


رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنروں ہسپتالوں و
لیبارٹریوں کیلئے

طب یونانی، آیور ویدک، ایوپیٹھک، ہو میوپیٹھک اور بائیو کیمک کا
انسائیکلو پیڈیا اور مفید معلوم کا حسین امتزاج



تاج الحکمت (پریکٹس آف میڈیسن)

اس کتاب میں ہر مرض کی تعریف، علامات، وجوہات تشخیص اور ہر مرض کے ایلوپیٹھک، یونانی،
آیور ویدک، ہو میوپیٹھک اور بائیو کیمک علاج تفصیل سے لکھے گئے ہیں نیز آسانی سے ملنے والی جڑی
بوٹیاں اور دیسی ادویات بھی درج ہیں تاکہ دیہاتی علاقوں کے رہنے والے بھی استفادہ کر سکیں۔

دور حاضر کی ایک جامع مستند اور مفید ترین کتاب

مصنف: ڈاکٹر و حکیم ہری چند ملتانوی گولڈ میڈلسٹ، میڈیکل ریسرچ اسکالر،
رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر و مصنف کتب کثیرہ

ملک بک ڈپو
اردو بازار، لاہور

16047
77

سائنٹیفک سوشل سائنڈر ڈیپوائنٹ نقطہ نظر سے صرف رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنرز، ہسپتالوں، ولیبارٹریوں کے استعمال کیلئے

(جمہ حق مع حق نقل و ترجمہ بحق مصنف محفوظ ہیں)

طب یونانی، آیور ویدک، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک اور یایو کیمک
انسائیکلو پیڈیا اور مفید معلومات کا حسین امتزاج

تاج الحکمت

بالصویر

(پریکٹس آف میڈیسن)

جو
نظر ثانی اور ضروری تبدیلیوں کے بعد بیش بہا اضافہ کے ساتھ پہلے چھ ایڈیشنوں سے بدرجہا بہتر شائع کی گئی
ہے۔ اس میں ہر مرض کی تعریف، علامات، وجوہات، تشخیص اور ہر مرض کا ایلوپیتھک، یونانی، آیور ویدک، ہومیوپیتھک
اور یایو کیمک علاج تفصیل سے لکھے گئے ہیں۔ آسانی سے ملنے والی جڑی بوٹیوں اور دسی ادویات کی طرف توجہ دی گئی
ہے تاکہ اس سے دیہاتی علاقوں میں علاج بلا تکلیف ہو سکے۔ یہ ایک جامع و مستند گرنٹھ ہے جس کی نظیر زمانہ ماضی
اور حال کے طبی لٹریچر میں موجود نہیں!

مُصنّف
”فخر اردو“ ڈاکٹر و حکیم ہری چند ملتان، گولڈ میڈلسٹ، میڈیکل ریسرچ سکالرز رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنرز (پو)

۴


ملک بک ڈپو = چوک اردو بازار، لاہور

تاج الحکمت پر منظوم نظریہ

(از فیضیاب حکمت قبلہ بی، ڈی گرما صاحب شاعر و لیکچرار آل انڈیا ریڈیو)
جناب گرما صاحب و دیگر دوست میری تصانیف کی
تعریف تو کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ تمام طبی طبقہ کی ہیں اور میں
دوستوں کی رہنمائی سے ہی انہیں ترتیب دیتا ہوں۔ لیکن
میری ذاتی تعریف نہیں کی جانی چاہئے۔ امید ہے کہ تمام
دوست آئندہ خیال فرمادیں گے!۔۔۔۔۔ ہری چند ملتانی

ڈاکٹر ہری چند کا تاج الحکمت
ایک خاص ہنر مند کا تاج الحکمت
نام پائے گا زمانے میں یگانہ ہو کر
طبیہ فن کا یہ نایاب خزانہ ہو کر
ماہِ ناز صحیفہ اسے سمجھیں دانا
بخشش حق کا ہدیہ اسے سمجھیں دانا
روح لقمان و ارسطو کے اشارے سمجھیں
ماہر فن سر خرو کے اشارے سمجھیں
طبی افلاک کے مخصوص ستارے یہ ہیں
ارضی خاک کے شاداب نظارے یہ ہیں
ادویات اس میں موثر ہیں نہایت چیدہ
نسخہ بندی بھی عجب درجہ غایت چیدہ
تجربات روز و شب اکثر ہیں مطلق کامراں
اعلیٰ تشخیص مرض اسباب علت ہیں عیاں
کیوں نہ ہونا می گرامی تاج الحکمت برملا
قادر و شافی نے بخشا اس کو ہے حکم شفا
مستحق اس کا مصنف ہے مبارکباد کا
جو معالج خاص ہے گرما دل ناشاد کا

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں



ملک بک ڈپو ○ صابری برادرز لاہور
صابری دارالکتب ○ کتابک پبلشرز لاہور

صابری بک سینٹر

بسطانی روڈ ○ سمن آباد ○ لاہور



ناشر
ملک بک ڈپو، لاہور
مطبع
ندیم یونس پرنٹرز، لاہور

نٹرز، لاہور

نذر (بھینٹ)


بقراط

جالینوس



بوعلی سینا

ابن زکریا رازی



اپنے اُن بہو وطن اطباء نے نامدار کے نام جو مشرق و مغرب کے
بے معنی فرق و امتیاز سے بالاتر ہو کر مریض دُنیا کی خدمت کو ہی اپنا
مقصد حیات سمجھتے ہیں! ————— ہری چند ملتانی

قانونِ حکمت


ہم دوا دیتے تو ہیں لیکن شفا دیتا ہے تو
 خاک میں اکسیر کے جوہر دکھا دیتا ہے تو
 زہر میں بھی تیری قدرت سے شفا موجو ہے
 گرنہ ہو رحمت تری تریاق بھی بے سود ہے
 الہی آرزو یہ ہے کہ جو آئے شفا پائے
 مریض لا دوا آ کر یہاں اپنی دوا پائے
 ولیکن ہاتھ میں تیرے حیات و موت کے سماں
 کوئی ہے شاد و صحت سے کوئی ہے مرض کے نالاں
 نیست در قانونِ حکمت صنفِ قسمت راعلاج
 طشتِ فکر بوعلیٰ ایں جا زیامِ افتادہ است



برائے "تاج الحکمت"

مسنفہ حکیم ڈاکٹر ہری چند ملتان

(از جناب حکیم صادق حسن امرتسری)




تاج الحکمت

(بالتصویر) پریکٹس آف میڈیسن



فہرست مضامین



باب	مضمون	صفحہ	باب	مضمون	صفحہ
	اسرارِ نبض		پہلا	منہ پھر جانا، لعوہ، فشل پیرالائیس	۳۷
	علاماتِ اخلاط		دوسرا	اعصاب کی بیماریاں	۳۸
	دیباچہ			تشنج، امینٹن، کنولشن	۳۸
پہلا	دماغ کی بیماریاں	۱۷		تمدد، کزاز، ٹے ٹے سن	۳۹
	دردِ سر	۱۷		کیکسی، رعشہ، لرزہ، کوریا	۴۰
	آدھے سر کا درد، شقیقہ، مانگرین	۲۰		دردِ ابرو (عصاب)، بھوں کا درد، ٹمک ڈولر دس	۴۱
	دماغ کی کمزوری، صنت دماغ، سیری برل انیہا	۲۲		سن ہو جانا، سن بھری، حذر، انس تھینزیا	۴۲
	بے خوابی، ندراناش، سہرا، انسومینیا	۲۳		عصبی کمزوری، پھٹوں کی کمزوری، نیورس تھینیا	۴۲
	خوابِ غفلت، مورچا، بات، قوما	۲۵		رجی درد، عصبی درد، نیوریلجیا	۴۴
	ورم دماغ، سرسام، می منجائٹس	۲۶		گردن میں بل پڑنا، رائی نیک	۴۵
	بھول جانا، نسیان، ایم نے سیا	۲۷		پسیوں کا عصبی درد، نیوریلجیا	۴۵
	سر ہکراتا، دوار، ورٹی گو	۲۷		لنگڑی کا درد، عرق النسا، شیاٹیکا	۴۶
	پاگل پن، جنون، ان سلیٹی	۲۸		کمر درد، وجع القطن، لمبے گو	۴۷
	مائیگولیا، وہم و سواس، میلن کولیا	۲۹	تیسرا	آنکھوں کی بیماریاں	۴۹
	خواب میں ڈرنا، کابوس، نائٹ میر	۳۰		آنکھ دکھنا، آئرش چشم، انفلمیا	۴۹
	سکتہ، سنایس، اپاپلیکس	۳۱		امراض چشم کے آزمودہ سننے	۵۰
	مرگی، صرع، اپسمار، ایپی لپسی	۳۲		درد چشم، آنکھ کا درد	۵۲
	فالج، ادھرنگ، سمی پچیا	۳۴		رد ہونے لکھنے، گرے نیورالڈز	۵۲

پیش لفظ

یہ امر موجب مسرت ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد طب یونانی، آیور ویدک و ہومیو پیتھک کو روز افزوں مقبولیت حاصل ہو رہی ہے اور معالجین کے علاوہ طبی لٹریچر کو اب عوام و خاص بھی شریک مطالعہ کرنے لگے ہیں، اس سلسلہ میں ایک عرصہ سے طبی طبقہ ایک ایسی مستند و جامع کتاب کے خواہاں تھے جس میں سرسے پاؤں تک تمام امراض کی تعریف و جوہات، علامات، تشخیص و آیور ویدک، یونانی، ایلو پیتھک، ہومیو پیتھک و بالوکیٹک (پانچ پیتھیوں) کے مجربات اور غذا و پرہیز کے علاوہ دیہاتوں میں ملنے والی عام جڑی بوٹیوں کے آزمودہ نسخہ جات موجود ہوں۔

ہم نے دیکھا کہ یہ مطالبہ درست تھا اور گھر بھر ڈاکٹر، ہندوستان کی جڑی بوٹیاں، جلد اول، دوم، سوم، چہارم جیسی طبی کتب کے پہلو بہ پہلو اس کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ہماری نظروں میں آج تک کوئی ایسا جامع و مستند گرنٹھ نہیں گزرا جو مادر ن علاج پر بالتفصیل جانکاری دے سکے، اس لئے کچھلے دس سال کی دن رات کی کوششوں سے اس مہان پور گرنٹھ "تاج الحکمت" کو ترتیب دیا اور اس کا کافی حصہ میں نے اٹھاسی ہزار مہریشوں کی پوچھ بھوئی نیچے شارنے (یو پی) میں پور تر دیائے گو منی گنگا کے کنارے جڑی بوٹیوں کے بھاری جنگلوں میں اور اس لئے اصناف شدہ ایڈیشن کو بھگوان شوکی پور ترقی ماؤنٹ آف (راجستھان) میں کڑی محنت ترتیب دیا ہے۔ ایلو پیتھک کے نئے نئے علاج درج کرنے میں مقامی تجربہ کار مستند ایلو پیتھک ڈاکٹر مشری داس دیو ایم، بی، بی، ایس کا تعاون حاصل کیا گیا اور طب جدید نے جتنے منازل ترقی طے کئے ہیں اور جو جدید انکشافات ہوئے ہیں، سب کو اس کتاب میں درج کر دیا گیا ہے، علاوہ ازیں یونانی، آیور ویدک و ہومیو پیتھک کے نئے علاج نے مرض کو دور کرنے کے لئے جو بھی نسخے تجویز کئے ہیں اور وہ تجربات میں آچکے ہیں۔ ان کو درج کیا گیا ہے۔

علاوہ ازیں کتاب کے اس نئے ایڈیشن کو ترتیب دینے میں عزیز (داماد) ڈاکٹر او پی سیتھ ایم، بی، بی، ایس۔ عزیزہ (دلڑکی) ڈاکٹر (مہتر) راج سیتھ ایم، بی، بی، ایس نے پریکٹیشنروں کی رہنمائی کے لئے ایلو پیتھک حصہ میں کافی تعاون دیا ہے اور عزیز (دلڑکی) ڈاکٹر وشنو ناتھ ملتانوی عزیزہ (دہو) ڈاکٹر (مہتر) اور ملتانوی عزیزہ (دہو) ڈاکٹر (مہتر) پون جی سے ایم، ایس نے پریکٹیشنروں کی رہنمائی کے لئے ایلو پیتھک، آیور ویدک، یونانی، ہومیو پیتھک حصہ کے ترتیب دینے میں بھرپور تعاون دیا ہے اور کافی محنت کی ہے اور انہیں کتاب میں حسب موقعہ لگایا گیا ہے۔ جہاں تک ہمارا تجربہ ہے اس کتاب میں کوئی سنا سنایا یا غیر مستند نسخہ نہیں دیا گیا ہے بلکہ تمام مجربات معمولِ طب ہی نہیں بلکہ جگر کے ٹکڑے ہیں جنہیں کتاب میں شائع کر دیا گیا ہے۔ مادر ادویات سلفا ڈرگز، مینی سلین، سٹریپٹومی سین، آریو مائی سین، کلورومائی ٹین، ڈیٹا مینز، مارونز اور دیگر مفید و مجرب انجکشن ہائے ہر بیماری کے ساتھ تحریر کئے گئے ہیں تاکہ مستند طبی معالجین مادر ن ادویات سے فائدہ اٹھائیں یہی نہیں بلکہ کتاب کے آخری صفحات میں پریکٹس میں استعمال ہونے والے عام جڑی اور قدیم آلات پر بھی بالتفصیل روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ تاج الحکمت (پریکٹس آن میڈسین) میرے طبی جیون کے عمل کا روح ہے اور ہر چیز کو میں نے نہایت ایمان داری سے لکھا ہے۔ ان مجربات کو آزمانے کے بعد ہی آپ ہماری محنت اور سچائی کی داد دیں گے مختصر طور پر طب ایلو پیتھک، یونانی، آیور ویدک، ہومیو پیتھک اور بالوکیٹک (پانچ پیتھیوں) طریقہ علاج کو "تاج الحکمت" (پریکٹس آن میڈسین) میں نہایت خوبصورتی سے سمودیا گیا ہے۔

مجھے اُمید ہے کہ قارئین کرام اسے پسند فرمائیں گے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس وقت یہ کتاب صرف اردو اور ہندی میں علیحدہ علیحدہ چھپ رہی ہے اور ہندوستان و پڑوسی ممالک کے کونے کونے میں نہ صرف طبی طبقہ کی خدمت کر رہی ہے بلکہ ہندوستان کے شہور آیور ویدک و یونانی و ہومیو پیتھک کالجوں کی لائبریریوں میں بھی رکھی گئی ہے جس سے گزربوٹ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب اسے پنجابی، انگریزی، گجراتی، مرہٹی، بنگالی زبانوں میں بھی چھپوانا زیر غور ہے کیونکہ ان زبانوں میں بھی بڑی بھاری مانگ ہے، طبی طبقہ نے میری اس تصنیف کی قدر دانی کر کے جو شرف مجھے بخشا ہے اس کے لئے میرا دم و دم مشکور ہے میں اس قدر مطلق مہان شکنتی کی ذات پاک کا بھی بہت احسان مند ہوں جس نے مجھے ناچیز کو طبی طبقہ کی اس اہم خدمت کیلئے لکھنے کی شکتی دی۔

بندہ

ہری چند ملتانوی میڈیکل ریسرچ سکالر

باب	مضمون	صفحہ	باب	مضمون	صفحہ
تیسرا	آنکھ میں پانی اُترنا، موتیا بند، کیڑا ٹیکٹ	۵۶	پانچواں	ناک کی بواسیر، پانی پس نیزائی	۸۶
	نظر کی کمزوری، ایسٹمی نوپیا	۵۷		ناک کی پھنسیاں وزخم	۸۶
	ناخونہ، ظفر، ٹریجیم	۵۹		سُونگھنے کی قوت جاتی رہنا، انوزمیا	۸۷
	آنکھ میں خونی نقطہ، ایکی موسس	۶۰		زیادہ چھینک آنا، سینزنگ	۸۷
	جالا، بھولا، ٹینٹ	۶۰		ناک کی خشکی، رائی نائی ٹس کا	۸۸
	روتندا، اندھرتا، عشا، شب کوری، میسی رل ادپیا	۶۱		زکام، نزلہ، کورائیزا، کٹار	۸۸
	دن کو نظر نہ آنا، روز کوری، نکمٹل ادپیا	۶۲		آسان مجربات برائے امراض ناک	۹۱
	بھینگا پن، سٹرابس مس	۶۳	چھٹا	منہ، زبان، حلق، دانت اور سورتھوں کی بیماریاں	۹۲
	پڑبال، ڈسٹی کائے سس	۶۴		ہونٹوں کا پھٹنا، کرکیڈ لپس	۹۲
	قریب نظری، بعید نظری، مائی ادپیا، مائی سٹروپیا	۶۴		ہونٹوں کی سوجن، انفلامیشن آف دی لپس	۹۳
	بامہنی، بی غرائی ٹس	۶۵		ہونٹوں کے زخم، السراف دی لپس	۹۳
	گوتا بخنی، انجن ہاری، ہارڈی اولم شائی	۶۶		ہونٹوں کا سرطان، کینسر آف دی لپس	۹۴
	ڈھلکھ دھو، اپی فور	۶۶		باجھوں کا پھٹنا، نفرش	۹۴
	اندھا پن، ایماروسس	۶۷		منہ کی پھنسیاں وچھالے، ثبور دہن	۹۵
چوتھا	کان کی بیماریاں	۷۲		بہت نفوک آنا، طابا لزم	۹۶
	کان درد، درد گوش، اوٹیلیجیا	۷۲		منہ سے بدبو آنا، اورل سپئر	۹۶
	کان بہنا، سیلان گوش، اٹوریا	۷۳		قوت ذائقہ کا زائل ہو جانا، اگولیا	۹۷
	کان کی خارش، پھنسیاں، اگزیم آف دی ایر	۷۳		زبان کی سوجن	۹۷
	کان کائیل، وکیس ان دی ایر	۷۴		زبان کا پھٹنا، فشر آف دی ٹنگ	۹۸
	کان میں کچھ پڑ جانا، فارن باڈی ان دی ایر	۷۷		سرطان زبان، کینسر آف دی ٹنگ	۹۸
	کان بچنا، ٹنائی ٹس	۷۸		تندو، اے نیولا	۹۹
	بہرو پن، ڈولف نس	۷۸		لکنت، سیکلا پن، ٹیمبرنگ	۹۹
	آسان مجربات برائے امراض گوش	۷۹		زبان کا بڑا ہونا، میکرو گلو سبیا	۱۰۰
پانچواں	ناک کی بیماریاں	۸۱		آسان مجربات برائے امراض زبان	۱۰۰
	ناک میں کچھ پھنس جانا، فارن باڈی ان دی نوز	۸۱		دانتوں کی بیماریاں	۱۰۱
	ٹکیر، رفاف، اسپن ٹک سبس	۸۲		دانتوں کے سوراخ کو بھرنے کا طریقہ	۱۰۱
	ناک کی بدبو، روزینا	۸۴		دانت نکالنا	۱۰۲
	ناک کے کیڑے، دوز نیزائی	۸۵		دانتوں کا سبب، ہمار طار	۱۰۳

باب	مضمون	صفحہ	باب	مضمون	صفحہ
پچھٹا	دانتوں کا بلہنا، اوڈن ٹومالی سبز	۱۰۵	آہٹھواں	دل کی بیماریاں اور دوران خون	۱۴۶
	دانت کھٹے ہو جانا، رن ٹیس آف ٹیٹھ	۱۰۶		ہر دیہ سپندن، دل کی دھڑکن، پلپی ٹیشن	۱۴۶
	دانتوں کا بجنا، اوڈنی ٹوپرائی سبس	۱۰۶		ہر دیہ شول، درد دل، انجائنا پکیٹورس	۱۴۹
	مسوڑھوں سے پیپ آنا، پائی اوریا	۱۰۷		مورچھاروگ، غشی، سنکوپ	۱۵۱
	مجربات امراض دانت	۱۰۸		ہر دیہ کی کمزوری، ضعف القلب، بریڈی کارڈیا	۱۵۳
	حلق و مری اور نرخرہ وغیرہ کی بیماریاں	۱۰۹		دل کا ڈوبنا، شوکس آڈمنڈریز	۱۵۵
	گلے پڑنا، ورم لوزٹین، ٹانسائی ٹس	۱۰۹		ہر دیہ کی پھرکن، اختلاج القلب	۱۵۵
	آواز کا میٹھ جانا، افونیا	۱۱۲		ہر دیہ کے غلاف کی سوجن، پیری کارڈائی ٹس	۱۵۶
	مشکل سے نگلنا، ڈس فے چیا	۱۱۳		دل کی چھٹی کا ورم، انڈو کارڈائی ٹس	۱۵۷
	کو اگرنا، الائنیشن آف دی یوولا	۱۱۳		دل کی سوجن، پیری کارڈائی ٹس	۱۵۷
	ورم حلق شدید	۱۱۴		خون کے دباؤ میں کمی، ہائپوٹیشن	۱۵۸
	حلق کی پھنسیاں	۱۱۶		بلڈ پریشر معلوم کرنے کا طریقہ	۱۵۸
	خناق و بانی	۱۱۶		خون کے دباؤ کی زیادتی، ہائی بلڈ پریشر	۱۶۱
	گل گھوٹو	۱۱۸		شریانوں کی سختی، آرٹیریلوسکلی روسز	۱۶۳
	کن بیرے	۱۱۸	نواں	معدہ و آنتوں کی بیماریاں	۱۶۵
	خنازیر، کھٹھ مالا	۱۱۹		اڈر شول، پیٹ درد، گیسٹریٹیا	۱۶۵
	آسان مجربات امراض گلو	۱۲۱		بد ہضمی، اجیرن، سوئے ہضم، ڈس پیپ سیا	۱۶۹
	غذا کی نالی کی سوجن	۱۲۱		بجکی، فواق، ہلف	۱۷۲
ساتواں	سینے کی بیماریاں	۱۲۲		آٹ کلش، قے، متلی، وائے ٹنک ریچنگ	۱۷۴
	کھانسی	۱۲۲		رکت دمن، خونی قے، ہیپے ٹی مے سبس	۱۷۶
	شواس روگ، ڈمر، ایسٹھما	۱۲۶		دھیمان، اسپارہ، فلیٹوٹینس	۱۷۸
	دور قلبی	۱۳۰		اماٹا شوکھ، معدہ کی سوجن، گیسٹریٹس	۱۸۰
	شو سٹنگ جور، نمونیا	۱۳۰		سرطان معدہ، کاری نوما آف دی ٹامک	۱۸۰ ✓
	آورن پروا، درد پلو، پلوریسی	۱۳۲		بھوک کم لگنا، انوریکسیا	۱۸۱
	پیشی شول، سینہ کا عضلاتی درد، پورودینا	۱۳۵		بھوک کا ہوکا، بولیموس	۱۸۲
	رکت سٹھ دن، خون بھونکنا، ہیماچی سبس	۱۳۶		معدہ کا ڈھیلا پن، ری لیک سیشن آف دی ٹامک	۱۸۲
	راج کھٹھما، پھیپھڑوں کی بیل ٹیو برکیو سبس	۱۳۸		اتی سار، دست، اسپہال	۱۸۳
	بیل ووق سے بچنے کیلئے مفید ہدایات	۱۴۵		رکت اتی سار، خونی دست، میلینا	۱۸۹

باب	مضمون	صفحہ	باب	مضمون	صفحہ
نواں	پرواہکا، پچیش، ڈسینڈری	۱۹۰	دسواں	جگر کا سکڑ جانا، سر دس آف دی پور	۲۲۷
	سنکڑ ہنی، گرہنی، پرانے دست، سپرد	۱۹۳		یکرت دردھی، جگر کا بڑھ جانا، انڈا رجمنٹ آف پور	۲۳۸
	کوشٹ بدھتا، قبض، کانسی پیش	۱۹۶		جگر کی ریاح	۲۳۸
	چھوٹے بچوں کی قبض دور کرنے کے تجربات	۱۹۹		جگر کی پھری، ہیپے ٹولمتھ	۲۳۹
	انیمالین حقنہ کرنے کا طریقہ	۲۰۱		جگر میں خون جمع ہو جانا	۲۳۹
	انہ شول، تولنج، کالک	۲۰۱		جگری جلودھر، بیسپاٹک ڈراپی	۲۳۹
	وسوچکا، ہیفیہ، کالہ	۲۰۳		جگر کا سرطان، کینسر آف پور	۲۴۰
	چھوٹے بچوں کے لئے ہیفیہ کے تجربات	۲۰۶		جگر کی آبی رسی	۲۴۰
	کرمی روگ انٹریوں کے کیڑے، ان ٹائیل ورمز	۲۰۷	گیارہواں	پستہ اور تلی کی بیماریاں	۲۴۱
	چڑنے، کدو دانہ، کیچوے	۲۰۸		پانڈو، یرقان، جانڈس	۲۴۱
	چھوٹے بچوں کی انٹریوں کے کیڑے	۲۱۱		صغرائی موجودگی کیلئے پیشاب ٹیٹ کرنے کا طریقہ	۲۴۲
	آنتوں میں گرہ پڑ جانا، ان ٹائیل آبسٹرکشن	۲۱۲		یرقان کو دور کرنے کے آسان تجربات	۲۴۳
	اپا نتر شوتھ، ورم زائدہ اعوز اپنڈے سائٹس	۲۱۳		تلی کا بڑھ جانا، انڈا رجمنٹ آف دی سلیپ	۲۴۵
	ٹاف ٹلنا	۲۱۵		تلی کے لئے آسان تجربات	۲۴۷
	ارش، بوایسر، پائلز	۲۱۵		تلی کا درد، سیلی نیلجیا	۲۴۸
	رکت ارش، بوایسر خونی، سمیرائیڈس	۲۱۵		تلی میں پیپ پڑ جانا، سپورٹین آف دی سلیپ	۲۴۸
	وات ارش، بادی بوایسر، پائلز	۲۲۰		پستہ کی پھری، گال بلیدراسٹون	۲۴۸
	گدا کا پڑنا زخم، فوایسر، فنجو	۲۲۲		تلی میں خون جمع ہو جانا، کن جس چن آف دی سلیپ	۲۴۹
	گدا کی سوجن، ورم مقعد، رکیٹائی ٹس	۲۲۴		تلی کی ریاح، یوکیسیا	۲۴۹
	گدا کی خارش، گدا کا پھٹنا	۲۲۴		جلودھر، استسقا، ڈراپی	۲۵۰
	گدا بھرنش، کاپنچ نکلنا، پردیپ سپس انائی	۲۲۵	بارہواں	گردہ و مثانہ کی بیماریاں	۲۵۴
	انڈو وردھی، آنت انزنا، ہرنیا	۲۲۵		گردہ کا ورم، نفرائٹس	۲۵۴
دسواں	جگر کی بیماریاں	۲۲۸		درد گردہ، ریگ گردہ، پھری گردہ	۲۵۶
	کمزوری جگر، یکرت شتھلتا	۲۲۸		پھری کا جڑی بوٹیوں سے علاج	۲۵۹
	ڈٹامن بی ۱۲ کے تجربات	۲۲۹		گردے کی کمزوری، البیومیوریا	۲۶۰
	یکرت شول، جگر کا درد، بیلری کالک	۲۳۲		گردے کے پھوڑے در سولیاں، رنیل ٹیومرز	۲۶۲
	یکرت شوتھ، ورم جگر میٹامائٹس	۲۳۳		درد مثانہ، ورم مثانہ	۲۶۳
	یکرت پھوڑا، جگر کا پھوڑا، بورایب سپس	۲۳۶		گردوں کا پھیل جانا	۲۶۳

باب	مضمون	صفحہ	باب	مضمون	صفحہ
بارہواں	پیشاب مشکل سے آنا، بند ہونا، پیدائش ہونا، رگ جانا	۲۶۴	تیرہواں	دیرج کا کم ہونا، قلت منی	۳۲۰
	پیشاب کی رکاوٹ کا جڑی بوٹیوں سے علاج	۲۶۷		دیرج کا اخراج نہ ہونا، عدم انزال	۳۲۱
	بے ارادہ پیشاب نکل جانا، سوتے میں پیشاب نکل جانا	۲۶۹		دیرج کی جگہ خون کا اخراج ہونا، ہیموپریسیا	۳۲۲
	پیشاب کی جلن، سپیل یوریمیکرائیٹس	۲۷۱		بوقت انزال پاخانہ کا اخراج	۳۲۳
	موترد دشی جور، پیشاب کا زہر، یوریمیا	۲۷۲		نفل خلاف وضع نظری کی عادت	۳۲۳
	رکت موترد، خونی پیشاب، ہیپے ٹوریا	۲۷۴		ادمک اُمنگ، کثرت شہوت	۳۲۴
	مدھومید، پیشاب میں شکر آنا، ڈایابٹیز، میلے ٹس	۲۷۵		ورم غدہ مذی، پراسے ٹامائی ٹس	۳۲۵
	ڈیابٹیس کا جڑی بوٹیوں سے علاج	۲۷۸		پراسیٹ گلینڈ کی بڑھوتری	۳۲۶
	ڈیابٹیس سادہ	۲۷۹		اندکوشوں کی سوجن، آرکائی ٹس	۳۲۶
	رکت میں شکر کی کمی، ہائپوگلیکیمیسیا	۲۸۰		اندکوشوں کا درد، نیوریلجیا آف دی ٹسٹیکلز	۳۲۷
تیرہواں	امراض مردانہ (مردوں کے امراض)	۲۸۱		اندکوشوں کی خارش، پرورائیکو سکر وٹامائی	۳۲۸
	مردانہ اعضائے تناسل	۲۸۱		اندکوشوں کی بڑھوتری	۳۲۸
	امراض مردانہ اعضائے تناسل	۲۸۶		اندکوشوں کی رگوں کا بھولنا، ویری کوسیل	۳۲۸
	جلق، مسٹر بے شن	۲۸۷		اندکوشوں میں پانی اُترنا، ہائیدروسیل	۳۲۹
	شادی سے پہلے و بعد کمزوری	۲۸۹		اندکوش کی یقینی میں رکت بھرنا، ہیپے ٹوسیل	۳۳۰
	کمزوری کے لئے جڑی بوٹیوں کا استعمال	۲۹۷		سیاری کی سوجن، بیلانائٹس	۳۳۰
	ضماد، طلا، پوٹلیاں	۲۹۸		سیاری کی پھنسیاں، ہرپیز آف گلیٹرس	۳۳۱
	سین دوش، احتلام، ناک ٹرنل امیشن	۳۰۱	چودہواں	زنانہ امراض	۳۳۲
	شکر پر مہیہ، جریان، سپرے ٹوریا	۳۰۵		جب لڑکی جوان ہونے لگتی ہے	۳۳۲
	دیرج کا خوردبین سے استمان	۳۰۶		زنانہ اعضائے تناسل	۳۳۲
	سرعت	۳۱۱		حیض	۳۴۰
	سرعت کا قوت خیال سے کامیاب علاج	۳۱۵		لڑکا پیدا کرنے کا راز	۳۵۰
	مردانہ بانجھ پن، سٹریٹل ان مین	۳۱۶		حفظ صحت حاملہ	۳۵۱
	عدم انزال	۳۱۶		گرہ پات، اسقاط حمل، بارش	۳۵۲
	دیرج کا تپلین، رقت منی	۳۱۸		ولادت	۳۵۷
	دیرج میں پیپ، پیپ دار منی	۳۱۹		وضع حمل کے لئے ضروری ہدایات	۳۵۹
	دیرج کا زیادہ گاڑھا ہونا، غلظت منی	۳۲۰		نخے بچوں کی پرورش	۳۶۰
	دیرج کی زیادتی، کثرت منی	۳۲۰		عسر ولادت	۳۶۳

باب	مضمون	صفحہ	باب	مضمون	صفحہ
چودھواں	کثرت نفاس	۳۶۷	سولہواں	زنانہ امراض کی جانچ کے مآثرن طریقے	۳۲۶
	بندش نفاس	۳۶۸	سترہواں	بچوں کی بیماریاں، چلڈرن ڈیزیز	۳۳۱
	پرسوت جوڑا، پیور پرل فیور	۳۶۹		نصف بچوں کا طبی معائنہ	۳۳۲
	امراض زچہ کے نئے مجربات	۳۷۱		تشہیح اطفال، انفنٹائل کنولشنز	۳۳۳
پندرہواں	بچہ دانی و کوئی کی بیماریاں	۳۷۷		بچوں کا درم دماغ، انفنٹائل منی نجاٹیس	۳۳۶
	سفید پانی آنا، لیوکوریا	۳۷۷		بچوں کی کھانسی، انفنٹائل برانکائٹس	۳۳۶
	اولاد کی آرزو، ستان اچھا	۳۸۱		ششک کاس، کالی کھانسی، ہوپنگ کف	۳۳۸
	آسان مجربات برائے استقرار حمل	۳۸۲		شواش نلی پرواہ، ڈوبہ اطفال، برانکوٹونیا	۳۳۸
	ایام کا بند ہو جانا	۳۸۶		ششوؤں کا شواش روگ، درہ اطفال، ایستما	۳۳۹
	ایام کی کثرت	۳۹۱		بچوں کے دست، انفنٹائل ڈائریا	۳۴۰
	بچہ دانی کی خارش، پھنیاں، زخم	۳۹۵		بچوں کی قے دستی، ناسیا دوائے ننگ	۳۴۲
	بچہ دانی کی سوجن، یونی کی سوجن	۳۹۸		بچوں کا پیٹ درد، گسٹریٹجیا	۳۴۳
	بچہ دانی کا ٹل جانا، ڈیپلیس منٹ آف یوٹرس	۳۹۹		وسوچکا، ہیضہ، کالرہ	۳۴۳
	بچہ دانی کا باہر نکل آنا، پردیپ سبس آف یوٹرس	۳۹۹		بچوں کی پرواہکا، ڈسینٹری	۳۴۴
	بچہ دانی کا بڑھ جانا، سب ان ویویشن آف دی یوٹرس	۴۰۰		بی وند، قبض، کانسٹیپیشن	۳۴۴
	بچہ دانی کا چھوٹا ہونا	۴۰۱		کرمی روگ، انٹرٹریوں کے کیڑے، انٹسٹائنل ورمز	۴۴۵
	بچہ دانی کی بدبو	۴۰۲		بچوں کا اناہ شول، قویج، کالک	۴۴۶
	بچہ دانی کا سنہ بند ہو جانا	۴۰۳		اجیرن، بد معنی، ڈس پیپ سیا	۴۴۶
	بچہ دانی کا اینڈرس	۴۰۳		بچوں کے دانت نکلنا، میٹھنگ	۴۴۷
	بچہ دانی کا ناسور	۴۰۴		بال شوش، سوکھا مسان، مارمس	۴۴۸
	بچہ دانی کی رسولیاں	۴۰۵		امراض اطفال و کلیجی پوڈر	۴۵۰
	بچہ دانی کی بواہیر	۴۰۶		بچوں کی عام امراض کے مستند نسخے	۴۵۱
	بچہ دانی میں پانی جمع ہو جانا	۴۰۷	اٹھارہواں	جلد (کھال) کی بیماریاں	۴۵۵
	بچہ دانی کا درد	۴۰۷		گھاؤ، زخم، السرز	۴۵۵
	یونی لی اینٹمن، وجائی ٹنس مس	۴۰۸		پھنسی، پھوڑا، باکس، ایب سبس	۴۵۹
	سن یس، مینڈیازنڈروم	۴۰۹		پھوڑے پھنسیوں کا جڑی بوٹیوں سے علاج	۴۶۳
	باؤنڈ، سٹریٹ	۴۱۰		کھجلی، خارش، سکے بیز	۴۶۴
سولہواں	پرپوڑا، یوجن، فیمیلی پلاننگ	۴۱۶		خارش کا بھلون دسبزیوں سے علاج	۴۶۸

باب	مضمون	صفحہ	باب	مضمون	صفحہ
انفارمیشن	داد، رنگ ورم	۴۶۸	انفارمیشن	بالوں کی پیدائش روکنا	۵۰۷
	چرم دل، چنبل، سورائیس	۴۷۱		بالوں کو گھونگرالا بنانا	۵۰۸
	آبلے، چھالے، روپیا، پیمنی گس	۴۷۴		جوئی پڑنا، پیڈی کیلوسس	۵۰۹
	شیت پت، چھپاکی، ارٹی کیریا	۴۷۵		بدبو دار پسینہ آنا، بروڈروسس	۵۱۰
	پانی وات، چھاجن، اگزیمیا	۴۷۷		پسینہ آنا بند ہو جانا	۵۱۰
	شوٹ کشت، پھلپھری، لیکوڈورما	۴۸۰		خونی پسینہ آنا	۵۱۰
	سفید داغوں کا کامیاب علاج 'باچی'	۴۸۲		ناخن کے امراض	۵۱۱
	آگ یا گرم پانی سے جل جانا	۴۸۳		ناخن کا پتلا پڑ جانا	۵۱۱
	اندر پیت (گنج) نے وس	۴۸۵		ناخن کا موٹا ہو جانا	۵۱۲
	سناک روگ، ناروا، گنی ورم	۴۸۶		انگل و پڑھا، بسہری	۵۱۲
	شب چراغ، راج پھوڑا، کارنگل	۴۸۷		ناخنوں کا سفید پڑ جانا	۵۱۲
	چہرہ کی خوبصورتی کیلئے کریمیں اور آئینوں کے نسخے	۴۸۸	بسیواں	بخاروں کا بیان	۵۱۴
	بولی پھٹنا، چید بندیز	۴۹۱		تھرماسٹر دیکھنے کا طریقہ	۵۱۵
	پت، پرکلی ہیٹ	۴۹۲		آئرشک جو رات پ محرقہ، ٹائیفائڈ فیور	۵۱۶
	آبیچی، کنسٹھ مالا، خنازیر، سکروٹولا	۴۹۴		دشمن جو، موسمی بخار، ملیریا بخار	۵۲۱
	ہاتھی پاؤں، فیل پا، فلیریا سس فٹائی سس	۴۹۴		شیتلا، چیچک، سال پاکس	۵۲۸
	چوٹ لگنا، بروڈر	۴۹۵		وات شلشک جو، حمی نزلہ و بائیر، انفلوئنزا	۵۳۱
	بدبو دار پسینہ آنا، بروڈروسس	۴۹۶		رومانشکا، خسرہ، میزلز	۵۳۲
	اگنی و سرپ، سرخ باد، اری سلس	۴۹۶		راج کھشما، سل ودق، ٹیوبرکیولوسس	۵۳۶
	کدرا، ان گٹھ، کارنز	۴۹۷		گل سوئے کن پیرٹے، مپس	۵۳۶
	مہاکشٹھ، کوڑھ، جذام، پرسی	۴۹۸		روہنی، خناق و بائی، ڈنفیریا	۵۳۶
انفارمیشن	بال اور ناخن کی بیماریاں	۵۰۱		گردن توڑ بخار، سیری بروڈسائیل فیور	۵۳۶
	بال گرنا، ایلوپے سیا بالڈینس	۵۰۱		لال جو، سرخ بخار، سکارلیٹ فیور	۵۳۶
	بھوسی جھڑنا، بفا، ڈین ڈرف	۵۰۳		اگنی روہنی، طاعون، پلگ	۵۳۷
	بال چر، ایلوپے سیاری اٹیا	۵۰۴		پرسوت جو، پرسوت کا بخار، پیور پریل فیور	۵۳۹
	سفید بال آنا، ہوری نس	۵۰۴		اگنی و سرپ، سرخ باد، اری سلس	۵۳۹
	بالوں کو سیاہ کرنے والے تیلوں کے نسخے	۵۰۵		لوٹ آنے والا بخار، قحط کا بخار، ری لیپ سنگ فیور	۵۳۹
	ماڈرن سائنٹیفک خضابات	۵۰۶		ڈنڈک جو، ہڈی توڑ بخار، ڈنگو فیور	۵۴۱

باب	مضمون	صفحہ	باب	مضمون	صفحہ
بیسواں	شو سنگ جور، ذات الریہ، نمونیہ	۵۴۲	بائیسواں	امراض عامہ	۵۴۹
	کالا جور، کالا آزار، لیشن مینی اے سبس	۵۴۳		گردہ رسی، عرق النسا، سیاٹیکا	۵۴۹
	ہالوکھنشا جور، ریت کی کمی کا جور، سینڈ فلای فیور	۵۴۳		جوڑوں کا پھتر جانا، آرٹھرائٹس	۵۴۹
	چوہے کاٹے کا بخار، ریٹ بائیٹ فیور	۵۴۴		چھوٹے جوڑوں کا درد، گاؤٹ	۵۴۲
	مالٹا جور، حمی متوجہ، مالٹا فیور	۵۴۶		مٹاپا، مید روگ	۵۴۳
	زر د بخار، بلو فیور	۵۴۶		پتلا ہونا، ڈبلا پن	۵۴۵
	رکت دوشی جور، عفونی بخار، سپٹک فیور	۵۴۷		رکت سراؤ، ہیمنوفیلیا	۵۴۶
	رکتہ موثر جور، بلیک ڈائٹر فیور	۵۴۸		مرض باحکین، لمفے ڈینوما	۵۴۷
	آدرن پروا، ذات الجنب، پلیورسی	۵۴۹		کھج ادھکتا، لمفاٹرم	۵۴۸
	ایک دن کا جور، یک روزہ بخار، فیبری کیولا	۵۴۹		پیشاب میں ہموگلوبین کا اخراج	۵۴۸
	آم دات جور، گنٹھے کا بخار، روئے ٹک فیور	۵۵۰		خون میں سرخ ذرات کی زیادتی	۵۴۸
	آم دات کا جڑی بوٹیوں سے علاج	۵۵۲		خون کے سفید ذرات کا زوال	۵۴۹
	دودھ کا بخار، بلیک فیور	۵۵۲		فر فور، پر پیور	۵۴۹
	جرہ، انگارہ، انٹریکس	۵۵۵		بال گرہ، سوکھا	۵۴۹
اکیسواں	چھوت والی بیماریاں	۵۵۶		کال جور، بیری بیری	۵۸۰
	آپڈنش، بادرنگ، سفلس	۵۵۶		سکر بوٹ، سکروی	۵۸۲
	آتشک کا جڑی بوٹیوں سے علاج	۵۶۰		دیون، میکرومیما	۵۸۳
	بھربھوشن دات، سوزاک، گنوریا	۵۶۰		گل گند، گھیکا، گائٹر	۵۸۴
	دھنڑوات، جسم کا اکر جانا، ٹے ٹے نس	۵۶۲	تیسواں	منشیات، زہریں اور ان کے تریاق	۵۸۵
	ہنجراں، خنازیر، سکروولا	۵۶۲		مجربات ترک، اینون	۵۹۰
	پرواہکا، بچیش، ڈیسنٹری	۵۶۲		زہریلے جانوروں کا کاٹنا	۵۹۸
	مشک کاس، کالی کھانسی، ہونپنگ کف	۵۶۴	چوبیسواں	اتفاقی حادثات اور ان کا فوری علاج	۶۰۴
	ہباکشٹ، جذام، کوڑھ، پیرسی	۵۶۶		سردی کھانا، کھلا جانا	۶۰۶
	ہلکاؤ، رے بیز	۵۶۷	پچیسواں	استعمال آلات ڈاکٹری برائے معاینہ علاج	۶۰۸
	قطر شامی، اکٹی نوامی کوسز	۵۶۷	چھبیسواں	گورنمنٹ ہسپتالوں میں مروج فارماکوپیا	۶۱۴
			ستائیسواں	آج کی نئی ماڈرن ادویات	۶۳۹
			اٹھائیسواں	یونانی، یورپینک و ہومیو پیتھک پر ماڈرن تحقیقات	۶۵۷

اسرارِ نبض

علاج میں شہرت و کامیابی حاصل کرنے کے لئے مرض کی درست تشخیص ضروری ہے اور تشخیص الامراض ایک باقاعدہ فن ہے اور اہل فن نے اس کے مختلف گوشوں کو مکمل و مرتب کرنے میں اپنی عمریں صرف کر دی ہیں۔ اس سلسلہ میں تشخیص کے تمام حصوں میں نبض کو سب سے زیادہ نمایاں مقام حاصل ہے اور نبض کی اہمیت و سودمندی سے قدیم زمانہ کی طرح آج بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ نبض سے مہارت رکھنے والا طبیب جدید آلات تشخیص کے مقابلہ میں صرف چند منٹوں میں مرض کی اصلیت و ماہیت تک پہنچ جاتا ہے اور بعض دفعہ نبض کی تشخیص جدید آلاتی تشخیص کو بھی مات لے جاتی ہے۔

نبض سے تشخیص کی صورت میں معالج کو عمر، مزاج، جنس، غذا، نیند، ورزش، جسمانی حالت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، کیوں کہ ان صورتوں میں نبض کی طبعی حالت میں فرق ہو جاتا ہے، اس لئے ان سپیوؤں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، معتدل مزاج کے اوسط درجہ کے جوان آدمی کی نبض صحت کی حالت میں منتظم، ہموار، قوی اور قدرے منتہی ہوتی ہے اور ضربات کی اوسط تعداد ۷۲ دفعہ فی منٹ ہوتی ہے۔

بڑے آدمیوں کی نسبت بچوں کی نبض کسی قدر ترقیق اور سریع ہوتی ہے اور ضربات نبض فی منٹ کے حساب سے بچپن سے لے کر جوانی تک جوانی سے بڑھاپے تک نقشہ ذیل کے مطابق ہے:-

پیدا ہونے کے فوراً بعد	۱۴۰ مرتبہ	یہاں تک کہ عورتوں کی نبض مردوں سے زیادہ متضادت نہیں ہو اس کے بعد عورتوں میں
دودھ پینے کے زمانہ میں	۱۲۰ مرتبہ	
۵ یا ۶ سال کی عمر میں	۱۰۰ مرتبہ	
ابتدائی جوانی میں	۹۰ مرتبہ	۱۰۱ مرتبہ
بھرپور جوانی میں	۷۰ سے ۷۵ مرتبہ	۸۵ مرتبہ
نہایت کمزوری میں	۷۵ سے ۸۰ مرتبہ	۹۰ مرتبہ

گویا عورتوں کی نبض مردوں کی نسبت فی منٹ ۶ سے ۱۴ مرتبہ تک زیادہ حرکت کرتی ہے نبض کے متعلق خاص خاص ہدایات درج ذیل ہیں:-
 نبض عظیم:- وہ نبض ہے جو طول و عرض و بلندی میں اعتدال سے زیادہ ہو، یہ قوت و حرارت پر دلالت کرتی ہے، گرم مزاج اشخاص گرم بخا اور صفراوی سرسام میں یہ نبض پائی جاتی ہے، اگر حرارت زیادہ ہو تو نبض عظیم ہونے کے ساتھ سریع بھی ہوگی۔
 نبض صغیر:- نبض عظیم سے بالکل الٹ ہے اور کمزوری کی علامت ہے، بعض دفعہ کثرت غذا کے نتیجہ میں قوت کے باوجود نبض دب کر جاتی ہے۔ اس لئے خیال رکھنا چاہیے۔

نبض سریع:- جو معتدل نبض سے زیادہ تیز اور جلدی جلدی چلتی ہے، عصبی امراض، بخوابی، بخار، دل کی بیماریوں، بچہ دانی کی بیماریوں، ایامِ ہسٹریا کی علامت ہے، شراب، تمباکو، چائے اور ورزش و خوشی کے موقع پر نبض سریع ہو جاتی ہے۔
 نبض بطی:- نبض سریع کے الٹ ہے، نمونہ، بدضمی، معدہ کے دم، معدہ کے سرطان، پیشاب میں شکر آنا، مایو نمیا اور معدنی زہروں کے بد اثرات کی علامت

نبض متواتر :- اس نبض میں دوسریوں کا درمیانی وقفہ کم ہوتا ہے اور عام کمزوری و امراض دل کی حالت میں چلتی ہے ۔
نبض متضادت :- اس نبض میں وقفہ زیادہ ہوتا ہے ۔ یہ مقابلتاً طاقت پر دلالت کرتی ہے ۔

نبض صلب :- شریانی دیواروں میں زیادہ انقباض کی بنا پر ہوتی ہے اور خون کے غلبہ بخاروں کے شروع میں گردوں کے امراض اور مرض آتشک پر دلالت کرتی ہے ۔

نبض لین :- پٹھوں کی سستی اور جزل کمزوری کی بنا پر ہوتی ہے ۔
نبض متلی :- یہ نبض انگلیوں کے نیچے بھر بھری معلوم ہوتی ہے غلبہ خون کے امراض میں پائی جاتی ہے ، اگر مرض پر ایک چوٹ نرم اور ایک سخت پڑے اور یہ سلسلہ اسی صورت میں بنا ہے تو اس نبض کو مختلف منتظم کہتے ہیں ۔ اس قسم کی نبض امراض جگر ، بدھنی ، منشیات و محرکات کے کثرت استعمال اور دل کی بیماریوں ، سرسام و سکتہ میں چلتی ہے ۔ لیکن اگر چوٹ ہٹے کا فرق بے قاعدہ ہو جائے تو اسے غیر منتظم کہا جائے گا اور ایسی نبض دل کے امراض اور زہر خوردہ مریضوں میں پائی جاتی ہے ۔

نبض منشاری :- اگر نبض سریع ، متواتر اور صلب ہے تو مونہ و غیرہ کی علامت ہے ۔
نبض موجی :- یہ نبض منشاری سے ملتی جلتی ہے ، لیکن اس میں نرمی زیادہ ہوتی ہے ، اس لئے یہ کمزوری ، مونہ ، فاج ، سکتہ اور بخاروں میں پسینہ آنے پر دلالت کرتی ہے ۔

نبض ودی :- یہ نبض "موجی" سے ملتی جلتی ہے ، لیکن صغیر اور بلی ہوتی ہے ، یہ انتہائی کمزوری کی حالت میں چلتی ہے ، دستوں کے زیادہ آنے اور خون کے زیادہ اخراج ہو جانے پر دلالت کرتی ہے ۔
نبض منلی :- یہ ودی سے زیادہ صغیر ہوتی ہے اور متواتر ہوتی ہے ، انتہائی کمزوری ظاہر کرتی ہے ، بچوں میں بعض مردوں کے مقابلہ میں سریع اور متواتر ہوتی ہے ، عورتوں کی سریع کمزور اور صغیر اور بوڑھوں کی متفادت کمزور اور صغیر ہوتی ہے ۔ ایام والی عورتوں کی نبض سریع غیر منتظم ہوتی ہے ۔ ایام بند ہو جانے کی عمر میں ایسی ہی نبض چلتی ہے ، حمل کے دنوں میں نبض پہلے سے قوی ہو جاتی ہے ، چوتھے یا پانچویں مہینہ میں سریع اور صغیر ہوتی ہے اور چھٹے ماہ کے بعد نبض کمزور اور بلی ہو جاتی ہے ۔

علامات

یونانی نظریہ کے مطابق مرض یا تو بیرونی سبب سے پیدا ہوتا ہے یا اندرونی سبب سے ، بیرونی سبب میں موسم کی حالت مثلاً زیادہ گرمی ، زیادہ سردی ، برف سے دوچار ہونا ، لیکن اندرونی سبب میں سب سے بڑا سبب اخلاط میں تبدیلی ، فساد یا زیادتی ، کمی وغیرہ سے مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں اس تبدیلی کا اندازہ مندرجہ ذیل علامات سے لگایا جاتا ہے :-

۱۔ غلبہ خون کی علامت :- زبان اور جلد کی رنگت سرخ ہوگی ، منہ کا مزہ میٹھا ہوگا ، پھوڑے ، پھنسیاں زیادہ نکلیں گی ، نکیر جاری رہے گی ، سٹروں سے خون آئے گا ، غنودگی ، جمائیاں وغیرہ علامات ہوں گی ۔

۲۔ غلبہ بلغم کی علامت :- جلد کی رنگت نسبتاً سفید ، نفوک لیسیدار زیادہ منہ کا ذائقہ پھیکا ، اعضاء میں سستی ، کھلی اور ترش ڈکاریں آئیں گی ۔


۳۔ غلبہ صفرا کی علامت :- رنگ زرد ، نبض سریع اور متواتر ، منہ کا ذائقہ کڑوا ، پیاس زیادہ ، آنکھیں زرد اور حلیں ، منی ، بدن میں خشکی ، پیشاب زرد اور سرخ آئے گا ۔

۴۔ غلبہ سودا کی علامت :- جسم لاغر ، رنگت سیاہ ، نبض بلی اور صلب ، بے خوابی ، منہ ، ناک وغیرہ کی خشکی اور مریض تنہائی پسند ، متفکر اور وحشت زدہ رہے گا ۔

تاج الحکمت

(پریکٹس آف میڈیسن)

پہلا باب دماغ کی بیماریاں



شرائشول - درد سر - صداع - ہیڈک (Headache)

تعریف مرض :- عام طور پر سرد درد دماغ کی کمزوری یا خون میں سمیت شامل ہو کر دماغ میں پہنچنے سے ہوتا ہے۔ سرد درد دوسری بیماریوں کی ایک علامت ہے۔ یہ عام تکلیف ہے۔ لیکن انسان کے لئے ہن بٹائے مہمان کی طرح ہے۔

اقسام :- وجوہات کے لحاظ سے بہت سی قسمیں ہیں۔ عام طور پر پانچ اقسام مشہور ہیں۔ (۱) بوجہ گرمی یا سردی (۲) قحط سے (۳) کمزوری سے (۴) نزلہ و زکام سے (۵) دوسری امراض کے اثرات سے۔

وجوہات :- زیادہ گرمی یا سردی کا لگنا۔ کھانے پینے میں بے احتیاطی۔ ریاچ پیدا کرنے والی چیزوں کا زیادہ استعمال۔ دماغی تھکاوٹ۔ ہرگی۔ ہیٹیریا۔ کان۔ ناک۔ دل۔ گردہ و مثانہ وغیرہ کی امراض و دماغ ہل جانے۔ ذیابیطس اور زنانہ جنسی امراض وغیرہ اس مرض کا سبب ہوتی ہیں۔

علامات :- سر میں اکثر درد رہتا ہے۔ نبض کمزور۔ بے قاعدہ۔ خالی۔ گاہے عظیم نین تپتی ہوتی ہے۔ گرمی کے درد سر میں آنکھوں میں تلش، جلن اور سر کی جلد گرم اور زبان وناک کے نچھنے خشک ہوتے ہیں۔ سردی کے درد سر میں چہرہ بھر بھرا ہوا۔ حواس بوجھل اور سر کا لمس سرد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جس اعضاء یا عوارض کی وجہ سے درد ہو۔ اُن کی علامات پائی جاتی ہیں۔ بعض حالات میں منی اور قے کی شکایت بھی ہوتی ہے۔

ڈاکٹری علاج :- جس عارضہ سے درد سر ہو اُس کا علاج کرنا چاہیے اور ایسپرین و ایفون وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر عارضی فائدہ کے لئے ان چیزوں کا استعمال ضروری ہو تو مصلحات شامل کر لیں۔ اس سلسلہ میں ایسپرین سے تیار شدہ کئی پیٹنٹ دوائیں اسپرو، اناسین سارڈیان، نولجین، اے پی سی وغیرہ ملتی ہیں۔ انہیں مزاج کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ زیادہ مقدار میں استعمال کرنا کمزوری پیدا کرتا ہے یا اے پی سی، ایک ٹیکہ، بیرن (گلیکسو)، ۵ ملی گرام، دونوں کو ایک ساتھ پانی سے دیں۔ درد سر و بخار کے لئے مفید ہے۔

ایپی ڈین (Apidin) ایک سے دو گولی دن میں دو سے تین بار دیں یا ڈسپرین (Disprin) ایک سے دو گولی دن میں دو سے تین بار دیں یا ایکو جیک ایک سے دو گولی دن میں دو سے تین بار دیں یا میچی ٹول (Mazetol) ایک ایک گولی دن میں تین بار دیں یا پائر ہیک (Pyrigesic) یا پائری مول یا کرو سین یا پیراٹامول ایک ایک گولی دن میں دو سے تین بار دیں یا ویکانن (Veganin) یا کوڈوپارم یا زمالجین (Ziamalgin) ایک ایک گولی دن میں دو بار دیں یا پراکسی دن (Proxynon) ایک کیپ شولز ہمراہ چائے دیں۔ اگر قبض ہو تو اطر فیصل زمانی ۹ ماشہ یا مرہ ہر دو عدد یا گل قند کا استعمال کرنا چاہیے۔ پیٹنٹ ادویات میں کیٹونین، فروٹ سالٹ یا ڈسکولیٹ یا ہر یا ڈلکولیکس یا پرسونید استعمال کی جاسکتی ہیں۔ گرمی کے درد سر میں مریض کے لئے سرد ہوا اکامرہ اور ٹھنڈا پانی سر پر دھاریں اور سر پر اور روغن گل ہم وزن لے کر مالش کریں۔

یونانی طریقہ علاج :- عذاب ۵ عدد، بھی دانہ ۳ ماشہ، مغز کدو شیریں ۳ ماشہ، عرق گاؤ زبان ۱۲ تولہ میں لعاب بنا کر شربت صند دو تولہ ملا کر پلائیں یا یہ تبرید دیں۔

تبرید برائے درد سر گرم :- لعاب بھی دانہ ۳ ماشہ، شیرہ عذاب ۵ دانہ، شیرہ تخم کاہو مقشر ۳ ماشہ، سرد پانی یا عرق گاؤ زبان دو تولہ میں نکال کر شربت نیلو فردو دو تولہ ملا کر پلائیں اور بیرونی طور پر ماتھے پر دھنیاں خشک، صندل سفید، پھول گلاب، کافور ہر ایک ماشہ، عرق گلاب ۶ ماشہ میں حل کر کے ماتھے پر لپیپ کریں۔ اگر درد سر سردی سے ہو تو بیرونی طور پر دار چینی، سونٹھ ہر ایک تین تین اجوائن خراسانی دو ماشہ، زردی بیضہ مرع میں ملا کر ماتھے پر لپیپ کریں یا امرت دھارا (ست پودینہ، کافور، ست اجوائن، ہم وزن دھوپ میں رکھیں تیار ہے) کی ایک پھریری پیشانی اور کنپٹیوں پر لگائیں اور خوراک کی طور پر مندرجہ ذیل نسخہ دیں

دوائے درد سر سرد :- اطر فیصل اسطخودس ۹ ماشہ (۹ گرام) چند دن کھلائیں یا معجون فلاسفہ ۳ گرام اور دواء مسک ایک ملا کر دونوں وقت دیں۔ بہت مفید ہے یا دار چینی ۳ گرام، اسطخودس ۳ گرام، چھوٹی الائچی ۲ عدد، ۲۵ گرام پانی میں جوش دیں اور چھان کر ۲۵ گرام ملا کر بطور چائے پلائیں۔ آرام آجائے گا۔ اگر دماغ کی کمزوری کی وجہ سے ہو تو دماغ من بی ۱۲ کا عضلاتی انجکشن دیں۔ دماغ جسمانی کمزوری کے لئے مفید ہے۔ بہتہ بعد دوسرا انجکشن دیں یا مندرجہ ذیل نسخہ دیں :-

معجون مقوی دماغ :- خشخاش ایک پاؤ، چہار مغز آدھ پاؤ، الائچی خورد ڈیڑھ تولہ، طباشیر ایک تولہ، مغز سولفت آدھ مرچ سیاہ ایک تولہ، مغز بادام آدھ پاؤ، چینی سب کے برابر۔ پہلے خشخاش کو دودھ میں بھگو دیں۔ پھر گھوٹ کر چھان لیں۔ اب بڑے پانی میں چینی ڈال کر چاشنی بنالیں اور معجون تیار کریں۔ خشخاش کے بھوگ کو بھی بھون کر معجون میں شامل کر لیں۔ خوراک ۹ ماشہ ایک تولہ ہمراہ دودھ گائے نیم گرم سے استعمال کریں۔

دماغی :- گلہ بفتہ دو تولے، گلہ سرخ دو تولے، گاؤ زبان دو تولے، اسطوخودوس دو تولے، چھلکا ہڑ زرد دو تولے، سناہ کی دو تولے۔
مغز و صلیاں دو تولے، مغز بادام دو تولے، چینی سفید چودہ تولے۔ مناسب ادویہ کو باریک کر کے سفوف تیار کریں۔
مقدار خوراک ۹ ماشہ صبح و شام ہمراہ دودھ گائے ایک پاؤ استعمال کریں۔ درد سر تفتیہ، دوران سر، نزلہ دائمی اور قبض دور کرنے کے علاوہ مقوی دماغ ہے۔

مقوی دماغ کا آسان گھریلو نسخہ :- روزانہ دودھ دمر بہ آملہ، آٹھ گری بادام اور دو عدد ورق چاندی کے پیٹ کر استعمال کریں، چند دنوں میں دماغ میں تقویت ہو کر تکلیف دور ہو جائے گی۔

دیگر :- الائچی خورد آٹھ عدد، گری بادام آٹھ عدد، چھوٹا دو عدد۔ رات کو پانی میں بھگو دیں۔ صبح بادام و الائچی کا چھلکا اور چھوٹا ہارا کی گٹھلی دور کر کے پانچ تولہ مکھن ملا کر دو خوراک بنائیں۔ ایسی ایک یا دو خوراک روزانہ استعمال کریں۔ ایلو پیچی و ٹامنز، گولیوں اور انجکشنوں کا منہ توڑ جواب ہے۔

نسوار درد سر :- کا یا پھل ۱۲ اتولہ، پوٹاسیم پرمنگنیٹ ایک ماشہ باریک سفوف تیار کر لیں اور ایک چاول کی مقدار میں سنگھائیں، نزلہ زکام سے رکاوٹ کی وجہ سے درد سر ہو تو بہت مفید ہے۔

دیگر :- بھجھا ہوا چونا دو تولہ، نوشادر دو تولہ بند کارک والی شیشی میں ڈال کر اوپر مقوڑا سا پانی ڈال کر خوب ہلائیں اور سونگھیں۔ یا ایوینیا سونگھائیں۔

پین بام برائے درد سر :- کافور سات ماشہ، ست پودینہ ایک تولہ دو ماشہ، ست اجوائن سات ماشہ، آئیل آف نامن (روغن دار چینی) ساڑھے تین ماشہ، آئیل آف کلوز (روغن لونگ) ساڑھے تین ماشہ، آئیل آف کیجو پٹ سات ماشہ، آئیل آف ونٹر گرین ساڑھے تین ماشہ، ویزلین سفید ایک سیر، ہارڈ پیرافین دس تولہ۔

ترکیب :- کسی صاف برتن میں ہارڈ پیرافین اور ویزلین کو نرم آبخ پر گھٹلا لیں اور کسی صاف شیشی میں پہلی تینوں چیزوں یعنی ست کافور، ست پودینہ، ست اجوائن ڈال کر شیشی پر کارک لگا کر دھوپ میں رکھیں۔ چند منٹ میں حل ہو جانے پر باقی تیل ملا لیں اور گھٹلی ہوئی ویزلین میں ملا کر چوڑے منہ کی شیشیوں میں پکینگ کر کے فائدہ اٹھادیں۔ مقام درد پر پٹنے سے فوراً آرام ہو جاتا ہے۔

دیگر فارمولا :- کافور ایک تولہ، ست پودینہ چھ ماشہ، ست اجوائن تین ماشہ، ویزلین سفید ایک تولہ، روغن زرد گائے چھ ماشہ، تمام دواؤں کو آگ پر رکھ کر گرم کریں۔ جب تمام دوائیں حل ہو جائیں تو کھلے منہ کی شیشیوں میں ڈال لیں اور سردی کے لئے ماسختے اور کنپٹیوں پر لگائیں۔

دوائے درد سر (تجارتی راز) :- ایسپرین پانچ گرین۔ فنٹین تین گرین، کیفین دو گرین۔ ایسی ایک ایک خوراک گرم دودھ یا چائے کے ساتھ استعمال کریں۔ ضرورت کے مطابق چھ گھنٹہ بعد دوسری خوراک دے سکتے ہیں۔ کمزور اشخاص کو نصف خوراک دینی چاہیے۔ ہر قسم کے درد، درد شقیقہ، اعصابہ، نزلہ زکام اور بخار کو عارضی طور پر فائدہ دینے کے لئے مفید ہے۔ طب جدید میں اے پی، سی پوڈر کے نام سے مشہور ہے۔ آج کل فنٹین کی جگہ پیراٹامول استعمال کیا جا رہا ہے۔

دیگر :- ایسپرین، فنٹین، دارچینی سفوف بنا دیں۔ خوراک چار رتی سے چھ رتی ہمراہ چائے یا گرم پانی دیں۔

وردوں کے لئے تیل :- ونٹر گرین آئیل ایک اونس، پیرمنٹ آئیل ایک ڈرام، ملا لیں۔ تب ان میں ۲۵ گرام میٹھا تیل ملا لیں۔ دردوں کے لئے تیل تیار ہے۔ جس جگہ مقوڑا درد ہو تیل لگا کر زور سے مالش کریں۔ اگر اس میں میٹھے تیل کی بجائے ویزلین

ڈاکٹری علاج :- جس غلط کا غلبہ ہو اس کا علاج در دسری طرح کریں۔ دورہ کی حالت میں مریض کو کسی تاریک کمرے میں آرام سے لٹائیں۔ عارضی آرام کے لئے در دسری کے بیان میں لکھے گئے پین بام کو مانتے پر ملیں اور دوائے سرد در د کھلائیں۔ مکمل فائدہ کے لئے مریض کو ہدایت کر دیں کہ وہ قواعد حفظانِ صحت کی پابندی کرے اور اعتدال کی زندگی بسر کرے۔ قبض نہ ہونے دیں۔

۱۔ کیفیر گاٹ (Cafer Got) سینڈوز — یہ درد شقیقہ کی خاص دوا ہے جو حفظ مالتقدم اور علاج دونوں میں مروج ہے، ایک ایک ٹکیہ دن میں تین بار تازہ پانی سے دیں۔ (۲) لارجیکٹیل (Lar gactil) ایم بی — کی ۲۵ ملی گرام کی ٹکیہ ایک ایک کر کے دن میں تین بار تازہ پانی سے دیں۔ انٹی ہٹائین ادویات انٹی ٹین یا انٹی سان یا ایول میں سے کسی ایک کا استعمال کرائیں۔ ایک ایک گولی دن میں دو سے تین بار تازہ پانی سے دیں۔ (۳) اگر جنزل کمزوری سے یہ عارضہ ہو تو ڈامسن بی ۱۲، ۱۰۰ ملگرام عضلاتی انجکشن دیں۔ درد شقیقہ و در د اعصاب کے لئے مفید ہے۔ گائونرجن (Gynergin) ۴۴/۱ گرین کی مقدار میں عضلاتی انجکشن دیں۔

ماڈرن لیسر ج کے مطابق پھٹوں کے درد خواہ جسم کے کسی حصہ میں ہوں، ڈامسن بی ۱ کی کمی سے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ ڈامسن جو مختلف تجارتی ناموں بنروا (Benerva)، بیرین (Berin)، بی فورٹس (Befortis) وغیرہ ناموں سے ملتے ہیں۔ ایک سی بذریعہ عضلاتی انجکشن دیں۔ اگر کمزوری زیادہ ہو تو ساتھ میں ڈامسن بی ۱۲ انجکشن بھی ایک سی سی ملا کر سرد در د سے دن ایک انجکشن کیا جائے (۴) سخت درد کی حالت میں سارپیدان، اسپرو، اناسین یا اے پی سی یا اویڈن (Avedan) کا استعمال کریں، (۵) ڈائی ہائیڈرو وارگوٹامین (D. H. E. 45) سینڈوز — یہ ٹکیاں اور امپولز دستیاب ہیں۔ ٹکیاں ایک ایک کر کے دن میں تین بار دیں۔ امپولز ایک سی سی بشرط ضرورت دیں۔ حاملہ کو ہرگز نہ دیں۔

نئی ماڈرن ادویات :- (۱) سخت درد کی حالت میں پراکسیون (Proxyvon) ایک کیپ شولز ہمراہ پانی دیں۔ (۲) کیفیر گاٹ "کیو" (Caffer got "Q") کی ٹکیاں زبان کے نیچے رکھ کر چوسیں یا درد شروع ہونے سے پہلے کھلاویں۔ (۳) ایکوے جیک (Eqvagecic) یا کاربوٹائل (Corbytyl) یا نار جیک (Norgesic) یا سدھی نول۔ این (Sudhinol-N) ایک ایک گولی صبح و شام دیں (۴) آپٹیلڈون (OptaliDon) دو ٹکیہ دن کے وقت دیں۔ (۵) لیومی نال (Luminal) ۳۰ ملی گرام کی ایک ٹکیہ دن میں تین بار دیں (۶) گارڈی نل (Gardenal) ۳۰ ملی گرام کی ایک ٹکیہ دن میں دو بار دیں، (۷) سیکول (Siquil) ذہنی تناؤ یا فکر کی وجہ سے درد ہو تو دس ملی گرام کی ایک ٹکیہ دن میں دو بار دیں، (۸) سٹیمٹیل (Stemtil) ۵ ملی گرام سے ۲۵ ملی گرام کی ایک ٹکیہ کھلائیں یا اس کا عضلاتی ٹیکہ دیں، (۹) آسٹو لیسیم ایک ٹکیہ، سپازموسالجین ایک ٹکیہ دونوں ایک ساتھ پانی کے ساتھ دیں، (۱۰) میگریل (Migril) یا وایوگرین (Vasograin) ایک سے دو گولی درد کے وقت دیں۔

یونانی علاج :- دوائے درد شقیقہ :- اسطوخودوس تین ماشہ، مرچ سیاہ سات عدد، دھنیاں خشک چار ماشہ، پانی ڈیڑھ چھٹانک۔ ترکیب :- تینوں چیزوں کو رات کو پانی میں بھگو دیں۔ صبح گھوٹ چھان کر چھ سات بتاشہ کھلا کر سورج نکلنے سے پہلے پلا دیں۔ پہلے دن ہی فائدہ معلوم ہوگا۔ دس دن کے استعمال سے آرام آجائے گا۔ اگر درد کو کلی آرام نہ ہو تو چند روز تک اطر فیل صغیر کا استعمال کریں۔ دیگر :- اسطوخودوس، سولف، ریونڈ چینی، دھنیاں خشک، نمک سیاہ، نوشادر سموزن سفوف بنا کر ایک تا دو ماشہ ہمراہ چائے دیں۔ دیگر :- دھنیاں خشک تین گرام، اسطوخودوس تین گرام، کالی مرچ چھ عدد۔ باریک سفوف بنائیں، صبح سورج نکلنے سے پہلے تین چار بتاشہ کھا کر پانی سے لیں اور ایک گھنٹہ آرام کریں۔

یونانی مرکبات میں اطر فیل اسطوخودوس چھ گرام یا اطر فیل کشینز سونے سے پہلے ہمراہ دودھ نیم گرم لیں۔ قدرتی طریقہ علاج میں سرسوں کے تیل کی ماش سرد درد کے لئے نہایت مفید ہے۔

آیور ویدک علاج :- (۱) شاپرنی کے پتے پانی میں پیس کر سوار لیں، (۲) کیسر دورتی خالص گھی گائے میں بھون لیں اور دودھ بکری میں مصری ملا کر اس میں یہ کیسر ملا کر دیں، (۳) سمندر پھل پانی میں پیس کر اس کی دو چار بوندناک میں ٹپکانے سے آرام آجاتا ہے، (۴) سرس کے بیجوں کو سفوف بنا کر سوار لینا مفید ہے۔

ہومیو پیتھک علاج :- سورج نکلنے ہی در شروع اور سورج غروب ہوتے ہی دروغاب، کالمیا ۳۰ - ۲۰۰ - سورج نکلنے وقت بائیں طرف سر در شروع، دوپہر کو تیز، دن ڈھلنے ہی در دھلتا شروع ہو، سپائی جیلیا ۳۰ - ۲۰۰ - دوپہر کو در شروع آر جینٹ میٹ ۳۰ - ۲۰۰ -

غذا و پرہیز :- در شدید ہو تو غذا نہ دیں۔ جب کم ہو جائے تو مقوی اور زود ہضم غذائیں شوربا، بخنی، دودھ، آش جو، نخود آب، دال مونگ، کچھڑی اور چپاتی وغیرہ دیں۔ نفاخ اور دیر ہضم چیزوں مثلاً آلو، گو بھی، دال ماش، بیکن، پیاز، تیل اور بناستی گھی کی چیزوں سے سخت پرہیز کریں۔

مشک شہقتلہ کمزوری دماغ - ضعف دماغ - سیرینرل انیمیا (Cerebral Anaemia)

تعریف مرض :- اس مرض میں رائے دماغ یا اس کے کسی حصہ میں خون کم پہنچتا ہے۔ خوراک کی کمی کی وجہ سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ وجوہات :- عام جسمانی کمزوری، کمی خون، کمزوری دل، کثرت جماع و احتلام، جلق، دائمی نزلہ، دماغی شریان میں رکاوٹ وغیرہ جس سے خون کا رُک رُک کر دماغ میں جانا یا رسولی وغیرہ کا پیدا ہو جانا۔

علامات :- اکثر در سر رہتا ہے، سر چکراتا ہے اور چہرہ پھیکا یا سفید پڑ جاتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا ہے، کبھی کان بجھتے سنائی دیتے ہیں۔ مرض کی شدت میں تشنج پیدا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں اور مریض دیوانوں کی سی حرکتیں کرتا ہے اور بیہوش ہو جاتا ہے وغیرہ۔

علاج ڈاکٹری :- بے ہوشی کی حالت میں آرام سے بستر پر لٹائیں۔ فوراً ایونیا سنگھائیں یا سپرٹ ایونیا ایرو میکس (Spirit Ammonia Aromatic) سنگھائیں یا سوار دیں، نوشادر اور چونا ہومزن ایک شیشی میں ڈال کر قدے مٹی کے گڑے میں بھون لیں۔ ہوش میں آنے پر سپرٹ ایونیا ایرو میکس ۳۰ منٹ مناسب پانی میں ملا کر ملائیں اور معجزات و محرکات کا فوری استعمال کریں۔ دوا المسد معتدل جواہر والی چار ماشہ عرق گلاب یا بید مشک چار تولہ کے ہمراہ دینا مفید ہے۔ اصل سبب مرض معلوم کر کے اس کا علاج کریں۔ کمی خون ہو تو خون پیدا کرنے والی دوائیں اور غذائیں کھلائیں۔ اس سلسلہ میں لور ایکسٹریکٹ بمعہ وٹامن بی ۱۲ کے انجکشن مفید ہیں۔ علاوہ ازیں کمزوری جگر کے بیان میں دی گئی سبب ٹانک ادویہ اس مرض میں بھی مفید ہیں۔ سر اور جسم پر روغن بادام کی مالش کریں۔ کثرت ملاپ سے کمزوری دماغ ہو تو مقوی اشیاء دیں اور ملاپ سے پرہیز کریں۔ کمزوری دماغ کے لئے مندرجہ ذیل نسخے نہایت فائدہ مند ہیں :-

یونانی علاج :- حریرہ مقوی دماغ :- مغز بادام مقشرات دانہ، مغز کدو، مغز تخم تربوز، مغز کھیرا، مغز خربوزہ ہر ایک تین ماشہ، خشکاش تین ماشہ، نشاستہ تین ماشہ۔ تمام ادویہ کو مقوڑے پانی میں خوب باریک پیس لیں۔ بعد ازاں ایک پاؤ دودھ ملا کر دو تین جوش دیں۔ روغن گائے پُر ۲ تولہ، چینی پُر ۲ تولہ اضافہ کریں۔ نیم گرم صبح سویرے نہار منہ استعمال کریں۔ دماغ کی خشکی، نیند کی کمی، دائمی نزلہ اور ضعف دماغ کے لئے بے حد مفید نسخہ ہے۔

گھریلو علاج :- مغز بادام پانچ دانہ رات کو پانی میں بھگو دیں۔ صبح چھلکا اتار کر پیچڑ پر دھتے میں ایک برابر پکڑ کر گھسیں۔ اس کے بعد اس میں

پانچ تولہ مکھن، پانچ تولہ بُوراکھانڈ اور پانچ عدد ورق چاندی ملا کر علی البیض ناستہ کریں، بے حد مفید ہے۔

مرجان بھسم :- مرجان شدہ ایک تولہ لے کر تین تولہ مکھن گائے میں ملا کر کوزہ گلی میں بند کر کے پانچ سیر پلوں کی آگ دیں، پھر پیس لیں۔ نہایت مقوی دماغ ہے۔ ایک رتی مکھن میں دیں۔

برہمی پلڑے :- برہمی بوٹی تازہ خشک شدہ بارہ گرام لے کر باریک کوٹ چھان کر روغن بادام سے چرب کر لیں۔ مرتج سیاہ تین گرام، دانہ لالچی خورد تین گرام باریک پیس کر اضافہ کریں۔ پانی میں گوندھ کر مرتج سیاہ کے برابر گولیاں بنائیں۔ صبح اور شام دو دو گولی نیم گرم دودھ سے دیں۔

سفوف مقوی دماغ :- سوف کے چاول (معز)، دھنیاں کے معز، معز بادام مقشر، مہری تمام ادویہ کے برابر۔ خوراک سوتے وقت ایک تولہ دودھ سے دیں۔ بعد میں کوئی چیز نہ کھائیں۔

اس سلسلہ میں خمیرہ گاؤ زبان غبیری یا خمیرہ گاؤ زبان سادہ کا استعمال بھی مفید ہے۔

اطریفیل برہمی :- ہڑ، بہڑ، آملہ صاف کیا ہوا ہر ایک پانچ تولہ، برہمی تازہ یا خشک کے پتے تین تولہ، مرتج سیاہ دو تولہ، روغن بادام شیریں پانچ تولہ میں چرب کریں۔ اس کے بعد شہد کے قوام میں اطریفیل بنالیں۔ خوراک ایک تولہ۔ دماغ و اعصاب کو قوت دیتا ہے۔

دوائے دماغ :- کشتہ چاندی تین ماشہ، کشتہ مرجان دو تولہ، کشتہ فولاد ایک تولہ، سب کو ملا کر محفوظ رکھیں۔ خوراک ایک سے دو رتی خمیرہ گاؤ زبان میں ملا کر دیں۔

دیگر :- نخود بریاں چھلے ہوئے، معز بادام شیریں برابر کھانڈ ملا کر ۹ ماشہ صبح نیم گرم دودھ سے لیں۔

آیور ویدک علاج :- پروال بھسم :- مرجان کو گھمیکوار کے گودے میں رکھ کر گل حکمت کر کے گچیٹ کی آگ دیں۔ ایک ایک رتی ان میں دو بار مکھن یا ملائی میں دیں یا برہمی گھرت یا تر پھلا گھرت کا استعمال مفید ہے۔ اشوگندھا ارشٹ (بیشج رتناولی) ایک سے دو تولہ تک برابر لانی ملا کر کھانا کھانے کے بعد استعمال کرائیں۔

قدرتی علاج :- خالص دودھ، گھی، مکھن اور مقوی پھل استعمال کریں، سر پر سرسوں کے تیل کی مالش بھی بہت مفید ہے۔

غذا و پرہیز :- بنگین و دال مسور، آلو، گو بھی، لہسن، پیاز، دیر بھم، بادی و ترش چیزوں سے پرہیز کریں، چائے، متباکو، شراب اور ملاپ سے پرہیز ضروری ہے، بخنی، شوربا، انڈہ، دودھ، مکھن، پختہ پھل، تازہ سبزیاں وغیرہ زود بھم و مقوی غذا میں دیں۔

نوٹ :- نسیان (بھول کی بیماری) ایم نے بیا (Amnesia) کا علاج ضعف دماغ کی طرح کریں اور مقوی دماغ ادویہ و اغذیہ کا استعمال کریں۔

ندراناش - بے خوابی - سہر - انسومنیا (Insomnia)

تعریف مرض :- نیند طبعی مدت سے کم آتی ہے، گاہے نیند بالکل نہیں آتی۔ اور انسان رات بھر پہلو بدلتا رہتا ہے۔ مرض بڑھ جائے تو مایچولیا (Melancholia) کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

وجوہات :- دماغ میں گرمی اور خشکی کی زیادتی سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کی زیادتی، بخار، درد، چورٹ، غم، فکر، منشیات اور چائے وغیرہ کا استعمال بھی اس مرض کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ امراض دل و دماغ، معدہ و جگر، قبض، بندش حبض، ہسٹریا، بد بھمی، خرابی خون بھی بے خوابی کا باعث ہوتے ہیں۔

علامات :- مریض رات بھر پہلو بدلتا رہتا ہے، لیکن نیند نہیں آتی، بعض کو ساری رات بعض کو چند گھنٹے بالکل نیند نہیں آتی، طبیعت بچپن رہتی ہے۔

علاج :- اصل سبب مرض کا علاج کریں۔ جس غلط کی زیادتی ہو، اس کے اخراج کا انتظام کریں۔ دماغ کو تراوت پہنچانے اور خشکی دور کرنے کے لئے ادویہ و اغذیہ سے کام لیں۔ سر میں روغن بادام، روغن کاہو یا بھیڑ کا دودھ ملیں۔ اگر درد سے ہو تو برشعشا دورتی کھلائیں۔ ایلو پیچی طریقہ علاج میں برومائیڈ کے مرکبات اور کلورل ہائیڈریٹ مفید بیان کئے گئے ہیں۔ مندرجہ ذیل نسخے اس مرض کا کامیاب علاج ہیں :-

ڈاکٹری علاج :- گارڈینیل (Gar dinal) ایم بی — کی ۲ گریں کی ایک ٹکیہ تازہ پانی سے دیں۔ جن کی نیندرات کو ٹوٹ جاتی ہے۔ اُن کے لئے مفید ہے، (۲) ڈائیل (Dial) سب — (یہ ایلو باربی ٹون ہے) ایک سے دو ٹکیہ سوتے وقت پانی سے دیں۔ (۳) سونے ریل (Seneryl) ایک ایک گولی دن میں دو سے تین بار دیں۔ (۴) لارجیکٹیل (Largactil) ایم بی — ایک گولی دن میں تازہ پانی سے دیں۔ (۵) سونالجین (Sonalgin) ایم بی — ایک سے دو ٹکیہ رات کو سوتے وقت تازہ پانی سے دیں، دردوں اور بے خوابی کے لئے مفید ہے۔ (۶) میلرل (Melleril) سینڈوز — دس ملی گرام کی ٹکیہ دن میں تین بار بے خوابی و درد کی بے چینی میں مفید ہے۔ (۷) سونیرگن (Sone rgan) سے اینڈبیکر — جلد نیند لانے کے لئے مفید ہے۔ ایک سے دو ٹکیہ سوتے وقت تازہ پانی سے دیں۔ (۸) ایکوانیل (Equanil) جان وائٹھ — ایک گولی دن میں دو سے تین بار یا سوتے وقت دیں۔ فکر کی وجہ سے نیند نہ آنے میں مفید ہے۔ (۹) لیومی نال (Luminal) بائیر — ۲ گریں سے ۲ گریں تازہ پانی سے دیں۔ (۱۰) ڈوری ڈین (Dori - den) سب — جلد و دیر تک نیند لانے کے لئے مفید ہے۔ ایک سے دو ٹکیہ تازہ پانی سے دیں — نیند لانے والی ادویات ہمیشہ با احتیاط دیں۔ ورنہ نقصان کا خطرہ ہے۔

کامپوز یا کیلیموڈ یا پیکسم یا ٹیناڈل یہ سب مرکبات ڈائزپام سے بنے ہیں۔ ایک گولی رات کو سوتے وقت دیں یا لبریم ایک گولی دیں۔ ویسپرکس یا مینڈرکس نیند لانے کے لئے بہت تیز ادویات ہیں جو صرف "رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنرز" کے تحریری نسخہ پر ہی کیمسٹوں سے مل سکتی ہیں۔ بغیر ڈاکٹر کے نسخہ کے ان کا استعمال منع ہے۔

ہائپنوسٹیکس کیپ ٹولز یا لارپوز گولی نیند نہ آئے تو فوری نیند کے لئے دیں۔ شدید درد و بے خوابی کے لئے ایکوانیل ایک ٹکیہ، ایسپرین پانچ گریں ایک ٹکیہ دونوں کو باہم ملا کر ایک پڑیہ بنائیں اور پانی کے ہمراہ دن میں دو بار دیں۔ بوڑھے لوگوں کو دھکی دوتا چار چمچہ خورد پانی ملا کر سوتے وقت پلانے سے نیند آ جاتی ہے۔

یونانی علاج :- دوائے بے خوابی :- پوٹاسی برومائیڈ، مغز سولف، دانہ الاچی کلاں ہر ایک ایک ٹولہ، سب کو کوٹ پیس کر سفوف بنالیں۔

مقدار و ترکیب استعمال :- ہر سے تین ماشہ تک حسب ضرورت بچوں کو بقدر تین رتی سے چار رتی تک عمر کے مطابق دیں، بچواری میں بہت مفید ہے اور جوش جنون میں دو دو ماشہ دن میں تین چار مرتبہ استعمال کرائیں۔

فوائد :- تسکین دیتی ہے اور عصبی امراض میں مفید ہے۔ نیند لاتی ہے اور احتکام و جربان کو بھی فائدہ دیتی ہے۔

لبوب سلعہ :- مغز فندق، مغز پستہ، مغز بادام شیریں، کنجد مقشر، مغز تخم کدوئے شیریں، مغز اخروٹ ہم وزن کوٹ کر گرم کر کے بطریق معروف نچوڑ کر روغن حاصل کریں اور ہر روز تھوڑا سا تیل سر پر خوب مالش کر کے جذب کریں۔ یہ روغن دماغ میں تری پیدا کر کے خشکی کو دور کرتا ہے۔ ناک کے زخموں کو بھرتا ہے، سہراور بے خوابی کو دور کر کے گہری نیند لاتا ہے۔

آیور ویدک علاج :- سفوف سرپ گنڈھا (چھوٹی چندن) ہم سے ایک ماشہ عمدہ سکن دوا ہے۔ دماغی امراض بے خوابی، سردرد، درد شقیقہ میں مفید ہے یا سرپ گنڈھا وٹی ایک گولی صبح و ایک شام نیند آ رہے۔ دماغی امراض میں مفید ہے۔ سرپ گنڈھا وٹی کے نسخہ

کے لئے "ماڈرن آپریٹو ویدک فارماکوپیا" ملاحظہ فرمادیں۔ قیمت سو پے ہے اور "نرالا جی" پبلی کیشنز پانی پت سے اردو یا ہندی میں منگاسکتے ہیں۔
موسم گرم ہو تو خشنخاش چار گرام، تخم کدو کی گری چار گرام، بیج کا ہو چار گرام، مناسب پانی میں پیس کر چینی سے میٹھا کر کے دن میں دو بار دیں۔
روغن کدو روغن بنفشہ ہوزن ملا کر سوتے وقت سرو تلوؤں پر ملیں۔ نیند لانے کے لئے برشتھا دو گرام رات سوتے وقت لیں، روغن خشنخاش سر پر لگائیں، خمیرہ بنفشہ یا خمیرہ خشنخاش کا استعمال بھی مفید ہے۔

ہومیوپیتھک علاج :- دماغی کمزوری سے یہ عارضہ ہو تو ایسڈ فاس (Acid Phos) دیں۔ بالو کیمک علاج میں ساتھ اگر سردرد بہت ہو تو کلکیریا کارب (Calcaria carib) دیں۔ درد سر کے لئے ازہد مفید ہے۔

قدرتی علاج :- دودھ، دہی، مکھن، خرفہ اور پالک کا ساگ، کدو، کھیرا، ناشپاتی، سنگترہ اور تربوز مفید ہوتے ہیں، اس سلسلہ میں رات کو مریض کے ہاتھ پاؤں کس کر باندھ دیں اور اسے تکیہ وغیرہ سے ٹیک لگانے یا اونگھنے نہ دیں۔ اس کے سامنے چراغ رکھ دیں (اگر بجلی ہو تو کمرہ میں زیادہ روشنی کر دیں) چند اصحاب اس کے پاس بیٹھ کر قصے کہانیاں سنانا شروع کر دیں۔ جب مریض تھک جائے تو اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیں۔ بجلی یا چراغ بجھا دیں اور کہانی سنانے والے خاموش ہو جائیں، اس سے بخوابی دور ہو جاتی ہے۔

غذا و پرہیز :- ہلکی اور زود ہضم غذا دیں اور سونے سے چار گھنٹے پہلے کھلا دیں۔ دودھ، ساگودانہ، شوربہ، یخنی، کدو، پالک، خرفہ، تڑی، انگور، انار دانہ، سیب وغیرہ دیں۔ دیرینہ اور گرم خشک چیزوں سے سخت پرہیز کریں اور مریض کو دھوپ میں پھرنے، کثرت ملاپ زیادہ دماغی محنت اور رنج و غم سے بچائیں۔

مُورچھا۔ خواب غفلت۔ بات۔ کوما — (COMA)

تعریف مرض :- مریض نہایت گہری اور لمبی نیند سوتا ہے اور اس کو جگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔

وجوہات :- مادہ بلغمی کی کثرت، دماغ میں کثرت یا کمی خون۔ امراض دماغ جیسے دماغ کاہل جانا یا دب جانا، مرگی، بستر یا سکتہ، تشنج، ردی بخارات کا دماغ میں پہنچنا، دماغی رسولی، سر پر چوٹ لگنا، افیون یا شراب کا زہر، سخت سردی لگنا اور فاقہ کشی، زیادہ دماغی محنت سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- سبب کے اعتبار سے خاص علامتیں ہوتی ہیں۔ خون کی زیادتی سے ہو تو ————— لمس گرم اور چہرہ اور آنکھیں سرخ ہوتی ہیں۔ سردی سے ہو تو ————— لمس سرد اور پیشاب سفید ہوتا ہے۔ مریض بالکل بے حس و حرکت بالکل بے ہوش ہوتا ہے اور جگانے سے جاگتا نہیں۔

علاج :- اصل سبب مرض کا علاج کریں، مریض کے سر کو اونچا رکھیں، دواء المسک معتدل جواہر والی تین ماشہ روزانہ دیں اور عادی مریضوں کو معجون فلاسفہ چھ ماشہ روزانہ کئی دنوں تک کھلائیں۔ اگر کمزوری دماغ سے یہ عارضہ ہو تو حریرہ مقوی دماغ جو صنعت دماغ کے بیان میں لکھا گیا ہے، استعمال کرائیں۔

قدرتی علاج :- خواب غفلت کے مریض کو ایسے امور سنائیں اور دکھائیں جو اس کو غم میں مبتلا کر دیں، کیونکہ جن امراض میں قوت فکر کمزور اور مہذب ہو جاتی ہے۔ غم نفس میں تحریک پیدا کر کے اصلاح کی طرف مائل کر دیتا ہے۔

غذا و پرہیز :- ہلکی اور زود ہضم غذا دیں۔ چائے، دال مونگ، تیتڑ، بیٹر، چوزہ مرغ، بادام وغیرہ کھلائیں، امرود، تربوز، برف

اورانیون وغیرہ سے پرہیز رکھیں، سرد ترکاریاں نہ کھائیں، بھنگ، شراب اورانیون وغیرہ سے بھی پرہیز ضروری ہے۔

شرشاورن پراہ - ورم دماغ - سرسام - می ننجائٹس (Meningitis)

تعریف مرض :- دماغ کی ایک یا دونوں جھیلیوں یا جوہر دماغ یا ان سب میں ورم ہو جاتا ہے۔

وجوہات :- چاروں اخلاط میں سے کسی ایک خلط کے غلبہ یا اجتماع سے ہوتا ہے۔ جس کی وجہ صدمہ دماغ، ملیریا، مونیا، محرقة، انفلوئنزا، بل وغیرہ کی چھوت، دل اور گردہ کے امراض، آتشک، کثرت تفکرات و دماغی محنت اور عورتوں میں بندش ایام وغیرہ، سرسام حقیقی میں دماغ کی جھیلیوں یا جوہر دماغ میں ورم ہوتا ہے۔ دوی، صفراوی، بلغمی اور سوداوی۔ پہلی دو قسمیں گرم اور آخری دو سرد ہوتی ہیں۔ سرسام غیر حقیقی میں دماغ اور اس کی جھیلیوں میں ورم نہیں ہوتا اور دیگر امراض میں بخارات دماغ کی طرف چڑھنے سے یہ حالت پیدا ہوتی ہے۔

علامات :- ہذیان، قے، قبض اور ۱۰۲ درجہ تک بخار ہو جاتا ہے۔ اکثر یہ مرض بخار وغیرہ کی حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ شدید درد اور تشنج ہوتا ہے۔ اس کے بعد مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔ شروع میں آنکھوں کی پتلیاں سکڑی ہوتی ہیں اور پھر کشادہ ہوتی ہیں۔ نبض کی حالت شروع میں بے قاعدہ اور سست اور آخر میں تیز تنفس بھی بے قاعدہ گہرا اور سرد ہوتا ہے۔ پیشاب اور پاخانہ خارج ہو جاتا ہے۔ اور اس حالت میں مریض وفات پا جاتا ہے۔ اگر اس کو صحت حاصل ہونے لگے تو اسے ہوش آ جاتا ہے۔ ہذیان، حرارت کم اور سرد در دور ہو جاتا ہے۔

ڈاکٹری علاج :- ریڑھ سے لمبر پنکچر دے کر سیال خارج کر کے (یہ عمل ایک کوالیفائیڈ ڈاکٹر کر سکتا ہے) پینی سلین کا ٹیکہ فوراً لگا دینا چاہیے۔ پینی سلین کرسٹلائن کی بجائے پروکین پینی سلین زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سٹریپٹومائی سین کا ٹیکہ بھی مفید ہے۔ خوراک کی طور پر کلورومائی سین، آریومائی سین، ٹیرامائی سین یا سنتھومائی سین میں سے کسی ایک دوا کا ایک کیپسول دن میں تین چار مرتبہ بقدر مزاج دینا بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ سلفا ڈایازین، سلفا مٹھایازول، سلفا میزاتھائین وغیرہ کسی دوا کی دد گولی مناسب سوڈا یا نیکارب ملا کر دن میں تین چار بار دینا مفید ہے۔ بچوں کو عمر کے لحاظ سے کم خوراک دینی چاہیے۔

سلفا گروپ سے تیزاب نئی ماڈرن دوا سپٹران (Septran) کے نام سے مارکیٹ میں ملتی ہے اسے مختلف کمپنیاں بکٹریم (Bactrim) سیناسیٹ، میتھو کیو پیریم، جیموٹرین وغیرہ نام سے فروخت کرتی ہیں، بچوں کے لئے اس کا شربت آتا ہے۔ اس دوا کو اندھا دھند استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بقدر مزاج و عمر استعمال کرائیں۔

یونانی علاج :- سر کو اونچا رکھیں۔ اور بال کٹوا دینے چاہئیں۔ مزاج کے مطابق گلاب، سرکہ اور روغن گل میں پارچہ تر کر کے رکھیں، صندل، کافور، گلاب وغیرہ کا غلطہ نگھائیں اور مونگ کے آٹے کو پشیر گائے میں گوندھیں اور اس کی موٹی روٹی بنا کر توڑے پر ایک طرف سے پچائیں۔ دوسری کچی طرف کو روغن گل سے چھڑ لیں۔ سر پر روغن گل لگا کر کچی طرف سے روٹی کو سر پر باندھ دیں۔ جب روٹی سرد ہو جائے تو اسے بدل دیں، لیکن روٹی اتنی گرم نہ ہو کہ سر جل جائے، رفع قبض کے لئے حقنہ کریں۔ پاؤں کی ہتھیلیوں کو گہیوں کی بھوسی کو کپڑے میں باندھ کر سہلانا چاہیے۔

آیور ویدک علاج :- بہت وات چنتامنی رس ایک ایک رتی صبح و شام شہد کے ساتھ دیں یا ویتال رس دیں۔

ویتال رس (رسیندھر سارنگرہ) :- بارہ اقسام کے خطرناک سن پات میں جب مریض کے دانت جکڑ چکے ہوں، بے ہوشی کا غلبہ ہو، آنکھیں پٹھمی ہو چکی ہوں۔ تو یہ دوا فوراً فائدہ پہنچاتی ہے۔

پارہ شدہ، گندھک آملہ سار شدہ (ہر دو کی سیاہ کجلی بنا لیں) میٹھا تیلیہ شدہ، کالی مرچ، ہڑتال در قی شدہ، سب کو بار یک پیس لیں۔

اور غبار کی طرح کریں۔ پھر پان کے رس کے ساتھ چار گھنٹے کھل کریں۔ پھر اس میں پارہ گندھک والی کجلی ملائیں۔ آخر میں کالی مرچ شامل کریں۔ ایک ایک رتی دن میں تین بار شہد یا ادک کے رس کے ساتھ دیں یا دشمل کو اتھ سے دیں۔
ہومیو پیتھک علاج :- بلیا ڈونا، ہالیوسم اور سٹرامونیم سفید ادویات ہیں۔

بالو کیمک علاج :- فیرم فاس (شرع میں)، کالی میور (درمیان میں)، اور کالی فاس تیسری حالت میں استعمال کی جاتی ہے۔
غذا و پرہیز :- شروع شروع میں تین چار دن غذا نہ دیں۔ آفاقہ کے بعد آب جو، آب گوشت، آب دال مونگ دیں۔ پھر مونگ کی نرم کھچڑی، ساگودانہ، پالک، توری، چپاتی وغیرہ دیں۔ اگر سردی کی وجہ سے ہو تو تیز، بٹر، کبوتر وغیرہ کی بجھنی دے سکتے ہیں، بنا پستی تیل، پیاز، لہسن، گرم مصالحہ، لال مرچ، اردی، آلو، گو بھی، چاول، دال ماش وغیرہ دیرینہ چیزیں بالکل نہ دیں۔

سمرتی بھرنش، بھول جانا، نسیان، ایم نے سیا (Amnesia)

تعریف مرض :- یادداشت کی طاقت خراب ہو جاتی ہے۔ مریض کو نئی یا پرانی باتیں یاد نہیں رہتیں اور اُن سے صحیح نتیجہ نہیں نکال سکتا۔ بعض اوقات یادداشت کی طاقت بالکل مفقود ہو جاتی ہے۔

وجوہات :- یہ مرض عموماً کمزوری دماغ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ سر پر چوٹ لگنے یا گر پڑنے سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ دائمی نزلہ یا زکام، امراض دماغ، ہڈم، رسولی، کثرت ملاپ، جلق، نشی چیزوں کا بکثرت استعمال، دماغی ہیمیج کا پیدا ہو جانا۔
علامات :- کوئی بات یاد نہیں رہتی، کئی بار دیکھی ہوئی صورتوں کو بھول جاتا ہے۔ رات کا خواب بھی صبح یاد نہیں رہتا۔ مریض اکثر زیادہ سونے کا خواہش مند ہوتا ہے۔

ماڈرن ڈاکٹری علاج :- سیرپ گلائی سروفاسفیٹ کمپاؤنڈ یا روبرائون یا فاسفو مین یا بی جی فاس یا بارٹھانک ایک دو چھوٹی برابر پانی اگر کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا مفید ہے۔ وٹامن سے بھرپور اعذیہ وادویہ دیں۔
یونانی علاج :- مریض کو مقوی ادویات دیں۔ اگر کمزوری دماغ کی وجہ سے ہو تو کمزوری دماغ کے علاج میں لکھے گئے نسخوں کو استعمال کرائیں۔ دماغ کی خشکی سے ہو تو کوبوب سبھ کی مالش کریں یا ردغن بادام ملیں، دماغی ہیمیج سے ہو تو مریض کو آرام سے لٹائیں اور برشٹادورنی ہمراہ عرق کاؤزبان کھلائیں۔

آیور ویدک و یونانی علاج بطور کمزوری دماغ کریں۔ دو مہرہ آملہ پانی سے دھو کر دس گہری بادام سے روزانہ بعد دوپہر کھائیں۔
قدرتی طریقہ علاج میں خالص دودھ، گھی، مکھن، بالائی اور سرسوں کے تیل کی سرپر روزانہ مالش کرنا بہت مفید ہے۔
غذا و پرہیز :- مقوی غذائیں، دودھ، شوربہ چوزہ مرغ، کدو، خرفہ، پالک، مغزیات وغیرہ مفید ہیں، محرک اور منشی اشیاء چائے، تہو، سبکاو وغیرہ اور دماغی محنت و کثرت ملاپ، سنگترہ، امروہ، لہسن، پیاز، لوبیا، دھنیا وغیرہ سے بھی پرہیز کرائیں۔

شر و بھرم - سرچکرا نا - دوار - ورنی گو - (Vertigo)

تعریف مرض :- سرچکراتا ہے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے۔ مریض کھڑا یا بیٹھا نہیں رہ سکتا اور سہارا لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

وجوہات :- کمزوری دماغ و اعصاب سر پر چوٹ لگنا، دماغ کا سوزاج سرد یا گرم، کمی خون، ہیئت خون، کثرت ملاپ، سکنت، مرگی، بخاروں اور شدید امراض سے صحت یاب ہونے کے بعد کمزوری کی وجہ سے یہ عارضہ پیدا ہو جاتا ہے۔

علامات :- مرض کی معمولی حالت میں اٹھنے بیٹھنے پر آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے اور سر ہلکے پڑتا ہے اور اسباب کے مطابق علامات پائی جاتی ہیں۔

یونانی علاج :- اصل سبب مرض کا علاج کریں کمزوری دماغ ہو تو کمزوری دماغ میں لکھے گئے نسخوں کو استعمال کریں۔ اور مرہ آملہ ایک عدد دھو کر ورق چاندی ایک عدد باہم ملا کر کھلائیں، کمزوری دل ہو تو خمیرہ مروارید پانچ ماشہ کھلائیں، قبض سے سر میں بخارات یا ریاح پیدا ہونے سے ہو تو فردٹ، سالٹ یا سڈلز پوڈر کا استعمال کریں۔ اطر فیض کشینزی کا استعمال بھی مفید ہے۔

ایلوپیتھک، آیور ویدک، ہومیو پیتھک علاج بطور کمزوری دماغ کریں۔

غذا و پرہیز :- دال مونگ، چپاتی، تیتڑ، بٹیر، مرغ کے گوشت کا شورب، دودھ، شلغم، پالک وغیرہ کھلائیں۔ دیرینہ اور بادی چیزوں مسور، ماش، لہسن، پیاز اور چائے، تمباکو، شراب، اندھ، کثرت ملاپ اور دماغی محنت سے سخت پرہیز کرائیں۔

پاگل پن - دیوانگی - جنون - ان شلیٹی (Insanilty)

تعریف مرض :- اس مرض میں انسان کی عقل میں فتور آ جاتا ہے اور ذہن میں غلط خیالات جاگزیں ہو جاتے ہیں اور اس کی عادات بدل جاتی ہیں، اخلاق میں خرابی آنے سے وہ فضول اور ناشائستہ حرکات و سکنات کرنے لگتا ہے۔

اقسام :- اس مرض کی بہت سی قسمیں ہیں۔ عام طور پر چار بڑی اقسام بیان کی گئی ہیں :-

۱۔ پرجوش جنون، جنون سبعی، مانیا (Mania)

اس مرض میں مریض کی طبیعت میں جوش و غصہ بہت ہوتا ہے اور وہ خونخوار درندوں کی طرح لوگوں کو دیکھنا اور کبھی ان پر حملہ آور ہوتا ہے۔

۲۔ کتے کا جنون، جنون کلیبی، سائیٹن کھروپی (Cynanthropy)

اس میں مریض کبھی تو فیض و غصہ کا اظہار کرتا ہے اور کبھی کتوں کی طرح خوشامد و چالپوسی کرتا ہے۔

۳۔ بھیڑیے کا جنون، قطرب، لایکومے نیا (LYCOMANIA)

اس قسم کے جنون میں مریض نہایت ترش رو اور مغموم رہتا ہے اور اسے کسی ایک جگہ قرار نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمیشہ آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، بک اور ناشائستہ حرکات کرتا ہے، عام طور پر لوگوں کو دشمن سمجھ کر ان سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے کبھی کبھی بھیڑیے کی طرح حملہ بھی کر بیٹھتا ہے۔

۴۔ سرسام کا جنون، ڈی لیرس مے نیا (DELIRIOUS MANIA)

اس قسم کا جنون سرسام صفاوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی ابتداء میں مریض زیادہ جاگتا اور بے قرار و پریشان حال رہتا ہے، کبھی غنیمتیں ڈر کر جاگ اٹھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سُرخی ہوتی ہے اور وہ سوال کے مطابق جواب نہیں دیتا۔

جنون کی باقی اقسام کا مفصل ذکر کرنے سے تو بجائے خود ایک ضخیم کتاب بن جائے گی۔ اس لئے میں پہلے یہاں عام اسباب و علامات دیوانگی بیان کر کے علاج لکھتا ہوں۔

وجوہات :- بہت سے اسباب ہیں۔ ذہنی صدمہ، فکر، خوف و ہراس، زیادہ دماغی محنت، دماغی اور اعصابی امراض، شدید بخار، حلق، کثرت ملاپ، منشیات کا بکثرت استعمال اور عشق وغیرہ۔

علامات :- بعض اوقات ایک دم مرض ظاہر ہو جاتا ہے اور مریض کے جذبات اس کے اختیار سے باہر ہو جاتے ہیں۔ وہ دشمنوں کے ساتھ ہمدردی اور دوستوں کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے۔ معمولی معمولی باتوں پر گالیاں بکتا ہے اور لڑنے مرنے پر بھی تیار ہو جاتا ہے۔ بچپنی ہوتی ہے، گرمی سردی معلوم نہیں ہوتی، آنکھیں سُرخ، شکل دیوانوں کی طرح، زبان میلی، بھوک کم، روشنی اور آواز کی برداشت بہت کم ہوتی ہے۔

علاج :- اصل سبب مرض کا علاج کریں۔ اگر کسی رنج و غم یا فکر و تردد سے یہ عارضہ لاحق ہو تو اسے دور کریں۔ نیند لانے کے لئے پوٹاسیم برومائیڈ کا استعمال کریں۔ ہائیوسین ہائیڈرو برومائیڈ کا انجکشن یا سرپائیل کا استعمال مفید ہے۔ کمزوری کی حالت میں مرکبات فولاد اور کاڈیور آئل دینا چاہیے۔ مریض کا سر منڈا کر روغن کدو یا لبوب سبجہ کی مالش کریں۔ خوراک کی طور پر معجون برشعشا ایک رتی مناسب عرق یا شربت کے ہمراہ استعمال کریں۔ دوائے المسک معتدل جواہر والی پانچ ماشہ ہمراہ عرق گاؤ زبان دینا بھی مفید ہے۔ اسرول (چھوٹی چندن) بوٹی دو سے تین رتی کا استعمال بہت مفید ہے۔ کیپ شولز میں بند کر کے دیں۔

غذا و پیمیز :- زود ہضم غذائیں دیں۔ سرد ترکاریاں، کدو، خرفہ، پالک، مولی وغیرہ اور پھلوں میں سیب، انگور، انار، شہتوت مفید ہے۔

سونگ کی کھجڑی، مرغ کا شوربہ اور دودھ کا استعمال بھی مناسب ہے۔ اس مرض میں کوئی تیز گرم دوا یا غذا کا استعمال سخت منع ہے۔

ورنہ صفرا کی پیدائش بڑھ کر مرض میں زیادتی ہو جائے گی۔ سرکہ، منشی اشبار، شراب، چائے اور دیر ہضم چیزوں، لہسن، پیاز، مینگن وغیرہ منع ہے، ملاپ اور زیادہ محنت، خراب لباس، تنہائی اور دھندلیک باتوں سے بھی سخت پرہیز کریں۔

شلیشک انما، مایخولیا، وہم و سواس، میلن کولیا، (Melancholia)

تعریف مرض :- اس مرض میں مریض کے خیالات فاسد و پریشان ہو کر وہ سودائی سا ہو جاتا ہے۔ مایخولیا جنون کی ہلکی قسم ہے۔

وجوہات :- یہ مرض افراطِ غم، ایام کے بند ہو جانے، کثرت محنت و ریاضت اور گرم چیزوں کے زیادہ استعمال سے ہو جاتا ہے۔

کثرت ملاپ، کثرت محنت دماغی، زیادہ جاگنے، نہایت مشکل مسائل کورات دن سوچتے رہنے، کبھی معدہ، جگر اور تلی میں خرابی ہونے یا سرسام شدید بخاروں کے بعد بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔

علامات :- مریض حیران و پریشان رہتا ہے۔ ہر ایک چیز سے ڈرتا ہے۔ خیالات خراب ہو جاتے ہیں اور وہ خود کشی کی طرف مائل ہوتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ مریض اس قدر وہمی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مٹی یا شیشے کا انسان خیال کرنے لگ جاتا ہے، کبھی حلق میں سانپ کی شکایت کرتا ہے کبھی گدھوں کی طرح چلتا ہے اور کبھی مرغ کی طرح بانگ دیتا ہے اور ہر وقت کوئی نہ کوئی وہم دماغ میں رہتا ہے۔

علاج :- اس مرض کے اصول علاج دیوانگی کی طرح ہیں، اصل سبب مرض کو دور کریں، قبض نہ ہونے دیں۔

ڈاکٹری علاج :- رائے پلا ایک سے دو گولیاں دن میں دو سے تین بار مزاج کے مطابق دیں۔ دورانِ استعمال میں قبض یا بخوالی نہ ہونے دیں اور اگر مریض علامات پیدا ہوں تو دوا کی مقدار کم کر دیں یا سرپائیل کا استعمال کریں۔

یونانی علاج :- اطریفیل صغیر، خمیرہ ابریشیم وغیرہ کا استعمال اور تقرنخ و تقویت قلب کے لئے دواء المسک معتدل جواہر والی مفید ادویات ہیں یا حالات کے مطابق بعد تفتیہ کامل شربت گڑھل (جو مایخولیا اور جوش جنون میں بہت مفید ہے) کا استعمال بھی مفید ہے یا مندرجہ ذیل سفوف کشینز کا استعمال کریں۔

سفوف کشینز:- دھنیا خشک مقشر دو تولہ، صندل سفید، تخم خرفہ مقشر، زہر مہرہ خطائی، طباشیر، گاؤ زبان ہر ایک چھ ماشہ، مصری سب کے برابر، کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور اس میں سے بقدر ۹ ماشہ عرق گاؤ زبان سے دیں۔ مایخو لیا دومی و صفراوی میں بہت مفید ہے۔

یونانی برومائیڈ:- اسرول (چھوٹی چندن) بونی چھ گرین دن میں تین بار ہمراہ دودھ گائے یا عرق گلاب دیں۔ زیادہ تکلیف ہو تو پندرہ گرین تک دیں۔ حیدر آباد کے ایک وید صاحب دوسو روپے فیس لے کر پاگل پن کا علاج کرتے ہیں۔ ان کا نسخہ صرف چھوٹی چندن ہے۔ جو اوپر دے دیا گیا ہے۔

دیگر:- چھوٹی چندن اصلی ایک تولہ، زہر مہرہ، صندل سفید، کہربا، جدوار، ابریشم شدہ ہر ایک ۹ ماشہ، بیج کا ہو دو تولہ، بادرنجبویہ اڑھائی تولہ، سولف تین تولہ، سفوف بنائیں، خوراک ایک ماشہ صبح و شام ہمراہ ماء الجبین دیں۔

نوٹ:- ماء الجبین آب پنیر میں وہ پانی جو دودھ کو پھاڑ کر اور پھر اے چھان کر علیحدہ کریں۔ اسے ماء الجبین کہتے ہیں۔

دیگر:- چھوٹی چندن بونی، گل سیوتی ہم وزن، خوراک دورتی ہمراہ تازہ پانی دیں۔

آیور ویدک علاج بطر یونانی علاج کے کریں۔

ہومیوپیتھک علاج:- ہمیشہ بکواس کرتے رہنا۔ کبھی چلانا، نیک و بد کا خیال نہ رہنا، سٹرامونیم ۳۔ ۲۰۰ ————— یادداشت کی کمزوری، کسی پر اعتبار نہ کرنا۔ دانائی ختم، انا کارڈیم ۳۔ ۲۰۰ ————— مزاج چڑچڑا، دماغی محنت، منشیات کے بد اثرات، نکس و امیکا ۳۔ ۲۰۰ ————— ملاپ سے دماغ کمزور، ایڈفاس ۳۔ ۲۰۰ ————— سرسامی حالت، روشنی ناگوار، بے خوابی، بیلڈونا ۳۔ ۲۰۰ ————— دماغ کمزور، مزاج دہمی، زنکم ۳۔ ۲۰۰ دیں۔

قد رنی طریقہ علاج میں مریض کو کسی عمدہ پُر فضا مقام پر رکھیں اور اس کا منظر خوش اور مسکن سرد ہوا دار معطر رکھیں۔ روزانہ قبل از غذا حمام کرائیں اور ہر ممکن طریقہ سے خوش رکھیں، سر پر روغن کدو کی مالش کریں۔

غذا و پرہیز:- غذائیں آش جو، پالک، خرفہ اور تر میوے کھلائیں، ترش و شیریں اور تنخیر پیدا کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرائیں۔

نیند میں ڈرنا خواب میں ڈرنا۔ کابوس، نائٹ میر (NIGHTMARE)

تعریف مرض:- مریض کو ڈر آنے خواب آتے ہیں۔ اسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دم گھٹا جا رہا ہے۔ عوام اس مرض کو آسیب خیال کرتے ہیں۔ لیکن طبی نقطہ نظر سے یہ مرض مرگی، سکنتہ یا جنون کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔

وجوہات:- بد ہضمی یا قبض کی وجہ سے خراب بخارات دماغ کی طرف چڑھتے ہیں۔ جس سے اعصاب میں تکلیف ہو کر سیلیوں کے درمیان عضلات میں تشنج پیدا ہو کر دم گھٹنے لگتا ہے۔ کثرت چائے، حقہ نوشی، غم و خوف اور بچوں میں پیٹ کے کڑے اس کے خاص اسباب ہیں۔

علامات:- نیند میں ڈر آنے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ دم گھٹتا ہے اور اسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بوجھ کے نیچے دبا جا رہا ہے اور وہ بول نہیں سکتا۔ بیداری کی حالت میں باقی علامات رفع ہو جاتی ہیں۔ لیکن دل کی گھبراہٹ باقی رہتی ہے۔

ڈاکٹری علاج:- اصل سبب مرض کا علاج کریں اور ایسی ادویات کا استعمال کریں جو بلڈ پریشر کو کم کر دیں۔ کیونکہ اس مرض میں بلڈ پریشر کم گرم دماغ کی جانب جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں سرپاسیل یا برومائیڈ و لیرینا مفید ادویات ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ادویات جو بانی بلڈ پریشر کے بیا میں آگے دی گئی ہیں، اس مرض میں بھی مفید ہیں۔

یونانی علاج :- اگر مریض کا مزاج سرد ہو تو باد رنجبویہ چار ماشہ، شہد ۹ ماشہ کے ساتھ کھلائیں یا اسطوخودوس ایک تولہ، مصری ایک تولہ، کوٹ چھان کر بقدر چار ماشہ سے چھ ماشہ چند دن رات کھلائیں۔ اگر مزاج گرم ہو تو جوارش جالینوس کا استعمال کریں۔ پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے ہو تو انہیں دور کریں۔ دماغی پریشانی سے ہو تو اسرول پانچ گرین تازہ پانی سے دیں۔

ایورویک علاج :- برہمی کے مرکبات مفید ہیں۔ سر پر تیل برہمی کی مالش کریں۔

ہومیوپیتھک علاج :- بطر زلسیان کے کریں۔

غذا و پرہیز :- بدہضمی پیدا کرنے والی دیرضیم اغذیہ اور کثرت چائے، قہوہ اور متبا کو نوشی سے سخت پرہیز کریں، غذا زود مضیم اور مقوی دیں۔

سیناس - سکتہ - اپاپلکسی (Apoplekxy)

تعریف مرض :- مریض بے حس و حرکت اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے سانس اور دل کی حرکات بہت کمزور ہو جاتی ہیں۔

وجوہات :- دماغ کی رگوں کی سختی اور خون کے دباؤ کا بڑھ جانا۔ شراب وغیرہ کا زیادہ استعمال، دل اور گردہ کے امراض زیادہ سخت، جوش غضبہ۔ بعض اوقات دماغ کی بڑی شریانوں میں رکاوٹ پڑ جانے سے ہو جاتا ہے۔

علامات :- ابتدا میں سر بھاری اور شدت کا درد ہوتا ہے۔ مریض اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے۔ سانس خراٹے سے آتا ہے اور چہرہ، سرخ یا زرد ہو جاتا ہے۔ سکتہ کی نوبت چند منٹ سے بہتر گھنٹے تک ہو سکتی ہے۔ بے ہوشی کامل ہوتی ہے۔ بعض حالتوں میں مریض کو آدھے جسم کا فالج ہو جاتا ہے۔ منہ سے جھاگ آنکھیں پھڑائی ہوتی، پتلیاں کشادہ، نبض کمزور ہوتی ہے۔ کبھی مریض فتور عقل میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں موت ہو جاتی ہے۔

ڈاکٹری علاج :- ایل نائٹراس ٹونگھنے کے لئے استعمال کریں۔ بلڈ پریشر کی زیادتی میں اس کے مطابق علاج کریں اور پیشاب کی رکاوٹ میں کیتھٹر کا استعمال کریں۔ قبض نہ ہونے دیں۔

یونانی علاج :- دورہ مرض میں مریض کے سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر اسے قد سے اونچا کریں، گلے اور سینہ کے بند ڈھیلے کر دیں۔ تریاق فاروق ایک ماشہ عرق گاؤ زبان میں حل کر کے حلق میں قطرہ قطرہ کر کے ٹپکائیں۔ مرض کی زیادتی کی حالت میں اسے کسی نزدیکی ہسپتال میں پہنچائیں، قبض کی صورت میں حقنہ کریں۔ موسم کے مطابق سر پر ٹی گلاب یا صندل یا کافور کی سرکہ میں گھس کر سر پر رکھیں، دواء المسک معتدل جواہر والی پانچ ماشہ کا استعمال بھی مفید ہے۔ اس سلسلہ میں دموی سکتہ میں فصد کھولنے نیز سپنڈلیوں پر پچھنے لگوانا یا سنگھیاں کھجوانا بھی مفید بتایا گیا ہے۔

ایورویک علاج :- بطر زلیونانی علاج کے کریں۔

ہومیوپیتھک علاج :- بے خبری میں پیشاب خارج، چہرہ میں امینٹن، نظر کمزور، پتلیاں پھیلی ہوئی، سیلا ڈونا ۳۰۔ بدن گرم اور خشک، خوف سے دورہ پڑنا، سر گرم ۱۰، ایونائٹ ۳۰۔ سرچکر کی تمام شکایات خاص کر بوڑھوں کو کوئم ۳۰۔

بھاگنے کی خواہش، گلونائن ۳۰۔ ۲۰۰۔ پٹھوں کی پھڑکن، بول نہ سکنا، کیوپرم ۳۰۔ ۲۰۰۔

غذا و پرہیز :- موسم کے مطابق غذائیں آتش جو، پالک، مونگ پالک کی سبزی، خرفہ اور ترمیو سے دیں، ترش چیزیں و پیٹ میں گیس پیدا کرنے والی اغذیہ جیسے آلو، اروی، گو بھی، دال ماش وغیرہ سے پرہیز کرائیں۔

ایسمار۔ مَرگی۔ صرع۔ ایپی لپسی (Epilepsy)

تعریف مرض :- عضلات میں تشنج ہو کر مریض بے ہوشی کے دورہ سے گزر پڑتا ہے۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔
 وجوہات :- غلیظ اخلاط یا ردی بخارات یا کسی سخی کیفیت کے اثر سے دماغی وسعتوں اور اعصاب کے راستوں میں ناتمام سدے ہو جاتے ہیں۔ جو ان اعضا میں روح انسانی کا لغو ذروک دیتے ہیں۔ جس سے اعضا میں تشنج پیدا ہو جاتا ہے۔ اکثر یہ مرض موروثی بھی ہوتا ہے۔
 زیادہ دماغی محنت، کثرت شراب نوشی، کثرت ملاپ، جلق، دماغ پر چوٹ لگنا، دماغی ورم، رنج و غم، آتشک، نقرس، وجع المفاصل، ایام کی خرابی۔ اعضائے تناسل کے بعض امراض اور سمیت خون اور بچوں میں پیٹ کے کیڑے، دانتوں کی خرابی کی وجہ سے یہ مرض ہو سکتا ہے۔
 علامات :- مریض دورہ پڑنے پر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتا ہے۔ اور تڑپتا ہے۔ ہاتھ پاؤں اینٹھ جاتے ہیں۔ منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اور منہ سے کف جاری ہو جاتا ہے۔ پیشاب اور پاخانہ بے اختیار نکل جاتا ہے اور ہاتھ پاؤں کو جھٹکا لگتا ہے۔ بقدری دیر بعد مریض ہوش میں آ جاتا ہے۔ دورہ کی مدت ایک سے تیس منٹ تک ہو سکتی ہے۔ بعض مریضوں کو دن میں ایک بار اور بعض کو کئی بار اور کبھی کئی ماہ اور سال گزر جاتے ہیں۔ اس مرض میں سب سے نمایاں علامت یہ ہے کہ مریض کے بدن کے کسی حصہ سے سرسراہٹ یا گرم ہوا کی ایک لکیر دماغ کی طرف جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

مرگی اور اختناق الرحم (ہسٹریا) کی علامات مشابہ ہوتی ہیں، لیکن مرگی کی خاص علامات کے باعث اس مرض کی تشخیص آسان ہوتی ہے۔ کیونکہ مرگی کے دورہ سے پہلے سرسراہٹ ہوتی ہے۔ دورہ کے دوران مکمل بے ہوشی ہوتی ہے اور دورہ کے وقت مریض زبان کاٹ لیتا ہے اور پیشاب و پاخانہ غیر ارادی طور پر خارج ہو جاتا ہے، لیکن اختناق الرحم (ہسٹریا) سے پہلے ایسی کوئی حالت نہیں ہوتی۔
 ماڈرن ڈاکٹری علاج :- دورہ کی حالت میں مریض کو صاف دھلی اور ہوادار نرم جگہ پر لٹائیں اور سر کے نیچے تکیہ دے کر سر اونچا کر دیں۔ دانتوں کے درمیان روٹی، کپڑے کی گدی یا بوتل کا کارک دیں۔ ناکہ زبان نہ کٹے۔ چہرہ پر سرد پانی کے چھینٹے ماریں۔ موسم کے مطابق سر پر برف رکھیں۔ ایسٹل نائٹراس کا ایک کیپ شول توڑ کر سنگھمائیں۔ دورہ کی حالت میں ہائیوسین ہائیڈرو برومائیڈ ایک سی سی کا انجکشن دینا مفید ہے، کیسٹرائیل کا حقنہ کریں۔ دورہ دور ہونے کے بعد اگر سردرد وغیرہ ہو تو کوئی مسکن دوا دافع درد دے دیں۔ جب دورہ ختم ہو جائے تو اصل سبب معلوم کر کے علاج کریں۔ قدیم ایلوپیتھی طریقہ علاج میں اس مرض میں سب ادویات سے برومائیڈ کا استعمال مفید ثابت ہوا ہے۔ روزانہ تین سے نو گریں تک یہ دوا دی جاسکتی ہے۔ اور مرض کے دورے بند ہو جانے کے بعد بھی دو سال تک یہ دوا جاری رکھنی چاہیے اور پھر آہستہ آہستہ یہ دوا بند کر دی جائے۔

ابتداء میں دورہ رُک جانے کے بعد دس گریں سے تیس گریں کی مقدار میں بقدر مزاج دن میں تین بار دیں۔ اگر رات کو نیند میں دورہ ہوتا ہو تو اس کو سوتے وقت ایک خوراک اور ایک صبح جاگتے ہی پلائیں۔ دورہ بند ہو جائے گا۔ دورانِ استعمال میں اگر برومائیڈ کے زہریلے اثرات ظاہر ہوں تو کچھ دنوں کے لئے دوا بند کر دی جائے۔ اگر دورانِ استعمال میں کبھی کبھی ناعہ کر لیا جائے تو زہریلے اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔
 مندرجہ ذیل ماڈرن ایلوپیتھک ادویات اس مرض کے لئے مفید ہیں :-

(۱) الیگزبرو مووولیرین (Elixir Bromo velarian) ایک سے دو چمچ دن میں تین بار دیں۔ (۲) ڈائی لنٹین (Dilantin) پارک ڈیوس — چھ سال سے اوپر کی عمر کو ایک کیپ شول دن میں تین بار پانی سے دیں۔ اگر مریض کو فینو باربیٹون یا برومائیڈ دیا جا رہا ہو تو اسے ایک دم بند کر دیں۔

کیپ ٹولز نکلنے وقت آدھا گلاس پانی پینا چاہیے۔ جوان مریض کی حالت میں بھی چھ کیپ ٹولز سے زیادہ مقدار دن رات میں نہیں دینی چاہیے، چھ سال سے کم عمر والے بچوں کے لئے اس کا سسپنشن (Suspension) آدھے سے ایک چمچ دن میں دو سے تین بار دیں۔ (۳) ڈیال (Dial) یا — دھی سے ایک گولی دن میں دو سے تین بار دیں۔ زیادہ تکلیف کی حالت میں عضلاتی انجکشن دوسری سی کی مقدار میں دیں۔ (۴) گارڈینل (Gardenal) ایم بی ۳۰ ملی گرام کی ٹیکہ دن میں دو سے تین بار دیں۔ (۵) روٹانول (Rutanol) ایک گولی دن میں دو سے تین بار تازہ پانی سے دیں، (گہری نیند لاتی ہے، با احتیاط استعمال کرائیں، کیونکہ یہ میٹھو فینو باربی ٹون کا مرکب ہے) (۶) ایکوئل (Equil) جوہن وائٹھ — ایک سے دو گولی تازہ پانی سے دیں۔ نیند لانے کے لئے مفید ہے، (۷) امبی نال (Embinol) سے بیکر — زبردست نیند آور ہے۔ پانچ گرین کی ٹیکہ ہمراہ تازہ پانی دیں، (۸) سرپاسیل (Serpasil) سرپ گندھا سے بنتی ہے، مرگی و بائی بلڈ پریشر کے لئے مفید ہے۔ ایک گولی دن میں تین بار مرض کے مطابق تازہ پانی سے دیں۔ یہی دوائی ری سرپین (Reserpin) سرپ روٹین سی (Serpirutin—C)، ڈائی روڈاکسین (Dirudixin)، سرپ نائیڈ اور سرپینا (Serpina) وغیرہ ناموں سے بھی ملتی ہے۔ ان میں سے کوئی آدھی سے ایک گولی دن میں تین بار دینا مفید ہے یا ایپی ٹون (Eption) یا روین (Garion) یا کو میٹل۔ ایل (Comital-L) یا ایفسولین (Epsolin) کا بلحاظ عمر استعمال مفید ہے۔

یونانی طریقہ علاج میں سہاگہ بریاں ایک ماش، شہد خالص چھ ماش میں ملا کر چند روز بوقت صبح کھلانا مفید ہے، بادر خجوبہ دو ماش، ہند ۹ ماش میں ملا کر دینا بھی بہت مفید ہے، اطریش اسٹو خود دس چھ ماش ہمراہ عرق منڈی پانچ تولہ دیں۔ عود صلیب یا جائفل گلے میں لٹکانا لالچہ دایک ہے۔ خالص عقرقر حاسفون بنا کر ایک گرام، پانچ گرام شہد میں دیں اور دورہ کے وقت منگھا بھی سکتے ہیں۔

معجون مرگی: چھلکا ہڑ کا بی، تریبد سفید، سونٹھ، مصطکی رومی، عود صلیب ہر ایک چھ ماش، اسٹخدوس دو ماش، ہرڑ سیاہ ایک تولہ، آملہ شہد ایک تولہ، دار چینی ۹ ماش، سب کو کوٹ چھان کر روغن بادام خالص میں چرب کر کے چینی سفید چھ تولہ، شہد خالص بارہ تولے، دونوں کو چھ تولے فی سولف میں حل کریں اور حسب دستور قوام بنا کر ادویہ مذکور ملا کر معجون تیار کریں، بعد کسی چینی کے برتن میں رکھ کر جو میں دن کریں اور چالیس روز کے بعد نکال کر روزانہ ۹ ماش سے ایک تولہ ہمراہ عرق سولف استعمال کریں۔

دوائے مرگی: جدوار دو ماش، عود صلیب دو ماش، دونوں کو باریک پیس کر خمیرہ گاؤ زبان دو تولہ میں ملا کر دو خوراکیں بنائیں اور ہمراہ فی گاؤ زبان استعمال کریں۔

دیگر: عقرقر حاکب تولہ، عود صلیب چھ ماش، دونوں کو باریک پیس کر شہد خالص تین گنا میں ملا دیں، اور دو ماش روزانہ چاٹ لیا کریں۔
نسوار مرگی: کا فور ایک ماش، تخم سرس چھ ماش، نوشادر چھ ماش، طوطا (ڈبڈا) اک ایک عدد، اسٹخدوس تین ماش، مرچ دکنی سفید دو ماش، وار بنا کر استعمال کریں۔ مرض کا دورہ تو فوراً رک جاتا ہے۔ اگر ایک ماہ تک متواتر استعمال کرایا جائے تو بالکل آرام آ جاتا ہے۔ صرف "نچھکنی" کا دوا بنا کر دورہ کے وقت منگھائیں۔

سفوف مسکن: چھوٹی چندن ایک تولہ، مغز دھنیا خشک پانچ تولہ، دانہ الاچی کلاں ایک تولہ، اجوائن خراسانی ایک تولہ، رب کاسفون اگر رکھیں۔ ایک ماش ہمراہ تازہ پانی دیں۔

دیگر: پوٹاسیم برومائیڈ، مغز دھنیا خشک، مغز سولف، دانہ الاچی کلاں برابر، سفوف بنائیں۔ تین ماش ہمراہ پانی استعمال کرائیں۔
خیرہ زبان جدوار عود صلیب والا تین سے چھ گرام صبح استعمال کرائیں۔

دیگر: اسرول (چھوٹی چندن) سفوف بنا کر تین رتی دن میں تین بار ہمراہ دودھ گائے دیں۔

آیور ویدک علاج: سرپ گندھا (چھوٹا چندرا) سفوف بنالیں، ہر سے ایک ماش دودھ گائے سے دیں۔

ہومیوپیتھک علاج :- نیند کی حالت میں دورہ پڑنا، کچی عمر کے بڑے شائع، ایکس ۳۰ - ۲۰۰ - نیند میں دورہ نہ دیر تک ہے، دماغی نقص، اوپیم ۳۰ - ۲۰۰ - پورنمائی کے قریب دورہ چنچ مار کر گرے، انگلیوں کا بے حس ہونا، کیو پریٹ ۳۰ - ۲۰۰ - نوٹ :- بچوں کی مرگی (ام الصبیان) میں عام ادویات جو مرگی میں لکھی گئی ہیں، مفید ہیں، لیکن یہ دوائیں بلحاظ عمر دینی چاہئیں۔ اور مقدار خوراک عمر کے مطابق ہو، زیادہ مقدار میں دوا کا استعمال نقصان دہ ہوگا۔

غذا و پرہیز :- زود ہضم اور بھوک سے غذا دیں، مونگ کی دال، بکری کے گوشت کا شوربا، پودینہ کی چٹنی اور مرغ، نیتربا بیٹر کا بھنا ہوا گوشہ کھلائیں۔ زیادہ گرم، سرد اور دیر ہضم غذائیں مثلاً مچھلی، ماش، کدو، چاول، امرود، بنینگن وغیرہ نہ دیں۔ کثرت ملاپ، رنج و غم اور اونچی پرچڑھنے سے سخت پرہیز کریں۔

پکھیا گھات - فالج - ادھرنگ - پیراپلیجیا (Para Plegia)

تعریف مرض :- بدن کا کوئی حصہ یا نصف حصہ بدن سُن ہو جاتا ہے۔ وہ بے حس ہو جاتا ہے اور حرکت نہیں کرتا اور اس کی قوت زائل ہو جاتی ہے۔

وجوہات :- اکثر سرد ہوا لگنے، ٹھنڈا پانی بکثرت پینے اور بلغم کی زیادتی سے پیدا ہوتا ہے اور بلغمی یا دُموی رطوبتیں اعصاب مساوات بند کر دیتی ہیں اور جس و حرکت کی قوتوں کا لغو ذرک جانا۔ اعصاب کا کٹ جانا، دماغی پھوڑا یا رسولیاں، دماغی جریان خون خوری، سردی لگنا، رنج و غم، اعصاب و عضلات کا سدہ، دماغی شرائن کا بند ہو جانا اور اُن میں خون جمن، کثرت ملاپ، منشیات کا استعمال اور کمزوری، محرقہ بخار، رعشہ، آتشک، باؤ گولہ، مرگی، وضع حمل اور بچوں میں پیٹ کے کیڑے و دانت نکالنا نیز کاتبوں کو کثرت کتابت کی وجہ سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

اقسام :- بدن کے تمام حصوں میں جہاں عضلات کی حرکت موجود ہوتی ہے، فالج ہو سکتا ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ عام معنوں میں کسی بھی عضو کے مفلوج ہونے کو فالج کہا جاتا ہے۔ لیکن طبی اصطلاح میں فالج یا فالج نصفی بدن کے بائیں یا دائیں نصف حصہ کو مفلوج جانے کو کہتے ہیں، بلحاظ اسباب و علامات اس کی مندرجہ ذیل مشہور اقسام ہیں :-

- (۱) دیوانہ فالج :- یہ سارے جسم پر گرتا ہے۔ اور اکثر دیوانہ اشخاص کو ہوا کرتا ہے، (۲) ادھرنگ :- اس سے جسم کے طولانی نصف کی جس و حرکت ناقص ہو جاتی ہے۔ (۳) فالج مع لقوہ :- اگر یہ مرض بدن کے نصف طولانی حصہ میں مع سر کے ہو تو فالج مع لقوہ کہتے ہیں
- نچلے دھڑ کا فالج :- اس میں کمر کے نیچے کا دھڑ شل ہو جاتا ہے۔ (۵) لقوہ :- اس میں نصف چہرہ کے ایک طرف کے عضلات مفلوج ہو جاتے اور چہرہ ایک طرف کو ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ (۶) استرخا یا مقامی فالج :- اس میں کوئی عضو جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ (۷) فالج مع رعشہ :- اس میں فالج کے ساتھ رعشہ بھی ہوتا ہے، اس قسم کا فالج بوڑھوں کو ہوتا ہے، (۸) فالج نخاعی :- اس میں مریض اچھی طرح گفتگو نہیں کر سکتا
- فالج کاتبان :- اس قسم کا فالج محروں، کمپازیٹروں، کاتبوں اور بابوؤں وغیرہ کو ہوتا ہے۔ (۱۰) فالج بصری :- اس مرض میں طبقہ تشکیب کا پردہ نورانی مفلوج ہو کر نظر ناقص یا بند ہو جاتی ہے، (۱۱) فالج سماعتی :- اس مرض میں قوت سماعت کا حصہ مفلوج ہو جانے سے سُننے کی طاقت یا ختم ہو جاتی ہے۔ (۱۲) فالج شامی :- اس مرض میں عصب شام کے مفلوج ہو جانے سے مریض کے سونگھنے کی طاقت ناقص یا ختم ہو جاتی ہے
- ذوقی :- اس میں عصب ذوق کے مفلوج ہو جانے سے ذائقہ کی طاقت ناقص یا ختم ہو جاتی ہے۔ (۱۴) فالج آتشکی :- جو زہر آتشک سے ہوتا ہے۔

فالج اختناق :- جو مرض باؤ گولہ (ہسٹریا) سے ہوتا ہے، (۱۶) فالج حداری :- جو مرض گنٹھیا کے سبب ہو جاتا ہے۔ (۱۷) فالج خناتی :- جو خناق کلی کے بعد ہو جاتا ہے۔ (۱۸) فالج سربی :- جو سکے کے زہر سے ہو جاتا ہے، (۱۹) فالج فقرسی :- جو مرض فقرس سے ہو جاتا ہے، (۲۰) فالج مہی :- جو مہی (تانبے) کے زہر سے ہو جاتا ہے، (۲۱) بچوں کا فالج :- یہ بچوں میں نخاعی امراض کے سبب سے ہو جاتا ہے۔

علامات :- مرض کا حملہ عموماً صبح کو ہوتا ہے۔ مفلوج حصہ پہلے کچھ گرم لیکن پھر سرد ہو جاتا ہے۔ اور اس طرف کے ہاتھ پاؤں کی حس و حرکت باقی نہیں رہتی۔ بغیر سہارے کے مریض کا اٹھنا دو بھر ہو جاتا ہے۔ مریض کے ہوش دھواں میں فرق پڑ جاتا ہے۔ بیمار ٹھیک طور پر بول بھی نہیں سکتا۔ عموماً زیادہ عمر کے بلغمی اشخاص مبتلا ہوتے ہیں، پچھلے دھڑکے فالج میں پہلے مریض کی کمر میں درد ہوتا ہے۔ پھر پاؤں میں کمزوری معلوم ہوتی ہے۔ بیمار لڑکھڑا کر چلتا ہے۔ اور پھر خپلا دھڑ بالکل مارا جاتا ہے۔ بعض اوقات محرّۃ، خسرہ، چیچک اور موسمی بخار کے دور ہو جانے کے بعد بھی یہ نقص واقع ہو جاتا ہے۔

رعشہ فالج میں پہلے تکان محسوس ہوتی ہے۔ پھر ایک پاؤں میں لرزش ہو کر دردمحسوس ہونے لگتا ہے۔ پھر ان سے رعشہ شروع ہو کر عموماً ایک طرف کے دیگر اعضاء کو مبتلا کر لیتا ہے۔ اگر چہرہ کی طرف کا فالج ہو تو ماؤں طرف کا چہرہ تندرست طرف کو کھینچ جاتا ہے۔ منہ کا ایک گوشہ نیچے کی طرف لٹک جاتا ہے۔ منہ سے رال بہتی ہے، ایک آنکھ کھلی رہتی ہے اور مریض کے سنسنے رونے میں منہ بالکل ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ مریض کو ہتھوکنے، سیٹی بجانے، پھونک مارنے میں سخت تکلیف ہوتی ہے۔

کاتبوں کے فالج میں ابتداء میں دائیں ہاتھ کی انگلیوں اور ہاتھ میں درد ہوتا ہے۔ ہاتھ فوراً تھک جاتا ہے۔ قلم پکڑنے کی طاقت ناقص یا زائل ہو جاتی ہے اور لکھنا محال ہو جاتا ہے۔

جب اس مرض کا اثر انٹریوں پر ہو تو پاخانہ خود بخود نکل جاتا ہے۔ مثلاً نہ پر ہو تو پیشاب پلا ارادہ خارج ہو جاتا ہے۔ بچوں کے فالج میں بچہ بھلا چنگار ت کو سوتا ہے۔ صبح اُٹتا ہے تو ایک یا دونوں پاؤں مفلوج ہوتے ہیں۔ رفتہ رفتہ عضلات ماؤں کی بڑھوتری رک جانے سے وہ لاغر اور بیکار ہو جاتے ہیں۔

ماڈرن ایلوپیتھک ادویات :- مرض کی علامات ظاہر ہوتے ہی مریض کو بالکل آرام سے بستر پر لٹا دیں اور اُٹھنے بیٹھنے کی سخت ممانعت کر دیں۔ قبض ہو تو سوپ وارٹنیم گرم کا حقنہ کرنا چاہیئے اور پھر قبض نہ ہونے دیں۔

(۱) بیرن (Berin) گلیکو ————— کا تولی گرم کا عضلاتی انجکشن ہر روز حالت مرض کے مطابق دیں۔ یہ انجکشن بنروا (Benerua) روش ————— ڈوٹ بی ۱ (Duvit B, 1) ڈیو میکس ————— بی ڈوم (Bedome) ایم ایس ڈی ————— ناموں سے ملے ہیں۔ (۲) میکرا بین (Macrabin) یا میکرا بین۔ ایچ (Macrabin-H) یا ریڈی سول ایچ (Redisol-H) یا ٹرائی ریڈی سول ایچ (Tri-Redisol-H) کے انجکشن مناسب مقدار میں دیں۔ (۳) ون ۱۲ (One-12) ایف ڈی کا ایک ایمپول ہر روز عضلاتی دیں۔ (۴) نیوروبیون (Neurobione) مرک ————— کا ایک ایمپول عضلاتی انجکشن ہر دوسرے دن دیں۔ (۵) بی پلیکس فورٹ (Be Plex - Forte) ایک سے دو ملی گرام ہر روز عضلاتی انجکشن دیں۔ (۶) بیوی ڈوکس (Bivi Dox) ایک ایمپول ہر دوسرے دن دیں۔ بتھا ڈاکسین (۱۲) (Bethadoxin-12) کا استعمال بھی مفید ہے یا کمپلین (Complamina) انجکشن یا گولی یا نیورو ٹریٹ کیپ ٹولز استعمال کریں۔ اگر ————— کی ادویات کے ساتھ میکرا بین یا میکرا بین۔ ایچ ملا کر لگایا جائے تو زیادہ مفید ہے۔ مرض کے سبب کا علاج کرنا چاہیئے ————— علاوہ ازیں گلائی سروفاسفیٹ، سٹرکینین کے مرکبات مفید ہیں۔ بیرونی طور پر اچھے پن بام کی ماسش و بجلی کی مشین سے شل شدہ اعضا کو تحریک دینا مفید ہے۔ نوٹ :- نیوروبیون فورٹ ایک گولی یا ٹرائی ریڈی سول گولی ایک سے دو عدد یا کو باڈیکس یا بیکار نام سی فورٹ یا بیسی ٹن فورٹ ایک گولی

تازہ پانی سے دیں۔

یونانی علاج :- ابتدا میں چار سے سات روز تک آب و غذا کی بجائے صرف ماء العسل (شہد خالص) دو تولہ عرق گاؤزبان بارہ تولہ میں جوش دے کر پلائیں۔ پانچویں یا آٹھویں دن جنگلی کبوتر کا شوربا بلا روغن پلائیں اور پانچویں یا آٹھویں روز منہج و مسہل دے کر مادہ مرض کا تنقیہ کریں۔ بعد تنقیہ ہینگ ایک ماشہ ماء العسل کے ساتھ روزانہ کھانا یا جند بیدستر ایک ماشہ آب شہد کے ہمراہ کچھ عرصہ متواتر کھلانا یا مربہ شدہ (سونٹھ) روزانہ ایک تولہ کی مقدار میں کھانا یا معجون فلاسفہ یا معجون کچلہ شدہ کا استعمال بہت مفید ہے۔

حب کچلہ :- کچلہ شدہ ایک تولہ، مرچ سیاہ ایک تولہ، ہر دو کو بار یک پیس کر پانی کی مدد سے سیاہ مرچ کے برابر گولیاں تیار کریں، خوراک ایک گولی ہمراہ دودھ بعد از غذا دیں۔ اور استعمال کے دوران میں ہر سات دن کے بعد دو دن دوا بند رکھیں۔ بیرونی طور پر روغن سرخ، روغن تارپین، روغن لونگ، روغن موم وغیرہ کی مالش کریں یا جند بیدستر، عقرقرہ، ہینگ ہر ایک تین ماشہ، روغن زیتون میں ملا کر عضو ماؤف پر ملیں یا یہ روغن فالج استعمال کریں۔

روغن فالج :- قسط نیم کوفتہ ساڑھے تین ماشہ، فلفل نیم کوفتہ، فرنیون ہر ایک پانچ ماشہ، عقرقرہ، جند بیدستر اصلی ساڑھے تین ماشہ، سپرٹ یا شراب ساڑھے بارہ تولہ، روغن زیتون سات تولہ۔ قسط اور فلفل کو سپرٹ یا شراب میں بھگو دیں، صبح اس قدر جوش دیں کہ شراب خشک ہو جائے۔ اور صرف روغن باقی رہ جائے۔ پھر فرنیون و جند بیدستر کو کوٹ چھان کر ملائیں اور آگ سے اتار کر محفوظ رکھیں۔ حب ضرورت نیم گرم کر کے مالش کریں۔ بچوں کے فالج میں بیرونی طور پر روغن پنہ دانہ کی مالش کریں اور خوراک کی طور پر خمیرہ گاؤزبان عنبری، جودارہ، عود صلیب والا بمقدار ایک ماشہ ہمراہ

عرق گاؤزبان دیں۔

حب فالج :- کچلہ شدہ چار تولہ، چھلکا جڑ متہ چار تولہ، کالی مرچ چار تولہ، ہرے سولف کے پانی سے گولیاں چھوٹے چنے کے برابر بنائیں ایک گولی صبح و ایک گولی شام ہمراہ ماء العسل دیں، لفظہ فالج کے لئے مفید ہیں۔

دیگر :- برادہ کچلہ شدہ دو تولہ، تخم سوئے ایک تولہ، لونگ دو تولہ، مرچ کالی دو تولہ، گودہ گھیکوار سے چھوٹے چنے کے برابر گولیاں بنائیں رات کو ایک گولی دیسی گھی سے دیں۔

روغن ہفت برگ :- اک کے پتے، بکائن کے پتے، ارنڈ کے پتے، سنہالو کے پتے، سہا بخند کے پتے، دھتورہ سیاہ کے پتے، تھوہر کے پتے ہر ایک ایک تولہ، تلی کاتیل ایک سیر میں جلائیں۔ اور چھان کر محفوظ رکھیں، بخور اساتیل گرم کر کے عضو ماؤف پر ملیں اور پیرے پرانی روغن باندھیں۔

آیور ویدک علاج :- یوگر ج گوگل یا مہا یوگر ج گوگل یا برہت وات چنتامنی رس کی ایک گولی صبح و ایک شام ہمراہ شہد دیں اور بیرونی طور پر نارائن تیل یا مہا نارائن تیل کا استعمال بہت مفید ہے۔ یاد رہے کہ شروع مرض میں کچلہ، سنکھیا، نولاد، کونین وغیرہ مقوی و محرک ادویات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ خصوصاً جب دماغ اور حرام مغز میں خراش اور اجتماع خون ہو تو کچلہ کا استعمال منع ہے۔

ہومیوپیتھک علاج :- اس تکلیف میں علاج مستقل مزاجی سے کیا جائے۔ دوائی کی دہرائی جلدی نہ ہو۔ دماغ میں پانی کی زیادتی ہو یا

چوٹ کی وجہ سے ہو تو آرنیکا ۳۰ - ۲۰۰ — بائیں جانب مفلوج ہو، ایکے سبس ۳۰ - ۲۰۰ — جسم کے کسی حصہ کا فالج، نظر کمزور،

سر مکرانا، کسی جلدی مرض کے دب جانے سے، کاسٹیکم ۳۰ - ۲۰۰ — بوجہ شراب نوشی فالج و پاؤں میں بے قراری رہنے زنگم ۳۰ - ۲۰۰ —

ایک جانب فالج، دوسری جانب امیٹھن، سٹرامونیم ۳۰ - ۲۰۰ — دانت نکلنے کے زمانہ میں بچوں کا فالج، کلکیر یا فاس ۶x — اگر

کسی قسم کا ٹیکہ لگنے سے فالج ہو تو مقوجا ۳۰ - ۲۰۰ دیں۔

غذا و پرہیز :- شوربا، بخنی، مونگ کی کھچڑی، پالک، کدو، خرفہ، سیب، انار، انگور وغیرہ کھلائیں اور سرخ مرچ، بنگین، آلو، گوبھی، مچھلی،

تمام بادی اور خشک غذاؤں نیز ملاپ، غم و غصہ اور کثرت دماغی محنت سے پرہیز کریں۔

منہ پھر جانا۔ لقوہ۔ فیشل پیرالائیس۔ (Facial Para Lysis)

تعریف مرض :- اس مرض میں چہرہ ایک طرف سے مفلوج ہو کر غیر طبعی طور پر دوسری طرف کھینچ جاتا ہے۔ جس سے دونوں لب اور ایک آنکھ کی پلکیں خوبی سے نہیں ہل سکتیں۔

وجوہات :- سردی لگنا، رقیق بلغمی مواد کا چہرہ کے اعصاب پر گرنا، دماغی امراض، دماغ کے بعض امراض، کمزوری اعصاب، آتشک، کان کی ہڈیوں کے زخم، دانت کا خراب ہو جانا، کمزوری وغیرہ۔

علامات :- منہ ٹیڑھا اور ایک طرف کا گوشہ دہن ڈھیلا ہو جاتا ہے اور جس طرف چہرہ کھینچا ہوا ہوتا ہے، وہ طرف درست ہوتی ہے۔ اور منہ سے لال بہتی ہے۔ پانی پیتے وقت منہ سے باہر چلا جاتا ہے۔ مریض لقوہ کئے، سیٹی بجانے اور پھونک مارنے کی کوشش کرے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ بیمار طرف کی آنکھ کھلی رہتی ہے اور اس سے پانی بہتا ہے، ایسے حروف جو ہونٹوں کی مدد سے بولے جاتے ہیں مثلاً ب، پ، ف اور م وغیرہ کو صحیح طور پر نہیں بول سکتا۔

علاج :- فالج کے اصول پر کریں، دارچینی، عرق قرحا، لونگ وغیرہ مقوڑی مقدار میں چبوائیں۔ مریض کو اندھیرے کمرے میں رکھیں، جہاں روشنی کا قطعی گزر نہ ہو اور منہ رجبہ ذیل روغن لقوہ کا استعمال کریں۔

روغن لقوہ :- موم سفید دو تولہ کو کسٹرائیل چھ تولہ میں پگھلا کر فرنیون، جندبیدستر، مصطکی، سورنجاں تلخ، ہر ایک چھ ماشہ کو باریک پس کر ملا دیں، اور بوقت ضرورت مالش کر کے سینک دیں اور فالج کی طرح بعد تنقیہ عام معجون فلاسفہ، معجون کچلہ یا یوگراج گوگل کھلائیں۔

ایلوپیتھیک طریقہ علاج میں مقام مرض پر اپنی منٹ ٹرپن ٹائن کی مالش کریں۔ کان کی خرابی سے یہ عارضہ ہو تو اس کا علاج کریں۔ دانت خراب ہو تو اسے نکال دیں۔ جو ڈاکٹری ادویات فالج کے بیان میں دی گئی ہیں۔ اس مرض میں بھی مفید ہیں۔

آیور ویدک علاج :- آندھیروں رس ایک گولی شہد میں ملا کر کھلائیں۔

ہومیوپیتھک علاج :- کاسٹیکم، کالچی کم، فاسفورس، نکس دامیکا وغیرہ مفید ادویات ہیں۔


غذا و پرہیز :- فالج کے مطابق ہے۔

دنیاۓ طب کی ایک نادر روزگار کتاب

لغات الادویہ

مرتبہ : حکیم کبیر الدین

کئی ہزار جڑی بوٹیوں اور مفرد ادویات کے نام اور شناخت سے متعلق مکمل تفصیل پر مبنی انسائیکلو پیڈیا۔ اردو زبان میں اپنے موضوع پر واحد مکمل، مفصل اور عظیم علمی اور تحقیقی کتاب، جس میں ہر جڑی بوٹی اور دواؤں کے نام اردو، عربی، فارسی، کشمیری، پنجابی، سندھی، ہندی، سنسکرت، بنگالی، لاطینی اور انگریزی سمیت پچیس زبانوں میں دیئے گئے ہیں کسی زبان کا ایک بھی نام معلوم ہو تو فوراً اس کے تمام زبانوں کے نام اور دوا کی ماہیت کا پتہ چل جاتا ہے اہل علم و فن، اطباء، وید، ڈاکٹر، دوا فروش اور عام حضرات کے لئے ایک نادر و نایاب تحفہ۔



دُوسرا باب

اعصاب کی بیماریاں

تشنج - اینٹھن - کنولشن - (Convulsion)

تعریف مرض :- بدن سے کم و بیش عضلات اپنے مرکز کی طرف کھینچ کر سُکڑتے اور اینٹھتے ہیں، معمولی بے ہوشی بھی ہوتی ہے۔ بذاتِ خود کوئی مرض نہیں، بلکہ یہ دوسری امراض کی ایک علامت ہے۔

وجوہات :- بلغمی اور غلیظ مادہ کا اعصاب میں لغو، دماغی چوٹ، کمی خون، ورم دماغ، خشکی اعصاب، دماغ میں کثرت یا کمی خون، دماغ کا نرم ہو جانا یا اس میں پانی بھر جانا، دماغی جہلیوں کا ورم، شدید بخار، مرگی، سکتہ، ہیضہ، قویج، کزاز، شراب، کچھ سیسہ وغیرہ کا زہر، کثرت ملاپ، جلق، باؤ گولہ، بچوں میں دانت نکالنا، قبض، پیٹ کے کیڑے، سردی لگنا اور خوف سے بھی تشنج ہو جاتا ہے۔

علامات :- وجوہات کے لحاظ سے مختلف علامات ہوتی ہیں :-

مریض دفعتاً بے ہوش ہو جاتا ہے، چہرہ، ہاتھ، پاؤں اور جسم کے دوسرے عضلات جلد جلد اینٹھتے ہیں اور جسم اکڑ کر سخت ہو جاتا ہے، چہرہ بگڑ کر نیلا یا سیاہ ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے ڈیلے پھر جاتے ہیں اور پٹکیاں پھیل جاتی ہیں۔ سانس تکلیف سے آتا ہے۔ مریض کے اعضاء ترپتے ہیں، مریض دانت پیتا ہے اور زبان دانتوں میں آکر کٹ جاتی ہے اور پیشاب و پاخانہ خطا ہو جاتے ہیں۔

نوٹ :- طب یونانی میں مادہ مرض کے لحاظ سے اس کی چار قسمیں ہیں، (۱) تشنج استثنائی، (۲) تشنج پسّی، (۳) تشنج

ریجی، (۴) تشنج ایذائی، اور ایلمیپٹیک میں پانچ قسمیں ہیں، (۱) ٹانگ سپیزم، (۲) کلونک سپیزم، (۳) کریمپ، (۴) اکلیشیا،

(۵) کنولشن۔

ڈاکٹری علاج :- اصل سبب مرض کو دور کریں، دورہ کے وقت مریض کے سینے اور گلے کے بند ڈھیلے کر دیں۔ اسے چپٹ لٹا کر

کے نیچے تکیہ وغیرہ دے دیں۔ اگر دانتوں میں تشنج ہو تو دانتوں کے درمیان کپڑے کی گدی بنا کر رکھ دیں، عام طور پر اس مرض کے علاج میں پہلے من کو دور کرنا ضروری ہے۔ جس کے لئے گرم پانی، صابن یا گلیسرین کا حقدہ کرنا خصوصاً بچوں کے تشنج میں بے حد فائدہ مند ہے، موسم کے مطابق پر برف کی تھیلی رکھیں، دافع تشنج ادویات کھلائیں مثلاً پوٹاسیم برومائیڈ یا کلورل ہائیڈریٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ شدید حالتوں میں مارینا میوسین ہائیڈرو برومائیڈ کا ٹیکہ لگایا جائے۔ اس صورت میں مریض کے دل کی حرکت کمزور نہ ہو۔ میں نے تشنج کے سینکڑوں مریض دیکھے ہیں۔ مائوٹس اور دانت نکالنے والے بچے زیادہ دیکھنے میں آئے ہیں اور جن میں میلیریا، دماغی چوٹ، مرگی، ٹے ٹے نس، پیٹ کے کیڑے، قبضہ کے مریض پائے گئے۔ اس لئے ان امراض کی صحیح تشخیص اور صحیح علاج کرنے کے بعد تشنج دور ہو جاتا ہے۔ وہ نرسند لانے والی ادویات ٹے ٹے نس (Tetanus) میں لکھی گئی ہیں۔ اس میں بھی مفید ہیں۔

یونانی علاج :- اگر امتلاء اور کثرت بلغم باعث مرض ہو تو مثل فالج کے علاج کریں۔ اور بعد تنقیہ معجون فلاسفہ کھلائیں اور بیرونی روغن قسط مالش کریں یا جندبیدستر، ہینگ ہر ایک دو سے چار رتی تک باریک پیس کر شہد خالص چھ ماشہ میں ملا کر صبح و شام چٹائیں، اگر تشنج خشکی کی وجہ سے ہو تو تری پیدا کرنے والی چیزیں استعمال کرائیں۔ اور بیرونی طور پر خالص تلوں کے تیل کی مالش کریں یا لبوب سبعہ کا استعمال کرائیں، تشنج ایذائی میں کہ آتشک سے ہو تو اطر لفل ایتھون چھ ماشہ سمراہ عرق شاہزہ چھ تولہ، عرق عشبہ چھ تولہ، مشربت عناب دو تولہ ملا کر صبح و شام پلائیں، تشنج ریجی میں دوں پانچ ماشہ، صفر فارسی پانچ ماشہ، عرق سولف چھ تولہ، عرق پودینہ چھ تولہ میں ملا کر جوش دے کر مشربت دینار دو تولہ ملا کر پلائیں یا مرچ سیاہ پانچ تولہ، ہرن کھری ایک تولہ رات کو گرم پانی میں تر کر کے صبح اس کا نتھار لے کر استعمال کریں۔

آیور ویدک علاج :- لبطر یونانی علاج کریں۔

ہومیو پیتھک علاج :- بدن کا پھلی طرف کو کھینچ جانا، سخت دورہ، سٹرا منیم ۳۰ - ۲۰۰ تشنج کی حالت میں متلی اور گوند کی لیس دارقے، کیو پرم ۳۰ - ۲۰۰ شروع مرض میں جب سخت بے چینی ہو، ڈریا بخار کی تیزی میں، ایکونائٹ ۳۰ دیں۔

غذا و پرہیز :- غذا لطیف اور زود ہضم دیں۔ مثلاً دودھ، دودھ سوڈا، آتش جو یا دودھ ملا کر دیں اور دیر ہضم غذاؤں سے سخت پرہیز کریں۔

وہزوات۔ وہن شتھا۔ تمد و کزاز۔ ٹے ٹے نس۔ (Tetanus)

تعریف مرض :- اس مرض میں جسم اکڑ کر تیر کی طرح سیدھا یا کمان کی طرح ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اینٹھن اور کچھاؤ سے دور سے پڑتے ہیں۔ وجوہات :- یہ مرض "بسی لس آف ٹے ٹے نس" نامی ایک متعدی جرثومہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور اس کی سرایت زخموں کے راستہ سے، بعض اوقات معمولی خراش سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں میں آنول میں ناف کے ذریعہ جرثومہ داخل ہونے سے ہو جاتا ہے، بوجہی یہ مرض عام طور پر ہو جاتا ہے۔

علامات :- چھوت لگنے کے پندرہ روز بعد مریض کے جبڑے اور گردن میں سختی پیدا ہو کر، پٹھوں میں تشنج پیدا ہو کر منہ بند ہو جاتا ہے، سر چکرانا، پاؤں آنا اور بخار ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر گردن پیچھے کو مڑ جاتی ہے۔ دانت بالکل ہل جانے سے پانی نگلنا یا بولنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس مرض علامات کچلہ کے زہر سے ملتی جلتی ہیں۔ اس لئے معالج کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس مرض کی علامات اور کچلہ کے زہر سے پیدا شدہ علامات میں فرق کرے۔ دونوں حالتوں میں فرق یہ ہے کہ کچلہ کے زہر میں تمام جسم میں اکڑاؤ ہوتا ہے، لیکن منہ کی دانتی نہیں لگتی، منہ کھل سکتا ہے، لیکن تشنج (کزاز) دورہ میں جبڑے بند ہو جاتے ہیں۔

ڈاکٹری علاج۔ شروع میں علاج سے فائدہ کی امید ہو سکتی ہے۔ لیکن مرض کی زیادتی کی صورت میں علاج کا کامیاب ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کزاز کے مریض کو دورہ کی حالت میں اندھیرے کمرے میں آرام سے لٹانا چاہیے۔ اور رفع تشنج کے لئے پوٹاسیم برومائڈ بنیس گرین ایک اونس پانی میں ملا کر یا کلورل ہائیڈریٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ مرض کی زیادتی کی صورت میں ہائیوسین ہائیڈرو برومائڈ ۲۰۰/۱۰۰ گرین کا زیر جلد انجکشن بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ مرکبات ایون بھی دفع تشنج کے لئے فائدہ مند ہیں، جس وقت زخم ہو اور ٹٹے ٹٹے کا خطرہ ہو، اس وقت بطور حفظہ مقدم ٹٹے ٹٹے انسیرم (A.T.S.) کا انجکشن دیا جائے یا ٹٹے ٹٹے ٹاکسائیڈ ایک سی سی عضلاتی ٹیکہ عمر کے مطابق لگا دیں۔ کئی اطباء کا خیال ہے کہ بطور علاج مرض کی تشخیص ہونے کے بعد بھی ٹٹے ٹٹے انسیرم ڈیڑھ سے تین ہزار یونٹ اور بطور علاج دو لاکھ یونٹ ہائے دیئے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ مرض مشکل علاج ہے۔ اس لئے مرض کی بڑھتی ہوئی صورت میں عام معالجین کو مریض کو کسی بڑے ہسپتال میں داخل ہونے کا مشورہ دینا چاہیے۔

باڈرن پیٹرنٹ ادویات :- (۱) لارجیکٹل (Largactil) ایم بی — کی ایک گولی ضرورت کے مطابق پانی سے دیں۔ (۲) سپارین (Sparine) ایک گولی ہمراہ تازہ پانی دیں۔ (۳) فینوباربیٹون (Phenobarbitone) یا سونے ریل کا استعمال کریں۔ (۴) گارڈینال پم گرین کی مقدار میں تازہ پانی سے دیں۔ (۵) لبریم (Librium) روش — یا اس کے مقابلہ کی دوسری کمپنی کی، لبریم یا کاپوزیالارپوز کی ایک گولی تازہ پانی سے دیں، دماغی تشنج و ٹٹے ٹٹے انس کے لئے مفید ہے۔

ہومیوپیتھک علاج :- کوئی نوکیلی چیز چبھ جانے یا چوٹ وغیرہ سے اینگیس ٹورا ۲۰ — جسم برف کی مانند سرد گردن ٹیڑھی، منہ کھٹکنا، تنگی سانس، کیمفر ۶ — آنکھیں باہر نکلی ہوئی، پاخانہ و پیشاب بے خبری سے خارج ہو، ہائپوسائیس ۳۰ — ۲۰۰ — کوک دار چیز چبھ جائے، ہائپریم ۳۰ — ۲۰۰ — چہرہ سرخ، نکلنے میں تکلیف، نظر تر چھی، سیلاڈونا ۳۰ — ۲۰۰ — غذا و پرہیز :- غذایاں، دودھ، پھلوں کا رس اور گلوکوز کا استعمال مفید ہے۔ دیرینہ چیزوں سے پرہیز کرائیں۔

تانڈو - کپکپی - لرزہ - کوریا - (Chorea)

تعریف مرض :- اختیاری عضلات میں بلا ارادہ حرکت ہونے لگتی ہے۔ جن میں کوئی نظم نہیں ہوتا۔ عضلات کی قوت محرکہ مستقل طور پر عضلات حرکت دینے یا ایک جگہ پر قائم رکھنے سے تنگ ہو جاتی ہے اور عام طور پر گردن اور ہاتھ لرزتے ہیں۔ وجوہات :- عصبی امراض، عصبی کمزوری، مرگی، باؤ گولہ جنون وغیرہ، حمل، بندش حیض، کمی خون، گنٹھیا، ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال، پرے کے کپڑے، شراب نوشی، زیادتی ملاپ، کمزوری دماغ، نفسیاتی امراض، اعصاب کی خشکی یا تکلیف یا سوء مزاج۔ عام طور پر بڑھاپے کی عمر میں یہ زیادہ پیدا ہوتا ہے۔

علامات :- ابتدائے مرض میں جسم، چہرہ، زبان اور ہاتھ یا پاؤں کانپنے لگتے ہیں، بے اختیار اور بے قاعدہ حرکات شروع ہو جاتی ہیں، مرل کا چلنا پھرنا اور ہاتھ میں کسی چیز کا پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شدت مرض میں آدھا یا سارا جسم ہلکتا ہے۔

ڈاکٹری علاج :- اگر حرکات شدید ہوں تو مریض کو چلنے پھرنے سے منع کر دیں، رعشہ چونکہ پٹھوں کی کمزوری کی علامت ہے، اس لئے اس علاج میں پٹھوں کی کمزوری کا خاص خیال رکھیں۔ ایلوپیتھی طریقہ علاج میں تقویت کے لئے ڈیٹا من اے، ڈیٹا من ڈی اور کاڈورائیل وغیرہ مفید ادویات ہیں، رعشہ کی شدید حالتوں میں پوٹاسیم برومائڈ یا کلورل ہائیڈریٹ کا استعمال مفید ہے۔ اس کے علاوہ ہائیوسین ہائیڈرو برومائڈ ۲۰۰/۱۰۰ گرین جلدی انجکشن بھی مرض کو سکون دینے کے لئے مفید ہے۔ نیند لانے والی کوئی بھی دوا فائدہ پہنچاتی ہے۔

یونانی علاج :- اگر ریشہ کے ساتھ سرد ہو تو اسٹنڈوس تین ماشہ کاسفوف بنا کر استعمال کرنا مفید ہے، تقویت اعصاب کے لئے حب کچلہ کانسڈ جو فالج کے بیان میں درج ہے کا استعمال بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ عجون کچلہ، عجون فلاسفہ، کشتہ سونا اور دواء المسک معتدل جو ہرالی اس مرض میں بہت مفید ہے۔

ایور ویدک علاج :- یوگرہ گول اور سدھ مکر دھوج مفید ادویات ہیں۔

ہومیو پیتھک علاج :- کاسٹیکم مفید ہے۔ بالوکیک علاج میں کالی فاس، کالی میور اور کلکیریا فاس مفید ادویات ہیں۔

قدرتی علاج :- دھوپ یا حمام سے پسینہ لانا مفید علاج ہے۔

غذا و پرہیز :- تیز، بٹر، کبوتر کے گوشت کا شوربا اور چپاتی، چنا، ارہر، کرپلا اور مونگ کی دال، انڈہ وغیرہ دیں۔ اس سلسلہ میں خرگوش کے دماغ کا مغز کھلانا فائدہ مند ہے، برف، سرد پانی، کدو، پالک اور تمام سرد و ترش غذاؤں سے پرہیز کریں۔ اگر جوڑوں کے درد کی وجہ سے ہو تو گوشت بھی نہ دیں۔

اُست و ات بھوں کی درد دابر و عصابہ ٹک ڈولر کس - (Ticdouloureux)

تعریف مرض :- اس مرض میں کبھی ایک ابرو میں اور کبھی آدھے چہرے میں درد ہوا کرتا ہے۔ اس درد کا مقام دماغی اعصاب کا پانچواں جوڑ یا اس کی کوئی شاخ ہوا کرتی ہے۔

وجوہات :- کمزوری خون، بدہضمی، قبض دائمی، کسی دانت کا بوسیدہ ہونا، گرم ہوا، کپٹیوں اور آنکھوں میں سورمزاج، گرم سرد ہونا، آنکھ، کان، ناک یا نظام بول کے امراض، وجع المفاصل، نزلہ و زکام کا بگڑنا، بطن غلیظ کا جمع ہونا، سمیت ملیریا، آنکھ گنٹھیا، جسمانی کمزوری سردی لگنا وغیرہ۔

علامات :- عام طور پر ابرو، پوٹے، آنکھ کے ڈیلے یا پیشانی میں درد ہوتا ہے۔ یہ درد اچانک آتا اور بڑا شدید ہوتا ہے، کبھی رخسار ٹھوڑی یا نیچے کے جڑے میں ایسا تیز درد ہوتا ہے۔ جیسے چھری یا نثر کے لگنے سے یا آگ سے جل جانے پر ہوا کرتا ہے۔ مریض کی آنکھیں نہیں کھلتیں، کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ درد سے پیشانی پھٹ جائے گی۔ دورہ چند سیکنڈ سے چند منٹ تک رہتا ہے۔ درد عموماً سورج کے چڑھنے پر چڑھتا ہے اور اس کے ڈھلنے پر بند ہو جاتا ہے۔ شدت مرض میں عضلات اٹھ جاتے ہیں اور باری بہت جلد جلد آتی ہے اگر مرض پُرانا ہو جائے، درد کا دورہ مہینوں کے بعد ہوا کرتا ہے۔

ڈاکٹری علاج :- اصل سبب کو معلوم کر کے علاج کریں۔ دورہ میں درد رفع کرنے کے لئے سارڈین، انا سین، اپرو یا نو لیجین یا انلیجین یا اس سے تیز پر کسی دن وغیرہ دیں یا اے پی، سی ایک خوراک کھلائیں اور چائے پلائیں۔ ابرو اور کپٹی پر پین بام کا استعمال کریں۔ یہ مرض وٹامن بی اکی کمی سے پیدا ہوتا ہے، لہذا یہ وٹامن جو مختلف تجارتی ناموں مثلاً بیرین (Berin)، بی فورٹس (Befortis)، بیٹالین (Betalin) وغیرہ ناموں سے ملتی ہے۔ درد عصابہ اور درد شقیقہ کے لئے بہت مفید ہے، اور ۵ سے ۱۰۰ ملی گرام کا عضلاتی انجکشن لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی زود ہضم خوراک جو وٹامنز سے بھرپور ہو، اس مرض میں بہت مفید ہے۔

یونانی علاج :- رات کو سوتے وقت اطر فیصل کشیز ۹ گرام سے ۱۲ گرام آب گرم سے کھلانا بہت مفید ہے۔ وہ تمام نسخہ جات جو درد شقیقہ و درد عصابہ میں دیئے گئے ہیں، اس مرض میں بھی مفید ہیں۔

ایور ویدک علاج :- کمزوری سے یہ مرض ہو تو سدھ مکر دھوج استعمال کریں، چھوٹا چندرا کے مرکبات بھی مفید ہیں۔

ہومیوپیتھک علاج :- اگر دماغ کی کمزوری سے سر درد ہو تو ایسڈ فاس (Acid Phos) کا استعمال کریں۔ بالو کیمک علاج میں کلکیریا کارب مفید علاج ہے۔
غذا پر ہیز :- پالک، خرفہ وغیرہ ترکاریاں، دودھ، گوشت کا شوربا، بخنی، بیضہ نیم برشت وغیرہ کھلائیں، ثقیل، نفاخ اور دیرینہ غذا مثلاً آلو، گوبھی، بنینگن، تیل والی اور ترش اشیاء، گڑ اور آچار سے پرہیز کریں۔

توکشونٹا۔ سن بھری۔ حذر۔ انس تھیزیا۔ (Anesthesia)

تعریف مرض :- چھوٹے کی طاقت میں خرابی ہو جانے سے مقام مرض کی حس ناقص ہو جاتی ہے۔ اصل میں یہ بعض عصبی بیماریوں کی ایک علامت ہے۔

وجوہات :- اعصاب پر دباؤ پڑنا یا بلج یا غولی سُدہ یا اعصاب کی خشکی، بعض زہروں کی سمیت، آتشک وغیرہ، کبھی کونین وغیرہ کے زیادہ استعمال کرنے سے بھی حس ناقص یا باطل ہو جاتی ہے۔

علامات :- ماؤف جیسے میں گدگدی ہوتی ہے۔ اور سوئیاں چھینے کی حالت محسوس ہوتی ہے، کبھی سوئی چھونے سے بالکل درد محسوس نہیں ہوتا، بعض مریضوں میں اس قدر حس زائل ہو جاتی ہے کہ اگر مقام مرض کو کاٹ بھی دیا جائے تو بالکل درد محسوس نہیں ہوتا اور سردی یا گرمی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔

علاج :- اصل سبب مرض کو معلوم کر کے علاج کریں، مقام ماؤف میں حس پیدا کرنے کے لئے اندرونی و بیرونی ادویات کا استعمال کریں۔
ڈاکٹری علاج :- لینی منٹ ٹرین ٹائن کی نیم گرم مالش کریں اور خوراک کی طور پر لائیو اور آرسینی کیلس ۵ منم، ایکوا ایک اولس میں ملا کر دیں اور ہر سہفتہ استعمال کے بعد دودن دوا کا ناعذر رکھیں۔

یونانی علاج :- اس مرض کا علاج فالج کے طریقے سے ہونا چاہیے اور اس سلسلہ میں جو ادویات فالج کے بیان میں لکھی گئی ہیں وہ اس مرض میں بھی مفید ہیں۔ مقام مرض پر حرمل کا تیل یا روغن قسط کی مالش کریں۔ اور محجون فلاسفہ کھلائیں۔ مفید ہے یا روغن فرنیون کی مالش کریں۔

روغن فرنیون :- فرنیون ایک تولہ، تلوں کا تیل پانچ تولہ، آپس میں ملا لیں اور مقام مرض پر نیم گرم مالش کریں، حذر اور فالج کے لئے مفید ہے۔
ہومیوپیتھک و آیورویدک علاج :- بطرز فالج کے کریں۔

قدرتی علاج میں عضوماؤف کی ریاضت، مالش اور ورزش کرنا اور اس کو ہلاتے جلاتے رہنا فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ بعد تفتیہ مرض اورک یا زنجبیل (سونٹھ) کا مربہ کچھ عرصہ کھانا مفید ہے۔

غذا پر ہیز :- مرغ اور کبوتر کے گوشت کا شوربہ، ابلانڈہ، چائے، چپاتی، شوربہ وغیرہ کھلائیں، ٹھنڈی ہوا اور ٹھنڈا پانی، کثرت ملاپ، دیرینہ، ترش اور نفاخ غذاؤں مثلاً آلو، اروی، گوبھی، دال مالش وغیرہ سے پرہیز کریں۔

پٹھوں کی کمزوری، عصبی کمزوری، ضعف عصبی، نیورس تھینیا۔ (Neurasthenia)

تعریف مرض :- اس مرض میں مریض کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اور عصبی نظام میں خلل وفتور پیدا ہو جاتا ہے۔

وجوہات :- شدید دماغی یا جسمانی محنت، محرکہ بخار، انفلوئنزا، ذیابیطس، سرطان، آتشک، کثرت ملاپ، نشہ آور چیزوں کا بکثرت استعمال، بے سوچ، ریل گاڑی کے ٹکرائے یا بم وغیرہ کے پھٹنے سے شدید عصبی صدمہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مشہور ماہر جنیات ڈاکٹر فرائیڈ نے اس کا ثبوت دے ہوئے جنسی جذبہ کو قرار دیا ہے۔

علامات :- عام کمزوری کی تمام علامات پائی جاتی ہیں۔ معمولی کام سے تنکلی محسوس ہوتی ہے، مریض عموماً چڑچڑاہٹ، پست ہمت اور کمزور ہو جاتا ہے۔ بے خوابی، پریشان خیالی اور وہم میں مبتلا رہتا ہے۔ دل دھڑکتا ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ کثرت احتلام، کمزوری باہ اور رقت منی کی شکایت ہوتی ہے۔ کبھی نامردی کا خیال اسے خود کشی پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اور توہمات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے حقیقی یا فرضی درد ہوتے ہیں۔ مردوں میں خصبوں اور عورتوں میں رحم (اوریز) میں درد کی شکایت ہوتی ہے۔

ڈاکٹری علاج :- ایلوپیتھک علاج میں وٹامن بی (بیرین) ۵ سے ۱۰ ملی گرام بذریعہ عضلاتی انجکشن دیں۔ بہترین مقوی اعصاب ہے۔ آجکل ٹیبلٹ وقت دینے کے لئے یہ انجکشن کافی استعمال کیا جاتا ہے۔ انجکشن کے علاوہ یہ دوا کھانے کی صورت میں بھی ملتی ہے۔ اور استعمال ہوتی ہے نیز مفرد وٹامن علاوہ مخلوط وٹامن کی گولیاں بھی دستیاب ہوتی ہیں۔ جو اعصاب کو طاقت دینے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں۔

مندرجہ ذیل ماڈرن میڈیٹ ادویات بھی عصبی کمزوری کے لئے نہایت مفید ہیں :-

(۱) بنزوا (روش) ۵۰ ملی گرام، ریڈوکسان (روش) ۵۰۰ ملی گرام، دونوں کو باہم ملا کر ایک پڑیہ بنالیں۔ اور پانی کے ساتھ دن میں دو بار دیں۔ اس پٹیال (بوہنگر) ایک گولی، بیرن (گلیکسو) ۱۰۰ ملی گرام، دونوں کو یکے بعد دیگرے پانی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد دو بار دیں، معدہ کی سے پیدا شدہ عصبی کمزوری کے لئے مفید ہے، (۳) بی کمپلیکس بی ۱۲ فورٹ (گلیکسو) ایک ٹیکہ، لبریم (روش) ایک ٹیکہ یکے بعد دیگرے تازہ پانی میں، (۴) اکوانیل (وائٹھ) ایک گولی، بنزوا (روش) ۱۰۰ ملی گرام، دونوں کو یکے بعد دیگرے تازہ پانی سے دیں، (۵) جیریاٹون (Geriatone) جان وائٹھ صرف ایک کیپ شولز روزانہ یا رات کو کھانا کھانے کے بعد دیں۔ چالیس سال کی عمر کے بعد زیادہ مفید ہوتا ہے، (۶) ایسنز سیرپ۔ بی جی فاس مین (بارٹ) ٹانک وغیرہ دیں۔ ان کی خوراک ہر شیشی کے اوپر لکھی ہوتی ہے۔ اس کے مطابق استعمال کریں۔

یونانی علاج :- مریض کو تسلی دیں۔ اور اس کی رام کہانی توجہ سے سنیں۔ اس کی شکایت کو وہم وغیرہ کا نتیجہ قرار نہ دیں۔ ورنہ وہ دل شکستہ ہو کر کسی سے طبیب کی تلاش کرے گا۔ سب سے پہلے مرض کا اصل سبب جاننا، اعصاب کو آرام پہنچانا، بعد میں طاقت پہنچانا ہی اس کا اصل علاج ہے، قصہ سے ہر ممکن طریقہ سے بچائیں، ورنہ علاج کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ بطور دوا خیمہ مروارید یا خیمہ گاؤ زبان عنبری جواہر والا پانچ ماشہ دیں، کبیر پانچ ماشہ یا معجون کچلہ دو ماشہ بھی مفید ہے، ۴/۲ سے ۲/۲ چاول کشتہ سونے کا استعمال ہمراہ عرق گاؤ زبان یا عرق عنبر کا شربت سیب کے استعمال بہت مفید ہے۔

حب مقوی اعصاب :- شلاجیت شدہ تین ماشہ، ثعلب مہری چھ ماشہ، موچرس چھ ماشہ، موصلی چھ ماشہ، مصطکی رومی چھ ماشہ، مغز تخم متر بریاں چھ ماشہ، آفاقیا چھ ماشہ، برگد (بوہڑ) کے دودھ میں چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور سونے وقت ایک گولی ہمراہ عرق گاؤ زبان یا نیم گرم استعمال کریں۔ یہ گولیاں عصبی کمزوری کے علاوہ زبردست مقوی دماغ اور دافع نزہہ ہیں۔

آیور ویدک علاج میں سدھ مکر دھوج اور سونا بھسم مفید ادویات ہیں۔

قدرتی طریقہ علاج میں مریض کو روزانہ صبح ہلکی ورزش اور مالش بہت مفید ہے، سرسبز جگہ اور کھلی ہوا میں سیر کرنا بھی بہت مفید ہے۔ غذا پر سہیز :- غذا کھانے سے قبل و بعد کم از کم ایک گھنٹہ آرام کرائیں، بکری، دُنبے اور پرندوں کا گوشت، دودھ، مکھن، مغزیات اور دیں، مٹھائیوں، آلو، گوہی، بیگن وغیرہ دیرینہ چیزوں سے سخت پر سہیز کریں اور منشی و محرک اشیا چائے، تمباکو، شراب اور افیون وغیرہ

سے بھی پرہیز ضروری ہے۔

وات نارٹی، ریکی درد، عصبی درد، نیورلجیا (Neuralgia)

عصبی درد کے مقامات



تعریف مرض :- ہر قسم کے درد میں اعصاب ماؤف ہوتے ہیں۔ اور اس کا احساس اعصاب کے ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن عصبی درد ان دردوں کو کہا جاتا ہے جو عصب کی خرابی سے ہوتے ہیں۔ یہ درد کسی عصب اور اس کی شاخوں میں دورہ سے ہوا کرتے ہیں اور عام طور پر بہت تیز ہوتے ہیں۔ وجوہات :- عصبی امراض، چوٹ لگنا، ملیریا، انفلوینزا، آتشک وغیرہ اور سنگھیا، پارہ وغیرہ زہریلے مادوں کا خون میں مل جانا، سردی لگنا اور اس طرح دوسرے اعضاء کے امراض سے بھی عصبی درد پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کی مختلف اقسام ہیں۔

درد ابرو، آدھا سیسی، ٹانگ کا بیرونی عصبی درد، پسلیوں کا درد، کمر اور پیٹ کا درد، گردن اور گڈی کا درد نیز پستانوں کا درد وغیرہ

علامات :- درد کی ٹیسس شدید ہوتی ہیں۔ اور مقام درد پر دبانے سے درد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹری علاج :- درد کے دورہ کو روکنے کی کوشش کریں، اے پی، اے سی پوڈریا سارٹین کی گولی دیں۔ مقام درد پر سینک کریں، کوڈوپائیرین یا نوڈوجین یا انجین یا اویدین کی ایک ٹکیہ تازہ پانی سے دیں یا کوڈوپائیرین (گلکسو) ایک ٹکیہ، بیرن .. اٹی گرام، دونوں کو باہم ملا کر ایک خوراک بناویں اور دن میں دوبار بعد از طعام تازہ پانی سے دیں۔ بیرونی طور پر ری لیکسل آئنٹمنٹ (Relaxyl-Ointment) کی مالش کر کے اوپر نیم گرم روئی باندھ کر سینک کریں۔

یونانی علاج :- اصل سبب مرض کا علاج کریں، بیرونی طور پر روغن او جاع کی مالش کریں۔ معجون بر شعثا کا استعمال بھی مفید ہے یا مندرجہ ذیل زندہ طلسمات کا استعمال کریں۔

زندہ طلسمات :- ست اجوائن ایک تولہ، ست پودینہ ایک تولہ، کافور دو تولہ، ان تینوں کو شیشی میں ڈال کر دھوپ میں رکھیں، روغن بن جائے گا۔ چار پانچ قطرے مقام ماؤف پر مل دیں، ہر قسم کے عصبی درد، زہریلے جانوروں کے کاٹے پر لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔

مہانارائن تیل یا نارائن تیل کی مالش کریں۔ (مندرجہ بالا نسخہ امرت دھارا یا زندہ طلسمات کے مقابلہ کا نسخہ ہے)۔

خوراک و پرہیز :- زیادہ ٹھنڈی اور دیرینہ غذاؤں سے پرہیز کریں۔ تمام منشی اشیاء سے مریض کو بچائیں، اور زود ہضم اور سادہ غذاؤں کا استعمال کرائیں۔ گو بھی آلو، دال ماش کا استعمال منع ہے، کشمش پانی سے دھو کر استعمال کرنا مفید ہے۔

(۱) درد ابرو :- محذرات کالیپ کریں (۲) گردن کا درد :- محذرات مسکناٹ کالیپ کریں (۳) پستانوں کا درد :- روغن تارپین وتلوں کے تیل کی مالش کریں (۴) پسلیوں کا درد :- روغن تارپین کی مالش یا بابائی فلو جیشیر پلاسٹر لگائیں (۵) درد کمر :- روغن تارپین یا لہو منٹ ٹرین ٹائن کی مالش کریں (۶) ٹانگ کا بیرونی عصبی درد (عرق النساء) روغن او جاع کی نیگرم مالش کریں (۷) ٹانگ ٹرین کا درد مطابق علاج کر کر

گردن میں بل پڑنا۔ رائی ٹیکٹ (Wryneck)

تعریف مرض :- گردن کے پھٹے اکڑ جاتے ہیں۔
وجوہات :- ایک ہی کروٹ پر سوتے رہنے سے یا سرد گرم ہو جانے سے یہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ گردن کے مہروں کی کسی مرض سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- گردن کے دونوں طرف یا ایک طرف کے عضلات اکڑ جانے سے مریض گردن جھکائے رکھتا ہے۔ اگر مرض بڑھ جائے تو گردن کے بعض عضلات میں فالج ہو جاتا ہے۔

ڈاکٹری علاج :- ایلوپیتھک طریقہ علاج میں ہنی منٹ ٹرپن ٹائن کی نیم گرم مالش کر کے اوپر سے روئی باندھ کر سینک کرنا مفید ہے اور دافع درد ادویات ساربیڈان، اناسین، اسپرڈو وغیرہ پیٹنٹ ادویات یا اے پی پوڈر دیا جاسکتا ہے۔ اگر مرض پرانا ہو تو بجلی لگائیں۔ اگر ساتھ جوڑوں کا درد بھی ہو تو سوڈا سیلاس عمر و مزاج کے مطابق پانچ سے دس گرین قدرے نازہ پانی ملا کر دن میں دو بار دیں یا نو لجنین یا بوٹا پر کسی ون وغیرہ پیٹنٹ ادویات دیں، اگر یہ تکلیف کمزوری کی وجہ سے ہو تو مقویات کا استعمال کریں۔
یونانی علاج :- روغن قسط تلخ کی مالش مفید ہے جس کا نسخہ درج ذیل ہے :-

روغن قسط :- قسط تلخ دو تولہ، تیل سرسوں آٹھ تولہ، قسط کو موٹا موٹا کوٹ کر تیل سرسوں میں جلا لیں۔ اور مقام مرض پر نیم گرم مالش کر کے اوپر سے گرم روئی رکھ کر پی باندھ دیں اور سینک کریں، آرام آجائے گا۔
جوڑوں کے درد سے تکلیف ہو تو معجون سرسجاں کا استعمال کریں۔

اس سلسلہ میں جو علاج گردن میں بل پڑ جانے کا ہے، وہی علاج گردن اکڑ جانے کا ہے کریں۔ آئیور ویدک علاج میں نارائن تیل کی نیم گرم مالش کریں۔

خوراک و پرہیز :- فکر و تردد سے بچیں، خوراک مقوی اور زود ہضم استعمال کریں۔ دیر ہضم چیزوں سے سخت پرہیز ضروری ہے۔

پیسلیوں کے پھٹوں کا درد، پیسلیوں کا عضبی درد، وجع العصب، نیوریلجیا (Neuralgia)

تعریف مرض :- یہ درد پیسلیوں کے درمیان ہوتا ہے، جو لمبی سانس لینے سے بڑھ جاتا ہے۔

وجوہات :- عورتوں میں خرابی ایام، مرگی، ہسٹریا اور مردوں میں سردی وغیرہ لگنے سے یا نمونہ وغیرہ سے اس قسم کا درد ہو جایا کرتا ہے۔

علامات :- لپٹ کے چھٹے سے نویں پھٹوں کی حسی شاخیں مبتلا ہوتی ہیں۔ سانس لینے، کھانے یا چھینکنے یا ہاتھ ہلانے سے درد میں زیادتی ہوتی ہے۔ مگر مقام مرض کو دبانے سے درد میں آرام آ جاتا ہے۔

علاج :- سونٹھ، جائفیل، لونگ ہر ایک چھ ماشہ، تلوں کا تیل پانچ تولہ میں جلا کر دردی جگہ مالش کر کے یا ہنی منٹ ٹرپن ٹائن یا روغن تارپین کی مالش کر کے سینک کرنا مفید ہے۔

فناشیں دو گرین، سوڈا سیلاس چار گرین، ایسی دو خوراک دن میں دو بار دیں، قبض ہو تو اطر فیل زمانی کھلائیں، وہ سب ادویات جو

عصی در دیں لکھ آئے ہیں، مفید ہیں۔

عصبی درد میں لکھ اے ہیں، مفید ہیں۔
غذا پر ہیز۔ درد شدید ہو تو غذا نہ دیں۔ جب کم ہو جائے تو زود دھنم و مسقوی غذا دیں، دیر دھنم چیزوں مثلاً آلو، گو بھی، دال ماش، مینگا اور بنا سستی گھی کی چیزوں سے پرہیز کریں۔

گز دھری وات، لشگری کا درد، عرق النسا، شیاٹیکا۔ (Seiatica)

تعریف مرض :- اس مرض میں سرین کے بیج سے لے کر بیرونی ٹخنے تک پیچھے تک درد معلوم ہوتا ہے، اکثر یہ درد ایک ٹانگ میں اور کبھی دونوں ٹانگوں میں بھی پایا جاتا ہے۔

وجوہات :- وجع المفاصل ، نقرس ، سردی ، سہیلی جگہ پر بیٹھنا یا سوتا ، سخت قبض اور امراض مقعد وغیرہ ۔

علامات :- سرین کے نیچے ٹانگ کی پھلی طرف سے شروع ہو کر گھٹنے کے پھلی طرف اور ٹانگ میں ہوتا ہوا باہر کے ٹخنے کے پیچھے نکل محسوس ہوتا ہے۔ اگر کافی دیر تک یہ تکلیف رہے تو ٹانگ کمزور ہو جاتی ہے۔

ڈاکٹری علاج :- مریض کو سردی سے بچائیں اور گرم بسترے میں لٹائے رکھیں اور ٹانگ کو گرم وسیع رکھیں۔ مقام مرض پر پنی منٹ ٹر ٹائسن کی مالش کریں اور سینک دیں، قبض نہ ہونے دیں۔ جدید تجربات کے مطابق وٹامن بی اور وٹامن بی ۱۲ کا استعمال مفید ہے۔ اس سے پٹھ میں تقویت پیدا ہو کر درد رفع ہو جاتا ہے۔ اگر مرض کافی پرانا ہو تو بجلی کا علاج مفید ہے، وقتی طور پر درد دبانے کے لئے کئی مستند ڈاک مارفیا کی جلدی پچکاری دیتے ہیں۔ اس سے وقتی طور پر تو درد دب جاتا ہے، لیکن اس سے مستقبل میں بجائے فائدہ کے نقصان ہوتا ہے۔

مادرین سپینٹ ادویات :- وٹامن بی ابرین (Berin) گلیکو ————— یا بنروا (Benerva) روش ————— یا بیڈ

(Bedom) ایم، ڈی، یادو وٹ بی (Duvitbi) فزریا ڈیو میکس یا بیٹامیڈ (Betamid) سپلا

بایو وائیٹ (Biovite) جان واسطہ ————— یا کسی دیگر کمپنی کا وٹامن بی ۱۲ انجکشن ————— یا بروٹیکس (Bervitex) المیا

_____ ایک سی سی سے دوسری حالت مریض کے مطابق عضلاتی انجکشن لگائیں۔ (۲) وٹامن بی ۱ ایک سی سی و وٹامن بی ۱۲ (میکراہ

(Macrabin) گلیکو۔۔۔۔۔ ایک سی سی کا ملا کر عضلاتی انجکشن ہر دوسرے دن کریں۔ (۳) ریڈی سول (Redisol) یا ریڈی سول!

(Redisol-H) یا ٹرائی ریڈی سول ایچ (Tri-Redisol-H) ایم، ایس اڈی — انٹرا اسکولر انجکشن ہر دوسرے دن عضلاتی کریں

بی بیلیکس فورٹ (Beplex Forte) اے، ایف، ڈی ————— یا یونی بی کیپلیکس فورٹ (Uni-B-Complex Forte) یونیم

ایک دوسری عضلاتی انجکشن ہر روز دیں، اس میں بی کمپلیکس کے ساتھ وٹامن بی ۱۲ بھی شامل ہے۔ (۵) ون ۱۲ (One-12) اے۔ ایف۔

یہ انجکشن وٹامن بی ۱ اور وٹامن بی ۱۲ کا مرکب ہے۔ ایک ایمپول ہر روز عضلاتی انجکشن لگائیں۔ (۶) درد کو فوری طور پر دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ مساج بھی کریں۔

کے لئے نواالجین (Novalgin) ہیکٹ _____ دوسری سی گھول کا عضلاتی اسپجشن کریں۔ یہ دوسری سی کے امپول میں دستیاب ہوئی۔

(۷) سباجین (Cibalgin) یا ————— یا کوڈوپیرین (Codopyrin) ————— کی ایک نئی تازہ پانی سے دیں۔ درج

سکین کے لئے مفید ہیں۔ (۸) ارکا پائرین (Irgapyrin) کیلی — ایک ایب کیلیہ دن میں تین بار تازہ پانی سے دیں یا ایک کا عضلاتی انجکشن روزانہ لگائیں۔ اس انجکشن کو سب سے پہلے الگ بنا جائے۔ بعض دفعہ اس کا بہت بڑا اثر بھی ٹرتا ہے۔ مریض کے حالات و م

مع کے مطابق دیں۔ (۹) درد کی جگہ اے 'لی'، 'سی'، 'منٹ' یا 'الگی بان' (Algipan) کی مالش کریں، (۱۰) وٹامی منٹس فورٹ (روش) ایک

اسے پی، سی (بولٹس) ایک ٹیکہ۔ ریڈوکسان (روش) ۵۰۰ ملی گرام کی ایک ٹیکہ۔ سب کو پانی کے ساتھ دن میں دو بار دیں، درد کو فوراً آرام دینے کے لئے مفید ہے، (۱۱) پی آر ٹیبلٹ (P. R. Tablet) بولٹس — ہر قسم کے دردوں میں مفید ہے۔ ایک سے دو گولی تازہ پانی سے دیں، (۱۲) دردوں کے لئے بیوٹا پراکسیون (Buta Proxyvon) ایک کیپ شولز چائے سے دیں۔ باہر سے ری لیکسل کی مالش کریں۔
یونانی علاج: — معجون فلاسفہ یا معجون سورنجاں مفید ہے۔ اس کے علاوہ مندرجہ ذیل نسخہ نہایت کامیاب ہے، متواتر استعمال سے مرض کو ہمیشہ کے لئے آرام آجاتا ہے۔

دوائے شیاٹیکا: — سناوکی تین تولہ، سورنجاں شیریں ڈیڑھ تولہ، شیطرج ہندی ۹ ماشہ، زعفران خالص ڈیڑھ ماشہ، تمام دواؤں کو باریک پس کر ہون مہری ملا کر سفوف بنائیں اور چھ ماشہ روزانہ نیم گرم پانی سے استعمال کریں۔
سفوف عرق النسار: — فلفل دراز، مرتج سیاہ، تخم کرنش، اجوائن خراسانی، اجوائن دیسی ہر ایک تین تولہ، سفوف کر کے ہمراہ پانی گولیاں بقدر بخود بنائیں، ایک گولی صبح، ایک شام بعد از غذا مرلیض کو پانی سے کھلائیں۔

دیگر: — اندر جو درخت کی چھال سفوف بنائیں اور بقدر دو ماشہ دیسی گھی کے حلوہ میں ملا کر نگلیں اور اوپر سے چائے وغیرہ پی لیں، ایک ہفتہ کے استعمال سے عرق النسار (رنگینی) ریاحی اور بلغمی درد دور ہو جاتے ہیں۔

خساندہ رنگین باؤ: — سورنجاں شیریں سات گرام یا چوب چینی سات گرام کو کوٹ کر رات کو ۵ گرام پانی میں بھگو رکھیں صبح اس کا نتھار پلائیں۔
حب عرق النسار: — پشکڑی بریاں ایک تولہ، سورنجاں شیریں تین تولہ، گوند کیکر ڈیڑھ ماشہ، باریک پس کر پانی کی مدد سے گولیاں بقدر بخود بنائیں، ایک گولی صبح، ایک دوپہر اور ایک شام تازہ پانی سے دیں۔

دیگر: — چھلکا ہڑ زرد، مصبر شدہ، سورنجاں شیریں برابر لے کر سفوف بنائیں، خوراک ایک ماشہ صبح و شام ہمراہ تازہ پانی دیں۔
دیگر: — چوب چینی پانچ گرام ۲۰۰ گرام پانی میں بارہ گھنٹے بھگو کر جوش دیں، تہائی سہنے پر چھان کر صبح پلائیں۔
دیگر: — سورنجاں شیریں، آسگندہ ناگوری، سوئٹھ، اجوائن خراسانی، چینی سفید ہون لے کر سفوف بنائیں۔ خوراک دو ماشہ صبح و شام تازہ پانی سے دیں، یونانی شفا خانہ جات کارپوریشن لاہور کے یونانی فارما کو پیاکا مجرب نسخہ ہے۔

یونانی مرکبات: — حب کچلہ ایک گولی دن میں دو بار پانی سے دیں یا حب سورنجاں ایک گولی پانی کے ساتھ دن میں دو سے تین بار دیں یا معجون سورنجاں چھ گرام پانی کے ساتھ دن میں دو بار دیں یا معجون چوب چینی چھ گرام سوتے وقت رات کو ہمراہ پانی لیں یا معجون برشعنا دو گرام پانی کے ساتھ رات کو سوتے وقت لیں۔

ایوروبیک علاج: — مہارنا آدی کو اتھ دو سے چار تولہ کا حسب طریق جو شانڈہ تیار کر کے دیں۔ ہر دینی طور پر نارائن تیل یا مہارنا رائن تیل کی نیم گرم مالش کریں۔ یوگراج گوگل یا مہا یوگراج گوگل یا برہت وات چنٹا منی رس یا دوا لیبہ گولیاں وات روگوں کے لئے مفید ہیں۔
غذا اوپر مہیز: — غذا تر گرم خالص گھی و مرغن اغذیہ دیں، سرد تر اور بادی اسہبار سے سخت پر مہیز کرائیں۔

کمزرد، وجع القطن، لمبے گو۔ (Umba Go)

تعریف مرض: — کمر کے درمیانی حصہ میں یا ساری کمر میں درد محسوس ہوتا ہے جس سے چلنا پھرنا دو بھر ہو جاتا ہے۔
وجوہات: — ٹھکاوٹ، کمزوری، سردی لگنا، گاہے نفرس اور وجع المفاصل کی وجہ سے بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔

علامات :- اچانک کمر میں درد اٹھتا ہے۔ جس سے مریض کسی قدر کمزور ہو جاتا ہے، عام طور پر رات کے وقت تکلیف بڑھ جاتی ہے۔
ڈاکٹری علاج :- مریض کو سردی سے بچائیں۔ اور گرم بسترے میں لٹائے رکھیں، مقام درد پر سینک کریں، خشک گلاس لگائیں، اس پر لینی منٹ آف ٹرین ٹائٹ کی مالش کریں جو آزمودہ ہے۔ اور اکثر آرام آ جاتا ہے، لکڑی کے پلنگ پر سوئیں تاکہ کمزوری ہے، خوراک کی طور پر مندرجہ ذیل نسخہ دیں :-

وائٹم کالچی سائی پندرہ مہم، پوٹاسیم آیوڈائیڈ پانچ گرین، سوڈاسلی سلاس پانچ گرین، عرق پودینہ ایک اونس، ایسی ایک ایک خوراک دوا قدے پانی میں ملا کر دن میں دو یا تین بار دیں۔

ماڈرن سپینٹ ادویات :- بوٹا زولیدین (Butazolidin) یا بوٹاسولون (Butasolone) یا پریڈنائل (Prednacyl) یا ارگاپائیرین (Iragpyrin) یا ڈیلٹا بوٹا زولیدین (Deltbuta zolidn) یا کوڈوپائیرین (Codopyrin) کی ایک ایک گولی دن میں دو سے تین بار دیں یا بوٹا پراکسیون (Butapoxyvon) ایک کیپ شول ہمراہ چائے دیں، بیرونی طور پر آیوڈیکیں وڈ میٹھل سلی سیٹ یا ریلیکسل (Relaxyl) مرہم کی مالش کریں یا لینی منٹ اے، بی، سی (Linement A. B. C.) یا لینی منٹ ٹرینیتھ کی مالش کریں۔

یونانی علاج :- کمر پر روغن قسط کی مالش کریں، خوراک کی طور پر معجون سورنجاں یا اطریفیل صغیر استعمال کرائیں، شہد خالص دو تولہ عرق سولف دس تولہ میں ملا کر نیم گرم پلانا بھی مفید ہے۔ معجون فلاسفہ کا استعمال بھی درد کمر کے لئے فائدہ مند ہے۔

آیور ویدک علاج میں شلاجیت شدہ کا استعمال بھی بقدر مزاج مفید ہے، بیرونی مہا نارائن تیل کی نیم گرم مالش کریں۔
ٹکڑا کمر درد :- باجرہ، چھان گندم، نمک سانہر ہر ایک ۲۰ گرام، کوٹ کر کپڑے کی دو پٹلیوں میں باندھ کر توڑے پر گرم کر کے سینک کریں۔
درد کمر، درد کان، درد شقیقہ، درد اڑی میں فوراً سکون بخشتا ہے :-

تیل بابونہ، پھول بابونہ ۱۰۰ گرام، تازہ تلوں کا تیل ۴۰۰ گرام میں ملا کر بوتل میں بند کر کے ۴ دن تک دھوپ میں رکھیں، اس کے بعد چھان کرکام میں بوقت ضرورت نیم گرم مالش کریں۔ درد کمر و یا جی دردوں کے لئے فائدہ مند ہے۔


تیل پھول آک، پھول آک، بھنگ کے پتے، سورنجاں کڑوی، سونٹھ ہر ایک دس گرام، تلی کا تیل ۱۰۰ گرام میں جوش دے کر چھان لیں، اور مقام درد پر نیم گرم مالش کریں۔ کمر درد و جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔

تیل مال کنگنی :- مال کنگنی کے تازہ بیج بے کر بادام روغن والی مشین میں ڈال کر تیل نکال لیں، کمر درد و جوڑوں کے درد پر نیم گرم مالش کریں۔ عضو کی کمزوری کے لئے بیرونی تیل مال کنگنی کی مالش بہت مفید ہے۔

روغن ہفت برگ :- برگ آک، برگ بکائن، برگ ارزند، برگ سنہالو، برگ سہانجہ، برگ دھتورہ سیاہ، برگ زقوم دھتورہ ہر ایک ایک تولہ، تلی کے تیل ایک سیر میں جلا لیں۔ اور چھان کر محفوظ رکھیں، مفوضا سا تیل گرم کر کے عضو ماسن پر ملیں اور اوپر سے پڑانی ردی سے باندھ دیں بہت مفید ہے۔

تیل قسط :- قسط کڑوی، بال چھڑ، ہر ایک ۸۰ گرام کو کوٹ کر ۵۰۰ گرام پانی میں ڈال کر پکائیں، جب پانی خشک ہو جائے اور تیل باقی رہ جائے تو پھر ۵۰۰ گرام پانی ڈالیں۔ یہ عمل تین بار کرنے کے بعد تیل چھان لیں، اور اس میں چند بیدستر، مرچ کالی، فرنیون ہر ایک ۳ گرام پس کر اچھی طرح حل کریں اور دھوپ میں نیم گرم مالش کریں۔

غذا و پیرہیز :- دودھ وغیرہ سیال غذائیں دیں، ٹھنڈی اور دیرینہم غذاؤں سے سخت پرہیز کرائیں!



تیسرا باب آنکھوں کی بیماریاں

نیشتر ابھی شند، آنکھ دکھنا، آشوب چشم، آفتھلمیا (Ophthalmia)

تعریف مرض :- ایک یا دونوں آنکھوں کے ڈھیلے کے اوپر پوٹوں کے اندر کی جھلی میں سوجن ہو جاتی ہے۔
وجوہات :- آنکھ میں کچھ پڑ جانا، دھوئیں یا گرد وغبار سے آنکھوں کی خراش، نزلہ وزکام، دھوپ یا سخت گرمی یا سخت سردی کا اثر کرنا، زیادہ رونے، دودھ پینے والے بچوں میں دانتوں کے نکلنے سے اور بعض امراض خناق، خسرہ، چیچک وغیرہ سے بھی آنکھیں دکھنے لگ جاتی ہیں۔
علامات :- اس مرض کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آنکھ کے پوٹے کو الٹ کر دیکھنے سے متورم و سرخ اور پوٹے سوجے ہوئے اور آنکھیں بھاری ہوتی ہیں۔ مریض دھوپ اور روشنی برداشت نہیں کر سکتا اور پلکیں رطوبت سے جڑی ہوتی ہیں، درد و جلن کے علاوہ سوزش کے سبب آنکھیں بند رہتی ہیں اور آنکھ کھولنے پر غلیظ (گاڑھا) پانی کو دکر باہر نکلتا ہے اور بغیر مادہ کو دھوئے ہوئے آنکھیں کھولنا دشوار ہوتا ہے۔
آشوب چشم کے عارضہ کو آنکھ کی دوسری تکالیف سے تشخیص کرنا نہایت ضروری ہے۔
آئی رائیٹس (دورم عنیہ) :- اس میں آنکھیں سرخ اور قرنیہ کے چاروں طرف گلابی گھیرا معلوم ہوتا ہے اور پوٹوں کے اندر کی جھلی لال نہیں ہوتی اور سریش درد ہوتا ہے۔

کیئر اٹائیٹس (دورم قرنیہ) :- اس میں لالی گہری ہوتی ہے اور عام طور پر قرنیہ کے چاروں طرف ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں مریض روشنی کی طرف نہیں دیکھ سکتا، چونکہ بہت ہوتی ہے اور نظر میں بھی فرق آ جاتا ہے۔
ڈاکٹری علاج :- اصل سبب مرض کو دور کریں۔ آنکھوں کو روشنی سے بچائیں۔ آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ لگائیں۔ اگر کوئی چیز آنکھ میں

پڑی ہو تو اسے نکال دیں۔ اور قبض نہ ہونے دیں۔ قبض کی حالت میں کیٹر آئیل کا استعمال کریں اور عمر کے مطابق دیں، ارغٹائی نائٹراس یعنی سلور نائٹریٹ کا ہلکا لوشن بہت مفید ہے۔ اس سلسلہ میں سلور نائٹریٹ دس گرین (۵۱ رتی) عرق گلاب یا کشید شدہ پانی ایک پونڈ میں حل کریں۔ یہ دوا گارٹھے نیلے رنگ کی بالکل صاف بوتل میں تیار کریں اور مریض کو نیلے رنگ کی شیشی میں ڈال کر دیں، کیونکہ دوسری شیشیوں میں روشنی لگ کر دوا خراب ہو جاتی ہے۔ اب ایک نئے ڈراپر کے ذریعے جو کسی دوسری دوا کا استعمال کیا ہو، نہ ہو، یہ دوا استعمال کریں اور ڈراپر میں جو دوا بچے وہ فوراً دوا کی شیشی میں ڈال دیں۔ صبح پاک و صاف روئی سے آنکھوں کو نیم گرم پانی سے صاف کریں اور ہر دوسرے گھنٹے کے بعد دو دو قطرے آنکھ میں ڈالیں اور رات کو سوتے وقت آنکھ پر بورک آئینٹمنٹ یا ویزلین سفید لگاویں۔ تاکہ رات کو آنکھیں چپڑے بند نہ ہوں اور آسانی سے کھل جائیں، اس لوشن کے استعمال سے پہلے روز ہی مرض کی علامات میں کمی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے روز سوجن کم ہو کر تیسرے روز آنکھیں اچھی ہو جاتی ہیں۔ ویسے اس دوا کو چار پانچ دن استعمال کرنا چاہیے۔

اس کے علاوہ آنکھ کو دس گرین فی اونس والے بورک لوشن سے دھو کر صاف کرنا اور اس نیم گرم لوشن سے ٹکور کرنا بہت مفید ثابت ہوتا ہے، شدید سوزش چشم کی حالت میں ہلکے پنی سلین یعنی پنی سلین ایک لاکھ پونٹ ڈسٹنڈ وائرڈ دس سی سی باہم ملا لیں، تیار ہے۔ ہر دوسرے گھنٹے صاف ڈراپر سے آنکھ میں پکامیں، اس گھول کو سرد پانی میں رکھیں۔ آشوب چشم، ککروں اور روم کے لئے مفید ہے۔ آنکھوں کی سوزش کے لئے آج کل انیٹ بایاٹک علاج مقبول ہے۔ اس سلسلہ میں پنی سلین آئی آئینٹمنٹ، ٹیرامائی سین آئی آئینٹمنٹ آریو مائی سین آئی آئینٹمنٹ (Auro-mycine-Eye-Ointment)، کلورومائی ٹین آئی آئینٹمنٹ وغیرہ آنکھوں کی بیماریوں کیلئے مفید ادویات ہیں۔ سلفا ڈرگز میں سلفا ڈایازین آئی آئینٹمنٹ، سلفونا مائیڈ آئی آئینٹمنٹ وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں اور خوراک کی طور پر سلفا تھایازول، سلفا ڈایازین اور سلفا میزاتھین بھی آشوب چشم کے لئے استعمال کی جاتی ہیں۔ اس مرض کے لئے بہت مفید ثابت ہوئی ہیں۔ مقدار خوراک ہر چار گھنٹے کے بعد ایک ٹمکیہ اور حسب نم کم مقدار میں دی جاتی ہے۔ آج کل سیپٹران گولیاں اور بچوں کے لئے سیپٹران سیرپ کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ عام سوزش چشم کے لئے کیمیاوی رنگ مثلاً اجیری فلیوین اور مرکب یوروکروم وغیرہ لوشن اور مرہم کی صورت میں مختلف طاقتوں کے استعمال کئے جاتے ہیں اور یہ سوزش چشم کے لئے مفید ثابت ہوئے ہیں۔ اگر آنکھوں میں درد شدید ہو تو فوری تسکین کے لئے اسپرو، سارڈین یا کوڈوپارین یا نو بچین گولی یا پراکسی ون کیپسولز حسب ضرورت عمر ایک خوراک دیں۔ تاکہ درد میں عارضی تسکین ہو جائے۔

امراض چشم کے لئے آزمودہ سائنٹیفک نسخے

- ۱۔ امرت لوشن :- اجیری فلووین ایک گرین، زنک سلفاس دو گرین، بورک ایڈ چار گرین، عرق گلاب ڈیڑھ اونس۔
- تذکیب :- تینوں دواؤں کو ملا کر گھول تیار کریں۔ آنکھ دھو کر ڈراپر سے ڈالیں، آشوب چشم کے لئے مفید ہے۔
- پروٹارگول لوشن :- پروٹارگول پندرہ گرین، کشید شدہ پانی یا عرق گلاب ایک اونس۔
- تذکیب :- دونوں کو ملا لیں اور ڈراپر سے دن میں ایک دو بار ڈالیں، دکھتی آنکھوں کے لئے مفید ہے۔
- بورک لوشن :- ایڈ بورک دس گرین، کشید شدہ پانی یا عرق گلاب ایک اونس، ہر دو کو ملا کر لوشن بنالیں۔
- آشوب چشم کے لئے مفید ہے۔ آنکھوں میں بالکل نہیں لگتی۔
- زنک بورک آئی ڈراپ :- زنک سلفاس ایک گرین، بورک ایڈ چار گرین اور عرق گلاب ایک اونس۔
- تذکیب :- تینوں کو ملا کر ڈراپر کے ساتھ آنکھوں میں ڈالیں۔

گرین لوشن :- سلور نائٹریٹ ساڑھے چار گرین، ایکری فلے وین ساڑھے چار گرین، میٹھی لین بلیو تین گرین، عرق گلاب تین اولنس۔
ترکیب :- تینوں ادویہ کو عرق گلاب میں نیلی شیشی میں ڈال لیں اور ڈراپر سے استعمال کریں، سُرخ چشم اور لکڑوں کے لئے مفید ہے۔
ایلم لوشن :- پھٹکڑی (ایلم)، دورتی، عرق گلاب ایک اولنس، دونوں کو ملا کر لوشن بنالیں اور آنکھوں میں دو تین بار ڈالیں۔ دُکھتی آنکھوں کے لئے مفید ہے۔

ایکری فلاوین لوشن :- ایکری فلاوین ایک گرین، عرق گلاب یا کشید شدہ پانی ایک اولنس، ہر دو ادویہ کو ملا کر ڈراپر سے آنکھوں میں ڈالیں۔
آئی آنٹیمنٹ :- بلیو آکسائیڈ آف مرکری تین گرین، ویزلین سفید ایک اولنس، آپس میں ملا کر مرہم بنالیں۔ دن میں دو بار آنکھ میں لگائیں، پھنسی دار آنکھ دُکھنے کے لئے مفید ہے۔

آیور ویدک لوشن :- پھٹکڑی سفید، رسونت شدہ، ہلدی سالم ہر ایک چھ ماشہ، عرق گلاب آدھی بوتل۔ بوتل میں تینوں چیزیں ڈال کر رکھ دیں ایک ہفتہ بعد نتھار کر استعمال کریں، اس دوائی میں پھپھوندی نہیں پڑتی اور آنکھوں کے لئے مفید ہے۔

ماڈرن سٹینٹ ادویات :- (۱) لاکیولا (Locula) یا البوسڈ (Albucid) دس فیصدی یا بیس فیصدی، دن میں تین بار دو دو بوند پچکاری سے ڈالیں، (۲) اوپٹی سڈ (Opticid) دس فیصدی یا بیس فیصدی، دن میں تین بار دو دو بوند پچکاری سے ڈالیں یا سلفو مال آئی ڈراپس۔

(Sulfomyl Eye drops) دو تین بوند دن میں دو سے تین بار ڈالیں، (۳) ایکرو مائی سین آئی آنٹیمنٹ (Achromycin-Eye ointment) لیڈے دن میں تین سے چار بار آنکھ میں لگائیں (۴) سوبامائی سین آئی آنٹیمنٹ (Subamycin Eye ointment) ڈیز۔ دن میں

تین سے چار بار آنکھوں میں لگائیں، (۵) سنٹومائی سین انتھالک آنٹیمنٹ (Synthomyetin ophthalmic Eye ointment) ڈیز۔ دن میں تین سے چار بار آنکھوں میں لگائیں، (۶) کینا لوگ ایس انتھالک آنٹیمنٹ (سار بھائی) روزانہ ماؤف آنکھ پر لگائیے۔ یہ کینا کورٹ،

نیومائی سین اور گرے می سین کا مرکب ہے۔ جو شدید آشوب چشم کے لئے مفید ہے۔ (۷) انتھو کارٹ (Ophthocort) پارک ڈیوس آشوب چشم کے علاوہ لکڑوں کے لئے بھی مفید ہے، کلورومائی ٹین، پولائی گزین بی، ہائیڈرو کورٹی سون ایسی ٹیٹ سے مرکب ہے، دن میں دو

سے تین بار لگائیں۔ (۸) ایف کارلین نیومائی سین آنکھ کا مرہم یا ڈراپس (Efcorlin-Neomycin-eye ointment or drops) گلیکو۔
یا ٹیرا کورٹریل آئی آنٹیمنٹ (Terra cortril eye ointment) فز۔ آنکھ کی سُرخ، جلن و درد کے لئے مفید ہے (۹) گان ٹری سین

(Gantrisine) روش۔ اس کا گھول ۵ فیصدی طاقت کا ہوتا ہے۔ دن میں تین سے چار بار ڈالیں (۱۰) کارٹی سون (Cortisone) سبکپنی نے امراض چشم کے لئے اس کا مرہم و آئی لوشن بنایا ہے۔ جو آنکھوں کے تمام سوزشی امراض کے لئے مفید ہے۔ آئی لوشن ایک دو قطرے ہر تیس

گھنٹے بعد ٹپکائیں، ہر تیس گھنٹے بعد پلک الٹ کر لگائیں، (۱۱) ارگاہٹین آئی آنٹیمنٹ (Irga her eye ointment) گیگی۔ اس میں سلفا نامائیڈز وغیرہ شامل ہے، آنکھوں کی سوجن، زخموں، لکڑوں کے لئے رات کو سوتے وقت پلک الٹ کر لگائیں۔ (۱۲) نی زین انتھالک آنٹیمنٹ

(Nizinophthalmic-oointment) باروڈولیکم۔ آشوب چشم کے لئے دن میں تین بار لگائیں، (۱۳) سپروئل (Supronal) بائر۔ یہ مرہم سوجن و زخم کے لئے مفید ہے۔ دن میں دو سے تین بار لگائیں، (۱۴) نیوسون (Neosone) اپ جان۔ یہ مرہم

کارٹی سون ایسی ٹیٹ اور نیومائی سین سے مرکب ہے۔ دن میں دو سے تین بار لگائیں۔ (۱۵) بورک ایڈس گرین، ویزلین سفید ایک اولنس ملا لیں بورک مرہم تیار ہے، پلکوں کے کناروں پر لگائیں، پلکیں نہیں چپکتی ہیں، (۱۶) کلورومائی ٹین انتھالک اپلی کیپ (Chloromycetin ophthalmic Applicap)

پارک ڈیوس۔ آنکھ میں سُرمہ کی طرح لگائیں، زیادہ چھوٹ دار آشوب چشم میں کلور و کارٹ انتھالک اپلی کیپ کا استعمال کریں۔ (۱۷) سلفا نامائیڈ سولوبل (Sulphacetamide Soluble) دو دو بوند آنکھ میں ٹپکائیں (۱۸) ڈائمنڈ آئی ڈراپس (Diamond Eye Drops) ایک دو بوند آنکھوں میں ڈالیں یا

سی مائیڈ آئی ڈرائپس ایک ایک بوند آنکھوں میں ڈالیں۔

آج کل کی نئی ادویات میں امراض چشم میں نیوسپورین (Neosporin) یا ون مائی ٹین (Vanmycetin) یا سوفرامائی سین (Soframycin) یا وائی زین آئی ڈرائپس (Visine eye drops) یا ڈیکا ڈرون آئی ڈرائپس (Decadron eye drops) یا ڈیکسونا (Dexona) یا کلورم سون آئی ڈرائپس (Chloram sone) کا استعمال مفید ہے۔

بیٹے سول آئی مریم یا ڈرائپس یا نیبا سلف آئی آسٹینٹ یا سو باکلاٹ آئی آسٹینٹ یا کیپی سون آئی مریم کا استعمال مفید ہے۔
یونانی علاج :- قبض دور کریں اور غذا میں کمی کر دیں۔ آنکھوں کو روشنی سے بچائیں، معمولی تکلیف میں پھکڑی سفید ایک ماشہ عرق گلاب دو تولہ کو آپس میں گھول کر آنکھوں میں دونوں وقت ڈالا کریں، خوراک کی طور پر اطفال صغیر ماشہ سے ایک تولہ کھلائیں یا مندرجہ ذیل نسخوں میں سے کوئی ایک بنا کر استعمال کریں۔

حب سیاہ چشم :- پھکڑی ۴ ماشہ، افیون ۶ ماشہ، رسونت شدہ ۲ تولہ، زعفران خالص دورتی، نیم کے پتے تین عدد۔
ترکیب :- سب کو باریک پس کر لوہے کی کڑا ہی میں ڈال کر قد سے پانی ملائیں اور لوہے کے دستے سے خوب کھل کریں، پھر آگ پر رکھ کر خشک ہونے پر گولیاں بنالیں اور بوقت ضرورت ایک گولی پوست کے پانی میں یا صاف پانی میں گھس کر آنکھ کے پوٹوں پر لپیپ کریں، لیپ صبح اور رات کو کریں، آشوب چشم، سرخی چشم اور آنکھ کے درد میں کے لئے مفید ہے۔
ٹکور برائے آشوب چشم :- چھانے ہوئے جوشاندہ پوست کے نیم گرم پانی میں صاف روئی ڈال کر ٹکور کرنا سوجن اور درد کے لئے بہت مفید ہے۔ دن میں دو تین بار ٹکور کی جائے۔ اگر پوست نہ ملے تو بورک ایسڈ کی چٹکی ڈال کر بھی ٹکور کی جاسکتی ہے۔ بعد میں وہی بھیگی ہوئی روئی پھوڑ کر ایک دو گھنٹہ کے لئے آنکھوں پر باندھ دینی چاہیے۔

حب سیاہ (دیگر فارمولا) :- پھکڑی دو تولہ، افیون چھ ماشہ، رسونت دس تولہ، زعفران ایک ماشہ۔
ترکیب :- تمام ادویات کو کھل کر کے گولی بقدر سخود بنالیں۔ ایک گولی گھس کر پوٹوں پر لگائیں، آشوب چشم، لکڑے، درد چشم اور سوجن کے لئے مفید ہے۔

دلیسی آئی لوشن :- انار دانہ اڑھائی تولہ، عرق گلاب پانچ تولہ، رات کو دونوں ادویات بھیگو دیں، صبح صاف کر کے چھان لیں، اور مندرجہ ذیل ادویات ملائیں :-

رسونت ڈیڑھ تولہ، پھکڑی سفید بریاں تین ماشہ، افیون شدہ ایک ماشہ، کافور چار رتی، ملا کر رتھ لیں، بطور لوشن آنکھ میں ٹپکائیں۔
آشوب چشم، درد چشم اور سرخی آنکھ کے لئے مفید ہے۔ خوراک کی طور پر پھول منڈی چھ ماشہ، عناب پانچ عدد، چھلکا ہارڈ زرد چار ماشہ، پانی دس تولہ میں جوش ملے کر آدھا رہنے پر چھان کر چینی ملا کر دن میں دو بار پلائیں۔

بعض دفعہ وبائی طور پر آشوب چشم کا عارضہ ہو جاتا ہے، جسے طب میں وبائی آنکھ دکھنا اور ڈاکٹری میں ایپی ڈیمک کن جنکٹو آئٹس (Epidemic Conjunctivitis) کہتے ہیں اور یہ ایک باری بہت سے لوگوں کو ہو جاتی ہے۔ اس کے علاج کے لئے بھی آشوب چشم میں دی گئی ہدایات علاج پر عمل کریں، اس کے علاوہ سوزا کی آنکھ دکھنے کے علاج میں سلفا ڈرگز اور مینی سلین کا استعمال کامیاب علاج ہے۔

خسرہ یا چیچک کے مریض کی آنکھیں خراب ہوں تو بورک ایسڈ یا پوست کے جوشاندہ سے دھو کر ان کے اندر مینی سلین آئی آسٹینٹ ڈالنی چاہیے، تاکہ آنکھوں کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہ رہے۔ اگر نزلہ کی وجہ سے آشوب چشم ہو تو نزلہ کا علاج کریں اور آشوب چشم کی ادویات استعمال کریں، نومولود کے رد سوزا کی میں مینی سلین لوشن کا ٹپکانا مفید ہے۔

آیور ویدک علاج بطریقی نانی علاج کریں۔

ہومیو پیتھک علاج :- سوزش کی زیادتی، سُرخی، درد بکثرت، ایکونائٹ ۳۰۔۔۔ روشنی برداشت نہ ہو، سُرخی، درد، جوش آنکھ، خشک حرکت سے زیادتی، سیلاڈونا ۳۰ - ۲۰۰۔۔۔ تیزابی پانی کی زیادتی جہاں لگے چھپکتا جائے، روہے پڑنا، ناک سے پانی نکلے، یوفریشیا ۳۰ - ۲۰۰ (اس کا لوشن بیرونی طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں)، گید، سوزا کی مادہ کا اخراج رُک جائے، شام کو زیادتی، کھلی ہوا میں آفاقہ، پلٹلا ۳۰ - ۲۰۰۔۔۔ چھوٹا ناگوار، پوٹے پھولنا، سینکے سے آرام، سردی سے اضافہ، پیپ پڑنا، آتشکی مزاج، ہیرسلفر ۳۰ - ۲۰۰۔۔۔ رات کو زیادتی، کوئی دوائی فائدہ کرنے سے رہ جائے، سلفر ۳۰ - ۲۰۰۔

غذا و پرہیز :- ہلکی وزود ہضم غذائیں، دال مونگ، چپاتی، ٹھنڈی سبزیاں، پالک، خرفہ، ٹنڈے، کدو وغیرہ کھلائیں، گرم و ترش غذا کھانے اور دھوپ میں چلنے پھرنے سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ مرچ، گرم مصالحہ، چائے، شراب، تمباکو، مطالعہ، دماغی کام، سر اور کان میں تیل ڈالنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔

نیشتر پٹرا - آنکھ کا درد - دردِ چشم - شقیقہ العین

تعریف مرض :- یہ ایک کثیر الوقوع مرض ہے جس کا حملہ ایک آنکھ پر ہوتا ہے اور بسا اوقات بعد میں دوسری آنکھ پر بھی ہوتا ہے۔ وجوہات :- آنکھ کی کسی رطوبت یا ہر سہ رطوبتوں میں اعتدال سے زیادہ غلاطت یا رقت ہونا، آنکھ دکھنا، کثرت ملاپ، کمزوری دماغ، نزلہ یا ایام کی رکاوٹ، منشیات کا زیادہ استعمال، دائمی قبض، گرم چیزوں کا استعمال یا موتیا بند کے آپریشن کے سلسلہ میں بے موقع یا زیادہ تشگاف کرنا وغیرہ وغیرہ۔

اس مرض میں نوجوان لڑکوں کے مقابلہ میں زیادہ تر ایسی لڑکیاں زیادہ مبتلا پائی گئی ہیں، جو کسی وجہ سے ایک لمبے عرصہ سے بندش ایام میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح نوجوانوں کے مقابلہ میں بوڑھوں اور کمزوروں میں عام طور پر ضروری نزول الماء یا رطوبت یا خشکی کی زیادتی سے واقع ہوتا ہے اور نوجوانوں میں زیادہ تر زیادتی ملاپ، جریان، آتشک اور بعض دفعہ زیادہ برہمچریہ سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- اس مرض میں عام طور پر دردِ چشم معمولی یا زیادہ ہوتا ہے، روشنی سے نفرت اور رات کو درد کی شدت ہوتی ہے، شروع شروع میں ایک آنکھ پر درد کا حملہ ہوتا ہے اور پھر بعض اوقات دوسری آنکھ پر بھی حملہ ہو جاتا ہے، آنکھ کے طول و عرض میں سُرخی ہوتی ہے۔

اس مرض کا انجام عموماً خطرناک ہوتا ہے، آنکھ بیٹھ جاتی ہے یا پھوٹ جاتی ہے یا باہر نکل پڑتی ہے یا اگر بڑی چیز ہوئی تو آنکھ میں جالا پھولا پڑ جاتا ہے جس سے روشنی کی آمد و رفت بند ہو کر آنکھ ناکارہ ہو جاتی ہے۔ اگر نزول الماء کی حالت میں اس مرض کا حملہ ہو تو عموماً ”گلوکوما“ رطوبت بیضہ گندی اور ناقص ہو جاتی ہے، نزول الماء کی سختگی اور تکمیل کے بعد کسی آپریشن یا کسی علاج سے بھی جس کا درست ہونا مشکل ہے۔ یہ مرض آنکھ کے لئے موت سے کچھ کم نہیں ہے، جو مریض کی آنکھ لے کر یا آنکھ ناکارہ کر کے ہی مریض کا پیچھا چھوڑتا ہے۔

علاج :- اسباب مرض کے لحاظ سے ایسے مریضوں میں فوراً مادہ کی کمی یا زیادتی کے اعتبار سے پیشانی کی رگ پر کنٹریکٹس یا رانی کا پلاسٹر لگانا یا جمال گوٹ کا ہلکا سا طلا کرنا اور آنکھ کو گرم پانی سے ٹکور کرنا۔ اس کے بعد بندش ایام وغیرہ کی حالت میں مدر ایام ادویات کا پلانا بہت مفید ہے۔ قبض دور کرنے کا خاص خیال رکھا جائے۔ اگر خشکی کی زیادتی ہو تو مریض کی آنکھ، ناک، کان میں تین تین گھنٹہ بعد خالص روغن بادام کے قطرے ڈالنا مفید ہے، سر پر بھی روغن بادام کی مالش کی جائے یا حلوہ ماش یا مونگ کی ایک طرف روٹی روغن گل سے

چرب کر کے باندھی جائے، شیرہ معز کھیرا، شیرہ مغز پیٹھا ہر ایک چھ ماشہ، شیرہ خشکاش پانچ ماشہ، روغن بادام دس قطرے، عرق شیرین تولہ شربت عذاب ایک تولہ کا استعمال کیا جائے۔ رات کو حلوہ بادام چھ ماشہ، ہمراہ عرق شیرین تولہ استعمال کرایا جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی دماغ کو تراوت دی جائے۔ ان تدابیر سے عام طور پر مریض تندرست ہو جاتا ہے، نہ آنکھ پھوٹی ہے نہ جالا پڑتا ہے اور نہ ہی نظر میں نقص پڑتا ہے۔ اکثر اطباء اس مرض کے علاج میں "در چشم" کے دور کرنے میں لگے رہتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ منفعیات کے بعد منقیات یا مسکنات کا استعمال کر دینا درست سمجھتے ہیں، لیکن یہ علاج مرض کی بڑھی ہوئی حالت میں عموماً ناکامیاب ہوتا ہے اور آنکھ جیسے شریف اور خاص عضو کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ہماری رائے میں اگر معالجین "در چشم" کے اسباب اور تکالیف کا فوری ازالہ اور انسداد میں جس قدر مندرجہ بالا تدابیر سریع الاثر اور مفید پائی گئی ہیں، اتنا کوئی ڈاکٹری علاج یا دوا میرے تجربہ اور مشاہدہ میں مفید نہیں پایا گیا۔ اس طریقہ علاج سے نہ طبیب کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے اور نہ ہی مریض کو ہسپتال جانے کی زحمت اٹھانی پڑتی ہے اور نہ کسی آپریشن کی ضرورت رہتی ہے۔

آیور ویدک علاج بطریونانی علاج کے کریں۔

لکڑے، روہے۔ جربُ الاجفان، گرے نیولرڈز (Granular Lids)

تعریف مرض :- آنکھوں کے پوٹوں کے اندر دانے نکل آتے ہیں۔ جو گول گول چھوٹے اور سُرخ رنگ کے ہوتے ہیں۔ وجوہات :- اس مرض کا اصل سبب نزلہ ہے، لیکن گرد و غبار، غذا کی خرابیوں، خراش دار ادویہ کا استعمال، دھواں اور آنکھوں میں تیز قسم کے سُرمے یا دوسری دواؤں کے استعمال سے بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے نیز یہ مرض متعدی (چھوٹ دار) ہے۔ اس لئے مریض کی آنکھ کا مواد تندرست آدمی کی آنکھ میں لگ جائے تو یہ بیماری لگ جاتی ہے۔

علامات :- مقامی طور پر پلک اُلٹ کر دیکھا جائے تو ابتدائی حالات میں پوٹ کے اندر بھنیوی شکل کے باریک باریک سُرخ دانے نظر آتے ہیں۔ دو چار دن کے بعد ان کی رنگت کچھ زردی مائل ہو جاتی ہے۔ آنکھ سُرخ ہو جاتی ہے اور اس میں ہر وقت پانی بھرا رہتا ہے۔ خراش بہت ہوتی ہے۔ بالائی پوٹ کے بھاری پن سے انہد تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس طرح جب مختلف طریقوں سے یہ دانے کچھ پیلے پڑ جاتے ہیں تو ان کی جسامت بڑھ جاتی ہے۔ اور کچھ چپٹے ہو کر سخت ہو جاتے ہیں۔ ان حالات میں جب مرض دیر پا ہو کر مستقل صورت اختیار کر لیتی ہے تو آنکھ کا پردہ زخمی ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ ضعفِ بصر (ایس تھی نوپیا) کی شکایت بڑھتی جاتی ہے اور ایک عرصہ میں بصارت بالکل زائل ہو جاتی ہے۔

علاج :- روہوں کا ابتدائی علاج معالجہ تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ لیکن جب یہ کہنہ (پُرانی) ہو جائے تو علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ علاج کی سب سے بڑی اور اہم مشکل یہ ہے کہ مریض اپنی بیماری کو معمولی بیماری سمجھ کر معالج کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اس مرض میں صحت کے لئے مقامی طور پر علاج ہی ضروری نہیں بلکہ اس سے زیادہ نزلہ کی روک تھام، دماغ کی تقویت، معدے کی درستی، خون کی صفائی بہت ضروری ہے۔ میرے تجربہ میں کبھی نہیں آیا کہ کوئی شدید روہوں کا مریض محض لگانے کی ادویات سے صحت یاب ہو گیا ہے، اس لئے ہم اندرونی علاج کو بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ ناظرین کے لئے ہم دو قسمیں مقرر کر کے الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

ابتدائی حالت میں جب کہ علامات عادی ہوں، جلدی سکون پیدا کرنے کے لئے پلک اُلٹ کر دس گرین فی اونس والا کاشک لوشن لگائیں۔ کاشک لگانے کے فوراً بعد نلک کے پانی سے آنکھ دھو ڈالیں، جب تک کئی مرتبہ آنکھ پر نلک کا پانی نہ بہا لیا جائے، پلک کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ دھونے سے پہلے اگر پلک چھوٹ گئی تو آنکھ میں زخم ہو جانے کا سخت خطرہ ہے۔ مرض کی شدت کی صورت میں کوکین لوشن دو گرین فی اونس والا ایک قطرہ پکانا بہت مفید ہے۔

اس عمل کے تین چار گھنٹہ بعد پر وٹار گھول لوشن یا آر جی رول ایک ایک قطرہ ڈالتے رہنا چاہیے۔ اگر دم زیادہ ہو تو بورک ایسڈ کو پانی میں حل کر کے تمکید کرائیں یا کوکنار کے جو شانہ سے تمکید کرائیں۔ جب کاشک لگانے سے بھی سوزش کو آرام نہ ہو اور درد بہت زیادہ ہو تو عورت یا بکری کے دودھ میں رونی تر کر کے آنکھ پر چند بار رکھنے سے تسکین آ جاتی ہے۔ اگر مزید تسکین کی ضرورت ہو تو دودھ میں قدے افیون حل کر لیں، چوبیس گھنٹے کے وقفہ کے بعد پھر کاشک لگائیں اور دن بھر متذکرہ بالا علاج جاری رکھیں۔ جب کچھ آرام آ جائے تو کاشک کا استعمال تیسرے دن کریں۔ پھر ہفتہ میں ایک بار پھر پندرہ روز میں ایسا کریں۔ بعض اوقات پرانے روہوں کے لئے کاشک لوشن کی طاقت ۳ گرین تک لگانی پڑتی ہے، ایسی صورت میں چونکہ یہ قوی کاشک ہے۔ اس لئے اس کے استعمال کی جرأت عام اطباء کو نہ کرنی چاہیے۔ بلکہ دس گرین سے زیادہ طاقت کا کاشک بھی خطرے سے خالی نہیں، بہر حال زیادہ قوت کا کاشک ماہر ڈاکٹروں، حکیموں کے لئے مخصوص سمجھنا چاہیے۔

آنکھوں کو دھونے اور صفائی کا ویسے بھی خیال بہت ضروری ہے۔ آنکھیں دھونے کا ایک مخصوص گلاس جو عام طور پر انگریزی دوا فروشوں کے ہاں بکتا ہے۔ روہوں کے مریض کے لئے بہت ضروری ہے، اس گلاس میں پانی یا بورک لوشن بھر کر آنکھ اس میں ڈبولیں۔ آنکھ کی کسی ایکٹائی کو متواتر استعمال نہ کریں، بلکہ بدلتے رہیں۔ لکڑوں کے لئے کچھ مفید تجربات آشوب چشم (OPHTHALMIA) کے بیان میں درج ہیں۔ بوقت ضرورت بنا کر فائدہ اٹھاویں۔

ماڈرن سینٹ ادویات :- البوسڈ آئی ڈراپس (Albucid Eyedrops) دن میں چار بار قطرہ قطرہ ٹپکائیں اور سلفا ڈایازین ایک سے دو گولی صبح، دو دوپہر اور دو شام پانی سے دیں، بچوں کو بلحاظ عمر دیں۔ (۲) ٹیرامائی سین ایس، ایف ایک کیپ شولز ہر چھ گھنٹہ بعد تازہ پانی سے دیں اور ٹیرامائی سین افتتاحی سینٹ (فزر) دن میں تین سے چار بار آنکھ میں لگائیں (۳) اکیرومائی سین آئی سینٹ (Acromycine Eye Ointment) لیڈرے دن میں تین سے چار بار آنکھ میں لگائیں۔ (۴) آریو مائی سین افتتاحی سینٹ دن میں دو سے تین بار لگائیں، (۵) آئی مائیڈ (Eyemide) یہ آئی لوشن ہے، لکڑوں کے لئے مفید ہے، دن میں تین بار قطرہ قطرہ ٹپکائیں، یہ سلفا ٹے مائیڈ سے بنتی ہے، (۶) گان ٹری سین (Gantrisin) روش یہ سلفا دوا آنکھ میں دو سے تین بوند دن میں تین سے چار بار ڈالیں، سلیوشن پندرہ فیصد طاقت کا ہوتا ہے، لاکولا بھی مفید ہے اس میں بھی سلفا ٹے مائیڈ جزو اعظم ہے۔ (۷) پرانے لکڑوں کے لئے سوفرا کارٹ آئی ڈراپس یا انسٹروکارٹ آئی ڈراپ (ڈیز) کا استعمال مفید ہے، (۸) کلوروکارٹ اپلی کیپ (پارک ڈیوس) ہر روز دو بار آنکھ میں ڈالیں، (۹) زینکوسلفا یا پیری مون یا کارٹولائیم مفید ادویات ہیں۔

یونانی علاج :- لکڑوں آئی سینٹ :- زعفران تین ماشہ، افیون تین ماشہ، رسونت، جرت پھلا، بورک ایسڈ، ہر ایک چھ ماشہ، غبار کی طرح پیس کر ویزلین سفید چار تولہ شامل کریں۔ اور رات کو سوتے وقت آنکھوں میں لگائیں، لکڑوں کے ہر درجہ میں از حد مفید ہے۔

لکڑوں کے لئے مفید سرمہ :- بھولا ہوا جست دو تولہ، سرمہ سیاہ شدہ دو تولہ، سرمہ سفید شدہ چار ماشہ، زنگار تین ماشہ، افیون ایک ماشہ، ہر ایک دو اکو علیحدہ علیحدہ کوٹ پیس کر چھان لیں، ایک روز لمیوں کے پانی میں کھل کر کے سرمہ بنائیں۔ رات کو سوتے وقت ایک ہلکی سلائی آنکھ میں لگائیں، لکڑوں کے علاوہ دھند، جالا، بھولا وغیرہ کے لئے مفید ہے۔

کافوری کا جل :- کانور بڑھیا ایک تولہ، نیم کے پھول تین تولہ، صاف کپڑے کی تہی میں پیسٹ کر سرسوں کے تیل کے ذریعہ کا جل کریں، یہ کا جل ایک تولہ بورک ایسڈ تین ماشہ، ویزلین سفید تین تولہ، سب کو ملا کر مرہم تیار کریں اور سلائی سے آنکھ میں لگائیں، پرانے لکڑوں کی عمدہ دوا ہے۔

لکڑوں کے لئے آسان سرمہ :- کشتہ جت، پھٹکڑی بریاں، مصری کوڑہ ہوزن لے کر کھل کریں اور محفوظ رکھیں، سوتے وقت ایک سلائی یا پچا یہ سے اٹ کر لکڑوں پر لگائیں، لکڑوں کے لئے بہترین سرمہ ہے۔

دیگر :- صرف بورک ایسڈ کی ایک چٹکی سونے وقت پاک اٹ کر لکڑوں پر چھڑکنے سے فوری طور پر آرام آ جاتا ہے۔

اگر آنکھ پر درم بہت زیادہ ہو گیا ہو تو پہلے نیم گرم بورک لوشن سے دھو کر پنی سلین لوشن آنکھ میں گھسنے کے بعد ڈراپر سے ڈالنے سے درم بالکل اتر جاتا ہے۔ خوراک کی طور پر سلفا ڈایازین یا سپٹران بقدر عمر دینا کامیاب علاج ہے۔ یونانی طریقہ علاج میں خوراک کی طور پر اٹریفیل زمانی یا اٹریفیل کشینزی کا استعمال بہت مفید ہے یا یہ سفوف منڈی کھلائیں :-

سفوف منڈی :- گل منڈی پانچ تولہ، مغز سولف اڑھائی تولہ، اسطخ دس سوا تولہ، مرچ سیاہ سات ماشہ، چینی اڑھائی تولہ، خوراک چھ ماشہ روزانہ ہمراہ پانی استعمال کریں، محافظ چشم اور سفوفی دماغ ہونے کے علاوہ لکڑوں کے لئے بے حد مفید ہے۔

آیور ویدک علاج :- کھانے کے لئے اٹریفیل گھرت یا مہا تر پھلہ گھرت دیں، بیرونی استعمال کے لئے مکتادی مہا بنج یا بنج امرت بنج

مفید ادویات ہیں۔

ہومیوپیتھک علاج :- یوفریشیا لوشن (Eupharasia Losion) دس بوند ہر روز ایک اونس پانی میں ملا کر استعمال کریں۔ سیکس

سائیریا میری ٹیما (Succus Cinera) مفید ادویات ہیں۔

غذا پر مہیز :- آشوب چشم کے مطابق کریں۔ انگور اور انار بھی دے سکتے ہیں۔

آنکھ میں پانی اترنا، موتیا بند، نزول المار، کٹریکٹ (Cataract)

تعریف مرض :- دونوں یا ایک آنکھ دھندلی ہو جاتی ہے۔ اس مرض میں مریض کو ایک چیز کی دو دو نظر آتی ہیں، آنکھ کا ملاحظہ کرنے سے پتلی کے پیچھے سفیدی مائل یا نیلگوں یا عنبری رنگ کی شے دکھائی دیتی ہے۔

وجوہات :- بڑھاپا، آنکھ پر چوٹ لگنا، مرض ذیابیطس، امراض گردہ، کسی غیر چیز کا آنکھ میں چلے جانا اور کبھی پیدائشی طور پر ہوتا ہے، عورتوں اور مردوں کو یکساں ہوتا ہے، عام طور پر دونوں آنکھوں میں پایا جاتا ہے، لیکن ایک آنکھ میں پہلے اور دوسری میں بعد کو ہوتا ہے۔

علامات :- آنکھ کا طبی معائنہ کرنے سے پتلی کے پیچھے چند خاکستری یا نیلگوں سفیدی مائل یا عنبری رنگ کی سی دکھائی دیتی ہے، مریض کو ہر چیز دو گنی دکھائی دیتی ہے، یعنی ایک چیز کی دو چیزیں نظر آتی ہیں، آنکھوں کے سامنے جالا یا سیاہ داغ دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھوں کے سامنے خیالی مکھیوں، مچھروں وغیرہ کی شکلیں نظر آتی ہیں۔ نظر آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتی ہے۔ حتیٰ کہ صرف دن رات کا احساس باقی رہ جاتا ہے، بعض اوقات چند ماہ اور بعض اوقات کئی سال میں بچتہ ہوتا ہے۔ اور کئی مریضوں میں یہ کبھی بچتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس مرض کو سبز موتیا بند (گلوکوما) سے تشخیص کرنا ضروری ہے، سبز موتیا بند میں پتلی کی رنگت سبز ہو جاتی ہے۔ آنکھ کا ڈھیلا پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ پتلی روشنی سے نہیں سکرٹتی ہے۔ مریض نزدیک کی چیزوں کو باسانی دیکھ سکتا ہے اور آنکھ اور کینٹی میں زور دار درد ہوتا ہے۔

علاج :- دواؤں سے شروع میں فائدہ ہوتا ہے۔ جب یہ مرض زیادہ دیر کا ہو جائے تو اس مرض کا شافی علاج آپریشن ہی ہے۔ شروع مرض میں نیلگوں چشمہ لگانے یا ہلکا اڑدین لوشن آنکھ میں ڈالنے سے پتلی کشادہ ہو کر مینائی قائم رہتی ہے، جیسا کہ ہم لکھ آئے ہیں، کہ جب مرض بچتہ ہو جائے تو سوائے آپریشن کے اور کوئی علاج نہیں ہوتا۔

ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں سکس سینہ ریریا میری ٹیما نامی دوا شروع موتیا بند میں ایک ایک قطرہ صبح و شام آنکھ میں ڈالنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور آپریشن کی ضرورت نہیں رہتی، لگ بھگ تین ماہ کے مکمل استعمال سے مکمل صحت ہو جاتی ہے۔

ڈاکٹری علاج :- ماڈرن ادویات میں کیشالین (Catalin) یا کیٹوبل (Cotobell) استعمال کرائی جاتی ہیں۔

یونانی علاج :- اس مرض میں قبض نہ ہونے دی جائے۔ اس سلسلہ میں مرہ ہر ایک عدد یا اطریفیل زمانی یا اطریفیل کشینز یا اطریفیل صغیرہ ماشہ سے لے کر ایک تولہ تک رات کو استعمال کرائیں اور بیرونی طور پر ان نسخوں میں سے کسی ایک کا استعمال کرائیں۔

سرمہ روشن چرخ :- لیکس سوپ ایک ٹیکہ (دواونس) طوطیا سبز تین رتی، ویزلین سفید ایک اولس۔

ترکیب :- اول دواونس پانی میں طوطیا کو حل کر کے اس میں صابن ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دیں۔ اور آگ پر یہاں تک پکائیں کہ بالکل دہی کی طرح ہو جائے۔ اب ویزلین ملا دیں تیار ہے۔ بقدر خشکاش دوائی ایک قطرہ پانی میں حل کر کے دونوں آنکھوں میں سلائی سے لگائیں، ایک دومنٹ آنکھیں بند رکھیں، نہایت لیس دار پانی خارج ہوگا۔

فوائد :- دھند، خارش، کمرے، پلکوں کا گرنا، آنکھوں کا گندہ پن اور ابتدائی موتیا بند کے لئے نہایت کامیاب علاج ہے۔

دوائے ابتدائے موتیا بند :- نیم کے پھولوں کے رس میں پُرانی روئی دو تین بار تر و خشک کر کے تیل سروسوں میں تر کر کے کاجل تیار کریں، اور بعدہ خاکستر پیس کر صبح و شام لگائیں، موتیا بند کی ابتدائی حالت میں مفید ہے۔

دوائے موتیا بند :- صرف جاسن کی گٹھلی شدہ سفوف شدہ تین ماشہ صبح اور تین ماشہ شام پانی سے کھلائیں اور ساتھ ہی ہی سفوف گٹھلی جاسن سرمہ کی طرح پیس کر ہوزن شہد خالص ملا کر سرمہ صبح و شام لگائیں اور قدرت ربی ملاحظہ فرمادیں۔

دیگر :- کشتہ جت دس تولہ سرمہ سیاہ شدہ دس تولہ افیون ایک ماشہ، زنگار چھ ماشہ، سمندر جھاگ تین ماشہ، سفیدہ کا شغری تین ماشہ تمام دواؤں کو علیحدہ علیحدہ پیس کر آپس میں ملا کر نصف بوتل عرق سولف اور نصف بوتل عرق گلاب خالص سے کھل کر کریں، اور ایک ہلکی سلائی استعمال کریں۔ یہ سرمہ موتیا بند کی ابتدائی حالتوں میں مفید ہے۔ اس کے علاوہ کمزوری نظر، جالا، پھولا، ناخونہ وغیرہ امراض چشم میں بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ کھل صابون اور سرمہ طوطیا وغیرہ بھی مفید ہے۔ یہ نسخہ جات صرف ابتدائی حالت میں فائدہ مند ہیں، اگر تکلیف کو زیادہ عرصہ گزر جائے تو آپریشن ہی اس مرض کا شافی علاج ہے۔

آیور ویدک علاج :- نیم کے پھول جب درخت پر اچھی طرح کھل جائیں تو انہیں درخت سے توڑ لیں۔ (زمین پر گرے ہوئے نہ اٹھادیں کیونکہ ان کے ساتھ ریت مٹی وغیرہ بھی آئے گی) پھولوں کی ہری ڈنٹھل پھولوں سے الگ کر لیں اور پھولوں کو سایہ میں سکھالیں، گرد مٹی وغیرہ نہ پڑنے دیں اور کالی کھل میں پیس لیں، اس کے برابر نلکی شورہ ملا کر سرمہ کی طرح پیس لیں، سرمہ تیار رہے صرف رات کو سوتے وقت سلائی سے لگائیں، ترچیلہ (ہرٹ ایک حصہ، بہیرہ دو حصہ، آملہ چار حصہ) کوٹ کر رات کو بھگو دیں، صبح چھان کر اس سے آنکھ دھوئیں اور تین گھونٹ پی لیں، سورج نکلنے سے پہلے ننگے پاؤں سبز گھاس پر کم از کم آدھ گھنٹہ سیر کریں۔

غذا و پرہیز :- خوراک میں گائے کا مکھن، گائے کے دودھ میں شہد ڈال کر پیس بھوجن سادہ کریں۔ بادی، بہت گرم اور دیر سے ہضم ہونے والی چیزیں نہ کھادیں۔ بھینس یا بھیر کا دودھ نہ لیں، صرف گائے یا بکری کا دودھ استعمال میں لادیں۔ مٹا کو، گوشت، شراب، بنا پستی گھی، چائے، بھنگ، انجا، افیون، پیاز، لہسن، آئیس کریم، برف، تیل، ترش چیزیں، مروج لال کا استعمال منع ہے، ہاں کالی مروج کا استعمال کر سکتے ہیں۔ علاج شروع کرنے سے پہلے تین دن پاخانہ ہو کر آنے کے بعد صاف پانی سے انیما کریں اور پھر جب کبھی پیٹ میں گڑ بڑ ہو، اسی طرح انیما کریں۔

درستی کی کھینتا، بینائی کی کمزوری، ضعفِ بصر، اسٹینوپیا (ASTHENOPIA)

تعریف مرض :- نظر کمزور ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے صاف دکھائی نہیں دیتا۔

وجوہات :- کثرت مطالعہ، کمزوری دماغ و اعصاب، شدید دماغی محنت، سر میں چوٹ لگنا، کثرت ملاپ، بڑھاپا، زکام، شوقیہ عینک لگانا، منشیات (مشراب، متاکو، افیم، بھنگ وغیرہ کا استعمال) قبض، دائمی درد سر اور دائمی گریہ وزاری اس کے اسباب ہیں۔

علامات :- دور کی چیزیں اچھی طرح دکھائی نہیں دیتیں، مطالعہ سے جلدی آنکھیں تھک جاتی ہیں، باریک حروف یا باریک چیزیں اچھی طرح نظر نہیں آتیں۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آجاتا ہے۔

علاج :- مرض کا اصل سبب معلوم کر کے اس کا علاج کریں۔ آنکھوں کو آرام دینا، رات کو جاگتے رہنا، کثرت مطالعہ خصوصاً باریک حروف کے پڑھنے سے پرہیز کریں۔ دماغی محنت، رونے دھونے اور گرم و سرد ہوا سے مریض کو بچائیں اور نظر کو تیز کرنے والے نسخجات استعمال کرائیں۔ محنت سے سخت پرہیز کرائیں، کمزوری دماغ کے لئے صنعت دماغ کے باب میں لکھے گئے نسخجات کا استعمال کریں، سر پر بلوب سبغہ کی مالش مفید ہے یا خوراک کی طور پر مندرجہ ذیل خمیرہ گاؤ زبان غبری کا استعمال کریں۔

خمیرہ گاؤ زبان غبری :- گاؤ زبان تین تولہ، گل گاؤ زبان، ابریشم مقرر، دھنیاں خشک، صندل سفید، بہمن سرخ، بادرنجبویہ، اسطوخودس، تخم بالنگو، تخم فرخشک، تودری سرخ، تودری سفید ہر ایک ایک تولہ، عنبر ڈیڑھ ماشہ، ورق چاندی چھ ماشہ، چینی ایک سیر، شہد خالص ایک پاؤ، بطریق معروضہ خیر تیار کریں۔ مفاد و ترکیب استعمال :- ہر روز پانچ ماشہ عرق گاؤ زبان دس تولہ یا تازہ پانی کے ہمراہ استعمال کریں، یہ خمیرہ دل اور دماغ اور نظر کو طاقت دیتا ہے اور خفقان کی شکایت کو کھودیتا ہے، طلباء اور دماغی محنت کرنے والے اصحاب کے لئے عمدہ چیز ہے، اصلاح و تقویت دماغ کے لئے اطفال کشنیزی کا کھلانا بھی مفید ہے۔

سرمہ مقوی بصر (غریبانہ) :- اخروٹ سالم سوختہ چار عدد، ہرڑ زرد سوختہ (جلائی ہوئی) چھ عدد، مرچ سیاہ نو عدد، سب کو باریک پس کر سرمہ کی طرح آنکھوں میں لگائیں۔

صرف سرمہ سیاہ شدہ آنکھ کے میل کو دھو کر رکھنے کے لئے اور مینائی کو طاقت دینے میں نہایت فائدہ مند ہے یا یہ سرمہ استعمال کریں۔

سرمہ محافظ چشم :- سرمہ سیاہ خالص دس تولہ، تر پھلا (ہرڑ بہڑہ آمہ) ۲۰ تولہ، نیم کے پتے پانچ تولہ، کیلے کے پتے ۲۰ تولہ، سرس کے پتے ۲۰ تولہ، سرمہ سیاہ کے سوائے باقی تمام چیزوں کو موٹا موٹا پس کر ایک سیر پانی میں بارہ گھنٹے بھگو کر رکھ دیں، پھر آگ پر جوش دیں اور نصف رہنے پر چھان لیں اور مذکور سرمہ سیاہ کی ڈلیوں کو آگ میں گرم کر کے پچاس بار اس پانی میں بھجائیں۔ پھر صاف پانی سے دھو کر کھل میں باریک پس لیں اور اس میں کافور بھیم سینی ایک ماشہ، ست پودینہ آدھا ماشہ ملا لیں اور صبح و شام آنکھوں میں سلائی سے ڈالیں۔ آنکھوں کی حفاظت کے لئے مفید ہے۔

بھیم سینی کا جل کے مقابلہ کا بہترین فارمولا :- ویزلین سفید ایک پونڈ، کاجل بڑھیا (چراغ کا کاجل) آدھا پونڈ، کافور بھیم سینی ایک اونس، ست پودینہ آدھا ڈرام۔

اگر چراغ (دیپک) کا کاجل مل جائے تو بہت ہی مفید ہے۔ اور سیاہ کاجل صحیح طبی نقطہ نظر سے آنکھوں کے لئے ایک نعمت ہے، ورنہ رنگ و روغن میں کام آنے والا ہی سہی، مارکیٹ میں جو کاجل بک رہے ہیں، وہ تمام انہی سے بنائے جاتے ہیں۔ اسے جہازی کاجل رنگ و روغن میں کام آنے والا کہتے ہیں۔ اس کے لئے بہترین قسم کا ہلکا لیجے۔ بھاری کم قیمت نہ خریدیے، کیونکہ وہ اس کے لئے فائدہ مند نہیں ہے۔

ترکیب :- ویزلین میں کاجل ملا لیں اور کافور ست پودینہ کھل کر کے اس میں شامل کریں اور اس قدر پھینٹیں، کہ سب اجزاء اچھی طرح مل جائیں، پھر چھوٹی چھوٹی ٹین کی ڈبیوں پر کاجل کا نام اور فائدہ سے چھپو اگر پکنگ کر لیں، ویزلین میں موسم کے مطابق کمی بیشی کی جاسکتی ہے۔ آنکھوں کی تمام امراض کے لئے نہایت مفید ہے، روزانہ استعمال سے آنکھوں کی نظر بڑھتی ہے اور قائم رہتی ہے۔ آنکھیں تھکاوٹ محسوس نہیں کرتیں اور

تندرست رہتی ہیں۔

لویشن برائے امراض چشم: بکپھرا کی جڑ کا رس پانچ تولہ نیم کے پھولوں، کارس چار تولہ، پیاز کا رس دو تولہ، شہد خالص ایک تولہ، کافور بھیم سنی چھ ماشہ، ایک شیشی میں ڈال کر دھوپ میں رکھیں، شیشی آدھی خالی رکھیں، پھر کپڑے سے چھان کر ڈراپر سے تین بار ہر روز ڈالاکریں، آنکھوں کی جلد امراض میں مفید ہے۔

دیگر: سولف ۱۲۵ گرام، سرمہ کالا ڈلی ۲۵ گرام۔ درخت نیم کے تنے میں شکاف لگا کر سرمہ کی ڈلی کو اس میں ایک ہفتہ کے لئے رکھیں، پھر نکال لیں، سولف کو ۲۰۰ گرام پانی میں بھگو کر رکھیں، پھر چھ گھنٹہ بعد جوش دے کر چھان لیں اور مقوڑا مقوڑا یہ جوشاندہ ڈال کر سرمہ کو کھل کر تے جائیں یہاں تک کہ جوشاندہ ختم ہو جائے اور باریک سرمہ بن جائے، دونوں وقت سلائی سے لگائیں۔

دیگر: تریپلہ سفوف تین گرام پانی کے ساتھ دن میں دو بار لیں۔ اور سولف کی شبنم (شبنم جو سولف کے پودے پر ہوتی ہے، صاف رومال سے اتار کر رومال پتھر ڈال کر شیشی میں ڈال لیں) اور ڈراپر سے آنکھ میں ڈالیں۔

قدرتی علاج: آنکھوں کو آرام دیں، صاف رکھیں اور صبح و شام سرد پانی کے چھینٹے دیں، ہر روز غسل کریں، اور ہر روز صبح و شام پرفضا اور سبزہ زار مقامات کی سیر کیا کریں، غذا لطیف اور مقوی دیں۔

غذا و پرہیز: زود ہضم، مقوی اور خالص گھی سے چکنی غذائیں (مرغ کا شوربہ وغیرہ) اور چپاتی، مونگ کی دال، مکھن، کلیجی، شہد وغیرہ کا استعمال کریں، موسم کے مطابق ابلے انڈے کھائیں، پودینہ کا استعمال بھی مفید ہے، ترش، بادی، ثقیل چیزوں، تیل، گڑ، شراب اور چائے وغیرہ سے پرہیز کریں۔ لوبیا، گوہی، دال مسور وغیرہ سے پرہیز کریں۔

ناخنہ — فطرہ — ٹریچیم (Pterygium)

تعریف مرض: آنکھ کے ایک گوشے میں ایک سُرخ مائل پردہ سا پیدا ہو جاتا ہے۔

وجوہات: گرد و غبار سے آنکھوں میں خراش پیدا ہونا، گاہے لیس دار غلیظ مادوں کے زیادہ جمع ہو جانے سے بھی یہ پیدا ہو جاتا ہے۔

علامات: ملتحمہ کے نیچے کوئی باریک رگ پھٹ کر معمولی سا خون بہہ جاتا ہے۔ اس کی جڑ عموماً ناک کی طرف ہوتی ہے، سُرخ پردہ سا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ پردہ کبھی بڑھ کر تمام قرنیہ کو ڈھک لیتا ہے جس سے نظریں نقص آ جاتا ہے۔

علاج: شروع مرض میں اس کا علاج ہو سکتا ہے، جب یہ مرض بہت بڑھ جائے تو سوائے آپریشن کے اس مرض کا کوئی علاج نہیں شروع مرض میں زنگ سلفاس لوٹن (دو فیصدی والا) آنکھ میں ڈالیں، وٹامن اے کے مرکبات کھلائیں۔ گولڈن آئی آکسائیڈ کا استعمال کریں، بعض ڈاکٹر ناخنہ پر احتیاط سے کاپر سلفیٹ (طوطیا) لگاتے ہیں۔

ایسی طریقہ علاج میں خوراک کی طور پر اطریفیل زمانی یا اطریفیل کشینز یا اطریفیل اسطندوس کا استعمال کرائیں اور مندرجہ ذیل نسخوں میں سے کسی ایک کا استعمال کریں:-

۱۔ چاکسو شہد (چھپے ہوئے)، سنگ بصری، پشکڑی، چینی سفید ہر ایک دو ماشہ، قلمی شورہ نو ماشہ، سب ادویہ کولیموں کے رس میں کھل کر کے شیا ف (بٹی) بنا کر اسے ہر روز ناخنہ پر لگائیں۔

۲۔ ہلدی کو آٹے میں لپیٹ کر آگ میں بھجلا کر نکال کر اس کے برابر پشکڑی بریاں ملا کر سرمہ کی طرح باریک پس کر سرمہ کی طرح ہلکی مقدار میں ناخنہ پر لگائیں۔

۴۔ پشکڑی بریاں، ہلدی (گاسٹھ والی) بریاں، چینی (داندہ دار کھانڈ)، تلمی شورہ، سمندر جھاگ، سب برابر وزن لے کر سرمہ کی طرح باریک پس کر ہلکی سلائی سے آنکھ میں لگائیں۔

۴۔ کندر عرق گلاب میں گھس کر آنکھوں میں ڈالنا بھی بہت مفید ہے۔

۵۔ آدمی کے کان کا میل شہد میں ملا کر لگائیں، عجیب اثر ہے۔

غذا پر ہیز۔ نرم اور جلد ہضم ہونے والی اغذیہ دیں۔ بادی، دیر ہضم، ترش اور گرم چیزوں، گردو، غبار اور دھوپ سے مرخص کو بچائیں۔

نین میں رکت بندو، آنکھ میں خونی نقطہ، طرفہ، ایکسی موشس (Acchymosis)

تعریف مرض :- آنکھ کی سفیدی پر سرخی سیاہی مائل نقطہ یا دھبہ پیدا ہو جاتا ہے۔

وجوہات :- آنکھ پر چوٹ لگنے، زور سے قے کرنے یا زور سے کھلانے یا چلانے وغیرہ سے کوئی باریک رگ پھٹ کر معمولی خون بہہ جاتا ہے، جو سیاہی مائل دھبہ کی صورت میں نظر آتا ہے۔

علامات :- آنکھ کی سفیدی پر ایک سرخ سیاہی مائل دھبہ (نقطہ) نظر آتا ہے۔

علاج :- اول تو یہ خونی دھبہ اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے، ورنہ آنکھ میں زنگ لوشن (سگرین فی اونس والا) ڈالیں۔ اور آنکھ پر سرد پانی کی پٹی باندھیں۔ اس کے علاوہ یلیو آئنٹینٹ کا لگانا بھی مفید ہے۔

دوسری طریقہ علاج میں پشکڑی لوشن (سگرین فی اونس والا) آنکھ میں ڈالیں مانتین کو کوٹ کر پوٹلی باندھ کر گرم پانی میں بھگو کر اس سے آنکھ پر ٹکور کریں یا سرمہ لگائیں۔

سرمہ برائے خونی نقطہ چشم :- پشکڑی، تلمی شورہ، سمندر جھاگ، ہلدی، مصری ہر ایک چھ ماشہ، سب کو سرمہ کی طرح باریک پس کر ہلکی سلائی سے صبح و شام کو آنکھ میں لگائیں۔

غذا پر ہیز :- بکری کا شوربہ، پالک، گاجر، دال مونگ، ٹنڈا، کدو، پیٹھا کی سبزی دیں، تیز مصالحہ دار چیزوں اور لکھنے پڑھنے سے سخت پرہیز کریں۔

جالا۔ پھولا۔ ٹینٹ۔ نے بولا۔ مے کیولا۔ لیوکوما

تعریف مرض :- قرنیہ کے طبقات میں زخم ہو جانے کے سبب سے آنکھ میں سفیدی ہو جاتی ہے، اگر یہ سفیدی بہت پتلی ہو تو اسے جالا (نے بولا) اور اگر گاڑھی ہو تو اسے پھولا (مے کیولا)، اگر بہت ہی گاڑھی ہو تو اسے ٹینٹ (لیوکوما) کہتے ہیں۔

وجوہات :- لکڑے، پڑبال، چھپک یا آنکھ دھکنے کے دوران میں لاپرواہی سے قرنیہ میں زخم ہو جاتے اور داغ رہ جاتے ہیں، اور یہ داغ ہی سفیدی ہوتی ہے۔ کبھی درشتیقتہ وغیرہ سے بھی قرنیہ میں زخم ہو کر سفیدی پیدا ہو جاتی ہے۔

اگر یہ سفیدی قرنیہ کے درمیان میں ہو اور خواہ پتلی ہی کیوں نہ ہو، اس سے بینائی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب سفیدی قرنیہ کے محیط پر ہو تو گاڑھی ہو کے باوجود بھی بینائی بدستور رہتی ہے، لیکن قرنیہ کے محیط پر خاکی رنگ کا ایک حلقہ نظر آتا ہے جسے ایلیو پیٹی طب میں آرکس سنالیس (Arcus senilis) کہتے ہیں۔ یہ سفیدی عمر کی آخری منزل (بڑھاپے) میں قرنیہ کے محیط میں ابتری کے ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ موتیا بند وغیرہ کے آپریشن کرنے میں قوس پری

(سلائی لس) سے کوئی حرج نہیں ہوتا۔

علامات :- اگر جالا ہو تو مریض کو روشنی برداشت نہیں ہوتی، آنکھ میں سوجن، درد اور سُرخی ہوتی ہے اور قرنیہ پر ایک جالا معلوم ہوتا ہے، پھولا یا ٹینٹ کی صورت میں آنکھ کی سیاہی پر سفید داغ یا پردہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے بینائی کم ہو جاتی ہے یا جاتی رہتی ہے۔

علاج :- بچوں کو عام طور پر جلد فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن بالغوں میں جب یہ سفیدی رونما ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ ہی آرام ہونا ہے۔ اگر سفیدی قرنیہ کے درمیان ہو تو بھینکا پن اور قریب نظری کی تکلیف ہو جاتی ہے اور جب بچہ کی دونوں آنکھوں میں سفیدی ہو تو آنکھوں کے ڈھکیوں میں رعشہ ہو جاتا ہے جسے ڈاکٹری میں نس ٹیگ مس (Nystagmus) کہتے ہیں۔

جب بچوں میں آنکھ کی سفیدی نازہ ہو تو یو آئنٹمنٹ (۲ سے ۴ گرین فی اونس والی) ہر رات کو آنکھ میں لگانے سے اور آنکھ پر گرم پٹی باندھنے سے آرام آ جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل مہربات اس مرض کے لئے نہایت مفید ہیں :-

۱۔ آنکھوں کی خراش کو دور کریں اور بارہ نگھا عورت کے دودھ میں گھس کر دوبار روزانہ پھولا پر لگایا کریں۔

۲۔ سمندر جھاگ کو سرمہ کی طرح باریک پیس کر شہد کے ساتھ سلائی سے پھولا پر لگائیں۔

۳۔ قلمی شورہ، لوٹا سچی، پشکڑی سفید، سوہاگہ، نوشادر پھلی ہوزن لے کر دو پیالوں میں بطریق معروف جو ہر اڑائیں اور صبح و شام سلائی سے ہلکی مقدار میں لگائیں، جالا و پھولا کا بہت ہی مفید علاج ہے۔

۴۔ پشکڑی بریاں پانچ تولہ، سونٹھ چھ ماشہ، قلمی شورہ چھ ماشہ، لیموں کارس حسب ضرورت، تمام ادویہ کو کوٹ کر لیموں کے پانی میں کھل کر کے سرمہ بنائیں اور ہلکی مقدار میں سلائی سے لگائیں، ہر قسم کا چٹا، پھولا چند دن کے اندر دور ہو کر آنکھیں صاف ہو جاتی ہیں، دلیسی طب کا انمول اور آسان نسخہ ہے۔

سرمہ برائے جالا و پھولا :- جست (پھول ہوا)، سرمہ سیاہ ہر ایک ایک تولہ، سرمہ دو ماشہ، زنگار ڈیڑھ ماشہ، افیون آدھا ماشہ، سمندر جھاگ دو ماشہ، ہر ایک دو کو علیحدہ علیحدہ کوٹ پیس کر چھان لیں، ایک روز لیموں کے رس میں کھل کریں اور ایک سلائی روزانہ مقام مرض پر لگادیں۔ یہ سرمہ دھند، جالا، پھولا اور ککروں کو فائدہ دیتا ہے۔ جالے کو دور کرنے کے لئے تو خاص شے ہے۔

اگر سفیدی بہت غلیظ ہو اور قرنیہ کے درمیان میں ہو تو پھر یہ آپریشن سے ہی دور ہو سکتی ہے، جو ایک ماہر امراض چشم ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے۔
غذا و پرہیز :- شوربہ، چپاتی، پالک وغیرہ جلد ہضم ہونے والی غذائیں دیں اور دہی، لسی، بنینگن، مسور کی دال، لیموں وغیرہ ترش اور دیر ہضم، گرم اغذیہ سے پرہیز کریں۔

رَلَوَنْدَا - اَنْدَهَرَا - عِشَا شَب کُورِی - ہِمِی رَل اوپِیا - (Hemeralopia)

تعریف مرض :- مریض کو رات کو اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ مرض دراصل اندھاپن کی ایک قسم ہے۔

وجوہات :- عام جسمانی کمزوری، تیز دھوپ کا آنکھوں پر پڑنا، تھکاوٹ، بلیربائی زہر، رات کو مطالعہ کرنا، گاہے وراثت میں ملتا ہے، گاہے بطور وبا بھی پھیل جاتا ہے۔

علامات :- مریض اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نظر کچھ نہیں آتا۔

ڈاکٹری علاج :- آنکھوں کو تیز دھوپ سے بچانے کے لئے چشمہ لگائیں، خراب اور ناقص روشنی میں کام کرنے اور باریک بینی سے پرہیز

کریں اور مندرجہ ذیل نسخہ جات میں سے کسی ایک کا استعمال کریں :-

۱۔ کاشک دو گرین، صاف پانی ایک ادس، لوشن بنا کر ایک قطرہ آنکھ میں ڈال کر آنکھ پر پٹی باندھ دیں، رات کو کھول دیں۔ آنکھ سے رات کو یقیناً نظر آئے گا، اسٹینز سیرپ کا استعمال مفید ہے۔

۲۔ وٹامن اے کے مرکبات اس کا موثر علاج ہیں، اس سلسلہ میں گلیکسو کمپنی "پریپالین" Prepalin بی، ڈی، پیج کمپنی ایو ولیم۔ ایم، بی کمپنی "پلا نووٹ" اور اے سی ڈی کمپنی اے "اے وی من" کے ناموں سے تیار کرتی ہیں،

یہ سیال صورت میں ۵ سے ۱۰ منم اور کیپ شولز کی صورت میں دو گولی دن میں دو سے تین بار دیں۔ بچوں کے اندھرتائیں اوکیولین

(Adexolin) گلیکسو ۵ سے ۱۰ ابوند ڈراپس، بڑوں کو دو دو کیپ شولز دن میں دو سے تین بار دیں یا ایرووٹ (Arovit)

روش ۵ سے ۱۰ ایک سے دو کیپ ہر روز دو بار دیں۔ بچوں کو اس کے ڈراپس دس پندرہ بوند دن میں تین بار دیں یا وٹامن اے

کسی اچھی کمپنی کا ایک ایمپولز کا عضلاتی ٹیکہ روز لگائیں۔

یونانی علاج :- (۱) مرچ سفید، مرچ سیاہ، لکھاں، تینوں ادویہ ہوزن لے کر سرسہ کی طرح بار یک سفوف تیار کریں، اور ہلکی سلائی سے

آنکھ میں لگائیں، رنڈا کے لئے مفید ہے۔

۲۔ آنکھوں میں پیاز یا ادراک کا پانی سلائی سے لگانا بھی مفید ہے۔

۳۔ خوراک کی طور پر اطر فیض صغیر یا اطر فیض کبیر استعمال کریں، یا مرہ آملہ دھو کر ورق چاندی پیٹ کر کھائیں، جسمانی کمزوری سے ہو تو صبح و شام کشتہ

فولاد یا دواء المسک مختل جواہروالی یا خمیرہ مروارید یا خمیرہ گاؤز بان عنبری کا استعمال کرائیں۔

۴۔ نوشادر کھلی چھ ماشہ، پھٹکڑی سفید بریاں چھ ماشہ، سرسہ کی طرح پیس کر سلائی سے ہلکی مقدار میں آنکھ میں لگائیں۔

۵۔ بکرے کی کلیجی کو چھری سے گود کر اس پر فلفل ایک عدد سرسہ کی طرح بار یک پیس کر چھڑک دیں اور آگ پر رکھ کر گرم کریں، جو رطوبت نکلے اُسے

سرسہ کی طرح سلائی سے لگائیں، شب کوری کے لئے مفید ہے۔

۶۔ شب کوری کے مریض کو بکرے وغیرہ کا جگر کھلانا نہایت مفید ہے، رات کو کھانا نہ دینے سے بھی مریض کو آرام ملتا ہے۔

آیور ویدک علاج :- بطر یونانی علاج کے کریں۔

ہومیو پیتھک علاج :- سورج چھینے کے بعد رات کو نظر بند ہو جائے فانی سوشلما، بیلا ڈونا، ہیلی بوس یا لایکو پو ڈیم ۳۰ - ۲۰۰ دیں۔

غذا و پرہیز :- مرغ، بکری، تیتڑ، بٹیر کا شوربہ و چپاتی، دال مونگ، مکھن، کلیجی، شہد وغیرہ وٹامن داتا اور زود صہم و مقوی غذا میں دیں۔

دیرینہ چیزوں، دال ماش، مینگن، چائے، میٹھی، پیاز، لہسن، لوبیا، گوہی، دال سور وغیرہ سے پرہیز کرائیں۔

دن کو نظر نہ آنا۔ روز کوری۔ نکٹول اوپیا (Nyctolopia)

تعریف مرض :- اس مرض میں مریض کو دن میں کوئی چیز صاف نظر نہیں آتی، لیکن رات کو دکھائی دیتا ہے۔

وجوہات :- دن کے وقت سورج کی گرمی یا دماغ میں کسی تیز مادہ کی وجہ سے روح بھر اس قدر رقیق ہو جاتی ہے کہ دن میں کوئی چیز اس میں نہیں

چھپ سکتی۔ رات کے وقت سردی سے روح بھر غلیظ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے رات کو چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، یہ عارضہ کثرتِ ملاپ، بار یک بینی

کم روشنی میں پڑھنے اور سورج کی طرف زیادہ دیر تک تکیے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ عام طور پر بوڑھے اور خشک طبع اشخاص زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔

علامات :- دن کو کچھ نظر نہیں آتا، رات کو نظر مکمل طور پر کام کرتی ہے۔

علاج :- اصل سبب مرض کو دور کریں، نیلے شیشوں کی عینک لگائیں، وٹامن اے کا استعمال اس مرض کا کامیاب علاج ہے، وٹامن اے ٹیبلٹ جو مختلف کمپنیوں کی تیار شدہ بازار میں عام ملتی ہیں۔ مریض کو کھلائیں، فولاد کے مرکبات بھی مفید ہیں، بیرونی طور پر بورک ایسڈ سلائی سے آنکھ میں لگائیں اور پٹی باندھ دیں۔ یہ علاج سورج کے نکلنے سے پہلے کرنا چاہیئے۔ دن بھر پٹی بندھی رہے، سورج ڈوبنے کے بعد کھول دیں، دوسرے دن دوسری آنکھ میں بورک ایسڈ کی سلائی لگا کر پہلے دن کی طرح پٹی باندھ دیں اور سورج ڈوبنے کے بعد کھول دیں۔ چند دن کے استعمال سے آرام آجائیگا۔

دلیسی طریقہ علاج میں مندرجہ ذیل مرکبات میں سے کسی ایک کا استعمال کریں، آرام آجائے گا۔

۱۔ خوراک کی طور پر اطر فیض کشینزی یا اطر فیض اسٹھوس ۹ ماشہ کھلائیں، لبوب سبجہ کی سر پر پالش کریں۔

۲۔ کشتہ چاندی ایک سے دو چاول خمیرہ گاؤ زبان عنبری جواہر دالے میں ملا کر کھلائیں اور حریرہ مقوی دماغ کا استعمال بھی مفید ہے۔

۳۔ سر پر روغن بادام یا روغن زردیا مکھن کی مالش کریں، اس کے علاوہ اغذیہ و ادویہ مقوی دماغ کا استعمال بہت مفید ہے۔

ہومیوپیتھک علاج :- دن کے وقت سورج کی روشنی میں نظر کمزور پڑ جائے تو باکھر و پس یا بوڈا ۳۰۔ ۲۰۰ کا استعمال کرائیں۔

غذا و پرہیز :- کثرت ملاپ، شراب، حرکات جسمانی، نکلین، تیز ترش چیزوں سے پرہیز کریں اور چوزہ مرغ کا گوشت، ماش کی دال، انڈہ، مکھن، خالص گھی، دودھ، بالائی، مربہ آملہ، گاجر کا استعمال بہت مفید ہے، چمک دار چیزوں کی طرف دیکھنا یا گڑ، لال مرچ، گرم مصالحہ وغیرہ استعمال نہ کریں۔

بھینگاپن - حول - سٹرابس مس - (Strabismus)

تعریف مرض :- آنکھ کی سیاہی اپنی جگہ سے ہٹ کر اوپر یا نیچے، دائیں یا بائیں ہو جاتی ہے۔

وجوہات :- کمزوری نظر، گوبانجی، بخار کی کمزوری، انٹریوں یا معدہ کی تکالیف، بچوں میں دانت نکلنے وغیرہ سے آنکھ کے ایک یا چند عضلات میں شدید تشنج ہو کر ڈھیلا پھر جاتا ہے۔

علامات :- اس مرض میں مریض آنکھ کو گھما کر ادراؤ پر نیچے کر کے دیکھتا ہے۔ آنکھ کی سیاہی اپنی اصلی جگہ سے ہٹ کر اوپر یا نیچے ہو جاتی ہے۔

۱۔ اور مریض کو دونوں آنکھوں سے کام لینے پر ایک کی بجائے دو چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس لئے ایسا مریض ایک ہی آنکھ سے کام لیتا ہے، جب سیاہی دائیں یا بائیں ہو جائے تو نظر میں چنداں فرق نہیں پڑتا، لیکن جب مریض کسی چیز کو دیکھتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ کسی دوسری چیز کو دیکھ رہا ہے۔

علاج :- اصل سبب کو دور کریں، کمزوری نظر سے ہو تو عینک لگوائیں، مقوی دماغ ادویہ و اغذیہ دیں، روغن جگرماہی یا کشتہ سونا کھلائیں۔

آنکھ جس طرف مائل ہو، اس کے مخالف طرف مریض کو دیکھنے کے لئے مجبور کریں، اور اس طرح کوئی رنگین کپڑا آنکھ پر لٹکادیں۔ اور اس کی طرف دیکھنے کی ہدایت کریں یا ایک فٹ کے فاصلہ پر ایک سیاہ داغ لگائیں جو مریض کے سر سے تین فٹ اونچا ہو، اور مریض کو اسے دیکھنے کی ہدایت کریں، اگر ان مذاہیر سے کوئی فائدہ نہ ہو تو آنکھ کو حرکت دینے والے عضلات میں سے جس کے سبب یہ نقص ہو، اس کو بذریعہ آپریشن کٹوا دیں۔ یہ آپریشن ایک ماہر چشم

مستند مریض ہی کر سکتا ہے، مندرجہ ذیل سُر مہ بھی بھینگاپن کے لئے مفید ہے یا سادہ شیشوں کی عینک بنوا کر لگائیں، اس سے نظر ٹک جاتی ہے۔

سُر مہ برائے بھینگاپن :- مامیراں چینی ایک ماشہ، ہلدی دو ماشہ، ہر دو کو عرق صوف کی مدد سے کھل کر کے بالکل ہلکی مقدار میں سُر مہ کی طرح سلائی سے آنکھ میں لگائیں اور مخالف طرف نظر قائم کرنے کی کوشش کریں۔

غذا و پرہیز :- زود ہضم غذا، گاجر، شلغم، بکری یا مرغ کا شوربہ وغیرہ کھلائیں، دیرینہ غذائیں، چنے کی دال، بیگن، گڑ، نیل اور بازاری مٹھائیوں

پڑبال۔ زائد بال۔ ڈسٹیکائیسس (Distichiasis)

تعریف مرض :- پلکوں کے بال اندر کی طرف مڑ کر آنکھ میں چبھتے ہیں اور خراش پیدا کرتے ہیں۔
وجوہات :- اس مرض کے باعث پوٹوں کے کناروں کی پرانی سوزش، لکڑے، کبھی چوٹ لگنے یا گرم پانی یا آگ سے جل جانے سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- آنکھوں میں سخت خراش سے درد ہوتا ہے، جس سے آنکھیں بند کرنے دکھونے میں سخت تکلیف ہوتی ہے۔ آنسو بہتے ہیں، بروقت علاج نہ ہونے سے آنکھ کے ڈھیلے زخم ہو جاتے ہیں اور کبھی آنکھ میں سفیدی پڑ جاتی ہے۔

علاج :- ڈاکٹری طریقہ علاج میں پلکوں کے مڑے ہوئے بالوں کو ایک ایک کر کے صاف مچھنے سے آہستگی کے ساتھ اکھیر دیں۔ اس سے عارضی طور پر آرام آ جاتا ہے۔ اگر پلکیں زیادہ نہ مڑی ہوئی ہوں تو علاج بذریعہ بجلی کامیاب رہتا ہے، لیکن اس سے مریض کو درد زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ بجلی کے ذریعہ بالوں کی جڑوں کو جلانا پڑتا ہے۔ اگر پڑبال کسی طریقہ سے دور نہ ہوں تو اس مرض کا مستقل علاج آپریشن ہی ہے جو ایک مستند سرجن ہی کر سکتا ہے۔

وہی طریقہ علاج میں ہر روز رات کو اطریفیل اسطخدوس چھ ماشہ یا مربہ ہر ایک عدد کھلائیں اور بیرونی طور پر مندرجہ ذیل دواؤں میں سے کسی ایک کا استعمال کریں :-

۱۔ شورہ قلمی چھ ماشہ، شرمہ سیاہ شدھ چھ ماشہ، ہرد کو سرمہ کی طرح بار ایک پیس کر ملکی سلائی سے آنکھ میں لگائیں۔

۲۔ گیرو کو سرموں کے تیل میں گھس کر مقام مرض پر لگائیں، مفید ہے۔

۳۔ زعفران خالص دو ماشہ، کافور ایک رتی، دونوں کو پانی کے ساتھ پیس کر بالوں کو اکھاڑ کر پوٹوں پر لپیپ کریں۔

۴۔ سمندر جھاگ کو لعاب السبغول میں ملا کر مقام مرض پر لگائیں، یا افاقہ، گوند کیکر ہرد کو اچھی طرح کھل کر کے پانی کی مدد سے بتی بنا کر پڑبالوں پر لگائیں۔

غذا و پرہیز :- گرم اور دیرینہم غذاؤں سے سخت پرہیز کریں، زیادہ دھوپ میں چلنے پھرنے اور لکھنے پڑھنے کے کام سے بھی پرہیز لازم ہے۔ جلد ہضم ہونے والی غذائیں، مونگ کی دال، کھجڑی، شوربہ وغیرہ دیں، پھلوں میں انگور، سیب اور انار کا استعمال مفید ہے۔

نکٹ دیکھنا، دور دیکھنا، قریب نظری، بعید نظری، مائی اوپیا، ہائی مڑوپیا

تعریف مرض :- قریب نظری میں مریض کو دور کی چیزیں صاف نظر آتی ہیں، لیکن قریب کی چیزیں واضح نظر نہیں آتیں، بعید نظری میں نزدیک کی چیزیں صاف نظر آتی ہیں، لیکن دور کی چیزوں کو اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا ہے۔

وجوہات :- دماغی اور اعصابی کمزوری، کثرت ملاپ، نشہ آور چیزوں کا بکثرت استعمال، کم روشنی میں لگاتار بار بار یک بینی، گاہے یہ مرض موروثی یا پیدائشی بھی ہوتا ہے۔

علامات :- قریب نظری میں مریض کو کسی تحریر کو پڑھنے کے لئے آنکھوں کے بالکل قریب لانا پڑتا ہے اور بعید نظری میں باریک بینی سے مریض کو سخت دقت ہوتی ہے، نظر تھک جاتی ہے اور حروف دھندلے ہوئے نظر آتے ہیں۔

علاج :- نظر کے ٹیڑھ کرانے کے بعد سبز عینک لگوالیں، عام طور پر یہ مرض وٹامن اے کی کمی سے ہوتا ہے، اس لئے اس مرض کے علاج میں وٹامن اے کے مرکبات استعمال کریں۔

دوسری طریقہ علاج میں مقوی بصری مجربات استعمال کریں، جن کا ذکر "ضعف البصر" کے بیان میں کیا جا چکا ہے، استعمال کریں یا ورق سونا ایک شہ کو شہد خالص چار تولہ کے ساتھ ملا کر تین چار دن کھل کریں۔ اس کے بعد دھوپ میں رکھیں۔ ایک ہفتہ کے بعد ایک یا دو ماشہ تک صبح و شام کھالیا کریں۔ اور وٹامن داتا اغذیہ وادویہ استعمال کریں۔

غذا و پرہیز :- زود ہضم و مقوی اغذیہ دیں، قابض اور دیر ہضم چیزوں سے سخت پرہیز کرائیں۔

بامہنی۔ سلاق۔ بلی فرائی ٹس (Blepharitis)

تعریف مرض :- آنکھ کے پوٹوں کے اندر کے کنارے موٹے ہو جاتے ہیں، پوٹوں کے اندر زخم اور بال گر جاتے ہیں۔

وجوہات :- آنکھوں کو میلا کچلا رکھنا اور آنکھیں نہ دھونا پلکوں کی سوزش، پلکوں میں جو میں پڑنا، آنکھوں کی خرابی۔ قریب یا بعید نظری وغیرہ، کبھی خسرہ اور سرخ بخار سے بھی یہ تکلیف ہو جاتی ہے۔

علامات :- پوٹوں کے کنارے سو جے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں جلن، درد اور سوزش ہوتی ہے، مرض کی پرانی حالت میں پلکوں کی رگوں میں چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ہو جاتی ہیں جو پھوٹ کر زخم کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، صبح اٹھنے سے پلکیں چپکی ہوئی ہوتی ہیں، نظر میں فرق پڑ جاتا ہے اور پلکوں کے بال جھڑ جاتے ہیں۔

علاج :- پلکوں کے کھرنڈوں کو دور کرنے کے لئے سوڈا بائی کارب دو گرین فی اونس کے لوشن سے دھوئیں، اس کے بعد روغن زیتون لگا دیں، پھر دین روز کے بعد آٹے کی پلٹس میں پھوڑا سا بورک ایڈ شامل کریں، اس طرح بامہنی کا اوپر والا کھرنڈ آسانی سے اتر جاتا ہے، دو گرین فی اونس والا کاشک لوشن لگانے سے بھی کھرنڈ اتر جاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں زخم کو دھونے اور خشک کرنے کے بعد سلفا تھاپا زول دس گرین، زین سفید ۲۵ گرین مریم بنا کر لگائیں یا مینی سلین آئی آسٹینٹ یا ایرومائی سین آئی آسٹینٹ یا ٹیرامائی سین آئی آسٹینٹ لگائیں یا ٹیرا کارٹل آئی آسٹینٹ لگائیں۔ کھانے کے لئے سلفا میزاتھین یا سپٹران گولیاں دیں۔ بچوں کو سپٹران شربت کا استعمال کرائیں۔

دوسری طریقہ علاج میں خوراک کی طور پر عرق مصفی خون پلائی اور بھینس کا دودھ نہ پینے دیں، مندرجہ ذیل نسخہ جات میں سے کسی ایک کا استعمال مفید ہے :-

۱۔ سپاری ایک عدد، افیون دورتی، لونگ، چھلکا ہڑ زرد ہر ایک دو عدد، الاچی خور دمجہ چھلکا دو عدد، سب کو بکری کے دودھ میں کھل کر کے گولیاں بنائیں اور سایہ میں خشک کر لیں، بوقت ضرورت بکری کے دودھ میں ہی گھس کر بامہنی پر لپیپ کریں۔

۲۔ سماق چھلکا ہڑ زرد ہر ایک اڑھائی تولہ، عرق گلاب تین تولہ، عرق گلاب میں رات کو بھگو کر صبح صاف کر کے اس میں صاف کپڑا تر کر کے بامہنی پر رکھیں، بہت مفید ہے۔ مازو یا گیر دھوڑے پانی میں رگڑ کر لپیپ کرنا بھی مفید ہے۔

۳۔ معز بادام کو عورت کے دودھ میں گھس کر بامہنی پر لپیپ کریں، کم خرچ اور آسان علاج ہے۔

۴۔ خوراک کی طور پر اطفال کشتیزہ ماشہ یا اطفال صغیرہ ماشہ یا مربہ ہر ایک عدد کا استعمال کرائیں۔

۵۔ چھلکا ہر زرد عرق گلاب میں گھس کر پلکوں پر لگائیں، بہت مفید ہے۔

غذا پر ہیز :- غذا زود ہضم دیں، دیر ہضم اور پیٹ میں ابھرا پیدا کرنے والی اغذیہ سے پرہیز کریں۔ آنکھوں کو صاف رکھیں، دہی، لسی، گوہی، آلو، دال ماش وغیرہ سے پرہیز کرائیں۔

گوہا بنجی۔ انجن ہاری۔ ہارڈمی اولم سٹائی (Hardiolumstye)

تعریف مرض :- آنکھ کے بالائی اور زیریں پوٹوں پر سُرخ اور خارش ہو کر دانے دانے نکل آتے ہیں۔

وجوہات :- خون کی خرابی، بد ہضمی یا آب و ہوا کی خرابی سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔ چھوٹی عمر سے لے کر بڑی عمر کے لوگوں کو ہو جاتا ہے۔

کبھی مسلسل باریک بینی سے بھی یہ تکلیف ہو جاتی ہے۔

علامات :- پلکوں کی جڑ میں پہلے خارش اور سُرخی ہوتی ہے۔ پھر وہاں پھنسی سی نکل آتی ہے۔ جو چند روز میں پھوٹ جاتی ہے، کبھی ایک یا

یکے بعد دیگرے نکلتی رہتی ہیں۔

ڈاکٹری علاج میں ابتدا میں بورک ایسڈ کو پانی میں ڈال کر ولایتی روٹی ڈال کر اس نیم گرم لوشن سے ٹکور کریں، جب گوہا بنجی پھوٹ کر پیپ بہنے

لگے تو آنکھوں کو دن میں دو بار بورک لوشن سے دھو کر صاف کرتے رہیں، پھر پنی سلین آئی آنٹی سٹینٹ پلکوں کی جڑوں (پوٹوں) پر لگائیں بورک آنٹی سٹینٹ یا

زنک آنٹی سٹینٹ یا ایکرو مائی سین آئی آنٹی سٹینٹ یا ٹیرامائی سین آئی آنٹی سٹینٹ یا ٹیرا کارل آئی آنٹی سٹینٹ لگائیں۔

اگر بار بار گوہا بنجی نکلتی ہوں تو سلفا میزاتھین یا سپٹران گولیاں خوراک کی طور پر دیں۔ پرانی تکلیف میں وٹامن اے کے مرکبات کھلانے سے عذر آرام آ جاتا ہے۔

یونانی علاج :- گوہا بنجی پر گیرو، سیندور، ہلدی، پُرانا کوئلہ، رسونت، کنوئیں کی پُرانی ٹھیکری میں سے کوئی ایک چیز باریک سفوف بنا کر لگائیں

یا چھوٹے کی گٹھلی کو عرق گلاب میں گھس کر گوہا بنجی پر لگائیں۔ مرض کی پرانی حالت میں خوراک کی طور پر گندھک شدھ یا اطفال شاہزہ یا عرق مصفی خون

اور شربت عناب کا استعمال مفید ہے، گوہا بنجی کو لگانے والی دوائیوں سے آرام نہ ہو تو پلٹس باندھیں، پک جانے پر پھنسی کو دبا کر یا چیرا دے کر پیپ

کو نکال دیں۔ اور کوئی مناسب مرہم لگاتے رہیں، آرام آ جائے گا۔

غذا پر ہیز :- ہلکی غذا، گیہوں کی روٹی، مونگ کی دال، پالک، کدو، ترٹی وغیرہ کھلائیں، گڑ، دہی، لسی، ترش اور دیر ہضم چیزوں سے پرہیز ضروری ہے۔

اشرویات۔ ڈہلکہ۔ دمخہ۔ اپنی فورا۔ (Epiphora)

تعریف مرض :- اس مرض میں آنکھ سے ہمیشہ آنسو جاری رہتے ہیں اور متعلقہ عضو کے مادف ہو جانے سے آنسو مریض کے گالوں پر گرتے ہیں۔

وجوہات :- آنکھوں کی خارش، مینائی کی کمزوری، لکڑے، آنکھوں کو صاف نہ رکھنا، بعض دفعہ دماغ کے رطوبات سے پُر ہونے سے بھی یہ

عارضہ ہو جاتا ہے۔

علاج :- اصل سبب مرض کو دور کریں۔ آنکھوں کو گرد و غبار سے بچائیں، ہاضمہ کی درستی کریں۔

ڈاکٹری علاج میں بورک لوشن یا ایلیم لوشن سے آنکھوں کو دھوئیں اور دن مائی ٹین آئی ڈراپس (Vanm:etin Eye Drops) یا پانی کلور

ڈیکسا (Pycehlor-Dexa) دو دو قطرے صبح و شام آنکھوں میں ڈالیں، زنک لوشن کا استعمال بھی مفید ہے۔

دلیسی علاج میں مندرجہ ذیل نسخوں میں سے کسی ایک کا استعمال کرائیں اور مقوی دماغی غذا دے دیں۔

۱۔ سنبل الطیب تین ماشہ، مازوتین ماشہ، سرسہ کی طرح باریک پیس کر آنکھ میں لگائیں۔

۲۔ بکائوں کے پتوں کی ٹکیہ بنا کر آنکھ پر باندھنا بہت مفید ہے۔

۳۔ سازج، مامیراں، ہرڑ زر در سب ہم وزن لے کر سرسہ کی طرح بنا کر آنکھوں میں لگائیں۔

۴۔ منڈی کے پھول دو تولہ، ہرڑ کالی ایک تولہ، دھنیاں خشک ایک تولہ، سفوف بنائیں، اور صبح و شام چھ ماشہ استعمال کریں، اطریفل کشنیز کا استعمال بھی مفید ہے۔

غذا اور پرہیز:- پاک کا ساگ، دال مونگ، ٹنڈا، کدو، توری، گاجر، مونگ سالم، شلغم وغیرہ کی سبزی دیں۔ لال مرچ، تیل کی اور ترش چیزوں سے سخت پرہیز کریں، جنسی ملاپ سے بھی پرہیز ضروری ہے۔

نظر کا اچانک جاتے رہنا۔ اندھاپن۔ ایماروسس (Amaurosis)

تعریف مرض:- اس مرض میں بینائی آہستہ آہستہ یا بالکل جاتی رہتی ہے۔

وجوہات:- سر پرچوٹ لگنا، دماغی رسولی یا پھوڑا، تشکی اُبھار یا جریان خون، خناق و بانی، سُرخ بخار، دائمی سر درد، منہا کو یا شراب نوشی، زہر سیسہ یا زہر سیلا ڈونا وغیرہ۔ عورتوں میں بندش ایام اور ایام حمل وغیرہ اس کے اسباب ہیں۔

علامات:- یہ مرض کبھی آہستہ آہستہ اور کبھی ایک دم ظاہر ہوتا ہے۔ نظر دھندلی ہو جاتی ہے۔ کبھی ایک شے آدھی نظر آتی ہے، اور کبھی ایک کی جگہ دو دکھائی دیتی ہیں، ظاہرہ آنکھ درست نظر آتی ہے، لیکن بینائی کی قوت میں فرق ہوتا ہے، اندھیرے میں مریض کو بہت مشکل ہوتی ہے اور وہ ٹول کر چلتا ہے۔

علاج:- اصل سبب مرض کو دور کریں، تمام منشی اشیاء ترک کر دیں، وجع المفاصل، زہریلے زخموں یا سیسہ کے زہر سے ہو تو پوٹاسیائیوڈائیڈ کا استعمال کریں اور جن امراض کے سبب سے یہ مرض ہو، ان کے مطابق علاج کریں۔ اگر بینائی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہو تو ضعفِ بصر کے بیان میں لکھے گئے کسی ایک کا استعمال کریں۔

اگر یہ مرض پیدائشی یا پرانا ہو تو اکثر علاج ہوتا ہے، اس لئے معالجین کو چاہیے کہ مریض کو درست مشورہ دیں اور دواؤں کے تجربے نہ کریں۔

آسان و آزمودہ مجربات برائے امراض چشم

خارش چشم:- پھلکڑی سفید بریاں سرسہ کی طرح پیس لیں اور ہلکی سلائی سے لگائیں، آنکھ کی خارش، آنکھ کے کھٹنے، پانی بہنے اور سُرخی کے لئے مفید ہے۔ یا پھلکڑی لوشن کا استعمال کریں، جس کا نسخہ اس باب کے شروع میں لکھ آئے ہیں۔

آنکھ میں کچھ پڑ جانا:- پلک کو اٹا کر دلائی روئی کو بورک لوشن سے بھگو کر اسے پھوڑ کر اسے پلکوں پر پھیر کر داخل شدہ کنکری، مٹی، مچھر وغیرہ کو نکالیں۔ اگر آنکھ میں چونا یا کوئی گرم یا تیز چیز پڑ گئی ہو آنکھ کو سرد پانی سے دھو کر کیسٹرائیل یا تلوں کے تیل کے چند قطرے دلائی کیپس کی پھیری سے لگائیں، اگر آنکھ میں چونا پڑ جائے تو خشک روئی سے پونچھ کر سرکہ انگوری کے ہلکے محلول سے آنکھ دھوئیں۔ اگر قرنبہ پر خارش آجائے تو پھولا پڑنے کا

خطرہ ہوتا ہے۔

آنکھ پر چوٹ لگنا :- شدت درد کو دور کرنے کے لئے سارڈان یا اسپرو دیس تسکین درد کے لئے بھنگ کی ٹکیہ ملدی ملا کر بنائیں، اور گائے کے گھی میں بریاں کر کے آنکھ پر باندھیں، پنی سلین گھول (پنی سلین ایک لاکھ یونٹ ڈسٹیلڈ واٹر دس سی سی) دو دو بوند ڈراپر سے ڈالیں۔ جدید ترین ادویات میں ایکرو مائی سین آئی آسٹینٹ یا ٹیرامائی سین آئی آسٹینٹ یا پنی سلین آئی آسٹینٹ کا استعمال بھی مفید ہے۔ خوردنی طور پر سٹیوٹرائیڈ کا استعمال کرائس یا بکٹریم (Bacatrim) گولیاں یا سیرپ دیں۔

زخم قرنیہ :- پنی سلین آئی آسٹینٹ دن میں تین چار بار آنکھ میں لگا کر اوپر پٹی باندھ دیں۔ زخم قرنیہ، لکڑوں اور آنکھ دکھنے کے لئے نہایت فائدہ مند ہے۔ زخمی آنکھ میں زنک لوشن، کاسک لوشن آئی ڈراپ کا استعمال کرنا سخت منع ہے۔

ناسور چشم :- شیخ بوعلی سینا اپنی تصنیف "قانون علاج" میں لکھتے ہیں۔ کہ برگ سداب اگر انار کے پانی میں پیس کر لگایا جائے۔ تو ناسور چشم کو آرام آجاتا ہے، (مگر اس کے لگانے سے سوزش پیدا ہو جاتی ہے!) (مُصَنَّف)

بڑھاپے کی کمزوری بصر :- اگر عمر چالیس سال کی ہو تو مناسب عینک لگوانے کی سفارش کریں۔

آنکھ کے تڑمرے :- تقویت دماغ کی اغذیہ وادویہ دیں۔

آنکھ کی خشکی :- رنج خشکی کے لئے آنکھ میں کیٹرائیل یا گلیسرین کے دو دو قطرے صاف روئی کی پھریری سے لگائیں۔

نظر کی تقویت کے لئے ہدایات

آنکھیں اور ان کی بینائی ایک نعمتِ عظمیٰ ہیں جس کا بدل کوئی چیز نہیں ہو سکتی، بہت سی بے احتیاطیوں کے باعث بینائی میں فرق آجاتا ہے یا بصارت جاتی رہتی ہے۔ اور اس کا کوئی علاج کارگر نہیں ہو سکتا۔ اگر حفظِ صحت کے قواعد کی پابندی کی جائے تو آنکھیں اکثر صدیوں سے محفوظ رہ سکتی ہیں۔

نظر کو طاقت دینے کے طریقے :- (۱) پاؤں کو گرم اور سر کو سرد رکھنے سے تمام جسم کی حفظِ صحت کے علاوہ قوتِ بصارت کو فائدہ ہوتا ہے۔

۲۔ فراخ میدان اور کھلی ہوا میں ہر روز معتدل ورزش کرنا نہایت مفید ہے۔

۳۔ صبح بستر سے اٹھنے کے بعد آنکھوں کو سرد پانی سے دھوئیں گرمی کے موسم میں بستر پر جانے سے پہلے آنکھوں کو ٹھنڈے پانی سے دھولیا کریں۔

۴۔ دماغ اور معدہ کی تقویت کا لحاظ رکھیں اور کمزور نہ ہونے دیں۔

۵۔ دن میں دو وقت مسواک کرتے رہیں، اس سے بصارت قوی ہوتی ہے۔

۶۔ صاف اور ٹھنڈے پانی میں غوطہ لگا کر آنکھوں کو اس میں کھلا رکھیں۔

۷۔ سبز رنگ، درختوں، سبز، ہریالی اور جاری صاف پانی کی طرف دیکھتے رہنا بالخصوص مفوی بصر ہے، دل کش مناظر اور خوبصورت چیزوں کی طرف دیکھنا

نظر کو قوی بناتا ہے۔

۸۔ ہر وقت لکھنے پڑھنے میں مصروف نہ رہیں، بلکہ کھلے میدانوں اور باغوں میں دور دور تک دیکھنے اور آنکھوں کو آزادی کا موقع دیتے رہیں، جس کے لئے

انہیں قدرت نے بنایا ہے۔

۹۔ تیل، ٹرش اشیار اور زیادہ گرم مصالحوں سے پرہیز کریں۔

۱۰۔ نہایت تیز روشنی کی طرف مت دیکھیں۔ یہ نظر کو کمزور کرتی ہے۔

۱۱۔ سرسوں کے تیل کی ماش سر میں کرنا نہایت مفید ہے، مقوی دماغ اغذیہ کا استعمال کریں۔

نظر کو بڑھانے والی ورزشیں

ورزش نمبر ۱:- اپنے سے بہت دور کسی درخت یا ٹیلے پر نظر جما کر دو چاند منٹ تک اسے دیکھتے رہو، اس کے بعد آنکھوں کو بند کرو اور کھولو، کم از کم پچاس بار کھولو اور بند کرو، پھر دو منٹ تک آنکھیں بند کر کے دوسری مشق شروع کرو۔

ورزش نمبر ۲:- سر اور گردن کو جنبش دیئے بغیر اپنی آنکھوں کو اس طرح حرکت دو، گویا تم اپنے کان کے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہو، پہلے دائیں طرف دیکھو پھر بائیں طرف۔ اس طرح دائیں اور بائیں کم سے کم ۲۵ بار دیکھو۔ ایک منٹ آنکھیں بند کر کے کھولو اور کسی درخت کو ایک منٹ تک دیکھتے رہیں پھر تیسری مشق شروع کرو۔

ورزش نمبر ۳:- سر اور گردن ہلائے بغیر اپنی آنکھوں کو حرکت دے کر آسمان کو دیکھنے کی کوشش کرو اور پھر اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو دیکھو اس طرح آسمان اور انگوٹھے کو پچیس پچیس بار دیکھو۔ اب اپنی آنکھیں خوب زور سے بھیج لو، اور ایک منٹ تک بھیجے رہو، پھر کھول کر درخت کو دیکھو۔ اب چوتھی ورزش شروع کرو۔

ورزش نمبر ۴:- سر اور گردن کو قائم کر کے اپنی آنکھوں کو اس طرح گردش دو کہ گویا تم اپنی آنکھوں سے دائرہ بنا رہے ہو۔ پہلے سیدھی جانب سے یہ دائرہ پچیس بار بناؤ۔ پھر الٹی طرف سے پچیس بار بناؤ، اس کے بعد آنکھیں بالکل بند کر کے پانچویں ورزش شروع کرو۔

ورزش نمبر ۵:- آنکھیں بالکل بند رہیں، تصویر میں ایک کالی چیز مثلاً ٹوپی لاؤ اور یہ تصور کرو، کہ یہ کالی چیز تم سے دور اور دور تر ہوتی جاتی ہے، جب یہ نظر سے اوجھل ہونے لگے تو پھر اسے رفتہ رفتہ قریب لاؤ، اور پھر اسے اپنے سے دور کرتے جاؤ، تاکہ پانچ منٹ گزر جائیں، اب آنکھیں کھولو، چند بار کھولو اور بند کرو۔

نوٹ:- یہ پانچ مشقیں ضعف بینائی کو دور کرنے اور نظر کو تیز کرنے کے لئے سودمند ہیں۔ بعض اوقات ان سے حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے اور عینک کی تکلیف چھوٹ جاتی ہے۔

نظر کو نقصان پہنچانے والے اعمال

مندرجہ ذیل باتوں سے بصارت کو نقصان پہنچتا ہے، اس لئے ان سے پرہیز واجب ہے:-

۱۔ ایک دم زیادہ دیر تک کتب بینی نہ کرو، بلکہ درمیان میں سستالو۔

۲۔ صبح اٹھتے ہی کچھ کھائے پیئے بغیر آنکھوں پر زور نہ ڈالیں۔

۳۔ جب جسم میں نقاہت ہو اور کسی مہلک بیماری سے نصیحت ہو تو ایسی صورت میں پڑھنا نہیں چاہیے۔

۴۔ باریک چھاپہ کی کتابوں کے پڑھنے سے پرہیز کریں۔

۵۔ لیٹے لیٹے پڑھنا بینائی کے لئے مضر ہے۔

۶۔ گندی اور بدبو دار جگہ میں پھرنے سے باز رہیں، شراب اور متبا کو کے پاس نہ جائیں۔

۷۔ جب آنکھوں میں کوئی بیماری ہو تو لکھنا پڑھنا ایک سخت ترک کر دیں۔

۸۔ گرد و غبار، دھوئیں، زیادہ گرم یا سرد ہوا، کثرت جماع، نشہ، پیٹ بھر کر کھانے، غلیظ اور دیرینہ نفاخ غذاؤں، زیادہ رونے، زیادہ

سونے اور تیز روشنی کی طرف نظر کرنے سے پرہیز کریں۔

۹۔ دن کے پانچ بجے کے بعد لکھنے کا کام نہ کریں۔

۱۰۔ کثرتِ قصد، بخار انگیز، زیادہ کھٹی، زیادہ نمکین غذاؤں، غلیظ گوشت، مینگن، مسور کی دال اور مچھلی کھانے سے بصارت کو نقصان پہنچتا ہے۔

۱۱۔ ملاپ کے وقت عورت کے پوشیدہ اعضاء کو دیکھنا ضعفِ بصارت کا باعث ہے۔ اس لئے اس سے سخت پرہیز ضروری ہے۔

۱۲۔ لیٹے ہوئے کتاب پڑھنا بینائی کے لئے مضر ہے۔

۱۳۔ آنکھوں کا بار بار چھپکنا اس بات کی علامت ہے کہ آنکھوں کو آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لئے آنکھوں کی تھکاوٹ دور کرنے کے واسطے پڑھنا بند کر کے ان کو آرام دیں۔

۱۴۔ آنکھوں کی معمولی شکایت مثلاً کوئی کتاب پڑھتے پڑھتے حروں کا دھندلا نظر آنا، آنکھوں میں چکا چوند پیدا ہونا وغیرہ کو بھی نظر انداز نہ کریں بسا اوقات یہ معمولی شکایتیں زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہیں۔

۱۵۔ دورانِ مطالعہ روشنی نہ ضرورت سے زیادہ ہونے لگے۔ اور وہ صحیح زاویہ کے مطابق ہم تک آسانی پہنچ سکے تاکہ آنکھوں کے نازک عضلات اور باریک ساختوں پر کم بوجھ پڑے۔

۱۶۔ کم روشنی میں کام نہ کریں، بالخصوص پڑھنے لکھنے سے پرہیز کریں۔ اگر کسی وقت کم روشنی والی جگہ پر کام کرنا پڑے تو لگاتار کام نہ کریں بلکہ ہر گھنٹے کے بعد کام کریں۔

۱۷۔ لکھنے یا پڑھنے کے وقت کا غذا یا کتاب دس بارہ اینچ سے کم فاصلہ پر نہ ہو۔

۱۸۔ مطالعہ کے وقت ایسی نشیمن اختیار نہ کریں جس میں سر بہت زیادہ جھک جائے اور آنکھوں پر بوجھ پڑے۔

۱۹۔ بچوں کو باریک حروف کی کتابیں مثلاً لغات وغیرہ نہ پڑھنے دیں۔

۲۰۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہو، انہیں باریک کام نہ سکھائیں۔

۲۱۔ آنکھیں کمزور ہوں تو مطالعہ کی کثرت نہایت مضر ہے۔

۲۲۔ آنکھوں کی کمزوری کا فوراً علاج کریں۔ اگر فائدہ نہ ہو تو چشمہ لگوا دیں۔ اس طرح آنکھیں زیادہ کمزور نہیں ہوتیں۔

۲۳۔ مصنوعی روشنی میں رنگین سطح پر کام کرنے سے آنکھوں پر بوجھ پڑتا ہے، اور وہ بہت جلد تھک جاتی ہیں۔ اس لئے رنگین سطح خصوصاً گہرے رنگ کی چیزوں پر دن کے وقت کام کریں اور نلکے رنگ کی اشیاء پر رات کے وقت کام کریں۔

۲۴۔ باریک کام رات کے وقت نہ کریں، اگر مجبوری ہو، تو وہ کام رات کے لئے منتخب کریں، جس میں آنکھوں پر کم بوجھ پڑے، مثلاً لکھنے کی نسبت پڑھنا کم مضر ہے۔

۲۵۔ مصنوعی روشنی میں کام کرنے والوں کو چاہیے کہ ایک یا دو گھنٹے کے بعد آرام کریں۔ یعنی چند منٹ کے لئے کام ترک کر دیں۔

۲۶۔ دھوپ میں بیٹھ کر باریک کام نہ کریں۔ جو اشخاص چمک دار اجسام پر کام کرتے ہیں، انہیں خاص طور پر محتاط رہنا چاہیے۔

۲۷۔ دھوپ میں رنگین عینک کا استعمال مفید ہے، لیکن اسے لگا کر باریک اشیاء کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔

۲۸۔ چھوٹے بچوں میں ہل ہل کر پڑھنے کی رسم عام ہے، لیکن اس سے آنکھوں پر بوجھ پڑتا ہے۔ اس لئے بچوں کو اس سے باز رکھنا چاہیے۔

۲۹۔ بعض طلباء گھٹے ٹیک کر سینہ کے بل لیٹ جاتے ہیں اور اس حالت میں گھنٹوں مطالعہ کرتے ہیں، اس طرح کتاب آنکھوں کے بہت قریب ہوتی ہے جس سے آنکھوں پر بوجھ پڑتا ہے اور قریب نظری کام میں صدمہ دہا جانے سے کافی مقدار میں پھیپھڑوں میں ہوا داخل نہیں ہوتی اور خون پوری طرح سے صاف نہیں ہوتا۔

۳۰۔ جو اشخاص درختوں کے نیچے بیٹھ کر پڑھتے یا باریک کام کرتے ہیں، انہیں اس جگہ بیٹھنا چاہیے۔ جہاں سایہ برابر ہو، ایسی جگہ بیٹھ کر پڑھنا جہاں دھوپ اور سایہ بلا جلا ہو۔ آنکھوں کے لئے مضر ہوتا ہے، درختوں کے نیچے ٹہلتے ہوئے پڑھنا بھی مضر ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا ہے۔

- ۳۱۔ چلتی ہوئی گاڑی میں مطالعہ کرنا مضر ہے، کیونکہ ہچکولوں سے نگاہ جم نہیں سکتی نیز روشنی بھی یکساں نہیں رہتی۔
- ۳۲۔ بعض اوقات روشنی کی کمی کو دور کرنے کے لئے دو چراغ جلائے جاتے ہیں۔ اس صورت میں دونوں کو جوڑ کر رکھنا چاہیے، اگر ایک چراغ دائیں طرف اور ایک بائیں طرف ہوگا تو روشنی یکساں طور پر پھیل نہیں سکے گی
- ۳۳۔ چراغ کا شعلہ ہمیشہ آنکھ سے چند انچ اونچا رہنا چاہیے تاکہ روشنی براہ راست آنکھوں میں داخل نہ ہو۔
- ۳۴۔ جس مقام پر روشنی دو مقابل اطراف سے داخل ہو، وہاں نظر اطمینان سے کام نہیں کر سکتی۔ اس لئے اس سے پرہیز کریں۔
- ۳۵۔ چراغ کو کتاب اور چہرے کے درمیان نہ رکھیں۔
- ۳۶۔ لکھتے وقت روشنی سامنے اور اوپر سے آنی چاہیے۔
- ۳۷۔ بے خوابی، رات کو دیر تک جاگنا، کھانا کھانے کے فوراً بعد یا کمزوری کی حالت میں آنکھوں سے کام لینا بہت مضر ہے۔
- ۳۸۔ شراب، متباکو وغیرہ منشیات کا استعمال ضرر رساں ہے۔
- ۳۹۔ پورے چاند کی طرف عرصہ تک ٹھٹھکی لگا کر نہیں دیکھنا چاہیے نیز سورج کی روشنی جو کسی سفید سطح سے منعکس ہو کر آنکھوں میں داخل ہو بہت ضرر رساں ہے۔

۴۰۔ سرمہ سیاہ کا استعمال بہت مفید ہے۔ اسے گاہے بگاہے ضرور استعمال کرتے رہیں۔

۴۱۔ جو عورتیں سحر کرنے والی آنکھوں کی خواہش مند ہیں۔ ان کو شیٹے کے ایک بڑے برتن میں سنہری مچھلی کو تیرتے ہوئے دیکھنا چاہیے۔ یہ خیال کوئی نیا نہیں ہے، کیونکہ صدیوں سے چینی عورتوں کا عقیدہ ہے کہ سنہری مچھلی کو تیرتے ہوئے دیکھنا آنکھوں کے لئے مفید ہے۔ اس سے آنکھوں کے عضلوں کی کسرت ہوتی ہے اور آنکھوں میں چمک پیدا ہوتی ہے۔


۴۲۔ دن بھر میں صرف دس منٹ آنکھوں کو بند کر کے چپ چاپ لیٹنے سے آنکھوں کو بے حد سکون محسوس ہوگا، اس کے ساتھ ہی اگر چند لمحے آپ اپنی ہتھیلیوں سے آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں کو دبائیں اور پھر انہیں دھیرے دھیرے ملیں تو یہ عمل آنکھوں کی تقویت کے لئے بے حد مفید ثابت ہوگا۔

۴۳۔ کبھی بھی اندھیرے سے نیز روشنی میں نہ آئیں بلکہ ذرا آنکھوں کو مل لیں، پھر باہر آئیں تو بہتر ہوگا۔

۴۴۔ آنکھوں پر پڑھائی کے لئے زیادہ زور نہ دیں اور جب وہ تھک جائیں اور نظر دھندلا جائے تو یہ سمجھیں کہ یہ نچر کی حفاظت خود اختیاری ہے جس کا یہ منشا ہے کہ آنکھوں کو آرام دینا چاہیے۔

۴۵۔ جب زیادہ پڑھنے سے یا سینے پر دھنسنے سے آنکھیں تھک گئی ہوں تو ان کو تازہ پانی سے دھو ڈالیں۔ اس سے نظر کو طاقت ملے گی۔

۴۶۔ ابرو یعنی بھوؤں کو آنکھ کی خوبصورتی سے خاص تعلق ہے، یہ رنج و غم کی حالت میں نیچے جھک جاتی ہیں، غصہ کی حالت میں بل پڑ جاتے ہیں، خوشی میں کھینچ جاتی ہیں۔ اگر ابرو مناسب وضع پر خم دار نہ ہوں تو انگلی سے تیل چنبیلی لگا کر مناسب وضع پر لاسکتے ہیں، اگر بال گنجان نہ ہوں اور جگہ خالی خالی ہو تو قینچی سے ذرا ذرا کنکائے کتر دیں اور رات کو ویزلین لگائیں۔



پوتھا باب

کان کی بیماریاں

کزن شول، کان کا درد، درد گوش، اوتالجیا (Otitis)

تعریف مرض :- اس مرض میں کان کے اندر شدید یا خفیف درد ہوتا ہے۔

وجوہات :- کان میں میل کچل جمع ہو جانا، سردی لگنا، خرابی دانت، پانی پڑ جانا، کان میں جھڑے پیدا ہونا، وجع المفاصل، زکام وغیرہ۔

علامات :- درد کی ٹیس کان سے چہرے اور ماتھے تک ہوتی ہیں، مریض بے چین ہوتا ہے۔

علاج :- اصل سبب مرض کو دور کریں، پہلے درد کی تسکین کے لئے ٹیکچر بیلٹ ڈونا ایک ڈرام، ٹیکچر اوپیم ایک ڈرام، گلیسرین دواؤں۔ تمام ادویات

کو ملا کر شیشی میں رکھیں اور ایک دو قطرے نیم گرم کان میں ڈالیں۔ درد کان کے لئے مفید ہے، بیرونی طور پر سینک دیں۔

ڈاکٹری علاج :- اگر ورم کی وجہ سے درد ہو تو بیرونی طور پر آئیوڈین کی ماش کر کے سینک دیں یا انٹی فلو جٹین پلاسٹر لگائیں۔ اگر ورم شدید

ہو تو ٹیرامائی سین کا ٹیکہ لگائیں۔ اور خوردنی طور پر سلفا ڈرگز یعنی سلفا ڈائزین کی ٹکیاں ہر چار گھنٹہ بعد ایک ٹکیہ دیں، اگر درد شدید ہو تو عارضی تسکین کے لئے

سارڈین، اسپرو، اناسین، کروسین، پیراٹامول، پراکسی ون وغیرہ کی گولی یا کیپ شولز کھلائیں، اگر کان میں میل جمع ہو تو پہلے کان کا ایرسکوپ سے معائنہ

کریں۔ اگر میل جمع ہو تو نیم گرم پانی میں پوٹاسیم پرمینگنیٹ مناسب مقدار میں ڈال کر پچکاری کریں، اور کان کو صاف و خشک کر کے دوائی ڈالیں، اگر

بہت سخت ہو تو پہلے گلیسرین نیم گرم ڈال کر میل کو نرم کریں۔

ماڈرن ادویات :- (۱) کوڈرال (Codral) بروز و ملیم کان کے درد کے علاوہ سب دردوں کو فوراً دور کرتی۔

ایک ٹکیہ تازہ پانی سے استعمال کریں یا پراکسی ون (Proxyvon) کیپ شولز چائے کے ساتھ دیں۔

۲۔ کوڈوپارین (گلیکسو) ایک ٹکیہ تازہ پانی سے دیں۔ حاملہ کو یہ دوا استعمال نہ کرائیں۔

۳۔ ٹیٹراسائیکلین (Tetracycline) کیپ شولز ہرچھ گھنٹہ بعد ایک دیں۔ کان کے اندرونی حصہ کی سوزش و درد کے لئے از حد مفید ہے۔

۴۔ معمولی درد و سوجن میں سیلاڈونا گلیسرین کا استعمال کریں۔

۵۔ لیڈر مائی سین (لیڈرے) ۵۰ ملی گرام، ریڈوکسان (روش) ۵۰ ملی گرام، اے۔ پی۔ سی (بوٹس) ایک ٹکیہ، تینوں کو ایک ساتھ چائے یا گرم پانی سے دن میں دوبار دیں۔ دافع جراثیم + مقوی حیات + دافع درد، کان کی سوجن، کان کے بہنے و کان کے زخم کے لئے مفید ہے۔ چیچک وغیرہ میں جب کان کے اندر سخت درد و سوجن ہوتی ہے تو یہ علاج آرام دیتا ہے۔

۶۔ اکرو مائی سین ایر ڈرائس یا سنتھو مائی ٹین ایر ڈرائس کان بہنے و کان کے زخم کے لئے بیرونی استعمال کے لئے مفید علاج ہے۔ زیادہ

سوجن میں ایٹھرو مائی سین (Erythromycin) المبیک ————— یا تھرو مائی سین (Thromycin) آئی، ڈی، پی، ایل — ۲۵۰ ملی گرام کی ایک گولی صبح و ایک گولی شام تازہ پانی سے دیں، زیادہ درد کی حالت میں نوولجین یا سبالجین یا اسپرو یا ساریڈان یا کروسین یا پیراٹامول کی ایک گولی دیں۔

یونانی علاج :- (۱)۔ تلوں کا تیل اڑھائی تولہ، کافور چھ ماشہ، انیون دو ماشہ، سب کو ملا کر رکھیں اور بوقت ضرورت دو تین بوند نیم گرم حالت میں کان میں ڈالیں، فوراً درد دور ہوگا۔

۲۔ گھی گائے ایک تولہ، کافور تین ماشہ ملا کر دھوپ میں رکھیں، اور اس میں سے دو تین قطرے نیم گرم کر کے کان میں ڈالیں۔

۳۔ مولی کا پانی پانچ تولہ، پیاز کا پانی پانچ تولہ، لہسن دو تولہ، تلوں کا تیل پانچ تولہ، آگ پر جوش دیں، جب صرف تیل رہ جائے تو چھان لیں، اور چند قطرے نیم گرم کان میں ٹپکائیں۔ فوراً آرام آجائے گا۔

۴۔ مکوہ دگودا الملتاس بھجیا سی بنا کر نیم گرم کان پر باندھیں یا بنفشہ کی ٹکڑ کر دیں۔

۵۔ بکری کی مینگیاں گرم کر کے کان پر باندھیں، درد کو فوراً تسکین دیتی ہیں۔

۶۔ ہومیو پیتھک دوا مولین آیل (Mullion-Oil) ایک یا دو قطرے در دوائے کان میں ڈالتے رہیں، بہت جلد تکلیف رفع ہو جائے گی۔ ہومیو پیتھک طریقہ علاج میں نہ صرف درد کان بلکہ بہرہ پن و کان بہنے کے لئے بھی یہ دوا مشہور ہے۔

۷۔ عورت کا دودھ کان میں ٹپکائیں یا روغن بادام تلخ کے چند قطرے نیم گرم کان میں ڈالیں۔

۸۔ سفید پیاز کا رس نکال کر کان میں ٹپکانا بھی درد کان کے لئے بہت مفید ہے۔

۹۔ کافور پڑرتی، انیون پڑرتی، تلی کا تیل دو بوند، سب کو ملا کر گرم کر کے دو تین بوند کان میں ڈالیں۔

۱۰۔ دھتورہ کے پتوں کا رس نکال کر گرم کر کے ایک دو قطرے کان میں ڈالیں۔

۱۱۔ مولی کے تازہ پتوں کا رس دس تولہ نکالیں اور پانچ تولہ تلی کے تیل میں جلا دیں، دو تین قطرے گرم کر کے کان میں ڈالیں۔

۱۲۔ لہسن بارہ گرام، تلی کا تیل ستر گرام، لہسن کو تیل میں جلا لیں، دو قطرے ہلکا گرم کر کے کان میں ڈالیں۔

آیور ویدک علاج :- اجوائن خراسانی آدھا تولہ، روغن تلی دس تولہ، کافور تین ماشہ، انیون دو ماشہ، اول تیل میں اجوائن پکا کر صاف

کریں۔ پھر کافور تین ماشہ اور انیون شامل کر کے محفوظ رکھیں۔ کان درد کے لئے بہترین دوا ہے۔ دو یا تین بوند گرم کر کے کان میں ڈالیں۔

ہنگوادی تیل :- کڑوا تیل ایک سیر، پانی چار سیر، ہنگ، تخم تیج بل (متر)، سونٹھ، ہر سہ ادویات ایک پاؤ۔ سب کو ملا کر حسب طریق تیل تیار

کریں۔ برائے درد کان پانچ دس بوند ایکٹ چمچ کے نیچے ماچس جلا کر کان میں ڈالیں۔

ہدایات :- (۱) ایسی ادویات جن میں افیون شامل ہو، صرف درد کی تسکین کے لئے استعمال کریں، ہمیشہ نہیں۔

۲۔ کان میں ہمیشہ نیم گرم دوا ڈالنی چاہیے، کیونکہ ٹھنڈی دوا سے نقصان کا احتمال ہے۔

۳۔ کان میں زیادہ سرد، گرم اور تیز دوا نہ ڈالیں۔

۴۔ اگر درد کی زیادتی کی وجہ سے تشنج کا خطرہ ہو تو کان پر سینک کریں۔

غذا و پرہیز :- بکری کا شوربہ، چپاتی، کدو، مونگ کی دال وغیرہ دیں۔ ٹھنڈی اور بھاری خوراک نہ دیں، مولی، گو بھی، آلو، ماش کی دال، اور تیز آوازوں سے پرہیز کرائیں۔

کان بہنا۔ سیلان گوش۔ اُوریا۔ (Otorrhoea)

تعریف مرض :- کان کی بیرونی نالی کی جھلی میں سوجن ہو کر پیپ آنے لگتی ہے اور متواتر کان بہنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔
وجوہات :- کان کو سردی لگنا، بد ہضمی، کان میں کوئی چیز گر جانا، بچوں میں دانت نکلنے، کان کا میلا ہونا، خرابی خون اور بعض جلدی بیماریوں کی وجہ سے یہ لاحق ہو جاتا ہے۔

علامات :- کان میں سخت سوزش ہوتی ہے، جس سے کان میں درد ہوتا ہے، بعض دفعہ درد اس قدر شدید ہوتا ہے کہ نیند نہیں آتی، اور دو تین دن کے بعد زرد رنگ کا مواد نکلنے لگتا ہے جو بعد میں پیپ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر زخم کان کے اندر دینی حصہ تک چلا جائے۔ تو دوران سر کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔

ڈاکٹری علاج :- ہائیڈروجن پراوکسائیڈ کے قطرے کان میں ڈالکر اس سے صاف کریں، پھر بورک ایسڈ کی خفیف مقدار چھڑک کر دو قطرے گلیسرین کے ڈال دیں یا بتی گلیسرین سے بھیگو کر کان میں رکھ دیں۔ ہمارے تجربات کے مطابق عام تکلیف کو دو تین روز کے اندر آرام آجاتا ہے، اگر کافی دنوں سے کان بہ رہا ہو، تو بورک ایسڈ میں ایک فیصدی آئیوڈوفارم ملا کر کان میں ڈالیں، بہت مفید ہے۔
خوراک کی طور پر سلفا ڈرگز یعنی سلفا ڈائزین وغیرہ کا استعمال بہت مفید ہے، مقدار خوراک ایک جو ان آدمی کے لئے دن میں ایک ایک یا دو دو گولی صبح، دوپہر اور شام استعمال کرائیں۔

اس سلسلہ میں پردکین پینیسلین چار لاکھ کا انجکشن ہر دوسرے دن لگانا مفید ہے۔ اکثر دو انجکشنوں سے آرام آجاتا ہے، کان بہنے اور سوزش کے لئے سٹریپٹومائی سین کا عضلاتی انجکشن بھی مفید ہے۔

ماڈرن ادویات :- (۱) آرے تال (Aurinol) مارٹن میرس — کان کے ڈراپس دو سے چار بوند دن میں تین یا چار بار کان میں ڈالیں۔

۲۔ کلورومائیٹین (Chloromycetin) پارک ڈیوس یا کیمائی ٹین (Kemicetin) کارلوار یا یا سنٹھومائی ٹین (Synthomye) — لیپٹیٹ — کان کا ڈراپس تین چار بوند دن میں تین یا چار بار ڈالنا چاہیے۔

۳۔ ٹیراکارٹیل (Teacortril) کان مریم، (فزر)، کان صاف کر کے دن میں تین سے چار بار لگانا چاہیے، لگ بھگ آدھ اپنچ مرہم ایک پھریری پر لگا کر کان کے اندر لگانا چاہیے۔

۴۔ ٹیٹراسائیکلین (Tetracyclin) ایک کیپ شولز بڑے آدمی کو ہر چھ گھنٹہ بعد کھانے کے لئے دیں۔ کان کی پیپ دسوجن کے لئے

از حد مفید ہے۔

- ۵۔ لاکیولا (Locula) ۲۰ فیصدی دو یا تین بوند دن میں تین چار بار ڈالیں۔
- ۶۔ ٹیرامائین اوٹک سولوشن (Terramycinotictolution) فزرجن تین سے چار بوند ہر تین گھنٹے بعد ڈالنا چاہیے (اس کی پکنگ میں ایک ڈائل اور ایک ایمپول ہوتا ہے۔ استعمال سے پہلے ایمپول کو ڈائل میں ملا لینا چاہیے)۔
- ۷۔ البوسید ایر ڈراپ (Albucid Ear Drop) ۲۰ فیصدی کان میں ایک دو بوند دن میں تین سے چار بار ڈالیں۔
- ۸۔ نیباسلف (Nebasulph) فزرجن کا (Ins tillation) دو دو بوند دن میں تین سے چار بار ڈالیں۔
- ۹۔ بیٹن سول ایر ڈراپس (Betnesolcardrops) گلیکو ایک دو بوند ہر تین گھنٹے بعد کان میں ڈالیں، نہایت مفید ہے یا سو فراکارٹ ایر ڈراپس (گلیکو) دو، تین بوند ڈالیں۔

۱۰۔ ایف کارا نیومائی سین ایر ڈراپس (گلیکو) دو تین بوند ڈالنا چاہیے۔

- ۱۱۔ ڈیکسونا (Dexona) یا جینیٹن (Genticyne) یا نیو سپرین۔ ایچ (Neosporin H) یا اوٹک 'اے' سی (Otek-A-c) یا ٹائیٹوسین (Tytocin) ایر ڈراپس کا استعمال کریں۔

یونانی علاج :- (۱) مناسب سفید پھٹکڑی کا سفوف ہمراہ شہد خالص ملا دیں، اور پہلے کان کو ہائیڈروجن پراؤکسائیڈ سے صاف کریں اور ممل کے صاف ٹکڑے کے قندے سے لت پت کر کے کان میں رکھیں، دن میں دو بار استعمال کافی ہے۔

۲۔ اطریش شاہترہ یا اطریش اسطندوس کا استعمال کر انیں یا عرق مصفی خون ہمراہ شربت عناب دیں۔

۳۔ افسنتین رومی آٹھ ماشہ کر دس تولہ سرکہ انگوری میں چار پہرنک بھگوئے رکھیں، پھر جوش دے کر چھان لیں اور کڑے باداموں کا تیل دس تولہ کر دو بارہ آگ پر رکھیں، جب سرکہ جل جائے اور صرف تیل باقی رہ جائے تو اتار لیں، صبح و شام دو دو قطرے نیم گرم کر کے کان میں ڈالیں، درم اور کان بہنے، کان کے زخم اور بہرہ پن کے لئے مفید ہے۔

آیور ویدک علاج بطر یونانی علاج کے کریں۔

ہومیو پیتھک علاج :- مولین آئیل کا بیرونی استعمال بہت مفید ہے۔

نوٹ :- اگر کان کے ڈھول میں سوراخ ہو تو کان میں پچکاری کرنا نقصان دہ ہے، کیونکہ اس سے پانی اندر جا کر شدید درد پیدا کر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں جب کسی چھوت دار مرض کا کان بہنے لگے تو کان کی پرپ میں اس چھوت دار مرض کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اس لئے خیال کریں کہ یہ پرپ کسی تندرست آدمی کو لگ کر اسے مرض میں مبتلا نہ کر دے۔

غذا و پرہیز :- تیل کی ترش اور گرم چیزوں سے پرہیز کریں، فدا زود صہم اور مقوی استعمال کریں۔

کان کی خارش اور پھنسیاں، ایگزیمیا آف دی ایر (Egzema of Ear)

تعریف مرض :- اس مرض میں کان کی بیرونی نالی اور اندر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں پیدا ہو کر خارش ہو جاتی ہے۔

وجوہات :- کان کو صاف نہ رکھنا، کان کا بہنا اور کان کی طرف تیز مادہ وغیرہ کا گرنا وغیرہ وغیرہ۔

علامات :- کان سے رطوبت بہتی ہے، کبھی کان کی جڑ پیٹ کر زخم بن جاتا ہے اور اس سے پرپ نکلتی ہے۔ درد کی شدت پھنسی ہونے کی

بڑی علامت ہے۔

علاج :- کان کی میل سلائی وغیرہ سے کرید کر نکالنے سے سخت پرہیز کریں، کان کو دو فیصدی نیم گرم بورک لوشن سے دھو کر خشک کر کے زنگ آکسائیڈ لگائیں اور الکوہول یا سلفا ڈائیزین کی ایک گولی صبح، دوپہر اور شام کو یعنی دن میں تین بار دیں۔

ڈاکٹری علاج :- سلفا ڈائیزین پوڈرویزلین سفید میں ملا کر کان میں لگانا مفید ہے۔ سوزش کے لئے اکیٹھول گلیسرین ہلکی طاقت کی بنا کر اس میں نصف انچ چوڑی اور تین انچ لمبی گاز کا ٹکڑا معمولی سا بھگو کر کان کے سوراخ کی نالی میں رکھ دیں اور اوپر سے سینک کریں۔ اس سے اگر سوزش کی وجہ سے کان کا سوراخ بند بھی ہو گیا ہو تو آرام آجاتا ہے۔

ماڈرن ادویات :- (۱) بورک ہنٹ گرم پانی میں بھگو کر اور پھوڑ کر کان کے اوپر تک سینک دیں۔

۲ - سٹریپٹو پی سیلین یا پروکین پی سیلین کا ہر ۴ گھنٹہ بعد عضلاتی انجکشن بلحاظ عمر و مرض کے مطابق کریں اور سلفا گروپ میں سے سلفا ڈائیزین یا الکوہول کا استعمال ہمراہ سوڈا بائیکارب کیا جائے یا سپٹران گولیوں کا استعمال کیا جائے۔

۳ - لیڈر مائی سین (لیڈرے) ۵۰ ملی گرام، ریڈوکسان (روڈش) ۵۰ ملی گرام ملے پلے اسی (بوٹس) ایک ٹیکہ، تینوں کو ایک ساتھ چائے یا گرم پاانی سے دن میں دو بار دیں، کان کے درمیانی حصے کی سوجن و کان بہنے کے لئے مفید ہے۔

۴ - آریو مائی سین (Aureomycin) ایرڈراپ۔ کان کی سوزش کے لئے دو تین بوند دن میں دو سے تین بار ڈالیں۔

۵ - ٹرائی سین (Trycin) مرک شارپ ڈوم۔ بڑوں کو ہر چھ گھنٹہ بعد ایک کیپ شولز دیں۔ کان کی سوزش کے لئے مفید ہے میٹر اسٹیکٹا ہائیڈروکلورائیڈ اس کا تجارتی نام ہے۔

۶ - سیلوپرن (Ciloprine) میلگ۔ کان میں ڈالنے کے لئے ہے، کان کے اندرونی درم اور در د کو ہٹاتی ہے۔ دو سے تین قطرے کان میں ٹپکائیں۔

۷ - ٹیٹراسائیکلین (Tetracycline) ایک کیپ شولز ہر چھ گھنٹہ بعد دیں، مرض کے کنٹرول میں آنے کے بعد ہر بارہ گھنٹے کے بعد ایک کیپ شول دیں۔ یونانی و آریو ویدک علاج :- نیم کے پتوں کے جو شانہ کے نیم گرم پانی سے دھو کر ٹکڑ کر کے سفیدہ کا شغری کا مرہم لگانا بہت مفید ہے خوراک کی طور پر شربت عذاب اور عرق مصفی خون کا استعمال یا اطریفل شاہترہ کا استعمال کرنا بہت مفید ہے، کچھ دن مرہم سفیدہ کا شغری میں ہی گندھک کی مقدار ملا کر مرہم بنا کر لگانا بہت مفید ہے۔

غذا و پرہیز :- گندم کی روٹی، مونگ کی دال، پالک کدوا، پیٹھا وغیرہ زود ہضم اغذیہ کے ساتھ دیں اور بادی و دیر ہضم تیل کی چکنی اور ترش چیزوں سے پرہیز کریں نوٹ :- کان کی شدید سوجن ادٹائی ٹس میڈیا ایکوٹ (Otitis Media Acute) میں غفلت نہ کریں، کیونکہ اس سے کان کے پردہ کے گل جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کی پھلی ہڈی میں ابھار پیدا ہو کر درم بن کر پپ پڑ جاتی ہے۔ اس لئے ایسی حالت میں مینی سلین کے انجکشن لگائے جائیں، اور اس میں کوتاہی نہ کریں، خصوصاً بچوں میں یہ مرض زیادہ دیکھا گیا ہے۔

کان کا میل، کان میں میل ہونا، وکس ان دی ایئر (wax in the ear)

تعریف مرض :- اس مرض میں کان میں میل جمع ہو جاتا ہے۔

وجوہات :- گرد و غبار کی زیادتی، کوڑے کرکٹ کا کام، کان کی صفائی کی طرف توجہ نہ دینا، کمزوری دماغ، دائمی نزلہ و زکام، خراب غذا کا استعمال وغیرہ

علامات :- یوں تو ہر آدمی کے کان میں بخوڑا بہت میل ہوتا ہے۔ لیکن اس کی زیادتی باعث مرض ہوتی ہے۔ میل کی زیادتی سے بہرہ پن کا عارضہ ہو جاتا ہے۔ اگر مریض کو دھوپ کے رخ کھڑا کر کے آلہ ایرسکوپ (کان دیکھنے کا آلہ) سے کان کو دیکھا جائے تو میل صاف نظر آتا ہے۔

علاج :- کان میں تیل یا گلیسرین نیم گرم ڈالیں، جب میل نرم ہو جائے تو نیم گرم پانی سے کان میں پچکاری کریں، پچکاری تیز تو نزل دالی نہ ہو، اور ت زور سے نہیں بلکہ آہستہ سے کی جائے۔ کیونکہ اگر تیز پچکاری کی جائے اور دھار کا رخ کان کے پردے پر ہو تو اس جھلی کے پھٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مریض کو پچکاری کرتے وقت کان کے نیچے اس کام کے لئے مخصوص ٹرے کان کے نیچے پکڑ کر رکھنا چاہیے تاکہ اس میں گندہ پانی جمع ہو سکے۔ دھونے کے لئے بھی ایک خاص پچکاری دوافروشنوں سے دستیاب ہوتی ہے جسے طبی (ڈاکٹری) زبان میں "ایئر سرخ" کہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں پچکاری بعد صاف روئی (ولایتی کاٹن) سے کانوں کو خشک کریں۔ اور گاز کا معمولی سا ٹکڑا کسی اینٹی سٹیک لوشن میں بھگو کر کان میں ڈال دیں تاکہ چھوٹ نہ سکے یا گلیسرین کے ایک دو قطرے نیم گرم کر کے کان میں ڈال دیں۔ اگر مرض کی زیادتی ہو تو پہلے ہائیڈروجن پراوکسائیڈ کی دو تین بوندیں کان میں کر میل کو نرم کر لیں اور اس کے بعد سوڈا بائی کارب لوشن (سوڈا بائی کارب ایکٹ چھ (چھوٹا)، نیم گرم پانی ایک پاؤ) سے سرخ کریں۔

آیور ویدک و یونانی علاج :- کان کی صفائی کے بعد روغن بنفشہ یا روغن گل یا روغن بادام کی ایک دو بوندیں گرم کر کے ڈالنی مفید ہیں۔ آپے کی عمر میں کان کی صفائی کا خاص دھیان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس عمر میں تمام قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ جب کہ جوانی میں یہ قوتیں تیز ہیں اور کان کی صفائی کا کام خود بخود ہوتا رہتا ہے۔ لیکن بڑھاپے میں کان کی صفائی طبعی طور پر نہیں ہو سکتی۔ اس لئے بوڑھوں کو کان صفائی کی طرف توجہ دیتے رہنا چاہیے اور کان کے اندر میل جمع نہیں ہونے دینا چاہیے۔

غذا و پرہیز :- تیل کی ترش و گرم چیزوں سے پرہیز کریں، گرد و غبار وغیرہ سے کانوں کو بچائیں۔

کان میں کچھ بڑھانا، قزئی الاذن، فارباڈی ان دی ایر

(Foreign Body in The Eir)

تعریف مرض :- اس مرض میں کان کے اندر کوئی غیر جنسی چیز داخل ہو جاتی ہے۔
وجوہات :- چھوٹے بچوں میں کھیلنے ہوئے مٹریا چنے کا دانہ، رتی، کنکر یا پنسل کا ٹکڑا پھنس جاتا ہے، کبھی کان میں کیڑا، مکوڑہ، گندم یا دانہ وغیرہ چلا جاتا ہے، جس سے شدید درد ہوتا ہے اور کبھی خون یا پیپ آنے لگتی ہے۔

علامات :- کان میں کسی غیر جنس کے داخل ہونے سے کان میں سرسراہٹ اور سننا بند ہو جاتا ہے۔ دیکھنے میں کان کے اندر کوئی آتی ہے۔ کان میں درد ہوتا ہے، اگر کان میں کیڑے ہوں تو کان سے بو آتی ہے اور کبھی کان سے کیڑے نکلتے ہیں۔

علاج :- اگر غیر جنس کان کے سوراخ کے قریب نظر آئے تو موچنے یا سلائی سے با احتیاط باہر نکال دیں، اگر درد ہو تو کان میں نیم گرم پچکاری سے وہ چیز باہر نکل آئے گی۔ اگر پھر بھی نہ نکلے تو کان میں نیم گرم گلیسرین یا سادہ تیل سرسوں کے چند قطرے ڈالیں، ایک دو دن مل آئے گی، اگر کان میں پانی چلا جائے تو خالی پچکاری سے کھینچ لیں یا روئی کی جی بنا کر پانی جذب کریں۔

اگر کوئی کیڑا مکوڑہ کان میں چلا گیا ہو تو ہائیڈروجن پراوکسائیڈ کے ایک دو قطرے ڈالنے سے فوراً ہلاک ہو جاتا ہے، بعد میں سادہ پانی آری سے اسے باہر نکال دینا چاہیے۔

یونانی و آیور ویدک علاج :- اگر مچھر وغیرہ کان میں چلا گیا ہو تو آڑ د کے پتے کچل کر رس نکال کر اور چھان کر کان میں ٹپکائیں یا کریلے

کا پانی پھوڑ کر کان میں ڈالیں یا پودینہ خشک کا جوشاندہ لے کر چھان کر اس پانی کی پچکاری کریں، کان میں پچکاری ہمیشہ ٹیڑھی کرنی چاہیے، تاکہ پانی سیدھا کان کے پردہ کو نقصان نہ پہنچا سکے، اس سلسلہ میں شہد ۹ ماشہ، شراب خالص چھ ماشہ، گل روغن چار ماشہ ہر سہ کو ملا کر ایک دو قطرے نیم گرم کان میں ڈالنے سے کان میں داخل شدہ مچھر ایک دو روز میں نکل جائے گا۔
غذا و پرہیز: عام سادہ خوراک استعمال کرائیں، کان کو کریدنے وغیرہ سے سخت پرہیز کریں۔

کَرَن نَاد، کَان بَجْنَا، وَدِی وَطَنِیس، سَنَائِی لُس (Tinnitus)

تعریف مرض :- اس مرض میں مریض کے کان بجتے ہیں اور کان کے اندر مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں۔

وجوہات :- کمی خون، جنرل کمزوری، باہمی، کان میں پرپ، رنج و غم اور کونین سلفاس وغیرہ گرم خشک ادویات کے زیادہ استعمال۔

بھی کان بجنے لگتے ہیں۔

علامات :- کان میں جیسے گرم پانی کھولتا ہے ویسے آوازیں آتی ہیں اور سننے کی طاقت میں فرق آجاتا ہے۔

علاج :- اصل سبب مرض کو معلوم کر کے دور کریں۔ اگر خشکی سے ہے تو معدہ کو لطیف غذاؤں سے طاقت دیں۔ کان میں نیم گرم روغن بادام یا گلیسرین ڈالیں، اگر کونین کے استعمال سے یہ عارضہ ہو تو اسے ترک کر دیں اور مندرجہ ذیل تجربات میں سے کسی ایک کا استعمال کرائیں۔

۱۔ شدت مرض میں پوٹاشیم برومائڈ دس گرین، ایجو ایک ادس میں حل کر کے ایسی دو خوراکیں روزانہ دن میں دو بار دیں یا کاپوز ایک گولی دیں۔

۲۔ اطریشل کشینزی ایک تولہ ہر رات سوتے وقت کھلائیں۔

۳۔ گل روغن، روغن بادام، روغن خشخاش مساوی الوزن ملا کر سر پر نیم گرم مالش کریں اور کان میں بھی ڈالیں یا لبوب سبب کی سر پر مالش کریں۔

۴۔ کمزوری کے سبب سے ہو تو ڈامن بی ۱۲ یا واٹر بریز کمپونڈ کا استعمال کریں یا الیگز وٹامن بی کمپلیکس دیں۔

۵۔ کمی خون سے یہ عارضہ ہو تو کشتہ فولاد اصلی یا شربت فولاد کا استعمال کرائیں۔

غذا و پرہیز :- آلو، گو بھی، پیاز، لہسن، بنینگن، کرلا وغیرہ نہ دیں۔ بکری کا گوشت، مونگ کی دال، کدو، ترٹی، خرفہ وغیرہ مفید ہیں۔

اور مقوی غذاؤں کا استعمال کریں۔

بَا وَصْرِیہ، اُوْچَا سُنَا، بَہْرَہ پُن، دُلف نِیس (Deafness)

تعریف مرض :- اس مرض میں مریض کو بالکل سنائی نہیں دیتا یا بالکل اُوچا سُنَا ہے۔

وجوہات :- بڑھاپا، تیز و بلند آواز، توپ کی گرج، بجلی کی کڑک، دماغی کمزوری، گلے کا ورم، عام صحتی کمزوری، کونین کا بکثرت استعمال۔

ہسٹریا، آتشک، جیمپک وغیرہ اسباب کے علاوہ تیز بخاروں میں بھی بہرہ پن پیدا ہو جاتا ہے۔

علامات :- سننے کی طاقت کم یا بالکل زائل ہو جاتی ہے، کبھی پیدائش سے بہرہ پن ہوتا ہے اور کانوں میں مختلف قسم کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔

علاج :- اصل سبب مرض کو تلاش کر کے اُسے دور کریں، اگر کان میں میل جمع ہو جانے سے یہ عارضہ ہو تو اُیرسکوپ سے کان کی

حالت دیکھ کر پچکاری کے ذریعہ مکمل خارج کر دینی چاہیے۔ اگر پیدائشی بہرہ پن ہے یا کان کا پردہ پھٹ جانے سے ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں

ہم مکینیکل اور الیکٹریکل جدید آلات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

مکینیکل آلات میں بناوٹی ٹریسٹ، آریکل اور کان کا ڈھول اور الیکٹریکل میں ایک طرف سے کھٹنے والے پردے ہوتے ہیں، بیٹری کا مصالحہ جو مارچ میں استعمال ہوتا ہے کی مدد سے چلتے ہیں۔ آریکل ایک چھوٹا سا سیدپ نما آلہ ہوتا ہے، جو آواز کی لہروں کو اکٹھا کر کے کان میں منتقل کر دیتا ہے اور بناوٹی کان کا ڈھول آئیل سلک کی چھوٹی سی تھالی ہوتی ہے، جو کہ کان کے ڈھول کے سوراخ بند کرنے کے لئے کان میں داخل کی جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں اگر ردی کا پھو یا بادام روغن یا گلیسرین یا لیکوڈ پیرافین میں بھگو کر کان میں ڈالا جائے تو بھی کام دے سکتا ہے۔ ہماری رائے میں جو لوگ کان کے درمیانی بہرہ پن میں مبتلا ہیں اور انہیں ادویات سے آرام نہیں آیا، ان الیکٹریکل ادویات سے انہیں فائدہ اٹھانا چاہیئے، ان کی قیمت بھی زیادہ نہیں ہے۔ یہ آلات منیجر سکھانیک ملٹانی دواخانہ (سر جیکل و بھاگ) پانی پت سے منگائے جاسکتے ہیں۔

آیور ویدک و یونانی علاج :- (۱) کان کی میل دور کرنے کے لئے رات کو گلیسرین یا تلوں کا تیل نیم گرم کان میں ڈالیں، صبح گرم پانی کا بھپارہ دیں اور سلائی کے ذریعہ میل نکال دیں، پھر بادام روغن ۶۰ بوند تیل تارپین ۱۰ بوند ملا کر شیشی میں رکھیں، اور ایک دو قطرے نیم گرم کان میں ڈالیں۔
۲۔ تلوں کا تیل پانچ تولہ، مولی کا پانی بیس تولہ، دھیمی آگ پر پکائیں، جب پانی جل جائے تو اس تیل کو صاف کر کے شیشی میں رکھیں اور ایک دو قطرے نیم گرم کان میں ڈالیں۔

۳۔ افسنتین رومی ایک تولہ، ہلدی، لہسن، مٹھر، قسط تلخ، مغز بادام ہر ایک دو تولہ، اجوائن، سونٹھ، ملٹھی، بورہ ارمنی، ہینگ، نمہ کا گودا، عقرقرہ ہر ایک چھ ماش، پیاز سفید دو عدد، ان دواؤں کو نیم کوب کر کے رات کو آب مرزنجوش، آب برگ کرپلا، آب مولی ہر ایک اڑھائی تولہ، سرکہ انگری پانچ تولہ میں ترکیں، صبح پندرہ تولہ تلوں کا تیل ملا کر جوش دیں، جب دوائیں جل جائیں تو چھان کر محفوظ رکھیں، صرف ایک قطرہ نیم گرم کر کے کان میں ڈالیں۔
فوائد :- کان کے کیڑوں کو مارتا ہے، سخت سوزش کے لئے مفید ہے، پھنسیوں کو دفع کرتا ہے، کان کے درد کو دور کرنے کے علاوہ بہرہ پن و مفید ہے، بشرطیکہ پیدائشی نہ ہو، درد کان کے لئے مفید ہے، نیم گرم کر کے استعمال کریں۔

۴۔ کمزوری دماغ سے یہ عارضہ ہوتا تو حریرہ مقوی دماغ کا استعمال کرنا، جنرل کمزوری کی حالت میں وٹامن کے مرکبات اور مقوی اغذیہ دیں۔
اس سلسلہ میں وٹامن اے، بی، سی، ڈی اس کے لئے خاص طور پر مفید ہیں۔ بیرونی طور پر لبوب سبوعہ کی سرپر مالش کریں۔

۵۔ پیاز کا پانی (پیاز سفید رنگ کا ہو)، پودینہ کے پتوں کا پانی، ہر ایک چار تولہ، تلوں کے تیل اڑھائی تولہ میں پکائیں، جب پانی جل جائے اور صرف تیل باقی رہ جائے تو صاف کر کے دو تین قطرے کان میں ٹپکائیں۔

ہومیوپیتھک علاج :- انڈر میل جھنے سے بہرہ پن کو نیم ۳۰ - ۲۰۰ کسی دقت دور کی آواز سے کان کھل جانا اور کم سنائی دینا، سلیشیا

۲۰۰ - ۲ کوئین کے بے جا استعمال سے بہرہ پن، پھٹ پھراہٹ کی آوازیں تو کلکیر یا کارب ۳۰ - ۲۰۰ کسی وقت تھوڑی دیر کے لئے کان بند ہو جائے تو جلیسی سیم ۳۰ - ۲۰۰ بہرہ پن میں بیرونی استعمال کے لئے مولین آئیل۔

غذا و پرہیز :- آلو، اروی، گو بھی، دال ماش اور بادامی، دیرینہ غذاؤں سے پرہیز کریں، لطیف غذائیں، چوزے یا بکری کا شوربہ، پالک، کدو، ریزہ وغیرہ استعمال کریں۔

آزمودہ و آسان مجربات برائے امراض گوش

کان کا پھوڑا :- درد و سوزش دور کرنے کے لئے سیلا ڈونا گلیسرین کا استعمال کریں اور دوسری تمام اینٹی سپٹک ادویات جو زخموں اور پھوڑوں کے لئے مفید ہیں، استعمال میں لادیں۔

کان کی سوچن :- خوراک کی طور پر سلفا مٹھا یا زول یا سلفا ڈایازین یا سپیٹران گولیاں یا شربت کا استعمال کریں، زیادہ تکلیف ہو تو مینی سلین یا ٹیرامائی سین کا ٹیکہ لگائیں۔

کان کے مٹے :- اس کا علاج بذریعہ آپریشن کامیاب ہے۔ کاٹنے کے بعد بجلی یا تیزاب سے جلا دینا چاہیے۔

کان کی پُرانی سوچن :- صاف ولایتی روئی سے کان کو خشک کریں اور سلوپرین (Ciloprine) (ساختہ میلیگ) یہ ایک پیٹنٹ دوا ہے۔ جو کان کی تمام سوزش اور التهابی بیماریوں مثلاً سوزش، ورم، پیپ بہنا، پھنسیاں نکلنے کے لئے مفید و مجرب ہے، ڈراپر سے پانچ قطرے ہر تیسرے گھنٹے کان میں ڈالیں، اوپر ولایتی روئی رکھ دیں، کان میں دوا ڈال کر مریض کو دس منٹ کروٹ کے بل تندرست کان کی طرف لٹائیں نیز کان کی التهابی بیماریوں میں ٹیرا سائیکلین وغیرہ بھی دے سکتے ہیں۔ ٹیرامائی سین کا بذریعہ انجکشن استعمال کرنا بے حد مفید و مجرب ہے۔

کان کے سوراخ کی تنگی :- یہ عارضہ کان کی اندرونی ہڈیوں کے بڑھنے سے پیدا ہو جاتا ہے، اسے بڑھنے سے روکنے کے لئے ایک سلور کی ٹیوب کان کے سوراخ کے برابر اندر داخل کی جاتی ہے۔ اس سے اکثر ہڈیوں کا بڑھاؤ روک جاتا ہے۔ زیادہ تکلیف کی صورت میں اس کا آپریشن ہی مؤثر علاج ہے۔

کان کا چنبیل :- اس کا علاج چنبیل کی مانند کریں، جس کا بیان آگے امراض جلد کے بیان میں لکھا گیا ہے۔


کان کا جریانِ خُون :- بیرونی طور پر پھینکری لوشن یا نیچر فرائی میں گاز تر کر کے رکھ دیں، اور مریض کو آرام سے لیٹے رہنے کی ہدایت کریں۔

کان میں کیڑا چلا جائے تو :- کیڑا جیسے ہی کان میں گھسٹا ہے، ویسے ہی ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ کان کن پی ٹی کو انگلی سے ہلا ہلا کر کیڑا باہر نکال دیں یا پھر کان میں انگلی ڈال کر اسے باہر نکال دیں، لیکن ایسا کبھی نہ کریں۔ کیونکہ اس طرح تو کیڑا اور اندر چلا جائے گا، اور انگلی کی پہنچ سے باہر ہو جائے گا۔ اسے پن یا تنکے کی مدد سے کرید کر باہر نکالنے کی کوشش نہ کریں۔

کیا کریں ؟ کمرے کی مٹیاں فوراً بجھا کر کان کے پاس ٹارچ جلا کر رکھ دیں اور آرام سے بیٹھ جائیں۔ کیڑا روشنی کے پاس پہنچنے کے لئے اپنے آپ باہر نکل جائے گا۔ بشرطیکہ آپ نے پہلے ہی کان کو مسل کر اسے اندر نہ دھکیل دیا ہو۔ اگر اس طرح بھی کیڑا نہ نکلے تو سرسوں کا تیل گرم کر کے چار پانچ بوند کان میں ڈالیں۔ کیڑا تیل میں اور کان میں جو مومیا تو (جڑ) ہے۔ اس میں لپٹ کر مر جائے گا۔ اسے پن یا تنکے سے کرید کر نکالنے کی کوشش نہ کریں۔

کان چھدوانا :- کان چھیدنے کی رسم اب کم ہو رہی ہے، پہلے کان کی نو کے علاوہ ساری کڑی میں دس بارہ چھید کر کے بالیاں وغیرہ لٹکائی جاتی تھیں۔ آج کل مہذب ملکوں میں صرف کان کی نو میں ایک سوراخ کر کر بندے، ٹاپس یا موتی پہنا پسند کیا جاتا ہے اور یہ مناسب بھی ہے کان ہمیشہ اس اوزار سے چھدوانا چاہیے جو خوب صاف (سٹرلائزڈ) ہونا چاہیے، ورنہ چھوت لگنے کا احتمال ہے۔ چھوت کی صورت میں بطرز زخم کان علاج کرنا چاہیے۔

کان کا خشکاف :- کوئی چور یا لیٹر اچھٹا مار کر کانوں کا زیور اتار رہا ہے تو اس حادثہ سے ایک لمبا شگاف ہو جاتا ہے اور بجائے ایک نو کے دو دو دکھائی دیتی ہیں، جس وقت کان کی نو پھٹ جائے تو فوراً کو الیفائیڈ ڈاکٹر سے سلائی کر دینا چاہیے تاکہ بد صورتی ظاہر نہ ہونے پائے، اور کھانے کے لئے انٹی بائیوٹک ادویات کا استعمال کرایا جائے۔



پانچواں باب

ناک کی بیماریاں

ناک میں کچھ پھنس جانا۔ فارن باڈی ان دی نوز

(Foreign Body in The Nose)

تعریف مرض :- اس مرض میں اکثر بچوں کی بے احتیاطی سے ناک کے اندر کوئی غیر جنس داخل ہو جاتی ہے۔
وجوہات :- چنے، سیم، مٹر، مکی کے دانے، کنکر، چھوٹے بٹن یا کوڑی وغیرہ ناک میں اکثر پھنس جاتے ہیں۔ کبھی جونک یا کیڑے بھی ناک میں چلے جاتے ہیں۔

علامات :- جس طرف کے نتھنے میں غیر جنس پھنسی ہو، اس طرف سے ناک بہتی رہتی ہے۔ ناک سے سانس مشکل سے آتا ہے، اور مریض ناک کے راستے سانس لینے میں سخت تکلیف محسوس کرتا ہے۔

علاج :- مخالف طرف کے نتھنے کو ہاتھ سے بند کر کے دوسری طرف کے نتھنے سے زور سے ناک نکلنے کے لئے ہدایت دیں یا غیر جنس کو کسی فارسیس یا موچنے سے پکڑ کر پھینچ کر نکال دیں۔ اگر غیر جنس چمٹی سے نہ نکلے تو ایک خاص قسم کے آلہ کو ناک میں داخل کر کے ناک سے نکال دیں، تندرست نتھنے میں نسوار دے کر چھینک لانے کی کوشش کریں۔ اس کے لئے نسوار درد سر (جس کا بیان درد سر میں درج ہے) کا استعمال بہت مفید ہے، صرف نمبا کو کی نسوار کو بھی استعمال میں لایا جاسکتا ہے۔ اگر ناک کے اندر کوئی جان دار چیز پڑ گئی ہو تو کلوروفارم مناسب مقدار میں سونگھا دیں، وہ چیز فوراً ہلاک ہو جائے گی یا مصبر شدہ پانی میں گھول کر یا آڑو کے پتوں کا رس نکال کر دو تین قطرے ناک میں پکھائیے۔ اس سے وہ چیز ہلاک ہو جائے گی، اس کے بعد قد سے نیم گرم پانی میں ملا کر مریض کا منہ بند کر کے نتھنے میں پچکاری کریں۔

غذا پر سہیز۔ مریض کو آرام سے لٹائیں اور زود ہضم و مقوی غذا دیں۔

ناسارکت پٹ، نکیر، رِغاف، اِپِس ٹکسِس (Epistaxis)

تعریف مرض :- اس مرض میں ناک سے خون جاری ہو جاتا ہے اور ناک کی رگیں خون سے پُر ہو جانے کے سبب پھٹ جاتی ہیں۔
وجوہات :- دماغ میں خون کا جمع ہونا، ناک یا سر پر چوٹ لگنا، کثرت خون، فساد خون، خونی یا صفراوی بخار، سانپ کا ڈسنا، حیض کی بندش، بواسیری خون کی رکاوٹ، بچوں میں پیٹ کے کپڑے، سر سام، شدید بخاروں میں بحران کے دن بھی نکیر جاری ہو جاتی ہے، علاوہ ازیں دموی مزاج لوگوں کو گرمی یا بہار کے موسم میں بھی نکیر پھوٹ پڑتی ہے۔
نوٹ :- بڑھاپے میں نکیر کا پھوٹنا نہایت خطرناک ہوتا ہے۔ اس طرح سر کے زخم و چوٹ سے نکیر کا آنا بھی

خطرہ سے خالی نہیں ہوتا۔

علامات :- کبھی ایک نکتے سے اور کبھی دونوں نکتوں سے قطرہ قطرہ یا دھار یا ندھ کر خون جاری ہو جاتا ہے، کبھی نکیر پھوٹتی رہ کر بند ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی کافی دیر تک جاری رہتی ہے، اگر مریض کمزور یا خون کی کمی کے عارضہ میں مبتلا ہو تو نکیر زیادہ آجانے سے اس کے مرجانے کا سخت خطرہ ہوتا ہے، دھوپ میں چلنے، زیادہ حقہ پینے یا چائے کا کثرت استعمال، ناک کھجانے یا زوردار سنوار لینے سے بھی نکیر پھوٹ پڑتی ہے۔

ڈاکٹری علاج :- بخار میں بحران کے دن یا کثرت خون سے نکیر جاری ہو تو یہ ایک اچھی علامت ہے، اور اسے فوراً بند نہیں کرنا چاہیے، ہاں اگر کمزوری کی علامات پیدا ہوں تو اسے فوراً بند کر دینا چاہیے۔ نکیر بند کرنے کے لئے مریض کو ہدایت کریں کہ وہ بیٹھ کر کسی قدر سر کو پیچھے جھکائے اور چند گہرے سانس اندر کھینچے، نکتوں پر دباؤ ڈالیں یا روئی وغیرہ ناک میں دے کر خون بند کرنے کی کوشش کریں۔ سر پر سرد پانی کی دھار دیں یا برف رکھیں، ذرا سی روئی کا پھایہ پھینکڑی کے سرد گھول (پیشکڑی ۵ رتی (دس گرین) پانی ایک اونس) یا ٹنگرٹیل میں تر کر کے ناک کے نکتوں میں ٹھونس دیں۔ اگر اس سے آرام نہ آئے تو ایڈرینے لین گھول (ہزار میں ایک طاقت کا گھول) لے کر اس میں روئی کا پھایہ تر کر کے مریض کے جس نکتے سے خون جاری ہو رکھ دیں یا گاز تر کر کے ناک کے اندر روئی طرف رکھی جائے، جس سے خون کا اخراج فوراً ختم ہو جائے گا۔

اس کے علاوہ خوراک کی طور پر کیلیم لیکٹیٹ بمقدار دس گرین فی خوراک دس گرین دن میں تین چار بار استعمال کرنا بہت مفید ہے یا ٹنگرٹیل دس سے پندرہ بوند ایک اونس پانی میں ملا کر پلائیں، نکیر کے علاج میں ڈامس "کے" (K) کا استعمال بہت مفید ہے۔ یہ حیاتین بہت جلد خون میں انجمادی قوت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کو ٹیکہ کے ذریعے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کے مرکب مختلف ناموں سے بازار میں ملتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ڈامس "کے" (K) کی ایک ٹیکہ صبح، دوپہر اور شام کو کھلائیں، ایک دن کے علاج سے نکیر بند ہو جاتی ہے، اگر نکیر کسی طرح بھی بند نہ ہو تو کسی ماہر ڈاکٹر سے ناک کے پچھلے حصہ میں جہاں سے خون جاری ہوتا ہے اس مقام کو ملیڈنگ پوائنٹ (Bleeding Point) کرا لینا چاہیے۔

ماڈرن ادویات :- (۱) سی بن (گلیکسو) ۱۰۰ ملی گرام، کیپی بن (گلیکسو) ۱۰۰ ملی گرام، دونوں کو ایک ساتھ تازہ پانی سے دیں، اچانک نکیر کے لئے از حد مفید ہے۔ فوراً فائدہ ہوتا ہے۔

۲ - کیپی بن (Kapelin) یہ ڈامس "کے" کا نسخہ ہے، یہ علاج کسی بھی صورت میں خون بہنے کو روکنے کے لئے مفید ہے۔ دس ملی گرام کی مقدار میں دی جاتی ہے۔

- ۲۔ کیلیم لیکٹیٹ دس گرین کی ایک گولی ہر تین گھنٹہ بعد دیں۔
- ۳۔ وٹامن سی یا ریڈوکسان (روش) ۱۰۰ ملی گرام سے ۵۰۰ ملی گرام تک روزانہ دینا ایسے تمام حالات میں مفید ہے جہاں خون کے سیلان کو درست کرنا مطلوب ہو۔ یہ علاج نکیر اور سیلان دندان میں از حد مفید ہے۔
- ۵۔ وٹامن سی کا کوئی مرکب مثلاً ریڈوکسان ۵۰۰ ملی گرام (ایمپول) دوسری سی کی مقدار میں عضلاتی انجکشن کریں۔ خون کے سیلان کو روکنے کے لئے از حد مفید ہے۔ نکیر روکنے کے لئے پیشانی، گردن اور پشت پر سرد پانی کی پٹی لگائی جائے۔
- ۶۔ کیپی لین (Kapelene) گلیکو — ایک سی سی عضلاتی یا انس میں ضرورت کے مطابق ٹیکہ دیں، کسی بھی قسم کے تیز رکت سراؤ (خون بہنے) میں مفید ہے۔
- ۷۔ سٹپٹوبیون (Steptobion) ایک ایمپولز عضلاتی یا وریدی ٹیکہ آہستہ آہستہ دیں یا ایک دو گولیاں نازہ پانی سے دن میں دو تین بار دیں۔
یونانی علاج :- (۱) کشتہ سنگ جراثحت (نیم کے پتوں میں تیار شدہ) چار سے چھ رتی تک صبح و شام مرہ آمہ میں دیں، نہایت مفید ہے۔
۲۔ کبریا شمع چار سے چھ رتی ہمراہ تازہ پانی یا شربت انجبار دیں۔ کامیاب علاج ہے۔
۳۔ کبریا، طباشیر، سنگ جراثحت ہر ایک چھ رتی باریک سفوف بنا کر مرہ آمہ میں ملا کر پہلے کھلائیں، اوپر سے لعاب ہی دانہ، شیرہ معزکد، شیرہ تخم خرفہ ہر ایک تین ماشہ، شیرہ عناب پانچ ماشہ، عرق گاؤ زبان اڑھائی تولہ میں نکال کر شربت نیلوفر دو تولہ ملا کر پلائیں۔
۴۔ گیرو دو تولہ لے کر باریک پیس کر پانی ملا کر ماتھے پر لپک کرنے سے بعض اوقات نکیر فوراً بند ہو جاتی ہے۔
۵۔ گرمی دشمنی سے ہو تو روغن کدو، روغن بادام سر پر ملنا اور ناک میں ٹپکانا کامیاب ہے۔
۶۔ تالو کے بال اُسترے سے صاف کر کے ملتان مٹی ایک تولہ، برادہ صندل سفید تین ماشہ، دھنیا خشک تین ماشہ، کافور ایک ماشہ، تمام ادویات کو پانی میں یا کسی مناسب عرق میں پیس کر تالو پر لپک کریں، اوپر کھدر کے کپڑے کی گدی بنا کر رکھ دیں اور پانی سے تر کریں، کامیاب علاج ہے۔
۷۔ صرف تخم ریحان ۹ ماشہ دودھ کی سٹی سے پھانک لیں، پرانی سے پرانی نکیر کو دو تین دن میں آرام آجاتا ہے۔
۸۔ عادت کی نکیر کے لئے ایسینول سالم ایک تولہ، شربت نیلوفر پانچ تولہ اور عرق بید مشک پانچ تولہ سے روزانہ دو ہفتہ دیں، کامیاب علاج ہے۔
۹۔ شربت بنفشہ دو تولہ، عرق گاؤ زبان پانچ تولہ میں ملا کر دیں اور دو تولہ گیرو کو پانی میں پیس کر پیشانی پر لپک کریں۔
۱۰۔ کشتہ سنگ جراح :- برگ نیم سبز ۲۵۰ گرام کے بھرتہ میں سنگ جراح ۶۰ گرام رکھ کر اور کپڑوں کی گدی کے اوپر اسے بچا کر دس کلو ایلوں کی آگ میں سرد ہونے پر نکال کر سیاہ یا مٹیائے رنگ کا نرم چمکدار کشتہ برآمد ہوگا۔
خوراک :- دورتی سے چار رتی تک، خونی نکیر، اسہال خونی، کثرت ایام میں مفید ہے۔
آپور ویدک علاج :- (۱) جڑ انجبار، مازد سبز، سنگ جراثحت، مائیں خورد، کتھ سفید، سفوف ہر ایک پانچ تولہ، گیرو اڑھائی تولہ سفوف بنا کر ملا لیں۔
دو ماشہ تازہ پانی سے دیں۔
۲۔ ستوپلا دی چورن :- مصری سولہ تولہ، طباشیر آٹھ تولہ، پہلی چار تولہ، دانہ لاکھی خورد دو تولہ، دار چینی ایک تولہ، تین ماشہ روزانہ دیں، نکیر اور کھانسی کے لئے مفید ہے۔
۳۔ سید پ بھسم :- سیپ کے ٹکڑوں کو دو چند کنوار گندل کے ٹکڑوں میں ڈھک کر گل حکمت کر کے گچ پٹ کی آگ دیں۔ پھر لعاب گھیکوار میں کھل کر کے دوبارہ آگ دیں، دو سے چار رتی صبح و شام بالائی میں دیں، نکیر کے لئے مفید ہے۔ مقوی دماغ ہے۔
۴۔ سنگ جراح بھسم :- سنگ جراح ایک پیالہ میں رکھ کر لعاب گھیکوار سے بھر کر سپرہ پلوں کی آگ دیں، اس طرح دس گھیکوار سے کھل کر کے

دوبارہ آگ دیں، بھسم تیار ہے۔ ایک ماشہ تازہ پانی سے دیں، پیشاب کی جلن دیکھ کر کے لئے مفید ہے۔
غذا و پرہیز :- غذا لطیف و جلد ہضم ہونے والی دیں، مثلاً دودھ، آتش جو، ساگودانہ، کھجڑی، کدو، پالک وغیرہ۔ گوشت، انڈہ، چائے، پیاز، گڑ،
بنگن، میٹھی، مصاحجات اور دھوپ میں چلنے پھرنے اور مکھن پڑھنے سے پرہیز کرائیں اور آرام سے لیٹنے کی ہدایت کریں۔

ناک کی دُرگندہ، ناک کی بدبو، اوزینا، (Ozena)

تعریف مرض :- اس مرض میں مریض کی ناک اور سانس سے سخت بدبو آتی ہے۔

وجوہات :- نزلہ و زکام بگڑنا، موڑھوں اور دانتوں کی غلاظت، پائیوریا، ناک پر چوٹ لگنا، ناک زخم، چھچک، خسرہ، آتشک، خنازیر، منہ یا
حلق کے چھالے، ناک میں غیر جنس کا ہونا، پھیپھڑے کا غلاف رانا کا ہونا۔

علامات :- اس مرض میں سونگھنے کی طاقت قیل ہو جاتی ہے۔ ناک سے بدبو دار رطوبت نکلتی ہے۔ جو بعض اوقات خون آمیز ہوتی ہے، گلاب
یہ رطوبت ناک کو بند کر دیتی ہے اور مریض منہ سے سانس لیتا ہے۔ کبھی رطوبت کے خشک پڑ جانے پر پھیپھڑے جم جانے سے سانس میں رکاوٹ پیدا
ہو جاتی ہے۔ مریض کے سانس سے سخت بدبو آتی ہے کہ اس کے ساتھ ٹھہرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ مرض کی بڑھی ہوئی حالت میں ناک میں کیرے پڑ جاتے
ہیں۔ اگر یہ عارضہ آتشک کی وجہ سے ہو تو ناک کی ہڈی گل کر نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ کبھی یہ مرض سالہا سال گلے کا ہار بنا رہتا ہے۔

علاج :- اصل سبب کو دور کریں۔ دن میں تین چار بار گرم پانی میں نمک ملا کر ناک کو صاف کریں یا پوٹاسیم پرمنیگنیٹ نیم گرم پانی میں ملا کر بذر
ایری گیٹر یا بلوری پچکاری سے دھوئیں (پوٹاسیم پرمنیگنیٹ دو گرین، نیم گرم پانی بارہ اونس) اور ناک میں پچکاری کرتے وقت مریض کو اپنا منہ کھلا رکھنا چاہیے
تاکہ جو پانی ناک کی راہ سے حلق میں جائے وہ منہ کے راستے نکل جائے۔ ناک صاف کرینے کے بعد گلیسرین یا دیزلین یا منتھول اور پیرافین کے گھول (دو
گرین فی اونس والا) کو ناک میں لگائیں، اس سے ناک میں چھلکا بننا بند ہو جائے گا۔ اور رطوبت خارج ہونے لگتی ہے۔ علاوہ ازیں مریض کو بہترین آب و
میں رکھیں۔ اگر مرض کا سبب آتشک ہو تو پہلے آتشک کا علاج کریں۔ اور خوراک کی طور پر پالوڈائیڈ تجویز کریں۔

جدید طریقہ علاج میں اس مرض کے لئے وٹامن اے کا استعمال نہایت مفید ہے۔ وٹامن اے کے مرکبات بازار میں دستیاب ہو سکتے ہیں، وہ استم
کرائیں یا وٹامن اے کی دو کچھ دن میں تین بار دینے سے اس مرض کو کافی فائدہ پہنچتا ہے۔ اس سلسلہ میں شارک لور آئل وغیرہ مرکبات کا استعمال بھی مفید ہے۔
مندرجہ ذیل مرکبات "ناک کی بدبو" دور کرنے کے لئے نہایت مفید ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بنا کر استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں :-
۱۔ نیم کے پتے (سایہ میں خشک شدہ) پانچ ماشہ، نو شادر تین ماشہ، اسطخودس پانچ ماشہ، گل بنفشہ پانچ ماشہ، مرزج سبیاہ تین ماشہ، کوٹ چھا
کر سفوف بنائیں اور دن میں دو تین بار بطور نسوار استعمال کریں۔

۲۔ خوراک کی طور پر اطر فیصل کشنیزی یا اطر فیصل اسطخودس یا اطر فیصل شامترہ کا استعمال کرائیں۔

۳۔ امرت دھارا، (ست اجوائن، ست پودینہ، کافور، ہموزن گھول بنالیں) ایک تولہ، روغن بادام شیریں اصلی پانچ تولہ آپس میں ملا لیں اور ایک
قطرہ صبح و شام ناک میں ڈالیں۔ یہ دوائی ناک سے بدبو آنے، نزلہ و زکام، درد کان اور درد سر کے لئے مفید ہے۔

۴۔ چوب چینی اور شبہ سفوف بنا کر ایک ماشہ کی مقدار میں کھلائیں۔

۵۔ سوہیہ کے پتے تین ماشہ، کاپا پھل تین ماشہ، جندبید ستر تین ماشہ، لونگ، ایک ماشہ، بارکب پیس کر نسوار تیار کریں اور دن میں ایک دو بار استعمال کریں۔

۶۔ تلسی کے پتوں کے رس میں قدرے نمک ملا کر ایک دو قطرے ناک میں ٹپکائیں۔

۷۔ بعد تحقیق سعد کوئی، صبر زرد، سنبل الطیب، پھول گلاب، لونگ، ہر ایک تین ماشہ، آب پودینہ سبز میں پیس کر فیلہ بنا کر یعنی بنی لت پت کر کے ناک میں رکھتے ہیں۔

۸۔ ہلدی، دار چینی، جاود تری، لونگ ہوزن پیس کر چھان لیں۔ اور شہد ہوزن ملا کر محفوظ رکھیں۔ روزانہ چار ماشہ استعمال کرائیں مفید ہے۔
غذا و پرہیز:- زود ہضم اور مقوی غذائیں، بکری اور مرغ کا شوربہ، دال ارہڑ، مونگ، چپاتی، کھجڑی، ساگو دانہ اور آتش جو وغیرہ کھلائیں، ہضم غذائیں، سردا شیر اور لہسن، پیاز، دال ماش، مینگن وغیرہ سے پرہیز کرائیں۔

ناک کے کٹاؤ، ناک کے کیڑے، دیدان الالف، ورمیز نازی (Wormesnazi)

تعریف مرض:- مریض کی ناک کی جڑ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور ناک سے پتلان خون ملا ہوا مواد نکلتا رہتا ہے۔
وجوہات:- صفائی نہ رکھنے والے اشخاص میں ناک صاف نہ رکھنے کی صورت میں ناک کے اندر کبھی بیٹھ کر اندھے سے جاتی ہے، جس سے ناک کے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ مرض موسم گرما اور موسم برسات میں ہوتا ہے، پرانے نزلہ، زکام یا آتشک کے گندے مادہ سے ناک کے زخم میں ٹرنڈ ہو کر کیڑوں کا عارضہ پیدا ہو جاتا ہے۔

علامات:- ابتداء میں مریض کے ناک سے سخت بدبو آتی ہے اور خون ملا ہوا مواد خارج ہوتا ہے، پھر کیڑے خارج ہوتے ہیں۔ آنکھوں سے پانی ہے۔ اگر توجہ سے علاج نہ کیا جائے تو کیڑے ناک کی طرف سوراخ کر کے قریب والے اعصاب کی ساختوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ کیڑے دماغ میں پہنچیں تو مریض ہلاک ہو جاتا ہے، بعض دفعہ مرض کی بڑھی ہوئی حالت میں ناک بھی بیٹھ جاتی ہے۔

علاج:- آرڈو یا نیم کے پتے پاچ توڑے لے کر ایک سیر بانی میں جوش دے کر چھان لیں، پھر اس میں تیل تارپین خالص دو تولہ ملا کر ناک میں پھکاریں۔ اس سے اپنے آپ کیڑے خارج ہونے لگتے ہیں۔ جو باقی رہ جائیں، انہیں ناک دیکھنے کے جدید آلہ سے دیکھ کر چھٹی سے پکڑ کر باہر نکال دیں۔ ایک طرف مٹی کے تیل کے ناک کے نھنوں میں ڈالنا بھی مفید ہے۔ ناک کے کیڑے مارنے اور نکالنے کے لئے پرانے جوتے کے تلے کو جلا کر اس کی دھواں لے کر دینا بھی نہایت مفید ہے، خوراک کی طور پر اٹریفل، اسٹو خودوس کا استعمال مفید ہے۔

جدید طریقہ علاج میں بھی آیل آف ٹرپن ٹائن (تارپین کا تیل) اس مرض کا موثر علاج ہے۔ پہلے ہائیڈروجن پراوکسائیڈ کے دو چار قطرے ناک کے اندر ڈال کر اس کی جھاگ کے ذریعے کیڑے باہر نکال دیں۔ بعد میں صاف کر کے تیل تارپین کے دو چار قطرے ڈرا کر سے ناک میں ڈال دیں، یہ کیڑوں مارنے، مواد خشک کرنے کے لئے تجربہ شدہ ہے۔ بعد صفائی کار بالک تیل اور کار بالک گلیسرین کا استعمال بھی مفید ہے۔

کرم ناشک نسوار:- متبا کو زردہ چھ ماشہ، نک چھپکنی چھ ماشہ، سویہ کے پتے چھ ماشہ، تنم الاچھی خورد دو ماشہ، قلمی شورہ، لونگ، جالفل، ہر دو ماشہ، کستوری خالص دورتی، پونماٹیم پر مینگنٹ، ۲ گرین (دس رتی)، سب کو پیس کر محفوظ رکھیں اور بالکل معمولی مقدار میں بطور نسوار استعمال کریں۔ ناک کے کیڑوں کو مارنے کے علاوہ نزلہ و زکام کے لئے مفید ہے۔

آیور ویدک علاج:- کھدر ارشٹ دو چھ برابر پانی ملا کر دن میں تین بار پلائیں یا سار یوادہ آسو دو چھ صبح، دو چھ دوپہر اور دو چھ شام روزانہ پانی دیں۔

لگانے کے لئے پرانے جوتے کا تلاء کر اسے جلا کر سفوف بنالیں اور بطور نسوار استعمال کریں۔

غذا و پرہیز:- زود ہضم و مقوی غذا دیں اور اس پر کبھی نہ بیٹھیں، تیل والی، ترش اور گرم چیزوں سے سخت پرہیز کرائیں۔

ناک کی بو اسیر، بو اسیر الالف، پالی پس نیزانی، (Polypusnazi)

تعریف مرض :- اس مرض میں ناک کے نختوں کے اندر سے پیدا ہو جاتے ہیں، جس سے سانس میں زبردست رکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔
وجوہات :- اس مرض میں ناک کے اندر سفید، زردی مائل پیللا یا لال رنگ کا مسہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس مرض کی تین قسمیں ہیں :-
 (۱) - سفید اور نرم مسہ جس میں درد و مواد نہیں ہوتا۔ (۲) لال رنگ کا ریشہ دار مسہ جس میں سختی و درد ہوتا ہے، (۳) سیاہی مائل مسہ جس میں سخت درد ہوتا ہے۔

علامات :- ناک کے اندر سے پیدا ہو جاتا ہے، جس سے پانی اور کبھی خون تراوش پاتا ہے۔ مریض کو اکثر زکام کی شکایت رہتی ہے، ماؤف جانب کے نختے سے سانس نہیں لیا جاسکتا۔ اگر مسہ بہت بڑھ جائے تو ناک کا نختہ ابھر کر چہرہ بد صورت ہو جاتا ہے، مریض کی آواز بدل جاتی ہے یعنی گنگنا کر بولتا ہے، اگر مسہ کا دباؤ دماغ تک جا پہنچے تو دماغی افعال میں فرق آ جاتا ہے۔

علاج :- مرض کی معمولی حالت میں صاف ولایتی روئی کی بتی بنا کر اس میں قدرے شہد لگا کر انار کی چھال کا باریک سفوف چھڑک کر ناک کے اندر رکھیں یا زنگار ایک ماش، نوشادر ایک ماش، سبکی ایک ماش باریک پیس کر کپڑے کی بتی شہد میں بھگو کر اس پر یہ دوا چھڑک کر ناک میں رکھیں، بعد تنقیہ اطریفیل اسٹنڈوس چھ ماش روزانہ کھلائیں۔

ڈاکٹری علاج :- مسہ کو نزل سکوپ سے معائنہ کر کے چمٹی (فارسس) سے پکڑ کر کھینچ لیں، اگر مسہ نرم اور پیللا ہوگا تو آسانی سے کھینچا جاسکتا ہے، لیکن سُرخ رنگ اور سخت مسہ کو اس طرح کھینچنے سے زبردست خون بہنے کا اندیشہ ہے اور ایسے مسہ کو چمٹی سے نہیں کھینچنا چاہیے بلکہ عمل جراحی سے ایک مستند ڈاکٹر بخوبی نکال سکتا ہے، مرض کی خفیف حالت میں پھٹکڑی دس گرین فی اونس پانی میں یا بورک ایڈ ۳ گرین فی اونس پانی میں گھول بنا کر ناک کے اندر بچکاری کرنا مفید ہے یا کاٹک لوشن پانچ گرین فی اونس مسہ پر لگانے سے بھی آرام ہو جاتا ہے۔

غذا و پرہیز :- بکری کا شوربا، چپاتی، کدو، تری، پالک، سبز توری، ٹنڈا وغیرہ زود سہم غذائیں دیں اور گڑ، تیل، آلو، مینگن، دال ماش وغیرہ پرہیز ضروری ہے۔

ناک کی پھنسیاں اور زخم، ثور و قرع الالف

(Postules & Ulcers of the Nose)

تعریف مرض :- ناک کی سوجن یا بوٹ میں جب پیپ پڑ جائے تو ناک میں پھنسیاں اور زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔
وجوہات :- یہ عارضہ مقامی خراش اور کبھی تیز بخاروں، نزلہ زکام اور انفلوئنزا وغیرہ سے ہو جاتا ہے۔

علامات :- ناک میں پھنسیاں پائی جاتی ہیں، ناک میں خراش ہوتی ہے، کسی قدر میس اور سُرخ بھی پائی جاتی ہے، کبھی زخموں سے کھرنڈا کرناک سے خارج ہوتے رہتے ہیں، بدبو دار زخم کی صورت میں ناک سے بو آتی ہے اور ناک سے بدبو دار رطوبت خارج ہوتی رہتی ہے۔

علاج :- زخم ناک کی صورت میں مقامی طور پر مسٹول وغیرہ استعمال کے لئے کام میں لائے جاتے ہیں، اینٹی بائیٹک اور سلفا ڈرگز کے مرہم لائے بھی مفید ہیں، اگر زخم یا سوجن شدید ہو تو بخار ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں پروکین مینی سلین کا عضلاتی انجکشن دیا جائے اور خوردنی طور پر سلفا ڈایازین یا

سیپٹران یا جیکٹیم وغیرہ کا استعمال کرایا جائے، علاوہ ازیں بورک آئنٹمنٹ یا اپنی سلین آئنٹمنٹ کا استعمال مفید ہے۔
 دوسری طریقہ علاج میں گھی خالص چھ تولہ، موم خالص دو تولہ، کافور چھ ماشہ، سفیدہ کاشغری چھ ماشہ، پہلے گھی کو گرم کر کے اس میں موم کو شامل کریں، پھر دوسری دوائیں ملا کر مرہم بنالیں اور بیرونی طور پر استعمال کریں اور عام زخموں و پھنسیوں کی طرح علاج کریں، لیکن ناک میں کوئی تیز دوائ نہ ڈالیں۔
 غذا و پرہیز:- مریض کو گرم و ترش چیزوں سے پرہیز کرائیں اور زود ہضم و مقوی غذا دیں۔

سُونگھنے کی قوت جاتی رہنا، بطلانِ اشتم خشم، انوزمیا (Anosmia)

تعریف مرض:- اس میں سُونگھنے کی طاقت ناقص و زائل ہو جاتی ہے اور مریض خوشبو اور بدبو میں تمیز نہیں کر سکتا۔
 وجوہات:- نختوں میں ورم (جو اکثر دیر تک نزلہ و زکام رہنے سے ہو جاتا ہے)، مرض سرطان، پیدائشی طور پر نختوں کا تنگ ہونا، نختوں میں زائد گوشت کا پیدا ہونا، چوٹ وغیرہ لگنے سے نختوں کا بند ہو جانا اور الفلوئیزا وغیرہ سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔
 علامات:- نختوں کا روشنی میں معاینہ کرنے سے سرطان یا زائد گوشت یا ورم وغیرہ صاف نظر آتے ہیں اور مریض خوشبودار اور بدبودار چیزوں میں تمیز کرنے سے محروم رہتا ہے۔ مریض ناک میں بولتا ہے۔

علاج:- اگر مواد کی رکاوٹ کی وجہ سے یہ مرض ہو تو بطور نسوار ناک چھکنی کا سفوف دیں۔ زائد گوشت کی وجہ سے ہو تو آپریشن ہی اس کا موثر علاج ہے۔ اگر اعصابی کمزوری سے ہو تو ڈامن اے اور ڈامن ڈی کے مرکبات دیں۔ شدھ کچلہ کا استعمال بھی بقدر مزاج و موسم نہایت مفید ہے۔
 ناک میں ڈالنے کے لئے مسٹول (Mistol) یا انڈرین (Endrin) مفید ادویات ہیں۔ انڈرین نامی پیٹنٹ دوا ایک اونس کی غبیری یا سبز رنگ کی شیشیوں میں بکتی ہے، جس کے ہمراہ ڈارپر بھی ہوتا ہے، ایک دو قطرے سر کھچلی طرف جھکا کر نختوں میں ڈالیں۔

یونانی طریقہ علاج میں بیرونی طور پر روغن چنبیلی ناک میں لگائیں اور تنقیہ دماغ اور تغذیل مزاج کا خاص خیال رکھیں اور اطریفل زبانی کو نہ بھولیں۔
 آیور ویدک طریقہ علاج میں "چون پراش" کا استعمال مفید تسلیم کیا گیا ہے۔

نوٹ:- اگر ان اعصاب کے متاثر ہونے سے یہ مرض ہو، جن میں سُونگھنے کی قوت ہے تو اس کا علاج اکثر مشکل ہوتا ہے اور اس کو ہی حقیقی مرض سمجھنا چاہیے۔

غذا و پرہیز:- ڈامن داتا اغذیہ دیں اور دیر ہضم و گرم و ترش چیزوں سے پرہیز کرائیں۔

زیادہ چھینک آنا، عطاس، سیزنگ (Sneezing)

تعریف مرض:- اس مرض میں بہت زیادہ چھینکیں آتی ہیں، جس سے ناک کی اندرونی نچلی میں خراش پیدا ہو جاتی ہے۔
 وجوہات:- زیادہ دھوپ میں چلنے، متبا کو لال مزج وغیرہ کی دھانس ناک میں چلے جانے یا گرد و غبار میں کام کرنے سے بار بار چھینکیں آتی ہیں، بعض دفعہ ناک میں نیز قسم کی رطوبت سے بھی زیادہ چھینکیں آنے لگتی ہیں۔

علامات:- گرد و غبار یا کسی تیز چیز کی معمولی دھانس بھی ناک میں چلے جانے سے بار بار چھینکیں آتی ہیں۔ جس سے مریض پریشان ہو جاتا ہے۔
 علاج:- جب ناک میں خراش ہو تو نیم گرم پانی سے دھو کر روغن گل یا روغن کدو دو تین قطرے ٹپکا دیں اور دھوپ میں چلنے سے ہونٹھٹھ سے

پانی سے غسل دیں، ناک کو صاف رکھیں، تیز چیزوں کی بوتل میں نہ جانے دیں۔ خوراک کی طور پر خمیرہ گاؤزبان یا خمیرہ خشخاش دیں، معجون برشتا دو سے چار رتی تک ہمراہ عرق گاؤزبان دینا بھی کثرت عطاس کے لئے مفید ہے، طب جدید میں وٹامن اے کے مرکبات دیئے جاتے ہیں، مندرجہ ذیل نسخہ بھی زیادہ چھینکیں آنے کو مفید ہے:-

دوائے عطاس:- ملٹھی چھلی ہوئی ایک تولہ، ریوند چینی ایک تولہ خوب باریک پیس کر پوسٹ خشخاش کے جوشاندہ میں گولیاں بقدر نسخہ بنائیں، ایک سے دو گولی تک صبح و شام دیں۔

ماڈرن ادویات:- اگر چھینکیں الرجک صورت میں ہوں تو انٹھی سان (Anthisan) سے بیکر۔ ایک گولی دن میں دو سے تین بار دیں یا ایول (Avil) مہکیٹ۔ نئی دافع حساسیت (الرجک) دوا ہے۔ ایک گولی دن میں دو سے تین بار بعد از غذا دیں یا ایناڈرل (Benadryl) یا انسٹیڈل (Incidal) یا ڈلاسین (Dilosyn) یا فورٹل (Foristal) یا فزگن (Phenergan) کا استعمال کریں۔ غذا و پیرہیز:- شوربہ، چپاتی، کدو، پالک، شلغم وغیرہ کھلائیں، گڑ، تیل، مرچ، تیز مصالحہ دار چیزوں اور دیرینہ غذا سے سخت پرہیز کریں۔

ناک کی خشکی، جفاف الانف، رائی نائیٹس سکا، (Rhinitis sicca)

تعریف:- اس مرض میں ناک خشک رہتی ہے اور ناک کی رطوبت بالکل خشک ہو جاتی ہے۔

وجوہات:- بدن میں حرارت کی زیادتی، جیسا کہ اکثر پرانے بخاروں میں ہو جاتی ہے، دماغی خشکی وغیرہ، بعض دفعہ اس قدر خشکی ہو جاتی ہے کہ خارش بھی ہونے لگتی ہے۔

علامات:- زیادہ گرمی میں محنت کا کام کرنے سے مرض میں بڑھوتری ہوگی، ناک کی رطوبت خشک اور تھوڑا سا پانی لے کر ناک میں پہنچانے سے آرام ہوگا، پیاس زیادہ لگے گی۔

علاج:- جسم میں زہری پہنچائیں اور مغز کدو، حبه ماش، مغز کاہو پانچ ماش، مغز تر بوز حبه ماش، تخم خرفہ سیاہ پانچ ماش، پانی میں پیس کر شکر ملا کر روزانہ پلائیں اور روغن گل ایک تولہ میں خفیف مقدار کا فور ملا کر دو دو بوند دو نوں نختوں میں ڈالیں، سر پر پیچ بوسجہ کی مالش کریں، اطریفل کشینزی کا استعمال بھی مفید ہے۔

جدید طریقہ علاج میں بڑے آدمی کو وٹامن اے کی اشیا، دن میں دو یا تین بار کھلائیں اور اس خوردنی علاج کے ساتھ ساتھ اگر ضرورت سمجھیں تو وٹامن اے کے ایک سی سی امپیل کا عضلاتی انجکشن کریں۔ یہ علاج ڈیڑھ دو ماہ تک جاری رکھنا ضروری ہے، خوراک میں وٹامن داتا غذا، اور دودھ، گھی، حب برداشت کھلائیں، سر پر مکھن ملنے کی ہدایت کریں۔

غذا و پیرہیز:- بھنے ہوئے چنے، لال مرچ، گرم مصالحہ اور گرم خشک چیزوں سے سخت پرہیز کریں، بینگن، پھلی، لہسن، پیاز، مسور کی دال سے پرہیز ضروری ہے، بکری کا شوربا، سالم مونگ، مونگ کی دھونی دال، کدو، ترٹی، ارہر کی دال، خرفہ، بنڈا، پالک کا ساگ وغیرہ دیں۔

زکام - زکام - کورائیسزہ - (Coryza)

نزله - نزله - کٹار - (Catarrh)

تعریف مرض:- یہ ایک چھت در مرض ہے، جس سے ناک کی اندرونی لعاب دار جھلی میں سوجن ہو جاتی ہے، ناک بہتا ہے اور سر میں درد ہوتا ہے۔

اگر رقیق مادہ ناک سے نکلے اور سوزش ہو تو زکام اور اگر مادہ حلق کی طرف یا سینہ میں گرے تو اسے نزلہ کہتے ہیں۔

وجوہات :- اس مرض کا باعث ایک خوردبینی کیڑا ہے، جس کا اصطلاحی نام مائیکروکاکس کٹائے لس یعنی جرثومہ زکام ہے، یہ مریض کی ناک کی ریزش اور منہ کے تھوک میں پایا جاتا ہے، بناوٹ میں یہ کیڑا نمونیہ کے کیڑے سے ملتا جلتا ہے۔

یہ مرض موسم کی تبدیلی کے وقت نزلہ و زکام کی شدت کے باعث ہوا کرتا ہے، بعض اوقات یہ وبائی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جسے زکام و بائی (Influenza) کہتے ہیں، جسے بخاروں کے باب میں درج کیا گیا ہے۔

ٹھنڈ لگ جانا، پانی میں بھیک جانا، ٹھنڈی ہوا میں پھرنا، سیلی زمین پر بیٹھنا، خراش دار بخارات کا ناک میں چلے جانا، یہ بھی یہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ بعض مریضوں میں یہ موردی ہوتا ہے۔

علامات :- شروع میں طبیعت سست ہوتی ہے، کام کاج میں جی نہیں لگتا، پیشانی میں جکڑن اور کنپٹی پر بوجھ معلوم ہوتا ہے، چھینکس آتی ہیں، سر میں ہلکا ہلکا درد اور ناک گھٹی ہوئی اور خشک ہوتی ہے، خراش دار مواد کے بہنے سے ناک کے تھنوں کے کنارے سرخ اور دردناک ہو جاتے ہیں، اور دکر تا ہے۔ شدید صورت میں ہوائی نالیوں میں خراش ہو کر کھانسی آنے لگتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، جس کی صورت ۱۰۱ سے ۱۰۲ درجہ تک ہوتی ہے، ناک سے نکلنے والا مواد پہلے پتلا لیکن بعد میں گاڑھا ہو جاتا ہے اور زیادہ خارج ہونے لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ناک کی پھٹی کا درم دور ہو جاتا ہے۔

علاج :- اس مرض کے علاج میں مریض کو قبض نہ ہونے دینا، سردی اور ٹھنڈے پانی سے محفوظ رکھنا اور تسکین دینے والی ادویہ کا استعمال من کو جلدی دور کر دیتا ہے۔ شروع مرض میں جب رطوبت جاری ہو چکی ہو تو اس کو غلیظ کر کے خارج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

معمولی زکام تو صرف چائے وغیرہ پینے سے دور ہو جاتا ہے یا اسپرو یا سارڈین یا اناسین یا اے پی سی کی ایک خوراک چائے کے ایک کپ سے لینے سے آرام آ جاتا ہے، اس سلسلہ میں ایمونیا کارب یا پوپلٹس آئیل کا سونگھنا بھی مفید ہے۔ ناک میں مسٹول (Mistol) یا انڈرین کے قطرے دن میں ایک دو بار ٹپکائیں، جب بار بار زکام ہو یا دیر تک ہے تو تبدیلی آب دہو ای اس کا مؤثر علاج ہے۔

جب زکام کے ساتھ بخار ہو تو یہ نسخہ بہت مفید ہے، اس سے نزلہ و زکام دور ہو کر بخار بھی دور ہو جاتا ہے۔

لائیکوار ایمونیا ایسی ٹاس ڈل دو ڈام، سپرٹ ایفیرنٹسٹراس ۲۰، وائٹم اپی کاک ۱۰، ٹنگر کیفر کو ۲۰، ایکو امفطر ایک اونس۔

ایسی ایک ایک خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دیں، کمزور مریضوں کو حسب برداشت کم مقدار میں دیں، اگر مرض میں کمی نہ ہو یا کھانسی اور بخار شدید ہو جائے یا زہر کا شبہ ہو تو فوراً سلفا ڈایازین اور مینی سلین یا سٹرپٹومیسین سے باضابطہ علاج کریں، ہٹیلے زکام میں سٹرپٹومیسین یا مینی سلین کے استعمال کو یاد رکھیں، سخت اور ہٹیلے زکام میں میرایہ آزمودہ نسخہ ہے، صرف پہلے انجکشن سے ہی بخار کم ہو جاتا ہے اور دو انجکشنوں سے مرض پر مکمل کنٹرول ہو جاتا ہے۔

در ردی علامات کھانسی اور بخار پیدا ہی نہیں ہوتیں، مینی سلین کے الرجک کا دھیان رکھیں۔

ماورن ادویات :- (۱)۔ ٹرائی سین (ایم، ایس، ڈی) ایک کیپ ٹول۔ اے پی سی ایک ٹیکہ، ریڈ وکسان ایک ٹیکہ، تینوں کو ایک ساتھ تازہ پانی سے دیں، زکام کی سرایت، درد سر اور کسل مندی کو بہت مفید ہے۔

۲۔ اکرومائی سین (لیڈرے) ایک کیپ ٹولز، پیری ٹن (گلیکو) ایک ٹیکہ، کرو سین (کروکس) ایک ٹیکہ، تینوں کو ایک ساتھ پانی سے دیں، یہ انٹی بائیوٹک + انٹی ہٹامین + دافع درد مرکب ہے، جو نزلہ کے بخار میں بھی مفید ہے۔

۳۔ ٹیرامائی سین (Terramycin) عضلاتی ٹیکہ دیں یا کیپ ٹولز ٹیرامائی سین یا ری ٹیکلین یا دیگر ٹیرامائیکیلین کیپ ٹولز کا استعمال کریں۔ ہر چار چھ گھنٹہ بعد ایک یا دو کیپ ٹولز دیں۔

۴۔ کو ساویل (Cosavil) یا کولڈرین یا ڈریٹان کا استعمال کرائیں۔

جوشاندہ نزلہ وز کام :- گل بنفشہ ایک تولہ، گاؤ زبان چھ ماشہ، عناب دس عدد، سوڑیاں ۲۲ عدد، سولف چھ ماشہ، تمام ادویات کا سفوف تیار کریں، خوراک چھ ماشہ، دس تولہ پانی میں ڈال کر دو تولہ مصری ملا کر آگ پر گرم کر کے چھان کر نیم گرم پی لیں۔ اس کی تین چار خوراک سے نزلہ وز کام کو بالکل آرام آجاتا ہے۔

دیگر :- گل بنفشہ چھ ماشہ، تخم خطمی چھ ماشہ، سوڑیاں ۱۱ دانہ، گاؤ زبان چھ ماشہ، گل نیلوفر پانچ ماشہ، اصل السوس تین ماشہ، بی دانہ تین ماشہ، سب کو پندرہ تولہ پانی میں تر کر کے صبح دو تولہ چینی ڈال کر دیں، نئے وپرانے نزلہ کے لئے نہایت مفید ہے۔

معجون دائمی نزلہ وز کام :- خشکاس پیر، چار مغز ہڑ پاؤ، الاچی خورد ڈیڑھ تولہ، طباشیر ایک تولہ، مغز سولف آدھ پاؤ، کالی مرچ ایک تولہ، مغز بادام آدھ پاؤ، چینی سب کے برابر وزن۔

خشکاس کو دودھ گائے میں بھگوئیں، صبح گھوٹ کر چھان لیں۔ اب چھینے ہوئے پانی میں چینی ملا کر قوام بنالیں۔ بعد میں خشکاس کے بھوگ کو خالص گھی گائے یا بھینس میں بھون کر شامل کریں اور دوسری ادویات بھی ملا کر معجون تیار کریں، ۹ ماشہ سے ایک تولہ تک صبح و شام دودھ گائے نیم گرم سے استعمال کریں، کمزوری دماغ کی وجہ سے دائمی نزلہ وز کام کے لئے مفید ہے۔

معجون بر شعثا :- فلفل سیاہ، بزر بلنج سفید ہر ایک ۲۰ ماشہ، افیون ۱۰ ماشہ، زعفران ۵ ماشہ، سنبل الطیب، عقرقرحہ، فریون ہر ایک ایک ماشہ، دواؤں کو علیحدہ علیحدہ کوٹ کر بعدہ ٹھیک وزن کر کے سہ چند شہد خالص میں ملا کر تین مہینے تک جو میں دفن رکھیں، بعد چار سے چھ رتی تک ہمراہ عرق گاؤ زبان استعمال کرائیں، پُرانے نزلہ اور زکام کے لئے نہایت اعلیٰ اور مفید علاج ہے۔

نرلی :- جندبیدستر، زعفران ہر ایک دو ماشہ، رب السوس، دارچینی، افیون ہر ایک چھ ماشہ، گوند کبیر، گوند کتیرا، نشاستہ ہر ایک دس ماشہ، رب کو پیس کر گولیاں بقدر کالی مرچ بنا کر دو گولیاں روزانہ استعمال کریں۔

سفوف مقوی دماغ :- گل بنفشہ دو تولہ، پھول گلاب دو تولہ، گاؤ زبان کے پتے دو تولہ، اسطخودس دو تولہ، چھلکا ہڑ زرد دو تولہ، مغز دھنیا شہد دو تولہ، مغز بادام دو تولہ، مصری پندرہ تولہ،

تمام ادویات کا سفوف تیار کریں، خوراک چھ سے نو ماشہ تک ہمراہ دودھ گائے صبح یا رات کو، دائمی نزلہ اور زکام ————— و دائمی کمزوری دماغ و سردرد کے لئے مفید ہے۔


برائے نزلہ دائمی، کشتہ مرجان ایک رتی ہمراہ خمیرہ گاؤ زبان عنبری چھ ماشہ صبح ہمار منہ اور شام چار بجے ہمراہ آب تازہ دیں، رات کو اطریفل اسطخودس ۹ ماشہ ہمراہ گرم پانی دیں۔

برائے نزلہ وز کام :- بھی دانہ تین گرام، عناب چھ عدد، سوڑیاں دس عدد، عناب اور سوڑیوں کو ۱۲۰ ملی لیٹر پانی میں جوش دیں، بھی دانہ کو ۶۰ ملی لیٹر پانی میں بھگوئیں، لعاب الگ کر کے جوشاندہ میں ملا کر شکر سے میٹھا کر لیں۔

آیور ویدک علاج بطر یونانی کے کریں۔

آج کل نزلہ وز کام اکثر بنا پستی گھی سے ہوتا ہے اس لئے اس سے پرہیز ضروری ہے، پُرانے نزلہ وز کام کے مریضوں کو ترش بالخصوص دہی، سستی اور دودھ سے پرہیز کرنا چاہیئے، مہمانہ کو درست رکھنا اور قبض نہ ہونے دینا چاہیئے، گرمیوں میں برف اور سوڈا سے سخت پرہیز اور حقہ و سگریٹ کو ترک کر دینا چاہیئے۔

ہومیو پیتھک علاج :- زکام، خشک اور سرد ہوا کا اثر، سردرد، ناک سے پانی، پیاس، بخار میں نیند نہ آنے، جسم میں درد ہو تو ایکونائٹ



چھٹا باب

مُتَّہِ زَبَانُ، خَلَقُ، دَانْتُ اور مُسَوِّرُھوں کی بیماریاں

ہونٹوں کا پھٹنا، تشنق الشقیین، کریکڈ لپس، (Crecked Lips)

تعریف مرض :- اس مرض میں ہونٹوں پر سوجن ہو کر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں اور خون نکلتا ہے۔
وجوہات :- سردی لگنا یا جسم میں دھماں اے کی کمی، جس سے جھلی نرم ہو کر پھٹ جاتی ہے۔ گرد و غبار، تیز بخاروں کے بعد ہونٹوں کا پھٹنا، ٹھنڈی جگہ سے یک بخت گرمی میں آنا۔

علامات :- عام طور پر یہ مرض سردیوں میں ہوا کرتا ہے، جبکہ سردیوں میں لکڑ (پالا) یا اولے پڑیں، تو یہ شروع ہو جاتا ہے، ہونٹ پھٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اُن سے خون بہتا ہے اور سوجن و خراش کی شدت سے خوراک کھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔

علاج :- دیسی طریقہ علاج میں بیرونی طور پر روغن بادام شیریں ہونٹوں پر لگائیں، خالص مکھن یا مکھن میں کا نور ملا کر یا روغن کدو کا لگانا بھی مفید ہے یا روغن گل میں سفید موم ملا کر لگائیں، اگر بخار کے بعد ہونٹ پھٹ جائیں یا چھائے پڑ جائیں تو خالص گھی گائے گرم کر کے مقام مرض پر لگائیں، روغن زیتون (آلو آئیل) کا ہونٹوں پر لگانا بھی مرض کو دور کرتا ہے۔

ایلو مپیتی طریقہ علاج میں اگر دٹامن کی کمی سے یہ مرض ہو تو دٹامن اے اور ڈی کے مرکبات دیں، اس سلسلہ میں کاڈیور آئیل یا ڈیکولین وغیرہ استعمال کرائیں، مرض کی شدت کی صورت میں جب کہ سبھار ساتھ ہو تو پردکین مینی سلین کا عضلاتی انجکشن اور خوراک کی طور پر سلفاڈایازین یا سپیران گولیاں یا ٹیڑا سٹیکلین دیں، ہونٹوں پر مینی سلین آسٹینٹ یا بورک آسٹینٹ لگائیں، بورک گلیسرین یا پھسٹری گلیسرین کا استعمال کریں۔

علاوہ ازیں مندرجہ ذیل پومیڈ اگر سردیوں میں استعمال کیا جائے تو ہونٹ پھٹنے سے محفوظ رہتے ہیں۔

ویزیلین پومیڈ یا زنک آکسائیڈ :- ویزیلین سفید بڑھیا دو پونڈ، زنک اوکسائیڈ (ممل کے کپڑے سے چھانا ہوا) پڑاؤنس، خوشبو گلاب (بے رنگ) چار ڈرام۔

تدکیب تیاری :- ویزیلین کو بالکل نرم کوئلوں کی آگ پر گھلائیے اور زنک اوکسائیڈ اور آغزیں خوشبو ملا کر چوڑے منہ کی شیشیوں میں بھر لیں سردیوں میں چہرہ کو ملائم رکھنے کے علاوہ پٹے ہوئے ہونٹوں، معمولی زخموں اور پھنسیوں کے لئے مفید ہے۔
غذا پر مہیز :- تیل کی ترش اور گرم چیزوں سے پر مہیز کریں۔ پالک، کدو، پیٹھا، پالک، مونگ کی دال وغیرہ زود ہضم غذا یہ استعمال کریں۔

ہونٹوں کی سوجن، ورم الشفت، انفلامیشن آف دی لپس

(Inflammation of the lips)

تعریف مرض :- ہونٹوں میں سوجن ہو جاتی ہے جس سے کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے۔

وجوہات :- مکھی یا جیونٹی کے کاٹنے سے ہونٹوں میں سوجن ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ معدہ اور امعاء کے نقائص یا جسم میں فاسد مادہ کی وجہ سے بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔

علامات :- ہونٹوں میں سوجن ہوتی ہے اور پیپ کی پٹریاں سی جم جاتی ہیں، خلط کا غلبہ، ورم کی رنگت اور دوسری علامات سے بخوبی تشخیص ہو سکتی ہے۔
علاج :- رسوت کو مکوہ کے پانی میں پیس کر لبوں پر لگائیں یا مندل مٹرخ یا مندل سفید کو عرق گلاب میں گھس کر لگائیں۔ گرم پانی سے بار بار مٹکور کرنا بھی مفید ہے۔

ڈاکٹری علاج :- بورک ایڈ لوڈر آدھا ڈرام، پانی تین ادنس میں ڈال کر اور ولایتی روٹی ڈال کر نیم گرم صورت میں ہونٹوں پر مٹکور کریں یا سردی طور پر سنچر آؤڈین لگائیں۔ اگر ورم کے ساتھ بخار بھی ہو تو سلفا گروپ میں سے سلفا ڈایازین وغیرہ دو دو گولیاں ہر تین چار گھنٹہ بعد دیں، پردکین مینی سلین کا انجکشن بھی از حد مفید ہے یا ٹیرامائی سین کیپ شولز ایک صبح اور ایک شام استعمال کریں یا ایکرومائی سین دو کیپ شولز ایک صبح اور ایک شام ہمراہ تازہ پانی دیں۔ ساتھ ہی دھامن بی کیلیکس، بیکازام سی فورٹ یا مہیسی ٹون فورٹ دیں۔

مقامی طور پر بورک گلیسرین یا آرن گلیسرین کا استعمال بہت مفید ہے۔ اگر جیونٹی کاٹنے سے ہو تو ادویہ دافع سموم ادویات جن کا بیان آگے لکھا گیا ہے کا استعمال کریں اور انٹی ہشائین ادویات بذریعہ انجکشن اور خوراکی طور پر دیں۔

غذا پر مہیز :- شوربا، چپاتی، کھجڑی، مونگ کی دال، پالک، کاساگ دیں، ترش بادامی اور دیر ہضم غذا یہ سخت پر مہیز کریں۔

ہونٹوں کے زخم، قروح الشفت، الشراف دی لپس

(Ulcer of the lips)

تعریف مرض :- اس مرض میں ہونٹوں پر زخم ہو جاتے ہیں اور مریض کو کھانے پینے میں سخت تکلیف ہوتی ہے۔

وجوہات :- اس مرض کا سبب خلط حاد کا غلبہ یا معدہ کی گرمی ہو ا کرتی ہے۔ اور عام طور پر پھنسیوں کے اندر پیپ پڑ جانے سے زخم ہو جاتے ہیں۔

علامات :- ہونٹوں پر زخم ہوتے ہیں، اگر زخم زیادہ ہوں تو ساتھ بخار بھی ہوتا ہے۔ مریض کو کھانے پینے میں سخت تکلیف ہوتی ہے۔

علاج :- اس مرض کا علاج ہونٹوں کی سوجن کی طرح ہے۔ خوراک کی طور پر سلفا ڈایازین دو عدد صبح، دوپہر اور شام کے وقت دن میں تین بار دیں، زنک آکسائیڈ لگائیں یا بورک ایسڈ، ۳ گرین، دیزلین سفید دو ڈرام مرہم بنا کر ہونٹوں پر لگائیں، اگر بنجار زیادہ ہو تو پینسیلین کے عضلاتی انجکشن دیں یا ٹیراسائیکلین کا استعمال کریں، ہونٹوں کی سوجن کے علاج میں جو ادویات لکھی گئی ہیں، اس مرض میں بھی مفید ہیں۔

ہونٹوں کا سرطان، سرطان الشفت، کینسر دی لپس

(Cancer of the lips)

تعریف مرض :- اس مرض میں تنچے کا ہونٹ موٹا ہو جاتا ہے اور ٹوٹ کی مانند سیاہ رنگ کا اُبھار پیدائے یا انگور کے دانہ کی مانند ہوتا ہے اطباء نے اس کو ہونٹوں کی بوا سیر (بواسیر الشفت) لکھا ہے، لیکن طب جدید میں اس کو ہونٹوں کے سرطان (سرطان الشفت) کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔
وجوہات :- یہ مرض زیادہ تر مردوں کو ہوتا ہے جو مٹی کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے پائپ پیٹے ہیں یا حقہ کی ٹے منہ میں لے کر پیئے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا باقاعدہ علاج نہ کیا جائے تو ہونٹ میں گانٹھیں سی پڑ جاتی ہیں اور بعض دفعہ مرض بڑھتے بڑھتے نچلے جڑے تک چلا جاتا ہے۔
علامات :- اس مرض میں ہونٹ بہت سوج جاتے ہیں اور موٹے ہو جاتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ ٹوٹ کی مانند سیاہ رنگ کا اُبھار یا دانہ انگور کی مانند اُبھار ہو کر ہونٹ کو بد صورت کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ مرض دونوں ہونٹوں پر بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کا باقاعدہ علاج نہ کیا جائے، تو ہونٹ میں گانٹھیں سی پڑ جاتی ہیں۔

علاج :- وہ تمام ادویات جو بواسیر الائف اور بواسیر المفعد میں قابل استعمال ہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں خبث الحدید، مردار رنگ سفید کا شری، پشکڑی ہر ایک تین ماشہ، موم خالص سات ماشہ، روعن بادام تین تولہ میں مرہم بنائیں اور لگائیں۔
ڈاکٹری علاج :- بورک ایسڈ، ۳ گرین، کاربالک ایسڈ دس گرین، ویزلین سفید آدھا اونس، زنک اوکسائیڈ ۳ گرین، سب کو آپس میں ملا کر مرہم بنائیں اور ہونٹوں پر لگائیں، اگر مرض زیادہ بڑھ جائے تو بذریعہ آپریشن زائد گوشت کاٹ کر حسب قاعدہ ڈرلینگ کریں۔ (یہ عمل مستند ڈاکٹر بخوبی کر سکتا ہے) اور زخموں کو اندر سے خشک کرنے کے لئے سلفا گروپ میں سے سلفا ڈایازین وغیرہ کھلائیں۔ اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو ایکس ریز سے علاج کرائیں۔
پرہیز :- تیل کی ترش اور دیرینہ چیزوں سے پرہیز کریں، غذا زود ہضم اور مقوی دیں۔

باچھوں کا پھٹنا، تشق الشدقین، تھرس، (Thrush)

تعریف مرض :- یہ ایک متعدی مرض ہے اس میں باچھیں پھٹ جاتی ہیں۔
وجوہات :- یہ ایک متعدی مرض ہے جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے، بچوں میں یہ مرض دماغی شور زلات کے باعث یا دودھ کی خرابی سے ہوتا ہے۔ جو ان مریضوں میں یہ مرض وٹامن اے اور وٹامن ڈی کی کمی سے ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اس کا سبب پائو ریا بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ مریض کے گلاس میں پانی پینے سے تندرست شخص کو بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔
علامات :- باچھوں کا رنگ سفید یا سبزی مائل ہوتا ہے، منہ کھولنے کی حالت میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ مرض کی علامات نمایاں معلوم ہوتی ہیں عام طور پر یہ زخم باچھوں میں ہوتے ہیں۔ مگر بعض مریضوں میں جب یہ مرض شدت اختیار کر لیتا ہے، تو یہ زخم زبان، حلق، مری اور معدہ تک پہنچ جاتے ہیں۔

جس سے بولنے نکلنے اور سانس لینے میں سخت رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔

علاج :- مازو ہنر ایک تولہ، سرکہ انگوری دو تولہ، پانی آٹھ اونس میں جوش دے کر غرضے کرائیں، باجھوں پر بورک آسٹینٹ لگائیں اور وہ تمام ادویات جو ہونٹوں کی سوجن میں درج کی گئی ہیں، استعمال کرائیں۔

خوراکی طور پر ڈٹامن لے اور ڈٹامن ڈی کے مرکبات دیں، اگر مریض کو ساتھ بخار ہو تو سلفا ڈایازین خوراک کی اور مینی سلین کا عضلاتی انجکشن دیں یا ٹیڑا سائیکلین کا استعمال کریں۔

غذا و پرہیز بطور ہونٹوں کی سوجن کرائیں۔

منہ کی پھنسیاں یا منہ کے چھالے، تہور دہن، (Aptndus stomatitis)

تعریف مرض :- اس مرض میں منہ کی اندر دنی جھلی سرخ ہو کر متورم ہو جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے سفید یا خاکستری رنگ کے دانے سوڑھوں زبان، لبوں اور گالوں کے اندر کی طرف پیدا ہو جاتے ہیں، یہ دانے دیکھنے میں خفیف آبلے معلوم ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے پر سخت محسوس ہوتے ہیں۔

وجوہات :- یہ مرض اکثر دودھ پینے والے بچوں کو ہوتا ہے۔ خصوصاً ان بچوں کو جنہیں ماں کا دودھ نصیب نہیں ہونا اور اوپر کا دودھ دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں اس کا باعث معدہ و آلات ہضم کی خرابی ہو کر رہتی ہے، منہ، حلق، ناک کی سوزش، سرخ بخار، طیر یا بخار، خسرہ، کھاری تیز اور چرچری چیزوں کے زیادہ استعمال سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے، پارہ، ہشنگرف، سگریٹ، متالو، لال مرچ، گرم مصالحہ، گرم گرم غذا کا کھانا بھی اس مرض کا باعث ہوتا رہتا ہے۔

علامات :- منہ میں سوزش اور درد ہوا کرتا ہے، کھانے پینے اور نکلنے میں سخت تکلیف ہوتی ہے، متوک کثرت سے آتی ہے اور منہ سے پانی بہتا ہے، زبان سرخ ہو جاتی ہے، مرض کی شدت سے گال سوج جاتے ہیں اور بخار ہو جاتا ہے۔ منہ میں چھوٹے چھوٹے زخم صاف نظر آتے ہیں بچوں سے تھے اور دست کی شکایت ہو جاتی ہے۔

علاج :- دافع تعفن، اینٹی سیپک ادویات سے غرضے یا کلیاں کرائیں۔ اس سلسلہ میں نیم گرم پانی میں ڈیڑھ ماشہ پھلکڑی سفید یا ڈیڑھ ماشہ سہاگہ (بریاں کیا ہوا) ملا کر گھول لیں اور اس گھول سے کلیاں کرائیں، مازو اور پھلکڑی بریاں ہوزن لے کر زخموں پر چھڑکیں۔

ڈاکٹری علاج میں مرض کی معمولی حالت میں بورک گلیسرین لگائیں، اگر ڈٹامن کی کمی سے یہ عارضہ ہو تو ڈٹامن دانا غذا و ادویہ دیں، اگر مرض شدید ہو اور ساتھ بخار ہو تو خوراک کی طور پر عمر کے مطابق سلفا ڈایازین دیں اور پریو کین مینی سلین کا عضلاتی انجکشن دیں یا ٹیڑا سائیکلین کا استعمال کراویں۔

مندرجہ ذیل مجربات منہ کے چھالوں کے لئے بے ضرر آسان اور آزمودہ ہیں، حسب موقع بنا کر فائدہ اٹھادیں :-

۱۔ زہر مہرہ، کباب چینی، طباشیر، کھٹہ سفید، زیرہ، گلاب، دانہ الاچی خورد، مغز کنول، ڈوڈہ ہر ایک مساوی وزن، خوب باریک پیس کر کپڑے سے چھان لیں، دن میں تین چار بار منہ میں چھڑکیں۔

۲۔ طباشیر، الاچی خورد، کباب چینی، کھٹہ سفید، سب کو سفوف بنا کر رکھیں اور بوقت ضرورت منہ میں چھڑکیں۔

۳۔ کشنیز خشک، طباشیر، نشاستہ ہوزن باریک پیس کر منہ میں چھڑکیں۔

۴۔ سہاگہ کھیل کیا ہوا شہد میں ملا کر پھیری سے لگائیں۔

۵۔ گاؤ زبان جلا کر پیس لیں اور منہ میں چھڑک دیں۔

- ۶۔ طباشیر، کھٹہ سفید، زیرہ گلاب، دانہ الائچی خورد، مغز کنول گٹھ ہر ایک تین ماشہ، سرد چینی چار رتی، سفوف بنا کر منہ میں چھڑکیں۔ مجرب ہے۔
 - ۷۔ صرف گلیسرین کی پھریری لگائیں یا مازو، پشکڑی، کھٹہ ہوزن لیکر سفوف بناویں، دن میں دو تین بار زبان پر چھڑکیں۔
 - ۸۔ گلیسرین ایک اونس، بورک الیڈ ۳۰ گرام، ہر دو کو ملا کر پھریری سے لگائیں۔
- غذا پر ہیز:- لطیف اور زود ہضم غذا دیں اور مصالحہ دار و گرم چیزوں سے سخت پرہیز کرائیں۔

بہت تھوک آنا، کثرت لعاب، ٹایالزم، (Ptyalism)

تعریف مرض:- اس مرض میں منہ کے اندر بہت زیادتی سے لعاب پیدا ہوتا ہے اور مریض بار بار تھوکتا ہے۔

وجوہات:- سوزش زبان، پارہ کے مرکبات کا زیادہ استعمال، ہونٹوں کا کینسر، منہ کے زخم، آتشکی امراض، امراض حلق، ایام حمل، خرابی معدہ خراش منہ، کن پٹا وغیرہ میں بھی تھوک کثرت سے آتی ہے، کیلول کے کھانے کے بعد اگر کوئی نمکین جلاب نہ دیا جائے تو تھوک زیادہ آتی ہے۔

علامات:- تھوک زیادہ پیدا ہونے سے مریض کو بولنے، کھانے، پینے میں سخت مشکل پیدا ہوتی ہے، مریض دُلا پتلا ہو جاتا ہے، اگر با کھانے سے تھوک آنے کی شکایت ہو تو پہلے منہ میں تانبے کی مانند کیلا ذائقہ محسوس ہوتا ہے اور پھر اوپر کے سوڑھے پھول کر درد کرنے لگتے ہیں۔ اور مرض بڑھنے کی صورت میں زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔

علاج:- اصل سبب مرض کو دور کر کے اس کا علاج کریں، پشکڑی سفید، اونس نیم گرم پانی میں ملا کر غرضے کرائیں، اگر پارہ یا پارہ۔ مرکبات کھانے سے زیادہ تھوک آئے تو میگنیشیا سلفاس، اونس ایک اونس پانی میں گھول کر پلانا مفید ہے، اگر منہ، حلق اور زبان کی سوزش کی وجہ سے ہو تو اس کے مطابق علاج کریں۔ ٹینکچر سیلا ڈونا، بوند ایک اونس پانی میں ملا کر دن میں دو بار دینا بھی مفید ہے۔ معدہ میں رطوبت کی زیاد سے یہ عارضہ ہو تو نمک خوردنی نیم گرم پانی میں گھول کر پلائیں اور قے کرائیں اور جوارش جالینوس یا جوارش مصطکی یا جوارش کمونی کا استعمال کرائیں۔ غذا پر ہیز:- زود ہضم و مقوی غذائیں دیں، دیر ہضم، تیل و ترش اور گرم چیزوں سے سخت پرہیز کریں۔

منہ سے بدبو آنا، اورل سپسز، (Oral-sepsis)

تعریف مرض:- اس مرض میں منہ سے تیز بدبو آتی ہے۔

وجوہات:- اس مرض کی سب سے بڑی وجہ ماسخورہ (پائیوریا) ہے۔ اس کے علاوہ بدہمی، دانتوں کا گندہ ہونا، مسوڑھوں، پیپ پڑ جانا، پیپٹروں کے زخم، معدہ اور رحم میں تعفن، خلطوں کا جمع ہو جانا، لہسن، پیاز، مولی اور ہنگ کے کھانے سے بھی منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔

علامات:- مریض کے منہ اور سانس سے اس قدر تیز بدبو آتی ہے کہ اس کے پاس بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے اور گندہ دہنی کے باوجود مریض دوستوں میں سخت شرمندہ ہوتا ہے۔

علاج:- مرض کے اصل سبب کو تلاش کر کے علاج کریں۔ اگر پائیوریا کی وجہ سے ہو تو اس کا علاج کریں اور اس کے لئے پائیوریا کا دیکھیں، منہ کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، ہر ایک کھانا کھانے سے پہلے ٹوٹھ پاؤ ڈریا ٹوٹھ میٹ سے دانت صاف کئے جائیں، ہائیڈروجن پراؤکسائیڈ

سے کٹی کرنا بھی مفید ہے، اس سلسلہ میں نیم کے پتے (سایہ میں خشک شدہ) دس تولہ، مرتج سیاہ بیس تولہ، نمک لاہوری چار تولہ، سب کا سفوف بنا کر رات کو دانتوں اور مسوڑھوں پر خوب ملیں، شروع شروع میں تلخی محسوس ہوگی، اس کے بعد تلخی معلوم نہیں ہوتی، منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ اگر عمدہ کی خرابی سے یہ عارضہ ہو تو معجون زنجبیل کا استعمال کرائیں۔ منہ میں لونگ یا الائچی خورد کا چبانا بھی منہ کی بدبو کے لئے مفید ہے۔

اگر ہاضمہ کی خرابی سے یہ عارضہ ہو تو یہ نسخہ بہت مفید ہے :-

نوشادر، فلفل دراز، الائچی خورد ہر ایک ایک تولہ، باریک سفوف تیار کریں اور ایک ماشہ غذا کے بعد دن میں استعمال کرائیں۔

غذا و پرہیز :- کدو، پالک، شوربہ، سالم مونگ، دال مونگ، چپاتی وغیرہ کھلائیں، دیرینہ چیزوں اور گرم چیزوں سے سخت پرہیز کرائیں۔

قوت ذائقہ کا زائل ہو جانا، اگوسیا، (Ageusia)

تعریف مرض :- اس مرض میں قوت ذائقہ کم یا بالکل زائل ہو جاتی ہے۔

وجوہات :- تمباکو، انیون، عقرقرہ، کوکین، دارچینی، لونگ وغیرہ کے زیادہ استعمال سے عارضی طور پر قوت ذائقہ میں فرق آجاتا ہے یا فالج کے سبب سے زبان بے حس ہو جاتی ہے، جس سے قوت ذائقہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔

علامات :- اس مرض میں اصل ذائقہ کے متعلق شناخت نہیں ہو سکتی اور مریض میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔

علاج :- عقرقرہ اصل باریک سفوف بنا کر زبان پر ملیں یا نوشادر بخورنا بخورنا زبان پر ملیں، عقرقرہ کو پانی میں جوش دے کر اس پانی سے کلیاں کرائیں، خوراک کی طور پر معجون زنجبیل یا مربہ ادرک استعمال کرائیں اور اصل سبب مرض کو معلوم کر کے اس کے مطابق علاج کریں۔

غذا و پرہیز :- گو بھی، مینگن، آلو، دال ماش، مسر، اروی، کچالو وغیرہ نہ دیں، غذا میں بکری یا پرندے کا گوشت گرم مصالحہ ڈال کر ہمراہ چپاتی دیں، مونگ، پودینہ اور ادرک کی چٹنی مفید ہے۔

زبان کی سوجن، ورم زبان، گلو سائٹس، (Glossitis)

تعریف مرض :- اس مرض میں زبان کو سوجن ہو جاتی ہے۔

وجوہات :- بدھنمی، غذا کا فساد، انسٹرلویں کی خرابی، تمباکو کا زیادہ استعمال، شدید بخار، چیچک، خنازیر، آتشک پاسے وغیرہ کا استعمال گرم د تیز مصالحہ دار اغذیہ کا استعمال، زبان پر زہریلے جانوروں کا کاٹنا، پان میں زیادہ چونا وغیرہ کا استعمال اس کے اسباب ہیں۔

علامات :- زبان کی سوجن صاف نظر آتی ہے، کیونکہ زبان متورم ہوتی ہے، زبان میں درد ہوتا ہے، کھانے، پینے، سانس لینے اور بات چیت کرنے میں سخت تکلیف ہوتی ہے، زیادہ تکلیف ہو تو مریض کو بخار ہو جاتا ہے، منہ سے رال نکلتی ہے، کھانا نہ کھائے جانے سے مریض دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے، کبھی زبان میں زخم ہو کر پیپ پڑ جاتی ہے۔

علاج :- اصل سبب مرض کو دور کر کے اس کا علاج کریں اور زبان کی سوجن کی سوجن کی طرح کیا جانا چاہیے، ایسی طریقہ علاج میں معزالمتاس پانچ تولہ، دودھ آدھ سیر میں جوش دے کر چھان کر اس سے کلیاں کرائیں، قبض ہو تو کیسٹرائل مین تولہ نیم گرم دودھ میں پلائیں یا کیسٹرائیل کا انیما کریں، پینکڑی، مگرین، پانی چار اونس گھول بنا کر اس سے کلیاں کریں، گلیسرین دواؤں، بورک ایسڈ .. اگرین، دونوں کو ملا کر زبان پر لگائیں۔

کمی خون کی وجہ سے ہو تو فولاد کے مرکبات دیں، وٹامن کی کمی سے ہو تو وٹامن بی کمپلیکس کا استعمال کریں، اگر بخار اور دم زیادہ ہو تو خوراک کی طور پر سلفا ڈایازین اور بنڈریج انجکشن پینی سلین یا ٹیرامائی سین کا استعمال کریں، جو ادویات ہونٹوں کی سوجن میں لکھی جا چکی ہیں۔ اس مرض میں بھی مفید ہیں۔
غذا پر مہیز: گرم و تیز مصالحہ دار چیزوں سے سخت پر مہیز کرائیں، ہلکی غذا، کھجور، بٹورہ (بجیرنگ) اور ساگودانہ وغیرہ دیں۔

زبان کا پھٹنا، شکاف زبان، فشر آف دی ٹنگ

(Fissare of the Tongue)

تعریف مرض :- اس مرض میں زبان پھٹ جاتی ہے اور دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔

وجوہات :- پانی میں زیادہ چونا کھانے، بدہضمی، تیز مصالحہ دار غذا، چٹنی،

اچار اور ترشی وغیرہ کا استعمال اور خرابی معدہ وغیرہ۔

علامات :- زبان جگہ جگہ سے پھٹ جاتی ہے جس سے کھانا کھانے، پانی پینے

اور بولنے میں سخت تکلیف پیش آتی ہے۔



آواز پیدا کرنے والی ڈوریاں



آواز پیدا کرنے کی ڈوریاں

علاج :- اصل سبب مرض کا معلوم کر کے مرض کے مطابق علاج کریں، بورک گلیسرین لگائیں یا کھانا کھانے کے بعد ۲ گریں سوڈا بائیکاربائیٹک اوٹس پانی میں ملا کر اس گھول سے کلیاں کرائیں اور پھر گھی لگائیں، وہ تمام ادویات جو ہونٹ پھٹنے و سوجن کے علاج میں لکھی گئی ہیں مفید ہیں۔ اگر زبان چوڑے سے پھٹ گئی ہے تو ناریل کا ٹکڑا چبانے سے یا گوندنی کی نرم شاخوں کو چبانے سے جلد آرام آ جاتا ہے، بکری کے دودھ یا تازہ دودھ سے کلیاں کرنا مفید ہے۔ پھٹی ہوئی زبان کے لئے بادام کی گری توڑے پر گیس کر لگانا اور منہ ڈھیل کر کے رال بہانا بھی خاص طور پر مفید ہے، بطور دوا یہ نسخہ کامیاب ہے۔

کا کر اسیٹی، دانہ الائچی خورد، لودھ گجراتی، زیرہ سفید، کات سفید، طباشیر، سنگ جراثیم، سببم وزن باریک پیس کر زبان پر لگائیں۔

نوٹ :- زبان پر سلور نائٹریٹ لوشن کبھی نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اس سے زبان کا سرطان ہو جانے کا سخت خطرہ ہوتا ہے۔

غذا پر مہیز :- پیاز، گوشت، بنگین، لہسن، کھٹی اور مصالحہ دار چیزوں سے سخت پر مہیز کریں، ٹھنڈی ترکاریاں، دودھ، ساگودانہ، کھجور، دال مونگ

وغیرہ نرم اور زود ہضم غذا دیں۔

سرطان زبان، سرطان اللسانی، کینسر آف دی ٹنگ

(Cancer of the Tongue)

تعریف مرض :- یہ ایک ایسی نامراد مرض ہے جو زبان میں پیدا ہو کر مریض کی ہلاکت کا باعث ہو جاتا کرتی ہے۔

وجوہات :- بوسیدہ دانت کی متواتر خراش، زبان پر کاشک لوشن یا کوئی اور تیز ادویہ لگانا جس سے زبان پر خراش ہو کر زخم پیدا ہو جاتا۔

اور جو رفتہ رفتہ سرطان کی شکل اختیار کر لیتا ہے، بعض دفعہ معمولی زخم کے علاج میں لاپرواہی کرنے سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- یہ مرض شروع میں چاہے کسی وجہ سے پیدا ہو، اس کا زخم ایک ہوتا ہے اور کناٹے بے قاعدہ ابھرے ہوئے ہوتے ہیں اور باہر کی طرف

ڈھٹے ہوتے ہیں، زخم سے بدبو دار اور گندہ مواد خارج ہوتا ہے، لعاب دہن زیادہ خارج ہوتا ہے، شدید درد ہوتا ہے جس سے کھانا پینا اور بولنا مشکل ہو

ہے، زخم پھیلتے پھیلتے جڑے تک پہنچ جاتا ہے، مریض خوراک نہ کھا سکنے کی وجہ سے جلد کمزور ہو جاتا ہے۔ بعض مریضوں کو خوراک ناک کے راستے سے دی جاتی ہے۔

علاج :- اینٹی سیپک ادویات سے غرارے کرائے جائیں، زبان کا بذریعہ آپریشن علاج کیا جائے، ابتدائی حالت میں ریڈیم کی شعاعوں سے اس مرض کا علاج کیا جاسکتا ہے، اس سلسلہ میں سرکار کی طرف سے پٹنہ اور بمبئی کے سرکاری ہسپتالوں میں انتظام کیا گیا ہے۔ مرض بڑھ جانے پر اکثر یہ مرض لا علاج ہی تصور کیا جاتا ہے۔

غذا و پرہیز: تیل کی اور ترش چیزوں سے سخت پرہیز کیا جائے، مریض کو سیال غذا، سنگترہ کارس وغیرہ بڑی نالی سے ناک کے راستے سے دی جائے۔

تندو، اے نیولا، (Ranula)

تعریف مرض :- زبان کے نیچے بندھن ہوتا ہے، جسے تندو کہتے ہیں۔
وجوہات :- اکثر یہ عارضہ قدرتی ہوتا ہے اور اس سے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں ہے۔
علامات :- زبان کے نیچے غدد میں رسولی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی صورت مینڈک کے سر سے ملتی جلتی ہے، اسے تندو کہتے ہیں۔
علاج :- اس کا شافی علاج عمل جراحی یعنی آپریشن ہے اور ایک ہوشیار سرجن اسے آسانی سے کاٹ کر زبان کو بندھن سے آزاد کر سکتا ہے۔

لکنت، ہکلا پن، ثقل اللسان، سٹمرنگ، (Stammering)

تعریف مرض :- مریض تسلس سے بات چیت نہیں کر سکتا اور رک رک کر یاد دہشت سے بات چیت کرتا ہے۔
وجوہات :- زبان کے نچلے بندھن کا پیدائشی طور پر نہ ہونا یا تنگ یا چھوٹا ہونا یا کسی زخم وغیرہ سے اس میں گرہ پڑ جانا، استرخا زبان، فالج، سرام، شدید دماغی اور عصبی صدمے، حقیقت میں یہ ایک ذہنی مرض ہے اور اکثر عصبی مزاج اشخاص کو ہوتا ہے۔
علامات :- انسان بات چیت میں کسی لفظ یا حرف پر رک جاتا ہے اور بہت مشکل سے اسے ادا کرتا ہے، بعض اشخاص گانے یا تقریر کرتے نہیں ہکلاتے، لیکن معمولی بات چیت میں الٹا الٹا کر بات چیت کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ گانا پھوسے کرتے وقت نہیں ہکلاتے۔
علاج :- زبان کے نیچے اگر کوئی غیر طبعی بندھن ہو تو اسے کٹوا دیں، مریض میں خود اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کریں، آرام سے اور آہستہ آہستہ بات چیت کرنے کی عادت ڈالیں، گانا یا تنہائی میں ایک قد آدم آئینے کے سامنے کسی عبارت کا بلند آواز سے بار بار پڑھنا مفید ہوتا ہے، غذا کے بعد روغن مابی دیں، عقرقر جا باریک پیس کر زبان پر ملیں اور وٹامن بی کیپلیکس دوسری سی کا انجکشن (بڑے آدمی کے لئے) ہفتہ میں دو بار لگایا جائے، وٹامن بی ۱۲ کا استعمال بھی مفید ہے یا وٹامن بی (بیرن) دیں۔ ہر روز چھ دانہ مغز بادام سردیوں میں شہد کے ساتھ اور گرمیوں میں مکھن کے ساتھ دیں یا اطر لفل اسطخدوس روزانہ چھ ماشہ کھلائیں۔

دوائے لکنت :- بطور دوا عقرقر جا چھ ماشہ، مرع سیاہ چھ ماشہ، باریک پیس کر شہد در تولہ میں ملا کر دن میں تین چار بار زبان پر ملیں۔
دیگر :- سہاگر بریاں چار رتی، شہد خالص چھ ماشہ ملا کر زبان پر ملیں یا وچ کو شہد میں ملا کر چٹائیں یہ لکنت کو دور کرتی ہے۔

دیگر :- عقرقرھا بارہ گرام، تیز پات بارہ گرام، کالی مرتج چھ گرام، باریک سفوف بنالیں، پھوڑا سفوف دن میں دو بار آہستہ آہستہ زبان پر ملیں۔
غذا و پرہیز :- پرندوں کا گوشت، اندھ، سیب، انار، مونگ کی دال، بادام کی گری، دودھ، بالائی وغیرہ دیں، آلو، برف، ماش کی دال وغیرہ
نہ دیں، اگر انیون وغیرہ کی عادت ہو تو انہیں ترک کرادیں، غصہ (کردودھ) چھوڑ دینا ہی اس مرض کے لئے کافی مفید ہے۔

زبان کا بڑا ہونا، عظم اللسان، میکرو گلوسیا، (Macro-Glossia)

تعریف مرض :- اس مرض میں زبان اپنی اصلی حالت سے بڑی ہو جاتی ہے۔

وجوہات :- یہ مرض عام طور پر پیدائشی ہوتا ہے، یعنی پیدائشی طور پر بعض بچوں کی زبان بڑی ہوتی ہے، جو منہ میں نہیں سما تی، لکنت والوں
کی زبان بھی اکثر بڑی ہوتی ہے۔

علامات :- مریض کو بولنے میں سخت دشواری ہوتی ہے، علاوہ ازیں کھانے پینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔

علاج :- اگر یہ عارضہ پیدائشی طور پر ہو تو آپریشن ہی اس کا مؤثر علاج ہے، اگر معمولی تکلیف ہو تو نوشادر بھلی اور سوئٹھ باریک پس کر سرکہ انگوری
کر زبان پر ملیں اور جو رطوبت ہے اُسے خارج کرتے رہیں، صرف نوشادر سفوف بنا کر ملنا بھی مفید ہے۔

سفوف عقرقرھا :- عقرقرھا چھ ماش، نوشادر چھ ماش، سفوف بنا کر صبح و شام زبان پر ملیں اور رطوبت باہر بہنے دیں، اس سے آرام آجائے گا۔
اگر زبان کے ڈھیلا پن (Glossopiegia) سے یہ عارضہ ہو تو استرخار کا سبب معلوم کر کے اس کے مطابق علاج کریں، لعوہ، فالج
اور کمزوری اعصاب وغیرہ کی صورت میں ہو تو ڈامن بی کپلیکس کا استعمال کرائیں۔

غذا و پرہیز :- بادی، ثقیل اور ٹھنڈی غذا ئیں نہ دیں، بکری کا گوشت گرم مصالحوہ ڈال کر دیں، مونگ کی دال، سیب، انار، انگور وغیرہ کھلائیں۔

آسان و آزمودہ مجربات برائے امراض زبان

زبان کی خارش :- بورک گلیسرین دن میں دو بار لگائیں، تر بھیلہ (ہڑ، بہڑ، آملہ) ہوزن کے جوشاندہ سے کلیاں کرائیں، قبض ہو تو
کیسٹر آیل پلائیں یا دو عدد مڑبہ ہڑ پانی سے دھو کر سمراہ دودھ نیم گرم استعمال کریں۔

زبان کی سفیدی :- سماق ایک تولہ، پھول گلاب ایک تولہ، پانی آدھ سیر میں پکا کر کلیاں کرائیں۔

زبان کا ورم :- اس کا علاج بطرز ورم ہونٹ کریں اور اصل سبب مرض کو معلوم کر کے اس کے مطابق علاج کریں۔

زبان کے جھلکے اترنا :- منہ کی سوزش کے مطابق علاج کریں۔ گلیسرین کا لگانا بہت ہی مفید ہے، ہونٹوں کے پھٹنے کے علاج میں جوشندہ
لکھ آئے ہیں، وہ اس مرض میں بھی مفید ہیں۔

زبان کا بندر ہنا :- اس مرض میں زبان کا لحام (سچے کا پردہ) کافی چھوٹا ہوتا ہے، اس کا علاج عمل جراحی سے ممکن ہے، گول نوک والی
اور صاف تیغی سے پھوڑا سا لحام کو کاٹ کر زبان کو علیحدہ کیا جاتا ہے۔ یہ عمل ایک مستند ڈاکٹر بخوبی انجام دے سکتا ہے۔

زبان کے زخم :- ڈامن کی کمی سے یہ عارضہ ہو تو ڈامن بی کپلیکس کا استعمال کریں۔ اگر سوجن زیادہ ہو تو خوراک کی طور پر سپرٹان گولیاں یا ٹیبلٹ
سائیکلین کا استعمال کریں۔ بیرونی امرد کے پتے تازہ دس گرام کو ۱۰۰ گرام پانی میں جوش دے کر چھان کر دن میں دو بار کلیاں کریں۔


اور بورک گلیسرین زخموں پر لگائیں۔

دانتوں کی بیماریاں

درد دانت، وجع الاسنان، لوتھیک، (Toothache)

تعریف مرض :- دانتوں یا ان کی جڑوں میں دورہ سے درد ہوتا ہے۔

وجوہات :- دانت کا خراب اور گلا ہوا ہونا، کثیر لگنا، دانت کی جڑ میں سوجن یا ورم ہونا، منہ کی صفائی نہ رکھنا، دانتوں پر چوٹ لگنا، ترش یا میٹھی چیزوں کی بکثرت استعمال، پارہ وغیرہ کا استعمال، علاوہ ازیں حاملہ عورتوں کو حمل کے دوران یہ مرض ہو جاتا ہے۔



علامات :- دانت یا اس کی جڑ میں شدید درد ہوتا ہے اور منہ ہلانے سے بھی درد ہوتا ہے۔
علاج :- درد دانت کے علاج کے لئے سب سے پہلے مرض کا اصل سبب دریافت کریں، اگر دانت کے نزدیک والے سوڑھے سوچ جاتے ہیں، بعض دفعہ گال بلکہ سارا چہرہ سوج جاتا ہے۔
علاج :- درد دانت کے علاج کے لئے سب سے پہلے مرض کا اصل سبب دریافت کریں، اگر دانت کے اندر کار بالک الیڈیا کر یا زوٹ یا سپرٹ کلوروفارم یا امرت دھارا (ست پودینہ، ست پوائن، کافور ہوزن ملا لیں، امرت دھارا تیار ہے) وغیرہ میں کپاس کا معمولی پھوپھو تر کر کے رکھ دیں،

کس دھیان ہے کہ دوا سوڑھوں کو نہ لگے۔ درد دور ہونے کے بعد سوراخ کو مندرجہ ذیل مصالحہ سے بھر دینا چاہیے، اس سلسلہ میں معلق کو دانت میں مصالحہ کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس دانت میں کوئی درد تو نہیں ہے یا ٹھنڈا پانی یا گرم پانی تو نہیں لگتا، پہلے عارضی طور پر مصالحہ بھر دینا چاہیے اور مستقل طور پر بھرنا ہو تو دو تین ہفتہ کے بعد چاندی سے بھرنا چاہیے، بعض دفعہ تین چار ماہ کے بعد بھی چاندی بھری جاتی ہے۔

دانت کے سوراخ کو عارضی طور پر بھرنے کا طریقہ :- Gattapercha (شک (دندان سازوں کے پاس عام ملتی ہے) کو سپرٹ لیمپ پر گرم کر کے (یہاں یہ واضح ہے کہ اس کو لاٹ میں گرم نہیں کرنا، بہت اوپر رکھ کر صرف گرمی پہنچانی ہے) جب یہ شک نرم ہو جائے تو اس کا نرم ٹکڑہ کسی چیز سے جس کا ذکر نیچے کیا گیا ہے سے بھر دیں۔

دانت کے سوراخ میں چاندی بھرنے کا طریقہ :- یہ ایک ولایتی مرکب ہے جو بہت سی دھاتوں سے تیار ہوتا ہے اور دندان سازوں کے بکثرت مل سکتا ہے، کئی فرموں کے گلوب قیمتی اور کئی کے ارزاں ہیں، عام طور پر مارکیٹ میں لندن کا بنا ہوا Globe Copper مل جاتا ہے۔ یہ ابیت آسانی سے الائے (Alloy) سے بھرا جاتا ہے۔ یہ لگ بھگ آٹھ دس روپیہ میں ٹیوب ملتی ہے۔ جس سے تقریباً پچاس ساٹھ دانت بخوبی بھر سکتے ہیں۔ اس میں ٹیکیاں ہوتی ہیں۔ دانت بھرنے کے لئے ایک ٹیکہ کو چمچی میں پکڑ کر سپرٹ لیمپ پر گرم کریں، اس میں سے پائے کے ذرے منو دار ہوں گے، انہی وہ ظاہر ہوں، ان کو کسی چھوٹے سے شیشے یا چینی کے برتن میں ڈال کر شیشے یا لکڑی کے گول چھوٹے سے ٹکڑے سے خوب رگڑیں۔ یہ مکھن کی مانند ہو جائے گا۔ اب اس کو آسانی دانت میں بھر سکتے ہیں۔

اگر چاندی کا الائے یعنی مرکب بھرنا ہو تو یہ تیار شدہ ولایتی (Silver Alloy) جو کہ سفوف کی شکل میں ہوتا ہے، کسی دندان ساز سے لیں یا نیشنل ڈپو سے خریدیں۔ دانت کے سوراخ کے مطابق تھوڑا سا بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ڈال کر اس میں تھوڑا سا پارہ صاف شدہ ڈال کر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے دبھلائیں، جب یک جان ہو جائے اور گولی بندھنے کے قابل ہو تو اس کو کسی کھدر کے کپڑے میں ڈال کر زور سے پھوڑیں، تاکہ اس میں سے پارہ نکل جائے اور وہ گولی نکال کر تھوڑا تھوڑا اس کھوڑ (دانت کے سوراخ) میں کسی سلاخ (سلانی) سے بھر دیں۔

نوٹ :- یہ عمل کرنے سے پہلے سوراخ کو اچھی طرح روئی سے صاف کر لیں اور اگر ہو سکے تو کسی تیز پوائنٹیز والی سلائی سے اس کے اندر کا سیاہ مادہ کھرچ دیں اور اس کے بعد سپرٹ ریکیٹ فائیڈ کا ایک پھایہ لگا کر خشک کر لیں یا اسی پھایہ کو آگ لگا کر جب وہ جلنے لگے تو اسے بجھا کر دانت کے سوراخ میں رکھ لیں تاکہ سوراخ Disinfecet ہو جائے۔

۲- Filling in Strument کی جگہ آپ ایک چھتری کی لوہے کی سیخ لیں، اس کے ایک طرف چھوٹی سی لوہے کی گولی ہوتی ہے اس طرف کو محفوظ ٹیڑھا کر لیں اور لگ بھگ دس انچ لمبا کاٹ لیں، اگر اسی سیخ کی دوسری طرف کو ہتھوڑی سے ذرا چوڑا کر کے رتی سے معمولی سا تیز کر لیں تو یہی آلہ کالا مادہ کھرچنے کے کام آسکتا ہے۔

ماڈرن ادویات :- ۱- سپرٹ کلوروفارم کا پھایہ تر کر کے دانت کے سوراخ کے اندر رکھیں

۲- ٹنکچر آئیوڈین و ٹنکچر اکیوٹائٹ برابر لے کر پھریری سے دانت پر لگائیں۔

۳- کلورل ہائیڈریٹ چھ ماشہ، کمفر چھ ماشہ، منقول چھ ماشہ، شیشی میں ڈال کر دھوپ میں رکھیں، حل ہو جانے پر پھریری سے دانت کے سوراخ میں لگائیں۔

۴- اویڈن (Avedon) یا ساریدان یا اسپرو یا اناسین یا کوڈوپارین یا اناجین کی ایک گولی چائے سے دیں۔

۵- سیل جین (Cibalgin) یا ایک ایک گولی دن میں دو بار تازہ پانی یا چائے سے دیں۔

۶- پراکسیون (Proxyvon) کیپ شولز چائے کے ساتھ دیں۔

۷- کوڈوپارین دو گولی، ریڈوکسان ۵۰۰ ملی گرام، میڈرے بون دو گولی۔ سب کی تین خوراکیں بنالیں اور دن بھر میں دیں، دانتوں کی بوسیدگی

یا کڑے ٹکڑے ہو کر نکلنے، کھڑا لگنے، مسوڑھے سوجھنے کا مستقل علاج کرنا ہو تو کوڈوپارین نکال دیں، باقی دونوں دواؤں کئی دنوں تک دیں۔

دانتوں کی صفائی نہایت ضروری ہے، اس کے لئے کالکیٹ، سبکا، فارہنس، کالی نوس وغیرہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا جائے، ہائیڈروجن پراکسائیڈ

کی پھریری لگانے سے بھی دانت صاف ہو جاتے ہیں۔

مندرجہ ذیل تجربات دانت درد روکنے اور دانتوں کی صفائی کے لئے مفید ہیں:-

برقی :- کاربالک ایڈ چھ ماشہ، کلورل ہائیڈریٹ چھ ماشہ، مصطکی رومی چھ ماشہ، کریازوٹ چھ ماشہ، ٹنکچر آئیوڈین (ریکیٹ فائیڈ سپرٹ سے

تیار شدہ) چھ ماشہ، شک کافور چھ ماشہ، سنت پودینہ چھ ماشہ، تیل لونگ تین ماشہ۔

ترکیب تیاری :- سب کو شیشی میں ڈال کر مضبوط کارک لگا کر رکھیں، بس "برقی" تیار ہے، جیسا نام ویسا کام، بجلی کی طرح اثر کرتی ہے

بوقت ضرورت درد والے دانت کو پھایہ سے لگائیں، فوراً آرام آجائے گا۔ درد دانت کے لئے یہ ایک نہایت ہی مفید دوا ہے، جس سے درد

دوا کا پھایہ لگاتے ہی فوراً درد دور ہو جاتا ہے۔ درد دانت کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی دوا میرے تجربہ میں نہیں آئی، بنا کر فائدہ اٹھائیں۔

دیگر آسان فارمولا :- کلورل ہائیڈریٹ، کافور، سنت پودینہ ہر ایک چھ ماشہ، شیشی میں ڈال کر دھوپ میں رکھیں، جب پانی کی طرح

ہو جائے تو پھریری سے دانت کے سوراخ میں لگائیں، درد دانت کے لئے نہایت مفید ہے، ہتھیلی پر سرسوں جمانے والی بات ہے۔

دیگر :- ٹنکچر آئیوڈین، ٹنکچر اکیوٹائٹ ہر ایک چھ ماشہ، ملا لیں اور پھریری سے دانت پر لگائیں، اگر مسوڑھوں میں سوزش و درد ہو تو بھی مفید ہے۔

دیگر :- ٹنکچر اکیوٹائٹ، ٹنکچر ہیرہ، ٹنکچر آئیوڈین، ٹنکچر پائپر پھرم ہر ایک چھ ماشہ، آپس میں ملا لیں، دانت و مسوڑھوں کے درد کے لئے از حد مفید ہے۔

درد دانت کا کامیاب علاج :- کلورل ہائیڈریٹ پراڈرام، کمفر پراڈرام، منقول پراڈرام، سپرٹ کلوروفارم پراڈانس، ٹنکچر ہیرہ آدھا

اونس، تیل لونگ پراڈرام، کریازوٹ پانچ بوند، تمام چیزوں کو ملا لیں، درد والے دانت میں پھریری سے لگائیں، ہتھوڑی دیر میں دور ہو جائیگا۔ دلیسی

طریقہ علاج میں عفر فرحاکا سفوف مقام درم پر ملنا بھی مفید ہے۔

ملتانی ٹوتھ پاؤڈر :- چاک خالص دو تولہ، سوڈا بائیکارب دو تولہ، بورک ایسڈ ایک تولہ، پینکڑی بریاں ایک تولہ، مازو سبز ایک تولہ، مرچ سیاہ چھ ماشہ، عطر قرچا چھ ماشہ، کانور بھیم سینی تین ماشہ، یوکلپٹس آئیل دس بوند ۔

ترکیب تیاری :- سب ادویہ کو باریک پس کر یوکلپٹس آئیل ملا کر محفوظ رکھیں، مسواک یا ٹوتھ برش سے دانتوں پر ملیں ۔ دانتوں اور مسوڑھوں کو مضبوط کرتا ہے، تمام امراض دندان کے لئے مفید ہے ۔

دیگر آسان فارمولا :- پینکڑی بریاں ایک تولہ، نمک خوردنی چھ ماشہ، ہر دو کو ملا کر دانتوں پر ملیں، دانت اور مسوڑھوں کے درد کے لئے از حد مفید ہے ۔

ملتانی کالا دانت منجن :- کوئلہ چمکا بادام بارہ تولہ، نمک خوردنی پانچ تولہ، پینکڑی بریاں پانچ تولہ، مرچ سیاہ تین ماشہ، سب کو باریک پس کر کرپڑ چھان کر لیں، روزانہ بھوڑا سا منجن انگلی یا برش سے دانتوں پر مل کر اوپر سے گرم پانی سے کلی کریں ۔ دانتوں کے تمام امراض کا آسان علاج ہے ۔

متبا کو منجن :- متبا کو خوردنی، سپاری جلی ہوئی، عطر قرچا، مرچ سیاہ ہر ایک برابر وزن لے کر باریک پس لیں، اور تسکین درد کے لئے دانتوں پر ملیں، آرام آجائے گا ۔

آسان منجن :- خون کو بند کرنے اور مسوڑھوں کے درد کے لئے نہایت مفید ہے ۔ مریض کو خواہ کتنی شدت کا درد کیوں نہ ہو، اس منجن کے ملنے سے مریض کو فوراً تسکین ملتی ہے ۔ مرچ سیاہ چھ ماشہ، کانور چھ ماشہ، یوکلپٹس آئیل ۲۰ قطرے، پینکڑی بریاں ایک تولہ، سوڈا بائیکارب ایک تولہ، سپاری (جلی ہوئی) دو تولہ، چاک مٹی چار تولہ ۔

ترکیب :- ہر دو کو علیحدہ علیحدہ پس کر یوکلپٹس آئیل ملا لیں، بس آسان منجن تیار ہے ۔ دونوں وقت دانتوں پر انگلی سے ملیں ۔

ستا ٹوتھ پاؤڈر :- چاک مٹی (رنگ و روغن نیچے والے دکان داروں کے یہاں ملتی ہے) دو پونڈ، سوڈا بائیکارب دو اونس، شبو لاپچی دو ڈرام ۔ چاک پاؤڈر اور سوڈا آپس میں ملا لیں اور خوشبو لاپچی ملا کر باریک چھلنی سے چھان کر پیک کر لیں، دانتوں پر ملیں تمام امراض دندان کے لئے مفید علاج ہے ۔

اگر دانت اپنی جگہ سے اکھڑ جائے تو اسے زبور کے ذریعہ نہایت احتیاط سے علیحدہ کریں ۔ اگر دانت درد کی وجہ سے باہر گال پر سورش ہو تو بورک ایسڈ کے پانی کی ٹکور کریں، دانت نکالنے سے پہلے اس لائن کا تجربہ ہونا ضروری ہے ۔ اگر داڑھ سے خون بند نہ ہو تو ٹنچر اسٹیل میں ڈوئی کا پھویہ ترکر کے رکھیں یا پینکڑی بریاں کا سفوف چھڑکیں ۔

غذا اور پرہیز :- تیل کی ترش اور گرم اغذیہ سے پرہیز کریں، خالص دودھ اور زود ہضم اغذیہ استعمال کریں ۔

دانت نکالنا :- بعض آدمی درد کی زیادتی کی وجہ سے مضبوط دانت نکلوانے پر بے بس ہوتے ہیں ۔ لیکن یہ سخت غلطی ہے اور مریض مضبوط دانت نکلوانے کا کبھی مشورہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ ادویات سے درد دانت کو بند کرنا چاہیے، کیونکہ مضبوط دانت نکالنے وقت ٹوٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، بعض دفعہ جڑے کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے یا آنکھ وغیرہ کو تکلیف پہنچتی ہے یا زیادہ جریان خون ہو ۔ ۔ کبھی منہ سوج جاتا ہے، اس لئے جب ادویات سے آرام نہ آئے اور کوئی چارہ باقی نہ رہے تو پھر دانت نکلوانے کا مشورہ دینا چاہیے، ویسے عام طور پر ۸ فیصدی ایسے مریض داڑھ نکلوانے آتے ہیں، جن کی داڑھیں ہلتی رہتی ہیں اور جن کا نکالنا بہت سہل ہوتا ہے ۔

لیکن جب کوئی مریض تندرست دانت نکالنے پر مجبور کرے تو معالج کو نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ جیسا ہم لکھ آئے ہیں کہ اس سے مریض کے جڑے کی ہڈی ٹوٹنے یا دانت ٹوٹنے یا شدید جریان خون (جس سے موت بھی ہو سکتی ہے) کا سخت خطرہ ہوتا ہے ۔

جس داڑھ یا دانت کو اکھاڑنا ضروری ہو، اس کے ارد گرد نو نو وکین یا کوکین یا پلانوکین (ان کے تیار شدہ ایمپول مارکیٹ میں عام مل جاتے ہیں، جن میں مناسب مقدار میں دوائی گھلی ہوتی ہے اور جریان خون کم ہونے کے لئے ان میں لائیو آر ایڈرینے لین بھی شامل ہوتا ہے) کسی ایک ڈاکٹر کے ڈنٹل سرج سے مناسب مقدار میں لگائیں۔ جب اچھی طرح ٹیکہ لگ جائے تو دو چار منٹ تک داڑھ بالکل بے حس ہو جائیگی، داڑھ کے تجس ہونے کے بعد نثر جے دندان ساز گم لنٹ (Gum-Leneit) کہتے ہیں۔ اس سے داڑھ کے ارد گرد کے مسوڑھے کا گوشت علیحدہ کر دیں یہاں تک کہ زبور دانت کی جڑ تک پہنچ سکے۔ پھر زبور سے داڑھ کو مضبوطی سے پکڑ کر داڑھ کو پہلے اندر کی طرف پھر باہر کی طرف ہلائیں۔ پھر جب داڑھ اپنے مقام سے ہل جائے تو معمولی سا زور لگا کر اوپر کو کھینچ لیں، داڑھ آسانی سے نکل آئے گی۔ اگر داڑھ کے اوپر زبور ڈال کر سیدھا کھینچنا شروع کر دیں گے تو داڑھ کے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے اور مرض کو سخت تکلیف ہوگی، یہ طریقہ داڑھ نکلنے کا بالکل آسان ہے، تمام دانتوں اور داڑھوں کو نکالنے کے لئے علیحدہ علیحدہ سائیز کے زبور انگریزی دوا فروشوں سے ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ اگر ملنے میں دقت ہو تو آپ منیجر سکھائیک ملتان دوا خانہ (رحمٹ) پانی پت سے منگا سکتے ہیں۔

جب داڑھ نکل آئے تو پھر پوٹاسیم پرمینگنیٹ ایک رتی ایک گلاس میں نیم گرم پانی میں گھول کر کلیاں کرائیں، مقام ماؤف پر ٹنگر فرائی پر کلورائیڈ یا ٹنگر بنزین کا پھیلا سوراخ میں لگا دیں، بعد میں گھی اور نمک کا نیم گرم پھیلا رکھنا مفید ہے۔ اگر شدید جریان خون ہونے لگے تو وٹامن کے (Vitamin-K) کپی لان (Kaplan) ایک سے دوسری سی کا عضلاتی انجکشن کریں۔ اور خوراک کی طور پر کیلشیم لکٹیٹ دس گرین کی تین یا چار خوراک روزانہ کھلائیں۔

شدت درد کو روکنے کے لئے کوڈ پائرن یا سارڈان یا اے پی سی پاؤڈر (جس کا نسخہ دوائے درد سر کے نام سے درج ہے) گرم چائے سے دیں، اگر منہ سوج جائے تو پروکین مینی سلین چار لاکھ یونٹ کا عضلاتی انجکشن ۲۴ گھنٹوں میں ایک بار دیں یا سپرائن کی گولی دیں۔ ہو میو پیٹھک علاج :- دانت اکھاڑنے کے بعد زخم کو صاف رکھنے کے لئے کیلنڈولا Q کالوشن (پانی ایک ادس، کیلنڈولا مدر ٹنگر فرائی بوند) استعمال کریں۔

غذا پر سبیر :- دیرینہ اور ٹھنڈی چیزوں سے سخت پر سبیر کرائیں، سرد پانی سے چند روز پر سبیر کرنا بڑا ضروری ہے۔

نوٹ :- دانت نکالنے کے عملی تجربہ کے لئے آپ چند روز کسی مقامی دندان ساز کے پاس کام کریں، آپ بہت جلد اس

لاسن میں بھی ماہر ہو سکتے ہیں، عملی تجربہ کے بغیر اس کام کو شروع کرنے کی جرأت نہیں کرنی چاہیے۔

بنا جمہور دانت نکالنے والی دوا :- اوٹنگن کے بیج کو بیردزہ کے ساتھ پیس کر دانت کی جڑ میں رکھنے سے دانت اپنی جگہ سے الگ ہو جائے گا یا تیل زیتون کو ترش انگور کے پانی میں اس طرح پکائیں کہ وہ شہد جیسا گاڑھا ہو جائے، اس کو دانت کی جڑ کے ساتھ لگانے سے دانت آسانی سے اکھڑ جاتا ہے۔

نوٹ :- اس نسخہ کے سلسلہ میں پرانے گرختوں میں بہت تعریف کی گئی ہے، کئی نئے نسخوں نے بھی تعریف کی ہے۔ مگر میں اس سے

متفق نہیں ہوں۔ ہری چند ملتان

دانتوں کا میل، حفر، ٹار ٹار، (Tar-Tar)

تعریف مرض :- اس مرض میں دانتوں پر میل جمع ہو جاتی ہے اور دانت بد رنگ ہو جاتے ہیں۔

وجوہات :- دانتوں پر مسواک نہ کرنا، معدہ کی خرابی، دائمی قبض وغیرہ سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔ یہ میل اکثر نیچے کے دانتوں کو خراب کرتا ہے۔
علامات :- دانتوں پر اکثر زرد اور گاہے سبزی مائل یا سیاہ رنگ کا میل جم جاتا ہے۔ اگر یہ مرض بڑھتا چلا جائے تو مسوڑھے زخمی ہو کر ان میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ جس سے "پائوریہ" کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔

علاج :- ہر روز دانتوں کو نرم مسواک سے صاف کرنا چاہیے، صبح و شام کھانا کھانے کے بعد خوراک کے تمام ذرات دانتوں کی غلاؤں سے صاف دینے چاہئیں، اگر دانتوں پر زیادہ میل جم گئی ہو تو کسی اچھے دندان ساز سے اتر وادینی چاہیے، دانتوں کی صفائی کے لئے ہائیڈروجن پراؤکسائیڈ کی کھلیاں (پانی چھ اوٹس، ہائیڈروجن پراؤکسائیڈ ایک اوٹس) مفید ہیں، دانت کسی اچھے ٹوٹھ پیسٹ یا مسجن سے جس کا ذکر دانت کے درد میں کیا گیا ہے۔ صاف کئے جائیں، یا مندرجہ ذیل ٹوٹھ پیسٹ بنا کر لگائیں :-

ٹوٹھ پیسٹ کا آسان فارمولا :- فریخ چاک آدھا پونڈ، پرسی پیسٹ چاک آدھا پونڈ، سن لائٹ صابن کا سفوف دو اوٹس، سکریں آدھا ڈرام، گلیسرین آٹھ اوٹس، ریکیٹ فائیڈ سپرٹ دو اوٹس، یو کلیپس آئیل ہم اوٹس، پیرمنٹ آئیل آدھا ڈرام، خوشبو گلاب ایک ڈرام۔

ترکیب تیاری :- ہر دو چاک میں صابن کا سفوف کھل کر کریں اور گلیسرین ملا کر خوب حل کریں۔ آخر میں سپرٹ میں خوشبو یا ت ملا کر شامل کریں، اور خوب کھل کر کے ٹیوبوں میں بھر لیں۔ اگر سخت ہو تو گلیسرین کا اضافہ کر لیں۔ بڑھیا ٹوٹھ پیسٹ تیار ہے، برش یا انگلی سے استعمال کریں۔

کالا دانت مسجن :- بادام کا چھلکا جلا ہوا آدھ سیر، متبا کو کے پھول، مرج سببہ، منک خوردنی ہر ایک دو تولہ، کوٹ کر مسجن کی طرح دانتوں پر لگائیں، میل صاف ہو جائے گی۔

اگر ناقص غذا کی وجہ سے دانتوں کا رنگ پیلا یا سیاہ یا نیلا ہے تو مغوی غذائیں دودھ اور پھل وغیرہ استعمال کریں اور بطور دوا وٹامن ڈی کے مرکبات دیں۔

غذا پر مہیز :- باسی و گلی سٹری غذاؤں سے پر مہیز کریں۔ ایسی غذائیں جو وٹامن سے بھر پور ہوں استعمال کریں، ترش چیزوں سے بھی پر مہیز ضروری ہے۔

دانتوں کا ہلنا، متحرک الانسان، اوڈنٹوسائیٹسز (Odontoseises)

تعریف مرض :- اس مرض میں دانت غیر طبعی طور پر ہلنے لگ جاتے ہیں۔

وجوہات :- بچوں میں دودھ کے دانت اور بڑھاپے میں دانتوں کا ہلنا ایک طبعی امر ہے، اور اس کے علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جوانی میں دانتوں کا ہلنا مرض میں شمار ہے، کبھی رفیق رطوبات دانتوں میں جمع ہو کر دانتوں کو ہلانے کا باعث ہوتی ہیں، منہ میں لعاب دہن زیادہ پیدا ہونے، دانتوں کے پھٹوں کی کمزوری، ماسخورہ، چوٹ لگنے اور دائمی نزلہ و زکام سے بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے۔

علامات :- کسی چیز کو کاٹنے یا چبانے سے دانتوں کو سخت درد ہوتا ہے اور دانت ہلنے لگ جاتے ہیں۔

علاج :- اصل سبب مرض کے مطابق علاج کرنا چاہیے، اگر دانت ماسخورہ (پائوریہ) سے ہلتے ہیں تو پائوریہ کے علاج میں جو نسخے لکھے گئے ہیں۔ وہ استعمال کئے جائیں، کبھی دندان ساز سے ہلتے دانت کو ساتھ دے دانت کے سہارے بندھوا دینے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اس مرض میں خشک کرنے والی ادویات مفید ہیں، اس سلسلہ میں ٹنچر سٹیل کی پھریری لگانا یا پشکڑی بریاں کا ملنا مفید ہے، ایسے مسجن جن میں پشکڑی کا جزو شامل ہو، اس مرض میں خاص طور پر مفید ہیں۔

لا جواب ٹوٹھ پاؤڈر :- ہلدی، چھلکا انار، سماق، پشکڑی بریاں ہر ایک ایک تولہ، سفوف بنا کر بطور ٹوٹھ پاؤڈر استعمال کریں دانت

اور ان کی جڑوں پر ملنا دانتوں کو سفید بنانے کے علاوہ انہیں مضبوط کرتا ہے۔ علاوہ ازیں کیکر کی مسواک بھی دانتوں کو مضبوط کرتی ہے۔
غذا پر مہیز:۔ دودھ، دلیا، کھجڑی، ساگو دانہ وغیرہ دیں، پالک کا ساگ بھی مفید ہے، مصالحہ جات بند رکھیں اور کوئی ایسی غذا نہ دیں جس سے دانتوں پر زور پڑے مثلاً گوشت، آلو، گاجر، مولی وغیرہ سے سخت پر مہیز کریں۔

دانت کھٹے ہو جانا، خرس انسان، رُف نیش آف ٹیٹھ

(Roughness of Teeth)

تعریف مرض:۔ دانت ترش یا کُندر ہتے ہیں اور کھانے پینے میں تکلیف رہتی ہے۔
وجوہات:۔ ترش چیزوں کا بکثرت استعمال یا خرابیِ معدہ وغیرہ سے یہ عارضہ اکثر طو بات کی زیادتی سے ہوتا ہے۔
علامات:۔ دانتوں میں ایسا معلوم ہوتا ہے، جیسے اٹی یا لکڑی کا دانہ یا نارنگی کھائی ہو اور ایسی حالت میں دانت نیچے دبانے سے دانتوں میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔

علاج:۔ اگر ترش اشیاء کے استعمال سے ہو تو ایسبغول کا لعاب چوسنا یا پستہ یا اخروٹ یا بادام کی گری چبانا مفید ہے، سونٹھ بریاں ایک تولہ، نمک خوردنی تین ماشہ بطور مسخن دانتوں پر ملنا بہت مفید ہے، کھانے کا نمک و تیل کا ملنا بھی فوری آرام دیتا ہے۔ اگر خرابیِ معدہ کی وجہ سے یہ عارضہ ہو تو اس کا علاج کریں۔
غذا پر مہیز:۔ ترش چیزوں سے قطعی پر مہیز کریں، غذا زود مضعم و مقوی دیں۔

دانتوں کا بجنا، ضرر الاسنان، اوڈنٹوپریسیس (Odonotoprisis)

تعریف مرض:۔ مریض سوتے وقت دانت پٹتا ہے۔
وجوہات:۔ جڑوں کے عضلات میں تشنج ہونا، صرع، سکے، فالج اور چھوٹے بچوں میں یہ عارضہ پیٹ کے کیڑوں سے ہوتا ہے۔
علامات:۔ مریض نیند میں منہ اس طرح چلاتا ہے، جیسے کچھ کھا رہا ہو، منہ چلانے سے دانتوں کی کڑکڑ کی آواز آتی ہے۔
علاج:۔ اصل سبب مرض کا علاج کریں، اگر آنتوں میں کیڑے پیدا ہونے کی علامات موجود ہوں، تو ان کا باقاعدہ علاج کریں، اور معدہ و آنتوں کی بیماریوں کے باب میں آنتوں کے کیڑے مارنے کی جو دوائیں لکھی گئی ہیں استعمال کرائیں، دانتوں کی غلاظت سے یہ تکلیف ہو تو دانتوں کی صفائی کے لئے جو نسخے لکھے گئے ہیں، استعمال کریں۔ بلغم کے تنقیہ کے لئے کچھ عرصہ اطریفیل اسلو خود دوس اور اطریفیل کشینز شام کو کھلائیں۔

پھلوں سے علاج:۔ دانتوں کی صفائی کے لئے لیموں کا رس نکال کر ایک چمچنی کی پیالی میں رکھ لیں اور اس میں سے دانت یا نرم برش سے اس لیموں کے رس کو دانتوں پر ملتے رہیں۔ اسی طرح روزانہ ملا کریں، چند روز میں دانتوں کی صفائی ہو کر تمام قسم کے ردی جراثیم ہلاک ہو جائیں گے، لیموں اور انگور کے کایرونی اور اندرونی استعمال مسوڑھوں کی ہر شکایت کو دور کرتا ہے۔

غذا پر مہیز:۔ دیرینہ چیزوں سے پر مہیز کریں، غذا زود مضعم و مقوی دیں۔

مسوڑھوں کی سوجن، ورم لثہ، جیجی وائی لٹس، (Gingivits)

مسوڑھوں سے پیپ آنا، قروح لثہ، پانی اوریا، (Pyorrhoea)

تعریف مرض :- مسوڑھوں کے کنارے سوج جاتے ہیں۔ اگر پانی اوریا ہو تو ان کے نیچے سے پیپ آتی ہے، مرض کی بڑھی ہوئی حالت میں ان کی دانتوں کی جڑ تک ناسور ہو جاتے ہیں۔

وجوہات :- منہ اور دانتوں کا میلارہنا اور غذا کھانے کے بعد دانتوں کو صاف نہ کرنا، کیونکہ غذا کے ذرات جو دانتوں کی جڑوں میں پھنسے رہتے ہیں وہ متفنن ہو جاتے ہیں اور جب برش، منجن یا مسواک سے دانت صاف نہیں کئے جاتے تو دانتوں کی جڑوں پر زرد رنگ کا میل (حفر، طار طار) جمع جاتا ہے، جس سے مسوڑھے زخمی ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے نیچے پیپ پیدا ہو جاتی ہے۔

علامات :- مسوڑھے پھول جاتے ہیں، خون بہتا ہے، مسوڑھے گلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پیپ خارج ہونے لگتی ہے اور دانتوں کی جڑیں ملنی ہو جاتی ہیں، آخر میں دانت ہلنے شروع ہو جاتے ہیں اور بوسیدہ ہو کر گرہنے لگتے ہیں، شدید درد اور سوجن ہوتی ہے۔ منہ اور سانس سے بدبو آنے لگتی ہے۔

علاج (بطور حفظ المقدم) :- منہ اور دانتوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے، کھانا کھانے کے بعد کلی کرنی چاہیے اور نرم مسواک کیکر یا نیم کی کرنی چاہیے یا درد دانت کے بیان میں لکھے گئے منجن ہائے میں سے کسی ایک منجن کا استعمال کرنا چاہیے، جس سے دانت صاف رہیں اور ان پر میل نہ جنے، دھیان رہے کہ بعض دفعہ سخت مسواک کا استعمال بھی مسوڑھوں کی سوجن کا باعث ہوتا ہے، اس لئے برش ہمیشہ نرم کر کے اور مسواک نرم استعمال کرنی چاہیے۔

انتباہ :- احتیاط یہ رکھنی چاہیے کہ ایسے برش یا ایسے مسواک استعمال نہ کئے جائیں کہ جن کے بال یا ریشے بہت سخت ہوں اور جن کی رگڑ کی وجہ سے مسوڑھوں کو نقصان کا اندیشہ ہو۔ مسواک کی عمدگی کی علامت یہ ہے کہ وہ تازہ ہو اور انسان کی سب سے چھوٹی انگلی کے برابر اس کی موٹائی ہو، پس ایسی مسواک لے کر پہلے اس کو داڑھوں تلے خوب اچھی طرح کچل لیں اور پھر مسوڑھوں اور دانتوں کو خوب اچھی طرح صاف کریں، بعد میں کلی کریں۔

بطور علاج شافی :- سب سے پہلے منہ اور دانتوں کا صاف رکھنا ہے، اگر دانتوں پر سخت میل جمی ہو تو کسی بستہ دندان ساز سے صاف کر دینا چاہیے، مسوڑھوں کی صفائی کے لئے ہائیڈروجن پراؤکسائیڈ سے دانتوں کے باہر اور اندر مسوڑھوں کو خوب اچھی طرح صاف کریں اور کلی کریں، روئی کی پھیری تر کر کے مسوڑھوں پر لگائیں، یہاں تک کہ منہ میں جھاگ بھر جائے، یہ دوا مسوڑھوں کی پیپ کو فوراً صاف کر دیتی ہے، اس دوا کے استعمال کے بعد صاف مگر نیم گرم پانی سے کلیاں کر کے منہ صاف کر دینا چاہیے۔ اسی طرح صبح و شام کرنا چاہیے۔

جب مسوڑھے زخمی ہوں اور پیپ آتی ہو تو ایسی صورت میں مسواک یا خشک منجن کے استعمال سے بجائے فائدہ کے نقصان ہوتا ہے، ایسی حالت میں نمائی یا مکھن کی مانند ڈنٹل کریوں کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے، اس سلسلہ میں کالی نوس (کلوروفل کے ساتھ) کالکیٹ (کلوروفل کے ساتھ)، سبا کا نیم ٹوٹھ، یٹ، نورہنس یا تھائی مول ڈنٹل پیسٹ کو ذرا سا انگلی پر لگا کر اور اس سے دانتوں کے اندر باہر اور مسوڑھوں پر آہستہ آہستہ مل کر نیم گرم پانی کی کلی اور غزے سے منہ صاف کر دینا چاہیے۔ اس طرح صبح کو ہاتھ منہ دھوتے وقت اور رات کو سوتے وقت دانتوں کا صاف کرنا نہایت مفید ہے۔ اس سے نہ صرف

گندہ دہنی دُور ہو جاتی ہے، بلکہ مسوڑھے اور دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔

بعض دفعہ مسوڑھوں کی سوجن سے خون وٹامن سی کی کمی سے آتا ہے۔ اس لئے وٹامن سی "خوردنی اور بذریعہ انجکشن کافی مقدار میں دی جائے۔

اس سلسلہ میں فارمالین کے پانچ قطرے ایک پیالی میں ڈال کر اس سے کلیاں کرنا بھی دانتوں کو مضبوط بناتا ہے۔

اگر دانت نکلنے کے زمانہ میں چھوٹے بچوں کے مسوڑھے متورم ہوں تو ان کے دانت باسانی نکل آئیں گے۔

دوائے ماسخورہ (پائوریہ) :- پشکڑی سفید چھ ماشہ، طوطیا بریاں تین ماشہ، ہلدی چھ ماشہ، نمک خوردنی پانچ ماشہ، زنک اوکسائیڈ تین ماشہ، مازو چار ماشہ، تمام ادویہ کو باریک کر کے آپس میں ملا لیں۔ پھر ان میں کاربالک ایسڈ دو بوند، گلیسرین دو بوند، ٹنگر آئیوڈین دو بوند، یوکلپٹس آئل چار بوند ملا کر ایک ذات کر لیں، صبح و شام اور رات کو سوتے وقت مسوڑھوں کو انگلی سے دبا کر پیپ سے صاف کر کے منجن کی طرح ملتے رہیں نہایت ہی مفید ہے۔

دوائے پائوریہ :- نیم کے پتے سایہ میں خشک شدہ پانچ تولہ، نمک لاہوری دو تولہ، مرچ سیاہ دو تولہ، تینوں ادویات کو باریک پیس کر منجن کی طرح بنا لیں اور صبح و شام دانتوں پر ملیں، رات کو دانتوں پر مل کر بغیر کلی وغیرہ کئے سوجائیں، صبح کو پھر یہی دوا مل کر دانتوں کو صاف کریں پائوریہ کے لئے مفید ہے۔

دیگر :- ایسڈ کاربالک پانچ منم، ایسڈ ٹینک ۲۰ گرین، ٹنگر آئیوڈین (ریکٹی فائیڈ والا) ایک ڈرام، ٹنگر کوناسٹ آدھا ڈرام، تھائی مول پانچ گرین، گلیسرین ایک اونس، دن میں ایک دفعہ پھریری سے لگائیں، پائوریہ اور مسوڑھوں کی سوجن کے لئے مفید ہے۔

پائوریہ یا منجن :- چھلکا انار، پھول انار، مازو سبز، پشکڑی سفید، سنگ جراثیم ہر ایک تین ماشہ، ان سب ادویہ کو باریک پیس کر بطور منجن استعمال کریں۔ ڈیوٹل پندرہ قطرے ایک گلاس نیم گرم پانی میں ملا کر کلیاں کرنا مفید ہیں یا چھال بھول کے جو شانہ نیم گرم ایک گلاس میں پشکڑی سفید چار ماشہ، نیلا مٹھا آدھی رتی ملا کر کلیاں کرنا پائوریہ کو از حد مفید ہے۔ خوراک کی طور پر مصفی خون ادویہ دیں، جب مرض پائوریہ یا بہت ترقی کر جائے، جس سے جسم کے دوسرے حصوں میں خرابی پیدا ہو جائے تو فوراً دانتوں کا ایکس رے کر جو دانت خراب ہوں نکلوادیں، مرض پائوریہ کا جلد علاج کرنا چاہیے، ورنہ اس کا زہر غذا کے ساتھ مل کر خون میں شامل ہو جاتی ہے، جس سے بہت سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔

تحقیقات جدید سے ثابت ہوا ہے کہ وٹامن اے کی کمی بھی اس مرض کا باعث ہے، اس لئے مریض کو ایسی غذائیں جن میں وٹامن اے ڈی سی بکثرت ہوں، کھلانا چاہیئے۔

نوٹ :- پائوریہ کا ایک اور طریقہ علاج بھی رائج ہے، وہ Vaccine-Treatment کہلاتا ہے، یعنی مریضوں کے مسوڑھوں

میں سے پیپ لے کر اس کے جراثیم کی ویکسین تیار کی جاتی ہے اور پھر اس کے انجکشن کئے جاتے ہیں، اس سے کافی فائدہ پہنچتا ہے اور موجودہ

دور میں تو سب سے زیادہ اہمیت اسی علاج کو دی گئی ہے۔ مگر اسے ایک مستند ڈاکٹر ہی سرانجام دے سکتا ہے۔

غذا و پرہیز :- گوشت، مچھلی، انڈے، دہی اور لسی سے پرہیز کریں۔ غذا زود ہضم اور مقوی دیں۔

مَجَرَّاتُ امراضِ دانت

دانتوں کا بڑھ جانا :- کسی لوہے کے آلہ سے پکڑ کر ریتی (سوڈن) سے گھس کر چھوٹا کریں اور پشکڑی سفید کا سفوف دانتوں پر ملیں۔

دانتوں کا ٹوٹنا :- پشکڑی سفید کا سفوف یا سفوف مازو ملیں اور وٹامن اے، ڈی وی کا استعمال کریں، سفیدی انڈہ کا ملنا بھی مفید ہے، خشکی

سے ہو تو گلیسرین یا بادام روغن پھریری سے لگائیں۔

دانتوں کی خارش :- پائوریہ کی طرح علاج کریں، پھلکڑی سفید کے غرضے کرائیں، نمک کے غرضے بھی مفید ہیں۔
دانتوں کا زوال :- کیلشیم کی کمی کی صورت میں کیلشیم آکسائیڈ اور وٹامن کے مرکبات اڈکیولین و گانتول (Vigantol) ملٹی وٹامنز وغیرہ اور
خوردنی و بذریعہ انجکشن استعمال کریں، ایسی طریقہ علاج میں کشتہ مرجان اور کشتہ پچے موتی کا استعمال مفید ہے۔
دانتوں کی خشکی :- گلیسرین یا روغن بادام کی پھریری لگائیں، سرپر روغن لبوب سبوعہ کی مالش کریں۔
دانتوں کی چمک جاتے رہنا :- روغن بلساں دانتوں پر ملیں، روغن گل ایک تولہ، کافور تین ماشہ ملا کر لگائیں، مغز بادام و مکھن کا استعمال
مفید ہے، مغز چہار کا چبانا مفید ہے، پھلکڑی سفید، مازوئے سبز، زراوند طویل، ہوزن پس کر بطور ٹوٹکا پاؤڈر کے ملیں۔ وٹامنز سے بھرپور
اغذیہ وادویہ دیں۔

خلق و مری اور نثرہ وغیرہ کی بیماریاں

گلے پڑنا، ورم لوزیتین، ٹانسلائٹس، (Tonslitis)

تعریف مرض :- اس مرض میں گلے کے غدود پھول جاتے ہیں اور ان میں درد شروع ہو جاتا ہے۔
وجوہات :- گندی نالیوں کی متغفن ہوا کے سونگھنے، بارش میں بھیگنے، سردی لگنے، وجع المفاصل اور نفرس بھی اس مرض کا باعث ہیں۔
بار بار نزلہ لگنے، کبھی یہ ورم بہت گرم دودھ یا بہت گرم چائے پینے، برف چبانے، مچھلی کی ہڈی یا کانٹا چبھ جانے، خراب برش کو دانتوں
پر ملنے سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

مچھلی کے کانٹے اور خراب برش کی وجہ سے عموماً یہ ورم ایک طرف کے لوزہ میں پایا جاتا ہے۔
اقسام :- ورم لوزیتین شدید اور مزمن صورتوں میں پایا جاتا ہے، شدید ورم لوزیتین کی تین قسمیں ہیں :-
۱۔ ورم لوزیتین حشوی۔ ۲۔ ورم لوزیتین حویلی۔ ۳۔ ذبحہ۔

۱۔ ورم لوزہ حشوی :- درد، ورم اور سُرخی لوزہ میں پائی جاتی ہے۔ مریض کو بخار رہتا ہے جس کی حرارت ۱۰.۱ سے ۱۰.۴ درجہ تک ہوا
کرتی ہے، لیکن بخار کی علامات تمام مریضوں میں یکساں نہیں ملتیں، بعض مریضوں کو بخار بالکل نہیں ہوتا۔
غدود لوزیتین میں سے ایک لوزہ بہ نسبت دوسرے کے زیادہ ماؤف ہوا کرتا ہے اور اس میں درد اور سختی بھی زیادہ پائی جاتی ہے،
اس کے ساتھ جبارے کے پچھلے زاویے میں درد ہوتا ہے، یہ مرض عموماً ہفتہ تک رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ لیکن
اگر ہفتہ سے زیادہ دن بے تو ماؤف لوزہ میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ جس کے ساتھ ورم بھی بڑھ جاتا ہے اور یہ تالو تک پھیل جاتا ہے،
لوزہ کا پھوڑا دوسرے میں حلق کے اندر پھوٹ جاتا ہے۔

۲۔ ورم لوزہ حویلی :- یہ ورم اپنی نوعیت میں بالکل سطحی ہوتا ہے۔ اور اس کی علامات تقریباً وہی ہیں جو اوپر مذکور ہیں۔ فرق صرف یہ
ہے کہ اس کے ورم میں پھوڑا پیدا نہیں ہوتا، لیکن غدد لوزیتین پر زرد نشان اور زخم و قروح نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی درد اور بخار بھی
نسبتاً کم ہوتا ہے۔

۳۔ ذبحہ :- یہ ورم لوزہ کی ایک شدید صورت ہے۔ اسے خناق مشخص کرنا ضروری ہے۔ اس مرض میں غدد لوزیتین پر کئی نشانات پائے

جاتے ہیں۔ ان داغوں کے نیچے لوزہ کی سطح چھلی ہوئی ہوتی ہے اور یہ زخم بہت مشکل سے بھرتے ہیں۔ اس کے ساتھ بخار بھی ہوتا ہے اور اعصاب بھی ٹوٹتے ہیں۔ یہ مرض ایک قسم کے جرثومہ سے حادث ہوتا ہے، جو منہ کے چھلے، کھڑا لگے دانت اور قمری بخار میں بھی منہ کے اندر پایا جاتا ہے۔
ورم لوزتین مزمن :- یہ بار بار جوانوں اور نوعمروں کو عارض ہوتا ہے۔ اس میں غدد لوزتین پر کوئی نشان وغیرہ نہیں ملتا، لیکن بعض مریضوں کے منہ سے سخت بدبو آتی ہے اور سمیت مرض کی وجہ سے جوڑوں کا درد اور ورم گردہ، پھٹوں کے درد وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ جس سے مریض کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔

بچوں میں مزمن لوزتین کے ساتھ غدد حلقوم (Adenoid) بڑھ جاتے ہیں، ایسے بچوں کا دم رات کو سوتے میں رکتا ہے اور اگر گلے کے دوسرے غدد میں بھی ورم رونما ہو جائے تو سانس میں بے حد تکلیف پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تکلیف عموماً ایسے بچوں کو عارض ہوا کرتی ہے جو بظاہر تندرست و توانا ہوں۔ چہرے سرخ و سفید ہوں اور بدن بھی موٹا تازہ ہو، ایسے بچے بعض اوقات کلوروفارم سونگھانے کے عمل ہی میں مر جاتے ہیں اور امتحان بعد الموت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا حلق اور لوزتین ماؤف تھے۔

علامات :- کافی حد تک علامات اور بیان ہو چکی ہیں، پھر بھی تشخیص مرض کے لئے باہر کی طرف پچھلے جڑے کے نیچے گلے کو ٹوٹنے سے غدد و بڑھے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اور یہ غدد سوج جاتے ہیں۔ درد کرتے ہیں، کبھی کوا بھی بڑھ جاتا ہے، نکلنے میں سخت تکلیف ہوتی ہے، اکثر بخار ہوتا ہے، کبھی کبھی ورم پھیل کر کان میں سرپ پڑ جاتی ہے اور کان بہنے کا عارضہ پیدا ہو جاتا ہے۔

علاج :- مقامی سوزش و ورم کو دور کریں، پھکڑی سفید چار ماشہ، شہد خالص ایک تولہ میں ملا کر پھریری سے سو بجے ہوئے لوزتین پر لگائیں اور جو پانی خارج ہو، اسے کھوکتے رہنا چاہیے، المتاس کے مغز دو تولہ، دودھ گائے پندرہ تولہ میں جوش دے کر اس سے غزغزے کرائیں، اسی نسخہ کو جوش دے کر پلائیں تاکہ ایک دو دست آکر پیٹ صاف ہو جائے۔

جب لوزتین میں دبیہ پیدا ہو جائے تو اسے نشتر دے دیں، جو کہ ایک مستند ڈاکٹر انجام دے سکتا ہے، اگر نزلہ کی وجہ سے یہ عارضہ ہوا بی دانہ چار ماشہ، عناب پانچ دانہ، سوڑیاں ۹ دانہ، گاؤ زبان آٹھ ماشہ، پانی میں جوش دے کر شربت توت سیاہ تین تولہ ملا کر صبح و شام پلائیں اگر سردی کی وجہ سے تکلیف ہو تو اس نسخہ میں بجائے بی دانہ کے گل بنفشہ پانچ ماشہ اور تخم خطمی سات ماشہ کا اضافہ کریں۔ مرض کی پُرانی حالت میں سد معلوم کر کے اس کے مطابق علاج کریں۔

ڈاکٹری علاج :- ورم لوزتین مزمن کا علاج سولے آپریشن کے اور کوئی نہیں، دیسی طریقہ علاج میں ان کا بذریعہ آپریشن خارج کر دینا صحیح طور پر سخت مضر ہے، کیونکہ قدرت نے حلق کے نزدیک یہ پیرے دار اس لئے بنائے ہیں تاکہ کوئی مضرت رساں جرثومہ داخل ہو تو اسے روکا جاسکے اور جسم کو اس کے نقصان سے محفوظ رکھا جائے، ہمارے نظریہ کے مطابق اگر دیسی طریقہ علاج کی بنا پر اگر اس کا مستقل طور پر علاج کیا جائے اور کھانے اور لگانے کی دونوں دوائیں دی جائیں تو اس مرض سے شفا کلی حاصل ہو سکتی ہے۔

اس مرض میں سلفا گروپ میں سے سلفا ڈایازین اس مرض کا موثر علاج ہے، مقدار خوراک ایک سے دو گولی، دن بھر میں چھ گولی تک دے سکتے ہیں، ہر گولی کے ہمراہ مناسب سوڈا بائیکارب ڈال لینا چاہیے، سلفا ڈایازین کی جگہ سپٹران بھی دے سکتے ہیں، طور پر سلفا گروپ سے فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن مینی سلین کا استعمال اگر شروع سے کیا جائے تو مرض کے زیادہ بڑھنے کی نوبت نہیں آتی، پردیہ مینی سلین ۴ لاکھ کا ہر ۲ گھنٹہ بعد ایک انجکشن (عضلاتی) کافی ہے۔ اگر علامات شدید ہوں تو سٹریپٹو مینی سلین کا انجکشن زیادہ موثر ہے۔ عازیں آدھ سیرنیم گرم پانی میں ایک چمچ خوردنی نمک ملا کر غزغزے کرائیں، منہ میں لیس دار لغیم اور ورم گلو کو کافی فائدہ ہوتا ہے، علاوہ چوسنے کے لئے مینی سلین لوزنجز کی ٹکیہ ۵۰۰ ٹونٹ منہ میں دانتوں کے باہر رکھ کر چوسیں، دن میں چھ ٹکیہ چوسنا کافی ہے، اگر علامات شدید نہ ہوں تو

ان گولیوں کے چوسنے، نمک گھول کے غرضے کرنے اور خوراک کی طور پر سلفا ڈایازین کے استعمال سے ہی آرام آجاتا ہے اور انجکشن کی ضرورت نہیں رہتی اورم لوزین کے لئے مجربات درج ذیل ہیں، انہیں حسب موقع استعمال کر کے فائدہ اٹھائیں :-

آئرن گلیسرین :- ٹنچر فرائی پر کلورائیڈ ایک ڈرام، گلیسرین ۱۰ اونس، دونوں کو شیشی میں ڈال کر خوب ہلایں اور پھر پری سے گلے میں لگائیں۔ معمولی گلے اور گھنٹی کے لئے مفید ہے۔

مینڈلس پینٹ :- پوٹاسیم آیوڈائیڈ ۲۵ گرین، آیوڈین پانچ گرین، آئیل منتھاپیپ پانچ نم، گلیسرین ایک اونس، سب اجزاء کو کھل میں رگڑ کر گلیسرین ملا دیں اور شیشی میں محفوظ رکھیں، روٹی کی پھر پری سے ہلکی مقدار میں یہ دوا گلے میں لگائیں، سخت سے سخت گلے، سوزش اور درم کو دور کرنے کے لئے نہایت ہی مفید ہے۔ پرونی طور پر گلے پرانی فلو جین یا اسی کی ٹپس باندھیں۔

سلورٹائیٹرسٹ لوشن :- سلورٹائیٹرسٹ دو گرین، صاف پانی ایک اونس نیلے رنگ کی شیشی میں حل کریں، پھر پھر پری بنا کر ہلکی مقدار میں دن میں صرف ایک بار گلے میں لگائیں، اوپر سے پھٹکڑی ایک چمچ یا نمک خوردنی ایک چمچ گلاس نیم گرم پانی میں ملا کر غرضے کرائیں، دھیان ہے کہ گلے میں لگاتے وقت روٹی کی پھر پری کو چھڑک کر لگائیں تاکہ سلورٹائیٹرسٹ کا قطرہ ہوا کی نالی میں نہ چلا جائے۔

ماڈرن ادویات :- مینڈلز پینٹ (جس کا نسخہ اوپر لکھا جا چکا ہے) گلے وٹانس پر لگائیں۔

۲۔ سیولان لوزنجز (Savlonlozenges) آئی، سی، آئی ————— ہر گھنٹے بعد ایک چوسیں۔

۳۔ پینی سلین لوزنجز (Penicillinlozenges) ہر تین یا چار گھنٹے بعد ایک چوسیں۔

۴۔ آیورٹال (Ivertol) بار ————— ایک ایک لوزنجز دن میں تین بار منہ میں رکھ کر چوسیں۔

۵۔ سلفا ڈرگز (Sulpha drugs) سلفا ڈایازین یا سلفا ٹرائیڈ معمولی مقدار میں سوڈا بائیکارب ملا کر ایک ایک کر کے چار سے چھ گولیاں تازہ پانی سے دیں، بچوں کو ملحوظ عمر دیں۔

۶۔ ٹیٹراسائیکلین (Tetracycline) یا ٹرائی سین (Trycin) ایک ہی چیز ہے، ہر چھ گھنٹے بعد ایک کیپ شولز دیں یا ٹرائی سین کیپ شولز دیں، آرام آجانے پر ہر بار چھ گھنٹے بعد ایک کیپ شولز دیں، یہ انٹی بائیوٹک دوا گلے کے تمام عوارضات کے لئے مفید ہے، تفصیل کے لئے کتاب "ماڈرن ایو میڈیسی" (مصنف ڈاکٹر ہری چند ملتانی و ڈاکٹر سادھو رام سود) دیکھیں، قیمت بڑے اور "نرالا جواگی پبلیکیشنز پانی پت (انڈیا) سے منگائی جاسکتی ہے۔

۷۔ ایکرومائی سین (Achromycin) لیڈرے ————— یہ بھی ٹیٹراسائیکلین کا تجارتی نام ہے۔ بڑوں کو دن بھر میں تین کیپ شولز دیں بچوں کو تین ڈرائس دن بھر میں تین بار دیں۔ شدید حالات میں انجکشن دیں، ٹانسائیڈس، کالی کھانسی، پیشاب کی چھوت، پھیپھڑوں کی چھوت سے منونہ وغیرہ کے لئے از حد مفید ہے۔

۸۔ انٹروسائیکلین (Enterocyclin) ڈیز ————— جہاں دیگر انٹی بائیوٹکس فیل ہو جائیں، وہاں یہ کامیاب نتائج دیتی ہیں، یہ کلورم فینی کال اور ٹیٹراسائیکلین کا مرکب ہے، ہر چھ گھنٹے بعد ایک کیپ شولز دیں یا شدید حالت میں شروع میں چار چار گھنٹے بعد ایک ایک کیپ شولز دیں، بچوں کو اس کا شربت نصف یا ایک چمچ ہر چار یا چھ گھنٹے بعد دیں، اس دوا کے دوران استعمال مریض کو وٹامن بی کمپلیکس کا استعمال بھی کرایا جائے۔

۹۔ ڈائی کرے سین (Dicrystecin) یا سیکلومائی سین (Seclomycin) یا کمبائیوٹک (Combiotic) کا عضلاتی انجکشن ہر ۲۴ گھنٹے کے بعد کریں۔

۱۰۔ پردکین مینی سلین چار لاکھ کا ہر ۲۴ گھنٹے بعد عضلاتی انجکشن کریں، الرجب کا ٹیسٹ پہلے کریں۔

۱۔ علاج ۶، ۷، ۸ میں بیان کی گئی ٹیڑا سائیکلینوں کا استعمال شدید حالت مرض میں کریں۔ مرض کے زیادہ پڑانے ہو جانے پر آپریشن ہی اس کا موثر علاج ہے۔

دوائے گلو :- طباشیر خالص، الپچی خورد، مغز کنول ڈوڈہ (سبز رنگ کا پتہ دُر کر کے) نس پال، کتھ سفید، گيرو، زیرہ سفید، جملہ ادویات سیادی وزن نے کر نہایت باریک پیس کر ان کے برابر بھری ملائیں، بوقت ضرورت بچے کے گلے پر چٹکی سے لگائیں گلے کے تمام امراض کے لئے مفید ہے۔ بڑے آدمیوں کو مغز المتاس پانچ تولہ ایک سیرپانی میں جوش دے کر غزغزے کرانا مفید ہے، علاوہ ازیں بچوں کے لئے صرف سوڈا بائیکارب کا سفوف لگا بھی مفید ہے دیگر :- المتاس کی گری (کالے رنگ کی ٹکیاں) پانچ تولہ، ایک سیرپانی میں اُبال کر چھان کر غرارے کریں، گلے آنا اور خناق کیلئے مفید ہے۔ دیگر :- پشکڑی، مازو، پھول اتار، چھلکا اتار، ہر ایک آدھا ماشہ، پانی ۲۵۰ گرام میں اُبال کر چھان کر غرارے کرائیں۔

آلو ر ویدک علاج بطریقی نانی علاج کے کریں۔

ہومیوپیتھک علاج :- پُرانی شکایت خنازیری مزاج والے بچوں میں پائی جاتی ہے، غدد پیلے و متورم، کلکیر یا فاس ۶x دماغی جسمانی طور پر گلے پر ٹنا عموماً کمزور بچوں میں سردی لگتے ہی گلے پر جائیں، براٹھا کرب ۳۰ - ۲۰۰ تازہ حالت جو کہ خاص طور پر دائیں طرف گردن اکڑ جانا اور سوزش ہو جانا، بیلا ڈونا ۳۰ - ۲۰۰ ورم شہد کی مکھی کے ڈنک مارنے کا سادہ دہو، پیشاب میں کمی ایپس ۳۰ - ۲۰۰ لوزتین متورم، پیپ پڑ رہی ہو، رال بجزت خارج ہو، سانس بدبودار، مرکبوس ۳۰ - ۲۰۰ اندر سے تمام منہ سفید گلے بڑھے ہوئے ہوں تو کالی میور ۶x کچھ نکلنے میں تکلیف، مزاج خنازیری براٹھا میور ۳۰ - ۲۰۰۔

غذا و پرہیز :- منہ اور گلے کے مریضوں کو غذا لطیف اور زرد دھنم اور مقوی کھلانی چاہیے۔ گردو، غبار، دھوئیں، متباکو، شراب، چائے، برف اور کھپکی و ترش چیزوں سے سخت پرہیز ضروری ہے، علاوہ ازیں چونکہ یہ مرض متعدی ہوتا ہے، اس لئے ایسے مریض یا مریضہ کا بوسہ نہیں لینا چاہیے۔

آواز کا بیٹھ جانا، سج الصوت، افونیا، (Efonia)

تعریف مرض :- اس مرض میں مریض کی آواز بالکل بیٹھ جاتی ہے۔

وجوہات :- نزلہ و زکام، حنجرہ کی ساخت میں خرابی، سردی لگنا، حنجرہ کا درم، زیادہ چیخنا چلانا، دھوئیں، غبار وغیرہ کا سانس کے اندر چھ جانا، سُرمہ یا سیندر کھا لینا، مرض دق کے آخری درجہ میں بھی آواز بالکل بیٹھ جاتی ہے۔

علامات :- اس مرض میں آواز نکالنا بالکل مشکل ہو جاتا ہے، اگر کوشش کی جائے تو بہت معمولی آواز نکلتی ہے اور مریض کا نا پھوسی کرتا ہے علاج :- اگر کسی بیرونی سبب، گرد و غبار، دھوئیں وغیرہ یا زیادہ تقریر کرنے سے ہو تو ان کو دور کریں اور ادراک چھائیں، اس سے آواز کھل جائے گی، اگر سیندر کھانے سے ہو تو متباکو کا جو ہر ایک چاول پان میں رکھ کر چبانا مفید ہے، شربت توت یا شربت بنفشہ پینے سے بھی آواز کھل جاتی ہے۔ علاوہ ازیں گل بنفشہ کی چائے بنا کر پینا اور یہی بنفشہ نیم گرم گلے پر باندھنا مفید ہے یا سرسوں کے تیل والے دیئے (دیپک) کا گل منہ مقدار میں پان میں رکھ کر کھلانا مفید ہے، بیرونی طور پر گلے پر روغن گل یا روغن کدو یا گھی گائے کی نیم گرم مالش کی جائے، مندرجہ ذیل گویا زبردست آواز کٹا ہیں :-

تان سین گولیاں :- ست لمبی بڑھیا چھ تولہ، لونگ ایک ماشہ، تخم الپچی خورد ایک ماشہ، کباب خنداں ایک ماشہ، ناگر موتھا ایک ماشہ، بال چھڑ ایک ماشہ، کستوری خالص ایک رتی، دار چینی ایک ماشہ، برادہ صندل سفید ایک ماشہ، ست پودینہ ایک ماشہ، زعفران خالص تین ماشہ

ترکیب :- تمام چیزوں کو کوٹ چھان کر روح کیوڑہ کی مدد سے مونگ کے دانہ کے برابر گولیاں بنائیں، ان گولیوں میں سے ایک دو گولی پان میں رکھ کر کھانے سے منہ میں خوشبو کی لپٹ پیدا ہونے کے علاوہ بند آواز کھل جاتی ہے، ہر قسم کی کھانسی اور پھیپھڑوں کے امراض میں مفید ہے۔ آواز کو ستریلی بناتی ہے۔ خولخان (جڑ پان) ایک گرام دن میں دو تین بار چبانے سے بھی آرام آ جاتا ہے۔

غذا و پرہیز :- گرم و ترش اشیاء سے پرہیز کریں، علاوہ ازیں چکنی چیزیں بھی نقصان دہ ہیں، خشک روٹی، مونگ کی دال، پالک کا ساگ وغیرہ زود ہضم اغذیہ دیں۔

مشکل سے نکلنا، ڈس فیجیا، (Dysphagia)

تعریف مرض :- اس مرض میں مرضی کے کھانے پینے کی قوت ناقص یا ختم ہو جاتی ہے۔

وجوہات :- ورم حلق، ورم مری، ورم لوزین یا نکلنے والے پھٹوں کا ورم، کمزوری، نزلہ، کن پیرے، گلے کا سرطان وغیرہ اس مرض کا باعث ہوتے ہیں۔

علامات :- پانی پینے یا کھانے وقت اچانک نکلنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ لغز گلے میں پھنس کر پریشانی اور بے چینی پیدا کر دیتا ہے، کھانا کھانے وقت یا پانی پینے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے، بعض دفعہ کھانا یا پانی ناک کے راستے خارج ہو جاتا ہے۔

علاج :- اصل سبب مرض کو دور کر کے اس کے مطابق علاج کریں۔ اگر ہسٹریا کی وجہ سے گلابند ہو تو اس کا علاج کریں، قبض ہو تو اسے دور کریں، ورم لوزین، ورم حلق، مری، حنجرہ ہو تو اس کا علاج کریں، اگر پھٹوں کی کمزوری سے یہ عارضہ ہو تو مقوی اعصاب ادویہ و غذیہ دیں۔ مری کی تنگی سے ہو تو خاص آلہ سے کشادہ کریں، سرطان کی وجہ سے ہو تو ابتدائی میں ایکس ریز سے علاج کرائیں، عام حالات میں شہتوت کے پتے تین تولہ، مسور سالم دو تولہ، پوست خشخاش چار عدد ایک سیر پانی میں جوش دے کر چھان کر اس پانی کے غرضے کریں۔

غذا و پرہیز :- بطور غذا صرف بخنی دیں یا ارہر کی دال اور گیہوں کی روٹی دیں، تیل کی دیر ہضم و ترش چیزوں سے سخت پرہیز کرائیں۔

کوا کرنا، الانگیش آف یوولا، (Elongation of The Uvula)

تعریف مرض :- اس مرض میں کوا ڈھیلا ہو کر ٹلک جاتا ہے۔

وجوہات :- حلق کی جھلی کمزور ہو کر ٹلک جاتی ہے، حلق کی پرانی سوزش، وجع المفاصل یا نفرس کے مادہ کا جسم میں موجود ہونا، عام طور پر اس کے ساتھ معمولی بخار بھی ہوتا ہے، بچوں میں سخت گرمی یا سخت سردی سے کوا ٹلک جاتا ہے۔

علامات :- کوا لمبا اور ڈھیلا ہو کر نیچے ٹلک جاتا ہے، جس سے حلق میں سرسراہٹ یا خراش ہو کر بار بار خشک کھانسی آتی ہے، جو عام طور پر چیت لیٹنے کی حالت میں زیادہ ہوتی ہے، کبھی کھانسی کی شدت سے متلی اور قے بھی ہو جاتی ہے۔

نوٹ :- گلے کی تمام بیماریوں میں کوٹے کا طبی معائنہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ عام حالات میں صرف کوٹے کے گر جانے سے حلق میں سرسراہٹ ہوتی ہے، جس سے بار بار کھانسی آتی ہے۔

علاج :- اس مرض کا علاج سوزش حلق کے مطابق کریں اور گلے کے امراض میں کھی گئی ادویات اس مرض میں بھی مفید ہیں۔

کاشک لوشن دو گرین فی اونس والا احتیاط کے ساتھ (پھریری کو جھٹک لیں تاکہ کاشک کا کوئی قطرہ اندر نہ چلا جائے) کوٹے پر لگائیں اور برومائیڈ آف امونیا ۲۰ گرین فی اونس پانی میں گھول بنا کر اس کے غرغزے کریں یا پھٹکڑی ۲۲ گرین، پوٹاسی کلوراس ۵۰ گرین فی اونس پانی میں گھول بنا کر اس کے غرغزے کریں، دن رات میں دو تین بار کوٹے پر گلیسرین آف ٹے نک ایڈ لگائیں، جس کا نسخہ درج ذیل ہے :-

گلیسرین آف ٹے نک ایڈ :- ٹے نک ایڈ ۲۰ گرین، گلیسرین ایک اونس باہم ملا کر شیشی میں ڈال لیں اور پھریری سے گلے میں لگائیں یا ٹنکچر آئیوڈین (سپرٹ ریجیٹ فائیڈ والا) کی پھریری کوٹے پر لگانا بھی مفید ہے، اگر کسی طرح بھی آرام نہ ہو تو عمل جراحی کرنا ہی سودمند ہے اور یہ یا پھٹکڑی کاٹ ڈالنا چاہیے، یہ عمل ایک مستند ڈاکٹر ہی بخوبی سرانجام دے سکتا ہے۔

دوائے عجیب :- پھول گلاب، مازو، سپاری، پھول انار، سماق دانہ، پھٹکڑی ہر ایک تین ماشہ، سوہاگہ ایک ماشہ، باریک سفوف بنائیں۔ اور انگلی گولگا کر مقام کوآپر لگائیں یا یہ دوا چمچ میں رکھ کر منہ کھول کر کوآ کے نیچے رکھ کر اوپر کوآٹھائیں، منٹوں میں فائدہ دینے والی چیز ہے۔ مندرجہ ذیل تجربات کو کرنے کے لئے نہایت کامیاب ہیں :-

۱۔ پھٹکڑی (باریک سفوف کی ہوئی) دو ماشہ، شہد خالص ایک تولہ باہم ملا کر روئی کی پھریری سے کوٹے پر لگائیں، دن میں دو تین بار لگانا کافی ہے، شہد کی جگہ گلیسرین ایک تولہ میں بھی تیار کر سکتے ہیں۔

۲۔ آئرن گلیسرین کی پھریری کوٹے پر لگانا مفید ہے یا ہن بقدر ضرورت رس نکالیں اس کے برابر شہد ملا کر روئی کی پھریری سے گلے میں لگائیں۔

۳۔ پھٹکڑی سفید، مازو سبز، پھول انار، سہاگہ، پھول سپاری ہر ایک ڈیڑھ ماشہ، سب کو ڈیڑھ پاؤنیم گرم پانی میں جوش دے کر چھان کر اس کے غرغزے کرائیں۔ دو تین بار کے استعمال سے کوآ اپنی جگہ پر آجاتا ہے یا پھٹکڑی سفید، دو ماشہ، پانی دو اونس میں گھول کر غرغزے کرائیں۔

۴۔ ملتانی مٹی (گاچنی) ایسٹول میں تر کر کے تالو پر لگائیں یا نشاستہ اور ملتانی مٹی پانی میں سرکہ انگری حل کر کے تالو پر لگائیں۔

۵۔ مسور، چھلکا اخروٹ، توٹ کے تازہ پتے بقدر مناسب پانی میں جوش دے کر اس کے غرغزے کریں۔

۶۔ مازو، پھول انار، سہاگہ بریاں ہر ایک ایک گرام، سفوف بنا کر ۱۲ ملی لیٹر پانی میں ملا لیں اور روئی کی پھریری سے گلے میں لگائیں۔ غذا و پریسز، گرم، ترش اور دیرینہ غذا سے پرہیز کرنا ضروری ہے، غذا زود ہضم اور مقوی دیں۔

ورم حلق شدید (در دگلو)، ایکوٹ فرنجائٹس (Acute Pharyngitis)

ورم حلق مزمن (پُرانا در دگلو)، کرائنک فرنجائٹس (Chronic Pharyngitis)

تعریف مرض :- اس مرض میں گلے میں شدید سوزش اور درد ہوتا ہے۔

وجوہات :- کسی خراش دار چیز کا حلق میں چلے جانا، کثرت بیڑی، سگریٹ و تنباکو نوشی، حلق کی سوجن، گرد و غبار کا پڑنا، خرابی خون، زکام،

خسرہ، چیچک کے علاوہ بعض دفعہ اونچی آواز سے بولنے یا چلانے، آئیوڈائیڈ اور سم انفار (سٹیمیا) کے مرکبات کے استعمال سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- معمولی لرزے سے بخار ہو جاتا ہے، حلق میں خشکی، کھڑکھری، گرانی، درد کی شکایت ہوتی ہے جس سے بار بار کھانسی آتی ہے۔ بولنا، کھانا، نگا

مشکل ہو جاتا ہے، منہ کا ذائقہ خراب اور سانس بد بو دار آتی ہے۔ اگر مریض کا جلدی علاج نہ کیا جائے تو مرض کی شدت کے باعث مریض کے دم گھٹ کر

جانے کا سخت خطرہ ہوتا ہے۔

علاج :- اس مرض کا علاج بطرز خناق ہے، گودہ المتاس وغیرہ کے غرضے کرائیں۔ گل بنفشہ پانچ ماشہ، ملٹھی چھلی ہوئی چھ ماشہ، زوفا پانچ ماشہ، چھلکا جڑ سونف پانچ ماشہ، عتاب سات دانہ، مویر منقی (بڑی منقی شدہ) ۹ دانہ، انجیر زرد دو عدد، سب کو آدھ سیر پانی میں جوش دے کر شربت اعجاز یا چینی سفید سے میٹھا کر کے پلائیں۔ اگر قبض ہو تو پھول گلاب اور گودہ المتاس دودھ میں جوش دے کر مناسب مقدار میں پلائیں، شربت قوت یا شربت عتاب کا استعمال بھی نافع ہے۔ گلے پر پلٹس باندھیں، پُرانے درد گلوں کے لئے گوند کثیرا، نشاستہ، گوند کیکر، ست ملٹھی، منیز کھیراجلد ہوزن، سب کو باریک سفوف سمراہ پانی ٹکیاں بنالیں اور مریض کو چوسنے کی ہدایت کریں۔ قوت سیاہ کے پتوں کا جوشاندہ بنا کر چھان کر غرضے کرانا بھی از حد مفید ہے۔

ڈاکٹری علاج میں گلے میں گلیسرین ٹئے نک ایڈ لگائیں، سوڈا سلی سلاس پانچ سے دس گرین پانی یا چائے یا دودھ سے کھلائیں، شدید حالت میں گلے پر پلٹس آف کے اولین لگائیں، سٹرپٹو پینی سلین کے عضلاتی انجکشن دینا فوری اثر رکھتا ہے، سلفا گروپ میں سے سلفا ڈایازین گولیاں دیں، پینی سلین لوزنجز منہ میں دانتوں کے باہر رکھ کر چوسیں۔ اس سلسلہ میں پروکین پینی سلین کا چار لاکھ کا عضلاتی انجکشن ہر ۲۴ گھنٹہ بعد دیں۔ دو تین انجکشن سے بالکل آرام آجاتا ہے۔ اگر تپ دق یا سہل کی وجہ سے درد گلوں ہو تو سٹرپٹو مائی سین ایک گرام ہر تیسرے دن عضلاتی انجکشن کریں، درد شدید ہو تو نوولجین یا ساربیڈان یا اسپرو کی ایک گولی کھلائیں۔ ایلم (پھسکڑی) دو ماشہ نیم گرم میں گھول کر غرضے کریں، پیڈنٹ ادویات میں منتقل لکورس لوزنجز (دست پودینہ، ست ملٹھی کی گولیاں) ایک یا دو گولی دن میں تین یا چار بار منہ میں رکھ کر چوسیں۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ گلے میں مینڈلز پیڈنٹ (آیوڈین پانچ گرین، آئیل منتھاپرپ پانچ سم، پوٹاسیم آیوڈائیڈ ۲۵ گرین، گلیسرین ایک اونس) پھیری سے لگائیں۔

۲۔ سٹرپٹو پینی سلین کا عضلاتی ٹیکہ ہر روز ۲۴ گھنٹہ بعد لگائیں۔

۳۔ نمک کو پانی میں گھول کر اس سے غرضے کرائیں۔

۴۔ ایکرو مائی سین (Achromycin) لیڈرے ————— کا ایک کیپ شولز بڑے آدمی کو ہر چھ گھنٹہ کے بعد دیں۔

۵۔ ٹیرامائی سین کیپ شولز، ایک کیپ شول بڑے آدمی کو ہر چھ گھنٹہ کے بعد دیں۔

۶۔ ٹراکس (Trox) برٹش ڈرگز ہاؤس ————— لوزنجز دن میں پانچ یا چھ دفعہ سے چوسیں۔

۷۔ سلفا ٹرائیڈ (Sulphatriad) گلے کی تکلیف میں جہاں بھی سلفا نامائیڈ تھیراپی کی صورت ہو، یہ تین قسم کے سلفازس مرکب ہے، گلے کے

ورم، درد کے لئے مفید ہے۔ اس کے ساتھ سوڈا بائیکارب لیسنے سے معدہ و آنتوں پر خراب اثر نہیں پڑتا یا سیپٹران گولیاں کا استعمال کریں۔

۸۔ سٹین پن ایس (Stenpens) بردزولیکیم ————— یہ سلفازو پینی سلین کا مرکب ہے۔ اور ہر قسم کی چھت لگنے کے شدید ورم اور

درد، ناک اور کان کی اندرونی و بیرونی سوجن کے لئے مفید ہے، ایک ایک ٹیکہ ہر چار گھنٹہ بعد دیں۔ شدید تکلیف میں دو ٹیکہ ایک ساتھ بھی دے سکتے ہیں۔

۹۔ میڈری لون (Midribon) روش ————— گلے کی شدید سراسیمہ میں پینی سلین سے بھی زیادہ مفید ہے، بڑوں کو ٹیکہ بچوں کو

سیال بلحاظ عمر و مرض دیں۔

۱۰۔ والوپن وی (Wyopen-vee) جان واسٹھ ————— پینی سلین کی یہ خاص قسم بذریعہ منہ لیسنے سے انتہائی فوری اثر دکھاتی

ہے، جتنا کہ پینی سلین کا انجکشن، اس لحاظ سے یہ خوردنی پینی سلین میں بہترین ہے، گلے کی خراش، درد، ورم، پُرانی کھانسی میں مفید ہے

ہر چھ گھنٹہ بعد ایک دو ٹیکہ دیں، بچوں کو بلحاظ عمر کم مقدار میں دیں۔

غذا و پرمہیز :- غذا و دہنم و مقوی دیں، تیل کی چکنی و ترش چیزوں سے سخت پرہیز کرائیں۔

حلق کی پھنسیاں، ثبور الحلق، گزے نیولر فرنجائیس،

(Granular Pharyngitis)

تعریف مرض :- اس مرض میں گلے کے اندر پھنسیاں نکل آتی ہیں۔

وجوہات :- یہ مرض اکثر اونچا بولنے والوں کو ہوتا ہے۔ واعظ، گوئیے، لیکچرار اس مرض میں زیادہ گرفتار ہوتے ہیں، کثرت منہ کو

نوشی و شراب نوشی بھی اس کے خاص اسباب ہیں۔

علامات :- حلق کے اندر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں نکل آتی ہیں، گلے میں سخت خراش ہو کر ہمیشہ کھانسی آتی رہتی ہے، مریض ہر وقت نکلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور گلے میں کوئی چیز اٹکی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جب مرض پُرانا ہو جاتا ہے تو حنجرہ میں ورم ہو کر آواز بالکل بیٹھ جاتی ہے۔

علاج :- بطور حلق سوزش کے ہے، زیادہ تکلیف کی صورت میں مینی سلین ہی اس کا موثر علاج ہے، چوسنے کے لئے بھی مینی سلین لوزنجز دی جائیں اور عمر کے مطابق پر دکن مینی سلین کے عضلاتی انجکشن بہت مفید ہیں، سلفا ڈرگز میں سلفا ڈایازین یا سپٹران گولیاں کا استعمال کیا جائے، اگر مرض پُرانا ہو جائے اور آرام نہ آئے تو ان پھنسیوں کو بجلی کے تار سے جلا دینا چاہیئے۔ یہ عمل ایک ہوشیار مسند ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے۔ دسی طریقہ علاج میں بنفشہ، گوند کثیر، ست لمبی، نشاستہ، مغز کھیرا، بیج خطمی ہر ایک ایک تولہ، لعاب ایسبغول کے ساتھ گولیاں بنائیں، اور تین چار گولیاں دن میں چوسیں۔

غذا و پرمہیز :- آب سرد، ترش و خشک اغذیہ سے سخت پرہیز لازمی ہے، غذا مقوی و زود ہضم دیں۔

خناق و بانی، روہنی، ڈف تھیریا، (Diphtheria)

تعریف مرض :- یہ ایک مسلسل متعدی دہائی بخار ہے، جس سے گلے میں شدید ورم ہو جاتا ہے۔

وجوہات :- اس مرض کا باعث ایک خورد بینی کٹرا ہے، جس کو "ڈف تھیریا بیسیس" کہتے ہیں، جو مریض کی ناک اور حلق کی رطوبت میں پایا جاتا ہے۔

علامات :- تالو، حلق اور حنجرہ کے اندر شدید ورم ہو جاتا ہے، جس سے کھانا پینا حتیٰ کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، منہ سے رال ٹپکتی ہے اور ہلکا یا تیز بخار ہو جاتا ہے، یہ مرض عام طور پر دو سے پندرہ برس کی عمر میں زیادہ ہوا کرتا ہے، چھوت لگنے سے ایک سے چھ دن کے بعد علامات مرض ظاہر ہو جاتی ہیں، شروع میں سستی، کاہلی، تپ اور درد سر کی شکایت ہوتی ہے، پھر حلق میں شدید ورم ہو جاتا ہے، اس مرض کی خاص تشخیص یہ ہے کہ حلق کے اندر ایک خاکستری یا زردی مائل فاسد جھلی پیدا ہو جاتی ہے، اور شدید درد گلو ہوتا ہے، تشخیص کے لئے اس جھلی کو ولایتی روئی (کاٹن) پر لے کر فوراً خورد بینی معائنہ کرنا چاہیئے یہ بیماری اتنی تیزی سے پھیلتی ہے کہ جسم کے دوسرے اعضاء کو بھی بے کار کر دیتی ہے۔ اس لئے ذرا سا شبہ ہونے پر فوراً علاج کی طرف متوجہ ہونا چاہیئے۔

علاج :- اس مرض کا شافی علاج ڈف تھیریا سیرم (Diphtheria serum) کا ٹیکہ ہے اور اس کی مقدار خوراک معالج کی رائے پر منحصر ہے۔

اس سلسلہ میں دو ہزار سے آٹھ ہزار یونٹ فوری طور پر دے دینی چاہیے۔ اور اس کے بعد بارہ گھنٹے کے اندر اندر مزید دو سے چار ہزار یونٹ کا انجکشن دینا ضروری ہوتا ہے۔ عام طور پر ایک بچے کے لئے ۲۵ ہزار یونٹ سیرم اور بالغ کے لئے ۵۰ ہزار یونٹ کافی ہوتی ہے، لیکن بعض ڈاکٹروں کی رائے میں ابتداء میں ہی بچے کے لئے دس ہزار یونٹ کی خوراک اور جوان کے لئے ۲۰ ہزار یونٹ کی مفید رہتی ہے۔ یہ سیرم مختلف طاقتوں کی صورت میں الگ الگ شیشیوں میں بازار سے عام مل جاتی ہے۔

یہی سیرم بطور حفظ مائع بھی استعمال کی جاسکتی ہے، اس مقصد کے لئے بچے کے لئے ۳۰ یونٹ اور نوجوان کے لئے ۵۰ یونٹ کا استعمال کافی ہے۔ اس کا یہ عارضی اثر صرف ڈیڑھ ماہ تک رہتا ہے۔

بعض اوقات اس سیرم کے استعمال سے شدید ردِ عمل ہوتا ہے۔ اس لئے معالجین کے لئے اس کی بھی احتیاط ضروری ہے۔ اگر ایک دو ہفتہ بعد جسم پر سُرخ سُرخ دھبے نمودار ہوں یا جوڑوں میں ورم اور خفیف درد ہونے لگے یا ہلکا بخار ہو جائے تو کیلشیم لکٹیٹ دس دس گرین کی مقدار دن میں دو تین بار دینے سے آرام آجاتا ہے، بچوں کو بلحاظ عمر دیں۔

علاوہ ازیں مریض کو ایک ہوا دار کمرے میں رکھیں اور اس کے حلق اور ناک کے مواد کے کپڑوں کو آگ میں جلا دیا کریں، تاکہ اس کی چھوٹ سے تندرست اشخاص محفوظ رہ سکیں، کمزوری دل کے لئے کورامین ایک سے دوسری کا عضلاتی انجکشن دیں، رفع ضعف کے لئے گلوکوز سولوشن کا وریڈی انجکشن بھی دے سکتے ہیں۔ کیوں کہ خناق وبائی میں گلوکوز بہترین مقوی قلب دوا ہے۔ اس کے علاوہ خون کے دباؤ کو بڑھانے کے لئے بھی گلوکوز سیال کا وریڈی انجکشن بہترین علاج ہے۔ خناق کے علاج میں سلفا ڈایازین دو ٹیکہ (معمولی سوڈا بائیکارب ملا کر) ہر چار گھنٹہ بعد اور پینسلین پانچ لاکھ یونٹ کا عضلاتی انجکشن بھی موثر علاج ہے۔ گلے میں مینڈلس پیٹ لگائیں، جس کا نسخہ "گلے پڑنا" کے علاج میں درج کیا جا چکا ہے۔

دلیسی علاج میں الملتاس کے غرغزے کرانا مفید ہے۔ مغز الملتاس چار تولہ پانی میں بھگو کر روغن بادام خالص چھ ماشہ، مصری تین تولہ ڈال کر پلائی اور مغز الملتاس کو گرم پانی میں گھسٹ کر گلے پر باندھیں یا مکوہ اور الملتاس کا گودا تلوں کے تیل میں پلٹس بنا کر نیم گرم گلے پر باندھیں گلے کے ورم اور خناق کے لئے یونانی طب میں ۹۰ فیصدی کامیاب علاج ہے۔

دوائے خناق :- ریٹھ کا بیرونی چھلکا ایک تولہ باریک سفوف بنالیں، نیم گرم پانی میں حل کر کے غرغزے کریں، شدید حالات میں گھنٹہ گھنٹہ کے وقفہ سے غرغزے کرائیں، اگر مریض بالکل بیہوش ہو تو اس کو مریض کے منہ میں ڈال کر مریض کے سر کو ہلائیں، قدرت کی مہربانی سے مریض کو جلد ہوش آجائے گا، حلق کھلنا جائے گا، ریٹھ کے غرغزوں سے بافراط لیس دار رطوبت خارج ہوتی ہے اور اس حالت میں ریٹھ کڑوا بھی نہیں لگتا۔

۱۔ معمولی خناق میں الملتاس کے غرغزے یا اسی کو پانی میں جوش دیکر اس کے غرغزے کرانا مفید ہے۔

۲۔ معمولی حالت میں شربت شہتوت کا استعمال بھی مفید ہے۔

۳۔ مکوہ بزر چھ ماشہ، گودا الملتاس چھ ماشہ، گودا الملتاس اور مکوہ کو دودھ گائے میں جوش دے کر غرغزے کرائیں یا پانی لین مفید ہے۔

۴۔ جدوار خطائی ایک تولہ، گودا الملتاس دو تولہ، مکوہ کے پانی دس تولہ میں پیس کر گلے پر صماد کریں، ہر قسم کے خناق کے لئے از حد مفید ہے۔

غذا و پرہیز :- مریض کو غذا لطیف اور زود ہضم دیں، مثلاً آش جو، شوربا، بخنی وغیرہ دیں، اگر اس کو غذا کے نگلنے میں تکلیف ہوتی ہو تو ناک کے راستہ اس کے حلق میں نمکی داخل کر کے اس کے ذریعہ دودھ وغیرہ مریض کے معدہ میں پہنچائیں۔

گل گھوٹو، کراو پ، (Croup)

تعریف مرض :- خناق و بانی کی طرح کی بیماری ہے، اس میں گلا زور سے گھٹنا نظر آتا ہے۔

وجوہات :- یہ مرض دیگر جراثیمی و بانی امراض کے دوران ہو جاتی ہے، مثلاً چیچک، خسرہ، محرّہ بخار اور کالی کھانسی وغیرہ۔

علامات :- گل گھوٹو کی علامات زکام سے ملتی جلتی ہیں اور خناق و اس میں اتنا فرق ہے کہ اس میں حلق کی کاذب جھلی کے متورم ہونے کے ساتھ ہی جھلی کی سوجن کی وجہ سے معمولی بخار ہوتا ہے، مریض کو گلا زور سے گھٹنا محسوس ہوتا ہے۔

علاج :- اس کا علاج زکام اور برانکائٹس کی طرح کیا جائے، ڈاکٹری طریقہ علاج میں سلفا ڈایازین دو گولی دن میں دوبارہ بانگوں کے لئے ۱/۲ سے ۱/۴ گولی دن میں تین بار چھوٹے بچوں کو دینی چاہیے، مرض کی شدت میں مینی سلین ایک لاکھ سے پانچ لاکھ یونٹ بلحاظ عمر ہر چھ گھنٹہ بعد یا پروکین مینی سلین چار لاکھ یونٹ ہر ۲۴ گھنٹہ کے بعد دینی مفید ہے یا سپران گولیاں یا ٹیسٹراسائیکلین کا استعمال کریں۔

بیرونی طور پر مکوہ و ملتاس کے گودہ کالپ یا بنفشہ باندھنا یا انٹی فلو جیٹین یا بانی فلو جیٹین کا پلستر لگانا بہت مفید ہے، خناق کی طرح مکوہ اور ملتاس کے جوشاندہ کے غرغرے بھی بہت مفید ہیں۔

غذا و پرہیز :- تیل کی چکنی و ترش اغذیہ سے سخت پرہیز کریں، غذا زود ہضم و مقوی دیں۔

کن پیرے، گل سوئے، مہیس، (Mumps)

تعریف مرض :- یہ ایک وبائی متعدی بخار ہے، جو عام طور پر موسم خزاں یا موسم بہار میں بچوں کو بکثرت ہوتا ہے۔

وجوہات :- اس مرض کا باعث ایک خوردبینی جراثیم ہے، جو مریض کی تھوک میں پایا جاتا ہے، درحقیقت یہ کان کی جڑ کا ورم ہے، چھوٹ لگنے کے ۱۸ روز بعد علامات مرض ظاہر ہو جاتی ہیں۔

علامات :- پہلے بخار ہوتا ہے، ایک کان کے سامنے درد ہو کر کان کے غدد متورم ہو جاتے ہیں اور گال و گردن سوج جاتی ہے، منہ کھولنے اور کھانے پینے میں سخت تکلیف ہوتی ہے، سانس سے بدبو آتی ہے، لعاب دہن بکثرت خارج ہوتا ہے چوتھے یا پانچویں دن بخار دور ہو کر علامات مرض میں تخفیف ہو جاتی ہے، بعض دفعہ اس مرض سے مردوں کے خضیوں میں سوزش ہو جاتی ہے اور عورت کے پستانوں میں ورم ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں پیشاب کی نالی سے بھی مواد آنے لگتا ہے۔

علاج :- مریض کو علیحدہ کمرے میں لٹائے رکھیں، سردی سے بچائیں، متورم مقام پر سیلا ڈونا گلیسرین لگائیں یا نیچر آئیوڈین دن میں دو تین بار پھیری سے لگائیں، آئیوڈکس کا بیرونی طور پر لگانا بھی مفید ہے، خوراک کی طور پر اگر بخار شدید ہو تو مندرجہ ذیل فیورکسچر دیں :-

پوٹاسیم سائٹریس دس گرین، لاسیکوارامیونیا ایسی ٹاس ۲۰، ہنم پیرٹ ایبقر نائٹراس ۳۰، میرپ ٹوٹو ایک ڈرام، ایکوا ایک اونس، ایسی ایک ایک خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دیں۔ اگر درد شدید ہو تو اسپرو یا سارڈین یا کوڈوپارین کی گولی دیں۔ "دولے درد سر" کا استعمال بھی بہت مفید ہے، جدید طریقہ علاج میں سلفا ڈرگز اور مینی سلین کا استعمال بہت مفید ہے، ہمارے تجربات کے مطابق سٹریپٹومائی سین (Streptomycin) کا استعمال یا سٹریپٹومینی سلین کا استعمال زیادہ موثر ہے۔ اس سلسلہ میں ہر ۲۴ گھنٹہ بعد سٹریپٹومینی سلین کا ایک عضلاتی انجکشن اور سلفا ڈایازین چار گولی دن میں دوبارہ (معمولی سوڈا

بائیکارب کے ساتھ) دیتا بہت مفید ہے۔ علاوہ ازیں سوڈا بائیکارب ایک ڈرام، بورکس ایک ڈرام، نیم گرم پانی دواؤں میں ملا کر کلیاں کرائیں، اس سلسلہ میں لیسٹین، لائی سول وغیرہ کے غزائے بھی مفید ہیں، بیماری کے بعد اگر سیرپ فرائی آئیوڈائیڈ کا استعمال کیا جائے تو بہت اچھا رہتا ہے۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ اس مرض کا بہترین علاج پینی سلین یا سٹریپٹومین سلین کا عضلاتی انجکشن ہے، بالغ مریض کے لئے سلفاڈایازین کی دو گولی صبح، دو دپہر اور دو شام کھانے کے لئے دیں، سوجن والی جگہ پر سیلاڈونا گلیسرین یا انٹی فلو جین یا بای فلو جین یا سیلاڈونا پلاسٹر لگائیں اور سینک کریں، شدت درد کے لئے کوڈو پارین یا سارٹان یا نوو جین یا سبالجین یا انا لجین یا اے پی سی کی ایک ٹمبیہ چلے سے دیں۔

۲۔ ایکرومائی سین (Achromycin) لیڈرے ————— کا ایک کیپ شولز ہر چھ گھنٹے بعد دیں۔

۳۔ ٹیرامائی سین ایس، ایف (Terramycin S. F.) فزر ————— علاج ۲ کی طرح استعمال کریں۔

۴۔ کلورومائی ٹین (Chloromycetin) پارک ڈیوس ————— علاج ۲ کی طرح استعمال کریں۔

۵۔ سیرمائی سین (Synermycin) فزر ————— کا استعمال ٹیرامائی سین (علاج ۲) کی طرح کریں۔

۶۔ لیڈرمامی سین (Ledermycin) لیڈرے ————— کا ۳۰۰ ملی گرام کا کیپ شولز دن میں دو بار دیں۔

دلیسی علاج میں ایسبغول کو دودھ میں پکا کر بطور مِلپش مقام ماؤف پر لگائیں، "بھیڈک" کا لیپ لگانا بھی مفید ہے، خوراک کی طور پر عنب سات دانہ، سوڑیاں ۱۱ دانہ، بی دانہ پانچ دانہ، تینوں کو غرق شاہترہ چھ تولہ، عرق مکو چھ تولہ میں جوش دے کر اور مل چھان کر شربت نیلوفر دو تولہ ملا کر اور خاکی پانچ ماشہ چھڑک کر صبح و شام پلائیں، بیرونی طور پر پنبشہ کی مِلپش کا باندھنا بھی بہت مفید ہے۔

غذا و پرہیز :- تیل کی ترش اور گرم اغذیہ سے سخت پرہیز کرائیں، غذا زود ہضم و مقوی دیں۔

خنازیر، کنٹھ مالا (منجیرا) سکروفولا، (Scrofula)

تعریف مرض :- اس مرض میں گردن کے غدد پھول کر مالا کی طرح ہو جاتے ہیں، کبھی کنج ران یا بغلوں میں بھی گلٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔
وجوہات :- جدید تحقیقات کے مطابق اس مرض کا باعث مادہ سل ہے، علاوہ ازیں آتشکی و شرابی والدین کے بچے بھی اس مرض میں اکثر مبتلا ہوتے ہیں اور اکثر یہ مرض موروثی بھی ہوتا ہے۔

علامات :- گردن کے غدد پھول کر مالا کی طرح ہو جاتے ہیں، گلٹیاں علیحدہ علیحدہ نظر آتی ہیں، کمزور بچوں میں جب سل کا مادہ موجود ہو تو گردن کے غدد پھول جاتے ہیں یا پیٹ میں گلٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس مرض کا علاج اگر استقلال کے ساتھ نہ کیا جائے، تو بچہ ہلاک ہو جاتا ہے۔

علاج :- جدید تحقیقات کے مطابق چونکہ خنازیر کے مادہ کو سلی مادہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لئے اس کے علاج میں سل وودق کی تمام ادویات شافی اثر رکھتی ہیں، اس سلسلہ میں سٹریپٹومائی سین ۱۲ سے ایک گرام کا عضلاتی انجکشن روزانہ کیا جاتا ہے، جس گلٹیاں تحلیل ہو جاتی ہیں، یہ مقدار خوراک بنیں، چالینس یا ساٹھ دن تک جاری رکھی جائے، کئی آدمیوں میں یہ دوا عرصہ تک جاری رکھنے سے قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے ایسی صورت میں یہ دوا بند کر دی جائے، عام طور پر یہ دوا زیادہ سے زیادہ چالینس یا بیالیس روز دینی کافی ہوتی ہے۔

آزونیکس بھی اس مرض کا جدید علاج ہے، ایک گولی دن بھر میں دو سے تین بار دی جائے۔ اس سے بخار کم ہو کر گلٹیاں تحلیل ہو جاتی ہیں، بیرونی گلٹیوں پر نیچر آئیوڈین روزانہ ایک بار لگاتے رہیں۔

تپ دق و خنازیر کے علاج میں نئی ادویات ریفامائی سین (Rifa Mycin)، آکسونیکس، آکسونیکس فورٹ (Isonex forte)، آکسوپار (Iso Par)، پاس کا استعمال کرایا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ طاقت کے لئے بیکاڈیکس یا بیکازام سی فورٹ یا بیکاسول کے کیپ شولز دیئے جاتے ہیں، ان سے مرض کنٹرول میں آجاتا ہے۔

جدید دلی علاج میں بڑی رو دنتی نے جو نام تھوڑے ہی عرصہ میں پیدا کیا ہے، وہ اور کسی دوا کے حصہ میں نہیں آیا۔ اس نے اس مرض کے علاج میں آکسونیکس اور سٹرپٹومائی سین سے بھی بڑھ چڑھ کر نام پایا ہے، اس سلسلہ میں رو دنتی پھلوں کا سفوف تیار کر لیں اور دو رتی سے پانچ رتی تک دن میں تین یا چار بار ہمراہ دودھ یا تازہ پانی کھلائیں یا اس بوٹی کو لے کر چھ ماشہ دوا ایک پاؤ پانی میں ڈال دیں۔ جب ایک چھٹانک رہ جائے تو جو شانہ نکھار کر آدھے سے ایک تولہ استعمال کریں یا سفوف بڑی رو دنتی دس تولہ، سفوف چھلکا جڑ چھوٹا چندرا پانچ تولہ، سفوف ہلدی خام (لمبی و پتلی گانٹھوں والی) پانچ تولہ، شیر مدار (دودھ آک تازہ) چھ ماشہ سب کو ملا لیں، دوائی تیار ہے، خوراک تین سے آٹھ گرین تک، حسب برداشت دن میں دو سے تین بار کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں، ہمارے تجربات کے مطابق بڑی رو دنتی تپ دق کے کنٹھ مالا کے علاوہ پھنسیوں، زخموں، چوٹ، چہرے کے مہاسوں، گلیٹیوں اور جذام کے لئے نہایت مفید ہے۔

نوٹ :- اگر سفوف بڑی رو دنتی کی ہر خوراک کے ساتھ ایک رتی سورن بسنت مالتی رس استعمال کرایا جائے، تو زیادہ

جلدی فائدہ کرتی ہے۔

دوائے خنازیر :- مینڈک کلاں ایک عدد دے کر اس کے منہ میں رس کپور، دارچینا ہر ایک چھ ماشہ، سم الفار چھ ماشہ بھر کر منہ بند کر دیں، اور اس کو گوزہ گلی میں بند کر کے اچھی طرح گل حکمت کریں۔ خشک ہونے پر دس سیراپوں کی آگ دیں، ادویات کشتہ ہوں گی، سرد ہونے پر احتیاط سے نکال لیں۔ مینڈک کی راکھ علیحدہ رکھیں، پھر اس کشتہ کو عرق شاہترہ تین تولہ میں اچھی طرح حل کریں، خشک ہونے پر محفوظ رکھیں، خوراک ۱/۲ چاول سے ۱ چاول ہمراہ مکھن گائے (تازہ) کے ساتھ استعمال کریں، چونکہ اس نسخہ میں تمام ادویات زہریں ہیں، اس لئے اسے با احتیاط تیار اور استعمال کرنا چاہیئے، ہر سات دن کے بعد دو دن دوا بند رکھی جائے، مریض کو گھی دودھ بکثرت استعمال کرائیں۔

صنماد خنازیر :- مندرجہ ذیل صنماد تیار کر کے اگر روزانہ گلیٹیوں پر لپک کیا جائے تو گلیٹیاں باسانی دب جاتی ہیں،۔

جدوار، رسونت، صندل، سرخ، گل ارمنی، ریوند چینی، ہورن پانی کے ساتھ گاڑھالپ تیار کر کے لگایا جائے۔

دوائے خنازیر :- چوب چینی، انستین رومی ہر ایک دو تولہ، شاہترہ چار تولہ، تمام ادویات کو خوب کوٹ کر دو سیراپانی میں تر کر کے رات کو رکھ دیں، صبح نرم نرم آگ پر جوشائیں، جب ۳ سیراپانی باقی رہ جائے تو مل چھان کر ۳ سیر چینی سفید (کھانڈ) ڈال کر شربت کا توام کریں، بقدر تین تولہ ہمراہ عرق منڈی دس تولہ یا سادہ پانی، مگر اسے جلاب دینے کے بعد (تاکہ فضلات خارج ہو جائیں) استعمال کریں، رات کو اطریفل شاہترہ کی ایک خوراک روزانہ دیں، بیرونی گلیٹیوں پر اسگندھ ناگوری گائے کے پیشاب کے ساتھ گھس کر صماد کرتے ہیں، اس پر تین ماہ عمل کریں، مگر اس میں ناغہ ہرگز نہ ہو۔

مرہم خنازیر :- سیاہ مرچ، نیلا تھوتھا، مہندی ہر ایک ایک تولہ، جملہ ادویات کو ایک جگہ خشک پیس کر دس تولے مکھن میں (جو تھوڑا سا پانی دھو لیا گیا ہو) مرہم بنا کر حسب ضرورت کسی کپڑے کے ٹکڑے پر لگا کر زخم پر چپکا دیں، اگر گلیٹیاں ہوں تو ان پر پیچھے لگا کر مرہم لگائیں، جب زخم مندمل ہونے شروع ہوں تو خوراک کی طور پر عرق صفی خون دس تولہ ہمراہ شربت عناب دو تولہ پلائیں۔

مرہم خنازیر (کنٹھ مالا) کم خرچ بالانشین ہے، ابتداء میں زخموں کو صاف کرتا ہے اور آخر میں انہیں مندمل کر دیتا ہے۔

علاوہ ازیں "جڑ گل عباسی" تنقوک میں گھس کر گلیٹیوں پر لگانا مفید ہے، اگر گلیٹیاں پھوٹی نہ ہوں تو پیچھے لگا کر استعمال کریں، زخمی گلیٹیوں کو روزانہ

نیم کے نیم گرم پانی سے دھو کر سلی سپرٹ میٹی لیڈ سے پی کر دنیا مفید ہے۔ نسخہ درج ذیل ہے :-

زخموں کے لئے پیلا گھول :- اجیری نلے دین دو ماشہ کو چار اونس سپرٹ میٹھی لیٹید میں حل کر لیں، پیلے رنگ کا گھول بن جائے گا۔ ڈاکٹر زخموں پر اس گھول کی پٹی کرتے ہیں، ہر روز پٹی بدلنے سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔

غذا و پرہیز :- زردہنم و مقوی غذا دیں، دیر سہم اور نفاخ چیزوں سے سخت پرہیز کرائیں۔

آسان و آزمودہ مجربات امراضِ گلو

زخمرہ کی شدید سوجن :- مغز المتاس پانچ تولہ آدھ سیر دودھ گائے میں جوش دے کر غرغزے کرائیں، سڑ بٹو پینی سلین یا پردکین پینی سلین کے عضلاتی انجکشن کریں۔

زخمرہ کی پانی سوجن :- علاج بطرز ورم گلو کے کریں، پینی سلین اور سلفا ڈرگز کا استعمال مفید ہے۔

زخمرہ کی پانی سوجن :- علاج بطرز زخمرہ کی شدید سوجن کے کریں، شدید درد کی حالت میں انٹی فلو جٹین پلستر گلے پر باندھیں۔

زخمرہ کی پانی سوجن :- یہ مرض زیادہ تر کمزور اور نازک بچوں کو ہوتا ہے، دورہ مرض کے وقت بلحاظ عمر تین چار سال کے بچے کے لئے پوٹاشیم برومائیڈ دو گرین، کلورل ہائیڈریٹ دو گرین، سیرپ آر نشائی سات بوند، پانی ایک ڈرام میں ملا کر پلائیں، یہ ایک خوراک ہے، اگر بچہ کمزور ہو تو اڈیکسولین وغیرہ دیں۔ اگر سپٹ میں کیڑے ہوں تو اس کے مطابق علاج کریں۔

زخمرہ کی جھلی دار سوجن :- علاج بطرز خناق کے کریں اور جو مجربات خناق میں دیئے گئے ہیں، اس مرض میں بھی مفید ہیں۔

ورم لوزیتین رمی :- علاج بطرز ورم لوزیتین (گلے پڑنا) کے کریں۔

ورم حلق شدید و مزمن :- علاج بطرز ورم لوزیتین کریں۔ مغز المتاس کے غرغزے مفید ہیں۔

غذا کی نالی کی سوجن (ورم المری)، ایسا فیکاسٹیس (Acsophagits)

اس مرض کو نمونیر سے تشخیص کرنا ضروری ہے، ابتداً مرض میں شیرہ تخم خرفہ سیاہ پانچ ماشہ، آب کاسنی یا آب مکوہ سبز سات تولہ میں المتاس کا گودہ تین تولہ ملا کر شربت نبفشہ دو تولہ ملا کر پلانا بہت مفید ہے۔

وہ تمام ادویات جو ورم لوزیتین کے بیان میں لکھی گئی ہیں، مفید ہیں۔ جدید طریقہ علاج میں سلفا گروپ یا سپیران دیں، پینی سلین کے عضلاتی انجکشن بھی مفید ہیں، پینی سلین لوزنجز چوسنے کے لئے ہدایت دیں۔

غذا کی نالی دگلنے کی سوجن کے لئے آسان علاج درج ذیل ہیں :-

۱۔ پوست خشخاش دس گرام کو ۲۰۰ گرام پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور دن میں دو تین بار غرغزے کرائیں۔


۲۔ اجوائن دیسی ۲۵ گرام کو ۲۰۰ گرام پانی میں جوش دیں اور منہ میں اس کا بھپارہ لیں اور چھان کر غرارے بھی کرائیں۔

۳۔ شربت توت سیاہ ۲۵ گرام دن میں دو بار لیں۔

۴۔ لہسن کو پیس کر رس نکال لیں اور اس کے برابر شہد ملا کر روٹی کی پھریری سے گلے میں لگائیں

۵۔ شہتوت سیاہ کا استعمال گلے کی سوجن، غذا کی نالی کی سوجن اور خناق سے محفوظ رکھتا ہے۔

۶۔ کچے شہتوت کا رس نکال کر پلانا غذا کی نالی کی سوجن و درد گلو میں بہت ہی مفید ہے۔



سوال و جواب

سینے کی بیماریاں

کھانسی، سعال، برونکائٹس، (Bronchitis)
کھانسی، سرفہ، کف، (Cough)

تعریف مرض :- کھانسی ایک حرکت ہے، جو آلات تنفس خاص طور پر پیپھڑوں کے تکلیف دہ مادہ کو دور کرتی ہے، درحقیقت کھانسی ایک علامت مرض ہے جو آلات تنفس کی بیماریوں میں پیدا ہوتی ہے۔

وجوہات :- سردی لگنا، دائمی نزلہ و زکام، گرد و غبار، گرم و سرد ہوا، دھواں، محرکہ بخار، نزلہ و بانی، خسرہ، مونہ، پوریسی، امراض قلب، امراض آلات تنفس، معدہ، جگر، دم گردہ اور بعض دفعہ و بانی طور پر پھیل جاتا ہے۔

کھانسی کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ خشک اور تر، خشک کھانسی میں خشک دھسک ہوتا ہے اور اگر توجہ سے علاج نہ کیا جائے تو پیپھڑوں میں زخم پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تر کھانسی اکثر بوڑھوں اور بچوں کو موسم سرما میں ہوتی ہے اور سفید زردی مائل بلغم نکلتا ہے، اگر اس طرف توجہ نہ دی جائے تو یہ عارضہ پرانی کھانسی میں تبدیل ہو جاتا ہے، کھانسی کی کئی اقسام ہیں جن کا بالتفصیل بیان درج ہے۔

سردی کی کھانسی :- یہ اکثر زیادہ عمر کے اصحاب کو سردیوں میں ہوتی ہے اور رات کو سونے وقت اور صبح کھانسی زیادہ ہوتی ہے، سفید زردی مائل بلغم خارج ہوتا ہے۔

بلغمی کھانسی :- سانس کی تنگی ہوتی ہے، بلغم زیادہ خارج ہوتا ہے اور کھانسی بار بار اٹھتی ہے۔

خشک کھانسی :- جیسا کہ ہم لکھ آئے ہیں کہ اس کھانسی میں خشک دھسکہ ہوتا ہے اور بلغم بہت کم خارج ہوتا ہے، یہ عارضہ امراض گردہ، امراض دل اور نفرس کے مریضوں کو زیادہ ہوتا ہے۔

پُرانی کھانسی :- اس کھانسی میں آلات تنفس خصوصاً ہوائی نالیوں کی اندرونی جھلی میں پُرانی سوجن ہو جاتی ہے کمزور مریضوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ شدید کھانسی :- بار بار کھانسی اُٹھتی ہے، جس سے ہوائی نالیوں کے اندر سوجن ہو جاتی ہے، بچوں، بوڑھوں اور کمزور اشخاص کو زیادہ ہوتی ہے، مرض کی بڑھی ہوئی صورت میں بخار بھی ساتھ ہوتا ہے۔

کالی کھانسی :- اکثر بچوں کو ہوتی ہے اور دورہ سے ہوتی ہے، کھانستے کھانستے قے بھی ہو جاتی ہے، چہرہ متورم اور نیلا ہو جاتا ہے۔ آواز سیٹی کی طرح نکلتی ہے۔

نزلہ کی کھانسی :- یہ نزلہ وز کام سے ہو جاتی ہے۔

دق کی کھانسی :- یہ کھانسی تپ دق میں ہوتی ہے۔ اس طرح محرقہ وغیرہ میں جو کھانسی ہوتی ہے وہ محرقہ کی کھانسی کہلاتی ہے، اور عام بخاروں میں جو کھانسی ہوتی ہے وہ بخار کی وجہ سے ہوتی ہے۔

علامات :- شدید کھانسی میں پھیپھڑے کی بڑی اور درمیانی یا چھوٹی نالیوں میں سوجن ہو جاتی ہے، سانس تکلیف سے آتا ہے۔ درد سر اور بخار ہوتا ہے، کبھی متلی بھی ہو جاتی ہے۔

علاج :- اصل سبب مرض کے مطابق علاج کریں، اگر کھانسی کا مادہ پتلا ہو تو اُسے گاڑھا بنائیں، تاکہ قابلِ اخراج ہو جائے، اگر بہت گاڑھا ہو تو پتلا کر کے خارج کرنے کی کوشش کریں۔ اور بلغم خارج کرنے کے لئے یہ نسخہ دیں :-

مخرج بلغم کسچر :- پوٹاسیم آیوڈائیڈ پانچ گرام، امیونیا کارب تین گرام، پنکچر آف اپی کاک دس گرام، سٹرامونیم دس گرام، گلیسرین تیس گرام، ایکو ایک اونس، ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین بار دیں، بہترین مخرج بلغم ہے۔

دیگر :- امیونیا کارب تین گرام، وائٹ اپی کاک دس گرام، سیرپ ٹو لو ۲۰ گرام، اکوکلوروفارم آدھا اونس، سرچار گھسنٹ کے بعد ایسی ایک ایک خوراک جوان مریضوں کو دیں۔

دیگر :- پوٹاسیم آیوڈائیڈ پانچ گرام، امیونیا کارب پانچ گرام، پنکچر اپی کاک دس گرام، سیرپ ٹو لو ساٹھ گرام، کلوروفارم وائٹ ایک اونس، بلغم نکلانے کے لئے کنگ ایڈورڈ ہسپتال ممبئی کا مشہور نسخہ ہے۔

مریض کو گرم کپڑے پہنائیں، سردی سے محفوظ رکھیں، یعنی منٹ ٹرین ٹائن دن میں تین بار چھاتی پر ملیں، پنکچر بنزدون کمپونڈ ایک ڈرام، دس چھٹانک، حوالتے ہوئے گرم پانی میں ڈال کر اس کی بھاپ کو سونگھیں، امیونیا کارب سنگھانا بھی مفید ہے۔ افڈرین ہر گرام سے ہر گرام بھی کھانسی کے لئے مفید ہے۔

جب ہوائی نالیوں میں بلغم کثرت سے جمع ہو تو افیون وغیرہ استعمال نہ کرائیں، ہوائی نالیوں میں سوزش اور درم کی وجہ سے کھانسی ہو، تو پروکین نیسلین چار لاکھ یونٹ یا سٹریپٹومین سلین کے عضلاتی انجکشن روزانہ ایک بار دینے مفید ہیں۔ عام طور پر دو تین انجکشن سے ہی آرام آ جاتا ہے، سلفا تھایا ول یا سلفا ڈایازین یا سلفا ٹرائیڈ دو گولی مناسب سوڈا بائیکارب میں ملا کر دن میں تین بار استعمال کرنا بھی مفید ہے۔

پیٹنٹ ادویات میں گلائیکو ڈین ٹرپ و ساکا، نلکو ڈین ٹرپ و ساکا، ٹوسانول، زلیفرول سیرپ وغیرہ کھانسی کے لئے مفید ادویات ہیں۔ رادوا کے ساتھ پرچہ ترکیب استعمال ہوتا ہے، اس کے مطابق استعمال کریں۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ بیناڈرل کف سیرپ (پارک ڈیوس) ۳۰ بوند، زلیفرول کف سیرپ (ایم بی) ایک چائے کا چمچ، دونوں کو

ہائیم ملا کر دن میں دو بار دیں، یہ بلغم خارج کرنے کے علاوہ دافع حساسیت ہے، دمر کی کھانسی، نزلہ، زکام کی کھانسی میں مفید ہے، اگر کھانسی میر بخار ہے تو سسٹریٹو پینی سلین کا عضلاتی انجکشن دیں، یہ انجکشن تب دق کی کھانسی کے لئے بھی مفید ہے۔

۲۔ فین سیڈل (Phensedyl) سے اینڈ بیکر ————— خشک اور ترددوں مستم کی کھانسی میں مفید ہے، دمر کی کھانسی میں بھی مفید ہے۔ ایک یا دو چمچ دن میں تین بار دیں۔

۳۔ بیناڈرل ایکسپیکٹورنٹ (Benadaral Expectorant) پارک ڈیوس ————— ایک یا دو چمچ دن میں تین بار دیں یا زیٹ ایکسپیکٹورنٹ یا سوڈن ٹال ایکسپیکٹورنٹ استعمال کریں یا ڈوسن ایکسپیکٹورنٹ دیں، بچوں کے لئے ٹیکسیلیکس کا استعمال کریں۔

۴۔ پیری ٹان ایکسپیکٹورنٹ (Piriton Expectorant) گلیکو ————— ایک چمچ دن میں تین سے چار بار دیں۔

۵۔ کف کیور، اے (Cof Cur-A) یونیکم ————— ایک چمچ دن میں تین سے چار بار دیں۔

۶۔ کوریکس کف سیرپ (Corex Cough syrup) فرزر ————— ایک چمچ دن میں تین سے چار بار دیں۔

۷۔ گلائی کوڈین ٹرپ و سا کا (Glycodin⁺ Terpvaska) المبیک ————— ایک دو چمچ دن میں تین سے چار بار دیں۔

۸۔ کاسابن (Kasabin) بنگال کیمیکل ————— دو چمچ دن میں تین سے چار بار دیں۔

۹۔ سیولان لوزنجز (Savlon Lozenges) ایک لوزنجز دن میں تین یا چار بار چوسیں۔

۱۰۔ ٹوسیکس (Tossex) سارا بھائی ————— بلغم نکالنے و کھانسی کے لئے مفید شربت ہے۔ ایک چائے کا چمچ دن میں دو سے

تین بار دیں۔

۱۱۔ ڈیٹی گون (Detigon) بایر انڈیا ————— کھانسی کے لئے یہ کوڈین سے بہتر ہے، مخالف اثرات سے خالی ہے۔ روزانہ

۲۰ تا ۳۰ بوند دیں۔ بچوں کو ۳ تا ۵ بوند دیں۔

۱۲۔ زلفیرول (Zephrol) سے اینڈ بیکر ————— ایک چمچ دن میں تین بار دیں۔

۱۳۔ پرانی کھانسی کے لئے سیرولین (Sirolin) روش ————— ایک یا دو چمچ دن میں تین بار استعمال کریں یا واٹربری کپ

ریڈ لیبیل ایک سے دو چمچ دن میں تین بار دیں۔

یونانی علاج :- بلغم کی زیادتی کی حالت میں پھول گاؤ زبان، گاؤ زبان، طمٹی (چھلی ہوئی) ہر ایک پانچ ماش، عناب پانچ دانہ، کھانڈ

دو تولہ پانی میں جوش دے کر صبح و شام پلائیں، سوتے وقت لعوق پستان ایک تولہ، لعوق معتدل ایک تولہ، عرق گاؤ زبان دس تولہ میں جوش

کر پلائیں، چھاتی اور دماغ کو سردی سے بچائیں، گرمی یا خشکی کی وجہ سے ہو تو اس کے مطابق علاج کریں۔

مندرجہ ذیل نسخہ جات حسب موقع استعمال کریں :-

شربت اعجاز (جدید) :- عناب ولایتی ۴۰ دانہ، سوڑیاں ۱۲۰ دانہ، گوند کیکر ہر ایک ایک تولہ آٹھ ماش، بی دانہ دو تولہ ۱۱۰

طمٹی چھلی ہوئی، تخم خطمی، تخم خبازی، گل نیلوفر، گل بنفشہ ہر ایک چار تولہ ایک ماش، برگ اڑوسہ (بالنہ کے تازہ و خشک پتے) ایک سیر، کھ

(دانہ دار چینی) تین پاؤ۔ گوند کیکر اور گوند کیترا کے علاوہ سب دواؤں کو جوش دے کر صاف کریں اور بطریق معمول چینی ملا کر توام کریں اور گوند کیکر اور

کیترا کو پس کر شامل کریں۔ ایک تولہ شربت عرق گاؤ زبان پانچ تولہ میں ملا کر استعمال کریں، خشک کھانسی کے لئے نافع ہے اور سہل ودق میں بہت مفید

ستوپلا دی چورن :- گوزہ مصری سولہ تولہ، طباشیر اصلی آٹھ تولہ، پپی چار تولہ، دانہ الاچی خورد دو تولہ، دار چینی ایک تولہ، سب کو بار

پس کر کپڑ چھان کر لیں، خوراک دو سے چار ماش دن میں تین بار ہمراہ شربت گل بنفشہ یا تازہ پانی دیں۔

فوائد:- تپ دق، پرانی کھانسی، بخار ہر قسم، دمر، امراض گلو، کمزوری، حوصلہ کمزوری کو دور کرتا ہے، بلغمی بخاروں میں یہ چورن بڑا
گوارا اثر دکھاتا ہے، انفلوئنزا اور نمونیہ میں بلغم کو خارج کر کے تسکین دیتا ہے، طب آئور وید میں قابل تعریف نسخہ ہے۔

حب کھانسی:- سفوف ملٹھی (چھلی ہوئی) پانچ تولہ، کاکڑاسنگی سفوف دو تولہ، نشاستہ دو تولہ، شکر تیغال دو تولہ، چینی بیس تولہ، ست
مینہ تین ماشہ، سب کو ملا کر گولیاں یا مشین سے ٹکیاں تیار کر لیں، منہ میں رکھ کر چوسیں، ہر قسم کی کھانسی میں مفید و موثر ہے اور ہماری معمولی مطلب ہیں۔
دوائے کھانسی:- بلدی، اجوائن، نمک خوردنی ہر ایک چھ ماشہ، تینوں کو مٹی کے کوئے سکوئے میں جلا لیں اور ایک ایک چٹکی دن میں دو
بار کھلائیں۔ پرانی بلغمی کھانسی کو مفید ہے۔

دیگر:- نوشادر ٹھیکری ایک تولہ کو دس تولہ کھانے والے نمک کے سفوف کے فرش و محاف میں لوہے کے نوپر رکھ کر تین چار گھنٹہ مدھم آگ
میں اور ٹھنڈا ہونے کے بعد نکالیں، نوشادر سنہری رنگ لئے ہوئے برآمد ہوگا۔ اسے پیس کر شیشی میں حفاظت سے رکھیں، خوراک ایک سے دو
گھنٹہ میں ملا کر نیم گرم پانی سے کھلائیں، بلغمی مزاجوں میں شہد میں ملا کر چٹائیں، بے حد مفید ہے۔

جوشاندہ کھانسی:- دارچینی چار ماشہ، بلی دانہ چار ماشہ، ملٹھی (چھلی ہوئی) ایک تولہ دو ماشہ، انجیر دس عدد، خشکاش تین ماشہ، مصری دو تولہ،
سیرانی میں جوشاندہ بنائیں، صاف کر کے بقدر پانچ تولہ استعمال کریں۔ دن میں تین بار استعمال کریں، ہر قسم کی کھانسی کے لئے مفید ہے۔
دیگر:- سفوف کاکڑاسنگی ایک تولہ، شہد ایک تولہ ہر دو کو ملا کر کھانسی کے مریض کو چٹانا کھانسی کے لئے بہت مفید ہے یا ملٹھی شدھ کا آٹا
میں ملا کر چٹائیں۔

آئور ویدک طریقہ علاج میں دارکشاسو و چیون پر اش بھی مفید ادویات ہیں، بچوں کی کھانسی کے مندرجہ ذیل نسخے مجرب و معمولی مطلب ہیں:-
سفوف کاکڑاسنگی، ملٹھی چھلی ہوئی کا آٹا برابر ملا کر بقدر ایک رتی سے دورتی ماں کے دودھ میں حل کر کے دیں یا لذت شہد خالص ملا کر چٹائیں۔
ادرک کارس ایک چمچ، شہد خالص ایک چمچ دن میں تین بار لیں، موسم سرما کی کھانسی کا مجرب علاج ہے۔ بچوں کو بلحاظ عمر دیں۔
سونٹھ بریاں، کاکڑاسنگی بریاں ہر ایک ایک ماشہ پیس کر شہد چھ ماشہ میں ملا کر بچوں کو چٹائیں۔

ڈامن اے اور ڈی کے مرکبات پھیپھڑوں کی تقویت کے لئے بہت مفید ہیں۔ اس سلسلہ میں بڑوں کے لئے اڈیکسولین کیپ شول اور بچوں کے لئے
ولین کلوڈ استعمال کریں۔

آئور ویدک علاج:- بستو پلا دی چورن تین سے چار ماشہ شہد میں ملا کر دیں۔ لونگ آدی وٹی ایک یا دو عدد منہ میں رکھ کر چوسیں۔ شدید
دور کے لئے کف کیٹورس ایک رتی ہمراہ شہد دیں۔ بلغمی کھانسی و بلغمی بخاروں کے لئے چند رامت رس دو سے تین گولی منہ میں رکھ
لیں۔ کھانسی، زکام و دمر کے لئے دیوش آدی گٹکا ایک سے دو گولی تین سے چار بار دیں۔ کالی کھانسی و دمر کے لئے بانسہ
دورتی کی مقدار میں دیں۔ بچوں کی کھانسی و دودھ اٹھانے کے لئے کرشنا آدی چورن ایک سے دورتی دیں۔

ہومیوپیتھک علاج:- شروع مرض خشک کھانسی پانی پینے سے اور رات کو اضافہ، سخت بے چینی ہو تو ایکونائٹ ۳۰۔ خشک
آدھی رات کے بعد تیزی ہو تو آرنگ ایلپ ۳۰۔ ۲۰۰۔ خشک کھانسی اور اس کے ساتھ چھاتی میں سٹوپیاں چھینے کا سادہ کھانے
سینہ دبانا پڑے تو برائی اوینا ۳۰۔ ۲۰۰۔ سردی کے ساتھ زکام و کھانسی، پیاس نہ ہو تو ڈلکامارا ۳۰۔ ۲۰۰۔ بلغم
مگر خارج نہ ہو، گلا د چھاتی بلغم سے پر ہو تو اینیم ٹارٹ ۳۰۔ ۲۰۰۔ نیند کی حالت میں خشک کھانسی بچہ چڑچڑا، گود بند کرے تو کمپولما ۳۰۔ ۲۰۰۔
غذا پر ہیز:- مونگ کی دھوئی دال، گوشت کا شوربا، چپاتی، پالک، بھجوتے کا ساگ و غیرہ دیں اور سرد، بادی، دیرینہ اور بلغم پیدا کرنے والی
سے بچیں، سرد ہوا سے بچیں، سرد پانی نہ پیئیں۔

شواس روک، دمہ، ضیق النفس، ایسٹھا، (Asthma)

تعریف مرض :- سانس کی تنگی کے دورے ہوتے ہیں اور سانس بالکل مشکل سے آتا ہے۔

وجوہات :- گاڑھی بلغم، سینہ اور پیچھے کے امتلا، جنرل کمزوری، پیچھے کی خشکی یا ورم، گردوغبار سرد ہوا کا لگنا، گلے کے غدودوں کا بڑھ جانا، نزلہ وزکام، کھانسی، خرابی معدہ، قبض وغیرہ، بعض افراد کو گھاس، مٹا کو وغیرہ کی بو سے بھی دورہ ہو جاتا ہے۔ بچوں کا دمہ اکثر ان کے سونے کے کمرہ میں پٹی، کتا، بھیڑ، بکری یا کسی اور پالتو یا خانگی جانوروں کی موجودگی اس مرض کا سبب بن جاتی ہے۔

علامات :- عام طور پر دورہ مرض رات کے پچھلے حصہ میں ہوتا ہے۔ جب مریض نیند میں ہو، اگر دورہ اس وقت ہو جب مریض بیدار ہو تو عام طور پر بار بار سفید پیشاب آتا ہے۔ ناک یا ٹھوڑی میں خراش، کمزوری، بے چینی اور پریشانی ہوتی ہے۔ دورہ مرض کی صورت میں مریض تنگی سے سانس لیتا ہے مریض کا دم گھٹنے لگتا ہے اور چہرہ پیلا، ہونٹ اور کان نیلے ہو جاتے ہیں، پسینہ آتا ہے، دورہ ۳۰ سے ۶۰ منٹ اور کبھی زیادہ دیر اور ۲۴ گھنٹہ تک بھی ہو سکتا ہے۔ مریض سو نہیں سکتا اور بستر میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ کھانے کھانے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ پھر معمولی سا بلغم خارج ہوتا ہے اور پسینہ آکر دورہ مرض دور ہو جاتا ہے۔

نوٹ :- بعض دفعہ دم گردہ کے مریضوں کو بھی سانس کی بے قاعدگی کا عارضہ ہو جاتا ہے، لیکن دمہ سے مختلف ہوتا ہے اور

دمہ کی ادویات سے فائدہ نہیں ہوتا، اس لئے اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔

علاج :- اس مرض کا اصولی علاج یہ ہے، کہ دورہ مرض کی تکلیف کو کم کریں۔ مدت دورہ کو گھٹائیں اور وقفہ کی حالت میں اصل سبب مرض کو دور کر۔
— مرض دمہ میں جب کہ لیس دار بلغم سے پیچھے کی ہوائی نالیاں رُک کر سانس میں تنگی ہو رہی ہو تو عام حالات میں ایفنی ڈرین ہائیڈروکلور آدھا کریں، گولی ہمراہ پانی کھلائیں۔ اس سے دورہ رُک جاتا ہے، لیکن یہ دوا زیادہ عمر کے لوگوں کو احتیاط سے استعمال کرائی جائے، کیونکہ اس سے غدہ قدامیہ بڑھ جا۔
میں جیل سے پیشاب بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، بعض دفعہ اسپرو یا اسپرین کی گولی کھلانے سے بھی دورہ رُک جاتا ہے۔

دمہ کا دورہ روکنے کے لئے مندرجہ ذیل مجربات مفید ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا استعمال کرائیں۔

۱۔ پوٹاشیم آیوڈائیڈ پانچ گرین، ٹنگر اپی کے کواسی دس سمن، ٹنگر لوبلی ایٹریا دس سمن، سیرپ ٹوٹو تین سمن، گلیسرین تین سمن، کلوروفارم واٹر تا ایک اونس
ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین بار بعد از غذا دیں، جب دمہ کے ساتھ کھانسی ہو تو یہ مکچر بہت مفید ہے، اس مکچر کے دوران استعمال ایفنیڈر
ہائیڈروکلور ٹیبلٹ آدھی گرین فی خوراک بھی دے سکتے ہیں۔

۲۔ پوٹاشیم آیوڈائیڈ پانچ گرین، ٹنگر سیلاڈونا دس سمن، ٹنگر سٹرامونیم بیس سمن، گلیسرین پندرہ سمن، کلوروفارم واٹر تا ایک اونس۔
ایسی ایک خوراک دن میں تین بار دیں، تسنجی کھانسی اور مرض دمہ میں مفید ہے، یہ لندن فارماکو پیا کا نسخہ ہے، جو ولایت کے بڑے بڑے ہسپتالوں
میں مروج ہے۔

۳۔ پوٹاشیم آیوڈائیڈ پانچ گرین، ٹنگر سٹرامونیم دس سمن، لکوڈیکسٹریٹ گلائی سرزہ دس سمن، ایکو کلوروفارم ایک اونس۔
ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین بار دیں، دمہ کے دورہ کو روکنے کے لئے کنگ ایڈورڈ میموریل ہسپتال کا مشہور نسخہ ہے۔
۴۔ پوٹاشیم آیوڈائیڈ ایک گرین، ٹنگر سٹرامونیم پانچ سمن، ٹنگر کفر کو پانچ سمن، شربت سادہ بیس سمن، کلوروفارم واٹر ساٹھ سمن۔ ہر سے ہر چھ دن میں تین
بچوں کے دمہ (دم کشی) کے لئے لندن فارماکو پیا کا مشہور نسخہ ہے۔

دُمہ کا دورہ رونے کے لئے لائیکواریڈرین لین ایک میں ایک ہزار کا گھول ایک سی سی لے کر زیرِ جلد انجکشن کریں، بعض اصحاب کو اس دوا کے بار بار استعمال سے اس کی برداشت کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے مریضوں کو ایڈرینالین، پچوٹرین یا ایڈرینالین ڈرین ایک سی سی سے تیار شدہ امپولز کا انجکشن دینا بہتر ہے، سو گھانے کے لئے ایمائیل نائٹریٹ ایک کیپ شول توڑ کر سو گھایا جائے۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ ایپاسان، این (Aspasan-N) بلیکٹ ————— ایک دو کچھ رات میں اور ایپاسان ڈی (Aspasan-D) ایک دو کچھ دن میں دیں۔

۲۔ ایفیدرین ہائیڈروکلورائیڈ (Ephedrine Hydrochloride) کی ایک ٹیکہ پراگرین ایک سے تین گولی تک روزانہ (ایم بی) کا استعمال کریں۔ زیادہ عمر کے لوگوں کو احتیاط سے استعمال کریں۔

۳۔ ایڈرینالین ہائیڈروکلورائیڈ (Adrenaline hydrochloride) کا ۱ : ۱۰۰۰ (ایک میں ایک ہزار) کا گھول پانی ملا یا تیل ملا (Adrenali-nin oil) بی، آئی کپنی کا انجکشن دوسرے کے وقت بہت فائدہ دیتا ہے، (لیکن یاد رہے کہ دُمہ قلبی اور تنگی تنفس بوجہ ہارٹ فیلچور میں ایڈرین نے لین خطرناک ہے) ————— ملتانے۔

۴۔ ایفنی ڈرین کمپونڈ ایلیگز (Ephedrine compound-elixer) پارک ڈیوس ————— برانکو دالات تنفس کے تشنج خصوصاً کالی کھانسی اور دُمہ میں بہت مفید ہے، خوراک پراتا ایکٹ چھ بڑوں کے لئے اور بچوں کو بلحاظ عمر پراکم مقدار میں مرض کے مطابق دیں۔

۵۔ ایڈرینو پچوٹری (Adreno Pituitary) بنگال ایونٹی ————— دُمہ کے مریض کی نازک حالت میں یا ویسے کسی مرض میں جب جسم ٹھنڈا ہو، نبض کمزور و ڈوبتی ہو تو یہ انجکشن جسم کو طاقت و گرمی دیتا ہے اور اکھڑے ہوئے سانس کو پھر سے قائم کرنا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے۔ نصف سے ایک سی سی عضلاتی انجکشن دیں۔

۶۔ ایڈرینو ایفنی ڈرین (Adreno Ephedrine) بنگال ایونٹی ————— سانس کی تکلیف (دُمہ) کے لئے ایک انجکشن کافی عرصہ تک کارگر رہتا ہے، پراتا ایک سی سی عضلاتی انجکشن دیں۔

۷۔ بیٹ نے سول (Betnesol) گلیکو ————— شدید دُمہ، ناک کا ورم، ایگزیا، پتی اچھلنا، سیرم کی بیماری الرجی میں ایک گولی دیں۔

۸۔ بینے ڈرل (Benadryl) پارک ڈیوس ————— دافع تشنج، دافع الرجی، دُمہ و پنی سلین کے مخالف اثرات میں مفید ہے۔ ایک ایک کیپ شول دن میں تین بار دیں، شربت ایک تا دو چائے کا چمچ ہر تین گھنٹے بعد دیں، شدید کھانسی و بلغم میں بینے ڈرل ایکسپیکٹورنٹ بصورت شربت ایک تا دو چائے کا چمچ دن میں تین بار استعمال کیا جائے۔

۹۔ زلیفرول (Zephrol) مے بکر ————— معمولی دُمہ کی حالت میں مفید ہے، ایک ڈرام دن میں دو سے تین بار دیں۔

۱۰۔ بینا ڈرل کف سیرپ (پارک ڈیوس) ۳ قطرے، زلیفرول کف سیرپ (ایم بی) ایک چائے کا چمچ، دونوں کو آپس میں ملا کر پانی کے ساتھ دن میں دو بار لیں۔ دُمہ کی کھانسی میں مفید ہے۔ یہ بلغم نکلانے والی حالتوں میں بھی مفید ہے۔

۱۱۔ شدید دُمہ میں پریڈنی سولون (Prednisolone) کی پانچ ملی گرام کی ٹیکہ ایک ایک کر کے دن میں تین بار دیں جیسے ڈیلٹا آف کارلن (Delta-cortizol) —————

efcorlin گلیکو ————— ڈیلٹا کارٹیل (Del tacortil) فز ————— ہوسٹا کارٹن (Hostcortiz) بلیکٹ ————— وائیولون (Wysolone) وسیقہ۔

۱۲۔ ملی کارٹن (Millicorten) سب ————— یا ڈیکادرون (Deadron) ایم، ایس، ڈی ————— یہ دونوں ڈیکازون ہیں،

اور اس سے زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ ڈیکاڈرون کا انجکشن بھی آتا ہے۔

۱۳۔ نیوایپنین (Neopinine) ایک ٹمکیہ دن میں تین بار زبان کے نیچے رکھ کر چوسیں۔

دھر کے علاج کے لئے جدید علاج کارٹی سون ایک سی سی بذریعہ انجکشن اور ایک سے تین گولی بحرب بتایا گیا ہے۔

۱۴۔ دھر کی کھانسی کے لئے نئی دوا برانکو سیرپ (Bronko Syrup) یا برانکو ڈیل (Bronko dil) نیو فارما ایک ایک ٹمکیہ دیں۔

۱۵۔ امینوفیلین (Aminophyllin) بروز دیکھم ایک دو ٹمکیہ دو تین بار ہر روز دورہ کے وقت دیں۔

۱۶۔ آسماسول (Asmasule) ایک دو کیپ شولز مسج و خام تازہ پانی سے دیں۔

۱۷۔ آسماسپکس ڈپوٹ ٹیبلٹ (Asma Pax Depot Tab.) ایک گولی صبح و ایک گولی رات کو تازہ پانی سے دیں۔

۱۸۔ اسٹھ لین ٹیبلٹ (Asthalin Tab) ایک سے دو گولی دن میں تین سے چار بار ہمراہ تازہ پانی دیں۔

۱۹۔ کوٹ اسمیل گولیاں (Cortasmyl Tab) ایک دو گولی دن میں تین چار بار دیں۔

۲۰۔ ڈیری فاسیلین گولیاں (Deriphylin Tab) ایک ایک گولی دن میں تین سے چار بار دیں۔ دھر کی زیادتی میں مفید ہے۔

۲۱۔ میرکس کیپ شول (Marax Cap.) ایک ایک کیپ شول دن میں تین چار بار دیں، دھر کی زیادتی میں مفید ہے۔

۲۲۔ سیڈنیل گولیاں (Sedonl Tab.) ایک دو گولی دن میں تین چار بار دیں۔ دھر کے دورہ کو روکنے میں مفید ہے۔

۲۳۔ ٹیڈرل (Tedral Tab.) ایک دو گولی دن میں تین چار بار دیں، دھر کے دورہ میں مفید ہے۔

یونانی علاج :- دورہ کے وقت گرم پانی کی بوتل سے پاؤں کو سینک دے کر گرمی پہنچائیں اور مریض کو گرم پانی یا قہوہ یا چائے (بلا دودھ) پلائیں۔

دھتورہ کے پتے دو ڈرام، انیسوں ایک ڈرام، قلمی شورہ ایک ڈرام، سفوف بنا کر ایک پلیٹ میں رکھ کر جلائیں اور دھونی دیں، سوما کلپا لتا (الیفیڈرا)

کی پتی اور بغیر پتوں کی شاخوں کا سفوف دس گرین کھلائیں۔ اس سے مریض کو فوری آرام آ جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل بحربات دھر کا کامیاب علاج ہیں :-

تریاق دھر :- ابرق سیاملیک پاؤ، قلمی شورہ پانچ تولہ، دہی پانچ تولہ، دہی اور قلمی شورہ ملا لیں۔ ابرق کے باریک پترے بنالیں، ایک

گوزہ گلی لے کر اس میں پہلے ابرق کی تہ رکھیں، اس کے اوپر ایک تہ قلمی شورہ دہی میں ملایا ہوا رکھیں۔ اس طرح یکے بعد دیگرے رکھتے جائیں، بعد

برتن کو گل حکمت کر کے دس سیراپوں کی آگ دیں، سرد ہونے پر نکال کر کشتہ شدہ ابرق کو باریک پیس لیں، مقدار خوراک ایک سے دو رتی مکھن

یا بالائی میں پیٹ کر نگل لیں۔ دن میں دو بار۔ دھر، پرانی کھانسی اور پرائے بخار کے لئے نہایت ہی مفید دوا ہے۔

دوائے دھر :- اجوائن دیسی، اجوائن خراسانی، مریح سیاہ، اجود، پلامول، سونٹھ، نمک سنگ، نمک کھاری ہوزن، لعاب گھیکوار سب

ادویہ سے تین گنا، برتن گلی میں گل حکمت کر کے بہت سے ایلوں میں جلائیں، یہ خاکستردو سے چار رتی شہد میں ملا کر چٹائیں۔

سگریٹ برائے دھر :- بھنگ خشک، قلمی شورہ، برگ دھتورہ خشک برابر وزن لے کر کوٹ لیں اور ایک دو چٹکی لے کر حلیم یا سگریٹ میں

بھر کر پلائیں۔ دھر کا دورہ یک لخت موقوف ہو جائے گا۔ یہ نسخہ بیسیوں مرتبہ آزمایا اور ہر دفعہ کامیاب رہا۔

دوائے دھر :- کاکڑاسنگی کا باریک سفوف بنا کر رکھیں، دھر، کالی کھانسی، بلغی کھانسی کا نہایت کامیاب علاج ہے۔ مختلف تجارتی ناموں

سے یہی ایک دوا مختلف اخباروں میں مشہور کی جا رہی ہے، مقدار خوراک ایک ماشہ تک، بچوں کو ایک رتی سے دو رتی شہد یا بٹورہ حلیم میں ملا

کر گرم پانی یا چائے سے دیں۔

چتر کوٹ بوٹی کا راز :- بہت سی کمپنیاں "چتر کوٹ بوٹی" کے عنوان سے دھر کے لئے اشتہار بازی کر رہی ہیں، دراصل یہ کاکڑاسنگی اور

نفل دراز دوا دیر ہی ہیں۔ جنہیں "چتر کوٹ بوٹی" کے نام سے بیجا جا رہا ہے، اس سلسلہ میں ہر دوا دیر چھ چھ ماشہ لے کر لکڑی کے برتن و ڈنڈا سے

سفوف بنالیں اور کار تک کی پور ناشی والے دن مریض کو برت رکھو اگر پہلے گائے کے دودھ میں ساٹھی کے چاول آدھی چھٹانک ڈال کر کھیر تیار کریں۔ اور کیلے کے پتے یا چینی کے برتن میں ڈال کر چاند کی چاندنی میں دو بجے رات تک رکھیں اور بعد میں یہ دوا کھلا دیں۔ اس سائے وقت میں کھیر تیار ہونے سے کھانے تک سایہ نہ پڑے، مٹی کی بانڈی اور کڑھی لکڑی کی ہو، مریض کے کپڑے سفید اور دوا کھانے کے بعد جس قدر چل سکے، بہتر ہے۔

پڑھیں:- ساری غم تیل کی اور ترش چیزوں، گو بھی، دال ماش، آلو وغیرہ سے پرہیز ضروری ہے۔

دُمہ کے لئے روسی ڈاکٹروں کا نظریہ مختلف ہے اور وہ دُمہ کو جرثومی بیماری مانتے ہوئے سلفا ڈرگز اور پنیسلین استعمال میں لاتے ہیں، اُن کا کہنا ہے کہ ۹۸ فیصدی دُمہ کے مریضوں کو یہ مرض ہونے سے قبل مختلف امراض کے جرثومہ کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ اس لئے پنیسلین اور سلفا ڈرگز سے شذر تاج نکلتے ہیں۔

دُمہ کا آسان علاج:- تندرست نوجوان شیردار بکری کو بجائے دیگر غذا کے برگ مدار (آک کے پتے) کھلائیں۔ دس روز یہ غذا کھلانے کے بعد اس کا دودھ دُمہ والے مریض کو پلانا شروع کر دیں، جس دن علاج شروع ہو، دوسری بکری کو بھی برگ مدار کھلانے لگیں، دس دن تک پہلی بکری کا دودھ پینے کے بعد چھوڑ دیں اور دوسری بکری کا پنا شروع کر دیں، اس طرح چار بکریوں کا دس دن دودھ پی کر چالیس دن ختم کریں، اس سے دُمہ کا قلع قمع ہو جاتا ہے۔ ایک بکری کو صرف بیس دن آک کے پتے کھلائیں اور دس دن اس کا دودھ پئیں۔ ایک ہی بکری کو چالیس دن تک آک کے پتے کھلانے سے اس کے مرجانے کا خطرہ ہے۔

پٹھکنڈہ بوٹی سے علاج:- پٹھکنڈہ (چرچٹ) کی جڑ یا بیج چلم میں رکھ کر پیسے سے دُمہ اور کھانسی کو نفع ہوتا ہے یا پٹھکنڈہ کے تمام پودے کو جلا کر اس کی خاکستر میں دو چند دیسی کھانڈ ملا کر چھ ماشہ صبح اور چھ ماشہ شام پانی کے ساتھ کھلانے سے لمبی دُمہ اور کھانسی کو فائدہ ہوتا ہے یا بیج انگ جلا کر بتدریج ماشہ ماشہ شہد کے ہمراہ چاٹنے سے امراض لمبی اور کھانسی کو فائدہ ہوتا ہے، بچوں کے لئے صرف ایک رتی کافی ہے۔

آب اورک:- ایک چائے کا چمچ رس اورک کو ہلکا گرم کر کے رات کو سونے وقت لیں۔

دوائے پھول آک:- آک کے پھول ۲۰ گرام، نمک ۳ گرام، یہ دوائیں مٹی کے برتن میں رکھیں، اس پر ڈھکنا رکھ کر مٹی سے اچھی طرح کر کے سکھالیں، پھر ۲۰ کلو ایلوں کی آگ دیں، چار گھنٹے بعد جلی ہوئی راکھ سنبھال لیں، مقدار ۱۰۰ ملی گرام، ۱ گرام شہد میں دن میں دو بار دیں۔

پرسیاوشال بوٹی سے علاج:- پرسیاوشال اڑھائی تولہ کو ایک سیر پانی میں جوش دیں اور جب پھر حصہ رہ جائے تو صاف کر کے خالص پانچ تولہ ملا کر نیم گرم پلائیں، موسم گرمیاں بجائے شہد کے مصری ملائیں۔ اس کے استعمال سے ایک گھنٹہ کے اندر دورہ رک جاتا ہے۔

گھیکوار بوٹی سے علاج:- لعاب گھیکوار ایک سیر اور اجوائن دیسی ایک پاؤ لیں اور لعاب گھیکوار کی ایک مٹی کی بڑی بانڈی میں بھیا اس پر اجوائن کی تہ بھیا دیں۔ اس طرح لعاب اور اجوائن کی تہ بھیا کر بانڈی کا منہ سرپوش سے بند کر کے آٹے سے گل حکمت کریں اور اس بانڈی کے نیچے متواتر آٹھ گھنٹے تک آگ جلائیں، سرد ہونے پر اجوائن نکال کر باریک کر کے سفوف بنالیں اور روزانہ بقدر دوسے تین ماشہ مریض کو کھلائیں۔

(ضیق النفس) میں مفید ہے، اس مرض میں اس سے بہتر کوئی دوا نہ ہو سکتی ہے اور نہ ہے "شرست زونا" کا استعمال بھی مفید ہے۔

آیور ویدک علاج:- شواش کٹھار رس، ستوپلا دی چورن، تالیس آدی چورن، چیون پراسن، دارکشاسو، کنک آسو، بالنہ اولیہ، سدھ رھوج، کھدر آدی وی، کشتہ بارہ سنگھا، کشتہ تانبہ وغیرہ استعمال کئے جاتے ہیں۔ "شواش چنتا منی رس" پر رتی صبح پر رتی شام ہمراہ شہد استعمال سب سے زیادہ مفید ہے۔

ہومیوپیتھک علاج:- کالی فاس x ۳ - میگنیشیا فاس x ۳ ہر سپرہ منٹ بعد ایک خوراک دیں، دُمہ کے لئے بے حد مفید ہے۔

قدرتی علاج:- روزانہ ایک جھینگر کی چائے شانی علاج ہے۔ علاوہ ازیں روزانہ سانس کی کوئی ورزش کرنا اور مسروں کے تیل کی چھاتی

پر مالش بہت مفید ہے، روزانہ سر کے نیچے تین چار تیکے رکھ کر سونے کی عادت ڈالنے سے بھی دورہ کا احتمال بہت کم ہو جاتا ہے۔ اگر قاسم پیشہ یا غلام غذا مرض کا سبب ہو تو اسے ترک کر دیں۔

غذا پر سیریز:- ہلکی اور زود ہضم غذا میں اور بکری کا شوربہ بخنی، آش جو، مونگ اور ارہر کی دال، کدو، تری وغیرہ دیں۔ گرم، نفاخ اور ثقیل اشیاء تیل، لال مروج، برف کا ٹنڈا پانی، دہی، لسی وغیرہ، سردی لگنے اور مرطوب جگہ پر سونے سے پرہیز کریں۔

دمہ قلبی، کارڈیک ایسٹھما

جو دل پر بخارات دغانیہ (دھوئیں) کے غلبہ سے پیدا ہوتا ہے اور عام طور پر دل کی بیماریوں سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔ اس میں دل کے مقام پر سوزش اور بے چینی ہوتی ہے۔

غیر مرورید یا خمیرہ گاؤ زبان عنبری جو اسر والادیں۔ ڈاکٹری طریقہ علاج میں ڈیجیٹلس کے مرکبات دیں اور جب تک مریض کا سانس درست نہ اُسے اکیلا نہ چھوڑیں۔

شونگ بخور، ذات الریہ، پھیپھڑوں کا ورم، منونیا، (Pneumonia)

تعریف مرض:- یہ ایک خاص قسم کا بخار ہے جس میں پھیپھڑے متورم ہو جاتے ہیں۔
وجوہات:- اس مرض کا باعث ایک خوردبینی جراثیم ہوتا ہے جس کو نیوموکا کس (کرم منونیا) کہتے ہیں۔ یہ کثیر مریض کے ہتھوک اور بلغم میں پایا جاتا ہے۔
عام طور پر نزلہ و زکام کی حالت میں یا بعد میں سردی لگنے سے ہوتا ہے، کبھی شدید کھانسی، تپ محرقہ، خسرہ، چھچک وغیرہ سے بھی ہو جاتا ہے۔
علامات:- سینہ میں درد ہوتا ہے، کھانسی کے وقت درد زیادہ ہوتا ہے، لیس دار بلغم بلا جھاک خارج ہوتا ہے، کبھی پھیپھڑے کا ایک یا سالم پھیپھڑہ اور کبھی دونوں پھیپھڑے مبتلائے مرض ہو جاتے ہیں، سانس کی تنگی ہوتی ہے، سانس لیتے وقت ناک کے نچھنے پھول جاتے ہیں، بار بار پیاس لگتی ہے۔ اور سانس جلد جلد آتا ہے۔ لرزہ سے بخار ہو جاتا ہے، جس کی حرارت ۱۰۲ سے ۱۰۵ تک ہو جاتی ہے۔ جس طرف کے پھیپھڑے میں ہو۔ اس طرف کا گال لال ہو جاتا ہے۔

جدید تحقیقات کے مطابق اس کی کئی اور اقسام دریافت کی گئی ہیں:-

۱- ذات الریہ فصی:- یہ اسٹریپٹوکاکل جراثیم سے پیدا ہوتا ہے اور عام طور پر انفلوئنزا اور خسرہ کے دوران ہو جاتا ہے۔

۲- ذات الریہ ثقبہ عنیبہ:- یہ سٹیفیلوکوکل جراثیم سے پیدا ہوتا ہے۔

۳- ذات الریہ فرید لینڈر:- یہ کلیب سیلا جراثیم سے پیدا ہوتا ہے۔

۴- ذات الریہ ہیوفیلپس زکام وبائی:- اس میں ہوائی نالیوں میں سوجن ہو جاتی ہے، انفلوئنزا کے جراثیم سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر بچوں کو ہوتا ہے۔

۵- ذات الریہ حبشی:- یہ وائرس منونیا ہے۔ یہ عارضہ انفلوئنزا یا خسرہ کی تکلیف میں پیدا ہو جاتا ہے۔

۶- ذات الریہ سعالی:- اسے بڑا کو منونیا کہتے ہیں، اس قسم کا منونیا اکثر چھوٹے بچوں میں کالی کھانسی اور خسرہ کے سبب سے ہوا کرتا ہے۔

نوٹ :- ۱۔ عام صحتی حالت میں درجہ حرارت ۳۷.۸ ع ۹۸.۶، نبض کی حرکات ۷۵ فی منٹ اور سانس کی چال ۱۸ بار فی منٹ ہوتی ہے اگر حرارت ایک درجہ زیادہ ہو جائے تو نبض آٹھ بار فی منٹ اور سانس دو یا تین بار فی منٹ بڑھ جاتے ہیں۔ اس مرض میں نبض کی چال درجہ حرارت کے مطابق بڑھتی ہے، لیکن سانس فی منٹ ۲۴ یا ۶۰ بار سے بھی زیادہ آتی ہے اور سانس نبض اور حرارت کا آپس میں تعلق قائم نہیں رہتا۔ اس لئے سانس کی چال کا لگاتار بڑھنا نمونیہ کی خاص تشخیصی علامت ہے۔

۲۔ آلہ اٹے تھکوپ کو سینہ پر لگا کر دیکھنے سے ماؤف پھیپھڑے میں بلغم کی کھڑکھڑاہٹ، سانس کی آواز کم، رکاوٹ اور تنگی بھی معلوم ہوتی ہے۔ سینہ کو ہاتھ سے ٹھونکنے سے پھیپھڑے کی آواز مدھم یا بالکل ختم ہو جاتی ہے، طبیعت میں بے چینی، سر درد، کھانسی، بے خوابی، سینہ میں جکڑن ہوتی ہے، نمونیہ کا بخار ۸ یا ۹ دن تک چڑھا رہتا ہے، لیکن اب تو انٹی بائیوٹک علاج سے ۲۴ گھنٹوں میں آرام آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ بخار رفتہ رفتہ اترتا ہے۔ شرابی، کمزور، بوڑھے یا دل و گردے کی تکلیف میں مبتلا مریضوں کے لئے یہ مرض مہلک ثابت ہوتا ہے۔

علاج :- مریض کو سردی سے محفوظ رکھیں، گرم اور ہلکا کپڑا پہنائیں، کمرے کو بھی گرم رکھنا بھی ضروری ہے، انٹی بائیوٹک علاج میں پینی سلین اس مرض کے لئے مجرب علاج ہے۔ مقدار خوراک دو سے دس لاکھ یونٹ دن میں دو بار عمر کے مطابق دیں یا پروکین پینی سلین چار لاکھ یونٹ ہر ۲۴ گھنٹہ بعد عضلاتی انجکشن دیں، بچوں کو بلحاظ عمر دیں۔ اگر ساتھ میں نزلہ وغیرہ ہو تو سٹرپٹومنی سلین ۴ لاکھ یونٹ کا ہر ۲۴ گھنٹہ بعد عضلاتی دیں یہ پینی سلین سے زیادہ موثر ہیں۔

معمولی حالتوں میں تو سلفا ڈرگز سے ہی آرام آ جاتا ہے۔ شدید حالتوں میں سلفا ڈرگز خوردنی اور پینی سلین بذریعہ انجکشن دی جائے، اس سلسلہ میں سلفا ڈایازین یا تھایازول ۳ سے ۶ گولی روزانہ دن میں تین بار دینی چاہیے۔ نمونیہ کے لئے آج کل سلفا ٹرائیڈ زیادہ مروج ہے، کمزوری دل کی صورت میں دل کو تقویت دینے والی ادویہ برانڈی، ایلے ہوئے انڈس وغیرہ دیں، کورامین یا کمفران ایبھتر یا کیمفر مسک ایبھتر کے زیر جلد انجکشن دیں اگر سرسامی عوارضات بھی ہوں تو بھی پینی سلین یا سٹرپٹومنی سلین نہایت مفید ثابت ہوتی ہے، بیرونی طور پر مقام درد پر لینی منٹ رپن ٹائن کی نیم گرم مالش کر کے اوپر سے روئی کی تہ رکھ کر پٹی باندھ کر سینکا جائے یا انٹی فلو جٹین یا بائی فلو جٹین کا پلاسٹر لگائیں، بائی فلو جٹین کو موٹے کپڑے پر لگا کر جس جگہ درد ہو لگاویں اور اوپر سے روئی رکھ کر کمور کریں، بیس گھنٹے لگے بہنے کے بعد اتار کر دوبارہ لگائیں، یہ پلاسٹر، نمونیہ، موچ آسنے، کن پیرے، سوچن کے لئے بیرونی طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور مجرب ہے۔

سلفا ڈرگز کے دوران استعمال میں ہر گولی کے ساتھ معمولی مقدار سوڈا بائیکارب کی بھی شامل کر لی جائے، اگر قے یا متسی ہو تو گولیاں کافی مقدار پانی کے ساتھ دیں اور چائے وغیرہ کا استعمال کریں یا سیپٹران گولیاں دیں۔

اس کے علاوہ کلورومائی ٹین (Culoro mycetin) اور سنٹھومائی ٹین (Syntho mycetin) اس مرض کا شافی علاج ہیں۔ جوان آدمی کے لئے ایک ایک کپ شول دن میں چار بار اور بچوں کے لئے ان کے مشربت پالمی ٹیڈ ہر سے دو چھپ تک بلحاظ عمر دن میں تین یا چار بار دیں، اس مرض کے لئے آریو مائی سین بھی بمقدار عمر ہر چھ گھنٹے کے بعد براہ دہن دی جاسکتی ہے۔ اس مرض سے مقابلے کی طاقت بڑھانے کے لئے وٹامن ہائے میں سے وٹامن سی کا استعمال مفید ہے۔ اگر بلغم بہت گاڑھا ہو تو پوٹاسیم آیوڈائیڈ تین گرین ایک اونس پانی میں حل کر کے دن میں تین بار دیں۔

برانکو نمونیہ (شویش نلی پرواہ) یعنی ڈبہ اطفال اکثر کم عمر والے بچوں کو ہوا کرتا ہے، اس لئے اس کا علاج بچوں کی بیماریوں میں ملاحظہ فرمادیں۔

مادرین ادویات :- ۱۔ سلفا ڈایازین (Sulpha Diazine) یا سلفا ٹرائیڈ (Sulpha triad) ایم بی — یا سلنا 4 —

یاپنڈ سلفاس کی ایک دوگولیاں ہر چار گھنٹے بعد دیں۔ ان گولیوں کے ساتھ معمولی مقدار ساتھ سوڈا یا میکارب ملا لیں۔

۲۔ اوری سیل (Orisul) سبب اس کے فوائد بھی سلفا گروپ کی طرح ہیں۔ پہلے دو دوگولیاں ہر چار گھنٹے بعد، پھر ایک ایک ٹکیہ دن میں دوبارہ تازہ پانی سے دیں۔

۳۔ ڈوسلفین (Dosulfin) گیلی سلفا میرازین کے برابر ہے، یہ کم مقدار میں زیادہ وقت تک کام کرنے والی سلفا دوائی ہے، شروع میں دوگولیاں، بعد میں ایک ایک ٹکیہ صرف دو خوراک دیں۔ زیادہ تکلیف کی حالت میں مرض کے مطابق دیں۔

۴۔ میڈری بون (Madribon) روش یہ کم وقت میں زیادہ دیر تک کام کرنے والی سلفا دوائی ہے، بڑوں کے لئے ٹکیاں اور بچوں کے لئے ڈراپ آتے ہیں، پہلے دن ایک ایک ٹکیہ صبح و شام، بعد میں ایک گولی روزانہ دیں، یا سپیٹران گولیاں اور بچوں کے لئے سپیٹران شربت کا استعمال کریں۔

۵۔ لیڈرکین (Lederkyn) لیڈرے سلفا ادویات کے استعمال کی طرح ہی اس کا استعمال ہے۔ یہ لمبے عرصے تک کام کرنے والی سلفا دوا ہے۔

۶۔ فینوسین ٹرائی سلفا (Fenocin-Trisulfa) ڈیو میکس تین آسانی سے گھلنے والی ادویات اور پینی سلین "وی" (Pencillin- V with Three soluble Sulpha drugs) شامل ہے۔

۷۔ پینی ٹرائیڈ (Penitrid) ایم بی تین آسانی کے ساتھ گھلنے والی ادویات کے ساتھ پینی سلین "جی" (Penicillin "G" with Three soluble sulpha drugs) یا پینڈ سلفا (سارابھائی) ایک سے دوگولی ہر چھ گھنٹے بعد تازہ سے دیں۔

۸۔ پینی سلین کرس ۴ (Crys-4) سکیب سکیلوپین (Seclopen) گلیکسو (Omnamycin) اومناسیلین (Omnamycin) ہیکٹ کا عضلاتی انجکشن بطریق معروف ایک بار کریں۔

۹۔ ڈائی کرسٹوسین (Dicrysticin) سکیب یا اومنامائی سین (Omnamycin) ہیکٹ یا مینومائی سین (Munomycin) گلیکویا سٹریپٹ پینی سلین (Strepto Penicilin) ڈیوسیکس یا کمبائیوٹک (Combiotic) فز (Combiotic) کا عضلاتی انجکشن ہر ۴ گھنٹے بعد کریں، دو یا تین انجکشنوں سے مکمل آرام آجاتا ہے، پینی سلین سے جلد فائدہ ہوتا ہے۔

۱۰۔ ٹیرامائی سین (Terramycin) فز یا ایکرومائی سین (Achromycin) لیڈرے یا سو بامائی سین (Subamycin) ڈیز یا سیزمائی سین (Syner mycin) فز یا ہوسٹاسائیکلین (Hostacycline) ہیکٹ یا لیڈر مائی سین (Ledermycin) لیڈرے کے کیپ شولز ایک یا دو، چھ گھنٹے بعد دیں۔

۱۱۔ ایکرومائی سین (Achromycin) لیڈرے یا ٹیرامائی سین (Terramycin) فز وغیرہ کے انٹراسکولر (عضلاتی) انجکشن دینے کے لئے بھی آتے ہیں، انہیں مرض و مریض کے حالات کے مطابق استعمال کیا جائے۔

۱۲۔ ٹیرامائی سین انٹراوینس (Terramycin Intravenous) فز یا ایکرومائی سین انٹراوینس (Achro mycin Intravenous) لیڈرے وغیرہ کے ملتے ہیں۔ انہیں حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تکلیف میں انٹراوینس دیا جاتا ہے۔ یہ عمل ایک مستند کوالیفائیڈ ڈاکٹر ہی انجام دے سکتا ہے۔

۱۳۔ انٹرو سائیکلین (Enterocyclin) ڈیز جہاں دیگر انٹی بائیوٹک نبل ہو جائیں وہاں یہ کامیاب نتائج دیتی ہے۔ اس میں دوز بڑا موثر دوائیں کلورم فینی کال اور ٹیٹراسائیکلین نصف نصف تناسب سے شامل ہیں۔ ایک کیپ شول ہر چھ گھنٹے اور شدید حالت میں چار چار

گھنٹہ بعد دیں۔ بچوں کے لئے انٹرو سائیکلین "سی" کیپ شولز ملے ہیں۔ عمر کے مطابق دیں، کالی کھانسی، خناق، گلے کے درم اور نمونیہ کے لئے از حد مفید ہے۔

- ۱۴۔ ٹرائی سین (Trycin) مرک شارپ ڈویم ————— یہ ٹیڑا سائیکلین ہائیڈروکلورائیڈ ہے۔ ایک کیپ شولز ہر چھ گھنٹہ بعد دیں۔
 ۱۵۔ ٹیڑا سائیکلین (Tetracyclin) نمونیہ، پھیپھڑے کے درم کے لئے از حد مفید ہے، ہر چھ گھنٹہ بعد ایک کیپ شولز تازہ پانی سے دیں۔
 ۱۶۔ ریڈوکسان (Redoxon) یہ وٹامن سی ہے، یہ نمونیہ میں دیگر انٹی بائیوٹک دواؤں کے ساتھ دینے سے جلد فائدہ ہوتا ہے، یہ عموماً ۵۰۰ ملی گرام کی خوردنی ٹکیہ میں اکثر امراض میں بہت شفا بخش ہے۔ وٹامن "سی" دانتوں کی بوسیدگی و پائوریہ کے لئے مفید ہے۔

نوٹ :- ۱۔ مندرجہ بالا ادویہ کے خراب رد عمل کو دور کرنے کے لئے وٹامن بی کمپلیکس کا ساتھ ساتھ استعمال جاری رکھنا چاہئے ————— ۲۔ نمونیہ کے علاج میں اور بھی نئی نئی ماڈرن انٹی بائیوٹک ادویات مارکیٹ میں آگئی ہیں۔ جن کا مزید بیان یہاں ممکن نہیں، آپ کتاب "ماڈرن ایلیمنٹری (بالتصویر) اردو دیا مہندی" روپے "نزالا جوگی پبلی کیشنز پانی پت (ہریانہ)" سے منگائیں۔ ان میں ان تمام ادویات سے ری ایکشن سے بچاؤ کے طریقے بھی دیئے گئے ہیں۔ مارکیٹ میں سلفا وینین سلین ملے مرکبات اس وقت ملنے بند ہیں۔ ان کا حوالہ اس لئے دے دیا گیا ہے، کہ اگر وہ کمپنیاں پھر بنا نا شروع کر دیں تو ان کا استعمال کیا جاسکے۔

یونانی علاج :- خیرہ بنفشہ میں کشتہ بارہ سنگا ایک رتی دن میں دو تین بار دیں۔ اور ورد کی جگہ تیل تارپین پانچ تولہ میں کا فور تین ماشہ حل کر کے نیم گرم مالش کریں۔ اور اوپر سے پُرانی روئی کا ٹکڑا باندھ کر سینک کریں، اگر بخار دسے چینی زیادہ ہو تو تسکین حرارت کے لئے بھی دانہ تین ماشہ، عناب پانچ دانہ، سوڑیاں ۹ دانہ، تخم خطمی پانچ ماشہ، تخم خبازی پانچ ماشہ، گاؤ زبان پانچ ماشہ کو پانی میں جوش دے کر شیرہ تخم کا ہو تین ماشہ کا اضافہ کریں، اور شربت بنفشہ دو تولہ ملا کر خاکسی سات ماشہ چھڑک کر پلائیں، پانچویں روز جب گرمی خشکی رفع ہو جائے تو اس نسخہ سے بھی دانہ، گاؤ زبان اور شیرہ تخم کا ہونکال کر موزین متقی ۹ دانہ، انجیر زرد تین دانہ، لمبھی چھلی ہوئی چھ ماشہ اضافہ کریں، پیاس لگے تو عرق گاؤ زبان نیم گرم پلائیں، جب بحران واقع ہو تو مریض کی بغلوں میں گرم پانی رکھیں اور جسم گرم رکھیں، جب بخار اُتر جائے تو کمزوری دور کرنے کے لئے لطیف اور مغوی غذا میں دیں۔
 مندرجہ ذیل مجربات نمونیہ کے لئے خاص طور پر مفید ہیں :-

دوائے نمونیہ :- بارہ سنگا پانچ تولہ لے کر کوٹلوں میں رکھ کر جلا لیں، سرد ہونے پر نکال لیں اور آک کے دودھ میں کھل کر کھینے بنا کر آک کے تپوں کے نغہ میں رکھ کر دس سیراپوں کی آگ دیں، کشتہ تیار ہو گا، پس کر محفوظ رکھیں۔
 خوراک ایک رتی سے دو رتی ہمراہ دودھ گرم یا چائے دن میں تین بار دیں، نمونیہ، درد پسلی، درد سینہ، بخار کھانسی اور دمہ کے لئے مفید ہے۔
 آیور ویدک علاج :- کشتہ بارہ سنگا ایک رتی دن میں تین بار یا کستوری بھیرورس برہت (بھیشج رتناولی) خاص طور پر جب نمونیہ میں ٹیڑا پھر کم ہو جانے پر دل کی کمزوری اور ہاتھ پاؤں سرد ہو گئے ہوں تو فوراً اثر کرتا ہے اور حلق سے اُترتے ہی لاجھ دیتا ہے۔
 مقدار خوراک ایک گولی ہمراہ شہد، رس اورک یا دودھ وغیرہ سے دیں۔

نیز بھون کیرتی رس (لوگ رتناکر) ایک تا دو گولی ہمراہ رس، پانی یا شہد دن میں تین بار دیں، جب کھانسی بار بار اُٹھے تو ایلا ری وٹی (چکروت) چوسنے کے لئے دیں۔ کھانسی اور سینے کی تکلیف کے لئے مجرب ہے۔

ہومیو پیتھک علاج :- اکونائٹ، سیلا ڈونا، ایونیا کارب (شدید کھانسی کے لئے) برائی اونیا، علاوہ ازیں فیرم فاس، کالی میوز، کلکیریا فاس بھی عمدہ ادویات ہیں۔

نوٹ :- جن مریضوں کو ایک بار نمونیہ ہو جائے تو اس مرض میں دوبارہ مبتلا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لئے ایسے مریضوں کو

سردی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، خصوصاً موسم سرما میں گرم لباس سے چھائی کو بچانا چاہیے۔
غذا و پرہیز: پھلوں کا رس، دودھ، چائے وغیرہ دیں۔ دیرینہ صائم و ٹھنڈی غذاؤں سے سخت پرہیز کر لیں۔

آورن پرڈا، درد پلو، ذات الجنب، پلیورسی، (Pleury)

تعریف مرض:۔ اس مرض میں سینہ کی اندر دنی دیوار اور پیچھڑوں کے اوپر پلغوف جھلی میں درم ہو جاتا ہے۔
وجوہات:۔ سردی لگنا، نزلہ، زکام، خسرہ، منونہ، سل، تپ محرقہ، چوٹ لگنا وغیرہ، لیکن اکثر اس مرض کا سبب مادہ سل ہو کرتا ہے۔
علامات:۔ یہ مرض اچانک پسلی کے درد، سردی کے بخار اور کھانسی کے ساتھ شروع ہوتا ہے، درد اس قدر شدید ہوتا ہے، جیسے کوئی برچی جھو رہا ہو۔ یہ درد پستان کے نیچے ہوتا ہے۔ جس کی ٹیس بغل تک جاتی ہے۔ گہرا سانس لینے، کھانسنے یا ماؤف طرف لیٹنے سے درد میں زیادتی ہوتی ہے، بخار کی حرارت عام طور پر ۱۰۰ سے ۱۰۴ درجہ فارن ہیرٹ تک رہتی ہے، اگر سینہ پر آلہ سماع الصدر لگایا جائے تو گرگڑ اور گرگڑاہٹ کی آواز پائی جاتی ہے اکثر منونہ سے پہلے یا بعد میں بخار کے دوران میں پلیورسی کا عارضہ ہو جاتا ہے، کبھی متورم پردوں کے درمیان میں رطوبت جمع ہونے لگتی ہے، اگر پانی جمع ہو جائے تو گرگڑاہٹ کی آواز میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور کبھی پانی کے بعد پپ بینی شروع ہو جاتی ہے، کبھی درم خشک بھی ہو جاتا ہے، جب سل (تھائی سیس) کے دوران میں خون کے زہریلے ہو جانے سے یہ مرض ہو جائے تو ماؤف غلاف شش (پیچھڑے) کی تراوش یافتہ رطوبت کی رنگت صاف لٹنی ہوتی ہے اگر غور دینی جا پرخ کی جائے تو اس میں لیمفو سائٹس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور پپ پیدا کرنے والے جراثیم موجود نہیں ہوتے، پلیورسی سلی عموماً ۱۱ سے ۲۲ سال کی عمر میں ہو کرتی ہے۔

علاج ڈاکٹری:۔ مریض کو بستر پر آرام سے لٹائیں، منونہ کے علاج کی طرح پپنی سلین و سلفا ڈرگز کا استعمال اور مالش و سینک کرنا مفید ہے ڈاکٹری نقطہ نظر سے منونہ اور پلیورسی کے علاج میں پپنی سلین ہی سب سے زیادہ موثر علاج ہے۔ اور ان امراض میں خصوصاً پپنی سلین کو استعمال میں نہ لا کر دوسری ادویات کا استعمال کرنا مریض پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ ہمارے تجربات کے مطابق پپنی سلین سے زیادہ سٹریپٹو پپنی سلین زیادہ موثر ہے، بیرونی طور پر آئیوڈکس کی مالش کر کے اوپر سے سینک کرنا بھی مفید ہے، مریض کو پانی کی مقدار زیادہ نہیں دینی چاہیے تاکہ غلاف شش میں رطوبت میں تراوش نہ پائے، بخار دور ہو جانے پر بھی بغیر تنک کی خشک غذاؤں دیں، مریض کو ہوا کے جھونکوں، گرد و غبار اور دھوئیں سے بچائیں، اگر اس مرض میں بخار کافی دنوں تک ہے، اور بار بار لرزہ ہو تو سمجھنا چاہیے کہ غلاف شش میں پپ پیدا ہو گئی ہے، ایسی حالت میں مقامی تخذیر کے بعد جھپی، ساتویں پسلی کے درمیان پولی سوئی داخل کر کے غلاف شش میں سے تراوش یافتہ رطوبت کو نکال دیا کرتے ہیں، لیکن یہ عمل ایک مستند اور تجربہ کار ڈاکٹر کر سکتا ہے، اور اسے طب جدید میں "پیراسن ٹے سس" کہتے ہیں۔

پلیورسی کے درد کو عارضی طور پر تسکین دینے کے لئے سارڈیان یا اناسین یا کوڈوپارین استعمال کرائیں، پپنی سلین، سٹریپٹو مائی سین اور سلفا ڈرگز کے علاوہ اس مرض میں کلورومائی سیٹن یا سنٹھومائی ٹین بھی مفید ہیں، جوانوں کے لئے ایک ایک کیپ شول دن میں چار بار اور بچوں کے لئے کلورو مائی ٹین لمبی ٹیٹ آدھا سے ایک چمچہ عمر کے مطابق دن میں چار بار دیں، جب دق کے جراثیم کی سرایت پیچھڑوں سے تجا و ذکر کے غشاء الریہ کو ماؤف کرنے تو سٹریپٹو مائی سین ایک گرام کار و زانہ عضلاتی انجکشن دینا پلیورسی کا جدید مجرب علاج ہے۔

ماڈرن ادویات:۔ علاج بطور منونہ کریں، منونہ کے علاج کی طرح سٹریپٹو پپنی سلین کے عضلاتی انجکشن اور بیرونی ٹکڑ کا استعمال مفید ہے۔ مقام درد پر خشک سینک کرنا زیادہ مفید ہے۔ آج کل انٹی فلو جین وغیرہ کا استعمال کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو چھاتی پر لگایا جائے تو اپنے بوجھ

سے سانس میں روکاؤٹ ڈالتا ہے اور ان میں دوسرا نقص یہ ہے کہ سرد ہو کر تکلیف دہ بن جاتے ہیں۔ اس لئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ صرف ربڑ کی بنی ہوئی گرم انی کی بوتل استعمال کی جائے، اس بوتل میں ایک تہائی گرم پانی ڈالنا چاہیئے تاکہ ڈھیلی رہے اور اس کے اوپر مناسب طریقہ سے تولیہ لپیٹ دینا چاہیئے۔

- ۱۔ ایسے سٹرین 'ایس' (Am bistrin-S) سارا بھائی۔ میسٹر پیپون (Mystrepton) ایم، ایس، ڈی، سٹرپٹونیکس (Streptonex) ڈومیکس۔ سٹرپٹوڈوسین (Streptoduocin) المیک۔ کومائی سین (Comycin) گلیکسو وغیرہ۔
- ۲۔ ڈالی کرٹے سین (Dicrysticin) سارا بھائی۔ سٹرپٹوپینی سلین (Streptopenicillin) ڈومیکس۔ کمبائیوٹک (Combiotic) فزیر وغیرہ کا عضلاتی انجکشن ۴ گھنٹہ بعد دیں۔

۳۔ مائی سٹیکلین 'وی' (Mysteclin-V) سارا بھائی۔ ایک کیپ شولز دن میں دو بار دیں، بچوں کو ڈراپس وزن کے مطابق آٹھ تا دس بوند دیں۔

۴۔ پینڈ یا پینی ٹرائڈ مرض کی عام حالت میں ایک گولی صبح و ایک گولی شام دیں۔

۵۔ لیڈر مائی سین (Ledermycin) ایک دو کیپ شولز دن میں دو بار دیں۔

۶۔ درد کی تیز حالت میں نوڈلجین یا سبالجین یا پیراٹامول ایک گولی تازہ پانی سے دیں۔

جب پھیپھڑے کے غلاف میں بہت سا سیرم یا آب خون تراوش پا کر جمع ہو جائے تو چھٹی یا ساتویں سپیوں کے درمیان پولی سوئی داخل کر کے اس کو نکال دینا ضروری ہے۔ اس عمل کو پیراسن ٹی سس کہتے ہیں، یہ عمل ایک ہوشیار اور مستند ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے۔

یونانی علاج :- یہی دانہ تین ماشہ، عناب پانچ دانہ، سوڑیاں ۹ دانہ، تخم خطمی سات ماشہ، پانی میں جوش دے کر صاف کر کے اور شیرہ تخم کا ہوتن ماشہ، بت بنفشہ دو تولہ اضافہ کر کے خاکسی سات ماشہ چھڑک کر پلائیں، اگر مادہ زیادہ رقیق ہو تو اس جو شانڈے میں گل نیلوفر سات ماشہ، عناب الشلب سات ماشہ، زبان پانچ ماشہ، تخم خبازی سات ماشہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگر حرارت زیادہ ہو تو شیرہ تخم خرفہ اور شیرہ مغزکدو ہر ایک تین ماشہ بڑھائیں، کھانسی کی شدت بحوق پستال چٹائیں، مقام درد پر گندم کی روٹی ایک طرف سے پکا کر دوسری طرف تلون کا تیل لگا کر گرم گرم باندھیں۔ قدیم طریقہ علاج کے مطابق نصہ لانے کی بھی ہدایت ہے۔ اگر پلیورسی ریح کے غلبہ سے ہو، جس میں بخار وغیرہ بھی نہیں ہوتا، اس کے لئے کشتہ بارہ سنگا ایک رتی، محجون فلا سفہ چھ میں ملا کر عرق گاؤ زبان تین تولہ کے ہمراہ کھلانا مفید ہے۔ مقام درد پر روغن پھول آک یا روغن شرخ نیم گرم ملنا بھی مفید ہے۔

آیور ویدک علاج و ہومیوپیتھک علاج بطر نمونہ کے کریں، جس کا ذکر پچھلے صفحات میں کیا جا چکا ہے۔

قدرتی علاج میں پرانا یام یا پھیپھڑوں کی دیگر ورزشیں کرنا سیال جذب کرنے کے لئے مفید ہے۔

غذا و پرہیز :- زود ہضم و مقوی غذا مثلاً ابلے انڈے، بکری کا شوربہ، چوزہ، مرع کی بجینی، شوربا، مونگ کی دال، چپاتی دیں، پانی کا زیادہ مال اور دیر ہضم اغذیہ سے سخت پرہیز کرائیں۔

پیشی شول، وجع الجنب، سینہ کا عضلاتی درد، پلیورودینا، (PLEURODYNIA)

تعریف مرض :- اس مرض میں سینہ کے عضلات میں درد شروع ہو جاتا ہے، جو اکثر عضلات یا درمیانی جھلی کے ورم کی وجہ سے درد ہوتا ہے۔ وجوہات :- پھٹوں کی کمزوری، سردی لگنے یا بھیگنے سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے، یہ عام طور پر کمزور عورتوں کے بائیں پہلو میں زور سے درد ہوتا ہے اس

کا نام مشہور طبیب رازی نے وجع الجنب تحریر کیا ہے۔

علامات :- سینہ میں زور کا درد ہوتا ہے، لیکن منتشر اور بلا بخار ہوتا ہے۔ اس مرض کا درد جگہ سے تشخیص کرنا نہایت ضروری ہے۔

علاج :- درد دور کرنے کے لئے پی، سی پوڈر یا سارڈین یا کوڈوپارین یا نولجین وغیرہ دیں۔ مقام ماؤف پر پینٹ ٹرین ٹائسن کی نیم گرم مالش کر کے اوپر سے روئی باندھ کر سبک کریں۔ مریض کو سرد ہوا سے بچائیں۔
اگر مرض کا زور زیادہ ہو تو پینی سلین کا عضلاتی انجکشن دیں، سلفا ڈرگز یا سپٹران کا استعمال بھی فائدہ مند ہے۔
یونانی و آیور ویدک علاج میں کشتہ بارہ سنگا کا استعمال مفید ہے۔
ہومیوپیتھک علاج میں اکونائٹ، برائی اونیا اور فیرم ناس وغیرہ ادویات از حد مفید ہیں۔
غذا و پرہیز :- سونگ کی دال، سالم مونگ، شوربا، یعنی ابلے اندے سمراہ چائے مفید ہیں۔ سرد و دیرینہم اغذیہ سے سخت پرہیز کریں۔

رکت سبھی ون، خون تھوکتا، نفث الدم، ہنیاپی سٹس، (HAEMOPTYSIS)

تعریف مرض :- اس مرض میں قے یا کھانسی کے ساتھ خون آتا ہے۔
وجوہات :- اکثر اس مرض کا سبب پھیپھڑوں کی سل ہے اور اس مرض میں مریض خون تھوکتا کرتا ہے، لیکن پھیپھڑوں کی سوجن (مونیا) پھیپھڑوں کا مردار پڑ جانا، طلق، خجھرہ، ہوا کی نالی میں باریک شرائن کے پھٹ جانے سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ زور سے کھانسنے، بلند مقامات پر چڑھنے، کبھی دھواں چوٹ، بواسیر، حیض کی بندش، جگر کے سکڑ جانے سے بھی یہ عارضہ ہو سکتا ہے، بعض دفعہ زیادہ ورزش یا زیادہ زور سے چلانے سے بھی خون تھوکنے کا عارضہ پیدا ہو جاتا ہے۔

علامات :- خونی قے آتی ہے، کبھی کھنکھار میں خون ساتھ ملا ہوا کرتا ہے۔ اگر پھیپھڑے سے خون آ رہا ہو تو اس کا رنگ شوخ لال، جھاگ دار اور بلغم میں ملا ہوا کھانسی کے ساتھ آتا ہے، اگر خون معدے سے بذریعہ قے خارج ہوتا ہے تو اس کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے اور اس میں کسی قدر غذائی ہوتی ہوتی ہے۔ اور مقام معدہ پر گرمی دھلن معلوم ہوتی ہے، دماغی چوٹ سے خون آ رہا ہو تو عام طور پر قے کے ذریعے خون جما ہوا، سیاہ رنگ اور لوتھڑوں کی صورت میں خارج ہوتا ہے، اگر مسوڑھوں سے آتا ہو تو مقامی طور پر دیکھا جاسکتا ہے اور یہ خون معمولی تھوک سے نکلتا ہے۔

ڈاکٹری علاج :- اگر تھوک میں صرف خون کی دھاریاں ہوں یا بلغم کسی قدر خون آمیز ہو تو صرف اتنا علاج کافی ہے کہ مریض کوئی زور کا کام نہ کرے۔ اگر شہہ رگ نہ پھٹ چکی ہو تو خون کا اخراج اپنے آپ بند ہو جاتا ہے، اگر تپدق کی وجہ سے آ رہا ہو تو سٹریٹو مائی سین کے عضلاتی ٹیکے دیں، (تپدق کا بیان آگے درج ہے)، ایمائل نائٹریٹ سونگھائیں، یہ خون کے دباؤ کو کم کر کے اخراج خون کو روک دیتی ہے، بارہ گھنٹے تک کوئی چیز کھانے کو نہ دیں اگر مریض کمزور ہو تو اسے مغوی غذا دیں، اگر دل کمزور ہو تو محرکات کا استعمال کریں، مناسب مقدار میں مارفیا و اڑوپین کا انجکشن بھی مفید ہے، لیکن کمزور مریضوں کے لئے یہ سخت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، حیاتین کے انجکشن ایک سے دوسری عضلاتی ٹیکہ کریں۔ اس سلسلہ میں کیپی لان (Capilan) سا گلیکسولکینی ایک سی سی کا عضلاتی انجکشن مفید ہے یا ہیموپلاٹین دوسری سی عضلاتی ٹیکہ سے دیں۔

کیسٹم گلوکونیٹ یا کیسٹم کلورائیڈ کے دریدی انجکشن بھی مفید ہیں۔
کیسٹم کلٹیٹ دس گرین کی مقدار میں دن میں دو یا تین بار دینے سے بھی خون آنا فوراً بند ہو جاتا ہے، اگر خون بہت زیادہ خارج ہو چکا ہو تو بلڈ ٹرانسفیوژن (عمل انتقال الدم) عمل میں لائیں، لیکن یہ طریقہ ایک مستند تجربہ کار ڈاکٹر ہی سرانجام دے سکتا ہے۔
ماڈرن ادویات :- اصل سبب کو معلوم کر کے خون بند کر دیں۔ مریض کو بستر پر لٹائیں، سر کو نیچا رکھیں، بارہ گھنٹے تک کوئی چیز کھانے کو نہ دیں۔

پھر سیال اغذیہ آتش جو وغیرہ دیں۔

۱۔ تپ دق میں خون تھوکنے کا فوری علاج سٹریپٹومائیٹین کا انجکشن لگانا چاہیے۔

۲۔ سٹیپٹوبیون (Styptobion) ای مرک ————— معمولی حالت میں اس کی ایک ٹیکہ اور شدید حالتوں میں اس کی دو ٹیکہ دن میں تین بار کھلائی جائیں۔

۳۔ الکسر ہیرورٹن ایٹ ٹرین ہائیڈریٹ (پارک ڈیوس) ہر سے ایک ڈرام دن میں تین بار پلائیے۔

۴۔ وٹامن کے (سنگاوت - روش) کا ایک سی سی عضلاتی انجکشن خود بخود خون بہنے یا خون تھوکنے کے لئے مفید ہے۔ یہ دو وٹامن "کے" کی خامی کے سبب فائدہ مند ہے، زیادہ تکلیف کی حالت میں اسٹیپٹس بیون (ای مرک) کا عضلاتی انجکشن لگانا مفید ہے۔

۵۔ ریڈوکسان (روش) ۵۰ ملی گرام، کلووڈن (جرمن) ایک ٹیکہ، دونوں کو پانی کے ساتھ دن میں تین چار بار دیں، نفٹ الدم کیلئے مفید ہے۔

۶۔ وٹامن کے (Vitamin-K) ہر قسم کے جریان خون کو روکتی ہے، اسے گلیکسومکینی کپی لان (Kaplan) ۱۰ ایرٹ کینی کلووڈجن

(Clotogen)، بی، ڈی، ایچ پروکے وٹ (Prokavit)، بارکپینی کیاکسن (Kapanax)، روچی کینی سنگاوت (Synkavit)

کے نام سے تیار کرتی ہے۔ ایک سے دو گولی دن میں دو سے تین بار دیں۔

۷۔ سٹیپٹو وٹ (Styptovit) ایک سے دو ٹیکہ پانی سے دن میں دو سے تین بار دیں۔

۸۔ سوبیون (Cebion) ۵۰ ملی گرام دو سے چار گولی دو سے تین بار دیں۔

یونانی علاج: محرکات شدید سے پرہیز کرائیں اور گہرو، سنگ جراحی ہموزن باریک پس کر محفوظ رکھیں اور بوقت ضرورت تین ماشہ سچ، تین ماشہ دوپہر اور تین ماشہ شام کو ہمراہ مناسب بدرقہ دیں۔ یہ خون کی روانی کو خواہ کسی وجہ سے ہو فوراً بند کرتا ہے۔ خون حیض ہو خواہ خونی بواسیر، منہ سے آتا ہو، قے الدم ہو یا نفٹ الدم یا اسہال دسوی ہوں۔ سب کے لئے مفید ہے۔ خون خواہ کسی جگہ سے آتا ہو، مناسب بدرقہ کیساتھ دیں تو تین یا چار خوراک میں خون بند ہو جاتا ہے۔ یہ ایک آسان اور مجرب نسخہ ہے۔ بنا کر فائدہ اٹھادیں۔

قرص کہربا: کہربا، گوند کیکر، نشاستہ، کیترا، مغز بیج کھیرا، مغز بیج کدو، ہر ایک تین ماشہ، پھول انار، اقلانیہ ہر ایک دو ماشہ۔

تمام ادویات کو باریک کر کے لعاب الیسیبول کی مدد سے چار چار ماشہ کی ٹکیاں تیار کریں، خوراک چار سے چھ ماشہ تک ہمراہ شربت انجبار یا صندل دیں پھیپھڑے کی خونی قے، بواسیر خونی، کثرت حیض، زخم گردہ و مثانہ اور خونی پیشاب کے لئے مفید ہے۔

دیگر: بانسہ کے تازہ پتے دو تولہ کو دو چھٹانک پانی میں گھوٹ کر صبح و شام پلائیے، تپ دق کا خون بند کرنے کے لئے نہایت ہی مفید ہے۔

تریاق الدم: کشتہ صدف مرواریدی چار رتی، بانسہ کے تازہ یا خشک پتے تین تولہ کو دس تولہ پانی میں گھوٹ کر صبح و شام پلائیے پھیپھڑوں کے

زخموں کی وجہ سے جو خون آ رہا ہو۔ اس کو بند کرنے کے لئے تریاق الاثر ہے، بارہا کا مجرب ہے۔

دیگر: ہڑتال گوندنی کو ٹلوں پر رکھ کر جلا لیں اور دو سے چار چاول ہمراہ شربت انجبار دن میں دو بار کھلائیں۔

آیور ویدک علاج: بول پر پٹی (لوگ رتناکر) دو تا چار رتی دن میں تین بار ہمراہ شہد دیں، ہر قسم کے رکت پر در، بواسیر خونی، جریان خون اور خونی دستوں کے لئے نہایت مفید ہے، اس کے استعمال سے خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، اس وجہ سے بہتے ہوئے خون مذکورہ بالا کو فوراً روکتی ہے۔

چندن آدی چورن: چندن سفید، جٹا بانسی، لودھ پٹھانی، خس، کھانڈ، کنول کیسر، ناگ کیسر، بیل گری، ناگر موٹھا، مشک بالا، پاٹھا، کڑا چھال،

سونٹھ، اندر جو، اتیس، گل دھاوا، رسونت، آم کی گٹھلی کی گری، موچرس، جامن کی گٹھلی کی گری، نیلوفر، مجیٹھ، لالچی خورد، انار دانہ برابر وزن،

ان سب کا سفوف بنا کر ملا لیں۔

خوراک :- چار چار ماشہ صبح و شام ہمراہ مشرب انجبار دیں، رکت پر در (کثرت طمث)، سیلان الرحم (لیکوریہ)، دستوں کے ساتھ خون آنا، غنی بواسیر، رکت پت (سیلان خون)، نکیر اور جسم کے کسی حصہ سے خون جاری ہو، یہ جو رن بے حد فائدہ کرتا ہے۔

ہومیوپیتھک علاج :- جب خشک کھانسی ہو اور آخر میں خون نکلے یا پھیپھڑوں سے خون آنے لگے تو ایکلفا انڈیکا مفید دوا ہے، مرض کی پرانی حالت میں فاسفورس کا استعمال مفید ہے۔

بالوکیک طریقہ علاج میں اگر دق یا سل میں پھیپھڑے سے کھانسی کے ساتھ بکثرت خون آئے تو فریم فاس $x 12$ اس کو روکنے کے لئے لاثانی دوا ہے۔

قدرتی علاج :- کلفہ کاساگ، انار، غنچہ انار کا استعمال اور جاسن کا استعمال بہت مفید ہے۔
غذا و پرہیز :- سیال اغذیہ، دودھ، آتش جو وغیرہ مقوی مقدار میں دیں۔ پھیپھڑے کو تحریک دینے والی گرم ترش اور دیرینہ اغذیہ بالکل نہ دیں۔

راج کیششا، پھیپھڑوں کی سل، ٹیوبرکیولوسس (Tuberculosis)

تعریف مرض :- یہ ایک عام چھوت دار مرض ہے، کوئی قوم، کوئی فرقہ اور کوئی جنس اس مرض کی زد سے محفوظ نہیں ہے۔
وجوہات :- اس مرض کا سبب مائیکوبکٹیریا ٹیوبرکیولوسس ہے۔ یہ جسم کے ہر حصے میں سرایت کر سکتا ہے۔ اور کسی ساخت میں جسم کو چھوٹی چھوٹی گانٹھیں یا دانے بنا دیتا ہے، جب سل و دق کے جراثیم جسم میں داخل ہوتے ہیں تو خون کے سفید ذرات حملہ آور جراثیم سے مقابلہ کرنے کے لئے وہاں پہنچ کر ان کے گرد ایک قسم کا خول بنا لیتے ہیں۔ اور جراثیم کو مزید ضرر رسانی سے روک دیتے ہیں، آہستہ آہستہ اس خول کی شکل گانٹھ کی طرح ہو جاتی ہے، اگر اس مرض سے پھیپھڑے متاثر ہوئے ہوں تو اسے پلیمونری ٹیوبرکیولوسس کہتے ہیں۔ اگر اس مرض کے جراثیم سارے جسم میں پھیل جائیں تو اسے ملٹری ٹیوبرکیولوسس کہتے ہیں۔ اگر پردہ دماغ میں اس مرض کی وجہ سے گانٹھیں پیدا ہو جائیں تو ٹیوبرکیولوسس سنجائی ٹس کہتے ہیں، جب گردن کے غدودوں پر اس مرض کا حملہ ہو تو اسے خنازیر (کنٹھ مالا) کہتے ہیں۔ اس طرح سل حنجری، سل بطنی (پریٹ کے غدود کی سل)، سل مفصلی (جوڑوں کی سل) وغیرہ۔

چونکہ یہ ایک مستعدی مرض ہے۔ اس لئے سل کے مریضوں سے یہ تندرست اشخاص کو ہو جاتا ہے۔ یہ مرض موروثی بھی ہوتا ہے، دائمی نزلہ، زکام، پلیمورسی، منویر، خراب غذا، بخار کی حالت میں ملاپ، تنگ و تاریک مکانوں و کثیف ہوا میں بڑا دیراس اس مرض کے خاص اسباب ہیں۔
اکثر بطن، تھوک اور پاخانہ سے اس مرض کے جراثیم پھیلتے ہیں، جیسا کہ ہم لکھ آئے ہیں، سل کی کئی اقسام ہیں۔ اور جب تپ دق کے جراثیم کسی ایک اعضاء میں داخل ہو جاتے ہیں تو تمام جسم کو تکالیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس مرض کا حملہ عام طور پر ۱۴ سال سے ۳۰ سال کی عمر میں زیادہ ہوتا ہے۔ مریض سل کے تھو کے ہوئے بطن میں سل کے بے شمار کیڑے موجود ہوتے ہیں۔ یہ کیڑے خشک شدہ بطن میں بھی زندہ رہتے ہیں۔ تپ دق کے مریض سے بات چیت کرنے یا کھانے وقت براہ راست بذریعہ سانس بھی مریض سے تندرست کو لگ سکتی ہے۔ اکثر اوقات اس مرض کا حملہ پھیپھڑوں پر ہوتا ہے۔

اعضائے بدن کی بڑھوتری کے لئے غذا سے جو رطوبتیں پیدا ہوتی ہیں، ان کے چار درجات ہیں :-

۱۔ وہ رطوبت جو عروق شریہ کے باریک جال میں پہنچ کر اعضاء کی غذا بننے کے قابل ہوتی ہے۔

۲۔ یہ رطوبت جو عروق شریہ سے نکل کر اعضاء کی سطح پر شبنم کی طرح پھیل جاتی ہے۔

۳۔ یہ رطوبت اعضاء کی شکل اختیار کر لیتی ہے، لیکن ابھی پختہ نہیں ہوتی۔

۴۔ وہ پوری طرح عضو کی شکل میں مستحیل ہو جاتی ہے۔

جب تپ دق عارض ہوتا ہے تو وہ اسی رطوبت کو فنا کرنے لگتا ہے اور درجہ بدرجہ رطوبت کے ابتدائی درجات کو فنا کرتا ہوا ترقی کرتا جاتا ہے اور پھر اعضاء کو تحلیل کرنے لگ جاتا ہے، معالجین نے اس کی مثال چراغ میں جلتے ہوئے تیل سے دی ہے، جب چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے تو حرارت اس تیل کو جلانے لگتی ہے، جوتبی میں موجود ہوتا ہے۔ یہ دق کا دوسرا درجہ ہے، جسے زبول کہتے ہیں۔ جب بتی کا تیل بھی ختم ہو جاتا ہے تو خود بتی کو آگ لگ جاتی ہے، یہ دق کا تیسرا درجہ ہے، اس کو طب میں مفتت اور مخفف کہتے ہیں۔

علامات :- اطباء نے تپ دق کے تین درجے مقرر کئے ہیں، اس لئے ہر درجہ کی علامات الگ الگ قرار دی گئی ہیں۔

درجہ اول :- معمولی بخار رہتا ہے، صرف نبض میں ذرا تیزی آ جاتی ہے، طبیعت سُست رہتی ہے، اس سُستی کا اثر شام کے قریب زیادہ ہوتا ہے۔ صبح کو طبیعت بحال ہو جاتی ہے، پھر رفتہ رفتہ کبھی خفیف بخار ہو جاتا ہے، جو رات کے آغاز پر ذرا تیز ہو جاتا ہے اور پچھلی رات کے وقت پسینہ آکر اُتر جاتا ہے۔ ان کو آرام رہتا ہے، اس درجے کی تشخیص نہایت مشکل ہے، لیکن علاج آسان ہے۔

درجہ دوم :- اس درجہ میں بخار تیزی سے ہونے لگتا ہے، اور کچھ دیر بعد پسینہ آکر بخار میں تخفیف ہو جاتی ہے، کبھی اس بخار کی دو نوبتیں ہوتی ہیں، پہلی نوبت دوپہر کے وقت ہوتی ہے، جو پانچ گھنٹے کے قریب رہتی ہے، پھر پھوٹے عرصہ بعد تخفیف ہو کر دوسری نوبت شروع ہو جاتی ہے، جو دو بجے رات تک رہتی ہے، پھر بہت سا پسینہ آکر بخار رفع ہو جاتا ہے، پیشاب سُرخ رنگ کا کم مقدار میں آتا ہے، رخساروں پر سُرخ رنگ کے حلقے پڑ جاتے ہیں، ہاتھوں کے تلوے جلتے ہیں، بہت گرمی محسوس ہوتی ہے، مریض روز بروز دُبلتا اور کمزور ہوتا جاتا ہے۔ بھوک کم ہو جاتی ہے، آنکھیں اندر کی طرف دھنس جاتی ہیں۔ بدن کا گوشت کم ہو جاتا ہے۔ اور ہڈیوں کے سرے نکل آتے ہیں، کپٹیاں دب جاتی ہیں، پیشانی کی جلد کھچ جاتی ہے، چہرہ کی رونق اور تازگی جاتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چہرہ پر گرد پڑی ہوئی ہے۔ ہلکوں اور پوٹوں کا اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، آنکھیں خواب آلود معلوم ہوتی ہیں، ناک اور گردن ہو جاتے ہیں۔ کان جھوٹے، تنگ اور زرد رنگ کے ہو جاتے ہیں، زرخرہ بلند ہو جاتا ہے، سینہ کی ہڈیاں ابھر آتی ہیں۔ آواز باریک ہو جاتی ہے۔ ظاہر اور خون سے خالی معلوم ہوتی ہیں۔ بال بے ہو جاتے ہیں اور ان میں جو میں پڑ جاتی ہیں۔ کندھوں کی ہڈیاں اونچی ہو جاتی ہیں، پریٹ کمزور ہو کر پیٹھ سے لٹک جاتا ہے۔

درجہ سوم :- پیشاب میں روغنی اجزاء کافی خارج ہوتے ہیں۔ بھاری خشکی سے تمام بدن کا گوشت تحلیل ہو جاتا ہے۔ بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ منہ پر کڑھیر ہو جاتی ہے۔ بدن پر ہڈیوں اور چمڑے کے بغیر کچھ باقی نہیں رہتا، بخار زور سے ہوتا ہے اور اس میں تخفیف کا وقت کم ہو جاتا ہے۔ اسہال ذوبانی آنے لگتے ہیں اور نرم ہڈیاں گل کر دستوں کے ذریعے خارج ہو جاتی ہیں۔ پاؤں پر درم آ جاتا ہے اور نہایت کمزوری کی حالت میں موت کی گود میں چلا جاتا ہے۔

اس بخار کا دوسرا بخاروں سے تشخیص کرنا ضروری ہے۔ اس بخار میں معمولی بخار ہر وقت لازمی طور پر رہتا ہے، غذا کھانے کے بعد حرارت زیادہ ہو جاتی ہے، نبض صلب، کمزور اور متواتر ہوتی ہے، جو غذا کے بعد قوی اور عظیم ہو جاتی ہے، گالوں پر سُرخ دارغ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جوتپ دق کی خاص علامات ہیں۔

جب تیز حرارت کے بعد حرارت کم ہو جائے یا بالکل نہ رہے، نبض منہ ہو، پیشاب میں چھلکے دار مادہ پایا جائے۔ ناخن سبز ہو جائیں، آواز باریک پینڈ لیاں پتلی ہو جائیں، بدن خشک ہو، سانس تنگی سے آئے، خفیف کھانسی ہو، خونی اسہال آئے تو مریض کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسی حالت میں وہ وہ سے زیادہ ایک ہفتہ کے اندر فوت ہو جاتا ہے۔

مسارع الصدر لگانے سے اس مریض کی تشخیص بخوبی کی جاسکتی ہے، کیونکہ پھیپھڑے میں سے ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح آوازیں آتی ہیں، اگر اخیر سے ٹوٹا جائے تو پھیپھڑے کے شکاف صاف طور پر دکھائی دیتے ہیں، اس بیماری کی تشخیص مریض کی تھوک سے بذریعہ خوردبین بھی کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ

دق کے جراثیم تھوک میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وان پیرقٹ ٹیسٹ (Vonpirqvettest) سے بھی اس مرض کا پتہ لگایا جاسکتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جلد کو صاف کر کے اس کے اوپر ایک قطرہ ٹوبرکولین لگائیں اور اس پر خفیف زخم نشتر سے چپک کے ٹیکہ کی طرح لگادیں۔ اگر مریض اس مرض میں مبتلا ہے تو اس جگہ پر سوجن ہو جائے گی، اسی طرح ٹوبرکولین کی مرہم لینولین میں بنائی جاتی ہے اور اس کی جلد پر مالش کی جاتی ہے۔ اگر مریض اس مرض سے متاثر ہو تو مرہم والی جگہ پر سوجن ہو جاتی ہے۔

بلغم کی خوردبینی جانچ کا طریقہ:- تب دق کے مریض کی بلغم کا خوردبینی امتحان کریں، اس سلسلہ میں رات کو مریض سوتے وقت ایک ڈھکنے والا چھوٹا برتن رکھے، جب کھانسی آئے اور بلغم خارج ہو تو اس میں تھوک کے صبح اس بلغم کا معائنہ کیا جائے اور بلغم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اسلانی پرے کر سلائڈ پر رکھیں اور دوسری طرف سلائڈ اس کے ساتھ چسپاں کر کے حرکت دیں۔ یہاں تک کہ دونوں سلائڈوں کی ملحقہ سطح پر بلغم کی ایک نہایت باریک فلم بن جائے اب ان میں ایک کو شعلہ پر ذرا گرم کریں۔ اس قدر نہیں کہ جل جائے، پھر ٹھنڈا ہونے پر اس پر کاربال نکسن (Carbolfuchsin) جو اس کام کے لئے خاص رنگ ہے۔ اس قدر ڈالیں کہ سارا فلم ڈوب جائے، لیکن اتنا نہیں کہ سلائڈ سے نیچے گر جائے۔ اب اس کے نیچے سپرٹ لیمپ رکھ کر اس قدر آہستگی سے گرمی پہنچائیں کہ رنگ کا گھول اُبلنے نہ پائے، صرف بخارات اس میں سے نکلتے نظر آئیں، تین چار منٹ تک یہ عمل کرنے پر سلائڈ کے ٹھنڈا ہونے پر یہ گھول نیچے گرا دیں۔ اب اس کو ۲۰ فیصدی شورے یا گندھک کے تیزاب میں ڈبوئیں اور ڈیوٹے پر نکال کر پانی میں ڈوبا دیں، پھر تیزاب میں اور پھر پانی میں یہاں تک کہ اس کا رنگ دور ہو جائے، اب فلم کے تمام حصے سوائے جراثیم دق کے اپنا رنگ کھو چکی ہوں گی، دق کے جراثیم پر یہ رنگ اتنا پختہ چڑھتا ہے کہ تیزاب سے بھی نہیں اُترتا۔ اب سلائڈ پر میٹھی لین بلیو کا ایک فیصدی کا گھول ڈالیں، اور ایک دو منٹ تک پڑا رہنے دیں، اس سے تمام ساختیں ماسوائے دق کے جراثیم کے نیلی ہو جاتی ہیں، اب فلم کو سکھا کر خوردبین میں دیکھیے، اگر دق کے جراثیم ہوں گے تو سرخ لکیروں کی صورت میں نظر آئیں گے۔

جراثیم دق کے علاوہ بعض اوقات بلغم کو دوسرے جراثیم کی موجودگی کے لئے بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس طریق پر ہی فلم بنائی جاتی ہے اور گرم کر کے قائم کی جاتی ہے۔ لیکن اس پر کاربال نکسن کی جگہ میٹھی لین بلیو کا رنگ ڈالا جاتا ہے، اس سے تمام جراثیم اور دوسری ساختیں سفید رنگ اختیار کر لیتی ہیں، اس کے بعد اسے خوردبین سے دیکھا جاتا ہے۔

علاج ڈاکٹری:- دق کے علاج میں سب سے زیادہ اہم جزو آرام ہے اور دوسرے لوگوں کے بچاؤ کے لئے دق کے مریض کو تندرست لوگوں سے علیحدہ رکھنا ضروری ہے اور دق کے حملہ سے محفوظ رہنے کے لئے بی، سی، جی کا ٹیکہ لگوانا مفید ہے، مریض کے لئے آرام اس قدر ضروری ہے کہ جب تک بخار قطعی اُتر نہ جائے، مریض بستر کو نہ چھوڑے، اس کے بعد آہستہ آہستہ زندگی کی سرگرمیوں میں حصہ لیا جاسکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے، کہ مریض کا بحیرے لیا جائے اور بلغم کی خوردبینی جانچ کی جائے، مریض کو لگ بھگ چار ہزار کیلوری طاقت کی روزانہ خوراک دینی چاہیے، جس میں سب حیاتیات (وٹامنز) بکثرت ہوں، اس کے علاوہ پروٹین سے بھرپور اغذیہ مثلاً دودھ، انڈے، گوشت، دالیں، سبزیاں اور پھل بھی کھانے کے لئے دیئے جائیں لیکن مریض کو یہ اغذیہ بقدر ہضم کھانی چاہئیں۔ چونکہ عام معالجین اس مرض کے خصوصی علاج کا تجربہ نہیں رکھتے، اس لئے مریضوں کو صرف تب دق کے ہر معالجیہ سے علاج کرانا چاہیے، جو کہ مرض کے نشیب و فراز سے پوری طرح واقفیت رکھتا ہو۔ اس کے علاوہ عام مریضوں کے لئے پہاڑی مقامات خصوصاً جن مریضوں کو ۱۰۰ درجہ فارن ہیٹ سے زیادہ حرارت رہتی ہو یا خون مقو کئے والے مریضوں کے لئے چار ہزار فٹ سے زیادہ اونچائی پر رہنا غیر مناسب ہوتا ہے اس مرض کے علاج کے لئے بے شمار ادویات استعمال کی جاتی ہیں، لیکن جدید انٹی بائیوٹک علاج میں جو شہرت سٹریپٹومیسین (Streptomycin) کو حاصل ہوئی ہے وہ اور کسی ڈاکٹری علاج کے حصہ میں نہیں آئی، اس کا ایک گرام کا عضلاتی ٹیکہ روزانہ ایک وقت یا آدھا گرام صبح و آدھا گرام شام کو لگایا جائے اور یہ علاج ۲۲ روز تک جاری رکھیں، اس علاج کے ساتھ پاس (پیرامینوسلی سلک ایسڈ) اس مرض کا مفید علاج ہے، روزانہ دن میں چار مرتبہ دو گرام کی خوراک دی جائے، عام طور پر اسے سٹریپٹومیسین کے ساتھ استعمال کرایا جاتا ہے، اگر بخار زیادہ ہو تو آیزونیکس بھی تب دق کا جدید شافی علاج ہے، ایک

گوئی دن میں دو سے تین بار دیں۔ کمزوری دور کرنے کے لئے وٹامن اے اور ڈی کے مرکبات اسٹیلین، اڈکیولین، ملٹی وٹامنز ہائے مفید ادویات ہیں وٹامن "سی" تو خاص طور پر مفید ہے۔

اگر مریض خون متھوکتا ہو تو خون متھوکنے کے بیان میں ملاحظہ فرمادیں، کیلشیم کے مرکبات اور سونے کے مرکبات بھی اس مرض میں استعمال کئے جاتے ہیں۔ مچھلی کے مرکبات مثلاً کاڈ بور آئیل، اسکاٹ ایلش، کیپڈ کاڈ بور آئیل، وارڈبری کمپونڈ اور شارک بور آئیل وغیرہ مریض کی تقویت کے لئے از حد مفید ہیں اگر کھانسی شدید ہو تو کھانسی کے بیان میں لکھے گئے نسخہ جات کا استعمال کریں، دق کی کھانسی کے لئے گلابی کوڈین ٹرپ، وٹا، فلوڈین ٹرپ وٹا کا مفید ادویات ہیں، لیکن مریض کو اپنی قوت ارادی سے کھانسی کو روکنا چاہیے، جس سے ایک حد تک کھانسی میں تخفیف ہو جاتی ہے، اس مرض کی بعض حالتوں میں عمل جراحی مثلاً آلات تنفس اور آلات غذا کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے اور بعض مریضوں کے پیپٹروں میں ہوا بھر کر ان کو کاراز رفتہ کیا جاتا ہے، اس طرح بعض دوسرے اعمال بھی کئے جاتے ہیں، جو ایک ماہر اور تجربہ کار سرجن ہی کر سکتا ہے۔

خون متھوکنے کو روکنے کے لئے وٹامن "کے"۔ "کیلشیم" اور "وٹامن سی" کا استعمال نہایت مفید ہے۔

ماڈرن ادویات:۔ ۱۔ سٹریپٹومیسین سلفیٹ (Streptomycin sulphate) ایک گرام کا عضلاتی انجکشن روزانہ ایک ہر گرام صبح اور ہر گرام شام کو دیا جائے اور یہ علاج ۴۲ روز تک جاری رکھا جائے، اس دوا کے حسب ذیل تجارتی نام ہیں:۔

سٹریپٹونیکس (Streptonex) ڈیو میکس — ایمبسترین ایس (Ambistrin-s) سارابھائی — یا صرف سٹریپٹومیسین سلفیٹ گلیکو — مندرجہ بالا طریقے سے استعمال کریں۔

تفصیل کے لئے ماڈرن ایلمینٹری — اردو یا ہندی کتاب دیکھیں، قیمت اٹھارہ روپے ہے اور نرالا جوگی پانی پت (ہریانہ) کے پتہ سے منگائی جاسکتی ہے۔

۲۔ آئسوزیازڈ (Isoniazid) ۵۰ ملی گرام و ۱۰۰ ملی گرام کی ٹیکہ حالات مرض کے مطابق دن میں تین چار بار استعمال کریں، اس سے بخار کم ہو کر کھانسی کو آرام آ جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل ناموں سے دستیاب ہے۔

آئسوزونیکس (Isonex) ڈو میکس — یلازڈ (Pilazid) گلیکو — ٹیبی زڈ (Tibizid) ایس ڈی — نائیڈرازڈ (Nydrazid) سارابھائی — مندرجہ بالا طریقے سے استعمال کریں

۳۔ پی ایس ایس (پاس) دانوں کی صورت میں یا ٹیکوں کی حالت میں ملتی ہے۔ اسے آٹھ سے سولہ گرام تک ہر روز لینا چاہیے۔ یہ مارکیٹ سے ان ناموں سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

پی ایس ایس (پاس) ڈو میکس — امی ناکس (Aminox) ہکیٹ — یا نیو پی ایس سی (New P A C.) یا پاسے زڈ (Pamizid) وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔

۴۔ آئسوزون (Isozone) فز — تپ دق کے معاون علاج میں یہ مفید و سستی دوا لگاتار اثر دکھاتی ہے، یہ قیابٹازون و آئسوزنازڈ کا مرکب ہے۔ روزانہ دو یا تین ٹیکہ دیں۔

۵۔ اسٹریپٹوٹریڈ (ایم بی)، ایک ٹیکہ، سی لین ۱۰۰ ملی گرام ایک ٹیکہ، وٹامن بی کمپلیکس بی ۱۲ ایک ٹیکہ — تینوں کو باہم ملا کر ایک خوراک بنا دیں۔ اور پانی کے ساتھ دن میں دو بار دیں۔ یہ انٹی بائیوٹک + سلفا + جیاتین کا مرکب ہے۔ جو دق سرایت کے سبب پھوڑوں میں بہت ہی مفید ہے یہ پیپٹروں کے پھوڑے میں بھی مفید ہے، بخار، کسل مندی اور کھٹھ مالا کے لئے مفید ہے۔ یہ مرکب اسٹریپٹومیسین کے انجکشن کے ساتھ بھی دیا جاسکتا ہے۔ ہڈی توڑ پھوڑے کے لئے بھی مفید ہے۔

۷۔ نائیڈرازڈ (سارابھائی) ایک ٹیکہ، بی کیلیکس بی ۱۲ ایک ٹیکہ، سی لن ۱۰۰ ملی گرام ایک ٹیکہ، تینوں کو آپس میں ملا کر ایک خوراک بنائیں اور پانی کے ہمراہ دن میں تین بار دیں۔ یہ آئیو نیازڈ اور وٹامن کا مرکب ہے، جو دق کے علاج میں تجویز کی جاتی ہے، کنٹھ مالا کی گانٹھوں کو تحلیل کرتی ہے۔ دبی توجہ غدہ کے لئے از حد مفید ہے۔

۸۔ آئیوزون فورٹ (فنز) ایک گولی، میناڈرل (پارک ڈیوس) ۲۵ ملی گرام، ریڈوکسان (روش) ۵۰۰ ملی گرام، تینوں کو ایک ساتھ پانی کے ہمراہ دن میں دو بار دیں۔ یہ علاج جراثیم دق کو دور کرنے کے لئے مفید ہے۔ اور دافع حساسیت ہے، اس لئے کھانسی اور سہاگہ میں مفید ہے۔

۹۔ والیومی سین (Viomycin) پارک ڈیوس ————— یہ دوا جرثومہ ٹی، بی کو روکتی ہے اور جہاں سٹرپٹومی سین سے فائدہ نہ ہو وہاں یہ جلد اثر دکھاتی ہے، دو گرام کو بارہ بارہ گھنٹہ کی خوراکیوں میں بانٹ کر ہر تیسرے دن عضلاتی انجکشن کریں۔

نوٹ :- سٹرپٹومی سین سے بعض دفعہ سریلے اثرات ظاہر ہونے لگے ہیں، مثلاً بہرہ پن، کالوں کا بھنا، درد سر، سرھکچا انا وغیرہ، تب اسے فوراً بند کر دیں اور کوئی انٹی ہسٹامین دوا مثلاً انٹھی سان یا انٹی ٹین وغیرہ استعمال کرنی چاہیے۔

۱۰۔ آج کل تپ دق کے علاج کے لئے ریفامائی سین (Rifamycin)، کیپ شولز استعمال کئے جاتے ہیں، اسے کئی کمپنیاں مختلف ناموں سے تیار کرتی ہیں۔ ساتھ ہی طاقت کے لئے کو باڈیکس یا بیسی ٹون فورٹ کیپ شولز دیئے جاتے ہیں۔ آئیو کین ٹی، ایف۔ آئیو پار، پاس پاسونیکس ایس۔ آئیو نیکیس فورٹ وغیرہ ادویات بھی بلحاظ مرض استعمال کرائی جاتی ہیں۔

————— میڈیکل ریسرچ کونسل ۱۹۴۹ء نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ شدید اقسام کے بل دق کے علاج میں سٹرپٹومی سین کے ساتھ ساتھ پی ایس ایس ۲۰ گرام روزانہ کھلانے سے علاج کے شروع ہونے سے چھ ماہ تک دق کے جراثیم کے اندر اس دوا سے مقابلہ کرنے کی قوت پیدا ہونے کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں دوائیں ایک دوسرے کی مدد و معاون ہیں۔

کئی دوا ساز کمپنیاں مینی سلین اور سٹرپٹومی سین کا مرکب مختلف ناموں سے فروخت کرتی ہیں۔ تپ دق کے ساتھ دوسری قسم کی چھوت دوا کرنے یا اس سے محفوظ رکھنے کے لئے یہ مرکب مفید ہے، لیکن ٹی، بی کے مریضوں کو لمبے عرصے تک سٹرپٹومی سین استعمال کرانی ہوتی ہے۔ اس لئے ایسی مرکب دوا صرف چھوتوں کے لئے استعمال کی جاسکتی ہے۔

یونانی علاج :- مریض کو کھلی اور پاک و صاف ہوا میں رکھیں۔ کسی باغ میں رکھنا مفید ہے، غذا لطیف و زود ہضم کھلائیں، تقویت و تندرستی کا زیادہ خیال رکھیں، آرام و چین کی زندگی بسر کرائیں، ملاپ سے قطعی پرہیز کرائیں، مریض کے کمرہ میں چاروں طرف خس کی ٹٹیاں لگوائیں اور بہت سے کھلے برتن پانی سے پر کر کے رکھ دیں، سردیوں کے خوشبودار پھول مثلاً گل نیلوفر، گل بنفشہ، گل گرہل، گل چاندنی، گل سرخ، س گلاب، چنبیلی وغیرہ رکھیں۔

تپ دق کے علاج میں داخلی اور خارجی سرد ادویہ کا استعمال کریں، مریض کے بدن پر ردغن کدو، ردغن خشخاش، ردغن بنفشہ، ردغن نیلوفر کی مال کریں، مریض کو کپڑے بھی صندل میں رنگے ہوئے اور کانور میں بسائے ہوئے پہنائیں، مریض کو چلنے پھرنے سے سخت پرہیز کرائیں۔

یونانی طریقہ علاج میں مریض تپ دق و بل کے علاج میں ایسے نسخہ جات کی جن میں سرطان (کیکڑا) ہو، بہت تعریف کی گئی ہے، کیونکہ سرطان سوختہ ایک قسم کا چوڑا حاصل ہوتا ہے جو لگ بھگ ہاپٹو فاسفیٹ آف لایم سے مشابہ ہے، جس کا مشربت ایو پیچی طریقہ علاج میں نہایت مفید ہے۔

ابتداءً مریض میں جب خشک کھانسی زیادہ ہو اور تھوک کے ساتھ خون بھی آتا ہو تو صبح و شام مندرجہ ذیل دوائے تپ دق کا استعمال کریں :-

دوائے تپ دق :- گیر و ایک ماش، سنگ جراثیم ایک ماش، دم الاخوان ایک ماش، سرطان سوختہ ایک ماش، بارسیک پیس کرخمیرہ خشخاش ایک ماش

میں ملا کر کھلائیں، اوپر سے بھی دانہ تین ماشہ، سوڑیاں ۹ دانہ کو پانی میں جوش دے کر شربت بفشہ دو تولہ ملا کر پلائیں، کبھی اس نسخہ میں گوند کیکر ایک ماشہ کثیر ایک ماشہ، ست ملٹھی ایک ماشہ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔

دیگر :- کہربائے شمعی، طباشیر بڑھیا ہر ایک ایک تولہ، کافور بھیم سینہ، مروارید ناسفہ، دانہ الاچی خور دہر ایک چھ ماشہ، برادہ صندل سفید پانچ تولہ، سب کو کھل کر کے غبار کی طرح کر لیں، خوراک دو ماشہ ہمراہ عرق شیر استعمال کریں، نہایت مفید ہے۔

دیگر :- گلوئے سبز جو درخت نیم پر چڑھا ہو، بقدر ایک تولہ کوٹ کر رات کو گرم پانی میں ترکیں، صبح اس کا زللہ لے کر قد سے مصری شامل کر کے مریض کو پلائیں، اگر کھانسی ہو تو سفوف ملٹھی چھلی ہوئی چھ ماشہ بھی گلوئے کے ہمراہ ترکیں، اگر حرارت زیادہ ہو تو شیرہ خیابن اور شیرہ معزکد و ہر ایک سات ماشہ بھی اضافہ کریں۔

دیگر :- سیتھ چینی ایک تولہ، سیلکھڑی ایک تولہ، الاچی خور دہر ایک تولہ، کتھہ پاڑیا یا پڑا تولہ، تمام دواؤں کو کوٹ پیس کر ۴ اڑیاں بنائیں، ہر روز صبح اور شام ایک ایک پڑیہ بکری کے دودھ کے ساتھ کھائیں۔ سات روز کے استعمال سے پیچھے دونوں سے خون آنا ہمیشہ کے لئے بند ہو جاتا ہے۔

دیگر :- سرطان نہری پانچ عدد، پوست خشخاش ایک تولہ، بانہ کے تازہ و خشک پتے چھ تولہ، سب کو مٹی کے سکڑے میں رکھ کر گلی حکمت کر کے کٹدوں کی آبخ دیں، بعد نکال کر ایک چٹکی کھلائیں، سل کی کھانسی میں نہایت مفید ہے۔

سفوف سل ووق :- ہلدی خام بار یک پسی ہوئی مین تولہ، دودھ آک ایک تولہ ملا کر یک جان کر لیں، خوراک ایک سے دورتی دن میں تین بار دیں اور غذا مرغن کھلائیں۔

عرق شیر (یہ نسخہ خاص سل ووق کے لئے مفید ہے) :- بانہ عنب الثعب، صندل سفید، دھنیاں خشک، گلوئے سبز، گل سرخ، ملٹھی چھلی ہوئی، پھول منڈی، شاہترہ کے پتے، دھنیاں کا پانی ہر ایک دس تولہ، سیب لال دس عدد، کافور ایک تولہ، دودھ گائے پانچ سیر، دریا کا پانی یا بارش کا پانی چھ سیر، کافور کے علاوہ تمام دواؤں کو اکٹھا کر کے رات کو بھگو دیں، صبح بدستور عرق کشید کریں۔ اور کافور کو نیچہ پر باندھیں، عرق چھ بوتل نکالیں، خوراک چار تولہ صبح، چار تولہ شام ہمراہ ادویہ مناسبہ استعمال کریں۔

قرص کافور (سل ووق کے لئے مفید ہے) :- مغز بیج کھرا، مغز بیج خرلوزہ، مغز بیج کدو میٹھا، مغز ہی دانہ ہر ایک پانچ تولہ گل سرخ، ست ملٹھی، طباشیر اصلی ہر ایک تین تولہ، گوند کیکر کثیر، نشاستہ، صندل سفید ہر ایک دو تولہ، تخم کا ہوشدھ ایک تولہ، کافور اصلی آٹھ ماشہ، سب ادویہ کو کوٹ کر ست ایسبغول سے قرص (گولیاں) بنائیں، خوراک چھ ماشہ ہمراہ مناسب عرق استعمال کریں۔

دوائے وق :- کہربائے شمعی، طباشیر اصلی ہر ایک ایک تولہ، کافور بھیم سینہ، سچے موتی اصلی، دانہ الاچی خور دہر ایک چھ ماشہ، برادہ صندل سفید پانچ تولہ۔ سب کو کھل کر کے غبار کی طرح بنائیں، خوراک ایک سے دو ماشہ ہمراہ عرق شیر دیں، نہایت مفید ہے۔

بڑی روؤ دنتی بوٹی سے علاج :- بڑی روؤ دنتی سل ووق کے لئے نہایت مفید ثابت ہوئی ہے۔ بڑی روؤ دنتی کے پھلوں کا سفوف تیار کر لیں اور دورتی سے پانچ رتی تک دن میں تین یا چار بار ہمراہ دودھ یا پانی دیں یا اس بوٹی کے پھل کا سفوف لے کر چھ ماشہ کی مقدار میں ایک پاؤ پانی میں ڈال کر آگ پر رکھیں۔ جب ایک چھٹانک رہ جائے تو جو شانڈہ کو نثار کر آدھا سے ایک تولہ استعمال کریں، سفوف پھل بڑی روؤ دنتی دس تولہ، سفوف چھلکا جڑ چھوٹا چندرا پانچ تولہ، ہلدی کچی (لمبی و پتلی گانھوں والی)، آک کا تازہ دودھ چھ ماشہ، سب کو ملا لیں، خوراک تین سے آٹھ گرین دن میں دو سے تین بار حسب برداشت کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں۔

نوٹ :- سفوف بڑی روؤ دنتی کی ہر خوراک کے ساتھ ایک سے دو گرین (آدھی سے ایک رتی) "سورن بسنت مالٹی رس" شامل کر کے دی جائے تو زیادہ موثر ہے اور فوراً فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔

آیور ویدک علاج :- آیور ویدک گرنتھوں نے تپ وق کے لئے "سونا" ایک واحد دوا تجویز کی ہے اور تپ وق و سل کے علاج میں سونے

کے مرکبات دسونے کا استعمال بے حد مفید مانا گیا ہے، کیونکہ سونا زبردست جراثیم کش ہونے کے علاوہ مقوی بدن ہے، اس لئے تپ دق کے خطرناک جراثیم کو آنا ناپاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور سونے کے مرکبات دینے سے تپ دق کے جراثیم ہمیشہ کے لئے نیست و نابود ہو جاتے ہیں اور مریض تپ دق دن بدن اپنی صحت و تندرستی میں حیرت انگیز تبدیلی محسوس کرنے لگتا ہے۔

سوران لبنت مالتی رس (بیشیج رتناولی) :- کشتہ سونا اصلی ایک تولہ، سچے موتی اصلی دو تولہ، شنگرف تین تولہ، مرچ سیاہ چار تولہ، کھریا آٹھ تولہ، باریک پیس کرکھن اڑھائی تولہ میں کھل کر کے اس میں رس لیموں اتنا کھل کریں کہ مکھن کی چکنائی مفقود ہو جائے، تب ایک ایک رتی کی گولیاں بنا لیں، خوراک آدھی سے ایک گولی ہمراہ عرق گلو یا شہد سے دیں، دق، سل، پُرانا بخار، آنتوں کی دق، دمہ، کھانسی، کمزوری معدہ کو نافع ہے، پُرانے بخاروں میں جب جسم بہت کمزور اور خون کم ہو گیا ہو نیز مریض کی قوت مدافعت معدوم ہو گئی ہو تو یہ رس جسم کو طاقت دے کر مرض کا مقابلہ کرنے کی طاقت کو بحال کرتا ہے۔

سَدھ مکر دھوج :- پارہ شدہ آٹھ تولہ، ورق سونا ایک تولہ، گندھک شدہ سولہ تولہ، پہلے پارہ اور ورق سونا دونوں کو تین روز لیموں کے رس میں خوب کھل کریں اور ہر روز تک سیندھا ایک تولہ شامل کر دیں۔ چوتھے روز اسے چار یا پانچ بار پانی سے دھو ڈالیں تاکہ لیموں اور نمک کی ترشی دور ہو جائے۔ تب گندھک شامل کر کے کھلی بنائیں، اب اس تیار شدہ کھلی کو سُرخ کپاس کے پھولوں کے رس میں تین دن بھاونا دیں، پھر خشک ہونے پر آتش شیشی میں ڈال کر بذریعہ بالوکا جنتر سندھو رتیار کریں اور تہہ نشین ہونے والا سونا لے کر حسب معمول کشتہ تیار کر کے سندھو حاصل کردہ میں ملا لیں، بس سَدھ مکر دھوج تیار ہے۔

مندرجہ بالا ترکیب سے جو سونا قدرے گندھک کے ہمراہ آمیزش شدہ شکل میں کپٹی کے پنیڈے میں تہ نشین رہ جاتا ہے، وہ مکمل کشتہ کی شکل میں ہرگز تبدیل نہیں ہوتا۔ لہذا طبی نقطہ نظر سے یہ تہ نشین کچا سونا کسی صورت میں استعمال نہیں ہونا چاہیے، لہذا بہتر اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ تہ نشین سونے کو سَدھ مکر دھوج سونے میں ملانے سے پہلے حسب معمول کشتہ تیار کر لیا جائے، اس طریقہ سے تیار شدہ سَدھ مکر دھوج اپنا پورا اثر دکھاتا ہے۔

خوراک پہ سے پہ رتی ہمراہ مکھن، شہد یا بالائی، اوپر سے دودھ دیں۔
یہ رسائن مشہور ٹانک ہے، آجور ویدک گرنتھوں میں اس کی بہت تعریف لکھی گئی ہے۔ تپ دق کے علاوہ جسم کا کایا کلیپ ہو جاتا ہے، قوت بڑھانے کے لئے مفید ہے۔

تپ دق کے لئے خالص کشتہ سونا یا کشتہ موتی یا کشتہ ابرق سیاہ یا کشتہ صدف یا مرجان کا استعمال بھی مفید ہے، اس کے علاوہ دارا کشا سو، جیون پراش، ستوپلا دی چورن کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔

مالیس آدی چورن (چرک سنگھتا) :- تالیس پتر، الاچی، دارچینی ہر ایک ایک تولہ، مرچ سیاہ دو تولہ، سونٹھ دو تولہ، پپلی چار تولہ، طباشیر چار تولہ، مصری تیس تولہ۔

سب کو ملا کر چورن بنالیں، خوراک دوسے چھ ماشہ ہمراہ شہد یا دودھ دیں، بلغمی کھانسی، تپ دق کی کھانسی اور دمہ کے لئے مفید ہے۔
"سروانگ سندرس" تپ دق کے درجہ حرارت کو کم کر کے طبیعت میں لباشا لاتی ہے اور کھانسی کے لئے مفید ہے۔ خوراک ایک رتی ہمراہ شہد استعمال کریں۔

ہومیوپیتھک علاج :- آرسینک آئیوڈائیڈ، چائنا، فیرم، آیوڈیم، ایڈفاس، برائی اوینا، ایسٹیم، بیسی لینیم، ٹیو برکیولیم عمدہ ادویات ہیں۔ مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹر جے سی، برنٹ کے قول کے مطابق اس مرض کا بہترین علاج بیسی لینیم ہے۔ بہت زیادہ مزمن صورتوں میں بھی یہ دوا مریض کو آفاقہ اور آرام پہنچائے گی۔


بالو کیمک علاج :- نیٹرم میور، فیرم ناس (جب پتلا جھاگ دار بلغم خارج ہو)، کالی سلف (جب بلغم تنگی سے خارج ہو)، کلکیر یا ناس (مرض کی پرانی صورت میں) یہ سب اس مرض کی مفید ادویات ہیں۔

قدرتی علاج :- تندرست گدھی کے دودھ کا استعمال اور کیکڑا (سرطان) شدھ کے شوربہ کا استعمال اس مرض کے لئے از حد مفید ہے اگر کھانسی کا عارضہ شدید ہو تو جھینگڑ کی چائے کا استعمال کیا جائے۔

غذا و پرہیز :- اس مرض میں غذا مقوی و مرغین استعمال کی جائے، خالص دودھ، خالص مکھن، خالص گھی، پرندوں کا شوربہ، تازہ اور بڑھیا پھل بہت مفید ہیں۔ تیل کی اور ترش چیزوں سے پرہیز اور برہمچریہ کا پالن کیا جائے۔

رسل ودق سے بچنے کے لئے مفید ہدایات

- ۱۔ اندھیرے اور پانی کی کمی والے مکانات اور جہاں گرد و غبار ہو یا دھوپ کا گزر نہ ہو، رہائش نہ رکھی جائے۔
- ۲۔ غذا لطیف اور مقوی استعمال کی جائے۔ ناقص اور کم غذا استعمال نہ کی جائے۔ غذا میں پھل، مکھن، گھی کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے۔
- ۳۔ بازاری چیزوں سے پرہیز کیا جائے اور کھانے پینے میں بے اعتدالی نہ کی جائے، ایسی غذائیں جو ہاضمہ کو خراب کریں۔ ان سے سخت پرہیز کیا جائے۔
- ۴۔ نشہ آور چیزوں شراب، بھنگ، افیون سے پرہیز کیا جائے۔
- ۵۔ کچی عمر میں برہمچریہ کو نہ توڑا جائے اور رنج و غم سے دور رہا جائے۔
- ۶۔ صبح و شام ہوا خوری کی عادت ڈالنی چاہیے۔
- ۷۔ سانس ہمیشہ ناک سے لی جائے اور گہرا سانس لیا جائے، بہت سے لوگوں کو ایک کمرہ میں نہیں سونا چاہیے، خصوصاً جس کمرہ میں تپ دق کا مریض ہو، وہاں نہیں جانا چاہیے۔
- ۸۔ کچا دودھ یا بازاری مکھن استعمال نہ کیا جائے۔
- ۹۔ کچا گوشت نہ کھایا جائے، ہمیشہ اچھی طرح پکا کر استعمال کیا جائے۔
- ۱۰۔ مریض دق کے جھوٹے برتن، حقہ، کپڑے استعمال نہ کئے جائیں، جس کمرہ میں مریض دق رہ چکا ہو، اسے اُس وقت تک استعمال نہ کیا جائے، جب تک دیواروں پر سفیدی نہ کرائی جائے اور فرش پر فیئائل نہ چھڑک لی جائے۔
- ۱۱۔ مریض دق کی بلغم کو گڑھے میں دبائیں، اگر عورت تپ دق میں مبتلا ہو تو مرد کو برہمچریہ کا پالن کرنا چاہیے، اور ماں کو بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہیے، اگر بچہ کو تپ دق ہو تو تندرست ماں یا دایہ کا دودھ نہ پلائیں۔ بلکہ گائے یا بکری کے دودھ پر گزارہ کیا جائے۔
- پھلوں سے علاج :-** ۱۔ کشمش بلغم کو خارج کرتی ہے، کھانسی میں مفید ہے۔ اسے پانی سے دھو کر کھانا کھانے کے بعد موسم کے مطابق حسب برداشت استعمال کیا جائے تو مفید ہے۔ آپور وید میں "در اکھشا سو" اسی کشمش سے ہی بنتا ہے۔
- ۲۔ کشمش ۱۰۰ گرام پانی سے دھو کر ۱۰۰ گرام چینی ملا لیں۔ جب چٹنی کی طرح ہو جائے تو محفوظ رکھیں اور مریض کو ہدایت دیں کہ ۲۰ گرام روزانہ رات کو سوتے وقت چاٹ لیا کرے۔
- ۳۔ کاڈور آئیل (روغن جگر ماہی) بھی طاقت کو قائم رکھنے کے لئے مفید ہے۔ جن لوگوں کا گوشت گھٹنے لگے یا دبلے پتلے ہونے لگیں انہیں مناسب پھلوں کے رس کے ساتھ اس کا استعمال کرنا مفید رہتا ہے۔



آنکھوں کا باب

دل کی بیماریاں اور دورانِ خون

ہر دیہ سَپِنْدَن، خَفَقَان، دل کی دھڑکن، پِلپی ٹیشن، (Palpitation)

تعریف مرض :- دل کو طاقت پہنچنے سے دل کی حرکت تیز ہو جاتی ہے اور اتنے زور سے دل دھڑکتا ہے کہ مریض کو یہ دھڑکن محسوس ہوتی ہے۔
وجوہات :- یہ عارضہ خون کی کمی، کثرت ملاپ و حلق، شراب، چائے، چرس، متبا کو وغیرہ کے زیادہ استعمال سے ہوتا ہے، بعض اوقات فکر، جوش یا غصہ اور دائمی تپش سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- دل زور سے دھڑکتا ہے جس سے سینہ میں بھی دھڑکن محسوس ہوتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل ڈوبا جا رہا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی ہے۔ اور مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، نبض تیز، جلد لال اور بعض دفعہ دل کے مقام پر درد ہوتا ہے۔

علاج :- اصل سبب مرض کو دور کریں، دل کی اندرونی و بیرونی طور پر تشریح کریں۔ ڈاکٹری طریقہ علاج میں دل کی طاقت کے لئے کورامین ایک سی سی کا انجکشن دیں اور خوردنی طور پر اس کا مخصوص گھول دس تا پندرہ قطرے ایک گھونٹ پانی میں ملا کر دیں بے حد معوی اور ٹانگ ہے یا کیمفران آئیل یا وڈ ایف ایک سی سی کا عضلاتی انجکشن ہفتہ میں دوبار اور فوری طور پر دیں، اگر ریا ج کے سبب سے دل پر دباؤ پڑ رہا ہو تو سپرٹ ایونیا ایرومیکس ۳۰ قطرے ایک گھونٹ پانی میں ملا کر دیں، اگر ضرورت ہو تو ایک گھنٹہ کے بعد ایک خوراک اور دیں، اگر کثرت ملاپ، حلق سے کمزوری اعصاب یا کمی خون کا عارضہ ہو تو معویات کوئین، فولاد اور ٹرکینین وغیرہ استعمال کرائیں اور ڈامن سے بھر پور اغذیہ دیں۔

کمی خون کی صورت میں خزانہ ایٹ ایونیا سائبراس پندرہ گریں، ایکوا اینی سائی ایک اونس میں گھول کر صبح و شام بعد از غذا دیں اور پورا کیکریٹ ایک ٹیبلٹ دو سی سی کا عضلاتی ٹیکہ کریں، پرانی شمش ایونیا ہو تو ڈامن بی ۱۲ کا خوردنی اور انجکشن کے ذریعہ استعمال کریں، اگر بیٹریا کی وجہ سے دل کی دھڑکن ہو تو

ولیری اینی ایونی ایٹ ۲۰ قطرے، ٹنگر سیلاڈونا پانچ قطرے، ایکوا کلور و فارم ایک اونس، ایسی ایک ایک خوراک دن میں دو بار دیں۔

ماڈرن ادویات :- خفقان، دل کی کمزوری یا دل یکا یک رکنے (Heart failure) کی صورت میں مندرجہ ذیل ادویات دیں :-

۱۔ کورامین (Coramine) ایک امپول عضلاتی یا ایک ٹکیہ ہر تین یا چار گھنٹے بعد دیں یا دس سے بیس بوند تین یا چار گھنٹے بعد دیں۔

۲۔ کارڈیازول (Cardiazol) ایک امپول عضلاتی ٹیکہ دیں یا ایک ٹکیہ ۲۰ سے ۳۰ بوند ہر چار گھنٹے بعد دیں۔

۳۔ کارڈیازول ایفیدرین (Cardiazol ephedrine) یا کورامین ایفیدرین (Coramin Ephedrine) جب دل فیل ہونے کے اندیشہ

میں اکھڑتے ہوئے سانس میں بہت موثر ہے، اگر دمر کی وجہ سے دم گھٹ رہا ہو تو جلد فائدہ ہوتا ہے۔ ایک امپول عضلاتی دیں یا دس سے بیس بوند

پانی میں ملا کر ایسی تین یا چار خوراک دین میں دیں۔ ٹکیہ نصف تا ایک ہر چار گھنٹے بعد دیں، یہ دوا ناشتہ کے بعد دیں۔ مٹی بلڈ پریشر میں اس کا استعمال

منع ہے۔

۴۔ کارواٹون (Carvotone) بوٹس ————— ایک امپول عضلاتی انجکشن دیں یا ایک ٹکیہ چار گھنٹے بعد دیں یا ۲۰ سے ۳۰ بوند ہر چار یا

چھ گھنٹے بعد دیں۔

۵۔ کارڈیامیڈ (Cardiamid) سپلا ————— ایک امپول عضلاتی انجکشن دیں یا ۲۰ بوند ہر چار سے چھ گھنٹے بعد دیں۔

۶۔ کیمفران آیل (Camphor inoil) سپلا ————— ایک امپول عضلاتی انجکشن دیں۔

۷۔ ایڈرینالین کلورائیڈ (Adrenaline chloride) ایک امپول عضلاتی انجکشن کریں۔

۸۔ مسک ان آیل (Musk inoil) ایک امپول عضلاتی انجکشن کریں۔

۹۔ لیناکسین (Lanoxin) بروز وٹیکم ————— ایک امپول عضلاتی دیں یا ایک ٹکیہ ہر چھ گھنٹے بعد دیں۔

۱۰۔ سیلارین (Sciliaren) سینڈوز ————— یہ دل کے امراض میں ڈیجی ٹیس کے برابر ہے۔ ایک امپول عضلاتی انجکشن حالات مرض

کے مطابق دیں۔

۱۱۔ ڈیجی فارٹس (Digi fortis) پارک ڈیوس ————— یہ ٹکیہ وسیال کی صورت میں ملتی ہے۔ جب ہارٹ فیل کا اندیشہ ہو تو اسے فوراً دینا چاہیے

یہ ڈیجی ٹیس سے بنتی ہے، آٹھ آٹھ بوند یا ایک ایک گولی دن میں تین بار دیں ————— سینڈوز ڈیجی ٹول (Digitol) —————

بروز وٹیکم ڈی جاکسین (Digoxin) ————— اور سب ڈیجی فولین (Digifolin) کے نام سے مارکیٹ میں ملتی ہے۔

۱۲۔ خفقان قلب میں یہ مرکب علاج بھی بہت مفید ہے۔ لبریم (روش)، ۱۰ ملی گرام، ہنزوا (روش)، ۱۰۰ ملی گرام۔ دونوں کو پانی کے ساتھ دن میں دو سے تین بار

دیں۔ سخت بے چینی و کمزوری میں مفید ہے۔

۱۳۔ وٹامی ٹس فورٹ (روش)، ایک ٹکیہ، ان ٹین سول (Anatensol) (سار بٹائی)، ایک ٹکیہ، دونوں کو پانی کے ساتھ حملہ مرض کے وقت فوراً دیں۔

یہ مرکب دوا دل و نفس کی بے چینی کے سبب خفقان میں بہت مفید ہے۔ لیکن بہت زیادہ دباؤ میں اسے استعمال نہ کرنا چاہیے۔

۱۴۔ ڈکسٹروز (Dextrose) ۲۵ فیصدی طاقت کی پچاس ملی لیٹر آمیت آمیت وریڈی ٹیکہ ہر بارہ گھنٹے بعد مکمل فائدہ ہونے تک ٹیکہ لگائیں۔

دل دھڑکنے کے دورہ کو روکنے کے لئے گڑی پر بیٹھے ہوئے سر کو گھٹنوں تک جھکا دینا، سانس روک لینا، منہ بند کر کے زور سے اندر اور باہر کو

گہرے سانس لینا، پریٹ پر دباؤ ڈالنا مفید تدابیر ہیں۔ زیادہ دھڑکن میں محرکات قلب ادویہ و چائے، تہوہ، شراب و متبا کو سے پرہیز کرایا جائے لیکن

دل ڈوبنے یا نبض کے کمزور ہوجانے کی حالت میں محرکات قلب ادویات کا استعمال ضروری ہے۔

اگر دل کی ساخت یعنی ذاتی خرابی سے یہ مرض ہو تو محرکات کا استعمال نہ کریں۔ امراض دل کے مریضوں کو زیادہ بلندی پر رہنا زیادہ مضر ہوتا ہے۔

اور گرم میدانی علاقہ میں بھی غیر مفید ہوتا ہے، دریائی علاقہ اور باغوں کی سیر بہت مفید ہے۔

یونانی علاج :- تقویت دل کے لئے مربہ بھی، مربہ آملہ ہمراہ عرق گاؤ زبان دیں یا خمیرہ مروارید پانچ ماشہ یا خمیرہ گاؤ زبان عبری چار ماشہ ہمراہ عرق گاؤ زبان و روح کیوڑہ دیں یا دواء المسک معتدل جواہر والی چار ماشہ ہمراہ عرق گاؤ زبان دیں۔ مندرجہ ذیل مجربات تقویت دل کے لئے نہایت مفید ہیں۔

مرواریدی پلڑ :- طباشیر نقرہ تین ماشہ، ورق چاندی پندرہ عدد، مروارید ناسفتہ خالص ایک ماشہ، روح کیوڑہ دس تولہ، تمام ادویات کو روح کیوڑہ بھٹوڑا بھٹوڑا ڈال کر کھل کیا جائے اور بقدر دانہ مسور گولیاں تیار کر لی جائیں۔ دل کی طاقت کے لئے سینکڑوں میں فائدہ دینے والی مفید گولیاں ہیں۔ مربہ آملہ دو عدد پانی سے دھو کر ورق چاندی لگا کر کھلانا یا گل گاؤ زبان تین ماشہ ہمراہ دودھ گائے دینا بھی دل کی دھڑکن کا آسان علاج ہے۔

دیگر :- زہر مہرہ خطائی، سچے موتی، کشتہ عقیق، کشتہ سنگ لیش، دانہ الاچھی خورد، مغز کنول گٹھ، ورق چاندی، سب برابر وزن، سب سے پہلے زہر مہرہ و موتیوں کو عرق کیوڑہ میں کھل کر لیں، پھر باقی ادویات کو ٹچھان کر ملائیں اور لگاتار تین دن روح کیوڑہ میں کھل کر لیں، خوراک دو سے تین رتی خمیرہ گاؤ زبان عبری جواہر والا کے ساتھ دیں، کمزوری دل کے علاوہ تمام صفراوی امراض کا کامیاب علاج ہے۔

علاوہ ازیں تقویت قلب کے لئے مفرح اعظم، مفرح شیخ الرئیس، کشتہ مروارید، کشتہ لیش، کشتہ عقیق، کشتہ سونا بہترین ادویات ہیں، طباشیر، زہر مہرہ ہر ایک دورتی، مروارید اصلی ایک رتی، باریک پیس کر شربت انار شیریں چھ ماشہ ملا کر چٹائیں۔

آیور ویدک علاج :- بدھ مکردھوج، کشتہ سونا، کشتہ موتی، کشتہ چاندی، کشتہ عقیق وغیرہ کا استعمال نہایت مفید ہے، اس کے علاوہ کانور، صندل، دھوپ، اگر بتی، عطربات اور پھولوں کا سونگھنا دل کو فرحت پہنچاتا ہے۔ طب آیور وید میں ارجن ارشٹ کا استعمال نہایت مفید ہے، جس کا نسخہ درج ذیل ہے :-

ارجن ارشٹ :- ارجن کی چھال پانچ سیر، منقہ اڑھائی سیر، گل مہوا ایک سیر، ان سب کو ڈیڑھ من پانی میں پکائیں، پندرہ سیر پانی رہ جانے پر چھان لیں اور گل دھاوا ایک سیر، گڑ پانچ سیر ڈال کر ارشٹ تیار کریں۔ خوراک ایک سے دو تولہ ہوزن پانی ملا کر استعمال کرائیں۔

فوائد :- دل کی تمام بیماریوں (دل کی دھڑکن، دل بیٹھنا، دل کا کمزور ہونا) کے لئے از حد مفید ہے۔ پھیپھڑوں کو طاقت دیتا اور دل ڈوبنے (بارٹ نیل) سے بچاتا ہے۔

چونکہ دل اندیشوں، افکار، حزن و ملال اور انسردگی سے جلد متاثر ہو کر خائف ہو جاتا ہے، اس لئے دل کی تقویت کے لئے بے نگرہ خوش مزاجی اور زندہ دلی بہترین قدرتی علاج ہے۔

ہومیوپیتھک علاج :- ڈیجی ٹیس مفید علاج ہے۔ اس دوا کے متعلق ڈاکٹر میوزر قنطران ہیں، کہ یہ دوا دل کی دھڑکن، دل کی کستی، بقاعدہ اور فوجی حرکت یہ خوف کہ دل کی حرکت بند ہو جائے گی اور استقامت دل وغیرہ کے لئے مفید پائی گئی ہے، اور مایوس کن پریشانی کے لئے یہ دوا بہت مفید ہے۔ زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے نقصان دہ ہے، اس کے علاوہ اکونائٹ، اسپائی جلیا، برائی ادینا وغیرہ بہترین ادویات ہیں، حسب موقعہ اور مزاج و علامات کے مطابق استعمال میں لانا چاہیئے۔

پھلوں سے علاج :- ۱۔ گڑھل کے پھول ۲۵ گرام لے کر ۱۲۰ ملی لیٹر پانی میں ایک گھنٹہ بھگوئیں، پھر چھان لیں۔ دن میں دو بار پلائیں۔
۲۔ گاجر ایک عدد لے کر گرم راکھ میں دبا دیں، یہاں تک کہ وہ نرم ہو جائے، پھر اس کو صاف کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں۔ رات بھر شبنم میں رکھیں، صبح چینی چھڑک کر کھائیں۔

۳۔ کشمش دس گرام، دھنیاں چھ گرام لے کر ساٹھ لیٹر پانی میں رات بھر بھگوئیں۔ صبح پیس کر چھان لیں اور پیئیں۔

غذا و پرہیز۔ محرکات قلب مثل چائے، قہوہ، شراب اور عتا کو سے پرہیز کریں، انگور، سیب، انار وغیرہ کا استعمال مفید ہے، موسم گرما میں شربت گڑھل، شربت صندل وغیرہ دیں (ان کے نسخے "نئے روزگار" میں درج ہیں، قیمت روپے ۶، محصول ڈاک ۶ روپے، مینجر نرالا جوگی پبلشرز پانی پت (انڈیا) کے پتے سے منگائی جاسکتی ہے)، زیادہ محنت سے سخت پرہیز کریں۔

ہر ت شول، وُجع القلب، دردِ دل، انجائنا پیکٹورس، (Angina-Pectoris)

یانی سے ہر چیز گھنٹہ کے بعد استعمال کرائیں۔

۲۔ وِسْکارڈن (Viscarden) بی، ڈی، ایچ۔ _____ دل کے درد، دُم، کالی کھانسی وغیرہ میں مفید ہے۔ ایک دوئکیاں ضرورت کے مطابق
تازہ پانی سے دیں۔ اس کا انجکشن بھی ملتا ہے۔

۳۔ انجائی زڈ (Angisid) بروز ویکم — درِ دل کے علاج و روک تھام کے لئے استعمال کرتے ہیں، ایک سے دو گولی دن میں دو سے تین بار دیں۔

۴۔ کارڈی لیٹ (Cardilate) بروز وعلیم ————— درِ دل کا علاج ہے۔ ایک خوراک کا اثر چار گھنٹے تک رہتا ہے، مرض کے دورہ کی حالت میں ایک ٹکیہ زبان کے نیچے رکھنے سے پانچ منٹ میں آرام ملتا ہے۔ دن میں کئی بار ضرورت کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔ زیادہ تکلیف کی حالت میں ایک ٹکیہ تازہ پانی سے لینی چاہیئے۔

۵۔ کارڈوسیدان (Cardosedan) المبیک — امینوفائی لین، فینوباربیٹون، میپا ویرین سے بنی ہے، دردِ دل و ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔ ایک سے دو گولی دن میں دو سے تین بار پانی سے دیں۔

۴۔ ایجو اناسٹریٹ (Eqvanitrate) جان واسٹھ۔ ایک ایک گولی دن میں تین بار تازہ پانی سے استعمال کریں۔

۷۔ پیٹ (Pet) ڈیز — ایک سے دو ٹیکہ دن میں تین یا چار بار دیں۔

۸۔ تھیوگا رڈی نال (مے بکیر) یا کورا مین ایڈے نو سین (سببا) یا تھیوبا (Theoba) بروز دلیکم — یا سیلاڈی نال (سینڈوز) یہ بکیر صرف وقفہ کے زمانہ میں کھلائی جاتی ہیں۔ شروع میں دو گولیاں، اس کے بعد رفتہ رفتہ مقدار خوراک کم کر کے صرف آدھی گولی دن میں دو بار دیں۔ مرض کی زیادتی دھیرے دھیرے کم ہو جائے گی۔

۹۔ رونی کول (Ronicol) ایک ٹکیہ سے دو ٹکیہ دن میں تین بار بعد از غذا دیں یا ایک امیپول کا زیرِ جلد انجکشن لگائیں۔

۱۰۔ پیری ٹریٹ (Peritrate) وارنر _____ دردِ دل کے حملوں کو روکنے کے لئے از حد مفید ہے۔ ایک ٹیکہ دن میں تین بار قبل از غذا دیں۔

۱۱۔ ہائیڈرجین (Hydergin) سیڈوز ————— یہ ٹیکہ کی شکل میں ارگٹ کا ایک خاص جوہر ہے، جو دردِ دل کے لئے کارآمد ہے، یہ نبض کی رفتار کو سست کر کے خون کے دباؤ کو کم کرتا ہے۔ یہ دوبارہ دہن زبان کے نیچے رکھ کر استعمال کی جاتی ہے، لیکن یہ ایک خطرناک دوا ہے۔ اس لئے اسے کو ایف ایڈ ڈاکٹر کے مشورہ کے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیئے۔

۱۲۔ انجی سٹ (Angised) بروز ولیم ————— یہ گلیسرین ٹرائی ٹریٹس سے تیار شدہ ہے۔ دردِ دل کے دورہ کو ختم کرنے کے لئے اور بطور حفظِ ماقدم دورہ کو روکنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ خوراک ایک سے دو ٹمپیاں تازہ پانی سے دیں۔

۱۳- البریم (رودش) دس ملی گرام، نیو ایس ڈاوائٹ (Newesdavit) ساختہ مرک شارپ ڈوہم ایک ٹکیہ۔ یہ مسکن نفس اور مقوی حیات مرکب ہے۔
دردِ دل کے لئے مفید ہے، البریم بے چینی اور نیو ایس ڈاوائٹ دھامنیوں کا مجموعہ ہے، اس لئے یہ مفید مرکب ہے۔

۱۴۔ سگونتین (Segontin) ہیکٹ ————— ۶۰ ملی گرام کی ایک ڈریگی دل کے دورہ کے لئے دن میں دو تین بار دیں۔

۱۵۔ کارڈی لیٹ (Cardilate) بروز ولیمیکم ————— ایک دو کچھ دن میں دو یا تین بار تازہ پانی سے دیں۔

یونانی علاج :- اکثر اس مرض کا باعث معدہ کی خرابی ہوا کرتا ہے، اس لئے معدہ کی اصلاح کا ضرور خیال رکھیں، کشتہ بارہ سنگا (گھیکوار والا) سفید رنگ ایک سے دو رتی منقعی میں رکھ کر کھلائیں، ہر قسم کے دردِ دل کے لئے مفید ہے، ہیرا بینگ ایک رتی منقعی میں ڈال کر کھلانا بھی دردوں کے لئے مفید ہے۔

بیرونی طور پر سہاگہ ایک تولہ، ہلدی ایک تولہ، باریک پیس کر گھی کو ار کے پات پر چھڑک کر اور تولے پر گرم کر کے مقام دل پر نکور کریں۔ مرض پرانا ہو جائے تو دواء المسک معتدل جو اسروالی پانچ پانچ ماشہ صبح و شام کھلائیں، درد دل کے لئے عرق دار چینی بھی مفید ہے، کیونکہ دار چینی مفرح مقوی ہونے کیساتھ باضم اور کامریاج بھی ہے۔ اس لئے اس کا عرق نہایت فائدہ مند ہے۔

پہلی ایک حصہ، بارہ سنگا بھسم دو حصہ، سفوف بنائیں، خوراک دورتی، شہد میں ملا کر دیں۔

آیور ویدک طریقہ علاج میں کشتہ بارہ سنگا ایک سے دورتی منقعی میں لپیٹ کر دیں اور مقام دل پر سینک کریں۔ شراب چائے متباکو، کافی اور غم و غصہ سے پرہیز کریں۔

مُورچھاروک، غشی، غش آنا، سنکوپٹی (Syncope)

تعریف مرض :- اس مرض میں دل کا فعل عارضی طور پر بند ہو جاتا ہے اور یہ غشی کہلاتا ہے۔

وجوہات :- شدید غم و الم یا خوشی، چوٹ یا صدمہ، جنرل کمزوری یا دل کی کسی بیماری سے غشی آ جاتی ہے۔ خونی پاخانہ یا خون حبض کے زیادہ آنے، زیادہ تپ، زیادہ دست، خون کے دباؤ کی کمی، کمی خون، خوفناک منظر یا شکل یا آواز سے ڈر جانا، ٹیکہ کا صدمہ، آپریشن کے بعد کی کمزوری وغیرہ سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا، رنگ زرد ہو جانا، ہاتھ پاؤں سرد، نبض کمزور اور عارضی طور پر دل کا فعل بند ہو کر مریض بالکل بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کبھی تو مریض غش میں پڑ کر فوراً مر جاتا ہے، لیکن عام طور پر غشی آنے سے پہلے مندرجہ بالا علامات پیدا ہو کر مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔ معالج کو غشی اور مرگی میں تشخیص کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ بعض اوقات غشی میں تشنجی حرکات ظاہر ہونے سے دھوکا لگنے کا امکان ہوتا ہے۔

علامات غشی

- ۱۔ غشی کا زیادہ تر تعلق خوشی، رنج، غصہ اور خوف کا تعلق نہیں ہوتا۔
- ۲۔ مرگی میں شاذ و نادر ہی خوشی، غصہ اور خوف سے دورہ ہوتا ہے۔ عام طور پر مریض کا چہرہ ڈراؤنا اور نیلا ہو جاتا ہے۔

اسی طرح غشی اور قوما (Coma) ، بات (سن یا س) میں تشخیص کریں، چونکہ دونوں کی ماہیت اور ان کا علاج مختلف ہے، لیکن بعض ظاہر علامات ایک ہیں۔

قوما کی علامات

غشی کی علامات

چہرہ کا رنگ سرخ ہوگا، نبض منتلی یا خون بھری ہوگی، سانس گی، سانس آہستہ اور غیر منتظم ہوگا، جسم سرد پسینہ سے تر ہوگا۔ خون کی دماغ میں کثرت ہوگی۔

چہرہ کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، نبض کمزور اور رُک رُک کر چلے گی، سانس آہستہ اور غیر منتظم ہوگا، جسم سرد پسینہ سے تر ہوگا۔ خون کی دماغ میں کمی ہوگی۔

علاج ڈاکٹری :- اصل سبب کو دریافت کر کے اس کے مطابق علاج کریں۔ سپرٹ ایونیٹک آدھا سے ایک ڈرام ایک اونس پانی میں ملا کر فوراً پلائیں۔ یا برانڈی، وِسکی ایک سے چار ڈرام قدرے پانی میں ملا کر دیں۔ سپرٹ ایونیٹک یا ایونیٹک کارب سنگھائیں، مریض کے جسم کو گرمی پہنچائیں، کورامین ایک سی سی فوراً عضلاتی ٹیکہ کریں، کمزوری دل، غشی، صدمہ، تنگی سانس، کمزوری نبض کے لئے از حد مفید ہے، ہاتھ اور

پاؤں کی ہتھیلیوں پر زور کی مالش کریں تاکہ گرم ہو کر دوران خون میں مدد دیں، موسم گرما ہو تو منہ پر پانی کے چھینٹے ماریں، مریض کے گرد کسی قسم کا ہجوم نہ ہونے دیں، اور نچکے سے ہوا کرتے رہیں۔ کورامین انجکشن کے علاوہ ڈی جی ٹیلیس یا ڈی جی ٹیلیس سٹرکنین یا کیمفران آئیل یا کیمفران ایٹر یا کیمفران مسک یا اڈرینالین میں سے کسی ایک کا انجکشن مریض کی قوت و حالات کے مطابق لگائیں یا پچوٹرین (Pituitrin) ایک سی سی زیر جلد انجکشن کریں۔ یہ انجکشن خون کے دباؤ کو تیز کرتا ہے۔ اور کمزوری دل میں از حد مفید ہے، مندرجہ ذیل نسخہ جات غشی کے لئے بہت مفید ہیں :-

سودا بائی کارب	۲۰ گریں	سپرٹ ایونیا ایرومینک	۳۰ منم
سپرٹ ایونیا ایرومینک	۲۰ منم	سپرٹ ایٹر	۳۰ منم
سپرٹ کلوروفارم	۱۵ منم	ٹنکچر مسک	۱۵ منم
ایکواپیرمنٹ	۱ اونس	ٹنکچر کارڈو	۳۰ منم
کمزوری دل اور بد ہضمی کے لئے فارما کوپیا ہسپتال ہائے سرکاری		ایکوا کلوروفارم	۱ اونس

ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین بار دیں۔

قدیم کا مشہور نسخہ ہے، ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین بار دیں۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ ایونیا کارب یا سپرٹ ایونیا ایرومینک سنگھائیں اور ۳۰ منم سے ۶۰ منم تک ایک اونس پانی میں ملا کر پلائیں، مریض کے جسم کو گرمی پہنچائیں۔ ہاتھ، پاؤں و تلوؤں کی مالش کریں۔

۲۔ دل کی دھڑکن کے بیان میں جو نسخہ جات دل کی تقویت کے لئے لکھے گئے ہیں، اس مرض میں بھی مفید ہیں۔ کورامین و کیفین (سیبا) ایک سی سی ایمپول عضلاتی انجکشن کریں، غشی اور دل ڈوبنے کے لئے مفید ہے۔

۳۔ کورامین ڈراپس (Coramin drops) ۲۰ سے ۴۰ بوند دن میں تین سے چار بار دیں۔ اس کی ٹکیاں بھی ملتی ہیں۔ جنہیں بوندوں کی جگہ استعمال میں لایا جاتا ہے، انجکشن کے لئے ایمپول ملتے ہیں، یہی دوا کارمید (Cormid) سینڈرڈ فارمیسیکل کا، کارلیوٹون (Coruo tone) بوش

اینا کارڈون (Anacardone) بی ایچ ڈی کے نام سے ملتی ہے۔

یونانی علاج :- مریض کو نور اچیت لٹاویں۔ سر کو باقی جسم کی نسبت نیچا رکھیں۔ ہاتھ اور پیروں کی مالش کریں۔ بلکہ ہاتھ پاؤں کو تپنے کی طرف مٹوئیں، موسم گرما ہو تو چہرے پر چھینٹے ماریں، جس شخص کو کبھی کبھی غشی کا دورہ پڑے۔ اسے زیادہ محنت اور جوش و غصہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اگر غشی کا مریض گرم مزاج ہو تو اسے سرد مقام پر رکھیں اور شربت صندل، گلاب و عرق نیلوفر و عرق بید مشک میں ملا کر اس کے حلق میں ٹپکادیں اور سرد مزاج ہو تو مشک و عنبر، زعفران وغیرہ سنگھائیں، دواء المسک معتدل جواہر والی، عرق گاؤ زبان یا عرق دار چینی میں حل کر کے حلق کے اندر ڈالیں، اگر مزاج سرد ہو تو سرد چیزیں بالکل نہ دیں، بلکہ مریض کو چونا و نوشار ملا کر اس کی ہوا سنگھائیں، عرق ماء اللحم میں سیب کا پانی حل کر کے حلق میں ٹپکائیں۔

آیور ویدک علاج :- اسٹوگندھا رشت کا استعمال کرائیں، جس کا نسخہ درج ذیل ہے :-

اسگندھ ناگوری اڑھائی سیر، مصلی سفید ایک سیر، جلیجیٹ، چھلکا ہڑ، ہلدی دار، مٹھی، راستنا، بڈاری قند، تزدی، چھال ارجن، موہتاں ہر ایک آدھ سیر، انت مول، شیاما، ورچ، چندن سرخ، چندن سفید ہر ایک تیس تولہ، تمام ادویہ کو جو کو ب کر کے پونے تین من پانی میں پکائیں، جب تیس سیر پانی رہ جائے، تب آتار کر چھان لیں اور گل دھاوا چوسٹھ توڑے، ناگ کیسز نکٹا آٹھ آٹھ تولہ، تر جات پریٹگو ہر ایک سولہ تولہ، کھانڈ اور شہد دس دس سیر ملا کر آسونا لیں، خوراک ایک سے دو تولہ، غشی، مرگی، خفقان، کمزوری معدہ، تپ دق، دہلا پن، جنرل کمزوری اور ریجی امراض کے لئے مفید ہے۔

دیگر :- دودھ گائے پاؤ سیر پانی پاؤ سیر، آسگندھ ناگوری، ستاؤ ہر ایک چھ ماشہ۔ دودھ اور پانی کو دیگچ میں ڈالیں اور باقی دونوں دواؤں کو کوٹ کر اس میں شامل کر دیں۔ اب اس کو اتنا جوش دیں کہ کل پانی جل کر باقی صرف دودھ رہ جائے۔ پھر آگ سے آتار کر چھان لیں۔ اور ٹھنڈا کر کے اس میں حب

ضرورت مری ملا کر غشی کے مریض کو چند روز تک پلاتے رہیں، غشی دور کرنے کے لئے مجرب نسخہ ہے۔
 دیگر یونانی، آیور ویدک اور ہومیو پیتھک علاج، غذا و پرہیز بطور کمزوری دل کے کریں، جس کا ذکر اگلے صفحات میں کیا گیا ہے۔
 بعض دفعہ ذیابیطس کے مریض کو انسولین کے انجکشن سے بھی غشی ہو جاتی ہے، ایسی حالت میں ایک اونس گلوکز پانی میں حل کر کے پلانا بے حد مفید ہے۔
 بعض دفعہ گلوکز کا وریدی انجکشن بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ ایسے مریض جو انجکشن سے گھبراتے ہوں کو بھی انجکشن نہیں دینا چاہیئے، ورنہ ان کو غشی کا دورہ پڑ جائے گا۔ ایسے مریضوں کو انجکشن کی جگہ خوردنی دوا کو ترجیح دی جائے۔

ہرڈیہ کی کمزوری، کمزوری دل، ضعیف القلب، بریڈی کارڈیا، (Brady-Cardia)

تعریف مرض :- اس مرض میں دل کی حرکت بالکل سست ہو جاتی ہے یعنی دل بہت آہستہ آہستہ سے حرکت کرتا ہے۔
وجوہات :- اس مرض میں دل کی حرکت کم ہو جاتی ہے، بعض اشخاص میں فطری طور پر دل کی حرکت و نبض سست ہوتی ہے۔ اس لئے ان فیوض کا علاج ضروری نہیں، اس مرض میں عام کمزوری و گیس نزو زیر خراش یا تحریک ہونا، دل کی رکاوٹ، اعصابی کمزوری، گردوں کی خرابی، ڈیجیٹلس، راب اور سیسہ وغیرہ کے زہریلے اثرات، بخاروں کے بعد میں کمزوری، ذیابیطس (ڈایابیٹیز) معدہ کے زخم اور بیرقان وغیرہ سے دل اور نبض حرکات سست ہو جاتی ہیں۔ طبی نقطہ نظر سے نبض کا بطی (سست) ہونا بلغمی مزاج کی علامت ہے اور اس مزاج والے کی عمر نسبتاً لمبی ہوتی ہے۔
علامات :- اس مرض میں دل کی حرکت ساٹھ فی منٹ سے کم ہو جاتی ہے، بیرقان، انفلوئنزا، اعصابی امراض، ہاضمہ کی خرابی، گردوں کی خرابی، سیسہ وغیرہ کے زہریلے اثرات، سرسام، معیادی بخار، پیشاب کے زہر سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے، جس سے دل و نبض کی رفتار کمزور ہو جایا کرتی ہے۔ اسے عارضی نبض بطی کہا جاتا ہے۔

ڈاکٹری علاج :- دل کو تقویت دینے والی ادویہ دیں، سپرٹ ایمنیا ایرومیک آدھا ڈرام ایک اونس پانی میں ملا کر دیں یا کورامین سٹرکینین دیگر محرکات قلب ادویات کے انجکشن دیں۔ پیٹنٹ ادویات میں ایسٹن سیرپ، نیلوز سیرپ وغیرہ دیں اور قواعد حفظانِ صحت کی پابندی کریں۔
 ادویات دل کی دھڑکن میں دی گئی ہیں، اس مرض میں بھی مفید ہیں۔

یونانی علاج :- خمیرہ مروارید تین سے پانچ ماشہ ہمراہ عرق گاؤ زبان یا خمیرہ گاؤ زبان عنبری جواہر والا پانچ ماشہ، ہمراہ عرق گاؤ زبان بارہ تولہ دیں۔
 گرما ہو تو شربت گڑھل کا استعمال کریں۔ دواء المسک معتدل جواہر والی کا استعمال بھی مفید ہے، شدید کمزوری کے لئے آدھے سے ایک تولہ برانڈی استعمال بھی مفید ہے، عرق ماء اللحم اور مرہ کا جواہر مرہ سید کا استعمال بھی مفید ہے۔

مرواریدی پلڑ :- طباشیر نقرہ تین ماشہ، ورق چاندی پندرہ عدد، مروارید ناسفتہ خالص ایک ماشہ، روح کیوڑہ دس تولہ، تمام ادویات کو ج کیوڑہ مقوڑا مقوڑا اڈال کر کھل کیا جائے اور بقدر دانہ مسور گولیاں تیار کر لی جائیں، دل کی طاقت کے لئے سیکنڈوں میں فائدہ دینے والی نہایت گولیاں ہیں۔

دیگر :- زہرہرہ خطائی، سچے موتی، کشتہ عشق، سنگ لیش، دانہ الپچی خورد، مغز کنول گٹھ، ورق چاندی، سب برابر وزن۔ سب سے پہلے زہر و موتیوں کو عرق کیوڑہ میں کھل کر کے بقایا ادویات کو کوٹ چھان کر ملا لیں اور تین دن لگاتار روح کیوڑہ میں کھل کریں، خوراک دو سے تین رتی خمیرہ زبان جواہر والا کے ساتھ دیں، کمزوری دل کے علاوہ تمام صفراوی امراض کا نہایت مفید علاج ہے۔

سفوف نقرہ :- زہرہرہ خطائی، دانہ الپچی خورد، طباشیر ہر ایک اڑھائی تولہ، ورق چاندی تین ماشہ، باریک پیس کر سفوف تیار کر لیں، خوراک

چار رتی ہمراہ مریب سبب یا گاجر صبح و شام کھائیں۔ کمزوری دل، دمر قلبی، اور گھبراہٹ کے لئے نہایت ہی مفید اور عزیزانہ نسخہ ہے۔

کشتہ سنگ لیشب خالص۔ لیشب سبز رنگ، صاف و شفاف اور بے رگ و ریشہ لیں۔ اسے آگ میں خوب تپا تپا کر عرق گاؤ زبان، بید مشک اور کیوڑہ میں اکیس دفعہ بھجائیں، پھر اسے بھڑکے دودھ میں کھل کر کے ٹکیہ بنا کر بنیں سیراپوں کی دوبار آگ دیں، اعلیٰ کشتہ تیار ہوگا۔ خوراک ایک رتی ہمراہ مکھن استعمال کریں۔

اگر موسم گرم ہو تو صرف گل گڑھل (گڑھل کے پھول) سات عدد سبزہ دور کر کے یا تخم ریحان ایک تولہ، رات کو عرق بید مشک دس تولہ میں بھگو دیں، صبح کو اس کا زلال لے کر مصری ملا کر پلائیں اور خمیرہ مروارید صبح و شام پانچ ماشے کر اس میں ایک چاول جو اہر مہرہ ملا کر کھلائیں۔

آیور ویدک طریقہ علاج:۔ کستوری بھیرورس برہت یا سورن بھسم یا موتی بھسم اور مکر دھوج وغیرہ عمدہ ادویات ہیں۔ جن کے نسخے ذیل

میں درج ہیں:-

کستوری بھیرورس برہت (بھیشج رتناولی):۔ کشتہ موتی، کستوری نیپالی، کشتہ سونا، کشتہ چاندی، کشتہ فولاد، کشتہ ابرق سیاہ، کشتہ مرجان، کشتہ تانبہ، مشک کا فور، پاٹھا، گل دھاوا، تخم کوپنج، بابڑنگ، مومعقا، مشک بالا، کشتہ ہڑتال و رقیہ شدہ، آملہ، سونٹھ، سب کو برابر وزن لے کر رس برگ مدار (آگ کے پتوں کا رس) میں کھل کر کے ایک ایک رتی کی گولیاں بنائیں، تیاری کے دوران کستوری کو دیگر ادویہ رگڑنے کے بعد پلائیں اور گولیاں سایہ میں خشک کریں۔ ایک گولی ہمراہ شہد یا رس ادراک یا برگ پان دیں۔

فوائد:۔ کستوری کا یہ بیش قیمت مرکب دل و دماغ کو خاص طور پر طاقت دیتا ہے، بلغمی امراض، نمونہ وغیرہ میں یہ رس نہایت مفید ہے۔ دل کی کمزوری، ہمت، پاؤں سرد ہوں تو یہ رس فوراً اثر کرتا ہے، دل ڈوبنے یا گھبرانے کی شکایت ہو تو یہ رس حلق سے اترتے ہی اثر دکھاتا ہے۔

سورن بھسم:۔ سونا شدہ کا برادہ ایک تولہ لے کر بن تلسی کے رس میں اس قدر کھل کر کریں کہ پاؤ بھر جذب ہو جائے۔ بعد ازاں ٹکیاں بنا کر مٹی کے کوزوں میں رکھ کر گل مکمت کریں اور دس سیراپوں کی آگ دیں۔ خوراک ایک چاول مکھن یا بالائی میں دیں، اعضائے رئیسہ کو قوی بنانے اور جسمانی طاقت کے لئے بے مثل چیز ہے۔

کشتہ موتی:۔ عمدہ موتی بھری ایک تولہ عرق گلاب یا رس نیلوفر بنیں تولہ میں لگاتار کھل کر کریں۔ کھل کرنے سے عمدہ قسم کا لاجواب کشتہ تیار ہوگا اگر اس کی ٹکیہ بنا کر بنیں سیر جنگلی اپلوں کی آگ دیں، تب بھی تیار ہو جائے گا۔ لیکن کشتہ کا وزن کم ہو جائے گا۔ لہذا اسے بلا آگ کشتہ تیار کریں، یہ بہتر اور درست ہے۔

خوراک:۔ آدھی سے ایک رتی ہمراہ شہد، مکھن، بالائی، مریب گاجر، مریب آملہ، مریب سبب کے ساتھ دیں، دل کے ڈوبنے، کمزور ہونے، د گھبرانے، دل اچھلنے اور غشی کے لئے نہایت لاجواب چیز ہے۔

یہ اول درجہ کا امیروں کے لئے نفیس کیلیم ہے، جو بلڈ پریشر کے لئے بھی مفید ہے۔

سندھ مکر دھوج:۔ اس کا نسخہ تپ دق کے بیان میں درج ہے۔ خوراک پُر رتی سے پُر رتی ہمراہ شہد یا بالائی لے کر اوپر سے دودھ ہو میو پیٹھک طریقہ علاج:۔ آرٹک الیم (مرض کے شروع میں جب سانس تکلیف سے آتا ہو)، نکس و امیکا (شدید کمزوری) اور عضلاتی کمزوری کے لئے، جیلیسی میم اور کو نیم (دل کی دھڑکن اور کمزوری کے لئے) بہترین ادویات ہیں۔ اگر دل میں دھڑکن بدھنمی کی وجہ سے ہو تو بھی نکس و امیکا مفید ہے۔

بالو کیمک علاج:۔ کالی فاس (ابتدائی حالت میں)، اور کلکیر یا فاس (پُرانی حالت) میں استعمال کی جاتی ہیں۔

پھلوں سے علاج:۔ کشمش سبز چھوٹی چالینس عد لیں۔ ان کو صاف کر کے عرق گلاب و عرق بید مشک آدھ آدھ چھٹانک میں

کو قلعی والے چھوٹے کٹورے میں بھگو دیں اور باہر صحن میں رکھیں، صبح ہاتھ منہ دھو کر ایک ایک کشمش صاف سوئی کی نوک سے اٹھا کر کھلائیں، اوپر سے عرق پی لیں۔ ایک ہفتہ میں دل کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔

قدرتی علاج :- مریض کو خوش و خرم رہنا چاہیے اور غم کو اپنے پاس نہیں پھینکنے دینا چاہیے، روزانہ سیر اور ہلکی ورزش مفید ہے۔

ہرڈیہ ڈوبنا، دل کا ڈوبنا، ضعف القلب، سٹوکس آڈمز ڈیزیز

(Stokesadams Disease)

تعریف مرض :- اس مرض میں نبض نہایت کمزور مہیتی ہے اور مریض کو دل ڈوبنا نظر آتا ہے۔

وجوہات :- اس مرض میں نبض کمزور مہیتی ہے معمولی غشی ہوتی ہے۔ یہ شکایت عام طور پر بوڑھے اشخاص کو زیادہ ہوتی ہے۔ یہ مرض دماغی اور نخاعی شریانوں کا سخت صدمہ اور کبھی آتشک بھی ہو جاتی ہے۔

علامات :- اس مرض میں دل ڈوبنا نظر آتا ہے اور ایسا نظر آتا ہے کہ ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ دم گھٹنا نظر آتا ہے۔ نبض کی رفتار بے قاعدہ ہوتی ہے، اس مرض کو سٹوک ایڈمز انگریز نے دریافت کیا تھا۔ اس لئے اس ہی کے نام پر اس مرض کا نام رکھ دیا گیا۔

علاج :- اصل سبب مرض معلوم کر کے دور کریں، مریض کے سر کو نیچا رکھیں، مقویات اور محرکات کا استعمال کریں اور کمزوری دل (بریڈی کارڈیا یا Brady Cardia) کے مطابق کریں۔

ہرڈیہ کی پھرکن، دل کی پھرکن، اختلاج القلب، ٹیکی کارڈیا، (Tachycardia)

تعریف مرض :- اس مرض میں دل کی حرکت تیز ہو جاتی ہے اور دل پھر پھرنے لگتا ہے۔

وجوہات :- عصبی کمزوری، سنوں کی کمزوری، شراب خوری، بد ہضمی، اچھا رہ، دل کا پھیل جانا، ہسٹیریا وغیرہ اس کے خاص اسباب ہیں، اکثر اس مرض کا یہ زیادہ محنت، زور لگانے، دوڑنے، رنج و غم یا خوشی سے ہو جاتا ہے، یہ عارضہ چائے، متبا کو وغیرہ کے استعمال سے بھی ہو جاتا ہے۔

علامات :- نبض کی چال تیز ہو جاتی ہے (نوجوان تندرست انسان کی نبض کی حرکات ۸۰ سے ۱۲۰ تک ہوتی ہیں اس سے زیادہ ہونا مرض کی علامت ہے، یعنی ۱۵۰ سے ۲۰۰ یا اس سے زیادہ حرکات ہونے لگتی ہیں کبھی سر گھومنے، دردِ دل، تنگی سانس اور کانوں میں بھننا ہٹ کا بھی عارضہ ہو جاتا ہے۔

علاج :- اس مرض میں موت بہت کم ہوتی ہے، اس مرض کا علاج بطرز دل کی دھڑکن (پلپیٹیشن Palpitation) کے کریں، اگر عصبی کمزوری کی وجہ سے یہ عارضہ ہو تو ڈیٹا من بی ۱ (بیرین) اور ڈیٹا من بی ۱۲ (یعنی ایک ایک سی سی ہر دو سے لے کر ہر دوسرے دن بڑے آدمی کو عضلاتی انجکشن دیں) کا استعمال کریں، خون کی وجہ سے یہ عارضہ ہو تو لوریکسٹریکٹ کا عضلی ٹیکہ کریں۔ مرض کے دورہ کو کم کرنے کے لئے مسکن ادویات کا استعمال کریں۔

ایسی طریقہ علاج میں اگر عصبی کمزوری کی وجہ سے یہ عارضہ ہو تو مرکبات کچھل شدھ کا استعمال کریں۔

ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، بائیو کیمک، ایورویدک علاج بطرز پلپیٹیشن (Palpitation) کے کریں، اگر ہائی بلڈ پریشر ہو تو ہائی بلڈ پریشر کے بیان میں دیئے گئے نسخجات کو استعمال کریں۔

غذا و پرہیز :- بطرز خفقان کے کریں۔

ہر دیر کے غلاف کی سوجن، دل کے غلاف کی سوجن، ورم غلاف القلب، پیری کارڈائٹس

(Pericarditis)

تعریف مرض :- دل کے غلاف میں سوجن ہو جاتی ہے، جس سے دل کے مقام پر درد ہوتا ہے۔

وجوہات :- اس مرض کا زیادہ تر سبب وجع المفاصل یا گنٹھیا ہوتا ہے، کبھی مادہ سہل یا سرطان یا سرخ بخار یا تپ محرقہ یا نمونیا یا ذیابیطس یا سوزش

گردہ وغیرہ ہو کرتے ہیں۔

علامات :- دل کے مقام پر شدید درد ہوتا ہے، کبھی دل دھڑکتا ہے اور کبھی کمزوری محسوس ہوتی ہے، سینے میں جکڑن اور سانس لینے میں تکلیف کے علاوہ

بعض اوقات دماغی امراض مثلاً بے ہوشی وغیرہ کا عارضہ پایا جاتا ہے، چہرہ کا رنگ، پسینا، معمولی کھانسی اور دل کی رفتار تیز لیکن نبض کمزور ہوتی ہے، مریض کو شدید

بے چینی ہوتی ہے۔

ڈاکٹری علاج :- اصل سبب کو معلوم کر کے دور کریں، اس مرض میں مکمل آرام نہایت ضروری ہے، مریض کو ہر وقت بستر پر لٹائے رکھیں، گرم موسم ہو تو

درد کی جگہ برف کی ٹیلی یا برف رکھیں، موسم سرما میں سینک کریں یا اپنی منٹ ٹرپ ٹائن کی ماس کریں یا انٹی فلو جیٹین کا پلاسٹر لگائیں یا اسی کی گرم گرم پٹس باندھیں

اگر مریض تیزی ہو تو جو نکلیں گلو ایس، گرم پانی کی بوتل کی ٹکڑی مفید ہے، اگر ان تدابیر سے درد کو آفاقہ نہ ہو تو ٹرائی لین کے امپولز رومال میں توڑ کر لگائیں یا ولایتی روئی

پر چھڑک کر لگوانا چاہیے۔ اس سلسلہ میں ایل ٹائیٹراس کے کیپ شولز بھی لگوائے جاسکتے ہیں، اگر دل کے فیل ہو جانے کا خطرہ ہو تو کورامین وغیرہ مقوی دل

ادویات دیں یا چار ڈرام برانڈی یا سوسڈ وائٹر میں ملا کر دیں۔ اگر مرض کے صراغ پنی سلین اور سلٹا گروپ کے زیر اثر ہوں تو سلفا ڈایازین یا مکتایازول دیر

پنی سلین یا پروکین مینی سلین کے عضلاتی انجکشن دیں۔ اگر جسم کے کسی حصہ میں پانی پڑ جائے تو نیپٹال (Neptal) یا سلیرگان (Salyrgan) کے انجکشن مرض

کے مطابق دیں، اگر بلڈ پریشر کی زیادتی ہو تو اسے گٹھانے والی ادویات دیں۔

چونکہ شدید گنٹھیا میں یہ مرض ہو جاتا ہے، اس لئے اصل مرض یعنی گنٹھیا کا علاج کریں، اس سلسلہ میں ارگاکا پائرن کا استعمال کریں، جو سوزش، ورم اور درد

کے لئے بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔ خاص طور پر جوڑوں کے درد، شدید گنٹھیا، ریاحی درد اور پھوٹوں وغیرہ کے درددوں کے لئے مفید ہے، اس کے علاوہ عرق الذہن

ضربات اور سادات کے درددوں کے لئے بھی اس کا استعمال مفید ہے۔ لیکن دل اور گردوں کی پرانی بیماریوں میں ارگاکا پائرن نقصان دہ ثابت ہوئی ہے، اس لئے

اسے مرض کے مطابق استعمال کرائیں، ارگاکا پائرن بذریعہ عضلاتی انجکشن اور خوردنی صورت میں دی جاتی ہے۔

یوتانی علاج :- درد کو دور کرنے کے لئے معجون برشعشا دیں۔ اگر دل کمزور ہو تو خمیرہ مروارید یا خمیرہ گاؤ زبان عنبری جو اہر والا یا جو اہر ہرہ عرفہ

گاؤ زبان اور عرق مکو کے ساتھ دیں، اس کے علاوہ کمزوری دل کے بیان میں دیئے گئے مجربات کا استعمال کریں، دواء المسک مقتدل جو اہر والی کا استعمال

بھی مفید ہے۔ بیرونی طور پر مقام دل پر مندرجہ ذیل ضماد کریں۔

اکلیل الملک، بابونہ، سورنجاں، عنب الثعلب ہر ایک دو ماشہ، سب کو گرم پانی میں پیس کر ضماد کریں اور پیسے کے لئے مندرجہ ذیل نسخہ دیں :-

پھول گاؤ زبان، پھول سیوتی، بادرنجبویہ، پھول گلاب، عنب الثعلب، میٹھی سورنجاں ہر ایک چار ماشہ، سب کو جوش دے کر شربت ہر دیر

تولہ ملا کر پلائیں۔

آیور ویدک علاج :- اگر ہر دیر کے غلاف کی سوجن کے ساتھ ہائی بلڈ پریشر کا عارضہ ہو تو سرپینا (Serpina) اور سرپاسیل (Serpasil) کا

نہایت کامیاب دوا ہے اور اب ایو میچٹی طب میں بھی اس آیور ویدک دوائی کا کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے لئے مغربی ممالک میں

اس آئیور ویدک، دوا کی کامیابی کو تسلیم کیا جا چکا ہے، اسے حسب موقع استعمال کر کے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔
 ہر دسے آرٹورس :- پارہ شدہ، گندھک شدہ، ایک ایک تولہ، کشتہ تانبہ دو تولہ، پارہ وگندھک کی کجلی کریں اور کشتہ تانبہ ملا کر ایک دن تک تڑپیلے کے کارے اور گوسے کے پانی میں کھول کر کے ایک ایک زنی کی گولیاں بنائیں۔
 خوراک :- ایک ایک گولی صبح و شام ہمراہ عرق گاؤ زبان دیں۔
 فوائد :- دل کی دھڑکن، دل کی کمزوری اور بلغمی امراض کے لئے مفید ہے، اس سلسلہ میں ہر دیہ کی کمزوری کے بیان میں جو نسخے دیئے گئے ہیں۔ وہ اس مرض میں بھی مفید ہیں۔

ہومیو پیتھک علاج :- اگر کمزوری دل ہو تو علاج بطور کمزوری دل کے کریں۔ اور اس کے لئے منعقب دل کے بیان میں دیئے گئے نسخجات کا استعمال کریں، غذا پر سبزی بھی بطور منعقب دل کے کریں۔ اگر دل کی رفتار بے قاعدہ ہو تو ڈیجیٹلس دیں۔ اگر مرض پرانی ہو تو برائی او نیاعمدہ علاج ہے۔ بالو کیمک علاج میں کلکیر یا فلور (آتشک سے) فیرم فاس (نونیہ سے) میگ فاس (گنٹھیا سے) ہو تو کامیاب ادویات ہیں۔

ہر دیہ کی جھلی کی سوجن، دل کی جھلی کا ورم، ورم باطن القلب، انڈو کارڈائٹس

(Endocarditis)

تعریف مرض :- دل کے اندر کی طرف اسٹرکی طرح لگی ہوئی جھلی میں ورم پیدا ہو جاتا ہے۔
 وجوہات :- اس مرض کے اسباب ورم غلاف قلب کی طرح ہیں، لیکن کبھی اس کا سبب زیادہ زور سے کام کرنا یا زیادہ وزن اٹھانا بھی اکرتا ہے، جس سے دل کی کیوڑیاں زخمی ہو جاتی ہیں اور زیر جلد خون کا جریان ہو کر سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ اس مرض کی علامات ورم غلاف قلب سے زیادہ شدید ہوتی ہیں۔

علامات :- اگر دل کے مقام پر سماع الصدر نکا کر آواز سنی جائے تو دھونکنی پھونکنی کی طرح آواز آتی ہے، اس مرض میں دل میں سوجن ہونے سے جسم میں مکمل طور پر خون نہیں پہنچا سکتا، جس سے پریشیر میں زیادتی آکر ہائی بلڈ پریشر کا عارضہ ہو جاتا ہے اور دل کی رفتار میں بھی فرق آ جاتا ہے، اس مرض کی دوسری علامات ورم غلاف القلب کی طرح ہوا کرتی ہیں۔

علاج ڈاکٹری :- اگر مریض کی نبض کمزور ہو تو کورائین دیں، ڈائسٹین بی اور ڈائسٹین سی بھی دل کو تقویت کے لئے عمدہ ادویات ہیں، سوزش کے لئے مینی سلین۔
 بوکین مینی سلین کے عضلاتی انجکشن دیں، اس کے علاوہ آریو مائی سین اور ٹیرامائی سین کا استعمال بھی مفید ہے، دل کی تقویت کے لئے برائڈی یا سپرٹ ایونیا۔
 ویشک کا استعمال کریں، اس مرض میں اکیس ریز کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ مریض کو آرام سے لٹانا اور غذا میں سیال چیزیں کم دینا بھی علاج میں داخل ہے، طبی آئیور ویدک و ہومیو پیتھک علاج بطور ورم غلاف القلب کے ہیں۔ اس کے لئے پیری کارڈائٹس (Pericarditis) کا بیان ملاحظہ فرمادیں۔

ہر دیہ کی سوجن، دل کی سوجن، ورم قلب، کارڈائیٹس، (Carditis)

دل کے عضلہ کی سوجن، ورم عضلہ قلب، مائیو کارڈائیٹس، (Myocarditis)

تعریف مرض :- دل یا اس کے عضلہ میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔

وجوہات :- اس مرض کے اسباب وہی ہیں جو دم غلاف قلب میں مذکور ہوئے عام طور پر دل کا دم غلاف یا اس کی کوڑیوں کے ساتھ یا بعد میں پیدا ہوا کرتا ہے۔ اس مرض میں دل کی جگہ پر بھاری پن، درد و بے چینی ہوا کرتی ہے۔ دل کے فعل میں خرابی نظر آتی ہے۔ مرض شدید ہو تو بخار اور ہڈیاں ہوجاتے ہیں اس مرض کی تشخیص میں خاص مہارت کی ضرورت ہے، علاج نہایت توجہ سے کرنا چاہیئے، کیونکہ اس مرض کا انجام ہمیشہ خراب ہوتا ہے۔

ڈاکٹری علاج :- کمزوری دل کی حالت میں دل کو تقویت دینے والی ادویہ دیں۔ اس سلسلہ میں کورامین ٹیبلٹ یا سیال یا انجکشن استعمال کریں اور دل کی کمزوری کے بیان میں لکھے گئے نسخجات کا استعمال کریں۔ اس مرض کا علاج بطور غلاف القلب کے کریں۔

طبی علاج :- سرکہ گلاب، کافور، صندل سفید گھس کر کپڑا تر کر کے مقام درد پر رکھیں، تقویت دل کے لئے دواء المسک معتدل جواہر والی یا جواہر مر یا خمیرہ گاؤ زبان غبری جواہر والا یا خمیرہ مرورید دیں۔

آیور ویدک، ہومیو پیتھک اور بالوکیک علاج بطور غلاف القلب کے کریں، جدید ترین علاج اس کا اکیس ریز کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ جو بہت مفید ثابت ہوا ہے۔

خون کے دباؤ میں کمی، رکت دباؤ میں کمی، ہائپوٹینشن، (Hypotension)

تعریف مرض :- اس مرض میں خون کا دباؤ اعتدال سے کم ہوجاتا ہے، گویا آلہ مقیاس فشار دم سفگمو مینومیٹر (Sphygmomanometer) پارہ کی بلندی کا درجہ بالغ مردوں میں ۱۱۰ ملی میٹر اور بالغ عورتوں میں ۱۰۵ یعنی اعتدال سے کم ہوتا ہے۔


وجوہات :- دل کی کمزوری، کمی خون، رکت دق، جنرل کمزوری، شدید جریان خون وغیرہ سے یہ عارضہ ہوجاتا ہے۔

علامات :- جسمانی و دماغی محنت سے جلدی تھکاوٹ محسوس ہونا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا، غشی، پریشانی، چہرے کی جلد کا نیلا یا زرد ہونا خاص تشخیصی علامات ہیں۔

بلڈ پریشر معلوم کرنے کا طریقہ :- بلڈ پریشر یعنی خون کا دباؤ کیسے

معلوم کیا جاتا ہے، اس مقصد کے لئے سفگمو مینومیٹر (Sphygmomano Meter) کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعہ بلڈ پریشر کی جانچ بھجی ہو سکتی ہے۔ اس آلہ کی نوعیت کو سمجھنے کے لئے آپ برابر والی تصویر کو بغور دیکھیں۔ آپ کو اس کے متعلق مفصل معلومات حاصل ہوجائیں گی۔

اس آلہ میں ایک ربر کی تھیلی کے ساتھ دو ربر کی نالیاں لگی رہتی ہیں ایک کا تعلق ایک ربر کے پیپ کے ساتھ ہے اور دوسرے کا ایک برتن کے ساتھ جس میں پارہ بھرا ہوا ہے، اس برتن سے ایک نالی نکلتی ہے جس کے پیچھے ایک پیمانہ لگا ہوا ہے۔ اس پیمانہ پر سیٹی میٹر کے نشان لگے ہیں تھیلی کپڑے میں لپیٹی ہوئی ہوتی ہے، تھیلی کو مریض کے بازو پر کھنی سے اوپر باندھ دیا جاتا ہے۔ اب پیپ کو لگاتار دبا یا جاتا ہے، جس سے تھیلی میں ہوا بھرتی



سفگمو مینومیٹر

جاتی ہے اور وہ بازو پر دباؤ ڈال کر بڑی شریان کو بند کر دیتی ہے، اب نبض پر انگلی رکھنے سے وہ محسوس نہ ہوگی، پیپ کے ساتھ ہی ایک

لگا ہے۔ اس کو کھولنے سے ہوا خارج ہونے لگے گی، جب نبض دوبارہ محسوس ہونے لگے، پیمانہ پر دیکھا جاتا ہے کہ پارہ کس نمبر پر ہے۔ یہ ہے دباؤ قلب کی حالت انقباض میں، یعنی جس وقت دل سکڑ کر خون کو خارج کر رہا ہے۔ اس طریق سے دل کی حالت انقباض میں خون کا دباؤ معلوم نہیں ہو سکتا، اس غرض کے لئے دباؤ معلوم کرنے کا سمائی طریق اختیار کیا جاتا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ انگلی نبض پر رکھنے کی بجائے سماع الصدہ کو کہنی کے سامنے رکھیں۔ پمپ دباتے جائیں، یہاں تک کہ پھیلی ہوئے بھر کر آخر بازو کی مشریان کو بند کر دے۔ اب پمپ کا ہیچ آہستہ آہستہ کھولیں، حتیٰ کہ مشریان کے دھڑکنے کی آواز سنائی دے، پارہ جس مقام پر ہے یہ انقباضی (Systolic-Pressure) دباؤ ہے۔ پارہ کو دھیرے دھیرے نیچے آنے دیں، حتیٰ کہ آواز آنا بند ہو جائے۔ یہ انساطی (Diastolic-Pressure) دباؤ ہے۔

تندرست و جوان اشخاص میں (۱۸ سے ۳۰ سال کی عمر میں) خون کا دباؤ ۱۲۰ سے ۱۳۰ ملی میٹر تک ہونا چاہیے، بچوں میں بہت کم تقریباً ۷۰ سے ۹۰ تک، زیادہ عمر کے لوگوں کے خون کا دباؤ ۱۵۰ درجہ تک بھی ہو سکتا ہے۔ اس لئے ۵۰ سال کی عمر میں ۱۵۰ تک کوئی خطرہ کی علامت نہیں۔ عام طور پر عورتوں کا بلڈ پریشر ۱۰۰ ملی میٹر کم سمجھنا چاہیے، جب ربرٹ کے پھیلنے میں ہوا داخل کی جارہی ہو اور ہوا کا نبض پر اتنا دباؤ نہ پڑا ہو کہ نبض بالکل بند ہو چکی ہو، تو اس وقت پارہ کے حرکت میں ہونے کے وقت سب سے بلند مقام پر جہاں پارہ پہنچے، وہ دل کے پھیلنے کی حالت کا مشربی دباؤ یا ڈایازولک پریشر کہلاتا ہے۔ اگر کسی شخص کا انقباضی دباؤ ۱۵۰ سے زیادہ اور انساطی دباؤ ۱۰۰ سے زیادہ ہو یا ان دونوں کا فرق ۵۰ سے زیادہ ہو تو یہ غیر طبعی سمجھا جاتا ہے، اس سلسلہ میں یاد رہے کہ نبض کی آواز سننے کے لئے سٹتھسکوپ کی امداد لی جاتی ہے۔ اور مریض کم از کم ۲۰ منٹ تک آرام کرے تو بلڈ پریشر لینا چاہیے۔

ڈاکٹری علاج :- اصل سبب مرض کو معلوم کر کے اس کے مطابق علاج کریں، غشی کا درجہ پڑے تو غشی کا علاج کریں، گرم مستروبات چائے اور کافی پلائیں، سپرٹ ایونیا ایرومینک یا برانڈی دیں، محرک قلب ادویات کورامین یا کیفروغیزہ دیں۔ کارڈیازول (Cardizol) شدید کمزوری کے بد اثرات کو رائل کرنے کے لئے نہایت مفید ہے۔ دل کو قوت دیتی ہے۔ خوراک ۵ سے ۲۰ قطرے پانی میں ملا کر دیں، بشرط ضرورت ہر دو گھنٹے بعد دے سکتے ہیں۔ شدید حالتوں میں کارڈیازول کا ٹیکہ کیا جاتا ہے۔ اس مرض میں وٹامن اے، ڈی، بی، سی اور ای کا استعمال بہت مفید ہے، بعض دغہ پیٹ پر پٹی باندھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، دیگر علاج بطور کمزوری دل کے کریں، اگر غشی ہو تو غشی کے بیان میں دیئے گئے نسخہ جات کا استعمال کریں اور جسم کو گرمی پہنچائیں۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ کارڈیازول (Cardiazol) تول ———— شدید کمزوری اور مارینا وغیرہ کے بد اثرات کو دور کرنے کے لئے بہت مفید ہے۔ دل کو طاقت دیتی ہے۔ خوراک ۲۰ قطرے قدرے پانی میں ملا کر دیں، بشرط ضرورت ہر دو گھنٹے بعد دوبارہ دوبارہ دے سکتے ہیں، شدید حالتوں میں ایک امپول کا جلدی یا عضلاتی انجکشن دیا جائے۔ یہ دوا خوردنی استعمال کے لئے ٹیکوں کی صورت میں بھی ملتی ہے۔

۲۔ کورامین (Coramin) ایک امپول کا عضلاتی انجکشن کریں، اس کے بعد کورامین ڈراپس ۲۰ سے ۴۰ بوندوں میں تین سے چار بار دیں۔
۳۔ بنروا (روش) ۵۰ ملی گرام، ریڈوکسان (روش) ۵۰ ملی گرام، دونوں کو باہم ملا کر ایک پڑیہ بنائیں اور پانی کے ہمراہ دن میں دو بار کھلائیں۔ یہ وٹامن بی اور وٹامن سی کا مرکب ہے جسے عام کمزوری میں استعمال کر سکتے ہیں۔

۴۔ پولی بون (Polybion) ای مرکب ————— جسمانی تھکن، کمزوری کے لئے مفید ہے۔ یہ دراصل وٹامن بی کمپلیکس ہے۔ ایک ٹیکہ کھانا کھانے کے بعد تازہ پانی سے دیں۔

۵۔ ہپی سیبرین (Hapicebrin) لٹی ————— یہ عام ٹانگ ہے، جو وٹامنوں کی کمی سے لاحق جسمانی و دماغی کمزوری اور زرد کمزوری میں مفید ہے، دو سے چار گولی روزانہ دیں، مختلف وٹامنز کا مرکب ہے۔

۶۔ روبراپلیکس (Rubraplex) سارا بھائی ————— یہ فولاد، وٹامن بی کمپلیکس اور وٹامن سی کا مرکب مشرب ہے، ایمینا سے پیدا شدہ کمزوری کے لئے بہت مفید ہے۔ ایک سے دو چمچ صبح و شام دیں۔

- ۷۔ روبراٹون (Rubratone) سارا بھائی ————— فوائد ترکیب استعمال بطریق روبراٹیکس ہے۔
- ۸۔ میٹاوین (Mittavin) بوہرنگر ————— جنرل ٹانگوں میں اعلیٰ ٹانگ ہے۔ ایک کیپ شول روزانہ دیں۔ وٹامن اے، بی، بی^۱، بی^۲ سی، ڈی، ای، فولک ایسڈ، کیلیم ————— نیا سٹامائڈ اور آر فینا ڈرین کا مرکب ہے۔
- ۹۔ بیلامل (Belamyl) سارا بھائی ————— وٹامن بی کیلکس سے پیدا شدہ تمام امراض کی کمزوری میں مفید ہے، بڑوں کو ایک سے دوسری عضلاتی انجکشن ایک دو دن چھوڑ کر دیں۔
- ۱۰۔ پلے بکس (Plebex) واسنٹھ ————— جو مریض پور ایکسٹریکٹ کی برداشت نہ رکھتے ہوں، ان کے لئے مفید ہے، بہت اعلیٰ ٹانگ ہے۔ وٹامنز کا مرکب ہے، خوراک دن میں ایک کیپ شول، شدید کمزوری میں دو تین بھی دن میں دے سکتے ہیں۔ شربت چائے کا ایک چمچ دن میں دو بار کھانا کھانے کے درمیان میں استعمال کرائیں۔
- ۱۱۔ ڈے پلکس (Deyplex) ڈیز ————— ایک قابل بھروسہ جنرل ٹانگ ہے۔ جو کمزوری وٹامنوں اور کیلیم سے مرکب ہے، اس سے وٹامنز کی کمی سے لاحق عوارض میں نوری فائدہ دیتا ہے، ایک شول ایک دن میں دو بار کھانا کھانے کے بعد یا ٹیکہ دن میں تین بار ایک ایک چمچ کو شربت بلحاظ عمر دیں۔
- ۱۲۔ بی سی ٹون (Basiton) سارا بھائی ————— غذائی کمی کو پورا کرنے کے لئے اعلیٰ جنرل ٹانگ ہے، دو دو کیپ شول دو دنوں وقت کھانا کھانے کے بعد تازہ پانی سے دیں۔
- ۱۳۔ بیکا ڈیکس (Becadex) گلیکسو ————— وٹامن کی کمی کے امراض، کمزوری کے لئے مفید ہے، ایک سے دو گولی روزانہ دیں۔
- ۱۴۔ فیرا ڈول (Ferradol) پارک ڈیوس ————— بڑوں کو دو چائے کے چمچے دن میں تین بار دیں، بچوں کو نصف تا ایک چائے کا چمچ دن میں تین بار دیں۔
- ۱۵۔ ایم بی لیکس (Embelix) مے بیکر ————— جن امراض میں وٹامن بی کیلکس دینا ضروری ہو، وہاں یہ دیا جانا چاہیئے۔ دو دو چمچے دن میں تین بار دیں۔ بچوں کو نصف مقدار میں دیں۔
- ۱۶۔ بیکوزائم سی فورٹ (Becozym C-Forte) روش ————— جنرل ٹانگ ہے، وٹامن بی کیلکس و وٹامن سی کی کمی کو پورا کرتا ہے، ٹیکہ کی صورت میں دستیاب ہے۔
- ۱۷۔ ڈو کے بولین (Docabolin) آرگنن ————— عضلاتی ٹیکہ ہفتہ میں ایک بار، چھ ہفتہ تک کریں۔
- ۱۸۔ بی جی، فاس الگزر (B G. Phos elixir) مرک شارپ ڈوہم ————— کمزوری اور تھکاوٹ کے لئے اعلیٰ ٹانگ ہے، ایک یا دو گولی کھانا کھانے کے بعد دیں۔
- ۱۹۔ پالادک (Paladac) پارک ڈیوس ————— یہ خوش ذائقہ غیر الکحلی شربت ہے، جس میں کمزوری وٹامن شامل ہیں، بچوں کے لئے خاص طور پر مفید ہے، بڑے بچوں و بالغوں کے لئے ایک چائے کا چمچ روزانہ استعمال کرائیں۔
- ۲۰۔ پرفولین (Prfolin) لیڈرے ————— یہ ملٹی وٹامن ہیں۔ جب وٹامنز کی کمزوری سے ہو تو اس کا دینا مفید ہے۔ ایک سے دو گولی دن بھر میں تازہ پانی سے دیں۔
- ۲۱۔ تھیو اگراں (Theagran) سارا بھائی ————— مشہور ملٹی وٹامن ہے، ایک دو کیپ شول دن میں تازہ پانی سے دیں۔
- ۲۲۔ فسفومین (Phosphomin) ————— وٹامنوں کی کمی سے پیدا شدہ کمزوری میں مفید ہے۔ کھانا کھانے کے بعد دو وقت ایک بڑا چمچ دیں۔

۲۳۔ میٹاٹون (Matetone) پارک ڈیوس — جسمانی ناطاقتی و مرض کے بعد کی کمزوری لے لئے مفید ہے۔ ایک تا دو چائے کے چمچے بھر کر کچھ پانی میں ملا کر کھانے کے بعد دیں۔

۲۴۔ مانی نیولز (Minules) وانٹھ — ایک کیپ شولز روزانہ شدید حالت کمزوری میں دو روزانہ کھانا کھانے کے بعد تازہ پانی سے استعمال کرائیں۔

۲۵۔ ملٹی بیے (Multibay) بایر — یہ وٹامن بی کیپیکس ہے، بیماری کے بعد کی کمزوری میں مفید ہے، روزانہ ایک کیپ شولز تازہ پانی سے کھانا کھانے کے بعد دیں۔

۲۶۔ نیو ایسڈ اور میٹ (Newesdavite) مرک شاپ ڈوہم — یہ بہت سے وٹامنوں کا مجموعہ ہے، پھلوں کا جوہر بھی شامل ہے روزانہ ایک ٹکیہ تازہ پانی سے دیں۔

۲۷۔ نشٹری سان (Nutrisan) سینڈوز — دیگر ملٹی وٹامنوں کی طرح یہ بھی کئی وٹامنز کا مجموعہ ہے، خون میں سُرخ ذرات کو بڑھاتا ہے۔ دن بھر میں ایک ایک کیپ شولز کھانا کھانے کے بعد تازہ پانی سے دیں۔

۲۸۔ والی میگنا (Vimagna) لیڈرے — شربت، ڈرائس و کیپ شولز کی شکل میں ملتا ہے، ناسفوس کی طرح مفید ہے۔ غذا و پیرہیز:۔ دیرینہ اور ٹھنڈی اغذیہ سے پرہیز کریں، غذائیں اُبلے ہوئے اندے و گوشت کا شور بہ بہت مفید ہے۔ نوٹ:۔ اس مرض میں برہمچریہ کا پالن کرنا نہایت ضروری ہے۔

ضفطۃ الدم قوی، خون کے دباؤ کی زیادتی، ہائی بلڈ پریشر (Hypertension)

تعریف مرض:۔ اگر بلڈ پریشر نارمل سے زیادہ ہو تو اسے ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں۔

وجوہات:۔ یہ ادھیڑ عمری کے بعد کا مرض ہے۔ جو شرائین کی بناوٹ میں خرابی ہو جانے سے ہوتا ہے، زیادہ شراب، چائے، کافی، تنباکو وغیرہ کے استعمال اور غم و غصہ، فکر، ڈر اور زیادہ دماغی و جسمانی محنت سے بھی یہ مرض پایا جاتا ہے۔ آتشک، سوزاک، خسرہ، چھچک، تپ محرقہ، جوڑوں کا درد، پائیوریا، گلے کی عذو دوں کی خرابی، زیادہ گوشت کھانے، انٹریوں کی خرابی، گردوں کے نقائص وغیرہ سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

دلیسی طریقہ علاج کے نظریہ کے مطابق یہ مرض زیادہ تر دموی مزاج موٹے، تازے انسانوں کو ہوا کرتا ہے۔ خون کا دباؤ ہر عمر کے انسان میں اس کی عمر کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ یہ مرض مردوں کی نسبت عورتوں کو کم ہوتا ہے۔

علامات:۔ سر میں بھاری پن، رگوں کی ترپ کا لگنا، احساس، درد سر، چہرہ کی لالی، آنکھوں کے آگے چمک، سرگھومنا، نیند نہ آنا، دل کا پیڑ کنا، شرائین کا موٹا اور سخت ہونا، نبض کا صلب اور متواتر ہونا، آنسو اور معدہ کا خراب ہونا، سانس بھولنا، دل کے پھوٹوں کا کمزور ہو جانا، قلبی دہ، پیشاب کی زیادتی وغیرہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔

ڈاکٹری علاج:۔ اگر بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ گیا ہو، ایم ایل ٹیٹراس کا ایک کیپ شول توڑ کر رومال پر ڈال کر سونگھائیں یا نائٹرو گلیسرین گولیاں زبان کے نیچے رکھ کر چوسیں، لیکن ان کا اثر عارضی ہوتا ہے۔ مریض کے منہ کے نیچے اونچا ٹکیہ رکھ کر سٹلنا چاہیے۔

زیادتی بلڈ پریشر کے لئے راؤڈکسین (Raudixin) سارا بھائی — گولیاں نہایت عمدہ علاج ہیں۔ بڑکیاں مشہور

یونانی دوا چھوٹی چندن ٹوٹی کی سالم جڑ سے تیار کی گئی ہیں۔ دو ٹکیاں دن میں دو بار صبح دشام کھلائی جائیں۔ اگر خون کے دباؤ میں ایک یا دو ہفتہ میں کمی نہ ہو تو مقدار خوراک بڑھا دی جائے، بعض مریضوں میں اس دوا سے ناک میں بھراؤ کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بد اثرات ظاہر نہیں ہوتے علاوہ ازیں ہتکے مانسے دل کے بوجھ کو کم کرتی ہے اور نبض کی چال کو اعتدال پر لے آتی ہے۔

اس دوا کو سپلاکپینی "سرپی نائیڈ" کے نام سے، ہمالیہ ڈرگ کمپنی "سرپینا" (Serpina) اور سیباکپینی "سرپاسیل" (Serpasil) کے نام سے یہ نواسیجا ڈکیاں چھوٹی چندن کے جزوی الکلائڈ سے تیار کی گئی ہیں جو کہ خون کے دباؤ کی زیادتی کے لئے ایک مانی ہوئی دوا ہے۔ یہ مرکزی نظام عصبی (سنٹرل نیور سسٹم) کے ان خود آئین (اٹونومک) مراکز پر اثر ڈالتی ہیں، جو خون کے دباؤ کو باقاعدہ رکھتے ہیں، علاج کی ابتداء میں اس دوا کی گولیاں دن میں تین بار ایک ایک کر کے پانی کے ساتھ کھلائیں جائیں، جب خون کے دباؤ میں کمی ہو جائے تو اس دوا کی مقدار کم کر دی جائے۔

اگر بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھا ہو تو سرپاسیل (Serpasil) ایک ملی گرام ایسپولنز کا عضلاتی انجکشن لگایا جاسکتا ہے، جسے سیباکپینی تیار کرتی ہے۔

یہ انجکشن ہائی بلڈ پریشر، مرگی، ہٹیریا، پاگل پن، جنون، مانیچو لیا اور بے خوابی کے لئے مفید ہے۔

طب جدید میں تھیوگارڈینال (Theogardinal) ساختہ مے اینڈ بیکر بھی اس مرض کے لئے مفید ہے، خوراک ایک ٹکیہ دن میں دو یا تین بار دیں۔ اس کے علاوہ سرپی روٹین، سی (Serpirutine) T.C.F. (ٹی، سی، ایف) بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ خوراک ایک سے دو ٹکیہ دن میں دو بار دیں اگر نمید نہ آئے تو "برومائیڈ مکسچر" کا استعمال مفید ہے۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ سرپاسیل (Sarpasil) سبباً ————— ایک گولی دن میں تین بار مرض کے مطابق تازہ پانی سے دیں۔

دوائی ٹی، سی، ایف کمپنی ری سرپین (Reserpine)، سرپی روٹین سی (Serpirutin C) اس میں اس کے علاوہ امینوفائی لین، فینوبار، ٹون، وٹامن بی اور سی دینا سٹامائیڈ بھی ہے اور یہ زیادہ اثر داتی ہے۔

۲۔ ڈائی روڈاکسین (Diraudixin) سارا بھائی ————— اس میں مکمل طور پر سرپ گندھا شامل ہے۔ مقدار خوراک ایک ٹکیہ دن میں دو یا تین بار دیں۔ سپلاکپینی اسے سرپی نائیڈ اور ————— ہمالیہ سرپینا (Serpina) کے نام سے تیار کر رہی ہے

۳۔ روپینا (Raupina) بوہرنگر ————— یہ ٹکیاں سرپ گندھا (چھوٹی چندن) کی جڑوں سے بنائی گئی ہیں، بلڈ پریشر کم کر کے اثر رکھتی ہیں۔ یہ ٹکیہ بعد از غذا یا درمیان از غذا بغیر چائے نکل لینی چاہیے۔ غذا میں نمک نہ دیا جائے اور بلڈ پریشر میں کمی ہو جانے پر ایک روزانہ کھلاتے رہنا ہی کافی ہے، بلڈ پریشر کی جانچ کرتے رہنا چاہیے۔ تاکہ کم ہوتے ہی مقدار خوراک کم کر دی جائے۔

۴۔ اڈلفین (Adelphane) سبباً ————— ایک جدید دافع ہائی بلڈ پریشر مرکب دوا ہے، جو سرپاسیل اور اپرے سولین سے کی جاتی ہے۔ خوراک ایک یا دو ٹکیہ دن میں تین بار بعد از غذا دیں۔

۵۔ اسمیلین (Ismelin) سبباً ————— دس ملی گرام کی ٹکیہ تازہ پانی سے دیں۔

۶۔ تھیوبائی ٹال (Theobital) سپلا ————— اونچے بلڈ پریشر اور حذب باقی، میجان میں مفید ہے۔ ایک یا دو گولی دن میں دو تین بار تازہ پانی سے دیں۔

۷۔ ہائی گروٹون (Hygroton) گیگی ————— اس کا استعمال وقفوں سے ہوتا ہے۔ پیشاب آور ہے۔ اور ہائی بلڈ پریشر میں ہے۔ ایک یا دو ٹکیہ ہفتہ بھر میں دو سے تین بار دیں۔

۸۔ ایسے ڈرکس (سبباً) ۲۵۰ ملی گرام، سرپاسیل (سبباً) ۱۲۵ ملی گرام، دونوں اکٹھی دن میں تین سے چار بار تازہ پانی سے دیں۔

۹۔ نیپھریل آر (Nephril-R) فززر ————— ایک دوٹکیاں تازہ پانی سے دیں۔

۱۰۔ انسولائی سین (Ansolysen) ایم بی ————— عام طور پر ۲۵ سے ۱۰۰ ملی گرام ہر چھ گھنٹہ بعد سے شروع کر کے آہستہ آہستہ بڑھائی جائے، بلڈ پریشر کی حد سے زیادہ زیادتی کے لئے مفید ہے۔

۱۱۔ ایڈل فین ایسی ڈریکس (Adelphane esidrex) سببا ————— ہائی بلڈ پریشر میں پیشاب کو بڑھا کر بلڈ پریشر کم کرتی ہے، ایک دو گولی دن میں دو سے تین بار تازہ پانی سے دیں۔

۱۲۔ ایلڈومیت (Aldomet) مرک شارپ یا ایم ڈپا (Emdopa) آئی، ڈی پی، ایل ایک ٹکیہ ایک دو بار تازہ پانی سے دیں۔

۱۳۔ ٹربولان (Trbolan) ہیکٹ ————— ایک دو ٹکیہ تازہ پانی سے ہر روز دیں، فائدہ ہونے پر مقدار کم کر دیں۔

یونانی علاج: مسکن دل اور عروق کو پھیلائے والی ادویات استعمال کی جائیں، جوش خون کو کم کرنے کے لئے چھوٹی چندن (اسرول) کا سفوف بمقدار تین رتی دن میں تین بار ہمراہ دودھ گائے یا عرق گلاب کھلائیں۔

تحقیقات جدید سے ثابت ہوا ہے کہ شیرہ معزز تر بوڑا اس مرض میں بہت مفید ہے، ۵ فیصدی اشخاص میں اس کے استعمال سے دل کا بوجھ کم یا بالکل زائل ہو جاتا ہے۔

دل کی تقویت کے لئے دواء المسک معتدل یا بار دکھلائیں۔

آیور ویدک علاج: مندرجہ بالا ہدایات پر عمل کریں۔ اور چھوٹا چندر یا سرب گنڈھا بوٹی دو سے چار رتی ہمراہ پانی استعمال کریں، دل کی تقویت کے لئے "برہت کستوری بھروس" کا استعمال کریں اور کمزوری دل کے بیان میں دیئے گئے نسخجات میں سے کسی ایک کو استعمال کرائیں۔
ہومیو پیتھک علاج: جدید تحقیقات کے مطابق "سرب گنڈھا" کو اس مرض کا شافی علاج تسلیم کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں سر پینٹیا کا استعمال مفید ہے۔

بالو کیمیک علاج میں فریم فاس، کالی میور اور سلینیا استعمال کی جاتی ہیں۔

غذا و پیرہیز: گرم دترش اور خون میں جوش پیدا کرنے والی غذا یہ نہ دیں اور ٹھنڈی و معتدل غذا یہ کا استعمال کرائیں۔ اگر مریض سینے میں دباؤ محسوس کرے یا بوجھ محسوس ہو اور دل کی حرکات بے قاعدہ ہوں تو درزش ہر قسم، متبا کو نوشی اور شراب سے پرہیز ضروری ہے، سرد پانی سے غسل کرنا مناسب نہیں، کیونکہ اس سے خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، لہذا گرم پانی سے غسل کرنا چاہیئے۔ گرم خشک مقامات میں رہنا مفید ہے۔ ہوائی جہاز کا سفر بلڈ پریشر والوں کے لئے مضر ہے۔

شریالوں کی سختی، آرٹیریوسکلیروسز (Arterio-Sclerosis)

تعریف مرض: اس مرض میں شریانیں سخت ہو کر ان کی دیواریں موٹی ہو جاتی ہیں۔

وجوہات: ۱۔ ہائی پریشر، کثرت گوشت خوری، شراب کا زیادہ استعمال، جراثیمی امراض، عمر کی زیادتی وغیرہ خاص اسباب ہیں۔

علامات: ۲۔ شریانیں سخت ہو کر متورم ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ پھٹ جاتی ہیں۔ نبض بھری ہوئی ہوتی ہے، دل کے بائیں حصہ میں سوجن ہو جاتی ہے۔ دل فیمل ہونے کا سخت خطرہ ہوتا ہے۔

ڈاکٹری علاج: اگر بلڈ پریشر کی زیادتی ہے تو بلڈ پریشر میں لکھی گئی ادویات کا استعمال کریں۔ سر پینٹیا یا سر پینٹیا یا سر پائسیل وغیرہ کا

استعمال کرائیں، کمزوری دل کے لئے وٹامن بی کمپلیکس مسلسل استعمال کرائیں، وٹامن بی کمپلیکس خوردنی کے علاوہ بذریعہ انجکشن دیں۔ جدید تحقیقات کے مطابق وٹامن "سی" اور وٹامن "کے" شریانوں کی سختی کو دور کرنے کے لئے مفید ثابت ہوئی ہیں۔

یونانی علاج :- مغز تر بوز، مغز خر بوزہ، مغز کھیرا ہر ایک چھ ماشہ، منقہ شدہ سات دانہ، پانی میں پیس کر موسم سرما ہو تو قدرے گرم کر کے اور اگر موسم گرم ہو تو ٹھنڈا پلائیں۔

اسرول (چھوٹی چندن) بوٹی چار رتی، مرتج سیاہ چار رتی، سفوف بنائیں اور دن میں دو بار ہمراہ تازہ پانی استعمال کرائیں۔
آیور ویدک و ہومیو پیتھک طریقہ علاج بطرز ہائی بلڈ پریشر کے کریں اور مریض کو قواعد حفظانِ صحت کی پابندی کرائیں۔
قدرتی علاج :- لہسن اور پودینہ کے پتوں کی چٹنی خاص طور پر مفید ہے، سبزی میں بھی لہسن کا زیادہ استعمال کریں اور لہسن کا اچار بھی مفید ہے۔

شریانوں کی سختی و ہائی بلڈ پریشر کا علاج "سرب گندھا"


جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے کہ سرب گندھا (چھوٹا چندرا، اسرول) شریانوں کی سختی اور ہائی بلڈ پریشر کا مجرب علاج ہے۔ اسرول کی قلیل مقدار صرف ۵ رتی (۱۰ گریں) بھی خون کی باریک رگوں کو کشادہ کر کے بلڈ پریشر کو کم کر دیتی ہے، لیکن یہ مقدار نیند آور نہیں ہوتی۔ نیند لانے کے لئے دس رتی (۲۰ گریں) دی جاتی ہے، اس کے استعمال سے سہیر یا کے مریضوں کو بھی خوشگوار نیند آ جاتی ہے پھر بھی اسے با احتیاط استعمال کیا جانا چاہیئے۔

اسرول (چھوٹا چندرا) سخت کڑوی ہونے کے علاوہ تیز بھی ہے اس لئے اس کے استعمال میں احتیاط ملحوظ رکھنی چاہیئے۔ چند نصیحت مریضوں میں اس کے کھانے سے جی متلانے لگتا ہے۔ بدن پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے اسے آج کل کے زمانہ کے مطابق کیپ شولز میں ڈال کر استعمال کرانی چاہیئے۔ کئی مریضوں میں اس سے کچھ دقت کے لئے بعض سُرست پڑ جاتی ہے لیکن اس سے گھبرانا نہیں چاہیئے، کیونکہ یہ عوارض محوڑی دیر کے بعد از خود رفع ہو جاتے ہیں۔

چھوٹی چندن (اسرول) نہ صرف ہائی بلڈ پریشر و شریانوں کی سختی کو دور کرنے کے لئے مفید ہے بلکہ جنونِ سمعی میں بھی مفید ہے ایسے مریض جو دن رات بکتے جھکتے رہتے ہیں۔ شور و غل مچاتے ہیں اور لوگوں کو مارتے پیٹتے ہیں، سخت غیض و غضب کا اظہار کرتے ہیں۔ نیند بہت کم آتی ہے۔ اس کے استعمال سے وہ آرام کی نیند سونے لگتے ہیں، چند دنوں کے استعمال سے اُن کے ہوش و حواس بجا ہونے لگتے ہیں۔ ان کے خون کا دباؤ طبعی اور مرض بھی جلد ہی دور ہو جاتا ہے ان مریضوں کو تندرست ہونے پر بھی چند ہفتے دوا دیتے رہنا چاہیئے۔ خون کے بڑھے ہوئے دباؤ کو اعتدال پر لانے کے لئے طب قدیم و جدید میں اس کے مقابلے

کی کوئی دوا نہیں ہے اس کے استعمال سے درد سر، دورانِ سر، بے چینی وغیرہ دور ہو جاتی ہے۔





نوال باب

معدہ و آنتوں کی بیماریاں

اُدرشول، پیٹ کا جلنا، کلیجہ جلنا، گیسٹریٹجیا، (Gastralgia)

تعریف مرض :- اس مرض میں معدہ کے مقام پر شدید درد ہوتا ہے، درد معدہ، وجع المعدہ، وجع الفواد، درد شکم، کارڈی ایلیجیا وغیرہ بھی اس مرض کے نام ہیں۔

وجوہات :- اس قسم کا درد زیادہ تر نازک اندام لڑکیوں کو عام طور پر بدھضمی یا قبض کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ زیادہ تنبا کو نوشی یا زیادہ چائے کے استعمال سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔ مذکورہ بالا اسباب کے علاوہ قبض، نفخ، ورم معدہ، زخم معدہ، اپنڈی سائٹس، سنگ گردہ، سنگ ہرارہ، سمیت پیریا، نفرس، درد دل کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔

علامات :- پیٹ میں نفخ، قراقر اور جلن کی شکایت ہوتی ہے۔ کوڑی کے مقام پر تیز قسم کا درد اور جلن ہوتی ہے جسے دبائے آرام محسوس ہوتا ہے۔ ڈکاریں آتی ہیں، جی متلاتا ہے اور اکثر تھوہ جاتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ معدہ کے عضلات میں اینٹھن ہو تو اس وقت درد نہایت شدید اور فوجی قسم کا ہوتا ہے جس سے مریض بے تاب ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ غشی تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور مریض کی زندگی خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔

ڈاکٹری علاج :- اصل سبب کو معلوم کر کے علاج کریں، اکثر ریاح خارج کرنے والی قبض کشا ادویات سے پیٹ درد کو آرام آ جاتا ہے۔

ڈاکٹری طریقہ علاج میں مندرجہ ذیل نسخہ جات بہت مفید ہیں :-

۱۵ منم
۱۰ منم

ٹنگچر کارڈم کو
ٹنگچر جعفر

۱۰ گریں
۱۵ منم

۱۔ سوڈائی کارب
سپرٹ ایونیا ایرومیٹک

ایرومینک سپرٹ آف ایونیا ۱۵ بوند
ٹنگر جنجر ۱۰ بوند
پیرپرنٹ وائر ایک اونس
ایسی ایک ایک خوراک صبح و شام کھانا کھانے کے بعد
استعمال کرائیں، نفخ شکم (اچھارہ) اور بد ہضمی کے لئے
مفید ہے۔

سپرٹ کلوروفارم ۱۵ ستم
عرق پودینہ ایک اونس
ایسی ایک ایک خوراک بعد از غذا صبح و شام دیں، درد
معدہ، نفخ معدہ، ترش ڈکار، کلیجہ جلنا، بد ہضمی، کمی بھوک کے
لئے تجربہ شدہ علاج ہے۔

۲۔ بانی کاربونٹ آف سوڈیم ۲۰ گرین

علاوہ ازیں سوڈامنٹ کی گولیاں جو ست پودینہ اور سوڈا بانی کارب مل کر بنائی گئی ہوں بھی درد معدہ اور بد ہضمی کے لئے از حد مفید ہیں
درد کو عارضی تسکین دینے کے لئے کوڈوپارین ایک ٹکیہ یا سارڈان ایک ٹکیہ گرم چائے سے کھلائیں، بعض دفعہ درد شروع ہونے سے پہلے
کوئی خشک غذا مثلاً بسکٹ یا روٹی کا ٹکڑا کھانے سے درد کو فوراً آرام آجاتا ہے، اگر قبض ہو تو میگ سلفاس کا جلاب دیں۔

مادرین ادویات: ۱۔ یوکول (Eucal) سپلا ————— درد پٹ (معدہ) گیس، اچھارہ کے لئے مفید ہے۔ ایک دو ٹکیہ
ہر دفعہ کھانے کے بعد تازہ پانی سے دیں۔ بچوں کو بلحاظ عمر دیں۔

۲۔ انٹریئل (Antrenyl) سبب ————— ادرشول، پینک شول میں مفید ہے، ایک ٹکیہ یا ۱۵ سے ۳۰ بوند دن میں تین یا چار بار دیں،
زیادہ دیر تک کام کرنے والی انٹریئل ڈوپلیکس (Antrenyl-Duplex) ٹکیاں بھی ملتی ہیں۔ یہ دگنے وقت تک کام کرتی ہیں۔ یہ کسی فینویم
برو مائیڈ ہے۔

۳۔ کیمفوروڈائن (CamPhorodyne) المیک ————— یہ کیمفر، کلوروفارم، آئیل منتھاپپ، ٹنگر کینا بس انڈیکا، مارنن ہائیڈروکلور،
ایڈ ہائیڈروسیانک ڈل سے مرکب ہے۔ بد ہضمی، پیٹ درد، قے، آنٹوں کے درد میں مفید ہے، ہضم کے دستوں میں بھی مفید ہے، پندرہ سے ۲۰ بوند
میں آدھا اونس پانی ملا کر دودھ گھٹنے بعد دیں، معالج کی رائے کے مطابق اور خوراک اور وقت میں کمی بیشی کی جاسکتی ہے۔

۴۔ گیسٹرولان (Gastrolon) سٹینڈرڈ فارمیوٹیکل ————— دو سے چار چمچے کھانے سے پہلے دونوں وقت لیں، قے، جی متلانا، معدہ کے
درد، ہچکچی وغیرہ کے لئے مفید ہے۔

۵۔ بیکوزائم سی فورٹ (روش)، ایک ٹکیہ، ڈس پپال (بوہرنگر) ایک ٹکیہ، لبریم (روش) ایک ٹکیہ ————— تینوں کو یکے بعد دیگرے پانی کے ساتھ کھانا کھانے
کے بعد دن میں دو بار دیں ————— یہ ڈامن بی کیلیکس، ڈامن سی اور انزائم اور مسکن نفنس ادویات کا مرکب ہے، پیٹ بھولنے، پیٹ درد اور
بے چینی کے لئے از حد مفید ہے۔

۶۔ بلاڈیئل (Belladennal)، یا بارڈیز (Bardase) یا نووالمین (Novalgin)، ایک دو گولی پانی سے دیں۔

۷۔ نیو آکٹینم (Neo-Octinum) نال ————— دس سے بیس بوند ہر چار گھنٹے بعد یا ایک امپول عضلاتی ٹیکہ لگائیں یا اس کی ایک دو گولی تین
چار بار پانی سے نگل جائیں۔

۸۔ سپازمو سبالمین (Spasmocibal gin) سبب ————— درد کے وقت تین ٹکیہ و باقی عرصہ کے لئے دو ٹکیہ تازہ پانی سے دن میں دو بار دیں یا
سپازمو پراکسی دن ایک کیپ شولز دیں۔

یونانی علاج: اگر درد معمولی ہو تو مرہض کو سوڈا وائر (لیمن) کی ایک بوتل پلائیں، منک سلیمانی یا حب کبد فوشادری دو عدد ہمراہ عرق سولف کھلائیں۔ مندرجہ
ذیل مجربات اس مرض میں نہایت مفید ہیں۔

دوائے دردِ معدہ :- منک لاہوری، منک سیاہ، منک سانجھ ہر ایک چار تولہ، نوشادر پھلی دو تولہ، مرج سیاہ چار تولہ، زیرہ پھول اک ۹ تولہ، سب کو باریک پس لیں۔ پھر رس لیموں ڈال کر ۲ گھنٹے تک پیتے رہیں۔ پھر خودی گولیاں بنائیں، خوراک ایک گولی ہمراہ گرم پانی دیں۔ خوش ذائقہ، دافع دردِ معدہ، مضم طعام و کامزاج ہیں۔ امرت دھارا :- ست پودینہ، ست اجوائن، کافور برابر وزن لے کر شیشی میں ڈال لیں، گھل جانے پر ایک دو بوند بتاشہ میں ڈال کر دیں۔ اس مرض میں خاص طور پر مفید ہے۔

دوائے ریاخ :- دانہ الاچی خورد دو تولہ، سونٹھ ایک تولہ، دارچینی ۹ ماشہ، لونگ چھ ماشہ، زیرہ سیاہ کشمیری تین ماشہ، سب کو علیحدہ علیحدہ کوٹ چھان کر ملا لیں، خوراک ایک تا دو ماشہ نیم گرم پانی یا عرق سولف سے دیں۔

معدہ کی کمزوری، اچھارہ، ہچکے، قے، متلی، دست اور درجہ گر کے لئے لاجواب ہے، ریاخ کو خارج کرتا ہے۔ دوائے معدہ :- نوشادر پھلی تین تولہ، الاچی خورد سالم دو تولہ، سیاہ مرج ایک تولہ، منک سیاہ پندرہ تولہ، پیر پرنٹ کر شل ایک رتی، تمام کو باریک کر کے شیشی میں محفوظ رکھیں، خوراک ایک رتی منہ میں ڈال کر رس چوسیں۔ یہ تمام امراض معدہ کا مفید اور سفلے علاج ہے۔ درد پیٹ کے لئے حلق سے اترتے ہی فائدہ ہو جاتا ہے۔

دیگر :- منک لاہوری، نوشادر پھلی، مرج سیاہ ہر ایک ایک تولہ، دارفلفل چھ ماشہ، منک سیاہ چار ماشہ، سوگند برابری تین ماشہ، ہینگ بریاں دو ماشہ، سب کو باریک پس کر سفوف بنائیں۔ خوراک دو ماشہ استعمال کریں۔

سفوف نمک سلیمانی (آسان نسخہ) :- سولف، سونٹھ، اجوائن، کالی مرج، فلفل دراز پودینہ خشک، سبھاگہ خام، منک سوچل، منک طعام ہر ایک اڑھائی تولہ، دارچینی سوا تولہ، نوشادر پھلی پانچ تولہ، سب کو کوٹ پس کر سفوف بنا کر چھان لیں۔ خوراک چار رتی سے ایک ماشہ، غذا کے بعد ہمراہ پانی، معدہ کی تمام شکایات کے لئے از حد مفید ہے، طب یونانی کا خوش ذائقہ چورن ہے۔

گھریلو علاج :- ۱۔ ہینگ خالص، منقعی کے دانہ میں لپیٹ کر نیم گرم پانی سے کھانا پیٹ کے درد کو فوراً آرام دیتا ہے۔

۲۔ سونٹھ کو خواہ تنہا استعمال کریں یا کھانے میں ملا کر کھائیں۔ ہضم کے لئے بہت مفید ہے۔

۳۔ منک سیاہ باریک پس کر بقدر ایک ماشہ ہمراہ گرم پانی دیں۔ فوراً آرام ہوگا۔

۴۔ منک خوردنی ایک ماشہ، سوڈا بائی کارب چھ رتی ہمراہ گرم پانی دیں۔ ہنایت مفید ہے۔

۵۔ ست پودینہ بقدر دو چاول کھانڈ میں ملا کر دیں۔ پیٹ درد کے لئے از حد مفید ہے۔

آیور ویدک علاج :- لون بھاسکر چورن، ہنگواشٹک چورن، ہنگوادی چورن، سوادشٹ چورن، گندھک دلی اور راج دلی مفید ادویات ہیں جن کے نسخے درج ذیل ہیں :-

لون بھاسکر چورن :- (شارنگدھر)۔ منک سانجھ آٹھ تولہ، انار دانہ چار تولہ، منک سوچل پانچ تولہ، منک وڑ، منک سیندھا، پپلا سول، زیرہ سیاہ، پپلی، تیز پات، امل بید، ناگ کیسر ہر ایک دو تولہ، مرج سیاہ، سونٹھ، زیرہ سفید ہر ایک ایک تولہ، دارچینی، الاچی خورد، آدھا آدھا تولہ، تمام ادویات کا سفوف بنا کر سات دن تک رس لیموں میں تر و خشک کر کے محفوظ رکھیں۔

خوراک :- ایک ماشہ تا چار ماشہ ہمراہ گرم پانی یا عرق سولف۔

فوائد :- مضم و شہتی، باؤ گولہ، بواسیر، تلی، سنگرہنی، بدھنی، قبض اور پیٹ درد کے ماضی ہے، معدہ اور آنتوں کی ہوا خارج کرتا ہے۔ یہ خوراک کو جلد ہضم کرتا ہے اور پیٹ کی تمام بیماریوں کے لئے مفید ہے۔

ہنگواشٹک چورن (اشٹانگ ہر دے) :- سونٹھ، مرج سیاہ، گھماں، اجوائن دیسی، زیرہ سفید، منک سیندھا، زیرہ سیاہ۔

ہینگ بریاں، سب برابر وزن کوٹ کر چھان کر سفوف بنادیں، خوراک دو سے تین ماشہ ہمراہ گرم پانی یا عرق سولف دیں۔

فوائد:- یہ چورن بدہضمی، ضعف معدہ، ہیضہ، اسہال، اچھارہ، ریح کا درد، باؤ گولہ اور سنگرہنی کو دور کرتا ہے، قوت ہاضمہ کو بڑھاتا ہے، بھوک پیدا کرتا ہے۔ حرارت معدہ کو تیز کرتا ہے، غذا کو جلد ہضم کر کے جزو خون بناتا ہے، جب کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، تب یہ چورن بہت فائدہ کرتا ہے۔
ہنگوا دی چورن (شارنگدھر):- ہینگ بریاں، پاٹھا، ہرڑ، دھنیا، اناردانہ، کچور، چترک کی جڑ کی چھال، اجود، سونٹھ، مرج سیاہ، گھٹا، جنگلی اجوائن، لاؤ بیر، امل بیر، زیرہ سیاہ، تازہ املی کا گودا، پوکھرمول، پنچ (دوچ)، چوہ، جو کھار، سحی کھار، منک سیندھا، منک سیاہ، وڑنگ، سانہر منک، سمندری منک، سب برابر وزن لے کر سفوف بنائیں، خوراک تین ماشہ ہمراہ گرم پانی دیں۔

فوائد:- غذا ہضم نہ ہوتی ہو، ڈکار آتے ہوں یا اچھارے کی شکایت ہو، تب یہ چورن استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دستوں کو روکتا ہے۔ اور باؤ گولہ کو دور کرتا ہے۔ پیٹ سے ہوا خارج کرتا ہے، نیز ہر قسم کا درد شکم، قبض، بدہضمی، یرقان، ہچکی، جگر کی سستی، کمزوری، جگر کا بڑھنا وغیرہ کے لئے زود اثر ہے۔

سوادشٹ چورن:- سونٹھ، گھٹا، دارچینی دو دو تولہ، دھنیاں، عقرقرہ، جڑ چتر، مرج سیاہ چار چار تولہ، زیرہ سیاہ، منک سیاہ، منک سیندھا آٹھ آٹھ تولہ، زیرہ سفید بریاں بارہ تولہ، اناردانہ بارہ چھٹانک، سب کو علیحدہ علیحدہ کوٹ کر ملا لیں، خوراک ایک تا دو ماشہ حسب ضرورت۔

نوٹ:- اناردانہ کے علاوہ باقی ادویات کا سفوف بنا کر اناردانہ کو پانی میں بھگو کر اس کے لعاب میں سفوف تر کر کے گولیاں بنائیں۔
فوائد:- نہایت خوش ذائقہ چورن ہے، لعاب دہن میں اضافہ کرتا اور خوب بھوک لگاتا ہے، بدہضمی، خوراک سے نفرت، کمزوری، ہاضمہ سستی، اچھارہ، پریٹ درد وغیرہ میں از حد مفید ہے۔

گندھک ولی (رس راج سندھور):- گندھک شدھ دو تولہ، جڑ چتر، گھٹا، مرج سیاہ ایک ایک تولہ، سونٹھ دو تولہ، جو کھار، منک سیندھا، منک سیاہ، منک سانہر چھ چھ ماشہ، سب کو کوٹ چھان کر لیموں کے رس میں دو دو رتی کی گولیاں بنائیں، خوراک ایک سے دو گولی کھاتا کھانے کے دو گھنٹہ بعد دیں۔

فوائد:- حرارت ہاضمہ کو تیز کرتی ہے، پریٹ کے کپڑے، اچھارہ، بدہضمی کے لئے مفید ہے، قوت معدہ کو بڑھاتی ہے۔
راج ولی:- گندھک آنولہ سار شدھ، منک سیندھا ایک ایک تولہ، سونٹھ چار تولہ، کھل میں ڈال کر رس لیموں کے ساتھ سات بار درد خشک کر کے دو دو رتی کی گولیاں بنالیں، خوراک ایک سے دو رتی ہمراہ عرق سولف، بدہضمی اور پیٹ درد کے لئے از حد مفید ہے۔
ہومیو پیتھک علاج:- میگنیشیا فاس $4 \times (\text{Mog-Phas}) \times 4$ (بمقدار ۵ گرین) گرم پانی کے ساتھ کھلانے سے تشنگی درد معدہ فوراً دور ہو جاتا ہے، شاذ و نادر ہی دوسری خوراک کی ضرورت پڑتی ہے۔

علاوہ ازیں کالوسنتھ، برائی اونیا، لائیو پوڈیم، کاربو دیج وغیرہ نفخ شکم اور درد معدہ کے لئے مفید ہیں۔
غذا پر سہیز:- درد کو آرام آ جانے کے بعد ایک وقت ہی غذا کھائیں اور ہلکی غذائیں بکری یا مرغ کا شوربہ، دال مونگ، مونگ کی کھچڑی، پودینہ کی چٹنی، زیرہ، امل، لیموں کا اجار وغیرہ دیں۔

قدرتی علاج میں فائدہ کرائیں۔
دیر ہضم اغذیہ آلو، گو بھی، دال ماش، مٹھائیوں اور شراب متبا کو وغیرہ سے پر سہیز کرائیں۔

اجیرن، بدضمی، سوتے، مضم، ڈس پیسیا، (Dys Pepsia)

تعریف مرض :- اس مرض میں معدے کے فعل ہضم میں فرق واقع ہو جاتا ہے، لیکن اس کی بناوٹ میں کسی قسم کی خرابی رونما نہیں ہوتی۔
وجوہات :- کھانے پینے میں لاپرواہی، غذا کو اچھی طرح نہ چبانا، ایک ہی قسم کی غذا عرصہ تک کھاتے رہنا، مصالحہ دار غذاؤں کا زیادہ استعمال، وراک کے ساتھ زیادہ پانی پینا، جگر، بلبہ اور آنتوں کی رطوبات کا ناقص یا کم و بیش ہو جانا، گیسٹرک جوس اور پیپ سین پیدا ہونا، رطوبت صفراء وغیرہ کے اوصاف میں خرابی آجانا، رنج و غم، کثرت مصالحہ، خون کی خرابی، آلات ہضم کی قوت کی کمزوری وغیرہ سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

مرض کی قسمیں :- اس مرض کی دو قسمیں ہیں، ایک شدید یعنی اکیوٹ (Acute) دوسرے مزمن یعنی کرائک مزمن کی پھر تین قسمیں ہیں :-
A- الوبک ڈس پیپسیا :- وہ بدضمی جو کمزوری معدہ وغیرہ کی وجہ سے ہو۔

B- اریٹے ڈس پیپسیا :- وہ بدضمی جو خراش یا پُرانی سوزش معدہ سے ہو۔

C- نروس ڈس پیپسیا :- وہ بدضمی جو عصبی خرابی کی وجہ سے ہو۔

علامات مرض :- معدہ کے ہضم میں فرق آجاتا ہے، درد، گرانی، بے چینی، ترش ڈکاریں، کبھی دست، کبھی قبض، بدبو دار دُکار، ہانپہ پاؤں کی تھیلیاں جلنا وغیرہ اس کی علامات ہیں۔ اگر مرض شدید ہو تو عام کمزوری، سستی، لاغری، دم کشی، ہانپہ پاؤں میں کھجلی، درد مزہزش یا کھارے دُکار آنا، صاب میں تلچٹ بھینٹنا، پُرانی بدضمی میں معدہ کے مقام پر دھیمادھیمادرد ہوتا ہے، کھانا کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے۔ ترش ڈکاریں آتی ہیں، اور میں کمزور ہو جاتا ہے۔

علاج ڈاکٹری :- اصل سبب مرض کو معلوم کر کے اس کے مطابق علاج کریں۔

مندرجہ ذیل تجربات اس مرض میں خاص طور پر مفید ہیں :-

۱- کارمیٹو مکسچر :-

سوڈا بائی کارب

۲۰ گرین

پیرٹ ایونیا ایرو میٹک

۲۰ منم

ٹنگر کارڈکو

۲۰ منم

ٹنگر زنجی بر

۱۵ منم

اکوا منتھا پیپ

ایک اونس

لدھیانہ کے میڈیکل کالج میں مروج فارماکوپیا کا نسخہ ہے جو

فی کے لئے مفید ہے، ہر چار گھنٹہ بعد ایسی ایک خوراک دیں۔

۲- مکسچر بدضمی :-

ست پودینہ (منقول)

۱/۲ گرین

پیرٹ ایونیا ایرو میٹک

۲۰ منم

پیرٹ کلوروفارم

۲۰ منم

خوراک ایک چھوٹا چھچھ آدھا اونس تازہ پانی ملا کر دیں، لندن فارماکوپیا کا مجرب نسخہ ہے۔ جب پیٹ میں ہوا ہو تو یہ مؤثر ہے۔

۳- الکلائن کارمیٹو مکسچر (برائے بدضمی)

سوڈا بائی کارب

۱۰ گرین

ایرو میٹک پیرٹ ایونیا

۱۵ منم

ٹنگر کارڈکو

۲۰ منم

کلوروفارم واٹر

ایک اونس

پنجاب کے ہسپتالوں میں مروج فارماکوپیا کا مجرب نسخہ ہے۔ جو

بدضمی کے لئے از حد مفید ہے۔

۴- مکسچر برائے بدضمی

بسمتہ کارب

۱۰ گرین

میگنیشیا کارب

۱۰ گرین

سوڈیم برومائیڈ ۱۰ گرین
ٹنکچر کارڈیم کمپونڈ ۲۰ منم
کلوروفارم وارٹر ۱/۲ اونس

مکسچر بنائیں، ایسی ایک ایک خوراک قدر سے پانی ملا کر دن میں تین بار بعد از غذا دیں۔ بدھیمی کے لئے مفید ہے۔

صرف سوڈا بائی کارب ۲۰ گرین میں ۱/۲ گرین ست پودینہ ملا کر بعد از غذا سمراہ پانی لینا بدھیمی و اچھا رہ کے لئے مفید ہے۔

پینٹ ادویات میں سوڈا منٹ (Sodamint)، سوڈا بائی کارب اور روغن پودینہ سے بنائی ہوئی ٹمکیاں معدہ کی ترششی اور پیٹ سے ہوا خارج کرنے کے لئے موثر ہیں۔

سوڈا بائی کارب ۱۰ گرین
ٹنکچر کارڈیم ۲۰ منم
کلوروفارم وارٹر ۱/۲ اونس

ایسی ایک خوراک دن بھر میں دو بار ہم وزن پانی ملا کر کھانا کھانے کے بعد دیں۔ ولایت کے ہسپتالوں میں مروج لندن فارما کوپیا کا مشہور و معروف نسخہ ہے۔ جب تیزاب کی زیادتی ہو تو مفید ہے۔

۵۔ ہاضمو مکسچر

لبنتہ کاربونیٹ ۱۰ گرین
سوڈا بائی کارب ۱۰ گرین
میگنٹیا کارب ۱۰ گرین

ماڈرن ادویات :- ۱۔ یونی انزائم (Uni Enzyme) یونیکم ————— ایک دو مکھ کھانا کھانے کے بعد تازہ پانی سے دیں۔

۲۔ ٹیکا کمبیکس (Taka-Combex) پارک ڈیوس ————— ایک کیپ شول صبح و ایک شام تازہ پانی سے کھانا کھانے کے بعد لیں، یا

ٹیکا کمبیکس الیکٹر (Taka-Combex Elixir) پارک ڈیوس ————— ایک دو چمچ مناسب پانی ملا کر دن میں تین بار لیں۔

۳۔ ٹیکا ڈائیس اینڈ پیپسین کمپونڈ ٹیبٹ (Taka Distasa & Pepsin compound tablets) پارک ڈیوس ————— ایک

تین مکھ کھانا کھانے کے فوراً بعد تازہ پانی سے لیں یا ٹیکا ڈائیس لکوڈ (Taka distase laqid) پارک ڈیوس ————— ایک چمچ کھانا کھانے کے بعد خوراک لیں۔

۴۔ کمبی زائم (Combiyzm) نیوفارما ————— ایک دو مکھ کھانا کھانے کے فوراً بعد تازہ پانی سے دیں۔

۵۔ ڈس پیٹال (Dyspeptal) بوہرنگر ————— ایک دو مکھ کھانا کھانے کے فوراً بعد تازہ پانی سے دیں۔

۶۔ ڈیجی پلکس سیرپ (Digeplex syrup) ڈی، سی، ایف ————— ایک بڑا چمچ کھانا کھانے کے بعد تازہ پانی ملا کر استعمال کریں۔

۷۔ سوڈا منٹ (Sodamint) یہ سوڈا بائی کارب اور روغن پودینہ سے بنائی ہوئی ٹمکیاں ہیں۔ ایک سے تین گولی تازہ پانی سے دیں۔

۸۔ ایلوی زائم (Alvizyme) الملیک ————— ایک دو گولی دن میں دو بار کھانا کھانے کے بعد تازہ پانی سے دیں۔

۹۔ بھوک نہ لگنے کے لئے الیگز بی کپلیکس کسی کمپنی کا جیسے لیڈر پلکس (لیڈرے)، روبر پلکس (ساربا)، بی پلکس (اینگلو فرینچ) وغیرہ ایک بڑا

چمچ دن میں تین بار دیں ————— یا بیکوزیم (Becozym) روش ————— کی دو مکھیاں دن میں دو سے تین بار تازہ پانی سے دیں۔

فاسفوٹون (Phosphoton) پلا ————— ایک دو چمچ کھانا کھانے کے بعد دیں، یا بی، جی، فاس (B. G. Phos) ایم، ای

ڈی ————— ایک بڑا چمچ کھانا کھانے کے بعد دن میں دو یا تین بار دیں ————— یا ڈس پیٹال (بوہرنگر) ایک مکھ، بیرن

(گلیکسو) ۵ ملی گرام، دونوں کو یکے بعد دیگرے پانی کے ہمراہ دن میں دو بار کھانا کھانے کے بعد تازہ پانی سے دیں۔ یہ بھوک نہ لگنے اور مرض کے بعد

کی کمزوری، خاص طور پر غذائی کمزوری کے لئے از حد مفید ہے یا ایم، بی، لیکس (Embelix) سے بیکر ————— دو دو چمچ دن میں تین بار دیں

۱۰۔ وٹازیم (Vitazyme) یا ڈی، جی، پلکس یا بٹوزائم دو چمچ برابر پانی ملا کر کھانا کھانے کے بعد دیں۔

یونانی علاج :- غذا زود ہضم اور لطیف کھلائیں۔ غذا خوب چبا کر کھائیں۔ پانی کم پیئیں۔ مرغن اور تقبیل غذا استعمال نہ کریں۔ شراب وغیرہ نہ

پرہیز کیا جائے، یونانی طریقہ علاج میں بدہضمی کے لئے "منک سلیمانی" مجرب علاج ہے، جس کا نسخہ پریٹ درد کے بیان میں درج کیا جا چکا ہے۔
سفوف ہاضمہ :- سوڈا ابائیکارب پانچ تولہ، ریوند خطائی اڑھائی تولہ، سونٹھ اڑھائی تولہ، فلفل دراز اڑھائی تولہ، منک سیاہ اڑھائی تولہ، نوشادر پھلی اڑھائی تولہ، پودینہ خشک اڑھائی تولہ، اچور اڑھائی تولہ، سب کو سفوف بنالیں، خوراک ایک سے دو ماش تک ہمراہ تازہ پانی دیں۔
ہاضمو مکسچر :- ہینگ خالص ایک تولہ، نوشادر پھلی ایک تولہ، منک خوردنی ایک تولہ، صاف گرم پانی (اُبلتا ہوا) چھ اونس، پہلے بوتل میں ہینگ نشاد اور منک پیس کر ڈال دیں، اوپر سے پانی ڈالیں، خوراک ایک ایک چمچ دن میں تین بار، بدہضمی، اچھارہ، دردِ معدہ اور ہسٹریا کیلئے مفید ہے۔
 علاوہ ازیں طب یونانی میں بدہضمی کے لئے امرت دھارا، جوارش کمونی، حب پیپتہ، سفوف منک سلیمانی، سفوف ہاضمہ وغیرہ بکثرت استعمال جاتی ہیں۔

آیور ویدک علاج :- مندرجہ ذیل مجربات بدہضمی وغیرہ کے لئے خاص طور پر مفید ہیں۔ حسب موقع ان میں سے کسی ایک استعمال کریں۔
اگنی کمارس (رسیندر سار) :- شدھ پارہ، شدھ گندھک، شدھ سہاگہ بریاں ہر ایک ایک تولہ، شدھ میٹھا تیلیہ تین تولہ، کشتہ سنگھ، کشتہ کوڑی (خرمہرہ) دو دو تولہ، مرج سیاہ آٹھ تولہ، جملہ ادویات کو کوٹ چھان کر لمبوں کے رس میں کھل کر کے ایک ایک رتی کی گولیاں لیں اور ایک ایک گولی صبح و شام ہمراہ عرق سولف یا گرم پانی دیں۔

فوائد :- ہاضمہ بڑھاتا ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے، کھانے کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، سنگرمہنی اور اسہال رفع کرتا ہے، بدہضمی کے لئے نہایت مفید ہے۔ کیونکہ آلات ہضم کو طاقت دے کر خوراک کو ہضم کر کے جزو بدن بناتا ہے۔ معدہ کی چاروں قوتوں (جاذبہ، ماسک، دفعہ، دفعہ) کے لئے شکتی داتیک ہے۔

نوٹ :- ہر سات دن کے بعد دو تین دوا بند رکھیں۔

اگنی تندری رس (بھیشج رتناولی) :- پارہ شدھ، گندھک شدھ، میٹھا تیلیہ شدھ، تر پھلہ، اجوائن دسبی، سبھی کھار، جو کھار، جڑ پاچوں منک، زیرہ سیاہ، ترکٹا، کچھ شدھ سب برابر کوٹ پیس کر رس لمبوں میں کھل کر لیں اور گولیاں کالی مرچ کے برابر بنالیں، خوراک گولی صبح و شام ہمراہ عرق سولف یا گرم پانی، حرارت ہاضمہ کو تیز کر کے بھوک لگاتا ہے، پیٹ سے ہوا خارج کرتا ہے، غذا کی خواہش پیدا ہوتی ہے، امراض معدہ اور قوت کے لئے مفید ہے۔

نوٹ :- استعمال کے دوران ہر سات دن کے بعد دو دن دوا بند رکھنی ضروری ہے۔

اجیرن کنٹک رس :- گھماں، میٹھا تیلیہ شدھ، سہاگہ بریاں، شدھ شنگرف ہر ایک ایک تولہ، مرج سیاہ دو تولہ۔
ترکیب تیاری :- میٹھا تیلیہ کو رس لمبوں میں چار گھنٹے تک کھل کر کے بعد ازاں باقی ادویات شامل کر کے رس لمبوں میں مزید دو دن تک کھل اور ایک ایک رتی کی گولیاں بنالیں، خوراک ایک گولی دن میں دو بار بعد از غذا ہمراہ عرق سولف یا گرم پانی دیں۔

فوائد :- بدہضمی، کمزوری معدہ، بھوک کی کمی، پیٹ درد، قے، اچھارہ، درست ہیمینہ، بھیش اور معدہ اور انٹریوں کے امراض کے لئے نسخہ ہے۔ خاص طور پر بدہضمی کے لئے بہت مفید ہے۔ ہر ہفتہ استعمال کے بعد دو دن کا ناغہ ضروری ہے۔

لون بھاسکر چورن :- منک سانجھر آٹھ تولہ، انار دانہ چار تولہ، منک سوخل پانچ تولہ، منک وڑ، منک سیندھا، پپلا مول، زیرہ سیاہ، تیز پات، اہل بید، ناگ کیسز ہر ایک دو تولہ، مرج کالی، سونٹھ، زیرہ سفید ہر ایک ایک تولہ، دارہینی، الاچی خورد ہر ایک آدھا تولہ۔
 تمام ادویات کا سفوف بنا کر سات روز تک رس لمبوں میں ترو خشک کر کے محفوظ رکھیں۔ خوراک ایک سے تین ماش تک ہمراہ گرم پانی یا سولف استعمال کریں۔

فوائد :- ہاضمہ دہشتہی ہے، ہسٹیریا، بواسیر، تلی، سنگرہنی، بدہضمی، قبض اور درد پیٹ کے لئے طب آیور وید کا مشہور و معروف نسخہ ہے۔ جو پیٹ کی ہر ایک بیماری کا نہایت مفید علاج ہے۔

سمندر آدمی چورن :- سمندر نمک، سوپل نمک، سیندھ نمک، اجوائن دیسی، جوکھار، اجود، لکھاں، چھال جڑ چترا، سونٹھ، ہینگ بریاں، نمک وڑ، سب ہموزن لے کر چورن بنالیں، خوراک ایک سے دو ماشہ ہمراہ گرم پانی دیں۔

فوائد :- ریح کی زیادتی سے پیٹ درد، اچھارہ ہو تو مفید ہے۔ علاوہ ازیں بواسیر اور سنگرہنی کے لئے بھی مفید ہے، علاوہ ازیں راج وٹی ایک سے دو گولی ہمراہ عرق سولف یا گندھک وٹی میں سے کسی ایک کا استعمال، بدہضمی اور پیٹ کے امراض کے لئے مفید ہے۔ صرف اجوائن دیسی چار تولہ، نمک ایک تولہ، نہایت باریک پس کر بقدر تین ماشہ روزانہ کھلائے منداگنی دور ہوتی ہے۔

سولف پانچ تولہ آدھ سیر پانی میں ملا کر ایک پاؤ چینی ڈال کر بطور شربت چاشنی تیار کریں۔ یہ شربت بچوں کا ہاضمہ تیز کرنے کے لئے ایک ماشہ سے تین ماشہ دن میں چند بار استعمال کرائیں، بچوں کی منداگنی کے لئے از حد مفید ہے۔

ہومیوپیتھک علاج :- برائی اونیا (Bryonia) اور لائیکوپوڈیم (Lycopodium) بہترین ادویات ہیں۔ اور حسب موقع استعمال کی جاسکتی ہیں۔

بالوکیک علاج :- فیرم فاس (کھٹی ڈکاریں آنے) کالی فاس (کھانے کے بعد پیٹ درد ہونے)، کالی سلف (پیٹ بھاری ہونے) کے لئے مفید ادویات ہیں۔

پھلوں سے علاج :- ۱۔ نمک سیندھ بارہ گرام، ادراک کارس ۶ ملی لیٹر، رس لیموں ۶ ملی لیٹر، تینوں کو شیشی میں حل کریں اور تین چار دن تک دھوپ میں رکھیں۔ ایک چائے کا چمچ آدھی پیالی پانی میں ملا کر دن میں دو بار بعد از غذا دیں۔

۲۔ اجوائن، کالا نمک ہموزن، رس لیموں کے ساتھ چنے کے برابر گولیاں بنائیں، دو گولی دن میں دو بار بعد از غذا دیں۔

۳۔ پپلی رس لیموں میں پس لیں۔ دورتی پان میں رکھ کر دن میں دو بار دیں۔

قدرتی علاج :- بدہضمی کے لئے صبح و شام کی سیر، کم خوراک یا فاقہ کرنا بہترین علاج ہے، اگر زلہ نہ ہو تو سنگترے یا مالٹے کا رس مفید ہے۔ کھانا کھانے سے پیشتر بقدر چھ ماشہ ادراک نمک لگا کر ہر روز کھانے سے عجبی ہوئی حرارت ہاضمہ دوبارہ مشتعل ہو جاتی ہے۔ غذا و پرہیز بطور پیٹ درد کے کرائیں۔

ہچکی، فواق، ہکف، (Hiccough)

تعریف مرض :- ہچکی ایک تشنجی مرض ہے جو معدہ یا آنتوں یا معدہ کی خراش سے ہوتی ہے، پھیپھڑے جس طرح اس موذی مرض کو رفع کرنے کے لئے حرکت کرتے ہیں اور اسی حرکت کا نام کھانسی ہے۔ اسی طرح فم معدہ کی حرکت کا نام ہچکی۔ اس مرض میں کبھی فم معدہ اور کبھی تمام معدہ کی حرکت کو ہوتی ہے۔ اس لئے اسے طب میں فواق کہتے ہیں۔

وجوہات :- تیز گرم چیز کھانا یا صغرا کا معدہ پر گرنا، بدہضمی، کلیجہ جلنا، جگر کے فعل کی مستی، دیرینہ وچکنی غذاؤں کا کھانا، معدہ میں ریاخ کثرت، ہسٹیریا اور اعصاب کے بعض دوسرے امراض، درم معدہ وغیرہ سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- ہچکی ایک عام اور ظاہری مرض ہے، کبھی کبھی ہچکی اس قدر شدید ہوتی ہے کہ ایک منٹ میں پچاس یا ساٹھ بار تک نوبت پہنچ جاتی۔

ایلوپیتھک علاج :- ایمائل نائٹریٹ توڑ کر نگھانے سے فوراً ہچکی بند ہو جاتی ہے، یارائی کو پانی میں حل کر کے نم معدہ کے اوپر صناد کریں، (زیادہ دیر نہ رکھیں کیونکہ سوزش ہو جاتی ہے) بعض دفعہ ایک آدھ منٹ سانس روک لینے یا ایک گلاس سرد پانی تیزی سے ایک ہی گھونٹ کر کے پنی لینے سے ہچکی رُک جاتی ہے، ہمارے تجربہ میں چائے کا ایک کپ ہچکی روکنے کے لئے نہایت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔ شدید ہچکی میں کلوروڈین یا کیمفر وڈین دس سے پندرہ منم ایک ادس پانی میں ملا کر دیں آرام آجائے گا۔ اگر نظام اعصاب کی کمزوری سے یہ عارضہ ہو تو بیرن گولیاں اور انجکشن کا استعمال مفید ہے۔ شدید ہچکی میں معدہ کو ٹامک ٹیوب سے دھونے کا عمل بھی کرتے ہیں۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ ایمائل نائٹریٹ امپول توڑ کر نگھائیں، ہچکی فوراً بند ہو جائے گی۔

۲۔ سپارین (Sparine) جان واسٹھ ————— متلی قے اور ہچکی روکنے کے لئے مفید ہے۔ خون کا دباؤ کم کرتی ہے، عام حالات میں ایک سی سی کا انجکشن یا ایک ٹیکہ کھلانے سے آرام آجاتا ہے۔ یہ پرومیزین ہائیڈروکلورائیڈ سے بنی ہے اس لئے قوما کی حالت میں ہرگز نہ دیں۔

۳۔ نیو اکتی نم (Neo-Octinum) بوہرنگر ————— ہیٹ درد و ہچکی کے لئے مفید ہے۔ ٹیکہ، انجکشن و سیال کی صورت میں دستیاب ہے، بلحاظ عمر و مزاج استعمال کریں۔

۴۔ اکوئل (Equanil) واسٹھ ————— ایک گولی دن میں دو بار یا سوتے وقت تازہ پانی سے دیں۔ اس سے نیند آ جاتی ہے، اور ہچکی رُک جاتی ہے۔

۵۔ لارجیکٹل (Largactil) سے اینڈیکر ————— قے اور ہچکی میں بہت فائدہ مند ہے اور انٹی ہٹامین اثر رکھتی ہے بڑوں کو دس ملی گرام کی ٹیکہ ہمراہ تازہ پانی دیں۔

۶۔ سیک ول (Siquil) سکوب ————— سفری قے اور مسلک قے کے لئے مفید ہونے کے علاوہ ہچکی کے لئے بھی مفید ہے، دس ملی گرام کی ٹیکہ ہمراہ تازہ پانی دیں۔

۷۔ گارڈینل (Gardinal) ۳۰ ملی گرام کی ایک ٹیکہ تین گھنٹے بعد دیں۔

۸۔ سٹیمٹیل (Stemetil) ۵ ملی گرام کی ایک ٹیکہ دن میں ایک یا دو بار دیں۔

۹۔ پرومیزین ہائیڈروکلورائیڈ (سپارین، ایس کے ایف) کا ایک سی سی کا انجکشن کسی مرض یا دوا سے اٹھنے والی ہچکی کو کنٹرول کرتا ہے یہ دوا دس منٹ میں ہی اثر کرتی ہے اور متلی و قے کو بند کرتی ہے۔ شدید ہیجان اور جنون کے لئے بھی مفید ہے۔ اسے قوما کی حالت میں ہرگز نہیں دینا چاہیے۔

یونانی علاج :- امرت دھارا (ست پودینہ، کافور، اجوائن، سموزن گھول بنالیں) ایک سے دو بوند بتاشہ میں ڈال کر استعمال کرنا ہچکی کو فوراً بند کر دیتا ہے یا ست پودینہ آدھی رتی سے ایک رتی گلفند دو تولہ میں ملا کر کھانے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔

دوائے ہچکی :- ریش ناریل (جس سے رسے اور تانگوں کے گدے بنائے جاتے ہیں) جلا کر رکھ بنالیں، بس دوا تیار ہے، بقدر آدھے سے ایک ماشہ ہمراہ پانی دیں، فوراً آرام آجائے گا۔ یہ ہچکی کے لئے چوٹی کے نسخہ جات سے بازی لے گیا ہے اور تجربہ میں کامیاب ثابت ہوا ہے۔ بیوں کاٹ کر رس چٹادیں، ہچکی بند ہو جائے گی یا پودینہ کی پتیاں ۳ ماشہ کھلانا مفید ہے۔

آیور ویدک علاج :- سونھ پانچ ماشہ، کالی مرچ پانچ دانہ، پانی میں جوش دے کر صاف کر کے دن میں دو بار پلائیں، ہچکی کے لئے ہمارا آزمودہ نسخہ ہے۔ علاوہ ازیں صرف سفوف پپی ایک ماشہ شہد میں چٹلنے سے بھی ہچکی رُک جاتی ہے۔

دیگر :- لونگ کے اوپر کے ڈوڈے سے کر باریک پیس لیں، ایک سے دو ماشہ ضرورت کے مطابق شہد میں ملا کر چٹائے قے اور ہچکی فوراً

بند ہو جاتی ہے۔

دیگر :- مٹھی چھلی ہوئی سفوف تین ماشہ ٹھنڈے پانی سے دیں۔ پہلی بار کے استعمال سے سچکی بند ہوگی۔

دیگر :- ہلدی ایک ماشہ، شہد چھ ماشہ۔ ہلدی کا سفوف بنا کر شہد میں ملا لیں اور استعمال کریں۔

دیگر :- بڑی الائچی کے چھلکے چھ ماشہ لے کر اڑھائی تولہ پانی میں جوش دے کر چھان کر تین خوراک بنائیں اور دن میں تین بار دیں۔

دیگر :- جوارش کمونی چھ گرام دن میں دو بار بعد از غذا دیں۔

ہومیوپیتھک علاج :- میگنیشیاس (مقدار ۵ گرین) گرم پانی کے ہمراہ دیں۔ اکثر پہلی خوراک سے آرام آ جاتا ہے نہایت مفید ہے۔

غذا و پرہیز :- مریض کو کسی قسم کی غذا نہ دیں، تخفیف ہو جانے پر دودھ و سوڈا، برف سے سرد کر کے کھوڑا پلائیں۔ جب مرض کا

طور پر دور ہو جائے تو دھیرے دھیرے لطیف اور زود ہضم غذا دیں، چرب، ثقیل اور نفخا خیز غذا سے پرہیز کریں۔

اُت کلش، قے، متلی، وامے ٹنگ ریچنگ (Vomiting-Retching)

تعریف مرض :- اس مرض میں غیر ہضم شدہ غذا قے کے ذریعہ خارج ہو جاتی ہے۔

وجوہات :- معدہ کی حرکت سے اس کی اندر کی اشیاء کا منہ کے ذریعے اخراج کو قے کہتے ہیں، معدہ کی حرکت قوی نہیں ہوتی اور اس کے اندر

اشیاء خارج نہیں ہو سکتیں اور قے سے پہلے ہی مالتش کرتا ہے۔ اسے متلی کہتے ہیں، یہ عارضہ غذا کی خرابی، کمزوری معدہ، زہریلی اشیاء کے کھانے، شراب

متناک، افیون، سنکھیا یا تیزاب دے کے پی لینے سے قے آنے لگ جاتی ہے، بعض دفعہ شدید بخار، غلیظ ہوا میں سانس لینے یا بس ریل یا ہوائی جہاز میں

کرنے سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- ہضم کی خرابی سے ہو تو معدہ میں نفخ اور ریاح کی کثرت ہوگی، صفر کی زیادتی سے ہو تو منہ کا مزہ کڑوا ہوگا اور قے میں زرد رنگ کی رطوبت خارج

گی، غذا میں بے اعتدالی کے سبب یہ شکایت ہو تو پہلے ہی متلاتا ہے، پھر قے آتی ہیں، اگر یہ عارضہ معدہ کی سوزش کے سبب ہو تو ایسی حالت میں غذا کھانے کے بعد درد

ہوتا ہے اور بار بار قے ہوتی ہے۔

ڈاکٹری علاج :- قے آنا بذات خود کوئی مرض نہیں، جب بار بار قے آئے تو موسم کے مطابق برف کے ٹکڑے چوسائیں، ٹینکچر آئیوڈین (سپرٹ ریٹی فائبر

ایک بوند ایک ڈرام پانی میں ملا کر پلائیں یا کلور وڈین یا کیمفر وڈین دس بوند، سوڈا بائی کارب ۲ گرین، پانی ایک اونس ملا کر پلائیں اور تین تین گھنٹہ کے بعد ایسی

ایک خوراک دیں، صرن کلور وڈین دس بوند عرق سولف ایک اونس میں ملا کر پلائیں۔ امرت دھارا (ست پودینہ، ست اجوائن، کافورم وزن گھول بنا کر) کا استعمال بھی

ہے۔ اگر سلفا گروپ کے استعمال سے قے ہو رہی ہو تو اسے بند کر دیں۔ کمزوری کی حالت میں گلوکوز سلائن بذریعہ دریدی انجکشن دیں۔ اگر کوئی دوا اندر نہ ٹھہرے تو پسو

رائی (مسٹرڈ) ایک چھوٹا چمچ لے کر کھوڑا سا پانی ملا کر اور چار پانچ پنچ مربع کاغذ پر لگا کر لپ کی طرح پھیلا کر منہ پر لگائیں۔ دس بارہ منٹ سے زیادہ نہ لگائیں،

بچائے فائدہ کے نقصان ہوگا۔

اگر جہاز میں بیٹھنے سے قے آئے تو کلوری ٹون (Chloretone) پارک ڈیوس ————— پانچ گرین کیرپ ٹولزمین ڈیل کر سفر سے آدھ گھنٹہ پہلے د

برانڈی اور سوڈا وار بھی گھونٹ گھونٹ پلا تا مفید ہے۔

ماڈرن ادویات :- اصل سبب کو دور کریں، کیونکہ یہ بذات خود کوئی مرض نہیں بلکہ اس کا اکثر سبب معدہ سے باہر ہوتا ہے۔

۱۔ ایوومین (Avomine) اے اینڈ بیکر ————— ایک ٹکیہ ہمراہ تازہ پانی ہر تین یا چار گھنٹہ بعد دیں، زہیند اور دواؤں کے ساتھ اسے قے

نہ دیا جائے اور زیادہ کمزور مریضوں کو احتیاط سے دیں۔

۲۔ سک ول (Squil) سارا بھائی ————— ایک ٹکیہ تازہ پانی سے دیں۔ یہ مشہور نئی دوائے اور حمل کے دنوں کی ہلکے سے میں نہ صرف علاج کے طور پر دی جاتی ہے بلکہ اس کو لینے سے ہلکے سے کا ڈر نہیں رہتا۔ جن کو ریل یا بس کے سفر میں قے آتی ہوں، انہیں سفر سے پہلے ایک ٹکیہ کھلا دینے سے قے نہیں آتی۔ اس کے مخالف اثرات بھی کم ہیں اور عام طور پر سب کو برداشت ہو جاتی ہے۔ اگر منہ سے لینے سے دوا نہ ٹھہرے، تو پھر اس کا ایک سی سی کا انجکشن کریں۔

۳۔ لار جیکٹیل (Largactil) سے اینڈ بیکر ————— کی ایک ٹکیہ ضرورت کے مطابق پانی سے دیں۔

۴۔ فزگن (Phenergan) سے اینڈ بیکر ————— کی ایک ٹکیہ ضرورت کے مطابق پانی سے دیں۔

۵۔ سفر کی قے جسے موشن سکس (Motion sickness) کہنا زیادہ درست ہے، کیونکہ اس کے تحت ہی سی سکس، ایر سکس، ٹرین سکس، کار سکس وغیرہ سب آجاتے ہیں، بیلر گال (Bellergal) سینڈوز ————— دو ٹکیاں سفر کو روانگی سے ایک دن پہلے شام کے وقت اور دو ٹکیاں سفر شروع کرنے سے پہلے بطور حفظ مائع کھلائی جائیں۔ قے کی موجودگی میں بیلے فولین (Bellafoline) سینڈوز ————— ایک سے دو گولی دن میں تین بار یا ایک امپول کا زیر جلد انجکشن کیا جائے۔ یہ انجکشن معدہ کی خرابیوں برائیکل ایسٹھا، کالی کھانسی میں مفید ہے، بیلڈونل کے بتوں کے کھار سے تیار کیا جاتا ہے۔

۶۔ ٹریول سکس ٹیلٹس (بولٹس) دو ٹکیاں سفر کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے کھلائیں، بشرط ضرورت تیسری ٹکیہ چار سے چھ گھنٹہ بعد اور چوتھی ٹکیہ اتنے ہی وقفہ بعد کھلائیں۔ بالکل چھوٹے بچوں کو یہ دوا نہ دی جائے۔

۷۔ بینے سین (Benacine) پارک ڈیوس ————— یہ ٹکیاں مینا ڈرل اور ہائیوسین کی آمیزش سے تیار کی گئی ہیں، سفری قے کے لئے مفید ہیں، سفر میں روانگی سے آدھا یا ایک گھنٹہ پہلے ایک ٹکیہ کھلائی جائے۔ اس کے بعد دوران سفر ایک ٹکیہ دن میں تین بار دی جائے۔

۸۔ انکولان (Ancolan) ڈی بی، ایچ ————— یہ میکلو زین ڈالی ہائیڈرو کلورائیڈ کا تجارتی نام ہے۔ یہ ایک مانع حساسیت دوا ہے جو حساسیتی امراض اور سفری بیماریوں میں مستعمل ہے، سفر شروع کرنے سے ایک گھنٹہ قبل ایک ٹکیہ کھلا دینے سے ۲۴ گھنٹوں تک سفری قے سے بچاؤ رہتا ہے۔ اگر سافٹ ۲۴ گھنٹوں سے زیادہ عرصہ تک جاری رہے تو ہر روز صبح کے وقت ایک ٹکیہ کھلائی جائے۔

۹۔ کلورے ٹون (Chloretone) پارک ڈیوس ————— سفری بیماری کو روکنے کے لئے ایک کیپ شولز تازہ پانی سے دیں، یہی دوا مرکب کپنی کلورو بوتنول (Chlorobutanol) کے نام سے بناتی ہے۔

۱۰۔ میری زین (Marezine) باروزولیکم ————— سفر شروع کرنے سے نصف گھنٹہ پہلے ایک ٹکیہ دی جائے۔

۱۱۔ وٹارل (فزیر) ۵۰ ملی گرام، بی کیلیکس بی ۱۲ (گلیکسو) ایک ٹکیہ، سی لین (گلیکسو) ۱۰۰ ملی گرام ایک ٹکیہ، تینوں کو باہم ملا کر ایک پڑیہ بنائیں اور تازہ پانی سے دیں۔ یہ قے دور کرنے کے لئے خاص مرکب ہے۔ یہ دوا کسی قدر غنودگی پیدا کرتی ہے، اس لئے کالی کھانسی کے مریضوں میں قے و تشنچ کنٹرول کرنے میں بہت مفید ہے۔ معدہ و آنتوں کی سوجن کے سبب قے کے لئے بھی بطور دافع قے ثابت ہو چکی ہے۔

۱۲۔ اسپارین (Sparine) جان وائیٹھ ————— دافع ہیجان دے، متلی، ہچکی و دافع درد ہے۔ بہت سے حالات مرض میں امیر جینی دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، خون کے دباؤ کو گھٹانے اور تشویش کو دور کرنے کے لئے بھی تجویز کی جاسکتی ہے۔ یہ دوا ۵۰ ملی گرام کی ٹکیہ میں دستیاب ہوتی ہے معمولی حالت میں کھانے کے لئے ایک ٹکیہ تازہ پانی سے دیں۔ شدت مرض میں ایک سی سی انجکشن لگائیں۔ قوما کی حالت میں اس کا استعمال منع ہے۔

۱۳۔ انتھی سان (Anthisan) زچہ کی قے، سمندری قے، سلفاگروپ وانٹی بائیوکس وغیرہ کی الرجی (حساسیت) چھپاکی کے لئے مفید ہے۔ ایک ٹیکہ صبح، دوپہر، شام تازہ پانی سے دیں۔ یہ مشہور کثیر الفوائد انٹی ہسٹامین دوا ہے۔

۱۴۔ ٹرائی لافون (Trilafon) شیرنگ — ایک ٹیکہ تازہ پانی سے دیں۔ نروس دباؤ، بلڈ پریشر بے خوابی قے و متلی میں مفید ہے، یا گارڈینل (Gardenal) ایک ٹیکہ دن میں ایک سے دو بار دیں۔

یونانی علاج :- اصل سبب مرض کا تدارک کریں۔ صفرا کی زیادتی ہو تو گنگنا پانی کر کے اس میں سکجنین چار تولہ ملا کر پلائیں اور قے کرائیں تاکہ معدہ اچھی طرح صاف ہو جائے، لیموں کاٹ کر اس پر قدرے نمک اور کالی مرچ خوب باریک کر کے چھڑک کر چوسیں۔ متلی دور کرنے کے لئے مجرب ہے۔

دریائی ناریل دورتی ہمراہ عرق سولف دینا یا طباشیر زرد، دھنیاں خشک، سماق، انار دانہ بریاں ہر ایک ایک ماشہ، سب کو باریک میں کر شراب انار شیریں ایک تولہ ملا کر لعوق بنائیں اور چٹائیں۔

دوائے قے :- نارجیل دریائی، زہر مہرہ خطائی، طباشیر اصلی ہر ایک ایک تولہ، سب کو باریک کر چھان کر کے روح گلاب اور روح کیوڑہ ایک تین تولہ میں کھل کر کے خشک ہونے پر محفوظ رکھیں۔ خوراک ایک رتی سے دورتی ہمراہ تازہ پانی۔ صرف ایک دو خوراکوں سے ہر قسم کی متلی اور قے بند ہو جاتی ہے۔ آزمودہ ہے۔ طباشیر زرد کے بیج دیں۔

دیگر :- پیل کی مکڑیاں جلا کر جب ادھ بلی ہو جائیں تو دو یا تین سیر ابلے ہوئے پانی میں فوراً ڈال کر بجھائیں۔ پھر اس پانی کو چھان کر محفوظ رکھیں۔ مریض کو ہلکا کر دیں کہ وہ اس پانی کو پیاس لگنے پر پیوے۔ ضرور فائدہ ہوگا۔ متلی کے مریض کو تسلی کے لئے ساتھ کوئی دوائی دے سکتے ہیں۔

دیگر :- گھیکوار کا گودا دس گرام، نوشادر بھلی ایک گرام، دونوں کو ملا کر چار دن تک رکھ دیں۔ پھر چھان کر محفوظ رکھیں۔ پانچ چھ قطرے دو تولہ پانی میں ملا کر پلائیں۔

دیگر :- سولف ایک ماشہ، بڑی الائچی کے دانے ایک ماشہ، پودینہ ایک ماشہ کو اڑھائی تولہ پانی میں جوش دیں۔ چھان کر پی لیں۔ دن میں دو سے تین بار لیر۔

آپور ویدک علاج :- ۱۔ مصری گوزہ ایک تولہ، نمک سیندھاتین ماشہ، ٹماڑی ایک ماشہ، سب کو باریک کر کے ایک چٹکی سنہ میں ڈالیں اور رس چوسیں۔

حاملہ عورتوں کی قے کے لئے مفید ہے۔

۲۔ کالا نمک، زیرہ سیاہ، مریح سیاہ، مصری برابر وزن میں کر دو چند شہد ملائیں اور مریض کو بطور حلثی دن میں تھوڑا تھوڑا کئی بار چٹائیں۔ تیس بند کرنے کے لئے عمدہ دوا ہے۔

۳۔ کچے ناریل کا پانی پینے سے صفراوی تئیں (پتج چھری) فوراً بند ہو جاتی ہیں۔

۴۔ کرپور آسو (بھیشج رتناولی) :- شراب تند درجہ اول پانچ سیر کا فوراً اصلی ۲۲ تولہ موٹھال، الائچی، سونٹھ، اجوائن، مریح سیاہ ہر ایک چار چار تولہ، کور پیس کر شیشہ کے مرتبان میں ملائیں اور ایک ماہ تک رکھیں۔ خوراک پانچ سے دس بوند ہمراہ عرق سولف یا عرق پودینہ۔

فوائد :- ہبضہ، دست قے، بھیش، بدہضمی اور ڈکاروں میں نفع کرتا ہے۔ ہبضہ میں یہ آسو مریض کو دوبارہ جیون دیتا ہے۔

ہومیو پیتھک علاج :- قے، متلی کے علاج میں ہومیو پیتھک میں اپی کاک کا استعمال مفید بتایا گیا ہے۔ قے کسی وجہ سے آرہی ہو، اپی کاک کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ قے کا حکمی علاج ہے۔

رکت و من، خون کی قے، قے الدم، ہیمنیٹیسس، (Hematemesis)

تعریف مرض :- قے کے مواد میں خون شامل ہوتا ہے یا خون کی قے ہوتی ہے۔

وجوہات :- یہ عارضہ شدید بخار، مری، معدہ، جگر، تلی، پھیپھڑے اور خون کے امراض اور رگوں کے پھٹ جانے سے ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں نحیر، لو اسیر اور بندش ایام بھی خون کی قے کے خاص اسباب ہیں۔

علامات :- قے سے پہلے سینہ میں جلن محسوس ہوتی ہے، اگر خون قے کے ساتھ نکلے تو غذا کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ اور ہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ اگر زیادہ مقدار میں نکلے تو سُرخ ہوتا ہے، نبض سریع اور قصیر ہوتی ہے۔ جلد ٹھنڈی ہوتی ہے۔

معدہ میں کسی رگ کے پھٹ جانے سے یہ عارضہ ہو تو زخم کے مقام پر درد ہوگا اور مری میں کوئی آفت ہو تو دونوں کے درمیان تکلیف ہوگی، جگر اور تلی میں خرابی ہوگی، توان کے مقامات پر تکلیف ہوگی۔ خون ہٹوکنے (ہیماپٹیسیس Hemoptysis) اور خون کی قے (ہیماٹیمیسیس Hematemesis) میں یہ فرق ہے کہ خون ہٹوکنے میں خون کی کلیاں آتی ہیں یا کھنکار کے ساتھ خون آتا ہے اور خون کا رنگ لال ہوتا ہے۔ لیکن خون کی قے میں خون کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے۔ اور اس میں جھاگ نہیں ہوتی۔ اگر معدہ سے خون آئے تو عام طور پر غذا کے ساتھ خون ملا ہوا ہوتا ہے۔

ڈاکٹری علاج :- خون کا اخراج روکا جائے۔ خون کا دباؤ کم کیا جائے اور مریض کی طاقت بحال رکھی جائے۔ مریض کو نور اہستر پر چیت بٹائیں اور حرکت سے روک دیں۔ سر نیچا رکھیں، پائنتی کو اونچا کریں۔ اگر تکلیف زیادہ ہو تو دو دن رات تک کوئی ٹھوس غذا نہ دیں۔ البتہ دودھ، آس جو اور گھونٹ گھونٹ پانی بغیر برف کے دے سکتے ہیں۔ نچوڑ ایم دس قطرے پانی میں ملا کر دیں۔

مارفیا کا ٹیکہ لگانا کامیاب علاج ہے، لیکن یاد رکھیں کہ کئی مریضوں کو مارفین کی برداشت نہیں ہوتی، اس لئے اسے باحیاط استعمال کریں۔ اگر خون زیادہ مقدار میں خارج ہو جائے تو گلوکوز سلوشن کا انجکشن ناٹری میں کریں۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ **سٹیپٹوبیون (Styptobion)** ای مرک — اس کا استعمال ہر قسم کے اندرونی و بیرونی خون بہنے کی حالتوں میں کرتے ہیں۔ ایک دو گولی دن میں تین بار تازہ پانی سے دیں۔

۲۔ **کلاوڈین (Clauden)**، نیوفارما — کا ایک امپول دو یا تین بار عضلاتی یا وریدی انجکشن کریں۔

۳۔ **ہیموپلاستین (Haemoplastin)** دوسری سی کا زیر جلد انجکشن دیں۔

۴۔ **سٹپٹسین (Stypticin)** مرک — اس کا فارما کو پیائی نام کو ٹامین ہائیڈروکلور ہے۔ جریان خون خواہ جسم کے کسی حصے سے ہو، اسے روکتی ہے، خوراک ایک سے دو تک تازہ پانی سے دن میں تین بار دیں۔ یہی دو اسٹپٹسین گان (سی، ڈی، سی)، سٹپٹونال (نال کپینی) کے ناموں سے بھی ملتی ہے۔

۵۔ **کیلیسیم سینڈوز ۵۰۰ (Calciansan doz 500)** سینڈوز — وٹامن سی کے سب فوائد کے ساتھ کیلیسیم کے فوائد بھی اس میں ملتے ہیں۔ اسے خون بہنے سے روکنے اور کیلیسیم کی کمی کو پورا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اسے بصورت وریدی انجکشن دیا جاتا ہے۔

۶۔ **کیلیسماسی (Calcima-c)** سپلا — اس کے فوائد ۵ کی طرح ہیں۔

۷۔ **وٹامن کے (Vitamin-k)** یہ وٹامن جریان خون کو روکتی ہے۔ اسے گلیکوسولپینی کپی لان (Kapilan)، ایبٹ کپینی (Klotogen)، بی، ڈی، ایچ کپینی پروکے وٹ (Prokavit)، بارکپینی کپاکسن (Kapaxan)، روش کپینی سنکاوٹ (Synkavit) کے ناموں سے بناتی ہیں۔ مقدار خوراک ایک سے دو گولی دن میں دو سے تین بار دیں۔

۸۔ **ریڈوکسان (Redoxon)** روش — سی لین (Cilin) گلیکو — کی ۵۰۰ ملی گرام کی مکھیہ روزانہ تازہ پانی سے یا ۵۰۰ ملی گرام کا عضلاتی انجکشن دیا جائے۔

۹۔ **وٹامن کے (سنکاوٹ، روش)** کا ایک سی سی کا عضلاتی انجکشن مفید ہے، ایسے موقع پر اسٹپٹوبیون کا انجکشن بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔

- ۱۔ ریڈوکسان (روش) ۵۰۰ ملی گرام، سنکادٹ (روش) ایک ٹیکہ، دونوں کو پانی کے ہمراہ کھلائیں، خون کا بہاؤ رک جائے گا۔
- ۱۱۔ ڈامین سی یارڈوکسان (روش) ۱۰۰ ملی گرام سے ۵۰۰ ملی گرام تک روزانہ کھلانا ایسے تمام حالات میں مفید ہے، جہاں خون کے سیلان کو درست کرنا ضروری ہو۔

۱۲۔ سٹیپٹوئڈ (Steptocid) سٹیپٹومیسٹین ڈون (Styptindon) انڈونارما — ایک دو ٹیکہ دن میں دو سے تین بار دیں۔
یونانی علاج :- خون بند کرنے والی ادویات خالی معدہ میں اثر کرتی ہیں۔ اگر معدہ میں غذا ہو تو اثر نہیں ہوتا۔ مریض کو آرام سے لیٹر پر لٹائیں مندرجہ ذیل مجربات خونی تھے کے لئے از حد مفید ہیں :-

- ۱۔ کہرباشمعی باریک پیس کر دو سے تین رتی ہمراہ شربت انجبار دیں۔ نہایت مفید ہے۔
- ۲۔ دم الاخوان، کہرباشمعی، سنگ جراحی، گیر و موزن سفوف بنائیں۔ خوراک آدھے سے ایک ماشہ ہمراہ شربت انجبار دیں۔
- ۳۔ دم الاخوان، کنڈر، گل نار فارسی، گل ارمنی، گوند کیکر ہر ایک ایک ماشہ، شربت انجبار ایک تولہ میں ملا کر چٹائیں۔
- ۴۔ کہرباشمعی تین ماشہ، دم الاخوان تین ماشہ، طباشیر اصلی تین ماشہ، حب آلاس تین ماشہ، جڑ انجبار پانچ ماشہ، نشاستہ بریاں ۹ ماشہ، سب سفوف بنا کر رکھیں اور تین سے چار ماشہ سفوف شربت انجبار دو تولہ میں ملا کر عرق گاؤ زبان یا پانی کے ساتھ کھلائیں۔
- ۵۔ زہر مہرہ چار رتی، طباشیر چار رتی، کہرباشمعی دو رتی کو باریک پیس کر مرہبہ آملہ بنارسی ایک عدد میں ملا کر کھلائیں۔
- ۶۔ ہاتھ پیروں کا کس کر باندھنا اور پنڈلیوں پر خالی سنگیاں کھچو انا بھی مفید ہے۔
- ۷۔ کہرباشمعی باریک پیس کر دو رتی سے تین رتی ہمراہ شربت انجبار دیں۔

آپور ویدک علاج :- لمٹھی چھلی ہوئی چھ ماشہ، صندل سُرخ چھ ماشہ، دونوں دودھ میں سردائی کی طرح رگڑ کر دینے سے تڑدوش قہیں (تینوں غلطیوں کے باعث پیدا ہونے والی قہیں) بند ہو جاتی ہیں۔

- ۲۔ گیر و پانچ تولہ آگ میں تپا کر تین بار پانی میں بچائیں۔ یہ پانی ٹھنڈا کر کے مریض کو پلانے سے خونی قہیں فوراً بند ہو جاتی ہیں۔
- ۳۔ گھر گھین کا گھر دیوار سے اتار کر پیس لیں اور آدھ سیر پانی میں چند مرتبہ خوب ہلائیں، بعد ازاں ٹھہرنے دیں اور یہ قطر مریض کو پلائیں، گھر گھین بھڑکی مانند ہوتا ہے، جو عام طور پر گھر کی دیواروں پر باہر سے گیلی مٹی لاکر اپنا گھر بناتا ہے اور اس میں بچے دیتا ہے۔

ہومیو پیتھک علاج :- خونی تھے میں اکونائٹ، آرنک، کروٹیل، فیرم مرٹ، فاسفورس، اپی کاک، اکلپھا، انڈیکا، ہیماسیل، فیرم فاس

وغیرہ بہترین ادویات ہیں۔

غذا پر مہیز :- ۴۸ گھنٹے تک براہِ دہن کوئی غذا نہ دی جائے۔ تاکہ معدہ کو آرام ملے، بعض اطباء شروع سے ہی نرم غذائے دیتے ہیں، مثلاً سنگترے کا رس، دودھ، آتش جو وغیرہ دیرینہم اغذیہ سے سخت پرہیز کیا جائے۔

دھیمان، اچھارہ، نفخ شکم، فلیٹیولینس (Flatulence)

تعریف مرض :- اس مرض میں غذا کی نالی جو معدے سے معتد تک جاتی ہے، ہوا سے بھری رہتی ہے، کبھی اس مرض سے اچھارہ ہوتا ہے، کبھی بدبو

ریاح خارج ہوتی ہے۔

وجوہات :- دیرینہم چیزوں کا کھانا، غم و غصہ، رنج و فکر، کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانا، پانی کا زیادہ استعمال، چلنے پھرنے سے پرہیز،

مزاج کے لوگ اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔

علامات :- کھانا کھانے کے بعد پیٹ ابھر جاتا ہے۔ کبھی ابھر کی زیادتی سے دل پر بوجھ یا گھبراہٹ یا دھڑکن محسوس ہوتی ہے۔ ایلو پیٹھک علاج :- اصل مرض کو معلوم کر کے دُور کریں۔ جب معدہ میں ترشی زیادہ ہو تو قبض یا اپھارہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں سوڈامنٹ کی ٹکیاں تین یا چار کی تعداد میں ہمراہ پانی کھائیں یا مندرجہ ذیل نسخہ جو ریح کو خارج کرنے کے لئے نہایت مفید ہے۔ پلائیں۔

۱۔ مکسچر کاسر الریاح :-

سپرٹ ایونیا ایرد میٹک ۳۰ منم
سوڈا بائی کارب ۱۵ گرین
ٹنکچر کارڈیم کمپونڈ ۳۰ منم
سپرٹ کلوروفارم ۳۰ منم
پانی ۱ اونس

۲۔ مکسچر برائے اپھارہ :-

منٹقل ۱۵ گرین
ایرد میٹک سپرٹ آف ایونیا ۳۰ منم
سپرٹ آف کلوروفارم ۳۰ منم
پانی ۱ اونس

اس کی مکسچر بنائیں، ایسی ایک ایک خوراک ہر چار گھنٹہ کے

بعد پلائیں۔

ایسی ایک خوراک ہر تین گھنٹہ کے بعد پلائیں۔

علاوہ ازیں پیٹ پر گرم پانی سے ٹکور کریں۔ ریح کی پیدائش روکنے کے لئے ٹنکچر ایسا فی ٹیڈ بمقدار ۲۰ قطرے ہر تیسرے گھنٹے بعد پلانا نہایت عمدہ علاج ہے یا سوڈا بائی کارب ۲۰ گرین، رت پودینہ ۱۵ گرین، گلوکوز ایکٹ جیم، یہ ایک خوراک ہے، ایسی ایسی ایک ایک خوراک کھانا کھانے کے بعد ہمراہ پانی پلائیں۔ پیٹ کی گیس خارج کرنے کے لئے از حد مفید ہے۔

پینٹ ادویات میں ٹاکاڈایاٹس (Taka Diastase) ساختہ پارک ڈیوس کمپنی۔ نشاستہ داراغذیہ سے پیدا شدہ بدھنمی، اپھارہ اور قے بہت مفید ہے۔ علاوہ ازیں جو ادویات بدھنمی میں لکھی جا چکی ہیں۔ اس مرض میں بھی مفید ہیں۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ یونی انزائم (Unien zyme) گولیاں — دو گولیاں صبح اور دو گولیاں شام ہمراہ تازہ پانی دیں۔

۲۔ ڈیجی پلیکس (Digiplex)، دوچھپ دوا دوچھپ پانی ملا کر صبح و شام کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں۔

۳۔ ڈیٹازائم دوچھپ صبح دوچھپ شام برابر پانی ملا کر کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں۔

۴۔ اینوفروٹ سالٹ (Enos Fruitsalt) دس گرام پوڈر کو ایک اونس پانی میں ڈال کر جھاگ اٹھتے ہی پی لیں۔ دن میں دو تین بار دیں۔

۵۔ کرسچین سالٹ (Kruschen Salt) تین گرام ایک گلاس گرم پانی میں ڈال کر دن میں دو سے تین بار دیں۔

۶۔ ڈائی جین (Digene) بولٹس — معدہ کے درد کو سکون دیتی ہے، یہ دافع ترشی معدہ ہے۔

یونانی علاج :- قبض نہ ہونے دیں۔ غذائے بعد جب کبد نوشادری تین تین عدد ہمراہ عرق سولف دیں۔ مندرجہ ذیل نسخہ جات مرض میں مفید ہیں :-

۱۔ دوائے اپھارہ :- سوٹھ چھ ماشہ، انیسوں ایک تولہ، پودینہ خشک ایک تولہ، نمک سیاہ ایک تولہ، زیرہ سفید ایک تولہ، سولف ایک تولہ، نمک لاہوری دو تولہ، سب کا سفوف بنا کر رکھیں اور صبح و شام کھانا کھانے کے بعد چار سے چھ ماشہ ہمراہ پانی استعمال کریں، اس مد میں جوارش کمونی اور جوارش جالینوس کا استعمال بھی مفید ہے۔

۲۔ تریاق معدہ :- نوشادر پھلی، دارفلفل، نمک سیاہ، الائچی خورد مدھ پورست کوٹ چھان کر سفوف بنائیں، خوراک تین تین رتی ہمراہ پانی بعد از دیں، جلد امراض معدہ کے لئے تریاق ہے۔

۳۔ سفوف ریاہ :- ریوند خطائی، سونٹھ، سوڈا بیکارب، ہوزن سفوف بنائیں اور دو ماشہ ہمراہ تازہ پانی صبح و شام کھلائیں۔
 آیور ویدک علاج :- ہنگواشٹک چورن جس کا نسخہ پیٹ درد کے بیان میں دیا جا چکا ہے۔ ایک ماشہ سے تین ماشہ ہمراہ عرق سولف یا گرم پانی دیں، اچھارہ بدھیمی کے لئے مفید ہے۔ دیگر نسخہ جات آیور ویدک اور ہومیو پیتھک بدھیمی کے بیان میں لکھے گئے ہیں۔ وہاں ملاحظہ فرمادیں اور بنا کر فائدہ اٹھادیں۔

اماشا شوتھ، معده کی سوجن، ورم معده۔ گیسٹرائیٹس، (Gastreitis) اماشاکھاؤ، معده کا زخم، قروح معده، گیسٹرک السر، (Gastric-Ulcer)

تعریف مرض :- اس مرض میں معده کی لعاب دار جھلی پر ورم ہو جاتا ہے، ورم سے کئی چھوٹے چھوٹے یا ایک بڑا زخم ہو جاتا ہے۔
 وجوہات :- پرانی بدھیمی و کلاسٹرامیوہ کھانا، مصالحہ دار و مرغن غذاؤں اور زیادہ گوشت و شراب کا استعمال اور غورتوں میں بندش ایام اس کے خاص اسباب ہیں۔

علامات :- پرانی بدھیمی کی علامات، فم معده اور کوٹری کے مقام پر یا اس کے بالمقابل پشت پر درد، بوجھ اور جکڑن محسوس ہوتی ہے، مقام معده کو دبائے میں درد میں شدت ہو جاتی ہے، عام طور پر کھانا کھانے کے بعد ایک گھنٹہ تک شدید درد ہوتا ہے اور پھر قے ہو جاتی ہے جس میں غذا اور خون ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ سر میں درد اور معمولی بخار ہوتا ہے، مریض کو غذا سے نفرت ہو جاتی ہے اور مریض دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں دھیان ہے کہ جب مریض کی عمر چالیس سال سے کم ہو اور علامات مرض دو سال پرانی نہ ہوں تو صحت یابی کی امید ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ عارضہ پانچ سال موجود ہو تو دوائی علاج یا آپریشن سے مستقل فائدہ کی توقع نہیں۔ معده کے پچلے دہانہ کی تنگی میں آپریشن سے ۸ فیصدی مریضوں کو مستقل فائدہ ہو سکتا ہے۔
 ایلوپیتھک علاج :- مریض کو مکمل طور پر بستر پر لٹائیں، شروع میں مریض کو دودھ یا سنگرتے کے رس میں گلو کو ز ملا کر ہر دو گھنٹے بعد دیتے رہیں علاج کے ابتدائی زمانہ میں ٹنگر بلاڈونا دس سم پانی میں ملا کر دن میں تین بار پلانا مفید ہے، لیکن چلنے پھرنے والے مریضوں کو یہ دوا نہ دی جائے۔ کیونکہ نظریہ فرق پڑ جاتا ہے۔

روغن زیتون کا استعمال بطور غذا و دوا بہت مفید ہے، اگر مریض کو درد کی وجہ سے نیند نہ آئے تو فینو باربیٹون ایک گرین صبح و شام کھلائی مفید ہے۔
 پیٹنٹ ادویات میں وگولائی سین (Vegoly sin) ساختہ سے اینڈ بیکر گولیاں کھلانے اور امپول انجکشن سے لے ملتے ہیں، حسب حالات مرل استعمال کریں یا ٹرے سنٹین (Trasentin) ساختہ سیبا، ایک سے دو گولیاں دن میں دو بار یا اس کے امپول کا جلدی یا عضلاتی انجکشن دیا جاتا۔
 اس سلسلہ میں روش کمپنی کا لاروسٹی ڈین (Larostidin) یا ہسٹی ڈین (Histidine) بی، ڈی، ایچ کمپنی کے ٹیکے دیئے مفید ہیں۔ اگر معده کافی خون آئے تو خون روکنے کے لئے ہموپلاستین (Hemoplastin) کا انجکشن دیں۔ اگر ادویات سے فائدہ نہ ہو تو انجکشن سے کے ذریعے زخم کا معائنہ کرنا اگر ایک انچ سے زیادہ زخم ہو جائے تو آپریشن کی ضرورت ہے۔ آیور ویدک ہومیو پیتھک اور باکٹیمک غذا و دوا پر ہیز کے لئے درد معده کا بیان ملاحظہ فرمادیں۔

سرطان معده، کاری نو ماؤف دی سٹاک، (Carsinoma Of The Stomach)

تعریف مرض :- اس مرض میں معده میں سرطان ہو جاتا ہے۔

وجوہات :- جدید تحقیقات کے مطابق متبا کو نوشی اور متبا کو خوردنی سے سرطانِ معدہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اکثر پُرانے امراضِ معدہ سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- ایکس رے کے بعد سرطانِ معدہ کی تشخیص ہو جاتی ہے۔ مقامِ معدہ پر ہر وقت درد رہتا ہے۔ اور مریض بے چین رہتا ہے۔
علاج :- شروعِ مرض میں اگر ایکس ریز کے ذریعہ مریض کا علاج کرایا جائے تو فرق کی توقع ہے۔ ورنہ یہ مرض لا علاج ثابت ہوتا ہے۔ اس مرض میں صرف مسکن اور محذور دوائیوں سے تکلیف اور درد کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تسکین درد کے لئے ٹنکچر ادیم دس سے پندرہ بوند ہمراہ تازہ پانی دیں۔

سرطان کا علاج "دھمانسہ" :- ہزاروں افراد پر تجربہ کرنے کے بعد سرطان پر دھمانسہ کی حیرت انگیز کامیابی کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا ہے۔ دھمانسہ جسے سندھ میں ڈامو کے نام سے پکارا جاتا ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے، پس کر بنائی جاتی ہے۔ روزانہ تقریباً دو تولہ ہرے یا خشک پودے کو پیس کر اور اس کا رس نکال کر دو ہفتہ تک مریض کو پلانے سے حیرت انگیز نتائج نکلے ہیں۔ ٹھٹھ میں پی، ڈبلیو ڈی، بی اینڈ آر کے اور سیر منور احمد بلوچ کی والدہ کے حلق میں کینسر کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا تھا۔ اس دوا کے پلانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی۔ اور چار سال سے وہ بالکل تندرست ہیں۔ حیدر آباد (پاکستان) میں لطیف آباد یونین کمیٹی کے ایک ممبر چوہدری علی حسین کی والدہ کے پیٹ میں تکلیف تھی، لیڈت میڈیکل ہسپتال میں ان کا آپریشن کیا گیا، لیکن ڈاکٹروں نے غیر متفقہ طور پر سرطان تجویز کر کے لا علاج قرار دیا۔ لیکن اس مفت کی دوا کے استعمال سے وہ بالکل تندرست ہو گئیں۔ چنیوٹ میں نور محمد کی بیوی کو بھی ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے کر علاج بند کر دیا۔ لیکن دھمانسہ (ہندوستانی و پاکستانی جڑی بوٹی) کے استعمال سے آج وہ بالکل تندرست و توانا ہیں۔

غرضیکہ بے شمار مریضوں پر اس دوا کو استعمال کیا گیا۔ اور خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے، ضرورت ہے کہ ملک کے اعلیٰ ترین اطباء و ڈاکٹر توجہ دیں اور اپنی تحقیقی و تجربہ سے سرطان جیسے موزی مرض کو جڑ سے اکھاڑنے کے لئے اس حقیر پودے کی صلاحیتوں کا جائزہ لیں۔
ڈاکٹر زکریا نے اپنے انڈین میڈیکل میگزین میں دھمانسہ کو انٹی سپٹک تسلیم کیا ہے، علاوہ ازیں تمام قدیم آیور ویدک و طبی کتب میں بھی اسے زبردست صفا خون اور انٹی سپٹک کہا گیا ہے۔ ان حالات میں ہم بھی سرطان کے لئے "دھمانسہ" کی کامیابی سے انکار نہیں کر سکتے۔ اہل طب اسے تجربات میں لا کر فائدہ اٹھائیں۔ اس کی عام مقدار خوراک تین سے ساڑھے چار ماشہ تک ہے۔
غذا پر ہیز :- ہلکی وزود ہضم غذا دیں، دیرینہم اغذیہ سے سخت پرہیز کریں۔

بھوک کم لگنا، نقصانِ اشتہا، انوریکسیا، (Anurexia)

تعریفِ مرض :- اس مرض میں بھوک کم یا بالکل بند ہو جاتی ہے۔

وجوہات :- ان دونوں صورتوں میں مرض کے اسباب ایک ہوتے ہیں، بدھمنی، اعصابی کمزوری، کثرتِ شراب خوری، سرطانِ معدہ، سوزشِ معدہ، پیٹ کے کپڑے، تلی بڑھ جانا، جگر کے امراض وغیرہ سے بھوک زائل یا ناقص ہو جاتی ہے۔

ایلمینٹیک علاج :- اصل سبب مرض کو دور کر کے اس کے مطابق علاج کریں، اگر بھوک نہ لگنے کا عارضہ قبض کی وجہ سے ہو تو قبض میں دیئے گئے نسخہ جات استعمال میں لادیں، اگر بدھمنی ہو تو اس کے مطابق علاج کریں۔ آیور ویدک یونانی اور ہومیوپیتھک علاج بطرز بدھمنی کے کریں۔
غذا پر ہیز بطرز دردِ معدہ کے کریں۔

بھوک کا ہوکا، جوع البقر، بولیموس (Bulimus)

تعریف مرض :- اس مرض میں مریض کو حد سے زیادہ بھوک لگتی ہے۔

وجوہات :- تلی بڑھ جانے، سودا کے زیادہ پیدا ہونے، دماغی نزلات فم معدہ پر گرنے، ذیابیطس، بچوں میں پیٹ کے کیڑے، شدید بخاروں

میں مبتلا رہنے سے بھی یہ عارضہ پیدا ہو جاتا ہے۔

علامات :- مریض کو شدید بھوک لگتی ہے۔ کچھ غذا کھانے کے بعد پھر بھوک لگ آتی ہے، مریض سست اور کمزور ہو جاتا ہے۔ دل گھٹتا ہوا نظر

آتا ہے۔ اس مرض کی خاص علامت یہ ہے کہ مریض اچھی غذا کھاتے ہوئے بھی دن بدن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔

علاج ڈاکٹری :- ڈاکٹری نظریہ کے مطابق اس مرض میں معدہ میں تیزاب کی زیادتی ہوتی ہے جس سے خراش پیدا ہو کر شدید بھوک لگنے لگتی ہے۔

اس صورت میں کھاری ادویات سوڈا بائیکارب استعمال میں لائی جاویں۔

تمام علاج ایلمینٹیک، آلیورویک، یونانی، ہومیوپیتھک بطور بدھنی کے ہیں، اس لئے بدھنی کے بیان میں دیئے گئے نسخہ جات کو استعمال میں لاویں

اگر تلی کے بڑھ جانے، ذیابیطس یا پیٹ کے کیڑوں سے یہ عارضہ ہو تو اس کے مطابق علاج کریں۔ اگر جسم میں صفرا کے غلبہ کی وجہ سے یہ عارضہ ہو تو جگر

درستی کے لئے بالی کولیٹس (Bi- Cholates) کا استعمال کریں، جو جگر کی عوارضات کے لئے کامیاب دوا ہے۔

یونانی طریقہ علاج میں دواء المسک معتدل جواہر والی چھ ماشہ کھلا کر اوپر سے عرق گاؤ زبان ۹ تولہ، عرق گلاب پانچ تولہ، شربت انار شیریں دو تولہ

ملا کر پلائیں۔

غذا پر ہیز :- مرغ یا بکری کا شوربہ خوب گھی ڈال کر چپاتی کے ساتھ دیں۔ مغز پستہ، مغز بادام، مغز چغوزہ، مغز اخروٹ، مغز کاجو، مغز ناریل

وغیرہ دیں اور نمکین، تیز، کسلی اور ترش غذاؤں سے پرہیز کریں۔

آماشیہ کا ڈھیلا پن، معدہ کا ڈھیلا ہو جانا، استرخا المعده، ری لیک سیٹشن آف ڈی سٹامک

(Relaxation Of The Stomach)

تعریف مرض :- اس مرض میں معدہ کی دیواریں کمزور اور ڈھیلی ہو جاتی ہیں۔

وجوہات :- متواتر پرانی بدھنی، رنج و غم، اپچارہ وغیرہ سے یہ عارضہ پیدا ہو جاتا ہے۔

علامات :- معدہ کے ڈھیلا پن میں سینہ ابھرتا ہے اور ہاضمہ بالکل خراب ہو جاتا ہے، پیٹھ اندر کو گھس جاتی ہے، دائمی قبض ہوتی ہے

معدہ میں ریاح بھرے رہتے ہیں۔ مریض سست اور کمزور ہو جاتا ہے۔

یونانی علاج :- جوارش مصطکی یا جوارش آملہ کا استعمال کریں، اس سلسلہ میں روغن زیتون کا خوردنی استعمال بطور دوا غذا مفید ہے، زیادہ

تیزابیت پیدا کرنے والی اغذیہ وادویہ سے سخت پرہیز کریں۔

ڈاکٹری طریقہ علاج میں وٹا منز سے بھر پور اغذیہ اور ادویہ دیں۔

اتی سار، دست، اسہال، ڈائریا، (Diarrhoea)

تعریف مرض :- پتلے پتلے دست بغیر کسی تکلیف کے آتے ہیں، سنسکرت میں مرض اسہال کا نام اتی سار ہے۔ اتی کے معنی زیادہ، کثرت یا بہت کے ہیں۔ اور سار کے ہیں سرن کرنے یا بہنے کے۔ پس جس مرض میں نہایت کثرت سے پانی کی طرح رطوبات بہتی ہیں۔ اس کو اتی سار (اسہال) کہتے ہیں۔

وجوہات :- خراب غذاؤں کا زیادہ استعمال، زیادہ مزاج، گرم مصالحہ، تبدیلی موسم، زیادہ رنج و غم، تپ محرقہ (معیادی بخار)، تپ دق، دائمی زلزلہ، ہیضہ، انتڑیوں میں سدہ، تیز جلاب لینے، جگر کے پھٹ جانے، بچوں میں دانت وغیرہ نکلنے سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے، طب آیور وید کے نظریہ کے مطابق زیادہ دیر تک تیرنے، کھیلنے وغیرہ سے بھی اتی سار ہو جاتا ہے۔

علامات :- طب آیور ویدک کے مطابق مرض شروع ہونے سے پہلے بے قراری، مقام ناف، پیٹ و پسلیوں میں درد، جسم کا بھاری پن، بد ہضمی، اپھارہ وغیرہ کا عارضہ ہو جاتا ہے، طب یونانی کے مطابق اگر غذا فاسد کی وجہ سے اسہال آتے ہیں تو ان کا رنگ مٹیالا اور جھاگ دار ہوتا ہے، زبان سیلی، پیٹ میں قراقر ہو جاتا ہے، اسہال کبدی میں دستوں کا رنگ زرد یا سرخ گوشت کے دھوون کی مانند ہو گا۔ اسہال معدی اور رطوبت بلغمی میں دست دن کو زیادہ اور رات کو کم آئیں گے اور ترش ڈکاریں آئیں گی۔

ڈاکٹری علاج :- اصل سبب کو معلوم کر کے اس کے مطابق علاج کریں، اگر کوئی خراش دار مادہ موجود ہو تو کیسٹرائیل مین تولہ پلا کر پیٹ صاف کریں۔ اس کے بعد قابض دواؤں کا استعمال کریں۔ اس سلسلہ میں کلوروڈین یا کیمفور وڈین ہمائے بخربہ میں مفید ثابت ہوئی ہیں۔ ہر قسم کے دست بند کرنے کے لئے مجرب ہیں۔ ان کی مقدار خوراک ۱۰ سے ۳۰ بوند تک ہے۔ شدید حالت میں سلفا گونے ڈین یا سلفا فٹا یا زول، بڑے آدمی کے لئے دو گولیاں چار چار گھنٹے بعد کھلائیں، علاوہ ازیں دستوں کو روکنے کے لئے ڈورس پوڈربھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی مقدار خوراک تین سے پانچ گرین ہے۔ مندرجہ ذیل مجربات دستوں کو روکنے کے لئے از حد مفید ہیں :-

۱۔ برائے اسہال

ٹینکچر کیٹی کو

۳۰ منم

ایرو میٹک چاک پوڈر

۱۵ گرین

ٹینکچر اوپیم

۵ منم

چاک کمپچر

۱/۲ اونس

ایسی ایک ایک خوراک ہر تین گھنٹے بعد پلائیں، ولایت کے

ہسپتالوں میں مروج لندن فارما کوپیہا کا مشہور و معروف نسخہ ہے۔

۲۔ دیگر

ٹینکچر بیلادونا

۵ منم

ٹینکچر ہائیوسائیس

۲۰ منم

ایکو امنٹی پیپ

۱/۲ اونس

ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین بار بعد از غذا پلائیں، جب ذرا سا کھانا کھانے سے فوراً دست یا پاخانہ کی حاجت ہو کر غیر منظم غذا خارج ہو جائے تو مجرب ہے۔

۳۔ برائے اسہال

سوڈا بائیکارب

۱۰ گرین

بسمتھ کارب

۲۰ گرین

ٹینکچر اوپیم

۵ منم

کمپچر کریشا

۱ اونس

ایسی ایک ایک خوراک دو یا تین بار روزانہ دیں، فارما کوپیہا قدیم ہسپتال ہائے متحدہ پنجاب کا مجرب نسخہ ہے۔

۴۔ کلوروڈین

۱۵ منم

ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین یا چار بار دیں۔

انٹی بائیوٹک ادویات میں آریو مائی سین، سیرامائی سین، اسپہال روکنے کے لئے مفید ادویات ہیں۔

بچوں کے دستوں کی صورت میں بذریعہ کیسٹریل یا پورائی کو سے پیٹ صاف کیا جائے، لیکن اوپیم کے مرکبات کو احتیاط سے استعمال کیا جائے۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ سٹریپٹوٹرائیڈ (Streptotriad)، مے اینڈ بیکر ————— یہ دستوں اور بیلیری ڈسینٹری میں مفید ہے، آدھی

سے دوئیاں دن بھر چار بار مرض کے مطابق تازہ پانی سے دیں۔

نوٹ :- اس کے ایک جزو کلورم فینی کال کو بے عرصے تک لینے سے سخت بلکہ جان لیوا خون کے امراض ہو سکتے ہیں۔ اس لئے معمولی

حالت میں اس دوا سے گریز کریں۔

۲۔ کلوروسٹریپ کیپ شول (پارک ڈیوس) یا انٹروسٹریپ کیپ شول (ڈیز) آدھا سے ایک کیپ شول دن بھر تین سے چار بار تازہ پانی سے دیں۔

بچوں کے لئے اس کا شربت ایکٹ حمچہ دن میں تین سے چار بار دیں۔

۳۔ سلفامائی ٹین (Sulphamycetine) ٹی ————— ایک دوگولی دن میں تین چار بار تازہ پانی سے یا شربت کی صورت میں

ایک سے دو چھ دن میں تین بار مرض کے مطابق دیں۔

۴۔ اسٹریپٹوپارگزین (Strepto-Paraxin) نان ————— کلورم فینی کول واسٹریٹو مائی سین سلفیٹ کا مرکب ہے۔ یہ ایک چائے

کا چمچ دن بھر میں دوبار دیا جاتا ہے۔ یہ مرکب شربت معدہ اور آنتوں کی سرایت کے لئے بہت ہی موثر ہے، آنتوں کی سوجن، آنتوں کی سرایت اور

بچوں کے دستوں میں زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ آنتوں کی دق اور ناسور مقعد میں بھی مفید ہے، نامعلوم سبب کے دستوں کے لئے موثر علاج

ہے، بچوں کو اس کے ساتھ میکرو این سپرپ دیا جائے۔

۵۔ انٹسٹوپان (Intestopan) سینڈوز ————— دست، پیمیش، گرمی کے مروڑ، دست، ابھارہ اور بدہضمی میں مفید ہے، ایک

سے دو ٹکیہ صبح، دوپہر اور شام تازہ پانی سے دیں۔

۶۔ انٹرو ویو فارم (Enterovioform) سا ————— پیمیش، دست، آنتوں کی سوجن میں مفید ہے۔ ایک سے دو گولی تین بار

تازہ پانی سے استعمال کریں۔

۷۔ سلفا گوانے ڈین دو ٹکیہ، انٹرو ویو فارم ایک ٹکیہ، یہ دونوں ٹکیہ ہر چار گھنٹے بعد تازہ پانی سے دیں، پہلے روز ہی آرام آجائے گا۔

۸۔ کیمنور ڈوائن (Camphorodyne) المبیک ————— ۱۵ سے ۳۰ بوند آدھے اولس تازہ پانی میں ملا کر ہر دو یا تین گھنٹے بعد

دیں۔ پیٹ درد، بدہضمی، قے، اسہال، اسہال ہضم میں مفید ہے۔

۹۔ کلورو ڈوائن (Chlorodyne) المبیک ————— قہج، قے، دست، پیمیش، اٹمنٹن میں مفید ہے، ۱۰ سے ۳۰ بوند آدھے اولس

پانی میں ملا کر ہر تین گھنٹے بعد دیں۔

۱۰۔ انٹرو مائی ٹین سلفا (ڈیز)، جراثیمی دست، پیمیش، بچوں کے ہرے پیلے دستوں میں مفید ہے۔ بڑوں کو ایک یا دو ٹکیہ دن میں تین بار تازہ پانی سے

بچوں کو اس شربت کا آدھا تا ایک چمچ دن میں تین یا چار بار دیں۔

۱۱۔ پالی میگما (Polymagma) وانٹھ ————— اس شربت کو ہر قسم کے دستوں میں مفید پایا گیا ہے، چائے کے دو سے چار چمچ

دن میں تین بار دیں، بچوں کو لمباظ عمر جو تھائی یا کم مقدار میں دیں۔

۱۲۔ کوپکٹال (رنیکسی)۔ انٹریوں کی سوزش، دست، معدہ کا درد، توہنج، گیس میں بھی مفید ہے۔ ایک چائے کے چمچ کے برابر دن میں دو سے تین بار دیں۔
 ۱۳۔ ٹیٹراسائیکلین (Tetra cycline) یا ٹیرامائین (Teramycin) ایک کیپ شول ہر چھ گھنٹہ بعد دیں۔ شدید حالات مرض میں ہر چار گھنٹہ کے بعد دے سکتے ہیں۔

۱۴۔ ڈارزین (نیومائی سین) (Darzine (Neomycin) ————— دستوں کی موثر و زود اثر دوا ہے۔ خاص طور پر بچوں کے جراثیمی اور گرمی کے زمانہ کے دست جن میں دستوں کی وجہ سے بچہ نڈھال ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ہیفیضہ کے دستوں میں بھی مفید ہے۔ جب دیگر انٹی بائیوٹک یا دافع اسہال ادویہ ناکام ہو جائیں تو اسے استعمال کرایا جائے۔ بڑوں کو ایک سے دو ٹکیاں دن میں تین بار تازہ پانی سے دیں، بچوں کو عمر کے مطابق کم مقدار میں دیں۔

۱۵۔ سزنامائی سین (Synermycin) فز ————— جراثیمی دستوں کے لئے از حد مفید ہے۔ ہر چھ گھنٹہ بعد ایک کیپ شول دیں۔ یہ دوا کسی وقت خراب رد عمل بھی کرتی ہے۔ اس رد عمل کو دور کرنے کے لئے ساتھ ساتھ ڈامن بی کیلیکس بھی دیتے رہنا چاہیے۔ ٹیٹراسائیکلین اولیا انڈومائی سین سے بنی ہے۔

۱۶۔ سٹریپٹومیگما (Streptomagma) جان واسٹہ ————— طے جلع جراثیمی دستوں میں فوراً فائدہ کرتی ہے۔ معدہ و آنتوں کو جراثیم سے صاف کرتی ہے۔ بڑوں کو چائے کے ایک یا دو چمچ کے برابر دن میں تین بار دیں۔

۱۷۔ سٹریپٹوسٹین (Streptocetin) مے اینڈ بیکر ————— دست و پچش میں فوراً اثر دکھاتی ہے، معدہ و آنتوں کی بلغمی جھلی کی سوزش جاتی رہتی ہے۔ دو کیپ شول اکٹھے ہر چھ گھنٹہ بعد تازہ پانی سے دیں۔ یہ دوا کلورم فینی کال، سٹریپٹومائی سین سے بنتی ہے۔

۱۸۔ کوئیکس لین (Quixalin) سارا بھائی ————— دستوں اور پچش میں مفید ہے۔ ایک سے دو ٹکیہ تازہ پانی سے دن میں دو سے تین بار دیں۔

۱۹۔ کرمیومائی سین (Cremomycin) مرک شارپ ڈوہم ————— سب طرح کے دستوں کو روکنے میں مفید ہے، ہیفیضہ، بد ہضمی، گرمی، دانت نکلنے کے سبب قسم کے دست بند ہو جاتے ہیں۔ یہ دوا آنتوں میں جراثیم کو فنا کر دیتی ہے۔ یہ شربت ۱۵ تا ۲۲ پونڈ کے وزن کے بچوں کو آدھا چمچ، بڑوں کو ایک تا دو چمچ دن میں چار سے چھ بار دیں۔

نوٹ :- اگر آنتوں میں زخموں کے سبب بدبودار دست ہوں، حاملہ عورت و گردہ کے امراض کے مریضوں کو نہ دیں، عام مریضوں کو بھی چار یا پانچ دن سے زیادہ استعمال نہ کرائیں۔

۲۰۔ میکسافارم (Mexaform) سبا ————— ہر قسم کے دستوں، آنوؤں، امیبائی پچش میں مفید ہے، ایک ایک گولی دن میں تین بار تازہ پانی سے دیں۔

۲۱۔ بیرن ایک ٹکیہ، انٹرو والو فارم دو ٹکیہ، ڈامن بی کیلیکس دو ٹکیہ، سب کو اکٹھا ملا کر تین خوراک بنالیں اور دن میں تین بار تازہ پانی سے دیں۔ پیرلنے دستوں اور پچش کے لئے مفید ہے۔

۲۲۔ گوانے مائی سین (Guanimycin) گلیکو ————— ایک دو چمچ دوا دن بھر میں تین بار دینا چاہیے، اس طرح (Streptoguin) کارکب (ڈیز) کا بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

۲۳۔ یونیومائی سین (Uniomylin) ایک سے دو چمچ دن میں تین بار دیں۔

۲۴۔ سٹری ٹیل (Strycital) سارا بھائی ————— دو دو ٹکیاں دن میں تین سے چار بار ہمراہ تازہ پانی دیں۔

انٹوبکس (Entobex) سب — ایک دو کچھ دن میں تین بار تازہ پانی سے دیں۔

یونانی علاج :- جب بار بار دست آتے ہوں تو گل دھاوا ایک تولہ، رال سفید ایک تولہ، برابر وزن کر کے سفوف کریں، خوراک دو سے تین ماشہ دیں میں ملا کر دیں یا دی کی سٹی سے دیں یا بیل گری کا سفوف بنا کر دو سے تین ماشہ تک ہمراہ شربت انار دو تولہ دن میں دو سے تین بار دیں، ہر قسم کے دستوں کو بند کرنے کے لئے نہایت مفید علاج ہے۔ دستوں کو روکنے کے لئے مندرجہ ذیل تجربات خاص طور پر مفید ہیں۔

دوائے اسہال :- بیل گری چھ ماشہ، موچرس ۹ ماشہ، گل دھاوا ایک تولہ، اندر جو شیریں چھ ماشہ، اساروں سات ماشہ، برگ بھنگ دو تولہ خستہ انبہ چھ ماشہ، جامن چھ ماشہ، ناگر موٹھا چھ ماشہ، گل انار چھ ماشہ، انیون تین ماشہ۔ تمام کو کوٹ چھان کر بقدر سخو دگو لیاں بنائیں، خوراک ایک سے دو گولی ہمراہ تازہ پانی دیں۔ دست خواہ کسی قسم کے ہوں، اس دوا سے بند جاتے ہیں۔ اور کسی قسم کا مسفر اثر نہیں ہوتا۔

سفوف مویا :- ہرڑ سیاہ، پوست خشخاش سفوف شدہ ہر ایک چھ ماشہ، گائے کے گھی میں بریاں کر کے سب کو کوٹ کر سفوف بنا دیں۔ خوراک چھ ماشہ ہمراہ آب تازہ دیں۔ معدہ و آنتوں کی کمزوری سے جو دست آتے ہوں ان کو روکنے کے لئے مفید ہے۔

مرہ بیل گری :- بیل پختہ کلاں جس کا چھلکا باریک ہوئے کر چھلکا دور کر کے چاقو سے گول گول قاشیں تراش لیں اور قاشوں سے بچوں کو نکال چینی سفید کا قوام بنائیں اور جب قوام تیار ہونے لگے تو قاشوں کو قوام میں ڈال کر اس قدر پکائیں کہ قوام درست ہو جائے۔

مقدار خوراک :- ایک تولہ روزانہ صبح دیں، دستوں و بچش کے لئے از حد مفید ہے۔

دوائے اسہال :- موچرس، مائیں، گل دھاوا، بل کتھ، پوست، رال سفید ہر ایک ایک حصہ، مصطکی دو حصہ، سب دواؤں کو سفوف بنا کر خوراک آدھا ماشہ دن میں تین بار دیں، نہایت قابض ہے اور دستوں کو بند کرتا ہے۔

دوائے اسہال اطفال :- بیل گری بریاں، مازوئے سبز بریاں ہوزن پیس کر ایک سے دو ماشہ بلحاظ عمر ہمراہ شربت حب آلاس دیں۔

دوائے اسہال :- انیون آدھی سے ایک گرین دن میں تین بار ہمراہ پانی دیں، ہر قسم کے دستوں کو بند کرنے کے لئے مفید ہے کمزور مریض کو اس کا استعمال منع ہے۔

شیر خواز بچوں کے دست روکنے کے لئے مجرب نسخے

- ۱۔ پودینہ خشک کے پتے اور دانہ الائچی سفید ہم وزن کھانڈ ملا کر بچہ کو تھوڑا تھوڑا اچٹائیں، مقوی معدہ ہے۔
- ۲۔ طباشیر بڑھیا، دانہ الائچی سفید ہوزن باریک پیس کر اور چینی ملا کر تھوڑی سی دوا ماں کے دودھ میں حل کر کے بچہ کو چٹائیں، معدہ کی تقویہ کے لئے مفید ہے۔
- ۳۔ سولف، ہرڑ سیاہ ہر ایک دو ماشہ، سونٹھ ایک ماشہ، سب ادویہ کو علیحدہ علیحدہ گھی گائے خالص میں بریاں کر کے سفوف بنائیں اور چینی ماشہ سفوف بنا کر ملا لیں، اس میں سے خوراک آدھا سے ایک ماشہ، صبح و شام بچے کو دیں۔ بچے کے معدہ کو طاقت دینے کے لئے مفید ہے۔
- ۴۔ سولف، دانہ الائچی خورد، حب آلاس ہر ایک ایک ماشہ پانی میں پیس کر چھان لیں اور مصری چھ ماشہ ملا کر صبح و شام پلائیں۔ دستوں کو روکنے کے لئے مفید ہے۔

- ۵۔ حب آلاس چار ماشہ، انجبار چار ماشہ جو کوب کر کے پانی میں پکائیں اور صاف کر کے مصری ملا کر ایک ایک گھونٹ عمر کے مطابق پلائیں۔
- ۶۔ زیرہ سفید بریاں سات ماشہ، سولف بریاں سات ماشہ، دانہ الائچی خورد چار ماشہ، انار دانہ چار ماشہ، مصری سفید ایک تولہ سفوف بنا

خوراک ایک سے دو ماشہ ہمراہ عرق سولف یا عرق پودینہ دیں۔ یہ سفوف بچوں کے دستوں کے لئے خاص طور پر مفید ہے۔

۷۔ نارچیل دریائی سات ماشہ، زہر مہرہ خطائی سات ماشہ، طباشیر کبود ۹ ماشہ، زرور دپانچ ماشہ، حب آلاس تین ماشہ، کات سفید شدہ تین ماشہ، گوند کیکر بریاں چار ماشہ، کیترا سفید چار ماشہ، نیم کے پتے ۱۵ عدد، ہار یک سفوف بنائیں، خوراک آدمی سے دو رتی مناسب عرق میں ملا کر عرق مطابق دیں۔

۸۔ زہر مہرہ خطائی، نارچیل دریائی، طباشیر ہر ایک قد سے لے کر گلاب کے عرق میں گھس کر پلائیں، بچوں کے خراش دار دستوں میں مفید ہے۔
سفوف اطفال:۔ ریوند خطائی، چھلکا ہرڑ زرد، کچور ہر ایک ایک تولہ، سوڈا بائی کارب چھ ماشہ، سب کو سفوف بنا کر اور ایک چٹکی مال کے دودھ میں حل کر کے بچے کو پلائیں، بچے کے سبز رنگ کے دستوں کے لئے مفید ہے۔

بال شربت ملتانی: زلال آبک یعنی لائم واٹر پڑ بوتل، عرق سولف ۲ تولہ، عرق گاؤ زبان دس تولہ، چینی سفید ۱۰ تولہ، عرق جادو ۱۰ تولہ، ترکیب۔ پہلے اڑھائی تولہ اُن بچھا چو نہ ایک سیر صاف پانی میں حل کریں اور تین روز تر رکھیں پھر روز دن میں تین بار ہلادیا کریں، بعد میں شکار اور چھان کر بوتل میں بھر لیں، آدمی بوتل لائم واٹر لے کر جلد عرقیات اور چینی سفید ملا کر شربت تیار کر لیں اور ٹھنڈا ہونے پر چھان کر عرق جادو ڈال کر خوب اچھی طرح ہلا کر شیشیوں میں بھر کر پکنگ کر لیں، نہایت مفید و مجرب ہے اور معمول مطب ہے۔

فوائد:۔ بچوں کے جلد امراض، ہرے پیلے دست اور کمزوری ہر قسم کے لئے حسب حاجت استعمال کریں۔
نسخہ عرق جادو:۔ ست پودینہ ایک تولہ، کافور دیسی دو تولہ، شیشی میں ڈال کر اور کارک لگا کر چند منٹ دھوپ میں رکھیں، پانی کی طرح ہو جائے گا۔ اسی کا نام عرق جادو ہے۔

مقدار خوراک بال شربت ملتانی:۔ چھ ماہ کی عمر تک پانچ بوند، ایک سال تک دس، دو تین سال کے بچے کے لئے آدھا چمچہ ہمراہ عرق سولف یا مال کے دودھ کے ساتھ دیں۔

ولایتی گرائپ واٹر سے بدرجہا بہتر ہے اور ہمارے دواخانہ کا پیٹنٹ شربت ہے۔

آیور ویدک علاج:۔ علاج شروع کرنے سے پہلے معالج کو اس بات کی تشخیص کرنی چاہیے کہ اتی سار (اسہال) پکو ہے یا اپکو، یعنی دستوں میں مواد خام ہے یا آؤں آتی ہے یا مواد پختہ خارج ہوتا ہے۔ اس بات کے لئے اتی سار روگی (مریض) کے دستوں کو پانی میں ڈال کر دیکھنا ضروری ہے، اگر مواد پانی میں ڈوب جائے اور ساتھ ہی پھٹا ہوا ہو تو سمجھنا چاہیے کہ اتی سار اپکو یا عام اتی سار ہے اور اگر مواد پانی میں تیر جائے اور پھٹا ہوا بھی نہ ہو تو پکو اتی سار جاننا چاہیے، گو یا پانی میں ڈوبنے سے اسہال خام اور تیرنے سے اسہال پختہ کا یقین کر کے علاج شروع کرنا چاہیے اور مندرجہ بالا لکھی گئی ہدایات کے مطابق علاج کرنا چاہیے، مندرجہ ذیل مجربات طب آیور وید میں دستوں کے لئے نہایت زود اثر ہیں۔

آئند بھروس (رسیندر سار):۔ شدھ گندھک، شدھ میٹھاتیلیہ، شدھ سوہاگہ، شدھ شنکرف، ترکٹا، برابر وزن، سب کو رسیموں میں کھل کر کے ایک ایک رتی کی گولیاں بنالیں، خوراک ایک گولی ہمراہ عرق گاؤ زبان یا شہد دیں، دستوں کو بند کرنے کے علاوہ بخار ورجسمانی سستی کے لئے مفید ہے۔

اجیرن کنٹک رس:۔ مگھان، میٹھاتیلیہ شدھ، سہاگہ بریاں، شنکرف شدھ ہر ایک ایک تولہ، مرچ سیاہ دو تولہ۔
ترکیب نیاری:۔ میٹھاتیلیہ کو رس لمیوں میں چار گھنٹے تک کھل کر کے پھر شنکرف ڈال کر دو گھنٹے تک کھل کر لیں، بعد ازاں باقی ادویات میں شامل کر کے رس لمیوں میں دو دن تک کھل کر لیں اور ایک ایک رتی کی گولیاں بنالیں، خوراک ایک ایک گولی دن میں دو بار کھانا کھانے

کے بعد ہمراہ عرق سولف دیں، بدھنی، دست اور ہینڈ کے لئے مفید ہے۔
 کرپورس (بھیشج رتناولی) :- اینون خالص، شنگرف شدھ، کافور، موہتا، جالفل برابر وزن، سب کو سادہ پانی کے ساتھ کھل کر کے
 ایک ایک رتی کی گولیاں بنائیں۔

فوائد :- ایک گولی ہمراہ عرق سولف دن میں دو بار صغراوی اور خونی دستوں، ہینڈ اور سنگرہنی کے لئے مفید ہے۔
 بعض دندہ اس کے استعمال سے پریٹ میں اچھا رہ جاتا ہے۔ اس لئے اسے احتیاط سے استعمال کریں۔ اچھا رہ کی صورت میں سولف کو پانی میں جو
 دے کر چھان کر پی لیں۔ اچھا رہ درست ہو جائے گا۔

کرپورس (بھیشج رتناولی) :- جس کا نسخہ اس کتاب کے صفحہ نمبر ۱۷۶ پر درج ہے۔ دست روکنے کے لئے نہایت مفید ہے، خوراک پانچ
 تادس بوند ہمراہ عرق سولف یا پودینہ دیں۔

اسی بھین آسو (بھیشج رتناولی) :- خوراک پانچ تادس بوند ہمراہ عرق سولف ہر تین گھنٹہ بعد دیں، اسہال متے، دست وغیرہ کے لئے از حد مفید ہے۔
 اگر اس سے اچھا رہ پیدا ہو تو سولف کا جو شانہ پلا لیں۔

اسی بھین ولی :- اینون خالص ڈیڑھ ماشہ، زعفران کشمیری ایک ماشہ، ہینگ خالص چھ رتی، تینوں اشیا رکوپس کر ایک چھوہارہ کی گٹھلی الگ کر کے
 اس میں بھریں اور دھاگا لپیٹ کر اوپر گھونڈ کے آٹے کا لپ کر کے چند منٹ اُپوں کی دھکتی آگ میں رکھیں۔ جب آٹا سُرخ ہو جائے تو نکال کر ٹھنڈا کر کے
 آٹا اُتار کر پھینک دیں اور چھوہارہ وغیرہ خوب باریک میں کر گولیاں بقدر دانہ موٹھ تیار کریں، وات اتی سار میں جب مادہ خام نہ ہو، صرف ایک دو خوراک
 دینے سے دست بند ہو جائیں گے۔ جب آرام آجائے تو چار یا چھ گھنٹہ بعد خوراک دی جائے۔

دیگر :- صرف خالص گھی میں بھنی ہوئی ہینگ ایک رتی سے تین رتی مرلیض کو ہمراہ گرم پانی دیں۔ بادی کے دست بند ہو جائیں گے۔
 دیگر :- گل دھاوا، رال سفید برابر وزن سفوف بنالیں، خوراک تین ماشہ دہی کی لسی سے دیں (لوہے کو آگ میں سُرخ کر کے لسی میں بچھا کر
 پلائیں) بار بار دست آتے ہوں تو اس کی ایک خوراک سے آرام آجاتا ہے۔

گنگا دھر چورن :- ناگر موہتا، اندر جو، بیل گری، لودھ پٹھانی، سوچرس، گل دھاوا، سب برابر وزن سفوف بنالیں، خوراک دو ماشہ چا و لو
 کے پانی یا عرق الائچی سے دیں، دستوں کو روکتا ہے، پیچش بٹاتا ہے۔ سخت قابض ہے۔ بچوں کو ایک رتی سے دو رتی ہمراہ عرق سولف دیں۔

دستوں کو روکنے کے لئے آسان آئیور ویک نسخے

۱۔ اجود، موچرس، گل دھاوا، سوٹھ ہموزن، سب کو نہایت باریک میں کر سفوف بنائیں، خوراک ایک سے تین ماشہ تک دن میں تین بار لگا
 کی دہی کی چھاچھ کے ہمراہ کھلائیں، دستوں کو مفید ہے۔

۲۔ کافور، ہینگ بریاں، اینون جملہ وزن برابر لے کر پانی کے ساتھ آدھی آدھی رتی کی گولیاں بنائیں، خوراک ایک گولی ہمراہ عرق سولف دیں، ہر قسم
 دستوں کے لئے مفید ہے۔

۳۔ تین ماشہ ہرڑ کو خالص گھی گائے میں بھون کر سفوف بنا کر ایک دو خوراک دینے سے عام اتی سار کو آرام آجاتا ہے۔

۴۔ الائچی سفید، مصطکی رومی، سولف برابر وزن میں کر سب کے برابر مہری ملا کر بقدر تین ماشہ دو تین بار مرہ آٹہ سے دیں۔ دستوں کو روکنے کے
 از حد مفید ہے۔

۵۔ سولف پانچ تولہ، بیل گری اڑھائی تولہ، گل دھاوا اڑھائی تولہ، تینوں کو آدھ سیر پانی میں جوش دیں، چوتھائی رہنے پر مل چھان کر آدھ سیر چینی

شریت بنائیں اور پانچ سے دس قطرے دن میں دو تین بار چٹائیں۔ یہ شریت اسہال بچکان کے لئے مفید ہے۔
ہومیوپیتھک علاج :- دانت نکلنے کے زمانہ میں بچہ دودھ کی قے کرے۔ دست سبز زرد یا دودھ کی مانند ہوں تو ایچوزا ۶۔ زرد رنگ کے دست، دست روک نہ سکا، لیکن ہوا کے ساتھ دست بھی خارج ہونا، صبح کو زیادتی ہو تو ایلیوز ۳۰۔ ۲۰۰۔ کبھی نقض، کبھی دست، کوئلہ مٹی، چاک وغیرہ کھانے کی خواہش، دست زرد رنگ کر خارج ہوں تو ایلیونیا ۳۰۔ ۲۰۰۔ دست بند اور زرد رنگ کے لیس دار، پاؤں میں سوزش ہو تو ایپس ۳۰۔ بدبو دار سبز یا جی دست، مٹھائی کھانے کی خواہش رہے، گھبراہٹ سے دست لگ جائیں، دانت نکلنے کے زمانہ میں دست، چہرہ بوڑھوں کی طرح، نفخ شکم، پڑ پڑ کی آواز، کچھ کھاتے ہی فوراً دست ہوں تو آرٹھیم نائٹ ۳۰۔ ۲۰۰۔ پانی کی طرح دست پھکاری کی طرح ہوں تو کروٹن ٹنگ ۳۰۔ ۲۰۰۔ کھٹی بو والے دست، تمام بدن میں ترش بو ہو تو ریمو ۳۰۔ ۲۰۰۔ جسم سرد، چادلوں کی پیچیدگی مانند دست، سرد پسینہ، تشنچ تک فوبت آئے تو ڈرائیٹرم ایلب ۶۔ موسم کی تبدیلی پر درد والے دست ہوں تو ڈلکایرا ۳۰۔ پھٹکی دار دست پتلے وزرد رنگ کے صبح کے وقت زیادتی ہو تو پودوفالٹم ۳۰۔ پھل کھانے سے دست، بد معنی کے دست، زرد رنگ کے ہوں تو چائنا ۳۰۔ ۲۰۰۔ سوکڑے کی شکایت والے تپنے کے دانت نکلنے کے زمانہ میں دست ہوں تو کلکیر یا فاس ۶x۔ پتلے چکنے والے دست، ساتھ بخار ہو تو مفید ہے فریم فاس ۶x۔ بغیر درد کے پانی کی طرح دست جس سے کمزوری نہ ہو تو ایڈن فاس ۳۰۔ ۲۰۰۔ بستر سے اٹھتے ہی پاخانہ کو دوڑنا پڑے تو سلفز ۳۰۔ ۲۰۰۔ غذا اور پرہیز :- زود ہضم اور ہلکی غذائیں، ساگودانہ، مونگ کی کھچڑی، چوزہ مرغ اور کبری کا شور یا یا بخنی دیں، ثقیل، نفاخ، گرم، ترش اشیاء مرتج مصالحہ سے سخت پرہیز کرائیں۔

رکت اتی سار، خونی دست، اسہال الدم، میلنیا، (Melena)

تعریف مرض :- اگر دستوں کا مریض نہایت کثرت سے گرم اشیاء کا استعمال کرے، تو اس کو نہایت خطرناک خونی دستوں کا مرض لاحق ہوتا ہے، جس میں نہایت کثرت سے خون کے دست آتے ہیں۔
وجوہات :- معدہ کا زخم، آنتوں کی سوزش، کمی خون، بواسیر، خون کی کثرت، عورتوں میں ایام کی بندش سے خون کے دست آتے ہیں۔
علامات :- متلاز جگر کی کسی رگ کا پھٹ جانا، آنت کا شق ہو جانا وغیرہ اس کی وجوہات ہیں۔
علامات :- پاخانہ سیاہ رنگ کا خون آمیز آتا ہے، کبھی خالص خون کے دست آتے ہیں، جس سے مریض نہایت کمزور ہو جاتا ہے۔
علاج ڈاکٹری :- کیلشیم لکٹیٹ ۵ اگرین ہر چوتھے گھنٹے بعد پانی سے کھلائیں اور برون کے پانی کی موسم کے مطابق حقنہ کریں مفردات میں ٹنگر اوپیم دس سے پندرہ بوند پانی میں ملا کر دیں، اگر خون زیادہ خارج ہو جائے تو گلوکوز یا نارمل سیلائن کا انجکشن کریں۔
جریان خون روکنے کے لئے ارگوٹین (Argotin) کا انجکشن بھی مفید ہے۔ مقدار خوراک ۱/۲ سے ۱/۴ اگرین ایک سی سی آب کشید میں زیریہ انجکشن زیر جلد دیں۔ اس کی مارکیٹ میں عام طور پر گولیاں ملتی ہیں، جو کشید شدہ پانی ایک سی سی میں ایک گولی حل کر کے انجکشن کے ذریعہ دی جاتی ہیں، یہ انجکشن رحم، پیچیدہ یا دیگر بدن کے کسی اعصاب سے جریان خون ہوتا ہو تو مفید رہتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کا انجکشن

لگانے سے رحم صاف ہو جاتا ہے، جو دوائیں اسہال کے بیان میں لکھی گئی ہیں۔ اس میں بھی مفید ہیں۔
یونانی علاج :- اصل سبب کو دور کریں اور رب انار یا رب ہی یا شربت حب آلاس یا شربت انجبار دیں، مندرجہ ذیل مجربات اس مرض میں خاص طور پر مفید ہیں :-

سفوف اسہال خونی :- آم کی گٹھلی کا مغز اور جاسن کی گٹھلی کا مغز برابر وزن لے کر سفوف بنائیں، خوراک پانچ ماشہ ہمراہ تازہ پانی استعمال کرائیں، خونی دستوں اور خونی بواسیر کے لئے از حد مفید ہے۔ ذیابیطس اور جربان کو بھی فائدہ مند ہے۔
دیگر :- کھٹہ سفید سفوف چھ ماشہ، الاچی خور دسفوف تین ماشہ، الیغول سالم ایک تولہ، چینی سفید سفوف ایک تولہ، ان میں چھ ماشہ کی پڑیا ہمراہ دی استعمال کریں۔ نہایت آسان اور مفید علاج ہے۔

دیگر :- سماق پانچ ماشہ، حب آلاس پانچ ماشہ، جڑ انجبار ۹ ماشہ، جوش دے کر صاف کر کے دم الاخوان ایک ماشہ، سنگ جراح (سفوف شدہ) ایک ماشہ چھڑک کر دن میں تین بار پلائیں۔ اس نسخہ کا پھوگ دوسرے وقت دے سکتے ہیں۔
آیور ویدک علاج :- خونی دستوں کے علاج میں نہایت ہوشیاری سے کام لیا جائے، اگر یقینی اور فوری علاج نہ کیا جائے، تو نتیجہ خراب ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل مجربات خونی دستوں کو بند کرنے کے لئے از حد مفید ہیں :-

وٹسکا دی کو اٹھ :- کڑا اچھال، بیل گری، ناگر موٹھا، اتیس، خس، جملہ ادویہ دو تولہ جو کو ب کر کے حسب معمول جو شانہ بنا کر مریض کو پلانے سے درد کے ساتھ ہونے والے سخت سے سخت خونی دست بند ہو جاتے ہیں، پچیش، مروڑ اور عام اتی سار کو بھی دور کرتا ہے۔
دیگر :- صندل سفید کی لکڑی کو سل پر گھس کر بقدر چار رتی سے چھ رتی شہد ملا کر ہمراہ آب چاول دن تین یا چار بار دیں۔ اس سے یقیناً رکت اتی سار رفع ہو جاتے ہیں۔

دیگر :- چھلکا انار، کڑا اچھال ہر ایک ایک تولہ حسب معمول جو شانہ بنا کر اس میں شہد و مصری ملا کر مریض کو پلانے سے ہر قسم کے خونی دستوں کو یقیناً فائدہ ہو جاتا ہے۔

دیگر :- سفوف ناگ کیسرتین ماشہ، مکھن ایک تولہ میں ملا کر دن میں دو یا تین بار کھانے سے خونی دست (رکت لتی سار) بند ہو جاتے ہیں۔
ہومیو پیتھک علاج :- دست خونی یا خون بلا آئے تو ہومیو پیتھک طب میں اپنی کاک، سیلاڈونا، آرسنک وغیرہ بہترین ادویات ہیں، انہیں حسب موقع اور مریض کے مزاج کے مطابق استعمال میں لانا چاہیئے۔
غذا و پرہیز :- گرم و دیرینہ غذا سے سخت پرہیز کرائیں، خوراک میں چاول کا استعمال مفید ہے، باقی غذا و پرہیز بطور اسہال کے کرائیں۔

پڑواہکا، پچیش، زحیر، ڈسینٹری، (Dysentery)

تعریف مرض :- اس مرض میں آنٹوں میں درد ہو کر زخم بن جاتے ہیں۔ جس سے پیٹ میں مروڑ ہو کر درد کے ساتھ اجابت ہوتی ہے۔
وجوہات :- اطباء قدیم نے پچیش کی دو قسمیں مقرر کی ہیں، (۱) پچیش صادق (۲) پچیش کاذب۔
پچیش صادق میں انٹریوں میں سُدہ نہیں ہوتا، اس لئے اس کا علاج قابضات سے کرنا چاہیئے۔
پچیش کاذب میں انٹریوں کے اندر سُدہ پیدا ہو کر رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور سُدہ کی وجہ سے بار بار پاخانہ کی حاجت ہوتی ہے۔ اس کا علاج سب سے پہلے سُدہ خارج کرنا ہے، اس کے لئے کیسٹرائیل وغیرہ سے سُدہ دور کیا جائے۔ اس کے بعد قابض ادویات دی جائیں۔

ڈاکٹری طریقہ علاج میں پیش کو ایک جراثیمی مرض قرار دیا گیا ہے اور جدید تحقیقات کے مطابق یہ ایک متعدی یعنی چھوت کا مرض سے جو ایک مریض سے دوسرے کو ہو جاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔

۱۔ بسی لری (Bacillary) - ۲۔ امی بک (Amoebic) -

۱۔ بسی لری ڈائی سنٹری :- یہ قسم عام طور پر معتدل آب و ہوا میں ہوتی ہے اور اس کا جرثومہ پاخانہ مریض کے جراثیم لگے کپڑوں اور مکھیوں سے خراب مٹی اور خراب پانی سے مرض پھیلتا ہے، اس جرثومہ کا نام شیکا بسی لری (Shigabacillus) ہے یہ چھوت لگنے سے دو سے تین دن بعد علامات مرض پیدا کر دیتا ہے۔

علامات :- اس مرض میں انتڑی متڑم ہو جاتی ہے، پاخانے کی بار بار حاجت ہوتی ہے اور پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ دست زیادہ تعداد میں ۳۰ یا ۴۰ بار اور مقدار میں کم ہوتے ہیں، دستوں کے ساتھ خون کی آلائش اور غشائے مخاطی بلغمی جھلی بھی خارج ہوتی ہے۔ اس مرض میں ہضم کے آلات بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ مرض مزمن صورت اختیار کر جاتا ہے۔

۲۔ امی بک ڈائی سنٹری :- یہ بلغمی پیش ہے۔ اس قسم مرض کا سبب امی بک جرثومہ ہے اور گرم ملکوں میں وبائی طور پر پھار ہوتی ہے، اس کا جرثومہ گندے پانی، مکھیوں، کچے پھلوں و سبزیوں کے ذریعے پیٹ میں جاتا ہے۔ اس کے جرثومہ کو انٹامیبا کول (Antamoebacole) کہتے ہیں۔

علامات :- یہ مرض آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے، جگر میں سوجن ہو جاتی ہے اور دست خونی، سیاہی مائل اور پتلی، بلغمی جھلی نہایت بدبودار اور تحض ملی ہوتی ہوتے ہیں، دستوں کی تعداد کم اور مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ یہ مرض بار بار عود کرتا رہتا ہے۔ جبکہ علاج نامکمل ہو اور پرہیز نہ کیا جائے۔

علاج :- اس مرض کے علاج میں وجوہات، مرض کی تشخیص اور ان کا دور کرنا علاج میں کامیابی کی ضمانت ہے۔

ڈاکٹری علاج :- امی بک ڈائی سنٹری کے لئے ایبٹین اس مرض کی کامیاب دوا ہے۔ اس کا عضلاتی ٹیکہ آدھی سے ایک گرین کا روزانہ کرنا ہئے۔ ایک دو ٹیکوں سے ہی آرام آ جاتا ہے۔ لیکن کورس ۶ یا ۱۲ ٹیکے ہیں۔ شام کے وقت لگانا زیادہ مفید ہے۔ کیونکہ اس کے استعمال سے اکثر مریضوں قے آتی ہے، علاوہ ازیں جگر کی سوجن یا پھوڑا بھی اس انجکشن سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔

آج کل جدید ادویات میں انٹروڈیو فام (Enteroviofoam) یا انٹروکوئینال (Enterokinol) مفید ادویات ہیں۔ ایک سے دو گولی دن تین بار دی جائے۔

سلفا ڈرگز میں سلفا گوانی ڈین چار گولی فوراً اور اس کے بعد دو گولی ہر چار گھنٹہ بعد دی جائیں، اس مرض کے لئے سلفا ڈایازین، سلفا ٹرائیڈ وغیرہ مفید ہیں۔ مگر ان کی خوراک سلفا گوانی ڈین سے آدھی رکھی جائے۔ اس سے مریض کو فوراً آرام آ جاتا ہے۔ اگر اسہال بہت زیادہ آگئے ہوں تو ناسل سیلائن لکوز سیلائن کا انجکشن کریں۔

انٹی بائیوٹک ادویات میں سے ٹیرامائی سین (Teramycin) اور آریو مائی سین (Aureomycin) مفید ادویات ہیں، بالغ آدمی کے لئے ایک گولی دن میں دو سے چار بار اور بچوں کے لئے آریو مائی سین پیرسائیڈز آدھے سے ایک چمچ دن میں تین بار استعمال کرائیں۔

اس کے علاوہ مینی سلین کا استعمال بھی مفید ہے، پروکین مینی سلین چار لاکھ یا مینی سلین پانچ سے دس لاکھ یونٹ کا استعمال مفید ہے۔ بچوں کو عمر کے مطابق دیں، دسی طریقہ علاج کے مطابق اس مرض کا علاج شروع کرنے سے پہلے ایک اونس کیسٹریل کا جلاب دے لینا مفید رہتا ہے۔

بسی لری ڈائی سنٹری کا علاج :- امی بک ڈائی سنٹری کی طرح اس پیش کے علاج میں بھی سلفا گوانی ڈین (Salfagaynadan) مفید ہے۔ ایک گولی دن میں چار بار ہمراہ تازہ پانی دیں، ہضم کی خونی، بلغمی، پیش جس میں میو کس ممبرین خارج ہوتی ہوئے کے لئے اول درجہ کی دوا ہے، علاوہ دیگر آلات ہضم وغیرہ کے لئے بھی مستعمل ہے۔

انٹی بائیوٹک علاج میں آریو مائی سین اور ٹیرامائی سین جن کا ذکر امی بک ڈائی سٹری میں کیا گیا ہے، کا استعمال از حد مفید ہے۔
کیسٹر آئیل امیلشن (برائے قبض و پھیش)، کیسٹر آئیل چارڈرام، آئیل آف سناموم تین قطرہ، گم الکیشیا ایک ڈرام، اکوا بقدر دواؤں، امیلشن بنا کر استعمال کریں۔ بیماری کے بعد کمزوری کے لئے فولاد اور وٹامن کے مرکبات دیں۔

معمولی پھیش میں پہلے تو کیسٹر آئیل نصف اونس کا جلاب دیئے اور پھر کلور وڈین دس بوند دو سے تین بار دینے سے آرام آجاتا ہے۔
یونانی علاج میں مندرجہ ذیل مجربات پھیش کے لئے از حد مفید ہیں۔ اگر پیٹ کے اندر سدا ہو تو اسے خارج کرنے کے لئے تین تو لہ کیسٹر آئیل کا جلاب دے کر پھر ان نسخوں میں سے کسی ایک کا استعمال کرائیں۔

سفوف پھیش :- سولف، سونٹھ، ہڑ کالی، خشخاش ہر ایک پانچ تولہ، سفوف کر کے خالص گھی گائے میں چرب کر کے تین ماشہ دن میں تین بار ہمراہ عرق سولف دیں۔

پھیش سدی، غیر سدی، بلغمی و خونی وغیرہ کے لئے از حد مفید ہے۔
دوائے پھیش :- جب آنتوں میں دُرم کی ابتداء ہو، آنتوں میں درد، مروڑ و پھیش شروع ہی ہو، تو اس وقت چھلکا ایسبول چھ ماشہ ہمراہ شربت کھانڈ دن میں تین بار استعمال کریں، اس کے استعمال سے ایک دن میں ہی پھیش کو آرام آجاتا ہے، بعد میں گرم مصالحہ اور لال مرچ سے پرہیز ضروری ہے۔
سفوف پھیش :- سولف پانچ تولہ، بیل گری ایک تولہ، دھنیا ایک تولہ، مصری تین تولہ، سفوف بنائیں، خوراک چھ ماشہ دن میں تین بار دیں پھیش کا خون بند کرنے کے لئے بہت مفید ہے۔

دیگر :- سولف پانچ تولہ، بیل گری پانچ تولہ، مصری دس تولہ، تمام ہر ایک کر کے سفوف بنائیں، خوراک چھ ماشہ ہمراہ تازہ پانی دیں۔ ہر قسم کی پھیش خصوصاً خونی پھیش کے لئے از حد مفید ہے۔

شربت انجبار :- خون بھٹکنے اور خونی دستوں کو روکتا ہے اور حرارت کو تسکین دیتا ہے اس میں خوبی یہ ہے کہ قبض پیدا نہیں کرتا۔
پوست جڑ انجبار اڑھائی تولہ، اقاتیا ۹ ماشہ، صندل سفید پونے دو تولہ، صندل سُرخ پونے دو تولہ، سب کو ایک سیر پانی میں رات کو بھگو رکھیں صبح جوش دیں، جب نصف پانی رہ جائے، تو شکر سفید آدھا سیر ملا کر شربت کے قوام پر لے آئیں، خوراک دو تولہ پانی میں ملا کر پلائیں۔
شربت حب آلاس :- دستوں کو بند کرنے کے لئے خصوصیت سے مفید ہے، حب آلاس ایک پاؤ کو پانی میں آدھا گھنٹہ جوش دے کر چھان لیں، اس میں ڈیڑھ سیر چینی ملا کر دو تولہ شربت تیار کریں۔ خوراک دو تولہ پانی میں ملا کر پلائیں۔

بچوں کی پھیش میں مندرجہ ذیل مجربات نہایت مفید ہیں :-
۱۔ چھلکا ایسبول ایک ماشہ، شربت انجبار چھ ماشہ ملا کر چٹائیں۔

۲۔ لعاب ریشہ خطمی، لعاب بی دانہ ہر ایک ایک ماشہ نکال کر شربت انجبار یا شربت خشخاش چھ ماشہ ملا کر دن میں دو یا تین بار پلائیں۔
۳۔ ریشہ خطمی، تخم کنوچہ، تخم بارتنگ، حب آلاس، سولف، پھول گلاب ہر ایک ایک ماشہ، گل قند تین ماشہ، پانی میں جوش دے کر پلائیں، اور چھلکا ایسبول چار رتی چھڑک کر پلائیں، اگر خون آتا ہو تو جڑ انجبار ایک ماشہ کا اضافہ کریں۔

۴۔ سولف، بیل گری، سونٹھ ہر ایک تین ماشہ، مصری پانچ ماشہ، سفوف بنائیں پہلے روز ایک ماشہ، دوسرے روز ڈیڑھ ماشہ، تیسرے روز دو ماشہ، بچے کو عمر کے مطابق دیں۔

دوائے سیاہ پھیش :- ہڑ سیاہ دس تولہ گھی خالص میں چرب کر کے کوٹ چھان لیں اور چینی دس تولہ ملا کر سفوف بنالیں، خوراک چھ ماشہ ہمراہ چھ تولہ رب بنی چاول ساھی کے پانی سے استعمال کرائیں، بڑوں کی پھیش کے لئے مفید ہے۔

اس مرض کی تشخیص میں دست، پاخانہ میں جھاگ، بدبو اور چکنائی کا اضافہ، زبان کی سوجن وغیرہ سے باسانی تشخیص کی جاسکتی ہے۔
 علاج :- مریض کو بد پرہیزی سے بچائیں، اول مریض کو دو تین دن سلفا گونے ڈین دو گولی، کم الکیشیا آدھا ڈرام، کیسٹر آیل آدھا ڈرام، کلوروڈین پندرہ بوند، عرق سولف ایک اونس، ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین بار پلائیں۔ اگر مریض کمزور ہو تو اسی نسخہ کی ایک خوراک کی جگہ دو خوراک بنا کر دیں اور اس کے بعد ڈامن بی ۱۲، ۵۰۰ مائیکرو گرام ایک سی سی کا روزانہ انجکشن دیں اور سنگر مہنی کے علاج میں معالج کو ڈامن بی ۱۲ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اگرچہ پور ایکسٹریکٹ، فولک ایسڈ، نکوٹینک ایسڈ بھی اس مرض میں مفید ہیں، لیکن ڈامن بی ۱۲ اس کے لئے از حد مفید ہے، اگر کمی خون ہو تو پور ایکسٹریکٹ ایک سی سی ہفتہ میں ایک بار عضلاتی ٹیکہ کریں۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ میکراہین (Mecrabin) یہ گلیکسوک کی ڈامن بی ۱۲ ہے، یہ انیمیا، سنگر مہنی و یرقان میں مفید ہے۔ ایک سی سی کا روزانہ عضلاتی انجکشن کریں۔ ایک دو انجکشن سے فائدہ ہونا محسوس ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ فولک ایسڈ ۲۰ ملی گرام کی گولیاں روزانہ دو ہفتہ تک کھلائیں۔ نہایت مفید ہیں۔

۲۔ پور ایکسٹریکٹ ۳۰ تا ۵۰ یونٹ کا عضلاتی انجکشن ہفتہ میں ایک بار کریں اور فولک ایسڈ کی تین ٹیکہ روزانہ تازہ پانی سے کھلائیں۔
 ۳۔ میکراہین الیگزرائٹ چمچ، روبراٹون الیگزرائٹ چمچ، دوپہر اور شام پلائیں، اور میکراہین ٹیبلٹ دن میں تین بار، فرسولٹ ٹیبلٹ دن میں تین بار کھلانے سے دو تین روز میں مرض دور ہونے لگتا ہے۔

۴۔ پروکیوٹ (Prokyvit) برٹش ڈرگ سنگر مہنی و جریان خون کے لئے مفید ہیں، دس ملی گرام دن میں دو سے تین بار تازہ پانی سے دیں۔ یہ ڈامن کے کا تجارتی نام ہے۔

۵۔ بیرن ایک ٹیکہ، انٹرو وایوفارم، ڈوٹیکہ، ڈامن بی کمپلیکس، ڈوٹیکہ، سب کو اکٹھا ملا کر تین خوراک بنائیں اور دن میں تین بار تازہ پانی سے دیں۔
 ۶۔ میکروفالین آرن ٹیبلٹ (گلیکسو) ایک ٹیکہ، سی لین ۱۰۰ ملی گرام کی ایک ٹیکہ، دونوں کو باہم ملا کر پانی کے ساتھ دن میں دو بار دیں۔

ڈامن بی ۱۲ و فولاد کا مرکب ہے، کمی خون کے لئے از حد مفید ہے۔

۷۔ روبراٹون الگزر (سکوب) ایک چائے کا چمچ دن میں دو سے تین بار دیں۔ یہ فولاد و ڈامن بی ۱۲ اور فولک ایسڈ کا مرکب ہے۔

۸۔ کال گلو فر (سینڈوز) دو گولی، ریڈ وکسان (روش) ۵۰۰ ملی گرام، دونوں کو باہم پانی کے ساتھ دن میں دو بار دیں، یہ کیشیم + فولاد + ڈامن

ڈی + ڈامن بی ۱۲ + ڈامن سی کا مرکب ہے۔

۹۔ نیوفیرم (کروکس) چائے کا ایک چمچ کے برابر، میکراہین سیرپ (گلیکسو) ایک چائے کا چمچ، دونوں کو آپس میں ملا کر دن میں دو بار پانی سے دیں

یہ فولاد + ڈامن بی ۱۲ کا مرکب ہے

۱۰۔ ہیموپلان (HEMOPLAN) کھنڈیوال ایک ایک کیپ شول بعد از غذا دن میں تین بار دیں۔ یہ فولاد، پور ایکسٹریکٹ، ڈامن بی

وغیرہ کا مرکب ہے۔

۱۱۔ ہیما ٹرین (Hematrine) سینڈوز ایک ایک کیپ شول کھانا کھانے کے بعد صبح و شام پانی کے ساتھ دیں۔

نوٹ :- معالج کو سنگر مہنی کے علاج میں ڈامن بی ۱۲ کو نہیں بھولنا چاہیے، اگرچہ پور ایکسٹریکٹ، فولک ایسڈ، نکوٹینک ایسڈ

بھی اس مرض میں مفید ہیں، لیکن ڈامن بی ۱۲ اس کے لئے سب سے زیادہ مفید ہے۔

یونانی علاج :- یونانی طریقہ علاج میں کڑا اچھال اس مرض کا نہایت مفید علاج ہے۔ اس سلسلہ میں کڑا اچھال پانچ تولے کر دو گھنٹہ تک بار ایک

کر بارہ خوراک بنائیں۔ ایک پڑیہ گائے کے دودھ کی دہی کے ساتھ کھلائیں اور تمام دن دہی پاتے رہیں، اگر شک لگے تو دہی چاول دیں ہفتہ بھر میں

سے چٹکارا مل جائے گا۔
دوائے اسہال کہنہ :- زیرہ سفید، بیل گری، طباشیر، مصطکی رومی، سب برابر وزن کوٹ کر مقدار خوراک چار سے چھ ماشہ دن میں تین بار ہمراہ سرد پانی دیں۔ چند دنوں میں ہر قسم کے دست دور ہو جائیں گے۔ نہایت ہی مفید چیز ہے۔
کشتہ کوڑی :- کوڑی زرد دس تولہ لے کر آگ میں گرم کر کے رس لیموں میں بھجادیں، ختمہ کہ نرم قابل پینے کے ہو جائیں، بعد باریک پیس کر رس لیموں میں ایک دن کھل کر کے ٹکیہ بنا کر کوڑہ گلی میں رکھ کر دس سیراپوں کی آگ دیں، سفید کشتہ برآمد ہوگا۔
خوراک :- ایک سے تین رتی تک ہمراہ سرد پانی، بچوں کو چوتھائی رتی سے آدھی رتی عمر کے مطابق دیں۔ یہ کشتہ سنگرہنی اور امراض طحال کے لئے مفید ہے۔

نوٹ :- چونکہ زرد کوڑی میں فاسفیٹ آف لائم زیادہ پایا جاتا ہے اس لئے عام کوڑی کی جگہ زرد کوڑی کا استعمال کیا جائے۔
علاوہ ازیں سنگرہنی کے لئے "جوارش انارین" کا استعمال بہت مفید ہے، خوراک چھ ماشہ سے ۹ ماشہ تک ہمراہ پانی صبح و شام استعمال کریں۔
دوائے سنگرہنی :- کڑا اچھال پانچ تولہ، پھول گلاب اڑھائی تولہ، دارہ الاچھی کلاں سوا تولہ، سب کا سفوف تیار کریں، خوراک دو سے تین ماشہ گرمیوں میں دہی کی سستی (چھاچھ) اور سردیوں میں نانازہ پانی سے دیں۔
آیور ویدک علاج :- (۱) وات گرمی کا علاج :- اجود، سونٹھ، کالی مرچ، فلفل دراز، زیرہ سیاہ، زیرہ سفید، ہینگ بریاں، سیندھانک، جملہ ادویہ برابر وزن لے کر سفوف بنائیں، اس کا نام "ہنگواشٹک چورن" ہے۔ یہ بقدر تین ماشہ دن میں تین بار ہمراہ چھاچھ یا گرم پانی دیں۔ حرارت باضمہ تیز ہو کر وات گرمی (سوداوی سنگرہنی) دور ہوتی ہے۔

۲۔ **تب گرمی کا علاج :-** جائفل، لونگ، الاچھی خورد، تیز پات، دارحینی، آملہ (گٹھلی خارج شدہ)، ناگ کسیر کا فور، سفید چندن (صندل سفید) تانہیں پتر، طباشیر، تل دھوئے ہوئے، تنگر، لکھاں، چھلکا ہڑ زرد، کلونجی، اچھال جڑ چترک، سونٹھ، باڑنگ، مرچ سیاہ، سب برابر وزن لے کر سفوف بنائیں، اور اس کے برابر ہینگ کے پتے ملائیں، پھر سب کے برابر مسری ملا کر سفوف بنائیں، یہ طب آیور وید کا مشہور و معروف "جاتی پھل آدی چورن" کا نسخہ ہے جو سنگرہنی کو دور کرنے کے لئے بے مثل ہے۔ باضمہ کی کمزوری کو دور کر کے آنٹوں کو طاقت دیتا ہے اور پافانہ بندھا ہوا لاتا ہے۔

خوراک ایک ماشہ سے تین ماشہ تک ہمراہ مشرب انار یا چھاچھ دن میں تین بار دیں۔ تب گرمی (صفرادی سنگرہنی) کے لئے نہایت ہی مفید ہے۔
کفج گرمی کا علاج :- دشمل ارشٹ (شارنگدھر) ایک سے دو تولہ برابر پانی ملا کر دیں اور بعد از غذا دونوں وقت لیں، کفج گرمی (بلغھی سنگرہنی) کے لئے نہایت مفید ہے یا اسی پین وٹی ایک سے دو گولی ہمراہ عرق سولف کھلائیں۔ یہ بھی کفج گرمی کے لئے مفید ہے۔
سپانج گرمی کا علاج :- بیل گری، موچرس، مشک بالا، ناگر مونتھا، اندر جو، کڑا اچھال، جملہ ادویہ چار تولہ، دودھ بکری ایک سیر، ادویہ کو جو کو ب کر کے دودھ میں اس قدر جوش دیں کہ ۳ سیر رہ جائے۔ چھان کر یہ دودھ مقوڑا مقوڑا امراض کو پلائیں، سپانج گرمی (سودا، بلغم، صفراسے پیدا شدہ سنگرہنی) کا نہایت کامیاب اور اعلیٰ علاج ہے۔

مستادی چورن :- ناگر مونتھا، بیل گری، اتیس، اندر جو ہر ایک ہوزن لے کر خوب باریک پیس کر اور اس میں شہد ملا کر تین ماشہ سے ایک تولہ تک دن میں دو یا تین بار دیں، اس کے استعمال سے سپانج گرمی (ہرر اخلاط سے پیدا شدہ سنگرہنی) دور ہو جاتی ہے۔
سنگرہنی مرض کا عام علاج :- یہاں سنگرہنی روگ کے عام علاج کا مطلب ہے کہ اگر خلط کی پہچان نہ ہو سکے تو جو ادویات دی جائیں۔ ان سے مرض کو فائدہ ہو سکے، چنانچہ آیور ویدک شاستروں میں لکھا گیا ہے۔

انش انش تیر و نام و ویکتم بنو شکینات
 سادھارنیم گریام تر و دیا تو چکستک

مطلب :- جہاں محتاج مرض کے اسباب یعنی پیدا کرنے والے دوشوں (اخلاط) کے ایک ایک حصہ (انش انش) کو یقینی طور پر نہ جان سکے۔ تو اس کو عام علاج کی طرح چکنتا (علاج) کرنی چاہیے۔

سنگرہنی مرض کے عام علاج کے مجرب نسخے مندرجہ ذیل ہیں :-

جاتی پھل آدی چورن :- ایک ماشہ سے تین ماشہ ہمراہ شربت انار یا چھاچھ یا شہد دن میں تین بار دیں۔
کنک سندرس :- شنگرف شدہ، مرچ سیاہ، گندھک شدہ، لکھاں، بیج دھتورہ شدہ، میٹھا تیلیہ شدہ، سہاگہ بریاں، میٹھا تیلیہ کو سبز بھنگ کے پانی میں تین گھنٹہ تک کھل کر کے پھر بیج دھتورہ شدہ ملا کر سبز بھنگ کے پانی میں کھل کریں۔ پھر شنگرف ڈال کر کھل کر کے باقی ادویہ ملا دیں اور بھنگ کے پانی میں کھل کر کے خشک کر کے سفوف بنالیں۔

خوراک دورتی سے تین رتی تک ہمراہ عرق سولف یا تانہ پانی سے دیں۔

فوائد :- یہ رس سنگرہنی کو فوراً دور کرتا ہے، ہاضمہ کی کمزوری، بھوک نہ لگنا، غذا کا ہضم نہ ہونا، انٹریوں میں سوزش، دستوں کو دور

کریجے لئے لاثانی علاج ہے، دوران استعمال غذائی طور پر دہی چاول دیئے جائیں۔

ہومیوپیتھک علاج :- فیرم فاس، نکس و امینکا، کالوسنتھ مفید ادویات ہیں۔ اگر مریض کو بغیر درد کے غیر ہضم غذا کے دست آویں کھانا کھانے کے بعد بھی مریض کو پاخانہ جانا پڑے، بے حد کمزوری ہو اور پاخانہ جلد جلد آئے تو چائنا کا استعمال مفید ہے۔ اگر پیٹ میں نفخ و سختی ہو، پاخانہ کارنگ سفید ہو، بد ہضمی کے پاخانے آئیں، کمزوری دن بدن بڑھتی جائے تو کلکیریا کارب مفید ثابت ہوگا۔

قدرتی علاج :- قدیم آیور ویدک و یونانی معالجین نے اس مرض کے لئے دہی کا مٹھا اور چھاچھ آب حیات کی مانند بتلایا ہے اور تجربہ سے یہی ثابت ہوا ہے کہ جب مرض سنگرہنی میں کوئی دوائی کام نہ دے تو دہی اور دہی کی چھاچھ اس کی زندگی بچانے کے لئے امرت کا کام کرتے ہیں، جیسے کہ آیور وید شاستروں میں لکھا ہے :-

گرہنی روگ نام تگر سنگرہنی لکھو دینیم - سیونی بیم سدا گوئم تر دوش شنم مہم

دوسا دھیو گرہنی دوشو بھیشجو مینوشا ییتی - سہر شواپی و ہتر و نا تکر سیہ یونات

یہ تھا ترن حلیم و ہنی ستانسی سیوتا تنھا - نہتی گرہنی روگم تنھا تکر سیہ سیوئم

مطلب :- سنگرہنی کے مریض کے لئے گائے کا خالص تگر مٹھا یا چھاچھ نہایت ہلکی غذا ہے۔ یہ قابض اور حرارت ہاضمہ کو خوب تیز کرتی

ہے۔ لہذا ایسے مریضوں کو ہمیشہ گائے کے دہی کا مٹھا حرارت ہاضمہ کو خوب تیز کرنے والا اور ہر سر اخلاط کو بگاڑ کر درستی پر لانے والا ہے۔

نوٹ :- سنگرہنی کے مریض کو تیز جلاب نہیں دینا چاہیے، ورنہ جریان خون کا سخت خطرہ ہوتا ہے۔

غذا و پرہیز :- ہر قسم کی بادی، ثقیل اور گرم اشیاء سے پرہیز کریں۔ شروع مرض میں صرف دہی اور اس کے بعد دہی چاول مونگ کی کھچڑی وغیرہ دیں۔

کوشٹ بدھشا، قبض، کانسٹیپیشن، (Constipation)

تعریف مرض :- اس مرض میں پاخانہ قدرتی طور پر نہیں ہوتا یا رفع حاجت کے دت زیادہ دیر لگتی ہے۔

وجوہات :- کبھی بلغم کی زیادتی، کبھی دیر ہضم غذاؤں کے بکثرت استعمال سے سہ سے بن جاتے ہیں، ترش چیزوں کا زیادہ استعمال

خون کی کمی، جگر و اعصاب کی کمزوری، موٹاپا، بواسیر، رحم کے امراض، آنٹوں کی خشکی سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- پاخانہ کے وقت دیر لگتی ہے، حواس کند اور اکثر سر میں درد رہتا ہے، جسم کی رنگت زرد ہو جاتی ہے۔ یہ عارضہ دو قسم کا ہوتا ہے، (۱) عارضی، (۲) دائمی۔ عارضی قبض خود بخود بھی دور ہو جاتی ہے، لیکن دائمی قبض کا ضرور علاج کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس سے کئی دیگر امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔

ڈاکٹری علاج :- وقتی قبض کے لئے کیسٹوفین دو عدد یا ویکٹیل پلز ایک سے دو عدد یا کیسٹر آیل ایک اونس یا بروک لیکس ایک عدد دیں، کیلومل پاؤڈر یا کیلومل پلز بھی مفید ہیں۔ علاوہ ازیں فروٹ سالٹ یا کرسچین سالٹ یا سڈ لیز پاؤڈر وغیرہ کا استعمال بھی مفید ہے۔ ان کا متواتر استعمال غیر مفید ہے، کیونکہ منکیات کے کثرت استعمال سے آنٹوں میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں یہ تمام منکین مسہلات گرم پانی میں حل کر کے صلی الصبح دیئے جاتے ہیں، لیکن دراصل فائدہ کرنے والی چیز گرم پانی ہے۔ اگر صبح اٹھتے ہی خالی معدہ پر گرم پانی کا گلاس پیا جائے تو ویسا ہی فائدہ کرتا ہے، لیکو ڈیپرافین ایک چھوٹا چمچ فوراً بعد از غذا صبح و شام پلائیں کہ یہ خوراک سے مل جائے۔ ورنہ یہ معتد (گدا) سے ٹپک کر کپڑوں کو خراب کر دیتی ہے۔ یہ پھسلانے والی دوا ہے اور دوسرے جلابوں کی طرح خراش پیدا نہیں کرتی، لیکن اسے لمبے عرصے تک استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ یہ انسانی جسم میں ڈنامنز طاقت میں رکاوٹ ڈالتی ہے، بعض لوگوں میں قبض کا باعث یہ ہوتا ہے کہ پانی کم پیتے ہیں، اگر غذا کم کھائی جائے، جس کا فائدہ کم ہو، تو پھر قبض کا ہونا یقینی ہے، اس لئے اس کا خیال رکھا جائے۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ پرسے نڈ (Pursennid) سینڈوز — قبض و دائمی قبض میں نئی دوا ہے، سوتے وقت دو کچھ پانی سے دیں۔

۲۔ پیٹرولاگر (Petrolagar) واسٹھ — عادی قبض و حاملہ کی قبض میں مفید ہے۔ بڑوں کو چار چمچے چائے کے برابر دن میں ایک دو بار دیں، دودھ یا پھلوں کے رس یا پانی میں ملا کر دے سکتے ہیں، بچوں کو بلحاظ عمر دیں۔

۳۔ ڈے پلیکس (Dey-Plex) ڈیز — قبض، خرابی ہاضمہ، جزل کمزوری میں مفید ہے۔ ایک کیپ شول ایک دن میں دو بار کھانا کھانے کے بعد تازہ پانی سے دیں۔

۴۔ کریمافن (Cremaffin) بولس — بڑوں کو ایک چائے کے چمچے سے ایک بڑے چمچے تک بچوں کو بلحاظ عمر دیں، بواسیر کے مریضوں کے لئے بہت مفید ہے۔

۵۔ اگے رول (Agarol) جان واسٹھ — دو بڑے چمچے سوتے وقت دیں، بچوں کو چھوٹا چمچ دیں۔

۶۔ بائی اگے رول (Bi-Agrol) بنگال ایمونٹی — دو بڑے چمچے سوتے وقت پلائیں۔

۷۔ اسٹیزین (Istizen) بائر — ہلکی قبض کشا ہے۔ ایک سے دو کچھ رات کو کھانا کھانے کے بعد لیں۔

۸۔ کرو لیکس (Crolax) کروکس — بڑوں کو دو کیپ شول رات کو سوتے وقت کھلائیں۔

۹۔ گلیکسینا (Glaxenna) گلیکسو — سب قسم کی قبض میں مفید ہے، ایک سے دو گولی رات کو سوتے وقت تازہ پانی

سے دیں یا ویکو لیکس یا ڈیکو مکس یا بائی کو لیٹ یا پرسونڈ ان ٹیبلٹ یا ہربو لیکس ایک دو رات کو سوتے وقت کھلائیں۔

۱۰۔ جیولیکس (Julax) ٹی، سی، ایف — ایک سے دو کچھ گرم دودھ کے ساتھ دیں، قبض کے علاج میں موثر ہے، دائمی قبض میں مفید ہے معمولی اجابت کے لئے صرف ایک گولی کافی ہے۔

۱۱۔ ملک آف میگنیشیا (Milk of mag nesia) فلپس — ۱۵ تا ۳۰ سی سی کی مقدار میں براہ دہن سوتے وقت دینا

قبض میں مفید ہے۔

۱۲۔ کیسٹوفین (Castophene) ویکولیٹس (Vaculax) پریگولیٹس (Purgolax) وغیرہ ادویات بھی قبض کے لئے استعمال کی جاتی ہیں۔

۱۳۔ سیبلن (Ciblin) پارک ڈیوس — اس کے دو ڈرام ایک گلاس پانی میں ڈال دیں، جب ایسبؤل کی طرح پھول جائے تو

پی لیں — نوٹ۔ یہ دوا ایسبؤل کی طرح پھول جاتی ہے، لیکن اسے چھلکا ایسبؤل پر ترجیح نہیں دی جاسکتی۔

۱۴۔ بروک لیٹس ایک سے دو تھیں رات کو سوتے وقت منہ میں رکھ کر چوس لیں، اوپر سے گرم دودھ پی لیں، قبض کے لئے مفید ہے۔

۱۵۔ ویجیٹبل، ایکس ٹوٹیلٹس۔ یہ لکیاں کئی کمپنیاں تیار کر رہی ہیں۔ رات کو سوتے وقت ایک یا دو لکیاں تازہ پانی سے دیں۔ صبح ایک یا دو دست آ

جائیں گے — بیرونی بتی گلیسرین مقعد میں رکھیں، پندرہ منٹ بعد پاخانہ آجائے گا۔

۱۶۔ فردٹ سالٹ ۹ ماش، آدھا گلاس پانی میں ڈال کر پی جائیں۔ یہ نکلین سہل قبض کے لئے مفید ہے۔

یونانی علاج :- حیوانی و نباتی ملی جلی غذائیں کھائیں، موٹے یا ان چھنے آٹے کی روٹی مفید ہے۔ دودھ، گھی، تازہ اور خشک پھل آڑو، آلوچہ،

انگور، امرود، سنگترہ، انجیر، آلو بخارا، کشمیری ناشپاتی، آم، خربورہ، شہم، سرسوں اور پالک سرسوں کا ساگ، سبز ماکولات بکثرت کھائیں، تازہ لیموں کا رس،

دو چمچ ایک گلاس گرم پانی میں ملا کر چار بجے شام پیئیں۔ ورزش کرنا اور پیادہ یا چار یا پانچ میل روزانہ چلنا یا دس یا بارہ میل گھوڑے کی سواری کرنا ضروری

ہے۔ اگر یہ تدابیر کافی نہ ہوں تو ایسبؤل ایک تولہ روزانہ دودھ کے ساتھ پھنکا دیں یا روغن بادام ایک تولہ گرم دودھ میں ملا کر پلانا یا اطر فیصل زمانی ۹ ماش

رات کو سوتے وقت دودھ کے ہمراہ کھلانا اکثر مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر قبض شدید ہو تو حقنہ کر لیا جائے۔ اس سے سڈے خارج ہو کر مریض کو آرام

آجاتا ہے۔

انیمیا یا حقنہ کرنے کا طریقہ :- سن لائیٹ صابن ایک اونس لے کر ایک، پائینٹ گرم پانی میں حل کر کے جھاگ دار کر لیں اور کیٹر آیل دو اونس ملائیں

اگر انٹریوں میں ریاخ زیادہ ہوں تو آدھا اونس تل مارچن خاص ملا نا بھی مفید ہے، ڈوش کین مریض سے دو تین فنٹ اونچا ٹکائیے ہیں۔ ڈوش کین کے پینڈے

میں ایک سوراخ ہوتا ہے جس کا ربر کی ایک لمبی نالی لگی ہوتی ہے۔ اس نالی کے آخری سرے پر ایک نازل لگائیے ہیں۔ جسے قریب ایک انچ مہعدہ (گڈا) میں

داخل کرتے ہیں۔ نازل یا ربر کی ٹیوب مقعد میں داخل کرنے سے پہلے ٹوٹی کھول کر تھوڑا سا سیال خارج کر دینا چاہیے، یہ حقنہ سخت قبض، تو لیج یا درد گردہ کی حالت

میں کیا جاتا ہے۔ تاکہ آنتوں کا فضلہ فوراً خارج ہو جائے۔ چرنوں کو مارنے کے لئے صرف نکلین پانی کا حقنہ کیا جاتا ہے۔ حقنہ صرف قبض کے لئے ہی نہیں کیا

جاتا، بلکہ بعض دفعہ مریض غذا نہ کھا سکتا ہو یا غذا معدہ میں نہ ٹھہر سکے، تو حقنہ کے ذریعے دو اونس گلوکوز ایک پائینٹ پانی میں حل کر کے بہت آہستہ آہستہ حقنہ

کیا جاتا ہے، صرف اس قدر ٹوٹی کا منہ کھولا جاتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پانی اندر داخل ہو کر جذب ہو سکے، گلوکوز کے پانی کی مقدار پانچ اونس سے زیادہ نہیں

رکھی جاتی اور چھ گھنٹہ کے بعد کیا جاسکتا ہے۔ اسے طب یونانی میں حقنہ غذائی کہتے ہیں۔

طب یونانی میں قبض کے لئے مندرجہ ذیل مجربات نہایت زود اثر ہیں، حسب موقعہ استعمال میں لا کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں :-

دوائے قبض :- چھلکا ہڑ زرد دو تولہ، مصر شہد ایک تولہ، دونوں کو کھل کر کے پانی کی مدد سے چنے کے برابر گولیاں بنالیں۔ دو گولیاں رات کو

گرم دودھ یا پانی سے کھلائیں، قبض کشا ہے۔ پاخانہ نرم کر کے لاتی ہے۔ اس کے دینے سے جلاب نہیں لگے، بلکہ ایک بار حاجت محسوس ہوتی ہے اور طبیعت

صاف ہو جاتی ہے۔

سفوف بنفشہ :- عمدہ بنفشہ کے پھول، مصری برابرے کر کوٹ لیں اور چھان کر سفوف بنالیں، خوراک ایک تولہ لے کر دودھ یا گرم پانی سے دیں۔ یہ

سفوف نہایت آرام سے پاخانہ لا کر طبیعت صاف کرتا ہے۔

گل قند آفتابی :- پھول گلاب ایک سیر تازہ سے کر چینی سفید دو سیر ملا کر پھول کی پتیوں کو ہاتھ سے مل کر دھوپ میں رکھ دیں۔ تین چار روز کے بعد استعمال

کے قابل ہے۔ خوراک دو سے چار تولہ ہمراہ عرق سولف دس تولہ یا پانی سے دیں۔
نوٹ :- سفید دیسی گلاب کا گل قند تیز اثر رکھتا ہے۔

سفوف ہرٹ سیاہ :- کافی ہرٹوں کا سفوف بنا کر مقدار ذائقہ نمک سیاہ ملا لیں، سفوف کالی ہرٹ تیار ہے، خوراک تین ماشہ ایک دن ناز کر کے بوقت خواب ہمراہ تازہ پانی کھلائیں، قبض دائمی، ریاحی تکالیف اور معدہ و جگر کی خرابی سے پیدا ہونے والے فاسد مادے دور ہو جاتے ہیں۔
مربہ ہرٹ :- قبض کو دور کرتا ہے، قوت حافظہ اور قوت بینائی کو بڑھاتا ہے، متواتر استعمال سے بال سیاہ رہتے ہیں۔ خوراک ایک سے دو عدد پانی سے دھو کر رات کو سوتے وقت کھائیں، (مربہ ہرٹ بنانے کا طریقہ "نئے روزگار" میں مربہ سازی کے بیان میں درج ہے، قیمت ۳۰ روپے اور محصول ڈاک ۶ روپے، مینجرز لاجوگی پبلشرز پانی پت (ہریانہ) انڈیا سے ایک خط لکھ کر منگائی جاسکتی ہے)۔

حب تنکار :- سہاگہ سات ماشہ، اجوائں خراسانی پونے نو ماشہ، مرج سیاہ ساڑھے تین تولہ، مصبر شدہ چار تولہ آٹھ ماشہ، گھیکوار کے رس میں چنے کے برابر گولیاں بنائیں، خوراک ایک سے تین گولی سوتے وقت پانی سے استعمال کریں۔

ارنڈی کا تیل :- اسے روغن بیدانجیر اور کیٹر آیل بھی کہتے ہیں۔ تمام فاسد مواد کو بذریعہ اسہال خارج کرتا ہے، خوراک دو سے چار تولہ تک نیم گرم دودھ میں استعمال کرائیں۔

قبض کشا کھانڈ :- نفاست پسند طبائع کے لئے قبض دور کرنے کے لئے عجیب تحفہ ہے اور خوشبودار ہے۔

سورسجاں شیریں، سناء کے پتے (شدہ)، پھل گلاب (شدہ)، ہموزن سفوف بنا کر تینوں کے برابر چینی ملا لیں، بقدر چھ ماشہ رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ سے لیں۔

ایسبغول :- قبض کی معمولی حالت میں ایسبغول سالم ایک تولہ روزانہ ہمراہ پانی دیں یا جب ضرورت ہو استعمال کرائیں، قبض کے لئے آسان علاج ہے اس سے آدمی عادی بھی نہیں ہوتا۔

دوائے قبض دائمی :- سنار کے پتے ایک تولہ، دانہ الاچی خوردا ایک تولہ، شہد خالص چار تولہ، بادام اصلی دو تولہ، سنار اور الاچی کا سفوف بنا کر بادام روغن سے چرب کر کے شہد میں ملا کر معجون بنالیں، خوراک چار سے نو ماشہ، رات کو سوتے وقت ہمراہ نیم گرم دودھ دیں، دائمی قبض کے لئے سب سے بہتر اور مفید نسخہ ہے، جس کے کچھ غرضہ کے استعمال سے آنٹوں کی خشکی زائل ہو کر قبض کی شکایت بالکل دور ہو جاتی ہے، نازک مزاجوں کے عین موافق ہے، علاوہ ازیں قبض کے لئے روغن بادام ایک تولہ، گرم دودھ میں ملا کر پلانا یا اطریفیل زمانی نو ماشہ رات کو سوتے وقت دودھ کے ہمراہ کھلانا اکثر مفید ہوتا ہے، اگر بخار خواہ کسی قسم کا ہو، مونہ، ورم جگر، درد جگر یا دیگر امراض یا درد قویخ وغیرہ میں سخت قبض ہو تو بجائے تیز جلاب کے حقنہ کرنا بہت ہی مفید ہے، علاوہ ازیں پیٹ پر گھی، کیٹر آیل یا روغن بادام کی مالش کرنے سے بھی دائمی قبض دور ہو جاتی ہے۔

دیگر :- سنار، سولف، سونٹھ، نمک سیندھا، باریک سفوف بنالیں، چھ گرم پانی کے ساتھ سوتے وقت لیں۔

دیگر :- اطریفیل ملیں دس گرم بلکہ گرم پانی سے رات کو سوتے وقت لیں۔

چھوٹے بچوں کی قبض دور کرنے کے لئے آسان مجربات

آسان گھٹی :- جو کہ بالکل بے ضرر ہے۔ اس سے دو تین دست آکر بچہ تندرست ہو جاتا ہے۔

گل قند ڈیڑھ تولہ، سولف تین ماشہ، گل سرخ تین ماشہ، گل بنفشہ تین ماشہ، جوش مکے کر اس میں سے صرف ایک چمچ نیم گرم پائیں۔ اگر ضرورت ہو تو اس میں سناء شدہ ایک ماشہ کا اضافہ کریں۔

ملین اطفال :- جو قبض دور کرنے یا راج کے لئے بے حد مفید ہے :-

ہرٹ سیاہ چار ماشہ، زکچور، سولف شدہ، سہاگہ بریاں ہر ایک ایک ماشہ، سفوف بنائیں اور بقدر ایک سے دورتی مال کے دودھ یا پانی میں گھول کر پلائیں۔

چٹکی اطفال :- سہاگہ بریاں، دانہ الائچی خورد، ریوند چینی ہوزن سفوف بنائیں، خوراک ایک سے دورتی ہمراہ عرق سولف دیں۔

دوائے قبض :- روغن ارند (کبیٹر آئل) چار ماشہ، قدسے شہد یا شکر ملا کر چٹائیں یا سولف ایک ماشہ، گلی سرخ ایک ماشہ، ریوند چینی تین رتی، گلی تند چار ماشہ، سب کو چار تولہ پانی میں جوش دیں اور جب دو تولہ رہ جائے تو مل چھان کر چھوچھ پلائیں۔

آیور ویدک علاج :- ابھیار شٹ، کماری آسو، ملکیتھ آدی چورن، بڑوانل چورن، پنج کسم چورن، ناراج چورن، سکھ درینج وٹی، بہترین ادویات ہیں جن کے نسخے درج ذیل ہیں :-

ابھیار شٹ (بیشیج رتناولی) :- ہرٹ سیاہ پانچ سیر متقی، اڑھائی سیر، بابڑنگ آدھ سیر، گل بہوہ آدھ سیر، پانی ڈیڑھ من میں اس قدر پکائیں کہ پانی پندرہ سیر رہ جائے۔ اسے اتار کر چھان لیں اور پرا ناگڑ پانچ تولہ، گوکھرو، تروی، دھنیاں، جڑ اندرائن (مٹہ)، پھول دھادا، چویہ، حب آلاس، سونٹھ، جڑ جمال گوٹہ شدہ، موچرس ہر ایک دس دس تولے کوٹ کر شامل کریں اور بطریق مشہور آسوتیار کر لیں۔

خوراک آدھے سے دو تولہ ہمراہ برابر وزن پانی، دائمی قبض، بواسیر خونی اور دیگر امراض معدہ و انتڑیوں کے علاوہ پیشاب کھولنے کے لئے مفید ہے۔

آملکیہ آدی چورن :- آملہ شدہ، لکھاں، چھلکا جڑ چترک، چھلکا ہر زرد، منک سیندھا برابر برابر وزن لیں، جملہ ادویہ کا سفوف بنالیں، خوراک دو سے تین ماشہ ہمراہ گرم پانی دن میں دو یا تین بار، قبض کشادہ، ہضم کے علاوہ بخاروں کے لئے مفید ہے، پاخانہ صاف لاتا ہے۔

بڑوانل چورن :- منک سیندھا ایک تولہ، پپلا مول دو تولہ، لکھاں تین تولہ، چویہ (جڑ کالی مرچ) چار تولہ، چھال جڑ چترک پانچ تولہ، سونٹھ چھ تولہ، چھال ہر زرد سات تولہ، ان سب کا سفوف بنالیں، خوراک دو سے تین ماشہ ہمراہ عرق سولف یا دہی کی لسی دن میں دوبارہ۔

پرائی بدھیمی، دائمی قبض، بواسیر اور حرارت ہاضمہ کو تیز کرنے کے لئے مفید ہے۔

پنج کسم چورن :- سونٹھ، چھال ہر زرد، لکھاں، تروی شدہ، منک سوچل، سب برابر وزن، ہر ایک کا سفوف بنالیں، خوراک چھ سے نو ماشہ ہمراہ نیم گرم پانی دیں۔

فوائد :- یہ چورن دائمی قبض دور کرتا ہے، جب پاخانہ کھل کر نہ آتا ہو اور آنتوں میں فضلہ رہ جانے سے طبیعت بھاری ہو تو اس کے استعمال سے آنتیں فضلہ سے صاف ہو کر پاخانہ آسانی سے آتا ہے اور طبیعت ہشاش بشاش ہو جاتی ہے۔

ناراج چورن :- لکھاں ایک تولہ، تروی شدہ، چینی ہر ایک چار تولہ، سب کو سفوف بنائیں خوراک چھ ماشہ سے ایک تولہ ہمراہ گرم پانی دیں۔ دائمی قبض، ہیٹ درد، اچھارہ اور لمبی مادہ نکالنے کے لئے مفید ہے۔

سکھ وریچن وٹی :- ریوند عصارہ پانچ تولہ، ہرٹ جلاپا، سونٹھ، اجوائن، کشتہ سکھ، گودا اندرائن (مٹہ) ہر ایک سات تولہ، جمال گوٹہ شدہ چھ ماشہ، سب مٹہ کی جڑ کے کارٹھے کے ساتھ کھل کر کے آدھ آدھ رتی کی گولیاں بنائیں، خوراک ایک سے دو گولی ہمراہ گرم پانی یا دودھ رات کو دیں۔ دائمی قبض کے لئے مفید ہے۔ صفراوی مزاج مریضوں کے لئے اس کا استعمال غیر مفید ہے۔

ہومیو پیتھک علاج :- نکس و امیکا یا برلی او نیا بہترین ادویات ہیں۔ اسے مریض کے مزاج کے مطابق استعمال کیا جائے، تفصیلات کے لئے "تناج ہومیو پیتھک" ملاحظہ فرمادیں، قیمت اٹھارہ روپے ہے اور نرالا جوگی پبلی کیشنز پانی پت (ہریانہ) سے منگائی جاسکتی ہے۔

بالو کیمک علاج :- کالی سلف، نیٹرم سپور، سائی لیشیا بالو کیمک طب میں بہترین ادویات ہیں، لیکن ہماری رائے کے مطابق غیر ملکی ادویات جو قبض

کے لئے استعمال کی جاتی ہیں، ان سے دیسی ادویات (یونانی و آیورویدک) زیادہ مفید ہیں۔ مثلاً چھلکا ایسغول رات کے وقت سوتے ہوئے کھانا یا ہر رز کا استعمال یا گل قند ایک تولہ ہمراہ دودھ لینا یا بادام روغن ایک تولہ ایک پاؤ گرم دودھ میں لینا یا دو مربہ ہر رز ہمراہ دودھ لینا قبض دور کرنے کے لئے بہترین دیسی ادویات ہیں۔

قدرتی علاج:۔ کچے پھل و سبزیاں مفید ہیں۔ روزانہ سیر و ورزش بھی قبض دور کرنے کا بہترین علاج ہے۔
غذا پر مہیز:۔ پالک، کدو، ٹماٹر، خرفہ، گیہوں کے آٹے کی روٹی، بکری اور پرندوں کا شوربا، انگور، سیب، ناشپاتی، سنگترہ وغیرہ کھائیں، نشاستہ اور تلی ہوئی چیزوں، آلو، اروی، دال ماش، گوبھی، نخود، چاول اور مٹھائیوں سے سخت پر مہیز کریں۔

انہ شول، قولنج، کالک، (Colic)

تعریف مرض:۔ اس مرض میں ٹھہر ٹھہر کر مروڑ ہوتی اور پیٹ میں درد اٹھتا ہے، مریض بے چین ہو کر لوٹتا ہے اور پیٹ دبا ہے۔ شدید قبض ہونا، لیکن عام طور پر بخار نہیں ہوتا، جی ملتا تا ہے۔ چونکہ اکثر قولنج آنت میں سدا پڑ جاتا ہے، اس لئے اسے قولنج کہتے ہیں۔
وجوہات:۔ بادی دیرینہ اور ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال، برف کی قلفیاں یا برف کا زیادہ استعمال، قابض و خشک دواؤں کا زیادہ استعمال، اگر ریاچ کی کثرت سے یہ عارضہ ہو تو قولنج ریاچی اور اگر آنت میں بل پڑ جانے سے ہو تو قولنج التوائی اگر قولنج صفراوی یا بیلیری کالک (Biliary-Colic) جس کو درد جگر بھی کہتے ہیں، اس میں صفراوی علامات نمایاں ہوتی ہیں، دائیں پسلی شکنجہ میں کسی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور کبھی شدت درد سے غشی تک نوبت آ جاتی ہے۔

علامات:۔ درد قولنج کو درد گردہ، درد معدہ، اپنڈی سائیٹس، درد دل، انتڑیوں میں بل پڑ جانا خاص طور پر بچوں میں انتڑیوں کے ورم اور عورتوں میں رحم (بچہ دانی) خصیۃ الرحم (ڈمب گرنٹھیاں) (Ovaries) سے تشخیص کر لینا ضروری ہے۔
۱۔ درد گردہ:۔ اگر درد گردہ ہو تو مقام گردہ سے درد اٹھتا ہے، جس کی ٹیسس رانوں اور فوطوں تک جاتی ہیں اور پیشاب رگڑک کر خارج ہوتا ہے۔

۲۔ درد جگر:۔ یعنی صفراوی قولنج میں متلی اور قے زیادہ ہوتی ہے اور درد کی نوبت یعنی باری کچھ گھنٹوں سے لے کر چند دنوں تک رہا کرتی ہے، لیکن درد کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے۔

- ۳۔ درد معدہ:۔ اگر معدہ سے درد ہو تو ناف سے اوپر مقام معدہ پر درد ہوتا ہے۔
- ۴۔ اپنڈی سائیٹس میں ناف کے داہنی طرف دبائے سے تکلیف پہنچتی ہے اور جگہ پھولی ہوئی نظر آتی ہے۔
- ۵۔ درد دل کی حالت میں دل گھٹا نظر آتا ہے اور عام طور پر یہ عارضہ ۵۴ سال کے بعد ہوتا ہے۔
- ۶۔ انتڑیوں میں بل پڑنے سے درد ہوتو قے میں پاخانہ خارج ہوتا ہے۔
- ۷۔ بچہ دانی یا ڈمب گرنٹھیوں کی تکلیف سے درد ہو تو حیض کی بے قاعدگی، پیڑ، کمز کو لہوں اور رانوں میں درد ہوتا ہے۔
- ۸۔ انتڑیوں کے ورم میں بخار نہیں ہوتا۔

غذا ہضم کے بعد جو فضلات خارج ہوتے ہیں، ان کے قولنج میں رک جانے سے سخت ترین درد ہوتا ہے، مریض کو کسی کروٹ چپن نہیں آتی، بعض دفعہ دیگر دردوں اور اس درد میں تشخیص کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لئے مندرجہ بالا علامات کو مد نظر رکھ کر بخولی مرض قولنج کو صحیح تشخیص

کر سکتا ہے۔

ایلوپتھیک علاج :- سڈے خارج کرنے کے لئے کیسٹر آئیل پانچ تولہ، تیل تارپین تین ماشہ، سن لائیٹ صابن چھ ماشہ، پہلے ڈیڑھ سیر پانی میں صابن حل کریں، اس کے بعد تیل تارپین شامل کریں، پھر انیمائکین میں کیسٹر آئیل ڈال کر ربر کی نالی میں پہنچائیں۔ اس کے بعد صابن کا پانی ڈال کر صابن دستور انیمائکین تک سڈے خارج ہو کر فوراً آرام آجائے، اگر تو لیج سیسہ کے ظروف یا تازہ رنگ و روغن کئے ہوئے مکان میں سونے سے ہو تو مسوڑھوں پر نیلی لیکر پڑ جائے گی، ایسی حالت میں اصل سبب مرض کو دور کریں، سیسہ یا تانبہ کا کام کرنے والے یا روغن کا کام کرنے والے اشخاص کو ایٹ سلفیورک ڈل ۵ بوند ایک اونس پانی میں ملا کر بطور حفظہ مقدم مہینے میں دوبار پی لینا چاہیے، چھوٹے بچوں کو برانڈی یا سپرٹ ابھتر نائٹروسائی چار بوند چھوٹے چمچے پانی میں ملا کر دینے سے اکثر درد کو تسکین آجاتی ہے جب درد رفع ہو جائے تو کیسٹر آئیل کا ایک چمچ پلائیں۔

کالک مکسچر :- ٹنگر بلاڈونا ۱۰ منم، ٹنگر اوپیم ۳ منم، سپرٹ ایونیا ایرومٹیک ۲ منم، سپرٹ کلوروفارم ۱۰ منم، سوڈا بائیکارب ۵ اگرین، عرق پودینہ ایک اونس ایسی ایک ایک خوراک ہر تین گھنٹہ بعد دیں۔ بچوں کو نہ دیں، جب درد تو لیج بہت شدید ہو تو یہ نسخہ فوری فائدہ دیتا ہے۔ اگر درد کسی طرح کم نہ ہو تو ایک مستند ڈاکٹر کو مارفیا اور اٹروپین کا مناسب مقدار میں انجکشن دینا چاہیے، انجکشن بچوں، بلغمی کھانسی کے مریضوں، کمزور دل والوں وغیرہ کو نہیں لگانا چاہیے، ورنہ بچا فائدہ کے نقصان ہوگا۔

دیگر :- سپرٹ ایونیا ایرومٹیک ۲ منم، سپرٹ کلوروفارم ۵ منم، ٹنگر ججزر ۲ منم، ٹنگر بلاڈونا ۱۰ منم، سپرمنٹ وارٹر ایک اونس، ایسی ایک ایک خوراک دیں، درد کو فوراً تسکین آجائے گی۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ پازمو سبالجین (Spasmo Cibalgin) سبباً ایک دو گولی تازہ پانی سے دیں۔
۲۔ بارلگان (Baralgin) ہکمیٹ درد روکنے اور تشنج و امینٹھن ہٹانے والی ہے، درد گردہ، درد تو لیج، آنتوں کے تشنج کو ہٹانے والی ہے، درد گردہ، درد تو لیج، آنتوں کے تشنج میں بہت مفید ہے، ایک ٹیکہ یا ایک امپول انجکشن کریں۔

۳۔ بلاڈنل (Belladenal) یا بیلارگل (سینڈوز) دو تین گولی روزانہ پانی سے دیں۔

۴۔ فائی سپٹون (Physeptone) بی اینڈ ڈبلیو سبب مضم کے دردوں میں جہاں پیٹھ میں، مارفیا وغیرہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ میٹھا ڈون ہائیڈروکلورائیڈ سے بنی ہے، اس کی امپول انجکشن کے لئے ملتی ہے۔

۵۔ نوولجین (Novalgin) ہکمیٹ کی ایک گولی تازہ پانی سے دیں یا انجکشن لگائیں یا پازموپراکسی ون ایک کیپ شوا چائے سے دیں۔

۶۔ او سے ڈرین (Osadrin) نول نوولجین کی طرح استعمال کریں۔

۷۔ نیواکٹیئم (Neo-octinum) نول سبب مضم کے پیٹ کے دردوں و تو لیج کے لئے مفید ہے۔ خوراک ۲۵ بوند ایک دو گولی دن میں تین بار دیں۔

۸۔ مارفین سلفیٹ و اٹروپین (Morphin Sulphat with Atropin) (پہلے اگرین، پھر اگرین ملا ہوا) کا انجکشن سخت حالات میں کریں (یہ انجکشن عام پریکٹیشنرز کو نہیں لگانا چاہیے، اسے ایک مستند ڈاکٹر ہی لگا سکتا ہے)۔

۹۔ انٹریئل (Antrenyl) سبباً پیٹ کے درد، صفراوی تو لیج، اسہال میں مفید ہے، ایک ٹیکہ یا ۱۵ بوند سے ۳۰ بوند میں تین بار دیں۔ زیادہ دیر تک اثر رکھنے کے لئے انٹریئل ڈوپلیکس (Antrenyl Duplex) ٹکیاں بھی ملتی ہیں۔ اس میں مقدار میں دوا ہوتی ہے اور دو گنے وقت تک اثر رکھتی ہے۔

۱۔ پٹیل جین (گلیکسو) یہ درد کے سکون کے لئے نئی کیمیائی دوا ہے۔ درد کو دور کرنے کے لئے مارفین، پیٹیٹ ڈین وغیرہ سے زیادہ موثر ہے۔ اس میں خوبی یہ ہے کہ اس کے استعمال سے زہریلے اور شافی اثر میں حفاظت کی بہت حد فاصل ہے۔ خوراک ایک سے دو ٹکیہ حسب ضرورت تازہ پانی سے دیں۔ ایک سی سی کے ایمپول کو توڑ کر عضلاتی انجکشن کریں، اس کا وریڈی انجکشن خطرناک ہے۔ اس لئے وریڈی انجکشن نہیں لگانا چاہیئے۔
ٹکیاں یا ایمپول سنڈیا فٹ ڈاکٹروں کو ہی استعمال میں لانا چاہیئے۔

یونانی علاج :- مذکورہ بالا ہدایات پر عمل کریں۔ اینما کے لئے وہی نسخہ استعمال کریں، جو اوپر لکھا گیا ہے۔ تولنج صفراوی میں اگر طبیعت قے کی طرف مائل ہو تو قے کے لئے گرم پانی میں لیموں پھوڑ کر پلائیں۔ اس کے بعد عرق کو پانچ تولہ، عرق کاسنی پانچ تولہ، شربت بزوری معتدل تین تولہ ملا کر پلائیں، اس کے بعد جگر کو اصلاح کرنے والی ادویات دیں۔ مقام درد پر سینک دیں یا مونگ کا آٹا آدھ پاؤ عرق سولف میں گوندھ کر زیج سویہ چھ ماشہ، ہینگ بن ماشہ، اجوائن چھ ماشہ ملا کر ٹکیہ پکائیں، جس کی ایک طرف کچی ہے۔ اس پر روغن گل ایک تولہ چھڑ کر گرم گرم باندھیں۔
مندرجہ ذیل مجربات طب یونانی میں اس مرض کے لئے خاص طور پر مفید ہیں :-

دوائے تولنج :- ہینگ، ہینگ، اجوائن، سونٹھ، نوشادھلی، سوڈا خوردنی، نمک خوردنی، سب کو سفوف بنا کر ایک ماشہ کی بھنکی ہر ایک گھنٹہ کے بعد استعمال کریں۔

دیگر :- کیسٹرائیل پانچ تولہ میں لیموں کا غذی کارس نصف عدد ملا کر پلائیں۔

دیگر :- جوارش کوئی تین ماشہ صبح و شام کھلائیں۔

دیگر :- کشہ بارہ سنگا جوآک کے دودھ کی مدد سے بنایا گیا ہو۔ اس مرض میں بھی ایک سے دو رتی دن میں دو یا تین بار دیں۔

دیگر :- ہینگ بقدر ضرورت سفوف بنالیں ۱۲۵ ملی گرام ہلکے گرم پانی سے لیں یا قرص حلیت (ہینگ) دو گولی دن میں دو بار دیں۔

دیگر :- اطر فیل زمانی ۹ ماشہ سے ایک تولہ تک ہمراہ عرق گاؤ زبان بارہ تولہ استعمال کرائیں۔

آیور ویدک علاج :- ہنگوادی چورن (شارنگدھر) تین سے چھ ماشہ یا ہنگو اشک چورن (اشانگ ہرے) دو سے چار ماشہ استعمال کریں، آرام آجائے گا۔ ان کے نسخہ جات بدھنی کے بیان میں دیئے جا چکے ہیں، وہاں ملاحظہ فرمادیں۔

ہومیوپیتھک علاج :- بدھنی دہیٹ درد کے بیان میں دیئے گئے نسخہ جات استعمال کریں، آرام آجائے گا۔

غذا و پیرہیز :- تولنج میں آرام آنے کے بعد مریض کو کم از کم ایک دن رات کے مطابق کوئی غذا نہ دیں، پھر ہلکی غذا شوربہ، بخنی، مونگ کی کا پانی وغیرہ دیں، بادی اور ثقیل چیزوں کو، گو بھی، دال ماش، چاول یا برف وغیرہ سے پرہیز کرائیں۔

وسوچکا - ہیضہ - کالرا - (CHOLERA)

تعریف مرض :- ہیضہ ایک متعدی مرض ہے جو نہایت باریک نباتی کرم سے پیدا ہوتا ہے، جن کو کالرا امیلائی کہتے ہیں۔ یہ مریض کی اور دستوں میں بکثرت خارج ہوتے ہیں اور کھانے پینے کی چیزوں کے ذریعے تندرست اشخاص میں پہنچ جاتے ہیں، بعض دفعہ وں اور نہروں کا پانی ناسد ہو جاتا ہے اور اس سے ہیضہ پھیل جاتا ہے۔ سنکرت زبان میں سوچی سوزن یعنی سوئی کو کہتے ہیں۔ چونکہ مرض میں مریض کو ہر وقت سوئی چھیننے کی سی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لئے طب آیور وید میں اس کا نام وسوچی یا وسوچکا ہے۔

وجوہات :- ہیضہ کی بیماری کا عام پھیل جانا، سخت گرم ہوا یا ٹوکالگنا، گندی ہوا، میلا کچیلارہنا، گندا پانی پینا، حیوانات کی حرج

بے تعداد کھانا، باسی خوراک کھانا، ہیضہ کے دبائی دونوں میں تیز دست آور یا جلاب آور دوائی کا کھانا وغیرہ عام اسباب ہیں۔

علامات :- علامات کے لحاظ سے مرض ہیضہ کے طب آیور وید میں چار درجات ہیں اور طب یونانی کے نقطہ نظر سے تین درجات ہیں۔

جو کہ درج ذیل ہیں :-

پہلے درجے میں قے و دست بکثرت آتے ہیں جو پہلے گاڑھے پھر تیلے پیچھے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں میں تشنج ہوتا ہے۔ مریض کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ دوسرے درجے میں قے اور دست کم ہو جاتے ہیں، آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہیں۔ نبض کمزور ہوتی ہے، لب اور سوڑھے نیلگوں ہو جاتے ہیں جسم ٹھنڈا اور چہرہ بے رونق ہوتا ہے۔ مریض شدت پیاس کی دہائی مچاتا ہے۔ ادھر پانی پیتا ہے، ادھر قے سے نکال دیتا ہے، بعض دفعہ نیند معلوم ہو لگتی ہے۔ تیسرے درجے میں آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہیں، پیاس بدستور معلوم ہوتی ہے، نبض اٹک اٹک کر چلتی ہے، چہرہ نیم مردہ اور ٹھنڈا ہوتا ہے سخت گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی ہے۔ درجہ حرارت بالکل نیچے ۹۶ سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ اگر اس وقت مریض کا بچاؤ نہ کیا جائے تو عام طور پر تین گھنٹے اٹھارہ گھنٹے کے اندر اندر مریض راہ عدم اختیار کرتا ہے۔ چوتھے درجے کو درجہ بحالی کہتے ہیں۔ اس حالت میں جسم گرم ہونے لگتا ہے، حرارت اکثر بخار کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے، نبض کی حرکات درست ہونے لگتی ہیں۔ آنکھوں میں تازگی اور چہرے پر رونق آنے لگتی ہے اور مریض تندرست ہونے لگتا ہے دفعہ شدید قسم کے ہیضہ میں صرف دو چار دست آکر مریض کی حالت نازک ہو جاتی ہے اور وہ راہ عدم اختیار کرتا ہے۔

طب آیور وید کی مشہور کتاب "بھاؤ پرکاش" میں لکھا ہے، کہ مرض ہیضہ میں نیند نہ آنا، بے چینی، لرزہ، پیشاب کی بندش، غشی وغیرہ سے خطرناک

عوارض پیدا ہو جاتے ہیں۔

علاج بطور حفظ ماقدم :- ایک بڑے آدمی کو کالرا ویکسین ایک سی سی کا عضلاتی انجکشن دینا چار سے چھ ماہ تک مرض کے حملے سے محفوظ رکھنا۔ بخار کی حالت میں یا معدہ کی خرابی اور کم عمر کے بچوں کو ٹیکہ لگانا منع ہے، ہیضہ کے دنوں میں پانی اُبال کر پینا چاہیے۔ پانی پینے کے کنوئیں میں پوٹاشیم پرمینگنیٹ میں حل کر کے ڈال دی جائے کچے پھل اور سبز پائ استعمال نہ کی جائیں، ہیضہ کے دنوں میں کوئی تیز جلاب استعمال نہ کیا جائے۔

ڈاکٹری علاج :- دستوں کو روکنے کے لئے کلور وڈین یا کیمفور وڈین ۱۰ سے ۲۰ نمم ایک اونس پانی میں ملا کر ہر چار گھنٹے بعد دیں، پیاس بجھا کے لئے برف چوسانی چاہیے، تشنج کو دور کرنے کے لئے مالش مفید ہے۔ قے روکنے کے لئے مسٹرڈ پلستر معدہ پر لگانا چاہیے (زیادہ دیر لگانا نقصا ہے)، اگر جسم ٹھنڈا ہونے لگے تو گرم پانی کی بوتلوں سے گرمی پہنچائی جائے۔ اگر کمزوری بہت زیادہ ہو تو وریڈی طور پر نارمل سیلان، گلوکوز سیلان یا پلازما وغیرہ مفید ہے۔ اس سلسلہ میں ایک مستند ڈاکٹر ہی آلہ سیلان (یہ آلہ خون کی مقدار کم ہونے یا ہیضہ وغیرہ کی حالت میں خون گاڑھا ہو جانے کی صورت میں گلوکوز سالیوشن یا سیلان سیلوشن یا پلازما جسم میں داخل کرنے کے کام آتا ہے) جس کی ربڑ کی ٹی کے سرے پر لگی ہوئی سوئی کو وریڈ میں داخل کیا جاتا ہے اور سوئی پشت پر لگا ہوا اسٹاپ کارک کھول دینے سے دوائی مریض کے جسم میں داخل ہونی شروع ہو جاتی ہے، جب دیکھیں کہ بخوڑی دوائی ابھی آلہ کے چار میں ہے تو کارک بند کر دیں، کیونکہ دوسری صورت میں ہوا وریڈ کے اندر داخل ہو کر خطرناک حالت پیدا کر سکتی ہے۔

وریڈی انجکشن کے لئے مندرجہ ذیل گھول عمدہ ہے گا :-

سوڈیم کلورائیڈ ۱۲۰ گریں، پوٹاشیم کلورائیڈ ۶ گریں، کیلیم کلورائیڈ ۶ گریں، ڈسٹنڈ واٹر ۲۰ اونس۔ اس گھول کو اُبال کر ٹھنڈا کر کے ۲ اونس فی منٹ حساب سے وریڈی انجکشن کریں اور مریض کے خون کے وزن متناسب اور خون کے دباؤ کا لحاظ رکھتے ہوئے ۴۰ سے ۱۲۰ اونس تک یہ گھول وریڈی ٹیکہ صورت میں دیا جاتا ہے۔ اگر مقعد (گڈا) کے اندر ٹیڑھ پھر ۹۹ فارن ہیٹ سے کم ہو تو یہ گھول ۱۰۰ ڈگری فارن ہیٹ تک گرم کر کے وریڈی طور پر دیا جائے۔ اگر مقعد کے اندر ٹیڑھ پھر ۱۰۰ ہو تو گھول ۸۰ یا ۹۰ ڈگری فارن ہیٹ پر دیا جاتا ہے۔ اگر پیشاب کی رکاوٹ ہو تو سوڈا بائیکارب ۲۰ گریں نارمل سیلان ۱۲۰ اونس ہر دو سے چار گھنٹے بعد بذریعہ مقعد (گڈا) دیا جاتا ہے۔ کے اولین ایک اونس پانی میں ملا کر ہر دو گھنٹے بعد چھ یا سات بار پلائیں، خواہ

ہو جائے۔ یہ دوا زہریلے مادہ کو جذب کر کے اُسے ناکارہ بنا دیتی ہے۔ علاوہ ازیں ایسٹیل مکسچر (Essential-Oil-Mixture) اس مرض کے شرمع میں اکثر مفید ثابت ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل تجربات اس مرض کے لئے مفید و مجرب ہیں:-

مکسچر برائے اسہال ہیضہ

برائے ہیضہ

- ۱۔ سوڈا بیکارب
- بسمتھ کارب
- ٹینکڑا اوچم
- مکسچر کرٹیا
- ۱۰ گرین
- ۲۰ گرین
- ۵ منم
- ۱ اونس

- ۲۔ سلفا گوانی ڈین
- ۲ گولی
- ۱ اونس
- پانی
- حسب ضرورت

خوراک دو یا تین بار روزانہ دیں، یہ فارماکو پیاسپتال لئے سرکاری قدیم کا مشہور و معروف نسخہ ہے۔

ہر دو گھنٹہ بعد دیں، یہ نسخہ لندن فارماکو پیاسپتال کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں مروج ہے۔

جدید علاج میں کارٹی سون کا ٹیکہ عضلاتی طور پر کیا جاتا ہے۔ سلفا ڈرگز میں سلفا گوانی ڈین چار گرام فوراً اور اس کے بعد دو گرام ہر چار گھنٹہ بعد یا سلفا ڈایازین دو گرام فوراً اور ہر چار گھنٹہ بعد دینی چاہیئے۔

جدید انسٹی با یا ٹیک علاج:- آریو مائی سین اور ٹیرامائی سین مجرب علاج ہیں، خوراک ایک کیپ شول دن میں چار بار جوان آدمی کے لئے استعمال کریں۔ بچوں کو بلحاظ عمر مناسب مقدار میں دیں۔

ماڈرن ادویات:- ۱۔ سلفا گوانی ڈین یا تھیلڈزول پہلی بار آٹھ گولیاں، بعد میں دو چار گولیاں ہر دو چار گھنٹے بعد دیں۔

۲۔ ٹیرامائی سین ایس ایف (Terramycin) S. F. فززر۔ کلوروسٹریپ (Chlorostrep) پارک ڈیوس۔
یا کلورومائی سین (Chloromycetin) پارک ڈیوس۔ یا آریو مائی سین (Aureomycin) لیڈرے۔

یا انٹرو سٹریپ (Entero strep) ڈیز۔ ایک سے دو کیپ شولز ہر دو سے چار گھنٹے بعد دیں۔

۳۔ انٹرو مینس ٹیک اور گلوکوز ملا ہوا گھول چڑھا دیں۔ یہ طریقہ ایک مستند ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے۔

۴۔ اگر نبض کمزور ہو جائے تو دل کو تقویت دینے والی ادویہ کا استعمال کریں۔

۵۔ دستوں اور آلیٹوں کو روکنے کے لئے دست و قے کے بیان میں دیئے گئے نسخوں میں سے کسی ایک کا استعمال کریں۔

۶۔ ٹرائی سین (Trycin) مرک شارپ ڈویم۔ ہیضہ کے جراثیم کو مارنے کے لئے مفید ہے۔ یہ ٹریٹاسائیکلین ایڈروکلورائیڈ ہے۔ ایک کیپ شول ہر چھ گھنٹہ بعد دیں، سٹریٹو مائی سین کا ٹیکہ بھی ہیضہ کے لئے مفید ہے۔

یونانی علاج:- پیتا ولایتی ایک رتی، جدوار خطائی ایک رتی، تارجیل دریائی ایک رتی، زہر مہرہ خطائی ایک رتی، عرق گلاب میں کھل کر کے کی ایک گولی بنائیں، ایسی ایک ایک خوراک ایک ایک گھنٹہ بعد سکجین یا لیموں کے ہمراہ دو یا تین بار دیں یا افیون ایک ماش، کافور دو ماش، آک جڑ کا چھلکا تین ماش، سفوف بنا کر دانہ مونگ کے برابر گولیاں بنائیں اور ایک گولی پانی میں حل کر کے دیں، بیرونی جائفل چھ ماش، تلوں کا تیل پانچ میں جلا کر چھان لیں، اور نیم گرم روغن کی ہاتھ پاؤں پر مالش کریں۔

حب ہیضہ:- ہینگ خالص ایک ماش، کافور پانچ ماش، افیون پانچ ماش، مرچ سیاہ ایک ماش، سونٹھ ایک ماش، کھل کر کے بقدر ایک رتی یاں بنائیں اور ایک گولی ہمراہ تازہ پانی یا عرق سولف ہر چار گھنٹہ بعد دیں۔

امرت دھارا:- ست پودینہ، ست اجوائن، کافور ہموزن شیشی میں ڈال کر چند منٹ دھوپ میں رکھیں، گھول بن جائے گا۔ ایک سے دو

بوند بتاشہ میں ڈال کر دیں، بدھنٹی دھنڈیہ کے لئے از حد مفید ہے، مختلف فریب اس نسخہ کو امرت دھارا، امرت ساگر، آب حیات، زندہ طلسمات وغیرہ ناموں سے فروخت کر رہی ہیں۔

عرق ہبیشہ :- پودینہ ڈیڑھ تولہ، الاچی کلاں چار عدد، منقہ آٹھ دانہ، نیم کوب کر کے ایک سیر پانی میں جوش دیں۔ جب نصف رہ جائے دو دو تولہ وقفہ سے دیتے رہیں، پیاس، تپ، دست وغیرہ رک جائیں گے۔

حب ہبیشہ :- کافور دو رتی، افیون آدھی رتی، سُرخ مرج تین رتی، یہ ایک خوراک ہے، ہر ڈیڑھ گھنٹہ بعد ہمراہ عرق پودینہ، سولف الاچی استعمال کرتے رہیں، یاد رہے کہ جب کمزوری شروع ہو جائے تو افیون کا استعمال مضر ہوتا ہے۔

عرق کافور :- کافور دو تولہ، سرکہ خالص چھ تولہ، شیشی میں ملا کر ایک ماہ دھوپ میں رکھیں، شیشی کو ہر روز ہلا دیا کریں، ایک ماہ کے بعد چھان کر محفوظ رکھیں، خوراک ہبیشہ کے مریض کو چار بوند عرق گلاب دو تولہ میں ملا کر ہر نصف گھنٹہ بعد دیں۔ وبا کے دنوں میں صرف ایک دو بوند بتاشہ یا مصری پر ڈال کر روزانہ کھلانا ہبیشہ کے حملہ سے محفوظ رکھتا ہے۔

حب ہبیشہ :- چھلکا جڑ آک ایک تولہ، مرج سیاہ نو ماشہ، ست پودینہ تین ماشہ، ادراک کے رس میں یا عرق سولف میں چھوٹے ٹکڑوں کے برابر گولیاں بنائیں، ایک گولی دن میں تین بار دیں، ہبیشہ خواہ کسی حالت میں ہو آرام آجاتا ہے۔

دیگر :- سونٹھ، مرج سیاہ، پپلی، آک کی جڑ کا چھلکا ہر ایک ایک تولہ، ست پودینہ تین ماشہ، باریک پیس کر شہد کی مدد۔ گولیاں بقدر بخود بنائیں، ایک گولی گرم پانی سے دیں۔

دیگر :- سُرخ مرج، افیون، ہینگ ہموزن، بقدر مرج سیاہ گولیاں بنائیں، ایک گولی گرم پانی سے دیں، ایک گھنٹہ بعد دوسری خوراک، دیگر :- مدار (آک کی جڑ)، تین ماشہ، کالی مرج تین ماشہ، ادراک کے پانی حسب ضرورت میں کھل کر کے گولیاں کالی مرج کے برابر تیار کریں، ایک گولی عرق گلاب دو تولہ سے لیں، ہر تین گھنٹہ بعد دیں۔

دیگر :- تلمسی کے تازہ پتے پانچ عدد، کالی مرج پانچ عدد، ایک اونس پانی میں پیس کر چھان لیں اور پلائیں۔

جن دنوں ہبیشہ کا موسم ہو، پیاز، آچار، پودینہ، لیموں وغیرہ کا کھانا مفید ثابت ہوتا ہے، کسی قسم کی باسی غذا یا بسزی نہ کھائی جائے، پانی پیا جائے، گلاب ہرگز نہ لیا جائے، مکان صاف ہونا چاہیے، ہبیشہ کے زہریلے مادے کو دور کرنے کے لئے عرق گلاب بہترین شے ہے، یہ ہبیشہ کی پیاس کو بھی دور کرتا ہے۔

چھوٹے بچوں کے ہبیشہ کے لئے آسان مجربات

- ۱۔ زہر مہرہ خطائی، طباشیر اصلی، نارجیل دریائی، سب ادویہ بقدر ایک ایک رتی، عرق کیوڑہ میں گھس کر شربت انار ملا کر بچہ کو پلائیں۔
- ۲۔ چھلکا الاچی خورد تین ماشہ، عرق گلاب میں جوش دیں اور چھان کر بچہ کو پلائیں۔
- ۳۔ سولف ڈیڑھ ماشہ، پودینہ ایک ماشہ، لونگ ایک عدد، گل قند چھ ماشہ، جوش دے کر چھان کر پلائیں۔
- ۴۔ طباشیر زہر مہرہ خطائی، نارجیل دریائی، چھلکا بیرونی پستہ، چھلکا ترنج، انار دانہ عمدہ، زرشک، پودینہ خشک، الاچی ہر ایک دو رتی، پیس کر شربت انار ۹ ماشہ میں ملا کر تین یا چار بار بچہ کو چٹائیں۔
- ۵۔ زہر مہرہ خطائی تین رتی، طباشیر تین رتی، الاچی چھوٹی ایک عدد، انار دانہ، گرد سماق، زرشک ہر ایک ایک ماشہ، گلاب میں پیس کر لیں اور شربت انار چھ ماشہ ملا کر پلائیں، دو دو تین تین خوراک بنا کر ہر تین تین گھنٹہ کے بعد پلائیں۔

آیور ویدک علاج :- اہی پھین آسو، کرپور آسو، اجیرن کنٹک رس، کرپور رس، اگنی کمار رس استعمال میں لائیں جو ہیفہ کے لئے از حد مفید ہیں۔

ہیفہ کے لئے آسان آیور ویدک نسخہ !

ارک جٹاوتی :- آک کی جڑ کا چھلکا نہایت باریک، پس کرادرک کے رس میں برابر ایک روز کھل کر کے ایک ایک رتی کی گولیاں بنائیں، اور نصف نصف گھنٹہ کے بعد مریض ہیفہ کو ایک ایک گولی ہمراہ عرق سولف یا گرم پانی سے نگلوائیں، یہ گولیاں ہیفہ کا نہایت آسان و مفید علاج ہیں۔
ہنگوا دی دلی :- ہینگ بریاں ایک تولہ، جائفل ایک تولہ، مرچ سیاہ ایک تولہ، ناگر موٹھا دو تولہ، کافور ایک تولہ، نہایت باریک پس کر لال مرچوں کے پانی سے کھل کر اس میں ایک ایک رتی کی گولیاں بنائیں۔ یہ ہیفہ کی عجیب الاثر دوا ہے۔ ایک ایک گولی ہر نصف گھنٹہ بعد دیں۔
دیگر :- کافور چار رتی، سوٹھ تین ماشہ، دونوں کو خوب کھل کر اس کی آٹھ خوراک بنائیں اور ہر سندرہ منٹ بعد ہمراہ عرق سولف دیں۔
دیگر :- افیون خالص ایک ماشہ، کالی مرچ، کافور، سوٹھ، ہینگ بریاں ہر ایک دو ماشہ، سب کو باریک پس کر لیموں کے رس میں مونگ کے دانہ کے برابر گولیاں بنائیں اور دن میں تین سے چھ گولی ایک ایک کر کے دیں۔

دیگر :- ناریل دریائی، عرق سولف یا پانی ڈال کر پھر پر اس قدر گھسیں کہ پڑ ماشہ کے قریب وزن ہو جائے، ایک چمچ میں ڈال کر پلاسٹ سے صفراوی ہیفہ کے دست و قیئیں فوراً بند ہو جاتی ہیں۔ اگر مریض ہیفہ کی قے نہ رکھتی ہو تو رائی ایک تولہ گرم پانی میں پیس کر مقام معدہ پر لپیپ کر پی۔ جلن ہونے پر فوراً یہ لپیپ اتار دیں۔ اس عمل سے قیئیں فوراً بند ہو جاتی ہیں۔

لشنج ہیفہ کو دور کرنے کے لئے تلوں کے تیل میں جائفل پس کر ملا لیں اور اس کی مالش کریں، انیٹھن و سردی وغیرہ دور ہو جاتی ہیں۔
پیشاب کی بندش ہو تو چوبے کی مینگین دس تولہ، قلمی شورہ دس تولہ، دونوں کو گرم پانی میں پیس کر ناف کے تنچے لپیپ کریں فوراً پیشاب کھل جائے گا۔

ہومیو پتھک علاج :- ایڈ فاس ۶ (ابتدائی حالت میں) قے اور دستوں کی زیادتی کی حالت میں بسمتھ ۶ یا کیمفر ۶ ہیفہ کیلئے مفید دوا ہیں۔
بایو کیمک علاج :- نیٹرم سلف (مرض کے پہلے درجہ میں) کافی فاس (جب دست اور قے زیادہ ہوں) اور دست چاول کی پیچھ کی طرح آہے ہوں) میگنیشیا فاس (جب اسہال درد سے ہوئے ہوں) کلکیریا فاس (بیماری دور ہونے پر) استعمال میں لادیں۔

غذا پر ہیز :- دو تین روز تک جب تک مرض کا زور رہے مریض ہیفہ کو غذا مطلق نہ دیں، صرف سوڈا واٹر، کھوڑا، پلاٹے رہیں جب مرض میں کمی ہو جائے تو آتش جو پلا لیں، پھر آہستہ آہستہ ساگو دانہ، مونگ کی نرم کھچڑی اور ایک دو دن بعد شوربہ میں ڈبل روٹی یا نرم پھلکا بھگو کر دیں، پھر آہستہ آہستہ غذا بڑھاتے جائیں، دیرینہ چیزوں سے سخت پرہیز کرایا جائے۔

کرمی روگ، انٹریوں کے کیرے، ویدان الامعاء، ان لٹائیل ورمز

(Intestinal Worms)

تعریف مرض :- اس مرض میں انٹریوں میں مختلف قسم کے کیرے ہو جاتے ہیں، جو جلد یا بدیر مختلف قسم کی تکالیف پیدا کر دیتے ہیں۔ اس قسم کے کیریوں کی تعداد دو سے تو تیس ہے، لیکن یہاں صرف تین قسم کے کیریوں کا ذکر کیا جائے گا، جو انسانی انٹریوں میں عام طور پر پائے جاتے ہیں۔
علامات :- رات کو معتد گدّا میں زور سے فارش ہوتی ہے، مریض ناک کھجاتا ہے، منہ سے رال بہتی ہے، بچہ سوتے میں دانت پیستا

ہے۔ وغیرہ علامات پائی جاتی ہیں۔

۱۔ چرنے، چروٹے، تھریڈ ورم، (Thread-Worms)

ہر ایک کرم کی لمبائی ۱/۲ سے ۱/۴ انچ تک ہوتی ہے۔ اس کے سر میں تین ہونٹوں والا منہ ہوتا ہے، یہ کرم نہایت چھوٹے چھوٹے اور دونوں سروں پر گاؤڈم ہوتے ہیں۔ یہ کرم اندھی آنت میں رہتے ہیں، عام طور پر بچوں کو زیادہ ہوتے ہیں، دھاگوں سے مشابہ نکلتے ہیں، جب مرض بڑھ جائے تو غورتوں کی یونی (ویجائنا) یا معدے میں اور دوسری انٹریوں میں بھی چلے جاتے ہیں۔ ان کی تعداد ہزاروں تک ہوتی ہے۔

۲۔ کڈوانہ، مہا کڈکرم، ٹیپ ورم، (Tap-Worms)

پانچ فٹ سے چوبیس فٹ تک لمبا ہوتا ہے۔ اور جوانوں میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں، فیتہ کے مشابہ ہوتے ہیں، اس کے قریب آدھے آدھے انچ کے ٹکڑے پاخانہ میں خارج ہوتے ہیں۔ جو کڈو کے بچوں کی صورت میں ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اسے کڈو دانہ کہتے ہیں، اس کرم کے سر میں چار ڈنگ ہوتے ہیں، یہ انسانی آنتوں کی غشائے مخاطی کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں۔ علامات :- ان کرموں کی موجودگی سے انسان کی چند یا میں درد، بھوک کی زیادتی، گندہ دہنی اور حیرل کمزوری کی علامات پائی جاتی ہیں۔

۳۔ کچھوے یا حیات، راؤنڈ ورم (Round Worms)

یہ کرم پانچ سے سولہ انچ تک لمبا ہوتا ہے اور سوا انچ تک موٹا، اس کے منہ میں چھوٹے چھوٹے دانت ہوتے ہیں اور اس کے تین ابھار بھی دکھائی دیتے ہیں، یہ کرم انسان کی چھوٹی آنتوں میں رہتے ہیں، کبھی آنتوں سے مری یا معدہ یا ناک یا مقعد (گدا) یا پیشاب کی نالی یا مریضہ عورت ہونے اندام نہانی (یونی) میں چلے جاتے ہیں، ان کی شکل کچھوؤں سے مشابہ ہوتی ہے، اس لئے اسے کچھوے کہتے ہیں۔

علامات :- عام طور پر پرٹ پھولا رہتا ہے، نم معدہ میں جھبھ، سیون اور مقعد پر خارش، مریض کے منہ سے بدبو آتی ہے، بھوک بند ہو جاتی ہے اور پاخانہ بے قاعدگی سے آتا ہے، سر میں درد، منہ سے رال بہتی ہے، چہرہ زرد، مریض نیند میں دانت پیستا ہے، کبھی تشنچ، رعشہ یا مرگی بھی ہو جاتی ہے۔ اگر مرض شدید ہو تو مریض پاگل ہو جاتا ہے اور کیڑوں کی آوارہ گردی سے ورم زائدہ عور (اینڈی سائی ٹس) پیدا ہو سکتا ہے اور کبھی یہ کرم ورم جگر کا سبب بن جاتے ہیں۔

پاخانہ کا خوردبینی امتحان :- کیونکہ پاخانہ کے ساتھ ان کے انڈے نکلتے ہیں، جو خوردبین کے بغیر دکھائی نہیں دیتے۔ یہ کرموں کی چوبھتی قسم کہی جاسکتی ہے۔

اسے کلہاڑی نما، انٹرو، ہک ورم، اینیکلو سٹوما (Hookworm Ankylostoma) کہتے ہیں، جو نصف انچ کے قریب لمبے ہوتے ہیں اور سیالی غاٹھ صانہ رکھتے ہیں۔ اس کے انڈے پاخانہ میں نکلتے ہیں، انٹریوں کی رگوں میں سوراخ کر کے ان کا خون چوستے ہیں، جب علیحدہ ہوتے ہیں تو ان کے زہریلے اثرات سے پاخانے کے ساتھ خون نکلتا ہے۔ جس سے مریض دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے اور کمی خون کی علامات ظاہر ہوتی ہیں طبعی براز کا رد و عمل نیوٹرل ہوتا ہے یعنی نہ تیزابی نہ کھاری۔ اگر رد و عمل تیزابی ہو تو انٹریوں میں تخمیر کی علامت ہے اور اگر کھاری ہو تو تعفن کی پہلی صورت عام طور پر چھوٹی آنت میں سوسے ہضم کی علامت ہے اور دوسری صورت بڑی آنت ہضم کی خرابی کی شیرخوار بچوں کے براز کا رد و عمل عام طور پر تیزابی ہوتا ہے، ٹمبس کاغذ سے براز کے رد و عمل کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

علاج ڈاکٹری :- کیچوے (راؤنڈ ورم کا علاج) :- اس کرم کے لئے سینٹونین کامیاب علاج ہے۔ یہ ہر گرین سے ہر گرین تک دی جانی چاہیے، اور اس کے ساتھ مناسب مقدار میں کیلول بھی ملا دیا جائے اور صبح کو نلیں جلاب دینا چاہیے، اس سلسلہ میں بڑے آدمی کو شام کا کھانا کھانے کے تین گھنٹہ بعد کیلول چار گرین، سینٹونین پانچ گرین کھلائیں، صبح میگنیشیا سلفاس چار ڈرام ایک اولس پانی میں گھول کر دیں۔ اگر ایک دفعہ کٹرے خارج نہ ہوں تو تین یا چار یوم کے وقفہ سے چند بار ایسا کرنا چاہیے، سینٹونین کے ساتھ کیٹر آیل کا استعمال نقصان دہ ہے علاوہ ازیں سینٹونین ایک زہریلی دوا ہے، اس کو کھلانے سے بعض دفعہ تمام اشیاء زرد یا پیلی دکھائی دینے لگتی ہیں، اس لئے چھوٹے بچوں کو مناسب عمر پر سے ہر گرین تک احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے۔ بالکل چھوٹی عمر کے بچوں کے لئے تو یہ علاج مناسب نہیں ہے۔ ان کرموں کے لئے آیل آف چینو پوڈیم چار سے آٹھ قطرے کی خوراک میں دیا جاتا ہے، علاوہ ازیں اس ورم کے لئے کاربن ٹیٹر اکلورائیڈ ایٹھالین بھی استعمال کئے جاتے ہیں۔

کدو دانے (ٹریپ ورم) کا علاج :- اس کے لئے ایکسٹریکٹ فیلے سس لکوڈ (Ext-Filicis Liq) جس کو کوڈ ایکسٹریکٹ میل فرن (Liq-Ext- Male-Fern) بھی کہتے ہیں، جو باقتوساگ کا جوہر ہوتا ہے، اس کرم کو دور کرنے کا کامیاب علاج ہے۔ اس علاج سے پہلے دو تین روز مریض کو صرف دودھ پلائیں اور ہلکی غذا دیں، پھر اس دوا کی پندرہ پندرہ بوند کیپ شولز میں ڈال دیں۔ اور کیپ شولز آدھے آدھے گھنٹے بعد چار بار دیں۔ آخری خوراک دوائے کے بعد سڈلز پوڈر ایک ٹریپ یا میگنیشیا کا جلاب دینا چاہیے، تاکہ مردہ کیڑے بذریعہ دست خارج ہو جائیں۔ اگر اس جلاب سے دست نہ ہو تو نیم گرم پانی کا انیا کریں۔ تاکہ مردہ کرم انٹریوں سے خارج ہو جائیں۔ اس علاج کے دوران میں مریض بہتر پر لیتا ہے اور گلو کو زلینا ہے تاکہ تے نہ آئے۔

پیٹنٹ ادویات میں ایکسٹریکٹ کلا لکوڈ جو کیلے کا سیال خلاصہ ہے۔ اسے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے استعمال کے بعد کیٹر آیل کا جلاب دیا جاتا ہے۔

پتھر نے (ہتھریڈ ورم) کا علاج :- انفیوژن کو اسٹیا نصف پائینٹ میں نمک خوردنی آدھا اولس ملا کر ہر دوسری رات حقنہ کریں حبش وائیلٹ کا کورس بھی مفید ہے، استعمال کے دوران میں ایک ہفتہ دوا بند رکھی جائے، اگر مرض شدید ہو تو سینٹونین اور کیلول کا استعمال مفید علاج ہے، ناخنوں کو کارٹ کر صاف رکھا جائے، رات کو سوتے وقت بچہ کے ہاتھوں پر کپڑا باندھ دیں تاکہ مقعد سے ناک کو چھوت نہ سکے۔

کلہاڑی نما (ہک ورم) کا علاج :- اس ورم کے لئے آیل چینو پوڈیم مفید ہے، علاوہ ازیں ٹیٹر اکلورائیڈ ایٹھالین اور کاربن ٹیٹر اکلورائیڈ بہترین ادویات ہیں۔ ست اجوائن پندرہ گرین کی مقدار میں ہر پندرہ منٹ بعد چار بار استعمال کافی ہے۔ آخری خوراک کے دو تین گھنٹہ بعد کوئی نلیں جلاب دیا جائے۔ ان دواؤں کے دوران استعمال میں ایقتر، گلیسرین، تارپین، کلوروفارم، کیٹر آیل، دودھ، تیل، گھی اور شراب کا استعمال منع ہے کیونکہ ان چیزوں کے ساتھ یہ مل کر زہریلا اثر پیدا کرتی ہیں۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ اینٹی پار (Antepar) بروز ویکم ————— یہ پائپر ازیں شربت ہے، ہر ایک ٹیکہ یا چمچ شربت میں ۵

ملی گرام دوا رہتی ہے۔ کیچوے (Roundworms) اور سوتر کرمی (Threadworms) میں مفید ہے۔ ایک چمچ دن میں دو بار یا تین بار ایک ہفتہ تک استعمال کرنا چاہیے، لیکن تین روز کے بعد کوئی نلیں جلاب دے لینا مفید ہوتا ہے۔

۲۔ ہیلما سڈ (Helmacid) گلیکو ————— عام حالات میں دو ٹیکیاں یا دو چمچ دن میں دو بار کافی ہے، کیچوے کے لئے مقدار خوراک چار چمچ یا چار ٹیکیاں تک دینی چاہئیں۔

۳۔ ہیلما سڈ وڈ سنا (Halmacid with Senna) گلیکو ————— اس میں سنا کا جوہر بھی ملا ہوتا ہے۔ بالغوں کے لئے

ایک پکیٹ میں ایک ہی خوراک ہوتی ہے۔ عام طور پر ایک بار میں ہی سب کیڑے نکل جاتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت دینا چاہیے۔

۴۔ ویروکسل ولفرس (Veroxylw fers) کروکس ————— دو ٹکیاں دن میں دو بار بچوں کو بلحاظ عمر دیں۔

۵۔ پائپرین (Pipran) المبیک ————— دو چائے کے چمچے صبح و شام دیں۔

۶۔ انٹاسل (Entacyl) بی، ڈی، ایچ ————— شربت دو چائے کا چمچ صبح و شام دیں یا دو ٹکیاں دن میں دو بار دیں۔

مندرجہ بالا ادویات راؤنڈورم اور فقرہورم کے لئے مفید ہیں۔

۷۔ بوٹولان (Butolan) بائر ————— دو گولی دن میں دو سے تین بار دیں، چڑھنے کے لئے از حد مفید ہے۔

۸۔ آکسی لان (Oxylan) بروزولیکم ————— اسے منبرے کی طرح استعمال کریں۔

۹۔ ڈائی نی نین (Diphenan) بی، ڈی، ایچ ————— چڑھنے کے لئے عام استعمال کی جاتی ہے، بچوں کو ہار سے پرہیز کیجیے اور

جوانوں کو دو ٹکیہ دن میں تین بار تازہ پانی سے دیں۔

۱۰۔ ٹیٹرا فارم (Tetraform) بی، ڈی، ایچ ————— یہ کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ کا تجارتی نام ہے۔ جو کھپڑی نما (ہک ورم) کا

کامیاب علاج ہے، خوراک بلحاظ عمر و وزن دیں ————— بائیرکپینی یہی دوا سیریٹین (Seretion) کے نام سے دیتی ہے۔

۱۱۔ کرسٹو آئیڈز (Crystoids) ایم، ایس، ڈی ————— ہر قسم کے دیدان امحار ہک ورم اور راؤنڈورم کے لئے مؤثر ہے۔

جوان آدمی کے لئے پانچ گولیاں صبح خالی معدہ گرم پانی سے دیں، ۲۴ گھنٹے بعد نمکین جلاب دینے سے مردہ کرم خارج ہوتے ہیں۔ یہ گولی

بغیر چبائے کھانی چاہیے۔ ورنہ غذا کی نالی میں سخت خراش پیدا کر دے گی۔ دوا کھلانے کے کم از کم چار گھنٹے تک کسی قسم کی غذا نہ دیں۔ پانی پی

سکتے ہیں۔ بچوں کو بلحاظ عمر و طاقت کم مقدار میں دیں۔

۱۲۔ یومے سن (Yomesan) بائر ————— ہر قسم کے سفید کرموں (ٹیپ ورم) میں مفید ہے۔ دو ٹکیاں دے کر ایک گھنٹے بعد

دوبارہ یہی خوراک دیں، دوسرے دن میگ سلف (Magsulph) کا جلاب دیں۔

۱۳۔ الکو پار (Alcopar) بروزولیکم ————— ہک ورم و پیٹ کے کیڑوں کے لئے نئی اور بھاری اثر رکھنے والی دوا ہے،

بچوں اور بڑوں سب کو دے سکتے ہیں، ہک ورم کے علاوہ راؤنڈورم کیڑے اور وہپ ورم کیڑے بھی خارج کرتی ہے، اس کی ایک

خوراک صبح گلاس میں شربت کے ساتھ پوری پی جانی چاہیے۔ ایک خوراک سے ہی قریب قریب سب کیڑے نکل جاتے ہیں۔

۱۴۔ ہے ٹرازان (Hetrazan) لیڈرے ————— پیٹ کے کیڑے (راؤنڈورم، ہک ورم) میں پیٹ کو بغیر جلاب کے کیڑے

خارج کر دیتی ہے۔ ایک نا ڈیڑھ چائے کا چمچ دیں۔

یونانی علاج: ————— کید شدہ تین ماشہ، دہی دس تولہ میں ملا کر روزانہ صبح و شام دو روز متواتر کھلائیں، اس کے بعد تیسرے روز کیڑے آئیل چار

تولہ پلائیں اور جب تک ایک دو دست نہ آجائیں، کوئی غذا نہ کھلائی جائے تاکہ کیڑے نکل جائیں، چند روز کا وقفہ دے کر دوبارہ یہی علاج

کریں، پیٹ کے کیڑوں پر حرفہ کا ساگ، کرلیہ، انار، شفتالو، آڑو، پیپتہ اور شریفہ مہلک اثر کرتے ہیں، اس لئے انہیں غذائی علاج کی صورت

میں ضرور استعمال کیا جائے۔ مندرجہ ذیل بحریات انٹریوں کے کیڑوں کو دور کرنے کے لئے نہایت زود اثر ہیں: —

۱۔ چھلکا درخت شہتوت چھ تولہ، چھلکا انار ترش دو تولہ، دونوں کو پکا کر ابال کر صاف کر کے پلائیں۔

۲۔ بابڑنگ و جینی ہر ایک چھ ماشہ بار یک پیس لیں اور چھ ماشہ کی مقدار میں کھلائیں۔

۳۔ کید شدہ تین ماشہ، فقوڑے گڑ میں ملا کر کھلائیں اور اوپر سے چار تولہ کیڑے آئیل پلائیں۔ بڑے اشخاص کے لئے یہ دوا نہایت ہی

کامیاب ہے۔

۴۔ رسونت شدہ، چاکسو شدہ، ہینگ شدہ، مصبر شدہ ہر ایک ایک ماشہ، مزج سیاہ آدھا ماشہ، نیم کے پتے پانچ عدد، سب کو پیس کر بقدر جوار گولیاں بنائیں، چھوٹے بچوں کو ایک اور بڑوں کو دو گولیاں ہمراہ پانی رات کو کھلائیں۔

۵۔ پیٹ کے کیڑے رات کو تکلیف دیں تو تیل تارپین سے بھیاہ تر کر کے مقعد (گڈا) پر لگاویں، آرام ہوگا۔

۶۔ ہرن کھری بوٹی کا پانی دو تولہ کیڑوں کو نکالنے والا ہے۔ ایک دن میں ناندہ دیتا ہے۔

۷۔ گری (کھوپڑا) ہفتہ، ڈیڑھ ہفتہ تین تولہ کی مقدار میں کھانے سے کیڑے خارج ہو جاتے ہیں۔

۸۔ "اظر فیض دیدان" نو ماشہ سے ایک تولہ تک تین روز تک استعمال کر کے بعد کوئی ہلکا سا جلاب دیں۔ اس سے نیم مردہ کیڑے خارج ہو جائیں گے۔

۹۔ اسنتین، کیدہ، بابڑنگ، نیم کے پتے سبز، پلاس پاڑا ہر ایک تین ماشہ بار یک پیس کر شفا لو کے پانی میں گوندھ کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں، خوراک ایک گولی صبح اور ایک شام کھلائیں۔

۱۰۔ باؤ بڑنگ، شکر ہوزن سفوف بنالیں۔ دو گرام پانی کے ساتھ سوتے وقت دیں۔

۱۱۔ کریلے کا چھلکا ۳ گرام، دہی ۶ گرام، کریلے کا اوپری چھلکا چھیل کر سکھالیں، بار یک پیس کر دہی میں ملا لیں اور استعمال کریں۔

۱۲۔ انار کی جڑ کی چھال بوقت ضرورت کے کر سایہ میں سکھا کر سفوف بنائیں، تین ماشہ پانی کے ساتھ سوتے وقت لیں۔

کمیلہ پلرز :- کمیلہ شدرہ، باؤ بڑنگ، پودینہ خشک، چھلکا ہرڑ زرد، تربد سفید شدہ ہر ایک ایک تولہ، کوٹ چھان کر گولیاں بنائیں، خوراک چار سے چھ ماشہ تک رات کو گرم پانی سے کھلائیں، پھر صبح کو کمیلہ آریل ڈیڑھ تولہ پلائیں، اگر ایک باریہ عمل کرنے سے مردہ کیڑے پاخانہ کے راستہ سے خارج نہ ہوں تو چار یا پانچ روز کا وقفہ دے کر یہ نسخہ دوبارہ سہ بارہ استعمال کر سکتے ہیں۔

چھوٹے بچوں کی انٹریوں کے کیڑوں کے لئے مجرب نسخے!

۱۔ ہلدی، بابڑنگ ہر ایک دو رتی پانی میں پیس کر چینی ملا کر چٹائیں۔

۲۔ رسونت، کمیلہ ہر ایک دو رتی پانی کے ساتھ دیں۔

۳۔ تیل نیم یا شفتالو کے پتوں کے پانی میں پھریری تر کر کے مقعد میں لگائیں۔

آیور ویدک علاج :- ۱۔ بابڑنگ ایک تولہ، کمیلہ شدہ ایک تولہ، بیج ڈھاک ایک دو تولہ، ہر سہ ادویات خوب بار یک پیس کر ایک سالہ پُرانا گڑ میں ملا کر بقدر چھ ماشہ روزانہ گرم پانی سے کھلائیں، ہر قسم کے انٹریوں کے کیڑوں کو دور کرنے کا نہایت مفید علاج ہے۔

۲۔ بیج ڈھاک چھ ماشہ، خوب بار یک پیس کر دہی کی چھا چھ میں ملا کر پلانے سے کیڑے ہلاک ہو جاتے ہیں۔

۳۔ بیج ڈھاک اور اجوائن برابر وزن پیس کر ملا لیں اور بقدر چھ ماشہ پانی کے ہمراہ کھلانے سے کیڑوں کے مرض کو آرام آ جاتا ہے۔

۴۔ بوقت رات کو مریض کو خوب پیٹ بھر کر میٹھا پلاؤ کھلائیں، صبح ایک پاؤ دہی میں مناسب مقدار میں کمیلہ شدہ ملا کر پلائیں، اگلے روز چار تولہ کمیلہ آریل دودھ میں ڈال کر دیں، اس طرح ہر قسم کے اندرونی کیڑے دور ہو جاتے ہیں۔

وڑنگ آدی چورن :- بابڑنگ، سیندھانک، ہینگ بریاں، چھلکا ہرڑ زرد، تربد سفید شدہ، سوخیل نمک، پسی، ان کو خوب بار یک

پیس کر سفوف بنائیں اور بقدر تین ماشہ گرم پانی کے ہمراہ صبح و شام چند یوم کھلانے سے ہر قسم کے کرمی خصوصاً "کچھ کرم ناش" ہو جاتے ہیں۔

کرمی گھسن رس :- بابڑنگ، بیج ڈھاک، مغز بیج نیم، تلسی کے پتوں کی راکھ، جملہ برابر وزن نہایت بار یک پیس کر محفوظ رکھیں اور

بوقت ضرورت اس میں سے تین ماشہ روزانہ صبح و شام گرم پانی سے کھلانے سے سب طرح کے کیڑے دور ہو جاتے ہیں۔
 گرمی کٹھار رس (نگھٹور تناکر) :- کپور آٹھ تولہ، اندرجو، ترمان، اجمود، بابڑنگ، شنگرف شدہ، مٹھا تلبہ، ناگ کلسر ایک ایک تولہ۔
 ترکیب :- سب کو بھنگ کے رس میں چھ گھنٹہ تک کھل کر پس اور اس کے برابر بیج پلاس کا سفوف ملا کر رس برہمی کی بھاوتا دیں۔ اور ایک ایک رتی کی گولیاں بنائیں، خوراک ایک سے دو گولی ہمراہ شہد استعمال کریں۔

طب آیور وید کے مطابق پیٹ کے کیڑوں کی بیس قسمیں ہیں، یہ رسائیں تمام کیڑوں کو فوراً ختم کر دیتی ہے۔

وڑنگا ارشٹ (بھیشج رتناولی) :- بابڑنگ، پلامول، راسنار، کچھال، اندرجو، پاٹھا، ایوالک پھل، آملہ، ہر ایک پانچ پانچ چھٹا سب کو کوٹ چھان کر تین من آٹھ سیر پانی میں پکائیں، بتیس سیر پانی پہنے پر چھان لیں اور دار چینی، الاچی، تیز پات ہر ایک دس تولہ، چھال کچنار، پرینگو، لودھ ہر ایک پانچ پانچ تولہ، سونٹھ، لکھاں، مریح سیاہ، تینوں چالینس تولہ، گل دھاداسو اسیر، شہد پونے انیس سیر، سب کو مٹکے میں ڈال کر بند کر دیں اور حسب دستور ارشٹ تیار کریں۔ یہ آرشٹ آدھ سے ایک تولہ، جذاز غذا دیں۔ آنتوں کے کیڑوں کو دور کرنے کے علاوہ، ہنجراں، بھگندرا اور پرانے زخموں کے لئے ازہد مفید ہے۔

وڑنگ اولیہ :- باؤڑنگ ایک پاؤ کو خوب باریک پیس کر تین یا چار گنا شہد میں ملا کر بطو معجون تیار کریں۔ یہ وڑنگ اولیہ ہے۔
 چھ ماشہ سے ایک تولہ ہمراہ گرم پانی روزانہ استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے ہر قسم کے کیڑے دور ہو جاتے ہیں۔

نوٹ :- ہومیوپیتھک و بائیو کیمک طریقہ علاج اس مرض میں بعض تجربات خاص مفید ثابت نہیں ہوئے۔ اس لئے ان کا

اندراج نہیں کیا گیا ہے۔

آنتوں میں گرہ پڑ جانا، انٹسائینل لکشن

(Intussusception-Intestinal Obstruction)

تعریف مرض :- آنتوں میں گرہ یا رکاوٹ پڑ جاتی ہے۔

وجوہات :- انٹریوں کی سوزش، انٹریوں کے زخم، انٹریوں کا سرطان، انٹریوں کا راستہ تنگ ہو جانا یا بالکل بند ہو جانا، انٹریوں کا ایک دوسرے سے چپک جانا، پاخانہ کے سڈوں یا کسی وجہ سے بند ہو جانا وغیرہ۔

علامات :- دس سال کی عمر تک بچوں کے اندر ایک انٹری دوسری انٹری میں پھنس جاتی ہے اور جو آنت پھنس جاتی ہے وہ سوج جاتی ہے اس کا مقام عام طور پر ناف کے نزدیک ہوتا ہے، قبض شدید ہوتی ہے، بعض دفعہ بار بار قے آتی ہے۔ مریض کمزور ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں شدت کا درد ہوتا ہے، کسی پہلو آرام نہیں آتا، مرض کی شدت میں پہلے قے میں معدہ کی خوراک اور بعد میں بدبودار قے یعنی پاخانہ کی قے خارج ہوتی ہے۔ جو اس مرض کی خاص علامت ہے۔

علاج :- شروع مرض میں گرم پانی کا حقن کرنا چاہیے، اگر درد اور نفخ شدت اختیار کر جائے، اور کمزوری بڑھ جائے تو فوراً آپریشن کی طرف توجہ دی جائے، کیونکہ اس مرض کا علاج سوائے آپریشن کے ممکن نہیں، اس لئے کسی بھی طبی کے نسخہ جات درج نہیں کئے گئے ہیں، جب بھی مرض کی تشخیص ہو اسے فوراً کسی بڑے ہسپتال میں آپریشن کا مشورہ دینا چاہیے۔ ورنہ مرض کی شدت سے مریض ایک دو دن میں ہی اس جہاں فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔

اسی طرح انٹریوں کی رسولیاں ٹیومر آف انٹسٹائن (Tumours of intestines) میں اور انٹریوں کے سرطانی پھوڑے میں مریض کو آپریشن کا مشورہ دینا چاہیئے، کیونکہ سوائے آپریشن کے اس مرض کا علاج ناممکن ہے۔ اگر آپریشن کے باوجود بھی بار بار یہ عارضہ ہو جائے تو اس کا علاج ریڈیم سے کیا جاتا ہے۔ مگر یہ صرف گورنمنٹ ہسپتال پٹنہ میں ہوتا ہے، نئے تجربات کے مطابق اس مرض کا علاج ایٹم شکتی سے بھی کیا جاتا ہے۔ اور بھارت میں اس طرح کا علاج صرف کینسر ہسپتال ممبئی یا چتر بجن کینسر ہسپتال کلکتہ وغیرہ صرف چند ایک بڑے ہسپتالوں میں ہوتا ہے۔ ریڈیم کا علاج تو اب دہلی کے بڑے ہسپتالوں میں بھی کیا جاتا ہے۔ عام معالجین کو ایسی خطرناک امراض کے علاج کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیئے اور مریض کو کسی اچھے ہسپتال میں داخل ہونے کا صحیح مشورہ دینا چاہیئے۔

اپانٹرشوٹھ، ورم زائدہ اعور، اپنڈے سائٹس، (Appendicitis)

تعریف مرض :- اعور یعنی کانی آنت یا ایک منہ والی آنت چار سے لے کر چھ انچ تک لمبی ہوتی ہے اور اس کی موٹائی پر کے برابر ہوتی ہے، اس میں ورم ہو جاتا ہے۔

وجوہات :- جدید تحقیقات کے مطابق یہ مرض بی کولائی (B-Coli) جرثومہ سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ پائوجینک کاکائی (Pyogenic Cocci) اور پروٹوس (B-Proteus) جراثیم بھی پائے جاتے ہیں، بعض دفعہ قبض، سیدب کے بیج، انگور کے بیج وغیرہ سے بھی انٹریوں میں خراش پیدا ہو کر یہ عارضہ ہو جاتا ہے، علاوہ ازیں یہ مرض مونیر، نزہ، زکام وغیرہ سے بھی ہو سکتا ہے۔

علامات :- پہلے پیٹ میں ناف کی طرف (ارد گرد) زور کا درد ہوتا ہے۔ اور اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے، لیکن آخری طور پر ناف کے دائیں طرف درد قائم ہو جاتا ہے، دائیں ٹانگ کو مریض اکثر کھینچتا رہتا ہے، بخار ۱۰۱ یا ۱۰۲ تک ہوتا ہے، نبض کی رفتار ۱۲۰ فی منٹ تک پہنچ جاتی ہے، متلی اور قے بھی آتی ہے، مقام ماؤف پر ابھار محسوس ہوتا ہے۔ اور دبانے سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کھانا نہ کھانے سے اس درد میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، یہ درد ورزش سے اکثر بڑھ جاتا ہے، پرانی حالت میں صبح اور یقینی تشخیص کے لئے ایکس ریز سے امداد یعنی ضروری ہے، عام طور پر علاج سے چار یا پانچ دن میں ورم تحلیل ہو جاتا ہے۔ اگر مرض شدید ہو اور پھوڑا بن جائے تو سوائے آپریشن کے کوئی علاج نہیں ہے۔

ڈاکٹری علاج :- اگر ورم میں مواد اور پیپ پیدا نہ ہوئی ہو تو سلفاڈایازین یا سلفاٹرایڈ یا سپٹران دیں۔ انٹی بائیٹک علاج میں پینی سلین، آریو مائی سین، ٹیرامائی سین مفید ادویات ہیں۔ بیرونی سیلاڈونا پلاسٹر مقام مرض پر لگائیں، جلاب ہرگز نہ دیں، اگر چار یا پانچ دن میں آرام نہ آئے تو آپریشن ہی موثر علاج ہے، بیرونی طور پر ربر کی بوتل میں گرم پانی ڈال کر ٹکڑ کر دیں۔ درد کے آفاقہ کے لئے درد کو دور کرنے والی ادویات ہیں۔

پینی سلین اس مرض کا شافی علاج ہے۔ بڑے آدمی کو ہر چھ گھنٹہ بعد چار لاکھ یونٹ عضلاتی انجکشن دیں، تین انجکشنوں سے ورم وغیرہ بالکل دور ہو جاتا ہے یا پروکین پینی سلین چار لاکھ چوبیس گھنٹہ بعد ایک انجکشن لگانا کافی ہے۔

ڈاکٹر ایریک کولٹر رے لندن نے لکھا ہے کہ ورم زائدہ اعور کا واحد علاج آپریشن نہیں ہے۔ بلکہ اس کا علاج 'جدید علاج پنیسلین اور سلفا گروپ کی دوائیوں سے کرنا چاہیئے۔ ۱۸! جب مرض کا بار بار حملہ ہو تو آپریشن کرنا چاہیئے۔

مادرین ادویات :- ۱۔ ڈائی کریسٹوسین (Di-cysticin) سارا بھائی — یاسٹریٹو پینی سلین (Strepto-penicillin)

آدھا گرام جو کہ پنیسلین و سٹریپٹومائی سین کا مرکب ہے۔ ہر ۲۴ گھنٹہ کے بعد عضلاتی انجکشن کریں۔

۲۔ ٹیرامائی سین (Terramycin) فزر ————— کا ۲۵۰ ملی گرام کا کیپ شول یا ٹیرامائی سین ایس، ایف (Terramycin S.F.) کیپ شولز ہر چھ گھنٹہ بعد دیں یا اس کا مناسب مقدار میں عضلاتی انجکشن دیں۔

۳۔ ایکرومائی سین (Achromycin) یا آریو مائی سین (لیڈرے) ۲ کی طرح استعمال کریں۔

۴۔ فینوسین (Fenocin) ڈیو میکس ————— یا اوراسین کے (Oracyn-K) ایم بی ————— یا پینیڈس وی (Pensids v) سارابھائی ————— یا کرسٹاپین وی (Crystapen v) گلیکو ————— یہ سب پنیسلین وی کی ٹکیاں

ہیں۔ ایک دو ٹکیاں ہر چھ گھنٹہ بعد دیتے رہیں۔

۵۔ سلفاڈایازین (Sulphadiazin) یا سلفاٹرائیڈ (SulPhatriad) ایم بی ————— چھ سے بارہ ٹکیاں ہر روز تازہ پانی سے دیتے رہیں۔ اسے انجکشنوں کے ساتھ ساتھ منہ کے راستے سے دیا جاسکتا ہے۔

۶۔ پینی ٹرائیڈ (Penitriad) ایم بی ————— یا پینیڈ سلفا (Pentidsulpha) سارابھائی ————— تین سے چھ ٹکیاں ہر روز تازہ پانی سے دیں ————— مرض کی معمولی حالت میں ۴ و ۵ کے نسخہ جات اکیلے استعمال کرنے سے بھی نمایاں فائدہ ہوتا ہے۔

۷۔ بائی فلو جیٹین (Bi-Phlogistin) بنگال ایمونٹی ————— یا انٹی فلو جیٹین کی پلٹس دائیں طرف درد والی جگہ کے اوپر باندھیں اور ہر چھ گھنٹہ بعد بدلتے ہوئے رکھنے سے درد کو فوراً آرام آجاتا ہے۔

۸۔ زیادہ درد کی حالت میں سیلاڈی نال (Balladenal) رٹوز ————— دینا مفید ہے۔

یونانی علاج :- تین بڑی آنتوں میں سے پہلی آنت جس کا نام اعور یا کالی آنت ہے، کیونکہ آنکھ کی طرح ایک سوراخ ہوتا ہے، اس آنت کے پچھلے حصہ سے ایک لمبا ابھار یا زائدہ نکلا رہتا ہے، جس کی لمبائی تین انچ سے چھ انچ تک ہوتی ہے، اس کو دوویہ کہتے ہیں، زائدہ دوویہ میں اگر ورم ہو جائے تو اس کو اپنڈے سائٹس کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس زائدہ میں ایک باریک سوراخ ہوتا ہے، جو اعور میں کھلتا ہے، چنانچہ دیگر اسباب کے علاوہ اگر اس سوراخ میں امروہ و انجیر جیسے چھوٹے بیج والے پھلوں کے بیج چلے جاتے ہیں۔ تو اکثر سبب مذکور ہو جاتے ہیں، اس کا علاج قبض کو دور کرنے کے ساتھ تحلیل ورم ہے۔ چنانچہ آب کو سبز مرق، آب کاسنی سبز مرق میں مخزالتاس حل کر کے نیم گرم پلانا نہایت مفید ہے، جب تنکار یا حب کبد نوشادری کھانے کے بعد دیں، ماش کا آٹا جس میں سونٹھ، ہینگ شامل کر کے گوندھ کر روٹی پکا کر ایک طرف سے پختہ کریں اور کچی طرف سے روغن بابونہ سے چرب کر کے نیم گرم مقام درد پر باندھیں، گرم ٹکڑ کرنا از حد مفید ہے یا سونے کے سبز پتوں کا پانی نکال کر آگ پر چڑھا کر بھاڑ دیں اور چھان کر آٹھ تولہ پانی میں شربت دینار چار تولہ ملا کر صبح اور شام پلائیں یا حب تنکار دو عدد ہر تیسرے روز رات کو سوتے وقت کھلائیں، ماش کا آٹا یا ڈبھر بکری کے دودھ میں گوندھ کر کھانے کا نمک، سونٹھ، بیج سویہ، ہینگ ہر ایک ایک ماش باریک پس کر ملائیں، ٹیکہ کو ایک طرف سے پکائیں اور دوسری طرف سے خام رکھیں، خام (کچی) طرف کو کیسٹر آیل سے چھڑ کر ذرا نیم گرم باندھیں، غذا دودھ اور پختی کے سوا کچھ نہ دیں، دو چار دنوں میں آرام آجائے گا، جب کبد نوشادری اور حب تنکار کے نسخہ جات درج ذیل ہیں :-

حب کبد نوشادری :- غذا کو ہضم کرتی ہے، قبض کو دور کرتی ہے۔ اور گرانی شکم کو کھودیتی ہے، جگر سخت ہو جائے یا بڑھ جائے یا زیادتی بلغم سے عروق و مجاری میں سدے پڑ جائیں تو بہت مفید ہے، نوشادر، نمک طعام، نمک سیاہ، سہاگہ بریاں، نمک لاہوری، زکچور، پھلکا ہڑ کا بلی، ہڑ سیاہ، باؤ بڑنگ، مرچ سیاہ، سونٹھ ہر ایک برابر وزن کوٹ چھان کر عرق کلاب میں ملا کر گولیاں بقدر نگو دبنائیں۔ خوراک دو سے چار گولی تک بعد طعام ہمراہ عرق سولف یا پانی کھلائیں۔

حب تنکار :- یہ بھوک لگاتی ہے، دائمی قبض رفع کرتی ہے اور پیٹ کو بڑھنے سے روکتی ہے، سہاگہ سات ماش، اجوائن خراسانی پونے نو ماش، مرچ سیاہ ساڑھے تین تولہ، صبر شدھ چار تولہ آٹھ ماش، شیرہ گھیکوار میں چنے کے برابر گولیاں بنائیں، خوراک ایک سے تین گولی تک سونے وقت یا کھانے کے بعد دونوں وقت پانی کے ساتھ کھلائیں۔

آیور ویدک علاج بطرز تولنج (کالک Colic) کے کریں۔

ہومیوپیتھک علاج :- لائیکوپوڈیم (Lycopodium) ہومیوپیتھک دوا کا استعمال مفید ہے۔ مریض کی عمر و طاقت کے مطابق دیں۔
غذا پر سبزی :- شدت مرض میں فاقہ بہتر ہے اور رفع تشنگی کے لئے تھوڑا تھوڑا پانی دیں۔ دورہ مرض کے بعد چند روز تک سیال غذا، سکرے، مالٹا کارس، گلوکوز، دودھ، سوڈا، بخنی وغیرہ دیتے رہیں اور رفتہ رفتہ ٹھوس غذا دیں۔

ناف ٹلنا (Umbilical-Displacement)

اس مرض میں ناف ٹل جاتی ہے، لیکن چونکہ عام طبی و ڈاکٹری کتابوں میں اس مرض کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس لئے معالجین اس کو مرض خیال نہیں کرتے، حالانکہ ناف ٹل جانا ایک واضح بیماری ہے، اس کے لئے مالش کرنا بہت مفید ہے اور ناف کو پیچھے دبا کر مالش کرنی چاہئے تاکہ وہ درمیان میں آجائے، ناف کی درستگی کی واضح علامت یہ ہے کہ ناف اور دونوں پستانوں کا فاصلہ برابر ہونا چاہئے۔ اگر ساتھ ہی قبض، اسہال یا نفخ شکم کا عارضہ ہو تو اس کے مطابق علاج کرنا چاہئے۔

ارش، بواسیر، پائلز (Piles)

تعریف مرض :- اس مرض میں مقعد کے اندر یا باہر سے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کی دو قسمیں خونی اور بادی ہیں۔ خونی میں مسوں سے خون آتا ہے اور بادی میں درد و خارش ہوتی ہے، خون کبھی پاخانہ سے مل کر آتا ہے، کبھی بعد از پاخانہ قطرہ قطرہ یا لگاتار نکلتا ہے۔ یہاں خونی و بادی بواسیر کا علیحدہ علیحدہ بیان درج کیا جاتا ہے :-

رکت ارش، بواسیر خونی، پائلز (Piles) ہیمورائیڈس (Haemorrhoids)

تعریف مرض :- مقعد (گدا) کی رگوں کے منہ پر سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ پاخانہ کے بعد یا پہلے خون کے قطرے نکلتے ہیں۔
وجوہات :- طب قدیم عام طور پر سوداوی خون کو بواسیر کا سبب قرار دیتی ہے جو یا تو اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ گرم دواؤں اور غذاؤں کے استعمال سرخ مریضوں کی کثرت، گوشت خوری کی زیادتی یا سودا کے ساتھ تیز اور جلی ہوئی صفر کے مل جانے سے اس میں احتراق لاحق ہو جاتا ہے یا سوداوی اغذیہ مثلاً مسور اور مینگن وغیرہ کے کثرت استعمال کے سبب سے خون غلظت اور احتراق پیدا کر کے آنتوں تک پہنچتا ہے اور رفتہ رفتہ اپنے نقص کے باعث پیچھے کی طرف آنتوں کی رگوں کے ان انتہائی سروں تک پہنچ جاتا ہے جو اسحائے مستقیم کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور وہ گندہ مادہ وہاں جلن پیدا کرنے

کے علاوہ کچھ پاؤٹ پیدا کر دیتا ہے اور ان رگوں کے سرے اس کھینچا تانی کے اثر سے پھول کر ابھر آتے ہیں اور مٹے کھلاتے ہیں، بسا اوقات ان میں شدت کا درد اور تکلیف پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی اس مقام پر درم کے سبب راستہ تنگ ہو کر سخت قبض کا باعث ہو جاتا ہے۔ اگر مشکل سے پاخانہ آئے بھی تو مسوں اور متورم رگوں پر دباؤ پڑنے کی وجہ سے علاوہ تکلیف اور درد کے خون بہنے لگتا ہے۔ جو پاخانہ کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ کبھی پہلے اور کبھی بعد میں آتا ہے۔ کبھی خون اس قدر خارج ہوتا ہے کہ مریض حد درجہ کمزور ہو جاتا ہے، رنگ زردی مائل بہ سبزی ہو جاتا ہے، جگر کا فعل درست نہیں رہتا، آنکھوں پر بھر بھرا ہٹ پیدا ہو جاتی ہے، بھوک کم و سوزش کی شکایت ہو جاتی ہے، کبھی خضیبہ، مثانہ اور کمر میں بھی درد محسوس ہوتا ہے، مرض کی شدت کے باعث دورانِ سر لاحق ہو جاتا ہے۔ زبان سیاہ ہو جاتی ہے اور نچلے ہونٹ پر سفیدی مچھلکنے لگتی ہے۔

نوٹ :- مسوں کی شکل و صورت کے لحاظ سے طب قدیم میں اس کی سات اقسام ہیں، (۱) صفر ہودی، (۲) مخفی، (۳) عینی،

(۴) تینی، (۵) ٹولوی، (۶) تری، (۷) توتی۔

پہلی قسم میں صفر پھول جاتا ہے اور کچھ مواد کا ترشح ہوتا ہے۔ مخفی مسوں کا رنگ ارغوانی ہوتا ہے۔ اور ان میں شاخیں ہوتی ہیں، دوسرے جن چیزوں سے مشابہت دی گئی ہے، اس سے مشابہ ہوتے ہیں، طب جدید میں ان کی تین اقسام دی گئی ہیں :-

۱۔ اندرونی بواسیر، جس کے مٹے بہت اندر کی طرف ہوتے ہیں اور دیکھے نہیں جاسکتے۔ ان مسوں سے خون تو آتا ہے لیکن درد معمولی ہوتا ہے۔

۲۔ درمیانی بواسیر، اس کے مٹے نہ بہت اندر اور نہ بالکل باہر بلکہ درمیان میں ہوتے ہیں۔

۳۔ بیرونی بواسیر، اس کے مٹے باہر کی طرف ہوتے ہیں اور آسانی سے نظر آتے ہیں، اگرچہ خون کم خارج ہوتا ہے لیکن درد شدت کیساتھ ہوتا ہے۔

علامات :- اندرونی مسوں سے خون خارج ہوتا رہتا ہے جو براز کے ساتھ گندھا ہوا نہیں ہوتا، ان میں درد کچھ نہیں ہوتا، بیرونی مسوں میں درد ہوتا ہے، مگر ان سے خون خارج نہیں ہوتا، جو مٹے عین دُبر کے کنارے پر ہوں، ان میں دونوں علامات ہوتی ہیں یعنی درد بھی اور اخراج خون بھی، جب مرض ترقی کر جاتا ہے تو مسوں کا حجم بڑھ جاتا ہے اور خروج المقعد کا عارضہ بھی ساتھ ہو جاتا ہے۔ خون کبھی براز کے ساتھ قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے لیکن کبھی اس قدر زیادہ خارج ہوتا ہے کہ مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، مریض کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، عرصہ تک خون آتے رہنے سے مریض کو کئی خون کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔

ڈاکٹری علاج :- سلفر سی میٹ ایک اونس، پوٹاسیم ایڈ ٹار ٹریٹ ایک اونس ملا کر سفوف بنائیں اور ایک چھوٹا چمچ دودھ کے ساتھ ملا کر روزانہ ناشتہ سے پہلے کھائیں تاکہ اجابت نرم آئے اور اس کی خراش سے خون نہ بہنے لگے، مندرجہ ذیل مرہم اور سپاز میٹری سوزش اور درد کو رفع کرنے اور خون کو بند کرنے کے لئے خاص طور پر مفید ہیں۔

۱۔ بواسیر انٹیمنٹ

بکوڈ ایکٹریٹ آف ہیپے سیلڈس ۲۴۰ گم

لینولین ۱۲۰ گریں

ویزلین ۱۲۰ گریں

مرہم بنائیں اور صبح و شام مسوں پر لگائیں سوزش دور کرنے اور خون بند کرنے کے لئے ولایت کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں مروج لنڈ فارما کو پیا کا نسخہ ہے۔

۲۔ شافہ بواسیر

ٹینک ایڈ ۵ گریں

آیل تھیو بروما (Oil-Theo Broma) ۱۲ گریں

یہ ایک شافہ ہے، ایسی ۱۲ سپاز میٹری بنائیں، ایک خافہ صبح و ایک شام کو مقعد (گدا) میں لگائیں۔

۳۔ پائلرز انٹیمنٹ

اینے تھین ۲ گریں

اکستھی اول ۵ گریں

زنک اوکسائیڈ ۹۰ گریں

ویزلین سفید
مریم تیار کر لیں اور مسوں پر لگائیں، جب مسوں کی خارش دردناک ہو تو اس کو مسوں پر لگانا مفید ہے۔

۴۔ بوا سیر پیٹ
ایسے تھین
زنک اوکسائیڈ
سافٹ پیرافین
اکتھی اول
پیٹ بنائیں۔ مسوں کی خارش کے لئے بیرونی طور پر لگانے سے تسکین ہوتی ہے۔

۵۔ کیٹر آئیل
کافور
ترکیب تیاری: کیٹر آئیل کو گرم کر کے اس میں کافور حل کر کے شیشی میں بند رکھیں، صبح و شام مسوں پر نیم گرم لگائیں، درد بوا سیر کو ٹیکہ سے علاج :- اس مرض میں آپریشن اور جلی سے جلانے کا رواج ہے۔ جسے ایک مستند ڈاکٹر بخوبی سراہا ہے۔ اس سے علاج بھی ایک مستند ڈاکٹر کا کام ہے۔ اس سلسلہ میں ایڈ کار بالک، ۲۰ گرین، روغن بادام خالص ایک اونس محلول بنا کر اس دوا کے دو سے ہر ایک مٹے کے ارد گرد انجکشن کریں۔ اگر ٹیکہ کرتے وقت مریض کو بہت درد ہونے لگے تو یہ عمل بند کر دیں۔ درد بجائے فائدہ کے نقصان نے کا احتمال ہے۔

تسکین دینے کے لئے مفید ہے۔

۶۔ مریم بوا سیر

نیم آئیل (روغن نیم)

۵ تولہ

۱۰ تولہ

۱ تولہ

۶ ماشہ

۴ رتی

ویزلین سفید

ایکسٹریکٹ سیلاڈونا

کیمفر (کافور)

طوطیا

ترکیب تیاری :- تمام ادویات کو کھل کر کریں باریک ہونے پر شیشی میں محفوظ رکھیں، اور ہتھوڑی سی مریم مسوں پر لگا کر سینک دیں۔ جتنی پر لگا کر ناسور میں رکھیں۔ یہ مریم مسوں کو تحلیل کرتی ہے۔ درد کو آرام دیتی ہے۔ ناسور کے لئے نہایت اعلیٰ چیز ہے۔ بوا سیر کے مٹے خواہ کتنے پڑانے کیوں نہ ہوں اس کے چند روز کے استعمال کرنے بوا سیر کے مسوں کو آرام آ جاتا ہے۔

پینٹ خارجہ ادویات میں گال اینڈ اپیم آئینٹ (مریم مازو وانیون)، ہیڈنسا (Hadensa) ایسے تھین آئینٹ (Ane-thain) ساختہ گلیکوکینی، اینوسول (Anusol) ریکٹوسرول (Rectoserol) ایچ پی آئینٹ (H.P. Ointment) ساختہ کیپی، ٹیسفول (Tecifol) ساختہ ٹی، سی، ایف کیپی استعمال کی جاتی ہیں، خوراک استعمال کے لئے پلو گلائی سرزا (کمپونڈ) یا لکٹو پیرافین بہترین قبض کشا ادویات ہیں، ایلیو پیچی طریقہ علاج میں خوردنی کوئی خاص علاج کامیاب ثابت نہیں ہوا، اس لئے خوردنی علاج کے یونانی یا یورپین نسخہ جات میں سے کسی ایک کا استعمال مفید ہے۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ پریڈسولان ایچ (Predsolan-H) گلیکویا ہیڈنسا مریم اندرونی اور بیرونی بوا سیر مفید کا پھٹنا، مقعد کی سخت خارش، ورم و زخم میں مفید ہے۔ اسے ٹیوب سے لگایا جاسکتا ہے۔ ۲۔ پروکٹوسیدل (Proctosedyl) فرانکو انڈین فارما بوا سیر بوا سیر کی پچیدگیوں میں مفید ہے، دن میں کئی بار لگانے سے درد اور ورم کو آرام دیتی ہے۔ اسے مقعد میں ٹیوب کی نالی کے ذریعے لگایا جاتا ہے۔ ۳۔ ایچ پی آئینٹ (H.P. Ointment) بوش اندرونی بوا سیر کے لئے یہ مریم نوزل کے ذریعے مقعد میں صبح و رات کو داخل کریں۔ بیرونی بوا سیر کے مقام ماؤف کو نیم گرم پانی کے ساتھ دھو کر خشک کر کے لگائیں۔

۱۔ پریڈسولان ایچ (Predsolan-H) گلیکویا ہیڈنسا مریم اندرونی اور بیرونی بوا سیر مفید کا پھٹنا، مقعد کی سخت خارش، ورم و زخم میں مفید ہے۔ اسے ٹیوب سے لگایا جاسکتا ہے۔

۲۔ پروکٹوسیدل (Proctosedyl) فرانکو انڈین فارما بوا سیر بوا سیر کی پچیدگیوں میں مفید ہے، دن میں کئی بار لگانے سے درد اور ورم کو آرام دیتی ہے۔ اسے مقعد میں ٹیوب کی نالی کے ذریعے لگایا جاتا ہے۔

۳۔ ایچ پی آئینٹ (H.P. Ointment) بوش اندرونی بوا سیر کے لئے یہ مریم نوزل کے ذریعے مقعد میں صبح و رات کو داخل کریں۔ بیرونی بوا سیر کے مقام ماؤف کو نیم گرم پانی کے ساتھ دھو کر خشک کر کے لگائیں۔

۴۔ پلائوفارم آسٹیمٹ (سے اینڈ بیکر) در دو کو بند کرنے کے لئے مسوں پر لگائیں۔

۵۔ نیوپرکینال آسٹیمٹ (Neupercainalointment) سبباً ————— دن میں دو سے تین بار یا پاخانہ سے پہلے و بعد ہفتہ میں داخل کریں یا پرے پریشن ایچ (Preparation-H) مرہم لگائیں۔

۶۔ ریکسٹون (Rexaton) یا پائیلیکس یا پائیلیکن ایک سے دو گولی دن میں دو بار کھانا کھانے کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد تازہ پانی سے دیں۔

۷۔ میڈی تھین (Medithane) جیوفرے میزس ————— یہ مرہم بواسیر، نوایر اور بھگندہ کے لئے مفید ہے، اسے ایک ریپی کیٹر ذریعے معد میں لگایا جاسکتا ہے۔

۸۔ پائیز پلز علاج (Piles Pills) (سکھائیگ ملتانی دوا خانہ (رجسٹرڈ) پانی پت) بواسیر خونی و بادی کے لئے سینکڑوں مرتبہ کا آزمودہ علاج ہے اس کی دو یا تین خوراک ہر قسم کی جلن و درد، سوزش کو آرام دیتی ہیں، خون بند ہو جاتا ہے اور سستے مر جھاب جاتے ہیں۔

یونانی علاج :- شروع مرض میں اس قدر علاج کافی ہے کہ قبض نہ ہونے دی جائے، دودھ، مرغی، غذائیں، سبز کولت اور تازہ پھل بکثرت کھائیں گرم اغذیہ سے سخت پرہیز کریں۔ قبض کے لئے چھلکا ایسنگول ایک تولہ روزانہ دودھ سے پھانکتے رہیں، خونی بواسیر میں جب تک غلیظ اور سیاہ رنگ کا خون نکلا رہے، بدن میں حرارت کا غلبہ ہو اور کمزوری کا ڈر نہ ہو، اس وقت تک خون بند نہ کریں، ہاں اگر صاف سرخ اور تپلا خون کثرت کے ساتھ خارج ہونے لگے حرارت میں کمی اور مرض کو کمزوری سے غشی کا ڈر ہو تو خون بند کرنے کی فوری تدابیر کرنی چاہئیں۔

جس طرح انسان کے گلے پر گرمی اور سردی کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح سردی اور گرمی کا اثر مقعد (گڈا) پر بھی ہوتا ہے۔ اس لئے غناک یا سرد جگہ یا پروں کی گدی یا روئی رکھ کر بیٹھنا بھی مضر ہے، لہذا مریض یا بواسیر کو بید کی کرسی پر بیٹھنا مفید ہوتا ہے، کھلی ہوئی میں متدل ورزش، پیدل ہوا خوری ہونا ہی مفید ہیں۔

مندرجہ ذیل مجربات خونی بواسیر کے لئے از حد مفید ہیں :-

حب بواسیر خونی :- گیر و دو تولہ، رسوت شدہ ایک تولہ، دونوں کو بزر کھروندہ بوٹی کے پانی میں یا سبز بکھر بوٹی کے پانی میں پیس کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور روزانہ دو گولی صبح، دو گولی شام ہمراہ تازہ پانی کھلائیں، یہ بوٹیاں ہر جگہ عام مل سکتی ہیں شاخت کے لئے ہندوستان کی جڑی بوٹیاں (ہاتھو کتاب منجر نرالا جوگی پبلکیشنز پانی پت سے پوسے کی دی، پی سے منگائیں۔

دوائے بواسیر :- رسوت شدہ ایک ماشہ کی گولی بنا کر پہلے کھلائیں، اوپر سے لعاب ریشہ خطمی چار ماشہ، شیرہ چھلکا جڑا بجنار چھ ماشہ، شربت بنفشہ دو تولہ ملا کر ایسنگول چھ ماشہ چھڑک کر پلائیں، بواسیر خونی کے لئے نہایت ہی مفید ہیں۔

دیگر :- سیپی دریائی لے کر کوٹوں کی آگ پر جلا کر راکھ بنا لو، بقدر چار رتی گائے کی تسی کے ساتھ کھلائیں، بواسیر خونی کے لئے مفید ہے۔
دیگر :- لکروندہ بوٹی چھ ماشہ، برگ گیندا چھ ماشہ، مرچ سیاہ تین دانہ، سب ادویہ کو دس تولہ پانی میں گھوٹیں اور چھان کر پلائیں، قدرت کی مہربانی سے دو ہفتہ کے استعمال سے ہر قسم کی بواسیر کو آرام آ جائے گا۔

دیگر :- بول کی چھال چھ ماشہ دہی کے ساتھ کھلانا از حد مفید ہے۔

دیگر :- برگ لکڑی چھڑی ایک تولہ، کالی مرچ سات دانہ، دونوں کو گھوٹ کر چند روز پلائیں، بواسیر خونی کے لئے از حد مفید ہے۔

دیگر :- سماق دانہ سالم صاف کر کے بقدر چار سے چھ ماشہ ہمراہ باسی پانی دیں۔ کثرت سیلان خون کو ایک دم بند کرتا ہے، خونی بواسیر کو دور کرتا ہے

دیگر :- مرچ سیاہ، رسوت شدہ، مغز بیج نیم، مغز بیج بکائن، ہموزن گولیاں بقدر چار رتی بنائیں، دو گولی صبح، دو گولی شام ہمراہ آب تازہ دیں بواسیر

کا نہایت مفید علاج ہے۔

دوائے بوائیسر:۔ زکچور، رسونت ہر ایک پانچ تولہ، مولیٰ سبز کا پانی چھنا ہوا ۲۵ تولہ، ان ہر دو کو مولیٰ کے پانی میں تر رکھیں، اس کے بعد تمام اشیاء کو کھل کر کے خوب بخودی تیار کریں، دونوں وقت ایک ایک گولی ہمراہ تازہ پانی دیں اور ایک سے دو گولی ہیردنی طور پر پانی سے گھس کر سوں پر لگائیں۔ یہ دوا قدرت کی مہربانی سے ایک ہفتہ کے اندر ہر قسم کی بوائیسر اندرونی، ہیردنی، خونی و بادی کو دور کر دیتی ہے، استعمال کے دوران غذا سادہ اور نہانے سے پرہیز کریں۔ دیگر:۔ کافور بھیم سینی تین ماش، ناگ کسیر، مغز بیج نیم، رسونت شدہ، مویز منقی ہر ایک چھ ماش، پہلے چاروں ادویات کو سفوف بنالیں، پھر ان میں مویز منقی ڈال کر خوب کھل کریں۔ اور جنگلی بیر سے ذرا کم گولیاں بنالیں۔ ایک گولی صبح اور ایک شام ہمراہ تازہ پانی نگل لیں، بوائیسر کو رفع کرنے میں ناجواب ہیں۔ یہ گولیاں بوائیسر خونی کے لئے از حد مفید ہیں۔

مرہ مولی:۔ مولیٰ کو قدرے چیل کر قتلہ کر لیں۔ اور روغن زرد میں بریاں کریں کہ بہت زیادہ سُرخ نہ ہونے پائیں۔ پھر اگر مولیٰ بریاں کا وزن آدھ سیر ہو تو سوا سیر مصری کا قوام پکائیں اور چولہے سے اُتار کر مولیٰ کے قتلے اس میں ڈال کر دھاپ دیں، سرد ہونے پر کسی مرتبان وغیرہ میں بحفاظت رکھیں تین روز بعد دو دو باتین تین تین روزانہ تھوڑے قوام کے ساتھ کھائیں، بوائیسر کے لئے تہا چیز ہے، پانی مطلق نہ ڈالیں، مولیٰ کے عرق میں ہی قوام بنائیں، تین روز کے استعمال سے فائدہ ظاہر ہونے لگتا ہے۔ اگرچہ ماہ تک برابر استعمال کریں تو مسہ تک خود بخود جھڑ جاتے ہیں، کئی آٹھ آٹھ دس دس برس کے مریض اس تہا دوا سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اور پھر اس شکایت نے اس وقت تک عود نہیں کیا۔ قدرت نے ہندوستانی جرّی بوٹیوں میں کس قدر طاقت بھری ہے، وہ اس مرہ مولیٰ سے ظاہر ہے۔

حالبس خون:۔ گبر و سنگجراحت ہم وزن پس کر محفوظ رکھیں اور بوقت ضرورت دو سے تین ماش صبح، دوپہر اور شام کو دیں، یہ خون کی روانی کو راہ کسی وجہ سے جاری ہو، بند کرتا ہے، خون بوائیسر کا، مویا ایام کا، منہ سے آتا ہو یا فے الدم یا لفث الدم یا اسہال دموی ہوں، اس کے لئے مفید ہے، تین یا چار خوراکوں میں آرام آجاتا ہے۔

حب بوائیسر خونی:۔ رسونت شدہ خالص، مغز بیج نیم، مغز بیج سرس، تینوں چیزیں ہموزن لے کر گولی بقدر بخود تیار کریں، خوراک دوسے گولی روزانہ استعمال کرائیں۔

دیگر:۔ رسونت مصفی، مغز بیج نیم ہر ایک دو تولہ، بیج مولیٰ ایک تولہ، زیرہ سفید، دانہ الاچھی خورد ہر ایک ڈیڑھ تولہ، سب کو کوٹ پس کر لکروندہ پانی میں آٹھ روز بھگو دیں، پھر گیندے کے پھول دو تولہ ملا کر جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنالیں، خوراک ایک گولی صبح و شام ہمراہ پانی دیں۔

نوٹ:۔ بعض اطباء یہ گولی کھانے کے بعد مولیٰ تراش کر شکر کے ہمراہ کھانے کی ہدایت کرتے ہیں، لکروندہ اور گیندے کے

پھول موسم سرما میں دستیاب ہوتے ہیں، اس لئے یہ نسخہ اکتوبر سے مارچ تک تیار ہو سکتا ہے۔

سفوف نخستہ انہ:۔ آم کی گٹھلی کا مغز، مغز جامن برابر وزن لے کر کوٹ چھان کر سفوف بنائیں، خوراک چار ماش ہمراہ تازہ پانی، خونی بوائیسر خونی دستوں کے لئے مفید ہے۔

حب بوائیسر جو بوائیسر خونی اور بادی کے لئے یکساں مفید ہیں، تجربہ اس کی تصدیق کرے گا:۔

رسونت اصلی شدہ ایک تولہ، چھلکا ہرڑ زرد ایک تولہ، زکچور ایک تولہ، گوگل شدہ (تر بھلہ سے) ایک تولہ، تمام ادویات کو مولیٰ کے نام سے ایک دن کھل کریں اور ایک دن آب لکروندہ (لکڑ چھٹی) بوٹی سے کھل کر کے چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ ایک گولی صبح اور ایک مہراہ باسی پانی دیں۔

مرہم بوائیسر:۔ زنک اوکسائیڈ چھ ماش، کافور دو ماش، ویزلین سفید ایک اونس، مرہم بنا کر بوائیسری سوں پر لگائیں۔ اس سے درد و وغیرہ کو آرام آجاتا ہے۔

دیگر :- اینون، مازو، کافور، مکھن، پہلی تینوں دواؤں کو باریک سفوف بنا کر مکھن میں ملا لیں اور مسوں پر لگائیں۔

حب بوا سیر :- رسوت مصفیٰ ایک تولہ، نیم کے پتے چھ ماشہ، نیم کے پتے کچل کر رس پخوڑ لیں، اس کو آگ پر پھاڑ لیں اور چھان لیں۔ اس پانی کے ساتھ رسوت کی چھنے کے برابر گولیاں بنالیں۔ دو گولیاں ہمراہ پانی دن میں دو بار لیں۔

آیور ویدک علاج :- کٹجاوی گھرت چھ ماشہ سے ایک تولہ خالص دودھ گائے یا بکری سے دیں یا کٹجا اولیہ کا استعمال کریں۔

مندرجہ ذیل آیور ویدک مجربات بوا سیر خونی کے لئے از حد مفید ہیں :-

۱۔ ایک عدد ناریل کے اوپر کا چھلکا اتار کر اس کو جلا لیں، راکھ ہونے پر اس راکھ کے برابر مصری ملا کر تین خوراک بنائیں۔ ایک خوراک روزانہ دودھ بکری سے کھانے سے بوا سیر کا خون بند ہو جاتا ہے۔

۲۔ کڑا چھال، صندل سفید، ناگ کیسر، رسوت ہر ایک ایک تولہ، باریک سفوف بنا کر ہمراہ دودھ بکری چھ ماشہ کھلانے سے خون بند ہو جاتا ہے۔

۳۔ کسوندی بوٹی دو تولہ نصف پاؤ پانی میں بطور سردائی رگڑ کر اس میں مصری ملا کر دو یا تین روز متواتر پینے سے بوا سیر کا خون بند ہو جاتا ہے۔

۴۔ ناگ کیسر تین ماشہ کو پیس کر دو تولہ مکھن میں ملا کر روزانہ کھلائیں، چند روز کے استعمال سے بوا سیر کا خون بند ہو جاتا ہے، از حد مفید ہے۔

۵۔ مکروندہ بوٹی کے رس دو تولہ میں گائے کا خالص گھی ایک تولہ گرم کر کے چند دن پینے سے خونی بوا سیر کو آرام آ جاتا ہے۔

۶۔ مصر شدہ پانچ تولہ، رسوت شدہ پانچ تولہ، گوگل شدہ اڑھائی تولہ، تینوں چیزوں کو ایک سیر مولیوں کے رس میں کھل کر کے ایک سے دو رتی تک گولیاں بنالیں اور صبح و شام ایک ایک گولی باسی پانی سے دیں۔ خونی بوا سیر کے لئے نہایت اعلیٰ دوا ہے۔

ہومیو پیتھک علاج :- الوز، بیلا ڈونا، ایکوس پ، کیپیکم، ہیما میل، سلفر نکس و امیکا، کاربووج، امون کارب، کلکریا فوریکا کالی میور، فیرم فاس بہترین ادویات ہیں۔

غذا و پرہیز :- بوا سیر کے مریضوں کو مصالحہ داراغذیہ، ثقیل اور بادی چیزوں مثلاً ماش کی دال، آلو، اردی، کچالو سے پرہیز کرنا، غذا آتش جو، ساگودانہ، دلیا، مونگ کی دال، نرم کھجڑی دیں۔

وات ارش، بادی بوا سیر، ریح البوا سیر، پائلز، (Piles)

تعریف مرض :- مقعد (گدا) کی رگوں کے منہ پر سے پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے مریض کو گدا کے مقام پر درد گدائی اور خارش ہوتی ہے، لیکن خون وغیرہ خارج نہیں ہوتا۔

وجوہات :- بادی بوا سیر کا سبب بھی سوداوی خلط ہوا کرتی ہے، جو کسی دوسرے مقام سے گروہ پر گر کر یا خود گروہ اور اس کے ارد گرد پیدا ہو کر گروہ کی حرارت کی وجہ سے ریح غلیظ کی صورت اختیار کر لیتی ہے جو کوکھ اور ناف کے ارد گرد گھومتی اور مشکل سے تحلیل ہوتی ہے، پیٹ میں نفی اور قراقر کی شکایت رہتی ہے اور کبھی یہ ریح خضیہ، عضوت ناسل اور مقعد کی طرف اتر آتا ہے، کبھی سینہ، پہلو، پشت، شانہ اور گردن کی طرف چڑھ کر ان میں درد پیدا کرتی ہے، گاہے پیش اور خونی اسہال کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، اکثر اوقات بتض کے سبب اعضاء شکنی، درد زوالو اور درد مفاصل

وغیرہ عارض ہو جاتے ہیں، کبھی دوسرے اعضاء مثلاً ہاتھوں اور سر کی طرف رجوع کر جاتی ہے، اس وجہ سے عام طور پر اٹھنے بیٹھنے کے وقت زانواں جوڑوں سے چڑچڑکی آواز آنے لگتی ہے۔

علامات :- گدلے مقام پر درد اور خارش ہوتی ہے، مردمی قوت کمزور ہو جاتی ہے، سویرمضم کی شکایت ہوتی ہے، ملاپ میں رنجش ہیں رہتی۔ منہ کامزاج خراب ہو جاتا ہے، معدہ اور سینہ میں جلن معلوم ہوتی ہے، فیند بہت آتی ہے۔ بدن سُست ہو جاتا ہے۔ مریض اپنے حلق میں کوئی چیز لٹکی ہوئی محسوس کرتا ہے، سوکر اٹھنے کے بعد بدن بھاری معلوم ہوتا ہے، چہرہ کارنگ زرد یا سیاہ ہو جاتا ہے، بکے یا پیتل کے رنگ سے مشابہ ہو جاتا ہے۔ مریض کو بھی بھوک نہیں رہتی، اکثر مریضوں کو دوران اور درد سر، شب کوری، توہنج اور جی متلانے کی شکایت لاحق ہو جاتی ہے۔

ڈاکٹری علاج :- بطرزخونی بواسیر کریں، قبض کے لئے لکڑی پیرافین استعمال کریں، خارجی استعمال کے لئے بواسیرخونی کے بیان میں لکھی گئی مرہموں کا استعمال مخصوص آلہ کے ذریعہ کریں۔

یونانی علاج :- نیک سیلانی چار رتی یا سفوف اجوائن دونوں وقت کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں۔ قبض کے لئے مرہ ہر دو عدد ہمراہ عرق سونف کھلائیں۔ اس سلسلہ میں اطریفل صغیر، جوارش جالینوس، اطریفل کشنیزی، جوارش کمونی وغیرہ بہترین ادویات ہیں۔

ذیل کے نسخہ جات بواسیر بادی کے لئے معمول اور مفید ہیں :-

سفوف خطا :- بواسیر بادی، ریاحی امراض، درد شکم میں بہت ناغ ہے۔

ریوند خطائی، سونٹھ، سوڈا بائیکارب ہموزن کوٹ چھان کر سفوف بنائیں، خوراک دو ماشہ ہمراہ آب نازہ صبح و شام دیں۔

نوٹ :- ڈاکٹری نسخہ "روبرب اینڈ سوڈا پاؤڈر" کے بھی یہی اجزاء ہیں۔ لیکن اس میں ریوند خطائی کی بجائے ریوند چینی کا سفوف (روبرب پاؤڈر) ڈالا جاتا ہے۔

حب بواسیر بادی :- رسوت اصلی پانچ تولہ، مغزیج نیم پانچ تولہ، مغزیج بکائن پانچ تولہ، گولیاں بقدر نخود (چار رتی) بنائیں، دو گولی صبح و شام استعمال کریں۔

حب رسوت :- رسوت، مقل ارزق، گیرد، مغزیج نیم، مغزیج بکائن، بیج گندناہر ایک برابر وزن، سبز گندناہ کے پانی میں چنے کے برابر لیاں بنائیں، بواسیر بادی میں صبح و شام ایک ایک گولی اور خونی بواسیر میں دو دو گولیاں استعمال کریں۔

حب بواسیر :- ہرٹسیاہ ایک تولہ، چھلکا ہرٹزد ایک تولہ، چاکسوکا آٹا ایک تولہ، مغزیج نیم ایک تولہ، رب کو گھیکوار کے گودہ کھل کر کے حب بقدر نخود (چار رتی) بنائیں، خوراک دو سے چار گولی صبح و شام دیں۔

دیگر :- بیج مولی، ریوند خطائی ہموزن لے کر چھان لیں اور قدرے شہد کی مدد سے دانہ نخود کے برابر گولیاں بنائیں۔ رات کو دو یا تین لیاں ہمراہ دودھ نیم گرم استعمال کریں، اس کے متواتر استعمال سے بواسیرخونی اور بادی کو آرام آ جاتا ہے۔

روغن بواسیر :- ارنڈی کا تیل (کمیسٹر آیل) دو تولہ لے کر تانبے کے بغیر قلعی دالے برتن میں ڈال کر آگ پر رکھیں اور برتن کو ڈھانپ لیں، جب گرم ہو جائے تو آگ سے نیچے اتار کر دور قی کا فور ملا کر ملائیں۔ ہلاتے وقت برتن کو ڈھانپنے رکھیں۔ سرد ہونے پر کسی شیشی میں رکھیں، بوقت ضرورت بواسیر کے مسوں پر گرم کر کے لگائیں، درد بواسیر کو تسکین دیتا ہے۔

بواسیر اور اندرائن بونی :- ۱۔ بواسیر کے لئے جڑ اندرائن (متہ) کالوسنٹھ (Colocynth) پانی میں گھس کر مسوں پر لپیپ کریں۔

اندرائن کے پھل کے ٹکڑے کر کے ایک گھڑے میں ڈال دیں اور گھڑے کو پانی سے پُر کر دیں، یہ گھڑا تین ہفتہ تک دھوپ میں پڑا رہنے دیں، اس کے بعد اس کے پانی سے استنجا (گدا کو دھونا) کرتے رہیں۔ چالیس روز کے استعمال سے سسے نابود ہو جاتے ہیں۔

بواسیر اور گینڈا لٹوٹی :- صدر برگ (گینڈا) کیلن ڈیولا (Calendula) کے پھول سایہ میں خشک شدہ، رسونت شدہ، مغز بیج نیم، مغز بیج بکائن، چھلکا نیم، بیج مولی ہر ایک پاؤسیر علیحدہ علیحدہ پیس کر ملائیں اور چار سیر دودھ گائے میں پکائیں، جب قوام درست ہو تو گولیاں بقدر خود بنائیں۔ بواسیر کے واسطے معمول مطب اور از حد مفید ہیں۔ چالیس روز کے استعمال سے اس نامراد مرض کا قلع قمع کرتی ہیں، خوراک چار گولی ہر روز پانی کے ساتھ کھلاتے رہیں اور پانی سے پیس کر مسوں پر ضما د کریں۔

بلا آپریشن بواسیری مسوں کا علاج :- ریٹھا کے مغز کی گریاں لے کر باریک پیس لیں اور نیم کے تیل یا پانی میں پیس کر مسوں پر لگائیں، خوراک کی طور پر کیڑا آئل دیں تاکہ پاخانہ نرم ہو کر خارج ہو، چند دنوں میں آرام آجاتا ہے۔

آیور ویدک علاج :- ۱۔ نیم کے پختہ پھلوں کا مغز پانچ تولہ باریک پیس کر اس میں میں اڑھائی تولہ گڑ ملا کر دو ماشہ وزن کی گولیاں بنائیں۔ اور روزانہ تازہ پانی کے ہمراہ صبح و شام کھلائیں۔ ہر قسم کی بواسیر کے لئے مفید ہے۔

۲۔ مغز بیج نیم، رسونت، چھلکا ہرڑ، تینوں برابر وزن لے کر عرق گلاب کی مدد سے تین تین رتی کی گولیاں بنائیں، صبح و شام ایک ایک گولہ ہمراہ دودھ گائے کھانے سے ہر قسم کی بواسیر کو آرام آجاتا ہے۔

۳۔ چھلکا ہرڑ کابلی، ہرڑ سیاہ برابر برابر گھی خالص میں بھون کر سفوف بنالیں اور اس میں برابر کھانڈ ملا کر ہر روز چھ سے نو ماشہ استعمال کریں، قبض اور بواسیر کے لئے مفید ہے۔

۴۔ ہلدی اور کڑوی توری دونوں کو خوب باریک پیس کر بواسیر کے مسوں پر لپیپ کریں اور روزانہ مسوں پر لگائیں۔ اس طرح کرنے سے دور ہو جاتے ہیں۔

۵۔ آک کے پتے خوب باریک پیس کر مسوں پر لگانے سے بادی بواسیر کے سسے دور ہو جاتے ہیں۔

۶۔ لکڑندہ بونی کے پتے پیس کر ہر روز گدا پر لپیپ کرنے سے دور ہو جاتے ہیں۔

۷۔ دودھ پیاز بھول میں نیم بریاں کریں اور چھلکا اتار کر اس کو کونڈی میں لغہ بنا کر گھی گائے یا بھینس میں نیم بریاں کریں اور ٹکیہ بنا کر نیم گرم مسوں میں لپیپ کریں اور باندھیں، اس سے مسوں کو آرام آجاتا ہے اور مرین چلن سے سوجاتا ہے۔

ہومیو پیتھک علاج :- سلفر، نکس وامیکا، کالن سونیا، ایکوس ہپ، پلسٹیل، بھوجا، کلکیر یا فلوریکا بہترین ادویات ہیں۔

قدرتی علاج :- ماش کرانا، حمام کرنا، پیادہ پا چلنا اور گھوڑے کی سواری مفید ہے، خوراک کی طور پر مرہ سولی کا استعمال بھی بہترین قدرتی علاج بواسیر کا بنا دوا علاج :- جب کبھی ژالہ (اوسے) باری ہو تو مرینیان بواسیر (خونی یا بادی) کیسی بھی ہو کو دو چار اوسے لے کر انہیں خوب اچھی ط مسوں پر ملیں اور جہاں تک ہو سکے انہیں معتد کے اندر بھی داخل کریں۔ ایک ہی دفعہ کے عمل سے از خود سسے جھڑ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ تکلیف نہ آوے نہ برسنے پر بارش کے پانی سے آبدست کرانے سے بھی کافی فائدہ ہو جاتا ہے۔ مگر ایسا کئی روز تک کرنا چاہیئے۔ نہایت مفید چیز ہے۔

غذا اور پرہیز بھر زخنی بواسیر کے کریں۔

گدا کا پرانا زخم، نواسیر، بھگندرا، فنجولا، (Fistula)

تعریف مرض :- نواسیر زخم ہے ناسور کی اور ناسور پرانے زخم کو کہتے ہیں، جو بھرنے میں نہ آتا ہو، یہ زخم گدا (مقعد) میں پیدا ہو جاتا ہے۔ کہ اندر سے چوڑا اور منہ پر سے تنگ ہوتا ہے۔

دجومات: گوشت اور میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال، کافی عرصہ تک بچپن میں مبتلا رہنا یا دستوں کا عارضہ ہونا یا کسی تیز مادہ کا امعاء مستقیم پر گرنا، ان اسباب سے آنٹوں کے آخری حصہ میں عام طور پر زخم پڑ جاتے ہیں۔ اور صحیح علاج نہ ہو سکنے کی وجہ سے ناسور بن جاتے ہیں۔ یہ مرض مین سٹم کا ہوتا ہے۔ اول ناسور آر پار ہو، دوسرا یہ کہ باہر کی طرف ناسور ہو اور اندر تک منہ نہ کیا ہو، تیسرا یہ کہ اندر کی طرف منہ ہو اور باہر کی طرف نہ ہو۔ اس قسم کا ناسور سب سے زیادہ خبیث ناک ہوتا ہے۔

تشخیص مرض: یہ معلوم کرنے کے لئے کہ ناسور آر پار ہے یا نہیں، ناسور میں سلائی ڈالیں۔ اور گدائی میں انگلی ڈال کر دیکھیں۔ اگر سلائی انگلی کو محسوس ہوتی ہے تو آر پار ہے ورنہ آر پار نہیں ہے۔ اگر ناسور ایک طرف کھلتا ہے تو ڈاکٹری اصطلاح میں اس کو مانع نس کہتے ہیں۔

علامات: شدید درد ہوتا ہے اور پانی بہتا ہے۔ ناسور اگر آنٹوں تک پہنچ جائے تو ہوا اور پاخانہ بلا ارادہ خارج ہو جاتے ہیں۔

علاج ڈاکٹری: قبض ہو تو اسے دور کریں۔ پیرافین کوڈ آدھا اونس یا کیسٹر آیل ایک اونس پلائیں، تیز جلاب نہ دیں، اگر دم زیادہ ہو تو بورک سڈ آدھا ڈرام، پانی ایک اونس گرم کر کے دلائی ردی کے ذریعے ٹکور کریں۔ جدید ادویات میں آریو مائی سین، ٹیرامائی سین اور پنی سلین مرہم جو آنکھوں کے لئے استعمال ہوتی ہیں۔ ناسور کے لئے استعمال کرنے سے مفید ثابت ہوتی ہیں، جب ادویہ کے استعمال سے فائدہ نہ ہو تو اس مرض کا آپریشن ہی شریعہ علاج ہے۔

یونانی علاج: ۱۔ بچھو ایک عدد، گائے کا خالص گھی اڑھائی تولہ میں جلا کر چھان کر محفوظ رکھیں اور ناسور میں لگائیں۔

۲۔ اگر عارضہ آشک سے ہو تو جو ہر آشک یا کشتہ سنکھیا سفید آدھا چاول بقدر مزاج و عمر مرہم کو دیں، بیرونی طور پر ناسور کے علاج میں اس کو صاف کرنا اور انٹی سپٹک ادویات کا استعمال مفید ہے۔

۳۔ گھونچ لال لے کر اونٹ کے پیشاب میں گھس کر بتی بنا کر ناسور میں رکھیں، اگر سوراخ کا منہ تنگ ہو تو چاول اور مونگ کی کھجڑی پکا کر باندھیں جب ناسور کا منہ کھل جائے تو اس کے بعد بتی کو اندر رکھیں۔ ناسور کے لئے بہت مفید ہے۔

۴۔ گیسوں کا دلیہ پانی میں پکائیں کہ پانی خشک ہو جائے، متواتر روزانہ ناسور پر باندھیں، مواد کو خارج کر کے زخم کو بھر لائے گا۔

۵۔ کنگھی بوٹی کے پتے ٹکچہ بنا کر باندھیں، ایک ہفتہ میں فائدہ ہو جائے گا۔

۶۔ تلوں کا تیل چار تولہ، بورک ایڈ ایک تولہ، کاربالک ایڈ ۲۰ قطرے، تیل کو آگ پر رکھیں، جب جھاگ آنی بند ہو جائے تو تیل اتار لیں اور بورک ایڈ شامل کر کے ڈنڈے سے خوب گھوٹیں، پھر ۲۰ قطرے کاربالک ایڈ ملا کر حل کر شیشی میں رکھیں اور بوقت ضرورت استعمال کریں اور اس نسخہ کے ساتھ خوراک کی طور پر

۷۔ نیم کے پتے، بکائے کے پتے، چنبیلی کے پتے، مہندی کے پتے، زیرہ سفید، آنہ ہلدی، رسوت ہر ایک ایک تولہ لے کر پہلے رسوت کو پانی میں حل کر کے اس کے پانی کو نتھار کر باقی اجزاء کو اس میں گوندھ کر گولیاں بقدر سخوہ بنائیں، خوراک ایک گولی ہمراہ تازہ پانی دیں ناسور کے لئے مفید ہیں۔

۸۔ روغن ناسور: تیل تارپین ڈیڑھ اونس، آیوڈوفارم ایک ڈرام، دونوں کو ملا کر بتی بنا کر ناسور کے اندر داخل کریں، نہایت اور اعلیٰ چیز ہے۔

۹۔ دیگر عمدہ خشک متبا کو پاؤ بھر لے کر اس میں ایک سیر پانی ڈالیں اور نرم آگ پر پکائیں، جب ایک پاؤ پانی رہ جائے تو اس میں لہ تیل سرسوں ڈال کر نرم آگ پر پکائیں، جب پانی جل کر تیل رہ جائے تو ٹھنڈا کر کے چھان کر محفوظ رکھیں۔ روزانہ تیل کے ۲۰ قطرے لگانے سے فائدہ ہوگا۔

آیور ویدک علاج :- ۱۔ نیم کی تازہ پتیاں لے کر پیس کر ٹکیاں بنا کر تلوں کے تیل میں بریاں کر لیں۔ ان ٹکیوں کو علیحدہ کر کے گرم تیل میں دو تولہ ملا کر مرہم بنالیں۔ یہ مرہم دو ماشہ لے کر اس میں کنکھجورے کی راکھ ملا کر ناسور میں بھر کر روئی رکھ کر پٹی باندھ دیں۔ ناسور کے لئے نہایت مفید ہے۔

۲۔ ٹنڈامدار (آک کی مکڑی) لے کر اسے آگ پر تیل سرسوں کے ساتھ مرہم کی طرح بنالیں اور مقام ناسور پر اس مرہم کو لگاتے رہیں اور آجائے گا۔

۳۔ ارہر کی دال جو سُرخ ہوتی ہے، خوب باریک پیس کر پانی سے مرہم کی طرح بنالیں اور بتی کے ذریعے ناسور کے اندر رکھیں، ناسور آجائے گا۔

۴۔ نیم کے تازہ پتوں کے جوشاندہ میں ٹنڈروجن پر اوکسائیڈ ملا کر روزانہ زخم کو صاف کیا کریں۔
غذا پر سہیز بطرز بواسیر کے کریں۔

گڈا کی سوجن، مُقعد کی سوجن، ریکٹائی ٹس، (Rectitis)

گڈا کی خارش، مُقعد کی خارش، پروڈائی اینائی، (Pruritis-Ani)

گڈا کا پھٹنا، مُقعد کا پھٹنا، فشرائی اینائس، (Fissure of the Anus)

تعریف مرض :- اس مرض میں گڈا (مُقعد) کے مقام پر سوجن، خارش یا گڈا کا بیرونی چمڑا پھٹ جاتا ہے۔ اور گڈا کے مقام شدید تکلیف

ہوتی ہے۔

وجوہات :- بواسیر اختریوں کے کیڑے، بدھنمی، پاخانہ کے بعد گڈا کو پانی سے نہوہنا، علاوہ ازیں عورتوں میں حمل کے دنوں میں مہ کے مقام پر عام طور پر شکایت ہو جاتی ہے، کبھی گڈا پر چوٹ لگنے یا کسی نوک دار چیز کے چبھنے سے بھی ورم ہو جاتا ہے۔ مرض نواسیر یا بواسیر اکثر مُقعد پھٹنے کا عارضہ ہو جاتا ہے۔

علاج :- قبض ہو تو کیٹر آئیل دیں۔ اگر ورم زیادہ ہو تو بورک ایڈ آدھا ڈرام، پانی ایک اونس، گرم کر کے ولایتی روئی سے ٹکڑ کر سوجن یا ورم دور ہو جائے گا۔

مقام ورم پر زنک یا بورک آسینٹ لگائیں۔ اس مرض میں تمام مرہم لائے جو بواسیر کے بیان میں لکھی گئی ہیں، مفید ہیں، ورم بہ زیادہ ہو تو بیینی سلین یا سلفا گروپ کا استعمال مفید ہے۔

یونانی علاج :- قبض ہو تو گل قند چار تولہ یا کیٹر آئیل (روغن سیدانجیر) تین تولہ دیں۔ بیرونی ورم پر روغن گل دو تولہ، موم اصلی

تولہ سفیدہ کا شغری چھ ماشہ، اول موم کو گرم کریں، اس کے بعد سفیدہ ملا کر رکھیں۔ اور مرہم بنا کر مقام مرض پر لگائیں۔

آیور ویدک علاج :- بطرز یونانی علاج کے کریں، قبض نہ ہونے دیں، مقام مرض پر تلوں کے تیل چھ ماشہ میں کا نور ایک ماشہ ملا

آرام آجائے گا۔

غذا پر سہز بطنز بواسیر کے کریں۔

گز ابھرنش، خروج المقعد، کاپنج نکلتا، پرولیپس انائی، (Prolapsus-Ani)

تعریف مرض:۔ اس مرض میں پاخانہ کے وقت کاپنج باہر نکلتی ہے، جب مرض بڑھ جائے تو کھانسنے یا معمولی حرکت سے کپنج نکل آتی ہے۔
وجوہات:۔ عام جسمانی کمزوری و دائمی تپش یا کثرت اسہال، پچیش، پیٹ کے کپڑے، مثانہ کی پھٹری، مقعد کا ڈھیلا پن، بواسیر اور اکثر شدید پچیش کے بعد یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات:۔ شروع شروع میں تو صرف پاخانہ کے وقت ہی شکایت پیدا ہوتی ہے، لیکن بعد آزاں کھانسنے یا معمولی حرکت کرنے سے بھی کاپنج نکلنے لگتی ہے۔ جو بعض دفعہ پانچ یا چھ پانچ تک لمبی نکل آتی ہے۔ اس میں زخم ہو جاتے ہیں۔ پاخانہ کے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ مرض عام طور پر بچوں کو زیادہ ہوا کرتی ہے۔

علاج ڈاکٹری:۔ مریض کو لٹا کر پاخانہ کرائیں اور سرد پانی یا سرد پانی میں ایلم (پیشکڑی) ڈال کر اس سے مقعد کو دھوئیں، پینچر سیٹل دس بوند صاف پانی ایک اونس میں ملا کر دلائی روئی ڈال کر کاپنج پر لگائیں اور آہستہ آہستہ اندر داخل کر کے لنگوٹ کس کر باندھ دیں۔ قبض کی حالت میں لکڑی پیرائین کا استعمال کریں، تقویت کے لئے بڑوں کو ملٹی وٹامنز دیں، چھوٹے بچوں کو وٹامن ڈی (اڈیکولین) گلیک و کپنی پانچ تا دس بوند دن میں تین بار بعد از غذا دیں۔ کاپنج نکلنے کے لئے مفید ہے اور کمزور بچوں کے لئے مفید دوا ہے، نوجوانوں مریضوں کو مرکبات فولاد اور مقوی غذا دیں۔

یاد سے علاج:۔ مقعد کے ارد گرد جلد میں سوئی داخل کر کے الکوحل کا ٹیکہ کیا جاتا ہے۔ یہ نازک عمل صرف ایک مستند ڈاکٹر ہی سراسیمہ دے سکتا ہے۔

یونانی علاج:۔ پیشکڑی ایک ماشہ، پانی اڑھائی تولہ میں ملا کر روئی تر کر کے کاپنج پر لگا کر آہستہ سے داخل کریں، لنگوٹ بندھوائیں یا مازو سبز ایک ماشہ، چمکا انار ایک ماشہ، پھول انار ایک ماشہ، بالکل باریک کر کے کاپنج پر چھڑکیں اور لنگوٹ بندھوائیں یا مازو سبز ماشہ، پیشکڑی چھ ماشہ، پانی ایک پاؤ میں حل کر کے روئی اس میں تر کر کے کاپنج پر لگا کر آہستہ آہستہ اندر داخل کر کے لنگوٹ بندھوا دیں، یا ببول (کیکر) کی چھال آدھا کلو کو پانچ لٹر پانی میں جوش دے کر چھان کر ٹب میں ڈال اس میں پانچ سے دس منٹ اس طرح بیٹھیں کہ کاپنج ڈوب جائے اور پھول گلاب، پھول انار، کھٹہ ہمو زن سفوف بنا کر کاپنج پر چھڑکیں اور اندر دبا دیں۔

خوراکی طور پر تقویت کے لئے کشتہ فولاد کا استعمال کرائیں اور وٹامن ڈی سے بھرپور اغذیہ وادویہ دیں۔

آیور ویدک علاج:۔ کشتہ فولاد ایک رتی ہمراہ مکھن دیں، بیرونی علاج بطر یونانی علاج کے کریں۔

غذا و پرہیز:۔ سرخ مرچ، مصالحہ دار اغذیہ سے سخت پرہیز کرائیں اور زرد پھنم و مقوی غذائیں دیں، کھانسی و قبض نہ ہونے دیں۔

انڈو و ردھی، انشور و ردھی، آنت اترنا، فتق، ہرنیا، (Hernia)

تعریف مرض:۔ فتق اس حالت کا نام ہے کہ پردہ صفاق کے دونوں طرف یا کسی ایک طرف سے وسیع اندکشاہ ہو جائے اور

کوئی چیز مثلاً آنت، مائیت یا رتخ فوطہ میں اتر آئے، یہ عارضہ پردہ صفاق پھٹ کر یا کچر ران والے سوراخ کشادہ ہو کر فتق کا باعث ہوتے ہیں۔
وجوہات :- پیٹ کی دیوار یا انٹریوں کو پیٹنے والی جھٹی یا کمزور ہو جانا، زیادہ زور کا کام کرنا، دائمی قبض، مثانہ کی پھتری، حمل، چوٹ یا صدمہ،
بھاری بوجھ اٹھانا، پاخانہ کو زیادہ دیر تک روکے رکھنا، دائمی قبض، پاخانہ کے وقت زیادہ زور لگانا، شدید کھانسی و شدید قہقہے آنا۔
قسمیں و علامات :- بلحاظ خاصیت اس کی دو قسمیں ہیں :-

۱۔ دبے والا فتق (Reducible Hernia) جو دبانے سے اپنی اصلی جگہ پر آجائے۔

۲۔ نہ دبے والا فتق (Unreducible-Hernia) جو دبانے سے اپنی جگہ پر واپس نہ جاسکے۔ نہ دبے والا فتق تین اقسام کا ہو جاتا ہے۔

۱۔ پھنسا ہوا فتق (Strangulated Hernia) اس قسم کے ہرنیا میں مقام مرض متورم اور دردناک ہوتا ہے۔ قبض، اچھارہ، قویج سے مریض نڈھال ہو جاتا ہے، قہقہے آتی ہیں، جن میں آخر کار پاخانہ خارج ہونے لگتا ہے۔

۲۔ فتق متورم یعنی سوزشی ہرنیا (Inflamed Hernia) اس ہرنیا میں شدت سے بخار اور درد ہوتا ہے۔

۳۔ سُدہ دار فتق (Incrasatead Hernia) اس قسم کے ہرنیا میں اترنے والی آنت میں سُدہ پھنس کر درد اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ بعض دفعہ شدید قویج سے مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس قسم کا ہرنیا زیادہ عمر کے مریضوں کو ہوتا ہے۔

علاج ڈاکٹری :- وٹامن سی کی اغذیہ حاملہ مریضہ کے لئے زیادہ مفید ہیں یا وٹامن سی کی گولیاں استعمال کرائیں، بھاری وزن اٹھانے کی ضرورت پڑے تو اپنے پاؤں بھاری چیز کے پاس رکھ کر اٹھائیں، ہرنیا خواہ کسی قسم کا ہو، اس کا شافی علاج آپریشن ہی ہو سکتا ہے، انٹریوں کے ہرنیا کے لئے خواہ کسی قسم کا ہو، مندرجہ ذیل علاج مفید ہیں :-

۱۔ اگر ہرنیا ریڈیوس ایل ہے یعنی خارج شدہ آنت دبانے سے اندر ہو سکتی ہے، تو اس کو اندر کر کے ہرنیا کی پیٹی تجویز کریں، عام حالات میں مریض کو سیدھا بٹانے اور ٹانگیں اکٹھی کرنے سے ہرنیا خود بخود اندر ہو جاتا ہے۔

۲۔ ہرنیا کی پیٹی خواہ کسی قسم کی ہو، اس کی عمدگی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دباؤ یا رگڑ سے جسم کی جلد کو نقصان نہ پہنچے، جسم کی حرکات میں تکلیف نہ ہو گدی اس شکل کی ہو کہ ہرنیا کی گزر گاہ کو بند رکھے اور کشادہ نہ کرے، ٹھیک ناپ کی ہو۔

۳۔ ہرنیا کی پیٹی کے لئے ناپ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ پیڑ کی ہڈی کے بالائی کنارے سے قریب ایک انچ نیچے ہرنیا کے سوراخ (گزر گاہ) تک پیڑ کا گھیرا دریافت کریں، بچوں اور جوانوں میں اگر شروع سے یہ پیٹی لگائی جائے تو اکثر آرام آجاتا ہے، پیٹی لگانے والے مقام کو اچھی طرح صاف رکھنا چاہیے، کبھی کبھی اس مقام پر زنک اوکسائیڈ چھڑک دینا چاہیے تاکہ زخم نہ ہو سکیں، جو ہرنیا دبانے سے اپنی جگہ واپس نہ جائے اور روزانہ موٹا اور متورم ہوتا جائے، اس کا علاج ادویات یا پیٹی سے ناممکن ہے، اس کا جس قدر جلد ہو سکے کسی ماہر ڈاکٹر سے آپریشن کروالینا چاہیے۔

سوچے ہوئے ہرنیا کا علاج سلفا ڈرگز، پنیسلین سے کیا جاتا ہے، سوزش کے لئے ٹیگور و مالش بھی مفید ہے۔ لیکن جلد آرام نہ آئے تو آپریشن ہی موثر علاج ہے۔

عارضی تسکین کے لئے پوٹاشیم برمائید کا استعمال کیا جائے۔

یونانی علاج :- مریض کو گرم پانی میں بٹھائیں، تیل بابونہ کی مالش کریں، اترے ہوئے جسم کو باہر کی اور پر کو چڑھائیں۔ جب چڑھ جائے تو پیڑے کی گدی رکھ کر مضبوط پٹی باندھ دیں، خوراک میں کاسر الریاح دوائیں، جوارش کوئی، جوارش جالینوس یا سمون فلاسفہ دیں، لنگوٹ کس کر باندھنا نہایت ہی مفید علاج ہے۔

بچوں کے ہر نیا میں کچھ دوا کو بیرونی کوٹ کر لگانا یا انگوڑی لکڑی جلا کر اس کی خاکستر کو سرکہ میں ملا کر ٹیپ کرنا مفید ہے، علاج کے دوران میں مریض کو آرام سے لیٹنا چاہیے۔ صبر یا افاقہ یا مصطکی رومی یا رسنت یا مازو یا پھلکڑی یا سماق ان میں سے کسی ایک کو پیس کر پانی کے ساتھ ضماد کریں مفید ہے۔
نوٹ :- بعض طبی کتابوں میں ایک یا دو دانت مگر مچھ کے طور پر میں کس کر باندھنا یا سوراخ کر کے پرودینا کر باندھنے کی جگہ بالمقابل باندھ کر رکھنا ہر نیا کے واسطے مجرب عمل بتایا گیا ہے، لیکن ہم طب قدیم کی ترقی کے پیش نظر ان تعویذوں کو سونیصدی غلط سمجھتے ہیں، ہاں! کس کر لنگوٹ باندھنا چونکہ کسی قدر ہر نیا کی پٹی کا مقام حاصل کرتا ہے۔ اس لئے اس کے باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(مصنف)

آیور ویدک علاج :- مصطکی رومی ایک ماشہ پیس کر گلی قند دو تولہ میں ملا کر صبح و شام کھلانا مفید ہے، بیرونی علاج بطرز یونانی علاج کریں۔
قدرتی علاج :- میں مغبانی کا گوشت کھلانا مفید ہے، آیور ویدک علاج میں رشت پشپ آدی گھرت (بنگ سین آیور ویدک گرنٹھ کا نسخہ) چھ ماشہ ہمراہ دودھ کھائے دیں اور نارائن تیل کی مالش کریں۔


غذا و پرہیز :- زود ہضم اور مقوی غذا مثلاً بسنتر کاریاں یعنی گھیا، ٹنڈے، توری، شلم، چقندر، ساگ پالک، کرلیہ وغیرہ تنہا یا گوشت ہیزی کے ساتھ پکا کر چپاتی کے ساتھ دیں۔ گھی، دودھ، مکھن ہضم کے مطابق دیر، تمام قابض، بادی چیزوں مثلاً ہرستم کی دالوں، چاول، گوبھی، آلو، کچالو، ارولی، پھنڈی وغیرہ سے پرہیز کریں۔

دنیا طے کی ایک نادر روزگار کتاب

لغات الادویہ

مرتبہ: حکیم کبیر الدین

کئی ہزار جڑی بوٹیوں اور مفرد ادویات کے نام اور شناخت سے متعلق مکمل تفصیل پر مبنی انسائیکلو پیڈیا۔ اردو زبان میں اپنے موضوع پر واحد مکمل، مفصل اور عظیم علمی اور تحقیقی کتاب، جس میں ہر جڑی بوٹی اور دواؤں کے نام اردو، عربی، فارسی، کشمیری، پنجابی، سندھی، ہندی، سنسکرت، بنگالی، لاطینی اور انگریزی سمیت پچیس زبانوں میں دیئے گئے ہیں کسی زبان کا ایک بھی نام معلوم ہو تو فوراً اس کے تمام زبانوں کے نام اور دوا کی ماہیت کا پتہ چل جاتا ہے اہل علم و فن، اطباء، وید، ڈاکٹر، دوا فروش اور عام حضرات کے لئے ایک نادر و نایاب تحفہ۔



دسوال باب

جگر کی بیماریاں

بکتر شہقتا، کمزوری جگر، مکروسائٹک انیمیا، (Mocrocytic Anamia)

تشریف مرض :- اس مرض میں جگر کے فعل میں کمزوری آجاتی ہے ۔

وجوہات :- جدید تحقیقات کے مطابق یہ مرض فولک ایڈمک کمزوری سے پیدا ہوتا ہے، جو کہ طبعی حالت میں خون بننے کے لئے نہایت ضرور ہے، اس سے جگر کی بعض یا تمام طاقتوں میں خرابی آجاتی ہے۔ یہ عارضہ جگر میں خون یا صفرا جمع ہونے، جگر کے سڈے یا ورم وغیرہ سے بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ کبھی حمام یا ملاپ اور ورزش کے بعد ٹھنڈا پانی پینا، کبھی خون میں حرارت زیادہ پیدا ہونے یا صفرا کی کثرت سے جگر کمزور ہو جاتا ہے۔

علامات :- رنگ زرد یا سفیدی مائل، کبھی سیاہی مائل، بھوک کم لگنا، جنرل صحت کی کمزوری، زبان اور ہونٹ سفید، نبض کمزور اور بعض دہست آتے ہیں، مریض کے چہرے کا رنگ بالکل زرد یا پھیکا پڑ جاتا ہے۔ حرارت کی شدت میں پیاس کی زیادتی، پیشاب کی سُرخی، قبض جگر کے مقام پر ہلکی جھلن اور سوجن کی علامات نمایاں ہو جاتی ہیں۔

علاج ڈاکٹری :- بوراکیٹریٹ دوسری روزانہ عضلاتی انجکشن کریں، وٹامن بی ۱۲ کا استعمال بھی مفید ہے، بھس، کمی خون، کمزور جگر کے لئے جب خون میں فولاد کی کمی ہو جاتی ہے اور اس میں زیادہ ترغریب عورتیں مبتلا ہوتی ہیں، اس کے لئے فرالی ایٹ ایونیا سائٹراس۔ سے ۳۰ گرین آدھا ادنس پانی میں حل کر کے دن میں دو یا تین بار پلائیں، اس مرض میں بوراکیٹریٹ، وٹامن بی کیلیکس اور آئرن کے مرکبات بہ مفید ہیں، وٹامن بی ۱۲ کا استعمال بھی نہایت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔

جدید تحقیقات کے مطابق جسم میں خون کی کمی یا نقص الدم (انیمیا) وٹامن بی ۱۲ کی کمی کا نتیجہ ہے، خواہ یہ وٹامن کی کمی، غذا کے نقص یا

کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے ہو، وٹامن بی ۱۲ کے استعمال سے یہ کمی پوری ہو سکتی ہے اور کمیادی جانچ سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ وٹامن بی ۱۲ مفید علاج ہے۔ یہ وٹامن کئی تجارتی ناموں سے مارکیٹ میں ملتا ہے، مقدار استعمال ایک سی سی (۵۰۰ مائیکروگرام کی شیشی سے) بذریعہ عضلاتی انجکشن ہر دوسرے دن دیں۔ بنیٹ بھس، کمی خون، پرانے دت، سنگرہنی کے لئے از حد مفید ہے۔ چھ سے بارہ ٹیکوں میں آرام آجاتا ہے۔

وٹامن بی ۱۲ کے خارش و کمزوری پر تجربات

کچھ عرصہ پہلے ایک مریض عمر ۵۲ سال جسے خارش کی اس قدر تکلیف تھی کہ وہ رات کو سو بھی نہیں سکتا تھا، خارش کی شدت سے مریض کے جسم کی جلد بھینس کے چمڑے کی طرح اور نظر کمزور ہو گئی تھی، قوت..... زائل تھی، مریض کافی جلاب، مصفی خون، عرق اور شربت، سلفا گروپ، مینی سلین وغیرہ کے انجکشن لگو اچکا تھا۔ لیکن اسے آرام آنے کی بجائے دن بدن صحت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے بی ۱۲ کے انجکشن (۵۰۰ مائیکروگرام) دینے شروع کئے۔ آہستہ آہستہ مریض کے چمڑے کی رنگت ٹھیک ہونی شروع ہو گئی، بعد میں نہ صرف خارش ختم ہو گئی، بلکہ اس کی قوت مردانگی بھی لوٹ آئی، ہمارے تجربات کے مطابق وٹامن بی ۱۲ نہ صرف انیمیا کے لئے کامیاب علاج ہے۔ بلکہ خارش، داد، جنبل اور کمزوری کی عام علامات میں بھی مفید ہے۔



پینٹ اددیات میں سیرپ ہموگلوبین، وٹامن بی کپیکس، ملٹی وٹامنز، پورایکٹرکٹ اور اس کے مرکبات مفید ہیں۔

مندرجہ ذیل نسخہ جات انیمیا کے لئے نہایت مفید ہیں :-

۱۔ آئرن مکسچر

آئرن ایونیٹ سائٹریٹ ۳۰ گریں
پیرپرنٹ وائرٹ ایک اونس

کمی خون کے لئے فارماکوپیا ہسپتال کے سرکاری کالجیڈ نسخہ ہے۔

۲۔ برائے کمی خون ویرقان

فرانی سلفاس ۲ ۱/۲ گریں
پوٹاسی بائی کارب ۲ ۱/۲ گریں

گولی بنا کر دن میں دوبارہ کھانا کھانے کے بعد فارماکوپیا ہسپتال کے سرکاری قدیم کا مشہور نسخہ ہے۔

۳۔ کمی خون

آئرن ایونیٹ سائٹریٹ ۳۰ گریں
وائرٹ ایک اونس

دن میں دوبارہ دیں، لندن فارماکوپیا کا مشہور نسخہ ہے، جو ولایت کے بڑے ہسپتالوں میں مروج ہے۔

۴۔ آئرن مکسچر

فرانی ایونیٹ سائٹریٹ ۳۰ گریں
ایکوا ایک اونس

کمی خون کے لئے آریہ میڈیکل کالج کا مشہور نسخہ ہے۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ میکراہین (Macrabin) یا میکراہین ایچ (Macrabin-H) گلیکسو ریڈی سول

(Redi sol) ریڈی سول ایچ (Redisol-H) ٹرائی ریڈی سول ایچ (Tri-redisol-H) ایم، ایس، ڈی وغیرہ کوئی

وٹامن بی ۱۲ ۱۰۰ سے ۵۰۰ مائیکروگرام کی مقدار میں عضلاتی انجکشن شروع میں دن میں ہر روز، پھر ایک دن کا وقفہ دے کر کریں۔

۲۔ پورایکٹرکٹ (Liver extractfort) ٹی، سی، ایف یا کمبیکس (Combex) لیڈرے ایک سے

دوسری سی عضلاتی انجکشن ایک دن چھوڑ کر دیں۔

- ۲۔ فیروبی کیل (Fere-B-col) یونیکم ————— انیمیا، ہڈیوں کی سوجن، بھوک کی کمی اور کمزوری میں مفید ہے، دن میں چار سے چھ ٹکیاں یا چار سے چھ چمچ دیں۔
- ۳۔ فری لیکس (Ferilex) ٹی، سی، ایف ————— انیمیا کی ہر حالت میں استعمال کی جاتی ہے، بھوک بڑھاتی ہے، کھانا کھانے سے پہلے روزانہ ایک دو چمچ تھوڑے پانی میں ملا کر دن میں تین سے چار بار استعمال کرائیں، بچوں کو عمر کے مطابق دیں۔
- ۵۔ فیراڈول (Ferradol) ایک دو چمچ دن میں دو بار دیں۔
- ۶۔ فیروبی لیور (Fero-B-liver) یونیکم ————— انیمیا، پرانی بیماری کے بعد کمزوری یا آپریشن کرانے کے بعد کمزوری میں مفید ہے، ایک سے دو ڈرام دیں۔
- ۷۔ ڈیوماسولس (Dumasules) ڈیومیکس ————— یہ سب قسم کی خون کی کمی، خاص طور پر فولاد کی کمی والی انیمیا میں بہت مفید ہے۔ ایک ایک کیپ شولز دن میں تین بار تازہ پانی سے دیں۔
- ۸۔ ہپوسیم (Hepocima) ہنگال کیمیکل ————— انیمیا میں بہت مفید ہے، ایک سے دو چمچ دن میں دو بار کھانا کھانے سے پہلے استعمال کرائیں۔
- ۹۔ ہیپین کمپونڈ (Hepa'incomd) البیک ————— ہر قسم کی کمی خون میں مفید ہے، یہ وٹامن بی کپلیکس کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد دو سے تین چمچ روزانہ دو سے تین بار دیں۔ بچوں کو بلحاظ عمر دیں۔
- ۱۰۔ شارکوفیرال (Sharkoferrol) ایک دو چمچ دو کھانا کھانے کے بعد دیں۔ اسی طرح کوئی بھی فولاد ملی طاقت کی دوا استعمال کر سکتے ہیں۔
- ۱۱۔ فرسولیٹ (Fersolate) گلیکو ————— فیرونیم (Ferronium) سینڈوز ————— فالورون (Folvron) لیڈرے ————— ایک سے دو ٹیکہ ہر روز کھانا کھانے کے بعد دیں۔
- ۱۲۔ آرن ٹیبلٹ (Iron tablets) ٹی، سی، ایف ————— یا فریٹس (Ferets) ٹی، سی، ایف ————— یا آئیولیٹ (Aysolate) ہنگال کیمیکل ————— ایک دو ٹیکہ ہر روز کھانا کھانے کے بعد دیں۔
- ۱۳۔ بائیو فرین (Bioferruin) بیکٹ ————— ایک دو چمچ کھانا کھانے کے بعد دیں۔
- ۱۴۔ کیلڈی فرم (Caldeferrum) گلیکو ————— ایک ایک گولی دن میں تین بار دیں۔
- ۱۵۔ کمپوفیران (Campoferron) بار ————— لیور آرن، وٹامن بی کپلیکس وغیرہ کا مرکب ہے، ہر قسم کی کمی خون، انیمیا کے لئے مفید ہے، ایک کیپ شولز یا دو چمچ دن میں تین بار کھانا کھانے کے بعد دیں، بچوں کو بلحاظ عمر دیں۔
- ۱۶۔ ڈیکالپیکس فورٹ کیپ شولز (Decaplex forte caps) ٹی، سی، ایف ————— انیمیا میں بہت مفید ہے۔ ہر روز ایک یا دو کیپ شولز تازہ پانی سے دیں۔
- ۱۷۔ فولک ایسڈ (Folic acid) ساراجائی ————— ایک سے دو گولیاں روزانہ تازہ پانی سے دیں۔ اس دوا کے ایک سی سی ڈائے ایمپول بھی برائے عضلاتی انجکشن ملتے ہیں۔
- ۱۸۔ روبراٹون (Rubraton) ساراجائی ————— یہ وٹامن بی ۱۲، فولک ایسڈ، فیرائی ایونیا سٹراس کا مرکب ہے، دو چمچ صبح، دو چمچ شام بچوں کے رس یا تازہ پانی سے دیں۔
- ۱۹۔ روبرافیرٹ (Rubraferate) ساراجائی ————— ایک ایک کیپ شولز دن میں تین بار تازہ پانی سے دیں۔

- ۲۰۔ کوئی اون (Cobione) مرک ————— یہ وٹامن بی ۱۲ کا ایمپولز ہے۔ ایک سی سی عضلاتی انجکشن کریں۔
 - ۲۱۔ سائٹامین (Cytamen) گلیکو ————— ایک سی سی کے ایمپولز ملتے ہیں۔ ایک سی سی بذریعہ عضلاتی انجکشن کریں، مکرو سائٹک انیمیا میں مفید ہے۔ یہی دوا کئی فریض مختلف ناموں سے بنا رہی ہیں۔
 - ۲۲۔ ہپیر (Hepar) ڈومیکس ————— یہ پور ایکسٹریکٹ، فولک ایسڈ و وٹامن بی ۱۲ کا مرکب ہے، مناسب مقدار میں مرض کے مطابق عضلاتی انجکشن دیئے جاتے ہیں۔
 - ۲۳۔ ابری فول (Eryfol) روش ————— جب مریض کو پور ایکسٹریکٹ سے الرجک ہو، تو اس کے ایک ایمپول کا عضلاتی انجکشن ہفتہ میں ایک یا دو بار مرض کے مطابق دیں۔
 - ۲۴۔ لیوی برون (Livibron) پارک ڈیوس ————— ایک یا دو چمچ تازہ پانی میں ملا کر دیں۔ یہ پور ایکسٹریکٹ، وٹامن بی کمپلیکس اور آرٹن کا مرکب ہے۔
 - ۲۵۔ لیوجن (Livogen) بی، ڈی، ایچ ————— ایک تا دو چمچ دیں۔
 - ۲۶۔ پلاسٹولز (Plastules) جان واسٹک ————— ایک سے دو گولی دن میں دو بار تازہ پانی سے بعد از غذا دیں۔
 - ۲۷۔ لیا فون (Liafon) ایک سے دو کیپ شولز دن میں تین بار بعد از غذا تازہ پانی سے دیں۔
 - ۲۸۔ ہیموسولز (Hemosules) وارنر ————— دو کیپ شولز دن میں تین بار بعد از غذا تازہ پانی سے دیں۔
 - ۲۹۔ فر سے مل (Fersemal) گلیکو ————— ایک ٹیکہ دن میں تین بار تازہ پانی سے دیں۔
 - ۳۰۔ میکروفولین آرٹن ٹیبلٹ ایک ٹیکہ، سی لن ۱۰۰ ملی گرام ایک ٹیکہ دونوں کو تازہ پانی کے ساتھ دن میں دو بار دیں، یہ وٹامن بی ۱۲ و فولاد کا مرکب ہے جو فولاد کی کمی سے انیمیا کے لئے مفید ہے۔
 - ۳۱۔ بیوی ڈوکس (Bevidex) ایبٹ ————— یہ ایک سی سی ایمپول میں درون عضلاتی راہ سے استعمال کرنے کے لئے دستیاب ہوتا ہے۔ تمام فوائد رٹائی ریڈی سول کی طرح ہیں۔
 - ۳۲۔ ہیمے ٹرین (Hematin) سینڈوز ————— دن میں دو بار ایک ایک کیپ شولز تازہ پانی سے کھانا کھانے کے بعد دیں۔
 - ۳۳۔ رونکو وائیٹ (Roncovite) ہیکٹ ————— ایک ایک گولی دن میں تین بار تازہ پانی سے دیں۔ خون بنانے میں عمدہ و معاون ہے۔
 - ۳۴۔ پرنے کزین (Pernexine) شیرنگ ————— فولاد، لیور، وٹامن بی کمپلیکس کا مرکب ہے۔ ایک چمچ چائے کے وزن کے برابر دن میں تین بار دیں۔
 - ۳۵۔ ربر اپلیکس (Rubraplex) سارابھائی ————— یہ فولاد، وٹامن بی ۱۲ اور وٹامن بی کمپلیکس کا مرکب ہے۔ ایک ڈو چمچ صبح دوپہر اور شام کو دیں۔
 - ۳۶۔ نیورو بیون (ایم مرک)، یہ وٹامن بی ۱، بی ۶، بی ۱۲ کا مرکب ہے۔ شدید کمزوری و عضلاتی کمزوری میں مفید ہے، عضلاتی انجکشن دیں۔
 - ۳۷۔ فیسو وٹ (Fesovit) یا فانی فال (Fe-Fol) ایس کے ایف ————— ایک دو کیپ شولز تازہ پانی سے دیں۔
- یونانی علاج: جگر (کلیجی)، بکراے کر خوب کوئیں۔ پھر اس میں دس قطرے پانی کے ڈالیں۔ اس کے بعد موٹے کپڑے سے پھوڑا اس میں شکرے یا مالٹا یا انار کا رس ملا کر تھوڑا سا نمک و مرتج سیاہ چھڑک کر صبح کو روزانہ پلائیں، تقویت جگر و خون پیدا کرنے کے لئے

بہت مفید ہے، کشتہ فولاد آدھی سے ایک رتی ہمراہ مکھن دیں۔

دیگر:۔ کلیجہ بکری دس تولہ روزانہ لے کر لنگری میں باریک کوٹ لیں، ٹماٹر کارس نصف پیالی (چائے والی) اور قدے نمک، کالی مرچ شامل کر کے صبح کے وقت خالی پیٹ استعمال کریں، بھس، انیمیا، کمزوری جگر اور کمی خون میں از حد مفید ہے۔

کشتہ فولاد:۔ برادہ فولاد شدہ، جامن کے پھل کے رس میں اس طرح بھگوئیں کہ پانی برادہ سے دو انگلی اوپر ہے۔ پھر برتن دھوپ میں رکھ دیں، روزانہ دو تین بار بلا دیا کریں، پانی خشک ہو جائے گا، خشک ہونے پر اور ڈال دیں۔ یہاں تک کہ برادہ فولاد کی سختی دور ہو کر راکھ ہو جائے۔ پھر ترش دہی ملا کر پکائیں کہ گاڑھا ہو جائے، بعد ازاں کوزہ گلی میں بند کر کے دس سیراپوں کی آگ دیں۔ جگر، معدہ، گڑھے اور تلی کی تقویت کے لئے از حد مفید ہے، خوراک آدھی سے ایک رتی ہمراہ مکھن دیں۔ بے حد فائدہ دیتا ہے۔

دوائے جگر:۔ ریوند خطائی، نوشادر پھلی ہر ایک ایک تولہ، تلی شوروہ دو تولہ کشتہ فولاد چھ ماشہ، سب کو سفوف بنا کر خوراک ایک رتی ہمراہ عرق گاؤ زبان دیں، جگر کی اصلاح کرتی ہے، پرانے بخار اور ان امراض کے لئے جو جگر کی خرابی سے ہوتے ہیں، کے لئے مفید ہے۔

خون افزا:۔ گاجر کارس ۲۱ تولہ، سنگترہ کارس ۲۱ تولہ، شہد خالص ایک تولہ، فیری ایٹ ایوینیا سائٹراس ایک سے دو رتی تک چاروں چیزیں ملا کر ایسی خوراک صبح و شام بعد از غذا دو گھنٹہ بعد پلا دیں، کمزوری جگر کے لئے از حد مفید ہے۔

دیگر:۔ تونے کالی داکھ (کشمش بڑی) تین یا چار بار پانی سے دھو ڈالیں، اب سنگترے کارس ۲۵ گرام نکال کر اس میں شام کو کالی داکھ کے دانے ڈال دیں۔ دوسرے دن صبح اس داکھ کو اسی رس میں مل کر اس کو ٹھیک طرح سے پخوڑ کر بیج پھینک دیں۔ اس رس کو صبح ہی خالی پیٹ پی جاویں، چالیس روز تک متواتر استعمال کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے، دودھ، مکھن اور پالک وغیرہ خوب استعمال کریں۔

دیگر:۔ کشتہ مونگا، کشتہ فولاد، طباشیر اصلی، لاکچی خورد، کوزہ مصری برابرے کر سفوف بنائیں، چار رتی ہمراہ دودھ دیں۔

دیگر:۔ سولف، پھول گلاب، پودینہ ہر ایک چھ گرام، ۵ گرام پانی میں جوش دیں اور چھان لیں، دن میں دو بار دیں۔

دیگر:۔ اجوائن ۹ ماشہ، ۲۴ گھنٹے ۳ گرام پانی میں بھگوئیں، دن کو سایہ میں اور رات کو شبیم میں رکھیں اور چھان لیں، صبح ناشتہ سے پہلے پی لیں۔

آیور ویدک علاج:۔ کماری آسو امراض جگر اور تلی کے لئے از حد مفید ہے۔ نسخہ درج ذیل ہے:۔

کماری آسو (شارنگدھر):۔ رس گھیکوار ۱۶ سیر، برادہ آہن (لوہ چون) ۲۴ سیر، گڑھ سیر، شہد ۲ سیر، پانی میں ڈال کر ذیل کی ادویات کا سفوف ڈالیں اور حسب دستور آسوتیار کریں۔

مرچ سیاہ، گمھاں، سونٹھ، لونگ، جترک، پیلامول، ہڑ، بہیرہ، آملہ، بابڑنگ، گج پیل، چوہ، ہلو، ہیر، دھنیاں، پیاری دھنی، کٹکی، موٹھاں، راسنا، دیو دار، ہلدی، دار ہلدی، مروڑ پھلی، ملٹھی، جڑ جال گوڑ، پوکھر مول، کھرنیٹی، کنگھی، بیج کوپنج، سولف، گوکھرو، ہنگو پتری، عقرقرھا، بیج اوٹنگن، جڑ اٹ سٹ، سرخ سفید، دودھ، بھسم سونا مکھی ہر ایک دو تولہ، گل دھاوا ۳۲ تولہ، خوراک ایک تولہ سے دو تولہ ہمراہ پانی بعد از غذا دیں۔

فوائد:۔ امراض جگر و تلی، بھس، کمی خون، یرقان، امراض معدہ و امعاء کو مفید ہے، جلودھر (استسقا)، جربان، مرگی کو بھی نفع دیتا ہے، ذیبت جسمانی میں اضافہ ہو کر چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ ابھارہ، قبض، ذیابیطس کے لئے بھی لایفہ داتیک ہے۔ کماری آسو امراض جگر کے لئے طب آیور وید کے مشہور گرنٹھ "شارنگدھر" کا انمول نسخہ ہے۔

نوائس لوہ (شارنگدھر):۔ ہڑ، بہیرہ، آملہ، سونٹھ، مرچ سیاہ، گمھاں، بابڑنگ، جترک، ایک ایک تولہ، کشتہ فولاد ۹ تولہ، سب کا سفوف بنا کر ملا لیں۔

خوراک:۔ دو رتی ہمراہ چھا چھ یا شہد دیں، بھس (کمی خون)، یرقان، ضعف جگر و جگر بڑھ جانے کے لئے مفید ہے۔ تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔

صرف کشتہ فولاد کا استعمال بھی مفید ہے۔۔۔۔۔ اس سلسلہ میں لوہ آسود و تولہ بعد از غذا کا استعمال بھی مفید ہے۔

ہومیوپیتھک علاج :- کمی خون بیماری کے حملے سے ہو تو چائنا، ایڈفاس، ہائیڈراسٹس، آرنگ، خون کے اخراج سے ہو تو چائنا، ایڈفاس، کلکیریا کرب، ملیریا سے صحت ہونے پر ہو تو آرنگ، چائنا، نیٹرم یور، ولادت یا اسقاط کے بعد ہو تو چائنا، فیرم مٹ، کلکیریا فاس، کالی فاس۔
غذا و پرہیز :- کمزوری جگر کے مریضوں کو گرم، چکنی چیزوں، گوشت، ہسن، پیاز، چائے، شراب اور ملاپ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ غذائیں شوربا، کدو، مونگ کی دال، دلیا، گندم کی روٹی یا پالکٹ وغیرہ دیں۔

بیکرت شول، جگر کا درد، وجع الکبد، بیلیری کالک، (Biliary-Colic)

تعریف مرض :- جگر کی جگہ اچانک شدت کا درد ہوتا ہے۔ وہاں سے زیادہ اور کروٹ بدلنے سے قدرے کم ہو جاتا ہے۔
وجوہات :- زیادہ گوشت و انڈوں کا استعمال، دائمی قبض، ورزش کے فوراً بعد پسینہ خشک ہونے سے پہلے پانی پینے سے، جگر میں گرمی یا سردی بڑھ کر درد کا باعث ہوتی ہے۔ یہ مرض عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے اور عام طور پر ۲۰ سال سے ۶۰ سال تک کی عمر میں ہوتا ہے۔
علامات :- اس مرض کو اپنڈیسائٹس کے درد سے تشخیص کرنا ضروری ہے۔ درد جگر میں درد کی شدت ہوتی ہے اور درد اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ دورہ کے بعد اگر پاخانہ کی میڈیکل چارج کی جائے یعنی اس کو پانی میں ملا کر چھانا جائے۔ تو اس میں باریک کنکریاں معلوم ہوتی ہیں، مقام جگر سے درد کی ٹیپیں پریٹ، پشت اور دامنے کندھے تک جاتی ہیں، کبھی شدت درد سے غشی بھی ہو جاتی ہے اور اس صورت میں صفراوی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔
ایلوپیتھک علاج :- شدید درد کو تسکین دینے کے لئے ایک مستند ڈاکٹر کو مارفین کا انجکشن دینا چاہیے، لیکن کمزور مریضوں کو یہ انجکشن نہایت احتیاط سے دیا جائے، معمولی درد کے لئے سوڈا سلی سلاس دس گرین، سوڈا بایکارب ۲ گرین، پانی ایک اونس میں حل کر کے پلائیں، معمولی درد میں دن میں دو یا تین بار کھول دینے سے آرام آ جاتا ہے، درد کے مقام پر سینک کریں، درد دور ہونے پر قبض نہ ہونے دیں، جگر کے مقام پر انٹی فلو جیسٹین کا پلاسٹر لگا کر ٹکڑا کرنا ہی مفید ہے، اس درد کو فوراً آرام ملتا ہے۔

یونانی علاج :- مریض کو آرام سے لیٹائیں پوست خشکاش و تولہ عرق گلاب پانچ تولہ میں جوش دے کر اس سے نیم گرم ٹکڑا کریں، خوردنی عرق سولف کا استعمال مفید ہے یا روغن زیتون ایک تولہ عرق سولف دس تولہ ملا کر پلائیں یا سولف یا جڑ سولف رات کو بھگو دیں، صبح جوشاندہ بنا کر شہد و تولہ ملا کر پلانا مفید ہے قبض نہ ہونے دیں۔
آیور ویدک علاج :- بطر یونانی علاج کے کریں۔

ڈاکٹر جی جے مرحوم لکھتے ہیں کہ اگر جگر کی علامات شروع ہوتے ہی آلو آئیل مناسب مقدار میں ہر گھنٹہ بعد دیتے رہیں تو اکثر درد رک جاتا ہے، گھی کی بجائے روغن زیتون یا روغن بادام کا استعمال مفید ہے، کھاری پانی یا سوڈا بایکارب وغیرہ صفر کو نکالنے کے لئے بھی لایعہدائیک ہے۔

غذا و پرہیز :- حیوانی غذائیں، گوشت، انڈے، پھلی وغیرہ اور شربتی و نشاستہ دار اغذیہ بالکل نہ دیں، سبز نرکاریوں اور تازہ پھلوں کا استعمال مفید ہے۔

بیکرت شوٹھ، ورم جگر، ہیپے ٹائٹس، (Hepatitis)

تعریف مرض :- اس مرض میں جگر کے اندر ورم ہو جاتا ہے، سانپ کا زہر، سینٹونین، سنکھیا، ایٹونان وغیرہ کا زیادہ استعمال سے بھی یہ

روگ ہو جاتا ہے۔

وجوہات:۔ شدید بخاروں، طیریا، کالا آزار، محرق، پلگ، انفلوئنزا، ہیپش، آتشک، جگر پرچوٹ لگنا، شدت کی گرمی، کثرت شراب نوشی، گوشت گرم مصالحہ اور گرم دوائیوں کے استعمال سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات:۔ ورم جگر کی دو قسمیں ہیں، ایک ورم جگر، دوسرا غلاف جگر، غلاف میں تنہا ورم ہو تو جگر کے مقام پر درد ہوگا، سانس میں تنگی ہوگی اور جگر کے کام میں نقص نہیں ہوگا، جگر میں بھی ورم ہو تو اس کے ساتھ بخار لازمی ہوگا۔ جگر کے مقام پر دائیں پسلی کے نیچے درد ہوگا، سانس لینے سے درد میں بڑھوتری ہوگی، ورم جگر گہرے حصے میں ہو تو روگی (مریض) کو قبض ہوگی، ہچکیاں آئیں گی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوں گے اور کبھی کبھی غشی بھی ہوگی، اگر محرق (اوسقلے) یعنی ابھرے ہوئے حصے میں ہوگا تو سانس مشکل سے آئے گا۔ کھانسی بھی ہوگی، بعض اوقات مریض کا پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ اگر ورم دونوں طرف ہوگا تو دونوں علامات مشترکہ ہوں گی، یہ مسم نہایت خطرناک ہے۔ بلغم کی وجہ سے ہوگا تو زبان کا رنگ سفید ہوگا۔ چہرے پر بھر بھراہٹ، بخار خفیف، پاؤں پر ہلکا ورم وغیرہ علامات نمایاں ہوگی۔

ایلوپیتھک علاج:۔ اصل سبب مرض کو دور کر کے علاج کریں۔ مقام درد پر گرم پانی کی بوتل سے سینک کریں یا انٹی فلو جین پلاسٹر لگائیں، گلوکوز مریض جس قدر مضمر کر سکے دی جائے۔ اس مرض میں پیشاب آور پوٹاسی سٹراس، پوٹاسی ایسی ٹاس وغیرہ مفید ہیں۔ اگر مریض کی حالت زیادہ خراب ہو تو گلوکوز سلائن بھاری مقدار میں وریدی طور پر دیا جائے، اصل سبب کے مطابق اگر طیریا کے زہر سے یہ عارضہ ہو تو کوئین کسچر کا استعمال کریں، اگر ہیپش سے ہو تو ای می ٹین ہائیڈر وکلور کے زیر حیلہ انجکشن دیں، جلد کے مریضوں کے لئے پیٹنٹ ادویات میں لورجن پلانے کے لئے اور لیور ایکٹریکٹ مختلف کمپنیوں کے تیار کردہ انجکشن لگانے کے لئے دستیاب ہوتے ہیں۔ یہ ٹیکے مرض کا اصل سبب دور کرنے کے لئے جگر کی تحریک اور خون کی تولید میں اضافہ کرتے ہیں۔ مفید ہیں۔

ماڈرن ادویات:۔ ۱۔ ایکرو مائی سین (Achromycin) یا آریو مائی سین (Aureomycin) لیڈرے ————— سز مائی سین

(Cynermycin) فز ————— ٹیر مائی سین یا ٹیر مائی سین ایس، ایف (Terramycin) فز ————— سو بامائی سین

(Subamycin) ڈیز ————— وغیرہ میں سے کوئی ایک لے کر ایک ایک کیپ شول ہر چھ گھنٹہ کے بعد تازہ پانی سے دیں۔

۲۔ فل امین (Felamin) سینڈوز ————— ایک سے دو گولی دن میں تین بار تازہ پانی سے دیں۔

۳۔ نیو میٹی ڈین (Neomethidin) نیوٹارما ————— ایک سے دو چمچے یا ایک سے دو گولی دن میں تین بار استعمال کریں۔

۴۔ لیٹرین (Litrison) روش ————— جگر کے امراض میں یا جگر کے لئے نقصان دہ چیزوں کے استعمال کرنے پر جگر کی حفاظت کے لئے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ دو تین ٹکیاں دن میں تین بار کھانا کھانے کے بعد تازہ پانی سے دیں۔

۵۔ لورجن (Livergen) سینڈرڈ ————— ایک دو چمچ دن میں دو یا تین بار دیں۔

۶۔ ڈلفی کال (Delphicol) لیڈرے ————— یا یونیوٹکم کولین (Univitecum Choline) ایک دو چمچ دن میں دو بار کھانا کھانے کے بعد دیں۔ اس کی زیادہ مقدار نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے اور الرجی کا عارضہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لئے اسے با احتیاط نگرانی میں استعمال کرایا جائے۔

۷۔ کمزوری کے لئے ہپا ویٹرون (Hepavitrone) سینڈرڈ ————— ایک دو چمچ دن میں دو بار کھانا کھانے کے بعد دیں یا لیو و جن

(Livogen) بی، ڈی، ایچ ————— ایک سے دو چمچ روزانہ دو بار دیں یا پروٹی نیولس (Protinules) المیک ————— ایک دو

چمچ دن میں تین چار بار دیں یا پروٹین ہائیڈرولائی سیٹ (Proten Hydrolysate) لیڈرے ————— ایک دو چمچ دن میں تین بار

دیں یا پرووائی ٹیکس (Provitet) ٹی، سی، ایف ————— ایک دوچھ دن میں تین بار دیں یا یونی پروٹین بسکٹ دیں۔
 ۸۔ ہول لیور ایکٹریکٹ (Whole Liver Extract) ٹی، سی، ایف ————— یا لیور ایکٹریکٹ فورٹ (Liverext extract Fort) ٹی، سی، ایف ————— یا یونی لیور ایکٹریکٹ (Uniliveract Fort) یونی کم ————— یا یونی بی کمپلیکس فورٹ (Uni B. Complex Fort) یونی کم —————۔ بی پلیکس فورٹ (Bepix Forte) اے، ایف، ڈی ————— وغیرہ انجکشن ایک سے دوسری سی عضلاتی ہر دوسرے دن دیں۔

۹۔ بلرون (بلی)، ————— ایک سے دو گولی دن میں تین بار تازہ پانی سے دیں۔

یونانی علاج :- ورم جگر محدب (اُبھرے ہوئے) میں پیشاب آور ادویات کا استعمال بہت مفید ہے اور معقر (دبے ہوئے) میں قبض کھولنے والی ادویات دی جاتی ہیں، اُبھرے ہوئے ورم جگر میں سبز کاسنی کا پانی (آگ پر پھاڑا ہوا)، مکو سبز کا پانی (آگ پر پھاڑا ہوا) ہر ایک پانچ تولہ، ریت بزوری تین تولہ ملا کر صبح و شام پلائیں۔

دبے ہوئے ورم جگر میں جڑ کاسنی چھ ماشہ، جڑ سولف چھ ماشہ، برنجاسف چھ ماشہ، افسنتین چھ ماشہ، مکوشک پانچ ماشہ، جوش دے ریت بزوری یا شربت دینار تین تولہ ملا کر پلائیں۔

مندرجہ ذیل مجربات ورم جگر کے لئے خاص طور پر مفید ہیں :-

حب کبد نوشادری :- نوشادر پھلی، نمک (کھانے والا)، نمک سیاہ، سہاگہ بریاں، نمک لاہوری، زرخچور، چھلکا ہڑکا بلی، ہرڑ سیاہ، نمک، مروج سیاہ، سونٹھ ہر ایک برابر وزن کوٹ کر عرق گلاب میں بخود کے برابر گولیاں بنائیں، خوراک دو سے تین گولی تک کھانا کھانے کے براہ عرق سولف یا پانی کھائیں، امراض جگر کے لئے مفید ہے۔ غذا کو ہضم کرتی ہے، قبض کو دور کرتی ہے۔

لیپ سنبل الطیب :- مسیح الملک حکیم اجمل خاں صاحب مرحوم دہلوی کے مطب میں بکثرت استعمال کیا جاتا تھا، ورم جگر، ورم وغیرہ کو تحلیل کرتا ہے، بیرونی استعمال کرنے سے خناق کو بھی فائدہ مند ہے، اب بھی کئی دواخانے اس کو شہر کر رہے ہیں۔
 بال چھڑ، تگر، مصطکی ہر ایک سات ماشہ، بادام کڑے، بیج کرنس، اجوائن ہر ایک ۹ ماشہ، اکلیل الملک، برنجاسف ہر ایک تین تولہ۔
 تمام ادویات کو سبز سولف کے پانی یا سولف کے جوشاندہ میں پیس کر روغن گل دو تولہ، سرکہ ایک تولہ ملا کر لیپ بنائیں اور مقام درد پر نیم گرم لگائیں۔

دوائے جگر :- شورہ قلمی ایک تولہ، نوشادر پھلی ایک تولہ، ریوند خطائی پانچ تولہ، سنبل الطیب ایک تولہ، سازج ہندی ایک تولہ، فلفل گرد ایک تولہ۔ سب کو کوٹ پیس کر سفوف بنائیں، خوراک چار رتی سے ایک ماشہ، ہمراہ مطبوخ جڑ کاسنی، ورم جگر، جگری بخار، کمزوری جگر اور ہوئی تلی کے لئے مفید ہے۔

دوائے جگر :- ریوند چینی پانچ تولہ، نوشادر پھلی پانچ تولہ، ہر دو کو سفوف بنالیں اور ایک سے دو ماشہ تک حسب ضرورت استعمال کرائیں۔
 دیگر :- افسنتین چار ماشہ، نوشادر پھلی آدھا ماشہ، پانی میں پیس کر آگ پر رکھیں، جب پھٹ جائے تو صاف کر کے پلائیں۔
 دیگر :- اجوائن دیسی چھ ماشہ سے نو ماشہ کو مٹی کے کوسے برتن میں رات کو ڈال کر بھگو دیں، صبح اس کا نتھار مریض کو پلائیں، ورم درمیانے بخار کے لئے مفید ہے۔

گھیکوار بولی سے ورم جگر کا علاج :- گھیکوار کا پٹھالے کر اس کو درمیان سے چیر کر نوشادر پھلی صاف پانچ تولہ سفوف کر کے محفوظ رکھیں اور لٹکا دیں، جو پانی نکلتا رہے، اس کو شیشی میں حفاظت سے رکھیں، دو سے دس بوند پانی میں ڈال کر پلائیں، ورم جگر و

عظم طحال کے لئے از حد مفید ہے۔ بھوک بڑھانے اور صائم کو طاقت دینے میں بھی مفید ہے۔

آیور ویدک علاج میں لوہ آسکا استعمال نہایت مفید ہے، جس کا نسخہ درج ذیل ہے:-

لوہ آسکا (شارنگدھر): کشتہ آہن، سونٹھ، لکھاں، مرچ کالی، ہرڑ، بہیرہ، آملہ، اجوائن، باڈنگ، موکھاں، جترک کی جڑ کی چھال ہر ایک سولہ تولہ، گل دھوا ایک سیر، باریک کر کے چکنے گھڑے میں ڈال کر ۲۲ سیر پانی معہ شہد سواتین سیر اور گڑ پانچ سیر شامل کر کے بند کر دیں۔ خوراک آدھا تولہ سے دو تولہ ہمراہ برابر وزن پانی ملا کر صبح و شام بعد از غذا دیں۔

فوائد:- یرقان، بھس، کمی خون، پُرانا بخار، تپ دجگر کے امراض، پیٹ درد، کمزوری، ہضم اور جنرل کمزوری کے لئے مفید ہے۔

قدرتی علاج:- پُرانے ورم جگر کے لئے اونٹنی کا دودھ پانچ تولہ، شربت بزوری دو تولہ ملا کر ملائیں، آرام آجائے گا۔ اس کے علاوہ قدرتی علاج میں مریض کو کئی روز تک صرف دہی پر رکھا جاتا ہے اور اس سے شاندار نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

یکڑت پھوڑا، جگر کا پھوڑا، لور ایب سس (Liver abscesses)


تعریف مرض:- جگر میں خون کے اجتماع سے ورم ہو کر پھر چھوٹے چھوٹے پھوڑے یا پھنسیاں سی بن جاتی ہیں، جو مریض بڑھ جانے کی صورت میں ایک دوسرے سے مل کر بڑے پھوڑے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، کبھی ایک پھوڑا ہو جاتا ہے اور کبھی کئی پھوڑے ہوتے ہیں، کئی پھوڑوں کا انجام خطرناک ہوتا ہے۔

وجوہات:- ورم جگر، جگر پر چوٹ لگنا، صفراوی مادہ کا جگر میں اجتماع، میز یا بخار کے زہریلے اثرات، زیادہ شراب نوشی، جراثیمی پچش وغیرہ وغیرہ ہمارے تجربات کے مطابق یہ عارضہ اکثر امی بک ڈسنٹری سے ہوتا ہے، کیونکہ جب مریض کو یہ عارضہ ہوتا ہے۔ تو معمولی علاج کرنے سے پچش کو آرام آ جاتا ہے، مگر دراصل آنت میں امیبا سوجو درہتا ہے اور وہاں سے آہستہ آہستہ جگر میں داخل ہو جاتا ہے اور وہاں سوزش پیدا کر دیتا ہے، جس سے جگر کے دائیں پوٹھڑے میں پھوڑا بن جاتا ہے اور جگر کا حجم بھی بڑھ جاتا ہے۔

علامات:- شروع میں جگر کی جگہ پر بھاری پن اور درد ہوتا ہے، جس کی ٹیسس شانے تک جاتی ہیں، کھانسنے اور سانس لینے میں سخت تکلیف ہوتی ہے۔ تیز بخار ہوتا ہے۔ مریض کا بدن، آنکھیں، ہونٹ سب زرد ہوتے ہیں، مریض نہایت کمزور و لاعز ہو جاتا ہے، کروٹ لینے یا دبائے سے درد بڑھتا ہے۔ پھوڑا پھوٹ جانے پر جگر کی جگہ ہلکا پن ہوتا ہے اور گاہے سفید یا پیلی تھیں یا اسہال یا پیشاب کے راہ خارج ہوتی ہے، پھوڑا معدہ، انٹریوں کی طرف پھوٹے تو عام طور پر مریض کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن غلاف دل، غلاف پیچھڑہ یا جوف شکم کی طرف پھٹ جائے تو انجام خراب ہو جاتا ہے۔

علاج ڈاکٹری:- شروع میں امی ٹین آدھے سے ایک گرین کا دن میں ایک بار زیر جلد انجکشن دینے سے بلا آپریشن جگر کے پھوڑے کو آرام آ جاتا ہے۔ یہ علاج دس روز تک جاری رکھا جائے، انجکشن خالی معدہ شام کو لگائیں، اگر شدید صورت تو سوائے آپریشن کے آرام آنا مشکل ہے، پچش کی صورت میں انٹرو والیو فارم وغیرہ کا استعمال کیا جائے اور مریض کو آرام سے بستر پر لٹائے رکھیں۔

یونانی و آیور ویدک علاج بطور ورم جگر کے کریں۔



ہومیوپیتھک علاج :- فاسفورس ۳۰ (Phos Phorous-30) (ابتدائی حالت میں)، آرنگ الب ۳۰ (Ars-Alb-30) (شدید صورت میں) مفید ادویات ہیں۔

بالوکیک علاج :- کالی فاس (شروع میں)، میگنیشیا سلفاس (بڑھی ہوئی حالت میں) مفید ادویات ہیں۔
قدرتی طریقہ علاج میں دہی کا استعمال مفید ہے۔
غذا و پرہیز :- بطن ورم جگر کے کریں۔

یکرت کا سُکڑاؤ، جگر کا سُکڑ جانا، صفرا لکبڈ، سروسس آف دی لور

(Cirrhosis Of The Liver)

تعریف مرض :- اس مرض میں جگر فالٹوریشوں کے پیدا ہونے سے کسی قدر بڑھ جاتا ہے، بعد میں سُکڑ کر چھوٹا ہو جاتا ہے۔
وجوہات :- یہ عارضہ اکثر شراب پینے والوں کو عام طور پر درمیان عمر میں ہوتا ہے اور عورتوں کی نسبت مردوں کو زیادہ لاحق ہوتا ہے، علاوہ
زیں تیز مسالحو دارانہ ذیہ کا استعمال، جراثیمی پچش، آتشک وغیرہ سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے، جن اشخاص کا جگر طبعی طور پر چھوٹا ہوتا ہے، وہ اس مرض کی
تعریف میں داخل نہیں ہیں۔

علامات :- شروع میں مریض کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، کبھی صبح کے وقت جی متلاتا ہے یا قیئیں آتی ہیں، زبان سیلی ہو جاتی ہے، جگر کے مقام پر
دھڑکتا ہے، کبھی خفیف بخار بھی ہو جاتا ہے۔ مریض کی رنگت بالکل زرد ہو جاتی ہے۔ دن بدن کمزوری بڑھتی جاتی ہے۔ آخر میں یرقان یا استسقا
پیدا ہو جاتا ہے۔

علاج ڈاکٹری :- ایونیا کلورائیڈ اس مرض کی عمدہ دوا ہے، اگر مریض کو آتشک کی وجہ سے یہ عارضہ ہو تو پوٹاشیم آیوڈائیڈ اور سبتھ کے ذریعہ
علاج کیا جائے، لیکن سنگھیا کے مرکبات نہ دیں، اگر مریض کو استسقا کی شکایت ہو تو نمک بند کر دیں اور پانی خارج کرنے کے لئے کوشش کریں، شدید
دورت میں نیپٹال (Neptal) یا سیلرگان (Salyr-Gan) یا مرسلائل (Mersalayl) کا شروع میں آدھائی سی اے جی میں ایک سی سی ہفتہ وار
عضلاتی انجکشن دیں، کھانے کے لئے ایونیا کلورائیڈ دس سے پندرہ گرین دن میں تین بار دیں اور مرض استسقا کے مطابق علاج کریں، ایونیا کلورائیڈ
مقیاط استعمال کریں، تاکہ اس دوا سے ترشہ سمیت نہ ہونے پائے۔

طاقت کی بحالی کے لئے "وٹامن کے" اور کیلشیم کے مرکبات دے سکتے ہیں، کمی خون کے لئے ضعف جگر کے مطابق علاج کریں، اگر یہ عارضہ
ل کو ہو تو پورجن، ہپارجن، لوٹیکس اور لورڈ (Livrid) بہترین ادویات ہیں۔ اگر یہ عارضہ حاملہ کو ہو تو وٹامن بی کیلکس کا استعمال مفید ہے۔
ہماری تجربات کے مطابق پورایکٹریکٹ ایک سے دوسری سی کی مقدار میں عضلاتی انجکشن و پور کے مرکبات خوردنی طور پر کھانے کو دیں، وٹامن
۱۲ کا استعمال بھی مفید ہے۔

یونانی علاج :- زیج کاسنی پانچ ماشہ، زیج کثوت پانچ ماشہ، زیج کرمن پانچ ماشہ، خارخک پانچ ماشہ، یہ تمام ادویات علیحدہ علیحدہ یا سب ملا
خیرہ نکال کر یا مطبوخ بنا کر مشربت بزوری دو تولہ ملا کر استعمال کریں۔

آیور ویدک علاج :- اچار گھیکوار کا استعمال مفید ہے، علاوہ ازیں جو مجربات ورم جگر میں دیئے گئے ہیں، مفید ہیں۔ قدرتی علاج میں دہی
چھانچہ کا استعمال مفید ہے۔

یکرت وردھی، جگر کا بڑھ جانا، انلارجمنٹ آف لیور

(Enlargement of Liver)

تعریف مرض :- اس مرض میں جگر بڑھ جاتا ہے اور پسلیوں کے نیچے پیٹ کے دائیں طرف درد محسوس ہوتا ہے۔

وجوہات :- ورم جگر، جگر کا پھوڑا، فساد خون، بحرہ، پلیریا، پلگ وغیرہ جرثومی بخاروں سے جگر بڑھ جاتا ہے۔

علامات :- بڑھے ہوئے جگر کو پسلیوں کے نیچے پیٹ کے دائیں طرف بخوبی محسوس کیا جاسکتا ہے۔ بعض دفعہ جگر چار انچ سے پانچ انچ تک بڑھ جاتا ہے۔

علاج :- بطرز ورم جگر (یکرت شوئخہ) یعنی ہے پے ٹائیس (Hepatitis) سے کیا جائے۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ دل کی کمزوری سے بڑھے ہوئے جگر کے لئے ایسی ڈرکیس (Esidrex) سب

ڈایاڈی میل (Diademil) سارا بھائی ڈایاموکس (Dia mox) لیڈرے وغیرہ ہر

ایک دو کیہ صبح دیں، یہ پیشاب لانے والی ہیں۔

۲۔ دل کی کمزوری سے بڑھے ہوئے جگر کے لئے نیپٹال (Neptal) مے اینڈ بیکر امینوفیلین (Aminophyline)

مرسال (Mersalyl) وغیرہ انجکشن بھی مفید ہیں۔

۳۔ لیور ایکسٹریکٹ (Liverextract) ٹی، سی، ایف یا بی پلکس فورٹ (Bplexfort) اے، ایف ڈی

وغیرہ انجکشن ایک سے دوسری ہر دوسرے دن عضلاتی انجکشن لگائیں۔

جگر کی ریا، نفخ الکبد، فیٹس آف دی لیور، (Fitus of the Liver)

جگر کی طاقت ہضم کمزور ہونے و دیر ہضم اغذیہ کے بجزت استعمال سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے، جگر میں یا جگر کے اوپر استر کرنے جھلی میں ریا حیس بند ہو جاتی ہیں، جس کی علامت یہ ہے کہ دبائے سے محسوس ہوتا ہے کہ نیچے کوئی چیز تحلیل ہو رہی ہے۔ یہ عارضہ خ

معدہ کے بعد زیادہ ہوا کرتا ہے۔

علاج :- ریا خ دور کرنے والی اغذیہ وادویہ استعمال کریں، جوارش فلافل کا استعمال مفید ہے۔

جگر کی پتھری، حصّۃ الکبد، ہیپٹولتھ (Hypatolith)

مرارہ کی پتھری کا کوئی ٹکڑا علیحدہ ہو کر جگر اور مرارہ کے درمیان نالی میں پھنس جاتا ہے، اس کو جگر کی پتھری کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔
 علامات :- مقام جگر پر سخت درد ہوتا ہے، خوراک ہضم نہیں ہوتی اور قیئیں آتی ہیں، گاہے سرخ رنگ کی پتھری پیشاب سے خارج ہوتی ہے۔
 علاج :- بطرز جگر بڑھ جانے کے کریں، اگر مرض شدید ہو تو آپریشن ضروری ہوتا ہے، نئی رلیزج کے مطابق ایسپرین کو اس مرض کے لئے مفید بتایا گیا ہے، اس کا علاج سنگ مرارہ کے مطابق کیا جائے۔ روغن زیتون آدھا اولس غذا کے بعد پینا بھی مفید ہے، دیسی طریقہ علاج میں سولف ۹ ماشہ کا جو شانہ پلائیں یا مولی کا رس اڑھائی تولہ دیں، کشتہ سنگ یہود آدھی رتی سے ایک رتی کا استعمال بھی مفید ہے۔
 غذا و پرہیز :- غذا لطیف و زود ہضم دیں، چاول، گوشت، اندھے، چائے، شراب و کباب سے سخت پرہیز ضروری ہے۔

جگر میں خون جمع ہو جانا، کون جٹشن آف دی لور

(Congestion of the Liver)

تعریف مرض :- اس مرض میں جگر میں خون زیادہ جمع ہو جاتا ہے۔
 وجوہات :- زیادہ کھانا پینا، زیادہ گوشت کا استعمال، شراب نوشی، زیادہ گرمی، ورزش نہ کرنا، دائمی قبض، دل و پیچھے کی بیماریاں وغیرہ۔
 علامات :- دائیں طرف کی پسلیوں کے نیچے بوجھ اور میٹھا میٹھا درد محسوس ہوتا ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، اچھارہ ہوتا ہے، مہوک لگتی ہے، کبھی درد اور بخار بھی ہو جاتا ہے۔

علاج ڈاکٹری :- میگنیشیا سلفاس کا ہلکا جلاب لیتے رہنے سے بھی مرض میں کمی ہو جاتی ہے، بطور دوا نو شادر دس گرین، سوڈا سلی سلاس گرین دن میں دوبار دیں، دیگر علاج بطرز "یرقان" کے کریں۔
 دیسی طریقہ علاج میں پہلے جلاب دیں، پھر سبز کاسنی کا پانی (آگ پر پھاڑا ہوا) چار تولہ، مشرب بزوری دو تولہ ملا کر صبح و شام چند روز پلائیں۔
 غذا و پرہیز :- پالک، شلغم، گاجر، دال مونگ، سنگترہ وغیرہ دیں، آلو، گو بھی، گوشت، اندھے وغیرہ کا استعمال نہ کریں۔

جگر کی جلودھر، ہیپاٹک ڈراپسی، (Hepatic-Dropsy)

اس مرض میں جگر میں پانی پڑ جاتا ہے، جسے طب میں جگر کی جلودھر کہتے ہیں، جگر کی سوجن، جگر کا پھوٹا، ورم جگر وغیرہ سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے، جگر میں ورم ہونے سے جگر شدہ خون نہیں بنا سکتا، جس سے جسم کے اندر خاص طور پر جگر کے اندر جلودھر کا عارضہ ہو جاتا ہے، جس کا اگلے باب میں دیا گیا ہے۔

جدید تحقیقات کے مطابق پیشاب لانے والی سلفا ڈرگز ڈایامیکس (Dia mex) کا استعمال اس مرض میں مفید ہے۔ ————— یونانی و دیگر علاج جلودھر کے مطابق کریں۔

جگر کا سرطان، کینسر آف لور، (Cancer of Liver)

یہ عارضہ جسم میں دوسری جگہ ہونے پر جگر کو بھی متاثر کر لیتا ہے، یعنی جگر میں بھی ہو جاتا ہے، بعض دغہ جگر میں رسولی بھی ہو جاتی ہے۔ علامت 'مرض' بطور سرطان ہیں، مریض بالکل کمزور ہو جاتا ہے اور اسے ساتھ یرقان کا عارضہ بھی ہو جاتا ہے، کینسر آف لور کے لئے سرطان کا بار ملاحظہ فرمادیں، حال ہی میں مشہور ہندوستانی و پاکستانی بوٹی دھماکہ کو اس مرض کے لئے شافی قرار دیا گیا ہے اور سرطان کے لئے نہایت موثر ثابت ہوئی ہے۔ اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ دو تولہ سبز یا خشک پودے کو پس کر عرق نکال کر روزانہ صبح اور شام پلائیں، دو ہفتہ کے اندر حیرت انگیز نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ سرطان میں اگر بیرونی حصہ ہو تو اس پر اس کی پلٹس بنا کر بھی باندھی جائے، بعض مریضوں کو اس قدر خوراک موافق نہیں آتی ہماری رائے میں ابتداء میں چھ ماشہ دھماکہ کو چار تولہ پانی میں جوش دے کر چھان کر پلائیں، اس بوٹی کا مفصل بیان ہماری نئی تصنیف "ہندوستان کی جڑ بوٹیاں" میں دیا گیا ہے، قیمت اٹھارہ روپے اور محصول ڈاک ۳ روپے ہے اور منیجر لاجوگی پبلیکیشنز پانی پت (ہریانہ) کے پتہ سے ایک خط لکھ کر منہا جاسکتی ہے۔

جگر کی آبی رسولی، ہائیڈیڈیسٹ آف لور، (Hydatid-cyst of Liver)


اس مرض میں جگر میں رسولی پیدا ہو جاتی ہے، بعض دغہ ایک سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، جگر کے مقام پر غور سے معائنہ کرنے پر رسولی معلوم جاسکتی ہے، جو کہ ایک پچکدار مٹیلی کی طرح ہوتی ہے۔ رسولی کے بڑھ جانے پر یہ پھپھڑے اور سپٹ پر دباؤ ڈالتی ہے، اس مرض میں اکثر ساتھ جلو کا عارضہ بھی ہو جاتا ہے، اس مرض کا علاج کسی اچھے ہسپتال میں سوائے آپریشن کے اور کوئی نہیں ہے، معمولی حالتوں میں جگر کے پھوڑے کے علاج کرنا چاہیئے۔

امراض جگر کا پھلوں سے علاج ۱۔ آب سنگترہ ایک عدد چینی حسب ضرورت، سوڈا خوردنی ایک گرام۔ ایک گلاس پانی میں حسب ضرورت میٹھا کوئی شربت ملا لیں اور ایک گرام سوڈا بائیکارب اس میں خوب حل کر لیں۔ اب ایک عدد سنگترہ رس سے بھرا ہوا لے کر اس کا پھلکا وینج د کریں۔ پھر قاش سنگترہ کو صاف کپڑے میں رکھ کر دبا کر رس حاصل کریں۔ اس پانی کو شربت مندرجہ بالا میں ملا کر داخل کریں، جوش پیدا ہوگا۔ جوش ہو ہی گلاس کو منہ سے لگا کر نوش کریں۔ نہایت ہی مفید و خوش ذائقہ شربت ہے۔

معدہ کی سوزش و گرمی کی تسکین کے لئے مفید ہے۔ موسم گرما کا تحفہ ہے۔ پیشاب لاتا ہے، جگر کے سدوں کو کھولتا ہے۔ یرقان کمزوری جگر کا مجرب علاج ہے۔ بھوک بڑھاتا ہے۔

۲۔ چہرہ و جسم کو نکھارنے و خوبصورت بنانے کے لئے خون پیدا کرنے والے پھلوں کو کثرت سے استعمال کریں۔ اس مقصد کے لئے انگور سنگترہ اور سیب تینوں پھل بہت ہی مفید ہیں۔ جگر میں وافر لال خون پیدا ہوتا ہے اور چہرہ کی زردی لالی میں بدل جاتی ہے۔

۳۔ انار کے رس پچاس گرام میں نئے لوہے کا دھویا ہوا صاف ٹیکڑا رکھ دیں۔ صبح لوہے کو نکال دیں۔ پانی میں قدرے مصری اور پانی ملا کر پلایا یرقان دور ہو کر جگر میں خون پیدا ہوگا۔



گیارہواں باب

ہیٹ اور تلی کی بیماریاں

پانڈو، پیلپاروک، یرقان، جانڈس، (Jaundice)

تعریف مرض :- اس مرض میں کبھی چہرہ اور آنکھیں اور کبھی تمام بدن پیلا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ سیاہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ مرض دجوات کے لحاظ سے کئی قسم کا ہوتا ہے، چنانچہ بعض ضروری اقسام درج ذیل ہیں :-

۱۔ خون شکن یرقان (ہیمولائیٹک جانڈس) :- اس مرض میں خون کے سُرخ کیے (سیلز Cells) نہایت بھاری مقدار میں ضائع ہو جاتے ہیں اور خون کے سُرخ ذرات کا رنگین مادہ ہلی روبین میں بدل جاتا ہے۔ یہ تبدیلی جگر کے ماؤف ہونے پر واقع ہوتی ہے، لیکن خلیات کبدی ایک حد تک بھی روبین کی زیادہ مقدار خارج کر سکتے ہیں، اس لئے یرقان ہو جاتا ہے۔

۲۔ یرقان سمی (ٹاکسک جانڈس) (Toxic Jaundice) :- یہ مرض نونیہ، محرقہ، بکڑ، پارہ، سنکھیا، کلوروفارم، فاسفورس وغیرہ کے زہر سے یا سانپ کے ڈسنے یا کسی جانور کے کاٹنے سے زہر یا خون میں پیپ شامل ہو جانے سے ہو جاتا ہے، اور ان کی وجہ سے صفراوی نالیوں میں بندش ہو جاتی ہے، اس قسم کا یرقان دوسرے مرض کی علامت ہے، بذات خود کوئی مرض نہیں

۳۔ یرقان سُدی (Obstructive-Jaundice) :- یہ جگر کے صفرا کو پتہ میں اور پھر وہاں سے انٹری میں پہنچانے والی نالیوں کے اندر یا باہر کا وٹ پیدا ہو جانے سے ہوتا ہے۔

۴۔ یرقان بلغمی (کٹارل جانڈس) :- اکثر بارہ انگشتی آنت میں سوزش ہو کر غشاء مخاطی کا ورم مرارہ کی نالی جو تین اپنچ لمبی ہوتی ہے اور لبلبہ کی تالی کے ساتھ اثنا عشری میں کھلتی ہے، اس تک اثر کرتا ہے اور اس کی دیواروں میں ڈھیلا ورم پیدا کر کے غلیظ بلغم کا ترشح ہوتا ہے، جس کے ذریعے

صفرا کی نالی کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر یہ یرقان سُدی کی ایک قسم ہے، لیکن حال ہی میں یہ نظریہ تبدیل ہو گیا ہے اور نئی تحقیقات کے مطابق خلیات کبدی (Hepatic-cells) میں ایک جرثومہ (وائرس) کے سبب سے سوزش واقع ہو کر ان کے صفرا کے اخراج کے نعل میں فرق پیدا کر دیتی ہے، جس سے یرقان ہو جاتا ہے۔

۵۔ یرقان طحالی :- اس مرض میں تلی کی رگوں میں سُدہ پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سودا تلی میں نہیں جاتی اور خون کے ساتھ مل کر تمام بدن کو سیاہ کر دیتی ہے۔ اس کو یرقان اسود کہتے ہیں، طب جدید میں ایکسٹریس میلس یا بلیک جانڈس کہتے ہیں، یرقان اسود کے ساتھ گاہے حمی رنج اور یرقان اصغر کے ساتھ حمی لازم (لازمی بخار) بھی ہوتا ہے۔

علامات :- اس مرض میں سب سے پہلے آنکھوں کی رنگت زرد ہونے لگتی ہے، ناخن، چہرہ، بازو اور آخر میں سارا جسم زرد ہو جاتا ہے۔ پاخانہ سفید، پیشاب زرد گہرہ براؤن ہوتا ہے۔ قبض، بستی، کاہلی، منہ کڑوا، درد معدہ، عام طور پر معمولی بخار ہوتا ہے، صفراوی نالیاں بند ہو کر صفرا خون میں جذب ہو جاتا ہے، آخر میں بدن پر خارش ہو جاتی ہے۔ یہ مرض اکثر گرم چیزوں کے استعمال سے ہوتا ہے، جس سے صفرا کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں۔

طب آیوروید میں پانڈوروگ کی پانچ قسمیں دی گئی ہیں۔ (۱) واتج، (۲) پتج، (۳) کلفج، (۴) سنیپاتج، (۵) مٹی کھانے سے۔

صفرا کی موجودگی کے لئے پیشاب ٹیسٹ کرنے کا طریقہ

مریض کا پیشاب ٹیوب میں لے کر چٹکی بھر سفوف گندھک ڈال دیں، اگر پیشاب میں نمکیات صفرا ہوں گے، تو گندھک ضرور اس میں گھل جائے گی یا تنچے بیٹھ جائے گی، اگر اوپر تیرتی ہے تو یہ اس کی دلیل ہے کہ مریض کو یرقان نہیں۔ یہ طریقہ ڈاکٹری میں ہینز سلفر ٹیسٹ (Hay's Sulphur Test) کہلاتا ہے، یرقان کے شروع میں پیشاب نمکیات صفرا خارج کرتا ہے، جو بعد ازاں رُک جاتے ہیں، تب دوسرا ٹیسٹ (Gmelin's test for bile pigment) کام دے سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ پیشاب کے چند قطرے کسی چینی کے پیالہ میں ڈال کر اوپر نائٹرک ایسڈ کے دو قطرے ڈالیں تو یرقان کی موجودگی میں گلابی اور ہرے پھلے بن جائیں گے۔

علاج ڈاکٹری :- اصل سبب مرض کو معلوم کر کے علاج کریں، شروع مرض میں مریض کو ۲۴ گھنٹہ تک کوئی غذا نہ دیں، صرف معمول مقدار میں آتش جو پلا میں۔ رات کو کیلو مل تین سے پانچ گرین کھلا کر صبح ایک خوراک فروٹ سالٹ یا سڈلز پوڈر دیں۔ تاکہ دو چار دن آجائیں۔ مریض کو آرام سے بستر پر لٹائے رکھیں، اگر متلی دتے ہو تو صرف سنگترہ کارس، لیمونیڈ اور دودھ سوڈا دیں، بیرونی خارش کے لئے کاربائیکیل کا استعمال کریں، یرقان کے مریضوں کو تیل، گھی، چربی سے پرہیز کرنا چاہیے، یرقان کے لئے :-

۱۔ ٹوفوسامین (Topho-Samin) وریڈی طور پر ۵ سی سی انجکشن ضعف جگر اور یرقان کے لئے مفید ہے، یہ جگر کے صفرا کو خارج کرتے ہوئے ۲۔ ڈیکولین (Decholin) ۵ سی سی وریڈی انجکشن دیئے جاتے ہیں، ڈی ہائیڈرو کولین (De-Hydro-Cholin) کے نام سے فروخت ہوتی ہے، ضعف جگر، پتہ کے ورم اور سوزش میں مفید ہے۔

۳۔ کمپولان (Campolon) یہ بارنگینی کے بور ایکسٹریکٹ کے انجکشن ہیں، جو یرقان، کمی خون، کمزوری، ضعف جگر میں مفید ہے۔ مقدار خوراک دو سی سی عضلاتی طور پر دیں۔ یہ مارکیٹ میں کمپانیم (Campanem) کے نام سے بھی فروخت ہوتا ہے۔ ہمارے تجربات میں یرقان کے لئے دنا من بی ۱۲ کے ایک سی سی کے روزانہ عضلاتی انجکشن نہایت زود اثر ثابت ہوتے ہیں۔ بور ایکسٹریکٹ کے عضلاتی انجکشن بھی جلد اثر دکھاتے ہیں۔

پیٹنٹ ادویات میں جگر کو صاف کرنے کے لئے بالائی کولیٹ (Bicholates) اور بالائی سیزر (Bilebeans) عمدہ ادویات ہیں، یرقان دبائی ہو کر ایک متعدی مرض ہے اور اس میں بخار ۱۰۳ سے ۱۰۵ درجہ تک ہوتا ہے اور حال ہی میں دہلی میں اس کی وبا پھیلی تھی۔ اس سلسلہ میں دبائی یرقان کے لئے سٹریپٹو پیپسیلین کا عضلاتی انجکشن مفید ہے، اس کے علاوہ ٹیرامائی سین کا استعمال مفید ہے، وٹامن بی کمپلیکس کا ساتھ ساتھ استعمال ضروری ہے۔ جراثیم کے لئے صرف پیپسیلین کا عضلاتی انجکشن بھی مفید ہے۔

۱۔ لیورجن (Liver gen) اور کومارلش (Qumaresh) کا استعمال بھی یرقان میں کیا جاتا ہے، جو کہ عمدہ ادویات ہیں۔
 ۲۔ ڈیپھی کال (Delphicol) لیڈرے ————— دو سے تین چمچ دن میں دو سے تین بار دیں۔
 ۳۔ فیلامین (Felamine) سینڈوز ————— ایک سے دو گولی دن میں تین بار تازہ پانی سے دیں۔
 ۴۔ نیو میتھیدین (Neomethidin) نیوفارما ————— ایک سے دو چمچ یا ایک سے دو گولی دن میں تین بار دیں۔ جگر کے تمام امراض و یرقان کے لئے مفید ہے۔

۵۔ لیٹریسن (Litrison) روش ————— دو تین ٹمکیاں دن میں تین بار کھانا کھانے کے بعد تازہ پانی سے استعمال کرائیں۔
 ۶۔ اگر یرقان کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا بخار بھی ہو تو ٹیرامائی سین ایس، ایف (Terramycin S.F) فزیر ————— کا ایک کیپ شول ہر چھ گھنٹہ بعد دودھ یا پھلوں کے رس کے ساتھ دیں یا ایکرومائی سین (Achromycin) لیڈرے ————— یا سوبامائی سین (Subamycine) ڈیز ————— یا لیڈرمانی سین (Ledermycin) لیڈرے ————— کا استعمال کرایا جائے۔
 ۷۔ بہت خراب حالت میں لیور ایکسٹریکٹ (Liver extract) کا عضلاتی انجکشن کریں اور کارٹی سون (Cortisone) کی گولیوں کا استعمال بھی بعض دفعہ اچھے نتائج دکھاتا ہے۔

یونانی علاج :- مولی کے سبز پتوں کا پانی (پھاڑا ہوا) سات تولہ، شکر سرخ چار تولہ ملا کر روزانہ پلائیں یا کھٹی پوٹی ایک تولہ لے کر ایک پاؤ پانی میں پیس روزانہ پلائیں، (اس بوٹی کا بالتصویر بیان ہندوستان کی جڑی بوٹیاں) میں درج ہے، قیمت جلد اول ۸/۱۸ پیسے، جلد دوم ۸/۱۸ پیسے، جلد سوم ۸/۱۸ پیسے، محصول ڈاک علاوہ "منجیزالا جوگی پبلیکیشنز پانی پت (ہریانہ) انڈیا سے خط لکھ کر دی، پی سے طلب کر سکتے ہیں)، یا کاسنی، جڑ کاسنی، مغز نیچ فرہندہ، مغز نیچ کھیرا، ایک پار ماشہ، مصری دو تولہ پانی میں شامل کر کے رگڑ چھان کر صبح و شام پلائیں۔

یرقان دور کرنے کے لئے آسان مجربات

- ۱۔ نیچ کا سنی ایک تولہ، منک لاہوری ایک ماشہ دونوں کو ملا کر پانی میں پیس کر آگ پر رکھیں، جب پانی پھٹ جائے، تو چھان کر پلائیں۔
- ۲۔ مکو سبز کا پانی (آگ پر پھاڑا ہوا)، کاسنی سبز کا پانی (آگ پر پھاڑا ہوا)، مولی سبز کا پانی (آگ پر پھاڑا ہوا)، ہر ایک تین تولہ، شربت بزدی تین تولہ ملا کر پلائیں۔
- ۳۔ سودا بایکارب و نوشادر پھلی مناسب مقدار میں کھانا کھانے کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد ایک ادس پانی میں گھول کر پلانا مفید ہے۔
- ۴۔ ریوند خطائی، ہلدی برابر وزن لے کر مٹی کے پیالہ میں نرم آگ پر بریاں کریں، بعد ازاں پیس کر سفوف بنالیں۔ اور چار ماشہ کی مقدار میں شربت دینار تین تولہ، عرق مکو بارہ تولہ کے ساتھ دیں۔ یرقان اسود کے لئے، جس میں جسم سیاہ ہو جاتا ہے، نہایت مفید اور زود اثر ہے۔
- ۵۔ پرنے یرقان میں پھلکڑی بریاں ایک ماشہ، دہی دس تولہ کے ہمراہ دینا مفید ہے۔
- ۶۔ آلو بخارا ایک تولہ، اعلی آدھا تولہ، کاسنی آدھا تولہ، پانی ایک پاؤ، کسی مٹی کے سکوے میں رات کو بھگو دیں، صبح مل کر چھان لیں، صبح سویرے چھنے

ہوئے خیانہ میں دو تولہ مصری ملا کر پلائیں۔ یرقان کے لئے مفید ہے۔

آیور ویدک علاج:۔ کشتہ فولاد بقدر آدھی سے ایک رتی چند روز استعمال کرانے سے وات سے پیدا شدہ یرقان رفع ہو جاتا ہے۔
 طرح مندرجہ ہضم آدھی سے ایک رتی کا استعمال ہر قسم کے یرقان و دیگر اور تلی کے لئے مفید ہے، چند سوربہ رس یا پرلن بلبلہ رس یا پانڈ و پنچان رس استعمال بھی مفید ہے۔ مشہور آیور ویدک دوا کماری آسو کا استعمال بھی یرقان کے لئے مفید ہے، آملکیہ اولیہ، دھاتری ارشٹ، کاملا آتنگ لوہ، پیزنوا آتنگ کو اٹھ، اشٹاد شانگ لوہ کا استعمال بھی مفید ہے۔

مندرجہ ذیل آسان آیور ویدک مجربات یرقان کے لئے بہت مفید ہیں:-

۱۔ کیکر کے پھول لے کر برابر مصری ملا لیں۔ اور روزانہ چھ ماشہ ہمراہ پانی صبح و شام کھلانے سے کاملاً یقیناً رفع ہو جاتا ہے۔

۲۔ کنکھی بوٹی چھ ماشہ بطور سردائی گھوٹ کر مصری ملا کر روزانہ سات روز تک پلانے سے کاملاً رفع ہو جاتا ہے۔

۳۔ کوندھی بوٹی کے پتے سات عدد، مرچ کالی چار عدد، دونوں پس کر تازہ پانی کے ہمراہ کھلانے سے ایک ہفتہ میں بڑھا ہوا کاملاً روگ ناکش ہو جاتا ہے۔

۴۔ تر پھل دو تولہ، ڈیڑھ پاؤ پانی میں جوش دے کر نصف پانی رہ جانے پر چھان لیں اور مصری ملا کر پلانے سے کاملاً روگ نشٹ ہو جاتا ہے۔

۵۔ گلو کے پتے ایک تولہ بطور سردائی گھوٹ کر اس میں ایک تولہ مصری ملا کر پلائیں، آٹھ دن میں کاملاً نشٹ ہو جاتا ہے۔

۶۔ آملہ کارس بطور سردائی سے آنکھوں میں لگائیں، یرقان کے لئے مفید ہے۔

۷۔ تازہ گلوئے نیم ۵ گرام، شہد ۵ گرام، گلو کو کچل کر ۳ گرام پانی میں جوش دیں، آدھا رہنے پر چھان کر ٹھنڈا ہونے پر شہد ملا کر پلائیں۔

۸۔ ہندی کے پتے دس گرام، ۳ گرام پانی میں جوش دے کر چھان کر صبح کو پلائیں۔

۹۔ مولی کا پانی اڑھائی تولہ، نوشادر پھلی ایک گرام، مولی کے پانی میں نوشادر ملا کر دن میں دوبار دیں۔

۱۰۔ بول کے پھول ۴ گرام، زیرہ سفید ۳ گرام، ۳ گرام پانی میں رات کو بھگو کر صبح کو چھان لیں اور پی لیں۔

۱۱۔ افستین ۶ ماشہ، نوشادر پھلی ایک ماشہ، ۳ گرام پانی میں پس کر آگ پر رکھیں، جب پانی الگ ہو جائے تو اتار کر چھان کر پلائیں۔

۱۲۔ گلو کے تازہ پتے ۶ ماشہ، ۵ گرام پانی میں اُبال کر چھان لیں اور ٹھنڈا ہونے پر پلائیں۔

کاملا کی لا علاج علامتیں:۔ جس کا ملا یا کنبھ کا ملا کے مریض کا پیشاب و پاخانہ سیاہ رنگ کا پلایا بالکل سرخ ہو جائے، جسم پر سوجن

بڑھ جائے، آنکھیں، چہرہ، پیشاب و قے بالکل لال رنگ کے ہو جائیں اور مریض وہمی ہو جائے تو مرض کو لا علاج سمجھیں۔

ہومیوپیتھک علاج: ۱۔ فاسفورس ۳۰ ایک کامیاب علاج ہے، علاوہ ازیں فیرم ۱۲ (FERRUM) کا استعمال بھی مفید ہے۔

بالوکیٹک علاج:۔ کالی میور (مرض کے شروع میں) نیٹرم سلف (مرض کی بڑھی ہوئی حالت میں) اور نیٹرم میور پرانی صورت میں مفید ہے

قدرتی علاج:۔ لیموں، سنگترہ، مالٹا، مولی اور پودینہ، ہرے دھنیاں کی چٹنی کا استعمال مفید ہے۔ ہمارے تجربہ میں اگر مریض کو بکری کا د

متواتر استعمال کرایا جائے اور خوراک کم دی جائے تو یرقان کے مریض کو چند روز میں ہی آرام آ جاتا ہے۔

غذا و پرہیز:۔ ہلکی اور زود ہضم غذائیں دیں، جب تک ہاضمہ درست نہ ہو جائے، ثقیل اور دیر ہضم اغذیہ دینے سے سخت پرہیز کریں، آیور

نظریہ کے مطابق پانڈ و روگ کے روگی کو ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا منع ہے، بلکہ گرم پانی میں تولیہ بھگو کر اس کو نچوڑ لیں۔ اس سے سائے جسم کو صاف

چاہیے کیونکہ اس طرح مریض کے سام کھل کر مواد فاسدہ بذریعہ مسامات خارج ہوتا رہتا ہے۔



پلیٹہاوردھی، تلی کا بڑھ جانا، عظم الطحال، انلارجمنٹ آف دی سپلین


(Enlargement of the Spleen)

پلیٹہا سوجن، تلی کا ورم، ورم الطحال، اسپلینائٹس (Spleen it-is)

تعریف مرض :- ورم اور عظم دونوں میں تلی بڑھ جاتی ہے، ورم میں التهاب اور شدید درد بھی ہوتا ہے۔
وجوہات :- یہ مرض اکثر ملیریا کی بخاروں کے بعد ہوا کرتا ہے۔ بخار کی حالت میں زیادہ پانی پینے یا تلی کی بناوٹ میں کوئی خرابی پیدا ہونے یا
 داوی یا بلغمی رطوبت تلی میں جمع ہو جانے سے تلی بڑھ جاتی ہے۔

علامات :- صحت کی حالت میں تلی بائیں طرف کی پسلیوں کے نیچے ہاتھ لگانے سے محسوس نہیں ہوا کرتی، مگر مرض کی حالت میں بڑھ کر کبھی تمام پیٹ
 روک لیا کرتی ہے، مریض کا پیٹ کسی قدر بڑھ جاتا ہے، ہاضمہ خراب، آنکھوں میں گدلاہٹ، پاخانہ سفید یا ہی مائل آتا ہے، مریض لاغر و کمزور ہو
 جاتا ہے۔ ورم کے ساتھ اکثر بخار بھی آجاتا ہے۔

ایلوپیتھک علاج :- اگر مریض کی رہائشی جگہ ملیریا زدہ ہو تو
 تلی آب و ہوا بہت ضروری ہے، بیرونی طور پر تلی پر ٹنگ چڑھ کر آٹھ دن دن میں
 دو بار پھریری سے لگائیں، خوراک کی طور پر آئرن، آرسنک اور کونین
 استعمال مناسب مقدار میں بہت مفید ہے۔ انجکشن کی صورت میں
 آرن آرسنیٹ (Iron-Arsenate) ایک سی سی عضلاتی انجکشن
 یا نیم الفار اور فولاد کے انجکشن ہیں۔ جو ورم طحال جنرل کمزوری اور
 ملیریا کی بخاروں کے لئے مفید ہیں یا آئرن آرسنیٹ وڈسٹرکینا
 (Iron-Arsenate-Strych) (سنگھیا، فولاد اور کچلہ کے ٹیکے)
 اور ایک سی سی عضلاتی طور پر دیں، ورم طحال و کمزوری کے لئے مفید ہیں
 آرن کا کوڈائی لیٹ (Iron-Cocody late) (فولاد اور سنگھیا
 کے ٹیکے) ایک سی سی پھٹوں میں دیں۔ ورم طحال اور پرائے ملیریا بخار کے
 لئے مفید ہیں۔ ورم طحال کے لئے یہ نسخہ بھی مفید ہے :-



کونین سلفاس دو گرین، سلفیورک ایڈ ڈائیلوٹ ۵ اسم، فرائی سلفاس ہم گرین، میگنیشیا سلفاس ایک ڈرام، صاف پانی ایک اونس، ایسی ایک
 خوراک غذا کے نصف گھنٹہ بعد دیں۔ کمزور مریضوں کو اس کی دو خوراکیں بنا کر دیں۔

سپلین مکسچر :- کونین سلفاس ۵ ماشہ، سلفیورک ایڈ ڈائیلوٹ ۲ ماشہ، میگنیشیا سلفاس ۵ اونس، فرائی ایٹ ایونیا سائٹراس ۹ ماشہ،
 صاف پانی ایک پونڈ، سب کو باہم ملا لیں، مقدار خوراک ڈیڑھ سے دو تولہ، صبح و شام، خشک روٹی یا دلیہ وغیرہ کھا کر اوپر سے پی لیا
 یا پرائے ملیریا بخار، تپ، تلی کمزوری جگر، ہضم کی خرابی، سوجن وغیرہ کے لئے مفید ہے۔ یہ متواتر استعمال نہ کی جائے، بلکہ ہفتہ میں دو دن

ناغہ کر کے استعمال کی جائے۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ آئرن کونین مکسچر (Iron quinin mixture) ————— کونین سلف پانچ گرین، سلفیورک ایسڈ ڈل (تیزاب گندھک کا ہلکا گھول) پانچ منم، فیرس سلف (ہیرا کیس سبز) پانچ گرین، میگ سلف (سالٹ) ایک ڈرام، لائیکوار آرسینی کیلس (عرق شکھیا) تین بوند، ایکوا (پانی) ایک اونس۔

پہلے سلفیورک ایسڈ ڈل کو دو ڈرام پانی میں ملا کر اس میں کونین حل کر لیں، پھر اس میں لائیکوار آرسینی کیلس ملا لیں۔

میگ سلف کو الگ کھل میں ڈال کر حل کریں۔ پھر اس میں مذکورہ بالا حل شدہ کونین ملا کر بوتل میں ڈالیں۔

یہ ایک خوراک دوا ہے، (مکڑور مریضوں کو نصف مقدار میں دیں) اس کو تھری سلف مکسچر بھی کہتے ہیں۔ یہ پرنے طیر یا بخار کے سبب تلی بڑھ جانے کی نہایت مفید دوا ہے۔ اس لئے یہ سپلین مکسچر (تلی کا مکسچر) کے نام سے مشہور ہے اور قدیم و قہمتی نسخہ ہے۔

مقدار خوراک و طریق استعمال :- پہلے ہفتہ ایک ایک خوراک بعد از غذا (یعنی کھانا سہم ہونے کے بعد) دن میں تین بار دیں۔

طیر یا بخار کی باری ہو تو اس کی پانچ چھ خوراکیں سے ہی رک جاتی ہے اور لگاتار ایک ہفتہ پلانے سے طیر یا کی بیماری یا حملہ بالکل رک جاتا ہے، لیکن تلی باقی رہ جاتی ہے۔

چونکہ تلی کے جراثیم تلی میں رہ جاتے ہیں، اس لئے اگر تلی کو پورا آرام نہ ہو تو طیر یا کے جراثیم بڑھ کر پھر بخار کا حملہ ہونے لگتا ہے۔ اس لئے ایک ہفتہ دوا استعمال کر چکنے کے بعد تلی اور انیمیا کو دور کرنے کے لئے اس مکسچر کی ایک ایک

خوراک بعد از غذا دن میں دو بار ایک دو ہفتہ یا تین ہفتہ استعمال کریں، اگر اس کے دوران استعمال میں مریض کے کان بجھنے لگیں تو دوا

روز کے لئے ناغہ کر دیں، یعنی دو تین دن مکسچر نہ پلائیں، چونکہ کونین حاملہ کے لئے مضر ہے، اس لئے حاملہ کو یہ دوا نہ دیں۔

۲۔ کونین سلفیٹ پانچ گرین، فرانی سلفیٹ پانچ گرین، میگ سلف ایک ڈرام، ڈائیلوٹ سلفیورک ایسڈ پانچ منم، پانی ایک اونس تک۔

موسمی بخار (طیر یا)، ورم طحال اور کمزوری جگر کے لئے از حد مفید ہے۔

یونانی علاج :- مندرجہ ذیل مجربات بڑھی ہوئی تلی کو دور کرنے کے لئے بہت مفید ہیں :-

دوائے طحال :- مصبر شدہ چھ ماشہ، اجوائن تین ماشہ، نوشادر پھلی تین ماشہ، گودا گھیکوار تین تولہ، گولیاں بقدر خود بنائیں

ایک گولی صبح و شام ہمراہ تازہ پانی لیں۔

نوشادر گھول :- دو تین پتے گھیکوار بوٹی کے لیں، اور ان کے درمیان میں شکاف دے کر نوشادر پھلی بھر دیں اور دھاگے سے با

کر دھوپ میں لٹکا دیں نیچے ایک چینی کا پیالہ رکھ دیں، تاکہ نوشادر کا گھول پیالہ میں آجائے۔ اس گھول کے تین یا چار قطرے روزانہ بتات

میں ڈال کر پانی یا عرق سے نگل لیں، یہ نوشادر گھول بڑھی ہوئی تلی کو تھلیل کرنے میں آسان و بغیر خرچ کے آزمودہ علاج ہے، چند روز کے استعمال

بڑھی ہوئی تلی کو آرام آ جاتا ہے۔

حب طحال :- نوشادر پھلی، مصبر شدہ، قلمی شورہ، سوہاگہ ہر ایک ایک تولہ، سرکہ انگوری چار تولہ میں کھل کر کے گولیاں بقدر خود بنائیں

خوراک ایک گولی صبح و شام ہمراہ تازہ پانی استعمال کریں، تلی کے بڑھ جانے سے جتنے عوارض پیدا ہو گئے ہوں، ان گولیوں کے استعمال سے رفع ہو جاتے ہ

چٹنی برائے طحال :- سولی اڑھائی تولہ، ارند حلوبونہ (پیتیا) اڑھائی تولہ، ادراک سوا تولہ، انجیر زرد سوا تولہ، پودینہ خشک تین ماشہ، کلو

تین ماشہ، سوہاگہ بریاں تین ماشہ، نوشادر تین ماشہ، مرچ سیاہ تین ماشہ، نمک لاسوری تین ماشہ، سب کو سرکہ انگوری میں پیس کر چٹنی تیار کریں

کھانا کھانے کے بعد تین ماشہ استعمال کریں۔

دیگر :- اجوائن، گھیکوار کا گودا، اجوائن کو گھیکوار کے گودے میں تر کر سکھالیں، دو گرام دن میں دو بار تازہ پانی سے دیں۔

آیور ویدک علاج :- کماری آسولہ آسو بہترین ادویات ہیں۔ جن کے نسخجات پچھلے صفحات میں لکھے جا چکے ہیں، مندرجہ ذیل تجربات بھی طب آیور وید میں نئی بڑھ جانے کے لئے بہت مفید ہیں۔

پلیہاری آدی وٹی :- مصبر شدہ ہیرا کیس سبز، لہسن (چھلکا دور کیا ہوا)، کشتہ ابرک سیاہ برابر وزن۔
پہلے لہسن کو کھل کر کے باریک کریں۔ پھر باقی ادویہ ملا کر گوبائی کے پانی میں تین پہر تک کھل کر کے دودھ رقی کی گولیاں بنائیں، خوراک ایک سے دو گولی صبح و شام گرم دودھ کے ساتھ دیں۔ بڑھی ہوئی تلی، بڑھے ہوئے جگر، سوجن، بدھنسی، خون کی کمی کے لئے مفید ہے، خصوصاً تلی کو درست کرنے کے لئے لاجبہ دایک ہے۔

دوائے تلی :- ہلدی پانچ تولہ، سیندھ مانک پانچ تولہ، رس گودا گھیکوار ایک پاؤ، تینوں چیزوں کو چوڑے منہ کی بوتل میں بھر کر ایک ہفتہ تک دھوپ میں رکھیں، بعد ازاں بوتل کے اوپر والا پانی نٹھار لیں، روزانہ کھانا کھانے کے بعد چھ ماشہ لیا کریں، بڑھی ہوئی تلی تحلیل ہو جائے گی۔

وڑنگ آدی چورن :- وڑنگ ایک تولہ، چھلکا جڑ چرچہ ایک تولہ، برادہ دیو دار دو تولہ، سب کو خوب باریک پیس کر تین ماشہ سے پانچ ماشہ تک ہمراہ گرم پانی کھلائیں، اس سے تلی کو آرام آجاتا ہے۔

علاوہ ازیں بجر کھشار، ابھیالون، گڑ پسی، برہت لوکنا تھرس، پیٹھاوی کوامہ، لون تریاری چورن، یوانی آدی چورن، ابھیادنگ گنی مکھچورن، وغیرہ تلی بڑھنے کے لئے مفید ہیں۔

پلیہاروگ کے لئے آسان آیور ویدک نسخے

۱۔ جڑ سرچھو کہ چھ ماشہ خوب باریک پیس کر گائے کی لسی (چھا چھ) کے ہمراہ کھلانے سے بڑھی ہوئی تلی کو آرام آجاتا ہے۔

۲۔ پکے ہوئے میٹھے آموں کا رس پانچ تولہ، شہد ایک تولہ ملا کر روزانہ کھلانے سے چند روز میں مرض دور ہو جاتا ہے۔

۳۔ ہلدی دو تولہ، منک سیندھ دو تولہ، رس گھیکوار ایک سیر، سب کو ملا کر ایک بڑی بوتل میں بھر کر ایک ہفتہ تک دھوپ میں رکھیں، پھر نٹھار کر چھ ماشہ روزانہ کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا بڑھی ہوئی تلی کو آرام دیتا ہے۔

۴۔ چھلکا ہڑ زرد اور منک سیاہ برابر وزن ہے کر سفوف بنائیں، خوراک تین ماشہ ہمراہ گرم پانی دیں، اس سے تلی کو آرام آجاتا ہے۔

۵۔ نفل دراز، عرق سولف میں گھس کر بچوں کو پلانے سے بچوں کی تلی ٹھیک ہو جاتی ہے۔

ہومیو پیتھک علاج :- اگاری کس مکاریس، مرکوریس، آرٹک ایلپ، چائنا بہترین ادویات ہیں۔

بالوکیٹک علاج :- اس علاج میں فرم فاس، کالی میور اور میٹرم سلف مفید ادویات ہیں۔

قدرتی علاج میں مولی کا استعمال :- صرف تلی کے لئے مفید ہے، بلکہ جگر اور گردے دشمن کے لئے بھی مفید ہے۔ اچار مولی اور اچار آم بھی مفید ہے۔

پھلوں سے علاج :- ۱۔ پیٹھ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر منک چھڑک کر استعمال کریں یا کچا پیٹھ ٹکڑے کر کے سرکہ انگوری میں ڈال کر

رکھیں، قدے منک لگا کر چھ گرم صبح کھائیں یا کچا پیٹھ بھی منک چھڑک کر لے سکتے ہیں۔

۲۔ مولی چھیل لیں اور ۲۵ گرام لیں، نوشادر پھلی ۲ گرام، مولی ٹکڑے کر کے اوپر نوشادر چھڑک دیں اور رات بھر شبنم میں رکھیں، صبح استعمال کریں۔

نوٹ :- یہ مرض دبیرے دبیرے دور ہوتا ہے، اس لئے اس کا علاج دو سے چار ہفتہ اور بعض دفعہ اس سے بھی

زیادہ عرصہ تک جاری رکھنا پڑتا ہے۔

غذا پر مبنی، بھوک سے کم کھائیں، گندم کی روٹی، شوربہ، موی کی سبزی اور اچار مفید ہے۔ چکنی، میٹھی چیزوں خصوصاً مکھن، دال چنے، دال ماش سے پرہیز ضروری ہے۔

پلیہاشول، تلی کا درد، وجع الطحال، پلی نیلجیا، (Splenalgia)

تعریف مرض :- تلی کے مقام پر درد ہوتا ہے۔
وجوہات :- ریاح کی کثرت اور کبھی سردی یا گرمی یا تلی کے بڑھ جانے اور پیٹ میں گیس سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔
علامات :- تلی کے مقام پر درد ہوتا ہے اور پیٹ میں گیس معلوم ہوتی ہے، مریض کو بے چینی ہوتی ہے اور کسی کام میں دل نہیں لگتا۔
علاج :- اگر سردی کی وجہ سے یہ عارضہ ہو تو مقام مرض پر سنیک کریں۔ اگر گرمی کے باعث یہ عارضہ ہو تو قرص طباشیر چھ ماشہ، سکنجبین سادہ تین تولہ، عرق مکو پانچ تولہ کے ساتھ دیں، اگر کثرت ریاح کی وجہ سے ہے تو پیٹ میں گیس کو ہٹانے والی ادویات دیں۔
ڈاکٹری علاج میں سوڈا سلی سلاس پانچ گرین، سوڈا بائیکارب پندرہ گرین، اسپرٹ ایمنیا ایرومیشک ۲۰ بوند، ایکوا اینی سائی ایک اونس۔ ایسی خوراک ہر تین گھنٹہ بعد دیں۔

تلی میں پیپ ٹر جانا، سپوریشن آف دی سپلین (Suppuration of the Spleen)

طحال کے ورم میں کبھی غلط علاج وغیرہ کے باعث پیپ ٹر جاتی ہے۔ تلی کے مقام پر شدید درد ہوتا ہے، سویاں سی جھپکتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، بعض دفعہ پیشاب کرتے وقت ساتھ ہی پیپ خارج ہوتی ہے یا منہ کے راستے تے کے ذریعہ تے خارج ہوتی ہے۔
علاج :- پیپ خارج کرنے کے لئے پیشاب لانے والی ادویات استعمال کریں، بیج مغز کھیرا چھ ماشہ، شیرہ بیج کاسنی چھ ماشہ، شیرہ مغز خربوزہ، ماء العسل چھ تولہ، علیحدہ علیحدہ یا اکٹھے استعمال کریں اور زخم بھرنے کے لئے دم الاخوان شہد کے ساتھ چٹائیں۔
ڈاکٹری علاج میں سلفا ڈرگز مثلاً سلفا ڈایازین یا سلفا متیازول یا سلفا میزاتھین یا سلفا ٹرائیڈ کا استعمال مفید ہے، جو کہ چار سے چھ گولی دن میں ایک ایک کر کے ہمراہ سوڈا بائی کارب دس گرین دی جائے، انٹی بائیٹک ادویات میں پینی سلین پانچ سے دس لاکھ یا پردکین پینی سلین پردکین کا مرکب بمعہ سٹریپٹومائی سین کا عضلاتی انجکشن مفید ہے۔ علاوہ ازیں جدید ادویات میں آریو مائی سین یا ٹیرامائی سین یا اکرو مائی سین ایک کیپ شول دن میں دو سے تین بار دینا مفید ہے، بچوں کے لئے ان ادویات کے میٹھے مرکبات دن میں دو سے تین بار استعمال کئے جائیں، اگر ان تدابیر و علاج سے فائدہ نہ ہو تو پھر ایک قابل سرجن کو بذریعہ آپریشن یا ایک مخصوص آلہ سے پیپ خارج کر دینی چاہیے۔

پتہ کی پتھری، گال بلیڈر اسٹون، (Gall Blader Stone)

مرارہ کی جگہ بہت سخت درد ہوتا ہے، متلی اور تے ہوتی ہے، درد کی لہریں، داہنے کندھے سے پشت تک جاتی ہیں، علاج بطرز کردہ کی پتھری کے کریں، کشتہ سنگ یہود کا استعمال مفید ہے۔ سخت درد کے وقت ایک مستند ڈاکٹر کو مارفین و ڈاڑھین کا انجکشن کرنا چاہیے۔

اگر ادویات سے فائدہ نہ ہو تو اس کا آپریشن ہی موثر علاج ہے۔

تلی میں خون جمع ہونا، کنجسٹن آف دی سپلین (Congestion of the spleen)

تعریف مرض :- اس مرض میں تلی میں خون جمع ہو جاتا ہے۔

وجوہات :- پورٹل دین (Portal vein) پر کسی قسم کے دباؤ پڑنے یا لیریا کی سمیت، چوٹ لگنا، عورتوں میں حیض کی بندش، تیز بخاروں، شریان میں خون کے اجتماع سے تلی میں خون بھر جاتا ہے، جسم کی رنگت سیاہی مائل ہو جاتی ہے، معمولی چوٹ وغیرہ سے زبردست خون بہنے کا خطرہ ہوتا ہے یا خون کے تلی میں جمع ہو جانے سے تلی میں خون کا لوٹنا بند ہو جاتا ہے۔ جو کہ مٹر کے دانے سے لے کر مرغی کے اندے کے برابر ہو سکتا ہے، کبھی یہ گل کر رہا ہو جاتا ہے اور کبھی پھوڑے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اس مرض کا علاج جگر میں خون جمع ہو جانے کے مطابق کریں، جس کا ذکر گذشتہ باب کیا جا چکا ہے۔

تلی کی ریاح، خون سفید ہو جانا، لیوکیمیا (Leukeamia)

تعریف مرض :- اس مرض میں خون میں سفید ذرات کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔

وجوہات :- لیریا، زچگی کے بعد کی کمزوری، چوٹ لگنے، کبھی یہ مرض موروثی ہوتا ہے۔

علامات :- اس مرض میں خون میں سفید ذرات کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اگر یہ مرض کافی پرانا ہو جائے تو خون سفید رنگت اختیار کر لیتا ہے، تلی بڑھ جاتی اور بعض دفعہ ۱۵ سے ۲۰ پونڈ تک وزنی ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ تلی معدہ کے ساتھ لگ جاتی ہے، جسم کی ہڈیاں نرم اور کمزور ہو جاتی ہیں، مریض کو تنگی، دل کی دھڑکن اور دم گھٹنا ہوا محسوس ہوتا ہے، جسم کے کئی حصوں سے جریان خون کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، مثلاً خونی دست، خونی فے اور بخوک سے آنی شروع ہو جاتی ہے، پیٹ میں گیس ہوتی ہے، بعض دفعہ ہلکا بخار بھی ہو جاتا ہے۔

علاج :- یہ بیماری عام طور پر خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ اور مریض کا سال ڈیڑھ سال میں خاتمہ کر دیتی ہے۔ اس مرض کا شافی علاج سنکھیا ہے۔ سلسلہ میں لائیکوار آرسینی کیس ۲ سے ۴ بوند یا بصورت سٹوورسول (Stovarsol) دیا جاسکتا ہے، استعمال کے ہر سات دن کے بعد دوا دودن بھی جائے، بصورت انجکشن آرن آرسینیٹ (Iron-Arsenate) یعنی فولاد و سنکھیا کے انجکشن ایک سی سی عضلاتی طور پر دیں یا آرن ڈائی لیٹ (Iron-Cacodylate) کا استعمال کریں۔

یونانی و آیور ویدک طریقہ علاج میں کشتہ سم الفار کا استعمال مفید ہے، ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں بھی آرنک کا استعمال مفید ہے۔

ماڈرن آیور ویدک علاج :- عام ویدوں، حکیموں اور ڈاکٹروں کو اس مرض کا شافی علاج معلوم ہوتا تو درکنار رہا، اس مرض کی جانکاری بھی ہے۔ اس نے اس مرض کے متعلق پہلی بار تاج الحکمت (پریکٹس آف میڈیسن) کے پہلے ایڈیشن میں بالتفصیل روشنی ڈالی گئی تھی۔

ایلوپیتھک میں اس کا موثر علاج سنکھیا کے مرکبات سے کیا جاتا ہے، لیکن اب آیور ویدک یونیورسٹی جام نگر نے کافی ریسرچ کے بعد اس مرض کا علاج "ہدی" کو قرار دیا ہے۔ چنانچہ ہدی کا سفوف چار ماشہ کی مقدار میں دن میں تین بار سہرا پانی پینے سے دوا دھائی ماہ تک مریض کو آرام آجاتا، اس سے کم مقدار میں ہدی کا استعمال کوئی فائدہ نہیں کرتا۔

یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق پہلے ہفتہ میں خون کے سفید دانوں کی تعداد چھ یا سات فی صدی کم ہو جاتی ہے اور مریض کو آرام محسوس ہوتا ہے، لیکن دوسرے ہفتہ میں یہ تعداد پھر بڑھ جاتی ہے اور مریض کو پہلے سے بھی بے چینی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس سے گھبراتا نہیں چاہیے، یہ بڑھوتری عارضی ہوتی ہے۔ تیسرے ہفتہ میں خون کے سفید دانوں کی تعداد پھر گھٹ کر علامات مرض میں کمی ہونے لگتی ہے، پھر آہستہ آہستہ آرام آ جاتا ہے۔

جلوور، استقار، چلندھر، ڈراپسی، (Dropsy)

تعریف مرض ۱۔ اس مرض میں جسم کے کسی حصہ میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔

وجوہات ۱۔ دوران خون کی رکاوٹ کی وجہ سے قوت جاذبہ کم ہونے کے باعث آب خون تراوش پا کر جلد کے نیچے کسی اندرونی اعضا جمع ہو جاتا ہے، دل، جگر اور گردہ کی خرابی سے یہ عارضہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ پانی تمام جسم میں جلد کے نیچے جمع ہوتا ہے اور پیٹ شک کی طرح پھولا ہے۔ اس مرض کی کئی اقسام ہیں :-

۱۔ استقار عامہ ۲۔ استقار زرقی یا بطنی ۳۔ استقار دماغی، ۴۔ استقار حجاب القلب، ۵۔ استقار صدری، ۶۔ استقار حنفی

(ایڈرویل) وغیرہ۔

علامات ۱۔ مریض کا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے اور مریض پیٹ کے بل لیٹے تو دونوں طرف بیماری پھیلنے لگتی ہے، ناف باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، جوار مرض کی خاص علامت ہے، مریض کو ایک طرف لٹا کر عضو ماؤف پر ہتھیلی لگانے اور دوسری طرف ایک یا دو انگلیوں کے ذریعہ حرکت دینے سے ہتھیلی کو کی لہریں محسوس ہوں گی اور استقار زرقی اور حمل میں شناخت کے لئے یاد رکھیں کہ استقار کا پانی عورت کے سینے کی صورت میں دونوں کو لہوں میں جمع ہو جاتا ہے۔

اگر استقار پھیپھڑوں کی خرابی کی وجہ سے ہو تو پہلے پاؤں پر دم آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پیٹ اور تمام جسم پھیلتا ہے۔ اگر یہ عارضہ جگر کی خرابی سے ہو تو دم پہلے پیٹ پر اور پھر باقی تمام جسم پھیلتا ہے، اگر مرض کا سبب گردوں کا نقص ہو تو دم سب سے پہلے آنکھوں پر نظر آتا ہے، آنکھ کے پوٹے متورم ہو جاتے ہیں اور پھر تمام جسم متورم ہو جاتا ہے۔ اگر اس مرض کا سبب انیمیا ہو تو دم خفیف ہوتا ہے اور آرام کے بعد کمی خون کا عارضہ دور ہو جاتا ہے، گردوں کی خرابی سے یہ عارضہ ہو تو چلنے پھرنے سے کم ہو جاتا ہے اور آرام کی حالت میں زیادہ ہوتا ہے۔

علاج ڈاکٹری ۱۔ اصل سبب مرض کو دور کریں، جب یہ مرض دل کی خرابی سے ہو تو مریض کو آرام سے لٹائے رکھیں، پانی کم پلائیں، غذا میں نہ دیں، شروع مرض میں پاؤں پر پٹی باندھنا بہت مفید ثابت ہوتا ہے، عام صحت کی طرف توجہ دیں، اگر دونوں دلوں کی خرابی سے عارضہ کی صورت میں تنگی جلاب مفید رہتے ہیں، اگر سیال سے سانس کی تنگی کا عارضہ ہو تو اسے ٹوب یا سرنج سے ایک مستند ڈاکٹر کو نکال دینا چاہیے اور یہ اخراج کئی بار جاسکتا ہے، بعض دفعہ کمزور پرانے مریضوں میں سیال نکلنے کی صورت میں خون کا اخراج بھی شروع ہو جاتا ہے، جو کہ ایک خطرناک صورت ہے، ایسی میں پیٹ پر الاسٹک پٹی باندھ دینی چاہیے، جو کہ سیال کے نکلنے سے تنگ ہوتی جلے گی، اگر ایسی پٹی نہ ملے تو سادہ پٹی باندھ دیں اور سیال نکلنے کے ساتھ ساتھ اسے بھی تنگ کرتے جائیں۔

مدد پر طریقہ علاج میں سیلرگان (Solyn gan) اور مرسلایل (Mersalyl) یہ پیشاب آور ٹیکہ جسم کے کسی حصہ میں پانی پڑ جانے

لئے مفید ہیں۔ اور ساتھ ہی ایونیا کلورائیڈ ۱۰ سے ۵۰ گرام کی خوراک میں دیا جاسکتا ہے، ہمارے تجربات کے مطابق مرسلایل (Mersalyl) آ

سی سی کا عضلاتی انجکشن کر کے مریض کی قوت کا امتحان کریں، دوسرے دن اس کا رد عمل دیکھ کر مرسلایل ایک سی سی کا عضلاتی انجکشن کریں، آ

دورانِ علاج میں ایونیم کلورائیڈ جاری رکھیں، اس سے پیشاب کھل کر آتا ہے اور تڑاوش یا فتنہ رطوبت کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ یہ دوا انجکشن کے لئے تیار شدہ امپولز میں مارکیٹ میں ملتی ہے۔

اس سلسلہ میں نپٹال (Neptal) کا ایک سی سی کا عضلاتی انجکشن بھی ہفتہ میں دو بار استعمال کرنا مفید ہے۔ اس ٹیکہ کے لگانے سے دو گھنٹہ پہلے ۲۰ گرین ایونیم کلورائیڈ ہمراہ پانی کھلائیں، بعد میں بقدر ایک سی سی عضلاتی ٹیکہ لگائیں، لیکن جس شخص کے گردے کمزور ہوں۔ ان کو نہ لگائیں اور مقدار بھی ایک سی سی سے زیادہ نہ دی جائے۔

کمزوری دل کی صورت میں سپرٹ ایونیم ایرومینک کا استعمال کیا جائے، اس ٹیکہ کے استعمال سے تھوڑی دیر بعد پیشاب آنا شروع ہو جائے گا۔ جب پانی جسم میں خون سے علیحدہ ہو کر جسم کے کسی حصہ میں جمع ہونے لگتا ہے، تو یہ ٹیکہ اس کو بذریعہ پیشاب خارج کر دیتا ہے، جسم سے پانی خارج کرنے کے لئے جملہ ڈاکٹروں کا معمول ہے۔ لیکن کمزور مریضوں میں اسے با احتیاط استعمال کیا جائے۔

جدید تجربات کے مطابق اب ڈراپسی (Dro psy) کے لئے نوا ایجاد سلفا ڈرگز ڈایا ماکس (Diamox) وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں، جو کہ بے ضرر پیشاب آور ہیں۔ جب یہ مرض انیمیا کی وجہ سے ہو تو جو علاج انیمیا میں لکھا گیا ہے وہی کریں۔ اگر گردوں کی خرابی کی وجہ سے ہو تو علاج ورم گردہ کے مطابق کریں۔ جنرل کمزوری کے لئے وٹامن اے، بی، سی اور وٹامن بی کمپلیکس کا استعمال کرائیں۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ نیفرل (Nephrol) فزیر ————— یہ ایک پیشاب لانے والی دوا ہے، ایک ہی خوراک کا اثر ۲۴ سے ۴۸ گھنٹے تک رہتا ہے۔ ایک دو ٹیکہ ہر روز کبھی آدھی ٹیکہ سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔

۲۔ ڈائی ایڈی مل (Di-Ademil) سارا بھائی ————— یہ ایک پیشاب لانے والی دوائی ہے اور مختلف وجوہات سے پیدا شدہ شدہ سوجن کم کرنے کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، ایک سے دو ٹیکہ تازہ پانی سے استعمال کرائیں۔

۳۔ ڈایا ماکس (Diamox) لیڈرے ————— یہ بھی پیشاب لانے والی ہے۔ ایک ٹیکہ تازہ پانی سے دیں۔ اسے زیادہ مقدار میں نہ دیں، ورنہ جسم میں پوٹاشیم کی کمی ہو جائے گی۔

۴۔ ایسی ڈریکس (Esidrex) ربا ————— یا نیوی ڈریکس (Navi-Drex) ربا ————— ایک سے دو ٹیکہ مرض کے مطابق تازہ پانی سے دیں۔

۵۔ ڈائی کلورائیڈ (Dichlotride) ایم، ایس، ڈی ————— یا ڈائی گروتون (Hygro-tone) گیگی ————— ایک دو ٹیکہ تازہ پانی سے دیں۔

۶۔ مرسل (Mersalyl) بولس ————— یا نپٹال (Neptal) اے اینڈ بیکر ————— یا لاسکس (Lasix) ہیکٹ ————— کا ایک امپول عضلاتی انجکشن دیں۔

۷۔ لاسکس (ہیکٹ) ایک ٹیکہ، وٹامین ٹی (روشن) ایک ٹیکہ، دونوں کو یکے بعد دیگرے پانی کے ساتھ دن میں دو بار دیں۔ یہ زبردست مدر بول اور حیاتین سے مرکب ہے جو استسقا اور جگر و گردہ کے عوارضات کے لئے مفید ہے۔ یہ دوا پیشاب لا کر ورم کو ہلکا کر دیتی ہے، گردہ سے پیشاب خارج کرتی ہے۔

۸۔ مرے ہل اور تھیوفیلین (Mersalyl & Theophyllin) یہ پارہ کا مرکب ہے جو عضلاتی انجکشن کی صورت میں ایک سے دو سی سی تک استعمال کرایا جاتا ہے۔ یہ مرکب انجکشن بطور مدر بول استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پیشاب کو بڑھا کر سوجن کو کم کر دیتا ہے۔ یہ زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے نوسوڈیم سینڈروم پیدا کر دیتا ہے، اس لئے یہ شدید سوجن گردہ میں ٹھہرے۔ اس کا انٹراسکولر انجکشن کافی

گہرا لگایا جاتا ہے۔

یونانی علاج :- جب یہ عارضہ جگر کی خرابی سے ہو تو ایسی صورت میں جلاب دینے کا فائدہ ہوتا ہے، تازہ کرلیہ کا پانی سات تولہ، شہد دو تولہ ملا کر روزانہ پلائیں، اس سے دو تین دست ہو کر مادہ مرض کا اخراج ہوتا ہے۔ کمزوری کے لئے دوا المسک معتدل جو اس دوا کی چھ ماشہ کھلائیں۔ مندرجہ ذیل مجربات مرض استسقار کے لئے خاص طور پر مفید ہیں :-

شربت دینار :- بیج کاسنی، پھول گلاب ہر ایک چھ تولہ، چھلکا جڑ کاسنی نو تولہ، گل نیلوفر، گاؤ زبان ہر ایک تین تولہ، کوٹ کر آدھ سیر پانی میں جوش دیں اور اس میں آٹھ تولہ بیج کثوث پوٹی میں بندھا ہوا لٹکا رکھیں، بعد چھان کر چینی سفید ایک سیر شامل کر کے شربت تیار کریں، شربت تیار ہونے پر آگ سے نیچے اتار کر اس میں ریوند چینی ۳۲ تولہ سفوف بنا کر شامل کریں، خوراک تین سے چار تولہ ہمراہ پانی استعمال کریں۔ استسقار اور سور القینہ کے لئے نافع ہے، پیشاب کھول کر لاتا ہے، جگر کے سدوں کو کھولتا ہے، قبض دور کرتا ہے، بچہ دانی کے امراض کو مفید ہے۔

کھار چرچہ :- چرچہ (سپکنڈہ) کے سالم پودہ کو سایہ میں خشک کر کے مٹی کے بڑے برتن میں ڈال کر جلابیں اور بہ ترکیب معروف کھار بنالیں، خوراک آدھے سے ایک ماشہ، استسقار کے لئے مفید ہے۔

چرچہ (سپکنڈہ) کا مفصل حال کتاب ہندوستان کی جڑی بوٹیاں مصنف حکیم وڈاکٹر ہری چند لٹانی میں بلا خط فرمائیں، قیمت جلد اول اٹھارہ روپے، جلد دوم اٹھارہ روپے، جلد سوم اٹھارہ روپے، محصول ڈاک علاوہ ہے۔ اور منیجر نرالا جوگی پبلیکیشنز پانی پت (ہریانہ) انڈیا سے دی پی سے منگائی جاسکتی ہے۔

دوائے استسقار :- عصارہ ریوند شدھ ایک ماشہ، تلمی شورہ تین ماشہ، دونوں کو کھل کر کریں، یہ ایک خوراک ہے، ہمراہ عرق سولف استعمال کریں، صرف ایک خوراک روزانہ ایک ہفتہ دیں، پاخانہ کے ذریعہ پانی خارج ہوگا، کمزور مریضوں کو نصف خوراک دیں۔

دیگر :- استسقار کی جلد انتہام کے لئے اونٹنی کا دودھ سات تولہ، گل قند چار تولہ ملا کر پلائیں، تین روز کے بعد ایک ایک تولہ دودھ کی مقدار بڑھاتے جائیں، حتیٰ کہ ۵ تولہ ہو جائے، پھر ایک ایک تولہ کم کرتے جائیں کہ پہلی مقدار پر آجائے، اس سے پاخانہ کے ذریعہ پانی خارج ہوگا۔

دوائے استسقار :- یہ دوائی اس استسقار میں مفید ہے، جس کو دبانے سے گڑھا پڑ جاتا ہو، اس کے علاوہ دوسری انتہام میں مفید نہیں ہے نسخہ مندرجہ ذیل ہے :-

سفوف سنار کی ایک تولہ، لونگ ایک تولہ، شہد خالص ایک تولہ، پہلی ہر دوا دو یہ کو باریک پیس لیں اور شہد ملا لیں، بس تیار ہے، یہ تین خوراک ہیں۔ ترکیب استعمال :- مریض کو دو گھنٹہ شام سے پہلے دوا کھلائیں۔ پھر شام کے وقت دوا کا تیسرا حصہ کھلا دیں، دوا کھلانے کے بعد پانی، غذا اور کوئی چیز نہ دیں، حتیٰ کہ صبح ہو جائے، مریض کو رات ہی اسہال شروع ہوں گے، جو چار یا پانچ سے بیس تک بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کو بند نہ کریں اور نہ ہی گھبرائیں مریض کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ ہی پیاس لگے گی، صبح تک آدھا دم دور ہو گیا ہوگا۔ صبح کو سوکھی روٹی اور کباب کھانے کو دیں اور چینی کو گرم پانی، پھر شام سے پہلے ہی غذا کھلا کر شام کو دوسرا حصہ دوائی کا کھلا دیں، اس رات دست بہت کم آویں گے، مریض صبح کو تندرست ہوگا۔ جسم سے دم وغیرہ خارج ہو چکا ہوگا۔ صبح سوکھی روٹی اور کباب کھانے کو دیں۔ اگر ضرورت سمجھیں تو تیسری خوراک دے دیں، درنہ دو خوراک ہی کافی ہیں، پانی کا زیادہ استعمال اور تر چیزوں سے پرہیز کریں، تین دن کے بعد کشتہ فلاد ایک رتی سے دورتی دن میں دوبارہ ایک ہفتہ تک دیں۔ تالہ دوبارہ مرض لوٹنے کا خطرہ نہ ہو۔ جو مریض گوشت نہ کھائیں وہ دال اور لہسن

جڑی بوٹیوں سے علاج

۱۔ اندرائن کے پھل کو گودے سے خالی کر کے اس کے چھلکے کی پیالی میں بکری کا دودھ بھر دیں۔ یہ دودھ تمام رات رکھا ہے، صبح دودھ میں چینی ملا کر پلائیں

استقار و سور القنیہ کے لئے مفید ہے۔

۲۔ دھماسہ، گورکھ پان ہر ایک ۲۰ تولہ کو دوسیر پانی میں جوش دے کر صاف کر لیں اور تین پاؤں مصری ملا کر توام تیار کریں۔ خوراک دو تولہ صبح و شام ہمراہ عرق مکوویں، استقار و یرقان کے لئے مفید ہے۔

۳۔ لکڑندہ بوٹی کا سرت آدھے سے ایک ماشہ دیں، استقار و یرقان کے لئے مفید ہے۔

۴۔ اٹ سٹ (پنزنواہ) کے دو تولہ پتوں کی چائے بنا کر دن میں دوبار استعمال کریں۔ لاجبہ دایک ہے۔

آیور ویدک علاج :- بسکپھرا (پنزنواہ) بوٹی کا سیال رُب (اکھیرکیٹ پنزنواہ لکڑ) ایک ڈرام، خالی معدہ دن میں دوبار پلانا مفید ہے یا سبز پتوں کا رس دن میں دوبار دیں یا اس کی جڑ کا سفوف بنا کر دن میں تین بار استعمال کریں یا پنزنواہ آدی آرٹھ یا پنزنواہ کھار کا استعمال کریں۔
پنزنواہ آدی کو اٹھ (جوشاندہ) :- بسکپھرا (پنزنواہ) سفید پھل والی، مٹھی چھلی ہوئی، دار بلدی، نیر بالا ہر ایک تین ماشہ، کو اٹھ (جوشاندہ) بنا کر صبح و شام پلائیں اس سلسلہ میں مندرجہ مصمم کا استعمال بھی مفید ہے۔

دیگر :- دشمل کی دسوں اشیار، برادہ دیو دار، سونٹھ، گلو، بسکپھرا، چھلکا ہڑ کا بی، جملہ چار تولہ حسب معمول جو شاندہ بنا کر چند روز مرہض کو پلانے سے جلودر اور دیگر اقسام کے اودر روگ دور ہو جاتے ہیں۔

نارائن چورن :- اجوائن، باؤبیر، دھنیا، تر پیلہ، زیرہ سیاہ، سولف، بن تلسی، کچور، بیج سویہ، ورچ، زیرہ سفید، مرچ سیاہ، سونٹھ، پیل، چوک، چترہ، جو کھار، سبھی کھار، پوکھر مول، کٹھ، پانچوں نمک، واوڑنگ ہر ایک ایک تولہ، اندرائن دو تولہ، تربہ سفید، جڑ جال گوٹھ، ساٹلا چار تولہ۔

سب کو باریک پیس کر چھان لیں، خوراک تین سے چار ماشہ تک، جلودر اور اودر روگوں کے علاوہ جملہ امراض شکم کے لئے از حد مفید ہے، علاوہ ازیں جلودراری رس چھ رتی سے ایک ماشہ تک ہمراہ گرم پانی یا اودر وی رس آدھی سے ایک رتی ہمراہ گرم پانی کھلائیں، جلودر کے لئے مفید ہے۔

ہومیوپیتھک علاج :- مرض کی بڑھی ہوئی حالت میں آرسنک ایلب دیں، اگر کمزوری دل کا عارضہ ساتھ ہو تو ڈیجیٹلس کا استعمال مفید ہے۔
بایوکیک علاج :- شروع مرض میں کالی میو، زیادہ کمزوری کی صورت میں کلکیریا فاس، بیماری کی بڑھی ہوئی حالت میں نیٹرم سلف اور کلکیریا نلور پرانی حالت میں مفید ہے۔

قدرتی علاج :- اونٹنی کا دودھ اس مرض کا نہایت مفید علاج ہے۔ اسے آدھ پاؤں سے شروع کر کے حسب برداشت آدھ سیر سے تین پاؤں تک دے سکتے ہیں۔


غذا و پرہیز :- زود ہضم اور مغوی غذائیں دیں، ثقیل اغذیہ سے سخت پرہیز کرائیں اور دوسرے دودھ کی جگہ اونٹنی کا دودھ پلائیں۔

دنیا طیب کی ایک نادر روزگار کتاب

لغات الادویہ

مرتبہ : حکیم کبیر الدین

کئی ہزار جڑی بوٹیوں اور مفرد ادویات کے نام اور شناخت سے متعلق مکمل تفصیل پر مبنی انسائیکلو پیڈیا۔ اردو زبان میں اپنے موضوع پر واحد مکمل، مفصل اور عظیم علمی اور تحقیقی کتاب، جس میں ہر جڑی بوٹی اور دواؤں کے نام اردو، عربی، فارسی، کشمیری، پنجابی، سندھی، ہندی، سنسکرت، بنگالی، لاطینی اور انگریزی سمیت پچیس زبانوں میں دیئے گئے ہیں کسی زبان کا ایک بھی نام معلوم ہو تو فوراً اس کے تمام زبانوں کے نام اور دوا کی ماہیت کا پتہ چل جاتا ہے اہل علم و فن، اطباء، وید، ڈاکٹر، دوا فروش اور عام حضرات کے لئے ایک نادر و نایاب تحفہ۔



عربی

اردو

فارسی

English

Grafix: SOHAIB HA KHAN

eBook

بارصواں باب

گڑدہ و مشانہ کی بیماریاں

گڑدہ کا ورم، ورم الکلیہ، نفرائٹس، (Nephritis)

تعریف مرض :- ورم گڑدہ کی دو قسمیں ہیں، ۱۔ شدید ورم گڑدہ، ۲۔ پرانا ورم گڑدہ، اس مرض میں پیشاب کے ساتھ البیومن خارج

ہوتا ہے۔ وجوہات :- چوٹ یا سردی لگنے یا ملیریا، آتشک، سل، اگزیم اور شراب نوشی سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔ گردے کی پتھری، میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال، جگر کی خرابی، سخت سردی، تیلنی مکھی، کاربالک الیڈ وغیرہ کے کھا جانے سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔ عورتوں میں بعض اوقات حمل کے دنوں میں بچہ دانی پر دباؤ پڑنے سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔

علامات :- گردے کے مقام پر درد ہوتا ہے، پیشاب بار بار آتا ہے اور اس سے نوشادر کی طرح بو آتی ہے، جب یہ مرض پُرانا ہو جاتا ہے تو پیشاب کے ساتھ پیپ آنی شروع ہو جاتی ہے، کبھی پیشاب بالکل بند ہو جاتا ہے، جب یہ مرض سردی سے ہو تو تمام جسم پر سوجن ہو جاتی ہے اور خاص علامات مرض یہ ہیں کہ عام استسقا ہو کر تمام جسم پھول جاتا ہے، خاص طور پر چہرہ اور ہپوٹوں کی جلد پھول کر چہرہ چھپ جاتا ہے، آنکھیں چھپ جاتی ہیں اور چہرے کا رنگ پھیکا ہو جاتا ہے، ابتداء میں پیشاب کے ساتھ البیومن خارج ہوتا ہے جو پکانے سے جم جاتا ہے عام طور پر یہ مرض خفیہ طور پر بڑھتا ہے، شروع مرض میں مریض تندرست معلوم ہوتا ہے، صرف سانس جلد جلد لیتا ہے یا جلد بھکی اور کھردری ہو جاتی ہے، بدھنی اور جنرل صحت کمزور ہو جاتی ہے، جسم کے مختلف اعضاء میں درد ہوتا ہے، کبھی کھانسی اور کھینچ ہو جاتی ہے یا غلیظ آتی ہے

مریض کو شراب پینے کی عادت ہو تو پہلے خرابی جگر کی علامات پیدا ہوتی ہیں، جیسا کہ پہلے لکھ آئے ہیں، کہ مریض کو شروع میں پیشاب زیادہ اور اس میں لیمون کی مقدار کم آتی ہے، لیکن مرض بڑھنے کی حالت میں پیشاب کم اور البیوس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، بلکہ گردہ کی ساخت کے ذرات بھی خارج ہونے لگتے ہیں، نظر میں فرق آ جاتا ہے۔ اعصابی کمزوری کی علامات ہو جاتی ہیں، کبھی پیشاب بند ہو جانے سے مریض سمیت بول سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ مرض کی پُرانی صورت میں سردی کے ساتھ بخار ہوتا ہے۔ گردہ کے مقام پر بھاری پن معلوم ہوتا ہے۔

علاج ڈاکٹری:۔ مریض کو آرام سے بستر پر لٹائے رکھیں۔ ابتداء میں گردوں کو صاف اور ہلکا رکھنے کے لئے پوٹاسیم سائٹریٹ، ۳ گریں، پانی ایک ادنس میں ملا کر ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین بار پلائیں، کمزور مریضوں کو نصف خوراک دیں۔ اگر سوزش جرثومہ سفلیو کا کس سے ہو تو سٹریپٹو پینی سلین یا ۴ لاکھ پروکین پینی سلین ہر ۴ گھنٹہ بعد عضلاتی انجکشن سے دیں، سلفا تھایازو لیرہ کا استعمال بھی مفید ہے، لیکن گلوکوز کا استعمال مریض کو کافی کرایا جائے، جب مرض میں کمی ہو جائے تو تقویت کی کوشش کرنی چاہیے، جس کے لئے ڈامن بی ۱۲ کا استعمال مفید ہے، اس سے کمی خون دور ہو کر تقویت آ جائے۔

اس مرض کے علاج میں گردوں کو آرام دینا، گرم نمکور کرنا، پسینہ لانا اور منشیات سے پرہیز کرنا شفا یابی کا ضامن ہے۔

مادرین ادویات:۔ پوٹاسیم سٹریٹ، ۳ گریں، پوٹاسیم بائی کاربونیٹ ۵ گریں، پانی آدھا ادنس، ایک خوراک ہر چار گھنٹہ بعد پلائیں، گردوں کو صاف اور ہلکا رکھنے کے لئے مفید ہے۔


۲۔ نیفرل (Nephrol) فزر — ایک ملی گرام دن میں ایک بار کھانے کے بعد دیں۔ یہ دوا عمدہ پیشاب آور ہے اور دم گردہ میں مفید ہے۔
۳۔ سٹرالکا (Citralka) پارک ڈیوس — دم حوض گردہ و دم مشانہ میں مفید ہے۔ دو بڑے چمچے دن میں تین بار بڑوں کو دیں، بچوں کو بلحاظ عمر دیں۔

۴۔ گانتانول (Gantanol) روش — یہ سلفا ادویہ کی عمدہ دوا ہے، جو حوض گردہ کا دم، پیشاب کے اعضا کی سرایت میں مفید ہے دوسری سلفا ادویہ کی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔

۵۔ لاسکس (ہیکٹ) ایک ٹیکہ، ڈٹامی نٹس (روش) ایک ٹیکہ، دونوں کو یکے بعد دیگرے پانی کے ساتھ دن میں دو بار دیں، یہ زبردست پیشاب لانے والی اور ڈامن سے مرکب ہے۔ یہ پیشاب لا کر گردہ کے ہلکے دم کو دور کرتی ہیں۔ اس مرض میں غذا کا مسئلہ نہایت اہمیت رکھتا ہے، (دیکھیں تاج ایلو پیچی)

مریض آلات بول، ایسے مریض کی غذا لطیف ہونی چاہیے، بارے و اٹر کا استعمال مفید ہے۔ اس مرض کے علاج میں گردوں کو آرام دیں، گرم نمکور، پسینہ لانا اور منشیات سے پرہیز کرنا شفا یابی کی علامت ہے۔

یونانی علاج:۔ مریض کو پسینہ لانے کی کوشش کریں، منشیات سے پرہیز کریں، گردوں کو صاف کرنے کے لئے ہلکی پیشاب آور ادویات



دیں، مریض کو گرم کپڑے پہنا کر گرم مکان میں بستر پر لٹائیں، شدید حالات میں سوائے دودھ کے اور کوئی خوراک نہ دیں، دودھ میں ساگودانہ ملا کر بھی دے سکتے ہیں۔

بطور دوا مغز بیج خربوزہ پانچ ماشہ، مغز بیج کدوئے شیریں تین ماشہ، بزرالہنج تین ماشہ، بیج کرفس تین ماشہ، بیج خرفہ تین ماشہ، بیج خضہ تین ماشہ، مغز بادام مقشر تین دانہ، گوند کثیر تین ماشہ، ست لمبھی تین ماشہ، گل ارمنی تین ماشہ، بیج خشخاش تین ماشہ، رب کو پانی میں پیس کر لعاب بھی دانہ بقدر حاجت ڈال کر دو ماشہ کی مقدار کی ٹکیاں تیار کریں، دو گولیاں ہمراہ عرق گاؤ زبان و عرق سولف دس تولہ دن میں تین چار بار دیں۔ مرض دور ہونے پر کمزوری کے لئے کشتہ فولاد آدھی رتی ہمراہ دواء المسک معتدل جواہر والی پانچ ماشہ کھلائیں مقام درد پر گرم پانی کی بوتلی سے ٹکور کرنا مفید ہے۔

آیور ویدک علاج :- مقام درد پر نارائن تیل کی پوٹلیاں ڈال کر گرم کر کے ٹکور کریں اور درم مشانہ کی طرح علاج کریں۔
ہومیو پیتھک علاج :- بطور درم مشانہ کے کریں۔

غذا و پرہیز :- تلی اور ہلکی غذا مثلاً گائے یا بکری کا دودھ، چھچھہ، دہی (ترشی زیادہ نہ ہو) ساگودانہ دیں، شراب، کباب، گوشت، انڈے سے پرہیز کریں۔ استسقا میں نیک کا استعمال بند رکھیں۔

درد گزردہ، وجع الکلیہ، رنیل کالک، (Renal colic)

ریگ گزردہ، رمل کلیہ، رنیل سینڈ، (Renal sand)

پھتری گزردہ، سٹون ان دی کڈنی (Stone in the kidney)

تعریف مرض :- جب پھتری گردہ سے نکل کر حالب میں داخل ہوتی ہے تو سخت تشنجی درد ہوتا ہے جس کو عام طور پر درد گردہ کہا جاتا ہے۔ وجوہات :- کنکریاں یا پھتریاں زیادہ تر گردوں یا مشانے میں بنا کرتی ہیں اور وہیں پائی جاتی ہیں، پھتری شروع میں مونگ کے دانہ کے برابر ہوتی ہیں، بعض مریضوں میں ایک پھتری پیدا ہو کر خارج ہو جاتی ہے اور بعض مریضوں میں یکے بعد دیگرے پیدا اور خارج ہوتی رہتی ہیں۔ شاذ و نادر گردوں میں ایک ساتھ پھتریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر پیشاب میں باریک ذرات خارج ہوں تو اس کو ریگ گردہ کہتے ہیں، پھتریاں بناوٹ کے لحاظ سے قسم کی ہوتی ہیں :-

۱۔ فاسفیٹ آف کیلیم :- انڈے کی طرح گول، زرد رنگ کی اور ملائم یہ پھتری مشانہ میں پیدا ہوتی ہے۔

۲۔ اوکس لیٹ آف لایم :- کانٹے دار بھاری کھردری شکل کی کالے رنگ کی یہ پھتری گردہ میں بنا کرتی ہے اسے طب میں سنگ توتی بھی کہتے ہیں۔


۳۔ یورک ایسڈ کی پھتری :- یہ اکثر گردہ میں بنتی ہے کبھی دو یا تین مادوں کے ملنے سے تیار ہوتی ہے، اس کا رنگ براؤن ہوتا ہے۔ یہ پھتریاں خشکاس سے لے کر نارنگی تک ہو سکتی ہیں۔

پیشاب میں جب یورٹس، فاسفیٹس، گزالیٹ اجزاء بہت زیادہ ہو جاتے ہیں یا پانی کی مقدار کم ہونے سے یہ گاڑھے ہو جاتے ہیں، تو یہ جسم کی پھتری ریگ بن جاتے ہیں، یہ صورت ناقص پانی سے زیادہ میٹھی و لحمی غذائیں کھانے اور جگر گردہ و مشانہ کے عوارضات سے یہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ مرض ہر عمر

ہے۔ ورزش نہ کرنے سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- جب پتھری گردہ میں ہوتی ہے، لوکمر میں دھیمادھیمادرد ہوتا ہے، جس کی ٹیسیں خُصیوں اور ران تک پہنچتی ہیں، اگر شام کے پیشاب کو شیشی میں بند رکھا جائے تو صبح دیکھنے پر بھورے یا سرخ رنگ کے ذرات یا سفید اجزاء دکھائی دیتے ہیں، کبھی پیشاب رُک رُک کر آتا ہے، کوئی بڑی پتھری پیشاب کے راستہ میں رُک جائے تو سخت قسم کا درد ہوتا ہے۔ کبھی پیشاب کے ساتھ یا پہلے یا بعد میں خون اور پیپ آتی ہے، کبھی گردہ کی پتھری کی وجہ گردہ کی خراش سے قے یا مٹی ہونے لگتی ہے، مریض کمزور ہو جاتا ہے، اگر پتھری مثانہ میں ہو تو سیون اور پارٹی میں درد ہوتا ہے،

یہ اس مرض میں پیشاب کر چکنے کے بعد دریا کرتے ہیں اور سپاری کو ہاتھ لگاتے ہیں جب دوسرے سے کسی قسم کی کنکری مثانہ کی طرف اُترتی ہے تو زیادہ شدت کا درد ہوتا ہے۔ اور بعض لوٹا، تڑپتا، پیٹ کو دباتا اور کلتا ہے، اس مرض میں بخار نہیں ہوتا، گردوں کا درد ردوں میں خُصیوں کی طرف اور عورتوں میں زنانہ اعضاء تناسل کی طرف جاتا ہے دوسرے



گردے کی
کئی پتھریاں

ردوں سے فرق معلوم کرنے کے لئے یہ نکتہ خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے۔

تشخیص :- درد گردہ کو پریٹ درد، جگر کے درد اور کمر کے درد سے تشخیص کرنا ضروری ہے، اس سلسلہ میں دھیان ہے کہ درد گردہ میں عام طور پر پیشاب خون ملا آتا ہے، درد کی ٹیسیں گردہ کے مقام سے شروع ہو کر ران کے اندر کی طرف جیسا کہ لکھ آئے ہیں، مردوں میں خُصیوں اور عورتوں میں اعضاءِ سل زنانہ کی طرف جاتی ہیں، پیٹ درد میں درد ناف کے ادھر ادھر ہوتا ہے اور درد کمر شدید نہیں ہوتا، جیسا کہ درد گردہ میں ہوتا ہے، اور ان دونوں میں بخار کرتے وقت درد نہیں ہوتا یا پیشاب خون ملا نہیں آتا۔

علاج ڈاکٹری :- یورک، الیڈ کی پتھری عام طور پر کھاری ادویات میں حل ہو جاتی ہے، اس لئے پیشاب کو کھاری کی جگہ تیزابی بنا دیا جائے، اس سلسلہ میں پوٹاشیم سائٹریٹ عمدہ دوا ہے پندرہ سے بیس گرین دن میں تین بار دیں، یہ پتھری کے ذرات کو باہم ملنے سے روکتا ہے، یہ علاج عرصہ تک جاری رکھنا ہے، آج کل یورک الیڈ کو تحلیل کرنے کے لئے لیتھیم سائٹریٹ (Lithium-Cit) اور پارزین وغیرہ کا علاج نہیں رہا۔ درحقیقت اب تک ڈاکٹری کوئی ایسی دوا دریافت ہی نہیں ہو سکی جو گردہ یا مثانہ کی پتھری کو بلا آپریشن تحلیل کرے، وقتی آرام کے لئے درد شدید کی صورت میں ٹکوروں اور ادویات میں نیا وایٹروپین کا انجکشن مفید ہے۔ لیکن کمزور مریضوں کو نہ دیں، مندرجہ ذیل نسخہ بھی مفید ہے :-

پوٹاشیم سائٹریٹ ۲ ڈرام، لائیو اریوینا ایسی ٹاس ۲ ڈرام، ٹنگر یوسم ۲ ڈرام، ٹنگر بیلادونا ۵ سم، پوٹاشیم برومائیڈ ۵ گرین، پانی ایک اوونس، ہر ایک ایک خوراک ہر تین گھنٹہ بعد دیں، اسے ہارمز استعمال نہ کریں۔

آج کل سبباکپنی کے تیار کردہ دافع درد انجکشن سیال جین (Cibal gin) ایک سے دوسری عضلاتی لگانا درد گردہ و درد عضلات، دیگر درد جوڑ، گنٹھیا وغیرہ کے لئے مفید ہے، یہی دوائی نووالجین (Novalgin) کے نام سے بھی مارکیٹ میں ملتی ہے، درد کو تسکین دینے والے انجکشن میں، اسپیرین یا اسپیرین کے مرکبات بھی درد کو عارضی طور پر رفع کرنے کے لئے مفید ہیں۔ آج کل مارفیا کے انجکشن کی بجائے بیلے فو لین (Bellafofin) یعنی بیلادونا کا جوہر لطیف بطور انجکشن استعمال کیا جاتا ہے، اس سلسلہ میں سینڈوزکپنی کے تیار شدہ ایمپولز ملتے ہیں، جس جگہ لیاڈونا یا اٹروپین کا استعمال ضروری ہو، اس کا ٹیکہ کیا جاسکتا ہے۔ درد گردہ و مثانہ کے لئے نہایت مفید ہے۔

مقدار خوراک :- ایک سی سی زیر حبلہ یا پچھوں میں انجکشن کیا جاتا ہے۔

مادران ادویات :- ۱۔ بارل گان (Baral gan) بکیٹ ————— ایک گولی تازہ پانی سے دیں، درد کو فوراً آرام دیگی۔

یا سپازموپروکسیون (Spasmoproxiron) ایک کیپ شولز دن میں دو سے تین بار دیں۔

۲۔ پیٹیدیٹین (Pethidine) روش یا ڈیز ————— کا ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام کا عضلاتی انجکشن گردہ یا مثانہ کی پھتری میں درد سے تڑپنے مریض کو فوری سکون دیتا ہے، لیکن یہ انجکشن ایک کو الیفائیڈ ڈاکٹر کو ہی استعمال کرنا چاہیے، عام پریکٹیشنرز کو اسے استعمال میں نہیں لانا چاہیے۔

۳۔ بارل گان ایک ٹکیہ، ہنرو ایک ٹکیہ، بوقت ضرورت ایک ساتھ تازہ پانی سے دیں، درد گردہ کو فوراً فائدہ ہوتا ہے۔

۴۔ بلارگل (Bellargal) سینٹوز ————— ایک سے دو ٹکیہ تازہ پانی سے دیں۔

۵۔ نوو لجنین (Novalgin) ہیکٹ ————— کی ایک گولی تازہ پانی سے دیں۔ زیادہ تکلیف کی حالت میں دوسری سی کے ایمپول لے کر اس کا عضلاتی انجکشن کریں۔

۶۔ سپازمو سبالجنین (Spasmo-cibalgin) سبا ————— ایک گولی تازہ پانی سے دیں۔

۷۔ بیلادی نل (Belladenal) ایک دو ٹکیہ درد کے وقت دیں۔

۸۔ بیلانولین (Bellafoline) ایک دو ٹکیہ دیں۔

۹۔ مارفین ہائیڈروکلورائیڈ (Morphin) یہ جوہر ایفون کا انجکشن ہے، جو ایمپول کی شکل میں ایک سی سی کی مقدار میں بذریعہ عضلاتی انجکشن

استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ مارفین ایک خطرناک دوا ہے جو قانون کے تحت ہی فروخت کی جاتی ہے، اس لئے یہ مستند ڈاکٹر

ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ عام طور پر استعمال نہیں کی جاتی۔ یہ دوا درد گردہ کو فوراً سکون دیتی ہے، مارفین کے استعمال سے متلی وقت، خرا

جلد، گہری نیند، اعضائے تنفس کا دباؤ عوارضات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لئے یہ دوا بہت سے خطرات رکھتی ہے، لہذا یہ دوا بہت احتیاط

کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے۔ مارفین ایسٹروپین کے ساتھ بھی استعمال کی جاتی ہے۔ ناخوش گوار علامات کو دبانے کے لئے اس کے

زہریلے اثرات کا نزاق تیار رکھنا چاہیے۔

یونانی علاج :- گردہ کے مقام پر ٹکڑ کر کے یارانی کا پلستر لگائیں، جب پلستر چھپنے لگے تو اتار دیں، درد گردہ کے لئے بہترین علاج۔

درد گردہ کے لئے آبن کرانا بھی مفید ہے، ایک سیر گرم پانی میں کسی قدر سن لائیٹ صابن ملا کر اور ایک اونس کیسٹر آیل ملا کر حقنہ کریں، پھتری

کے اخراج کے لئے کلمتی چھ ماشہ، سولف سات ماشہ، پھتری بھڑی بوٹی چار ماشہ، گل داؤدی پانچ ماشہ، سب کو پانی میں پیس کر چھان کر پلائیں۔

سب دوائیں نہ ملیں تو جو میسر ہوں وہی استعمال کریں، شدت درد میں برشعشا معجون کا استعمال بھی مفید ہے۔

مندرجہ ذیل مجربات درد گردہ و پھتری کے لئے مفید ہیں :-

جوشاندہ درد گردہ :- گوکھرو چھ ماشہ، سولف رومی پانچ ماشہ، پولیاں پانچ ماشہ، مغز کھیرا چھ ماشہ، گل قندین تولہ، تمام ادویات کو گھوٹ

پانی ملا کر چھان کر سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ویسے ہی پلا دیں، پندرہ منٹ میں آرام آجائے گا۔ اگر درد گردہ پھتری سے ہے تو مفید ہے۔

دوائے درد گردہ :- جوکھار، لوٹاکھار، سوگہ خام، نوشادر پھلی، مرج کالی، نمک سیندھا، نمک طعام، ہیرا ہینگ، قلمی شورہ، تمام ادویات

برابر کر سفوف بنالیں، اور قدرے سرکہ انگوری ملا کر لعوق تیار کریں، بقدر متین ماشہ پندرہ منٹ بعد چٹا دیں، دوسری یا تیسری خوراک سے

گردہ کو آرام آجائے گا۔ دوائیں تازہ تیار کر کے استعمال کریں۔

کشتہ حجر البہود :- حجر البہود (پھتری) پانچ تولہ کو باریک پیس کر مولی کا پانی ڈال کر اتنا کھل کریں کہ ایک سیر پانی خرچ ہو جائے، اس

بعد ٹکیہ بنا کر کلمتی کے نغہ کے درمیان رکھ کر دس سیر ایلوں کی آگ دیں، سرد ہونے پر نکال لیں اور باریک پیس کر محفوظ رکھیں، خوراک ایک

دورتی تک مناسب بدرقہ کے ساتھ کھائیں، گردہ و مثانہ کی پھتری کے لئے مفید ہے۔

دوائے پھتری گردہ :- کشتہ جڑ الیہود چار رتی، سفوف شورہ دورتی، سوڈا بانی کارب دورتی، جو کھار کا سفوف دورتی، سفوف ریوند خطائی دورتی۔ تمام ادویات کو باریک پس کر ملا لیں اور دو خوراکیں بنالیں، صبح و شام گائے کی چھا چھ سے ایک ایک خوراک دیں چند یوم میں گردہ کی پھتری خارج ہوگی، کمزور مریضوں کو نصف خوراک دیں۔

دیگر :- سیندھا نمک تین ماشہ، کلکتی دو تولہ، دونوں کا جو شانہ تیار کر کے پلائیں، چند بار میں پھتری پیشاب میں بہہ کر چلی جائے گی۔
دیگر :- ہینگ، نوشادر، سہاگہ، برابر وزن پس کر دورتی ہمراہ عرق سولف کھلائیں، بیردنی سونہٹ، سولف، روغن بالونہ میں پس کر نیم گرم گردوں پر لپیپ کریں۔

دیگر :- مغز بیج کھیرا تین ماشہ، مغز بیج کھڑی تین ماشہ، مغز بیج خرلوزہ چھ ماشہ، گوکھرو چھوٹا چار ماشہ، کلکتی چار ماشہ، سب کو ۱۰۰ گرام پانی میں بھگو کر جوش دے کر چھان لیں اور چینی سے میٹھا کریں، اس کی دو خوراک بنالیں، دن میں دو بار لیں۔

دیگر :- کلکتی چھ گرام، مولی کارس بارہ گرام، کلکتی کو ۲۵ گرام پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور مولی کارس ملا لیں، کھانا کھانے کے پُر گھنٹہ بعد لیں۔

دیگر :- سرمچو کہ دس گرام، ۳ گرام پانی میں جوش دے کر چھان کر پلائیں۔

پھتری کا جڑی بوٹیوں سے علاج

۱۔ چرچہ (پٹھکنڈا) بوٹی آدھا تولہ، پانی میں پس کر چند روز پینے سے گردہ و مثانہ کی پھتری ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکل جاتی ہے اور درد گردہ کو آرام آجاتا ہے۔

۲۔ نمک کنگھی بوٹی (جس کی ترکیب ہندوستان کی جڑی بوٹیاں میں دی گئی ہے قیمت جلد اول پڑے، جلد دوم پڑے، جلد سوم محصول ڈاک علاوہ منجھڑا لا جوگی پبلیکیشنز پانی پت (ہریانہ) انڈیا سے منگاسکتے ہیں) بقدر چار رتی کھا کر اوپر سے زیرہ سفید تین ماشہ، سولف چھ ماشہ کا شیرہ پلائیں، چند روز میں پھتری ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پیشاب سے نکل جائے گی۔

۳۔ گل داؤدی تین سے چار ماشہ بوقت دورہ درد گردہ پانی میں جوش دے کر پلائیں، ایک مرتبہ کے استعمال سے ہی درد بند ہوگا۔

درد گردہ کا قدرتی علاج

۱۔ مکی کے بھٹے کے بال لے کر سایہ میں خشک کر لیں اور بطور چائے پلائیں، درد گردہ کو فوراً تسکین دے گا۔

۲۔ کبوتر کی بیٹ کی سفیدی کو علیحدہ کر لیں، اگر فرصت نہ ملے تو تمام بیٹ کوٹ کر چھان لیں۔ ایک ماشہ کی مقدار میں ہمراہ گرم پانی دیں۔ درد گردہ کے لئے نہایت مفید اور عجیب قدرتی دوا ہے۔ چند مرتبہ کا استعمال کافی ہے، درد مثانہ کے لئے مفید ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق بھٹیابن اور وٹامن اے کی کمی سے بھی ریگ و پھتری گردہ بننے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لئے جن لوگوں کے پیشاب میں پھتری پائی جائے، انہیں بعد علاج وٹامن اے کا ضرور استعمال کراتے ہیں، تاکہ یہ عارضہ بعد میں نہ ہو۔

آیور ویدک علاج :- اگر درد کمزور دوں، فوطوں اور مثانہ میں دورہ کرتا ہو، ساتھ ہی پیشاب و پاخانہ بالکل رکا ہوا ہو، تو مندرجہ ذیل نسخہ جات کا استعمال کرائیں :-

شنٹھیادی کو اتھ :- سونہٹ، ارنی، پاکھان بید، چھال درخت سو باجنہ، چھال درخت برنا، گوکھرو، چھال ہرڑ، گودا امتاس ہر ایک تین ماشہ، سب کو جو کو ب کر کے ڈیڑھ پاؤ پانی میں جوش دیں اور چوتھائی رہ جانے پر چھان لیں اور اس میں ہینگ بریاں دورتی، نمک سیندھا ایک ماشہ، جو کھار ایک ماشہ ملا کر نیم گرم پلانے سے ریاحی درد گردہ دور ہو کر پیشاب و پاخانہ کھل کر آجاتا ہے، صبح و شام پلائیں۔

گوکھشرادی گوگل :- گوکھروہم ۱۳ سیر کو جو کوب کر کے ۲۱ سیر پانی میں پکائیں، جب پانچ سیر پانی رہ جائے تو اتار کر مل چھان کر اس میں آدھ سیر گوگل شدہ شامل کر کے آگ پر پکائیں اور کڑھی سے ہلاتے رہیں، گاڑھا قوام بن جانے پر اتار کر ذیل کی ادویات کا سفوف ملائیں اور خوب یک جان کر کے چار چار رتی کی گولیاں بنائیں۔

سونٹھ، بگھاں، مرج کالی، چھلکا ہڑ زرد، چھلکا بہیرہ، آملہ، ناگر موٹھا ہر ایک پانچ پانچ تولہ۔

فوائد :- درد گردہ کی لاثانی دوا ہے، پیشاب کی تمام بیماریوں کو نیت و نابود کرتی ہے، پیشاب کی رکاوٹ اور تکلیف دور ہو کر پیشاب کھل کر آنے لگتا ہے، پیشاب قطرہ قطرہ آنا، پیشاب میں گدلا پن، چربی، البیومن، شکر، خون یا پیپ آتی ہو، یہ گوگل از حد مفید ہے، مثانہ کی پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے خارج کرتا ہے، پراسٹیٹ گلینڈز (غذہ قداسیہ) بڑھ جانے سے جب پیشاب بند ہو جاتا ہے، تو اس کے لئے عجیب الاثر ہے، علاوہ ازیں امراض منی اور جریان منی کے لئے اکیر صفت ہے، خوراک دو سے تین گولی صبح و شام ہمراہ نیم گرم پانی استعمال کریں۔

دوائے درد گردہ :- کشتہ حجر البیہود دورتی، ہنگوادی چورن ایک ماشہ، جو کھار چار رتی ملا کر ہمراہ گرم پانی دن میں دو بار کھلائیں، درد گردہ

کو یقیناً آرام ہوگا۔

دیگر :- جو کھار کشتہ حجر البیہود، سبھی کھانا، سہاگہ خام، مرچ سیاہ، سیندھانک، سمندر نمک، ہینگ بریاں، قلمی شورہ، جملہ برابر وزن کا نہایت باریک سفوف بنا کر اس میں عمدہ سرکہ اس قدر ملائیں کہ سحون سی بن جائے۔

مقدار خوراک :- ایک ماشہ سے تین ماشہ تک ہمراہ عرق سولف یا گرم پانی دیں، درد گردہ کے لئے نہایت ہی مفید دوا ہے۔

دیگر :- پیکلڑی سفید خام، لوٹا سبھی، قلمی شورہ ہر ایک ایک تولہ، نوشادر بھلی پانچ تولہ، سب کو پیس کر سفوف بنائیں، خوراک دو سے تین ماشہ صبح و شام ہمراہ عرق سولف و گرم پانی دیں، چند روز کے استعمال سے پتھری گردہ و مثانہ گل کر خارج ہو جاتی ہے۔

ہومیوپیتھک علاج :- کنینتھرڈس ۳۰ (Canthar 30) بربرس ۱۲ (Berberis 12) بہترین ادویات ہیں۔ گردے کا درد زیادہ جھکنے سے بڑھتا ہو یا میٹھے رہنے سے زیادہ ہوتا ہو، تو بھی بربرس بہترین دوا ہے۔

قدرتی علاج :- مشہور ہندوستانی ترکیب "مولی" کا کچا کھانا مفید ہے، لیکن اسے نمک و مرچ سیاہ لگا کر کھانا چاہیئے۔ کیونکہ یہ دیر

ہضم ہوتی ہے۔

گردے کی کمزوری، ضعف الکلیہ، البیومی نوزیا، (Albuminuria)

تعریف مرض :- اس مرض میں انسان کے خون سے البیومن خارج ہو کر پیشاب کے ذریعہ خارج ہونے لگتی ہے۔ اس کو ہی البیومی نوزیا یا ضعف گردہ کہتے ہیں۔

وجوہات :- ورم گردہ، کثرت ملاپ، انڈوں کا زیادہ استعمال، گھوڑے کی سواری، عصبی امراض، سل دق، شدید بخار دل اور پیچھے پٹوں کی بیماریاں، مکر پر بوجہ، زہر پارہ و سکہ وغیرہ سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- البیومی نوزیا کے خارج ہونے سے خون خراب ہو جاتا ہے، جسم کمزور، رنگ پھیکا، ہاضمہ خراب، سر درد، چہرہ پر بھر بھراہٹ، کبھی دست یا قبض وغیرہ کا عارضہ ہو جاتا ہے، پیشاب میں چربی یا انڈے کی سفیدی کی طرح مادہ خارج ہوتا ہے۔

ڈاکٹری علاج :- اصل سبب کو دور کر کے اس کا تدارک کریں، ملاپ سے سخت پرہیز کریں، اگر بخار میں البیومن آنے لگے تو حرارت و کمزوری دور

ہو جانے سے اپنے آپ آرام آجائے گا، عصبی کمزوری سے یہ عارضہ ہو تو وٹامن بی (بیرین) اور وٹامن بی ۱۲ کے عضلاتی انجکشن دیں، اس سلسلہ میں وٹامن بی (بیرین) کی ایک گولی صبح و شام ہمراہ پانی بعد از غذا کھلانا بھی مفید ہے، اگر ورم گردہ کی وجہ سے یہ عارضہ ہو تو اس کے مطابق علاج کریں، بلڈ پریشر ہو تو بپرنز بلڈ پریشر علاج کریں۔ اگر دل کی کمزوری ہو تو برانڈی، کورامین، سپرٹ ایونیٹا اور ویتیک وغیرہ دیں اور اس مرض میں مریض کو مکمل آرام و سکون کی ضرورت ہے۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ ون ۱۲ (One-12) اینگلو فرینچ ڈرگ ————— یہ وٹامن بی ۱۲ کی کمی کو دور کرتی ہے، بھوک اور ہاضمہ بڑھاتی ہے، جگر گردہ، اعصاب و حرام مغز کی کمزوری کے لئے از حد مفید ہے۔ ایک ایمپول ہر روز یا ایک دن چھوڑ کر انٹرا اسکولر انجکشن لگائیں۔

۲۔ نیوروبیون (Neurobione) مرکب ————— ایک ایمپول ہر دوسرے دن عضلاتی انجکشن لگائیں، ٹرائی ریڈی سول ایچ (Tri-redisol-H) ایم، ایس، ڈی ————— مرض کے مطابق انٹرا اسکولر انجکشن لگائیں، نمبر ۲ و نمبر ۳ میں وٹامن بی ۱۲ وٹامن بی ۱۲ اور وٹامن بی ۱۲ شامل ہیں۔

۳۔ بی نیوروفاس (B-neurophos) گلیکو ————— ایک سے دو کیپ شولز کھانا کھانے کے بعد تازہ پانی سے دیں۔

۴۔ بی وٹول (B-vitol) سینڈرڈ ————— دو سے چار چمچ دن میں دوبار دیں، سب وٹامنز کی اور ہر قسم کی کمزوری کیلئے مفید ہے۔

۵۔ بیکوسول (Becosules) ڈیوسیکس ————— اس میں سب وٹامن بی کمپلیکس ادویات کے علاوہ وٹامن بی ۱۲، فولک ایسڈ و وٹامن سی بھی ملا ہوتا ہے، ایک کیپ شولز روزانہ کھانا کھانے کے بعد تازہ پانی سے استعمال کرائیں۔

۶۔ بیسی ٹون (Basiton) سارا بھائی ————— ۵ کی طرح مفید ہے، کھانا کھانے سے پہلے دن میں دوبار دو چمچ دیں، بچوں کو بلحاظ عمر دیں۔

۷۔ لیڈر پیکس کیپ شولز (Lederplexca psules) لیڈرے ————— ایک کیپ شولز تازہ پانی سے دیں۔ اس کے انجکشن بھی ملتے ہیں۔

۸۔ وٹامن بی کمپلیکس (Vitamin-B complex) ٹی، سی، ایف ————— کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت دو دو چمچے استعمال کریں۔

۹۔ یونی بی کمپلیکس (Uni-B-complex) یونیکم ————— دو سے چار کپیاں تک تازہ پانی سے استعمال کریں۔

۱۰۔ ملٹی بے (Multibay) بائر ————— ایک کیپ شولز روزانہ کھانا کھانے کے بعد تازہ پانی سے دیں۔

یونانی علاج :- جندبیدستر خالص ایک ماشہ، حائل پانچ ماشہ، جلوتری پانچ ماشہ، دارچینی پانچ ماشہ، حرمل پانچ ماشہ، تل سیاہ چھلے ہوئے پانچ تولہ، کوٹ چھان کر حسب ضرورت شہد ملا کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں، دو گولی صبح، دو گولی شام کو ہمراہ دودھ گائے یا بھینس نیم گرم سے استعمال کرائیں، گردہ کی کمزوری کے لئے مفید ہے۔ پیشاب کی زیادتی رک جاتی ہے اور کمزوری کے لئے مفید ہے، اگر یہ عارضہ عصبی کمزوری کے سبب سے ہو تو خیرہ گاؤ زبان عبری پانچ ماشہ، عرق عنبر سات تولہ، عرق گاؤ زبان ۷ تولہ دیں، اگر کمزوری خون وغیرہ کے سبب سے ہو تو کشتہ فولاد و کشتہ سونا یا دوا اسک مستدل جو اہروالی پانچ ماشہ صبح و شام ہمراہ عرق گاؤ زبان دیں یا شلاجیت شدھ ایک ماشہ، لبوب صغیر چھ ماشہ ملا کر کھلائیں، مقوی ادویات و مغزیات کا استعمال بھی مفید ہے۔

دوائے کمزوری گردہ :- سامٹی چاول، بہمن سرخ، بہمن سفید، تو دری زرد، تو دری سرخ، دارچینی، مغز اخروٹ، مغز پستہ ہر ایک تین ماشہ، مغز بادام شیریں چھلے ہوئے سات عدد کو بھڑکے دودھ دس تولہ میں چھان کر آگ پر پکائیں، جب وہ گاڑھا ہو جائے تو مصری دو تولہ سے میٹھا کر کے پلائیں، کمزوری گردہ کے لئے از حد مفید ہے۔

دیگر :- گوکھڑ خشک کو کوٹ کر چھلنی سے چھان لیں، پھر تازہ گوکھڑ کا رس نکال کر اس میں اتنا ڈالیں کہ تر ہو جائے، پھر خشک ہونے پر اور ڈال دیں، اس طرح تین بار کریں۔ اگر یہ دس تولہ ہو تو اس میں ایک تولہ سونٹھ شامل کر لیں۔ چھ ماشہ ددوں وقت دودھ گرم میں میٹھا ڈال کر کھالیا کریں۔ کمزوری گردہ و مثانہ کے لئے از حد مفید ہے۔

آیور ویدک علاج :- اس مرض کا موثر علاج مشہور آیور ویدک گرنٹھ شارنگدھر کا نسخہ ”چندر پر بھاوٹی“ ہے، جو درج ذیل ہے :-
 باجی شدھ، ورتج، چرائیہ، برادہ دیودار، گلو، ہدی، اتیس، دار ہدی، پلامول، چترک، دھنیا، تر پیلہ، چویہ، بابڑنگ، گج پیل، سونٹھ، مرتج سیاہ، نگھاں، کشتہ سونا مکھی، نمک سوخیل، نمک سیندھا، نمک وڑ، جو کھار، سبھی کھار ہر ایک تین تین ماشہ، تیز پات، تروی، جڑ جالگوٹھ شدھ، دار چینی، الاچی، طباشیر ہر ایک ایک تولہ، کشتہ فولاد دو تولہ، مصری دسی چار تولہ، سلاجیت شدھ، گوگل ہر ایک آٹھ آٹھ تولہ پہلے تمام نباتاتی ادویہ کو کوٹ چھان لیں۔ پھر سلاجیت و گوگل کو کھل میں ڈال کر علیحدہ علیحدہ پانی میں حل کر کے ملا لیں اور سب ادویہ کو یک جان کر کے خوب کھل کریں اور گولیاں بقدر دودھ دورتی بنائیں، خوراک ایک ایک گولی صبح و شام ہمراہ عرق سولف یا دودھ نیم گرم سے دیں۔

فوائد :- اس دوا کا استعمال بچے، بوڑھے، جوان عورتوں اور مردوں کے لئے یکساں فائدہ مند ہے، سلاجیت اور کشتہ فولاد کے اجزائے خاص ہونے کی وجہ یہ امراض گردہ و مثانہ کے لئے خاص طور پر مفید ہے، کمزوری مثانہ، کمزوری گردہ، کثرت پیشاب، سلسل البول، پیشاب کا گدلا پن، جریان، احتلام، مثانہ کی پتھری یا پیشاب کے ساتھ ریت خارج ہونا وغیرہ میں مفید ہے۔ جگر کو طاقت دے کر خون صالح پیدا کرتی ہے رات کو سوتے میں پیشاب خارج ہو جانے کو بھی مفید ہے۔

ہومیوپیتھک علاج :- آرٹک الیب (Ars-Alb)، ڈجی ٹلیس (Digitalis)، نکس و امیکا (Nx-vom) بہترین ادویات ہیں۔
 بالوکیک علاج :- کلکیریا کارب، نیٹرم سلف، کالی میور، کالی سلف اور نیٹرم میور — مفید ادویات ہیں۔
 قدرتی علاج :- مغز چغوزہ، اخروٹ، ناریل وغیرہ کا استعمال مفید ہے، علاوہ ازیں بکرے کے گردوں کو پکا کر کھانا بھی مفید ہے۔
 غذا و پرہیز :- دھامن سے بھرپور اغذیہ دیں، تل و خشکاش کے لڈو مفید ہیں، مغوی چیزیں فائدہ مند ہیں، سرد پانی، برف اور ملاپ سے سخت پرہیز ضروری ہے۔

گردے کے پھوٹے اور رسولیاں، رینل ٹیومر (Renal Tumours)

اس مرض میں گردے کے اندر پھوٹے یا رسولیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پیشاب کے اخراج کے وقت مریض کو سخت تکلیف ہوتی ہے اور بعض دفعہ تو گردہ کے درد کا حارضہ بھی ہو جاتا ہے، گردے کے مقام پر بوجھ معلوم ہوتا ہے۔

اس مرض کے علاج میں سلفا ڈرگز مفید ہیں۔ اینٹی بائیوٹک علاج میں مینی سلین یا سٹریپٹو مینی سلین یا سٹریٹو مانی سین کا استعمال مفید ہے یا پروکین مینی سلین چار لاکھ یونٹ ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ اس مرض میں آریو مانی سین، ٹیرامانی سین یا اگر د مانی سین بھی مفید ادویات ہیں۔

مادرن ادویات :- ایپی سلین ۲۵۰ یا ۵۰۰ ملی گرام کا کیپسول دیں۔ اس سلسلہ میں سنٹو سلین یا رو ایکسی سلین کا استعمال کرایا بنے بچوں کیلئے شربت اور ڈرائس اپنی ناموں سے ملے ہیں۔ دھامن کی پکیٹیں استعمال ساتھ جاری رکھیں۔



ٹیوبرکولوسس آف کڈنی، (Tuber culosis of Kidney)

اس مرض میں گردے دق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان میں بعض دفعہ پیپ بھی پڑ جاتی ہے، جس سے گردے متورم ہو جاتے ہیں، تمام علامات دق کی ہوتی ہیں، اگر یہ مرض ایک گردے میں ہو تو جلد آرام آ جاتا ہے۔ ورنہ کافی عرصہ تک علاج کرنا پڑتا ہے، اس مرض کا علاج بطرزورم گردہ و مرض دق کے ہے۔ اس سلسلہ میں پیپھڑوں میں دیئے تپ دق کے مجربات میں سے نسخہ جات کو استعمال میں لائیں۔

گردوں کا پھیل جانا، ہائیڈرونفروسس، (Hydro Nephrosis)

اس مرض میں گردے پھیل جاتے ہیں اور کمزور ہو جاتے ہیں، گردوں کے مقام پر درد ہوتا ہے، شدید صورت میں گردوں کے اندر سوزش اور پیپ ہو جاتی ہوتی ہے، اس مرض کا علاج بطرزورم گردہ کے کریں اور مریض کو آرام اور سکون سے لیٹے رہنا چاہیئے۔

درد مثانہ، وجع المثانہ، ویسائیکل سپیزم، (Vesatical Spasm)

ورم مثانہ، سوجن مثانہ، سیسٹائیٹس، (Cystitis)

تعریف مرض :- اس مرض میں مثانہ کے مقام پر درد یا سوجن ہو جاتی ہے۔
وجوہات :- مثانہ پر چوٹ لگنا، پتھری، پیشاب کی بندش، سوزاک جوڑوں کا درد، پیشاب میں شکر آنا، عورتوں میں بچہ دانی کی سوجن یا سقند یا بعض دفعہ برقعہ کنٹرول کے لئے کئے گئے ادھورے ملاپ سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔ اسے طب آیوروید میں موتراسفیہ شول کہتے ہیں۔

نوٹ :- مثانہ کے درد کو ایلو پیتھی طب میں پن آف دی بلیڈر بھی کہتے ہیں۔ یہ مرض اکثر سرد چیزوں کے استعمال سے مثانہ میں ریاچ پیدا ہونے کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔

علامات :- مثانہ کے ورم میں گرانی و بے چینی ہوتی ہے۔ پیشاب گہرے رنگ کا بدبودار اور بار بار آتا ہے اور اس میں بلغم یا پیپ نشین ہے، مثانہ کے مقام پر سخت درد ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے اور جی متلاتا ہے، کبھی قیئیں بھی آتی ہیں، بعض دفعہ پیشاب لگ کر آتا ہے، مثانہ جاتا ہے اور دبائے سے درد کرتا ہے، کبھی پاخانہ بار بار آتا ہے اور اس میں خون اور آنوں ملی ہوئی ہوتی ہے، اگر ورم مثانہ پرانی حالت میں مثانہ کے مقام پر درد ہونے کے علاوہ پیشاب تھوڑی تھوڑی مقدار میں اور پیپ ملا ہوا آتا ہے۔

علاج ڈاکٹری :- درد مثانہ کے لئے ٹینکچر زنجی بر ۱۵ ام، سوڈا بائیکارب ۲۰ گرین، سپرٹ کلوروفارم ۵ ابوند، ایکوا ایک اونس، ایسی ایک خوراک دن میں تین بار دیں، بورک ایسڈ کو پانی میں گھول کر گرم کر کے درد کے مقام پر سینک کریں۔
ورم مثانہ میں سلفا گروپ یا پینیسلین یا سٹریپٹومین سلین کے عضلاتی انجکشن دیں اور علاج بطرزورم گردہ کے کریں۔

یونانی علاج :- مقام مرض پر بابونہ سے ٹکور کریں یا بنفشہ خلمی، خبازی ہر ایک پانچ تولہ، دوسیر پانی میں جوشا کر پھر اس میں پندرہ سیر پانی گرم ملا کر اس میں مریض کو بٹھائیں یا روعن بنفشہ کی پیڑ و پر مالش کریں، درد مثانہ میں بیج کھیرا چھ ماشہ، بیج سوئے پانچ ماشہ، سولف پانچ ماشہ، دھنیا ۹ ماشہ سب کو پانی میں پیس کر مشرب بزوری دو تولہ ملا کر پلائیں، موسم سرد ہو تو جوارش جالینوس چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ عرق کا و زبان دس تولہ دیں، جوارش زرعوئی اور جوارش زنجبیل (سونٹھ) کا استعمال بھی مفید ہے۔ ورم مثانہ میں پھول بابونہ پندرہ تولہ، پانی پندرہ سیر میں پکا کر ابزن کرائیں، اونٹنی کا دودھ پلائیں اور بطرز درم گروہ کے علاج کریں۔

ایور ویدک و ہومیو پیتھک علاج بطرز درم گروہ کے کریں۔

غذا و پرہیز :- دودھ، آش جو اور سیال اغذیہ دیں، ہر قسم کے مصالحوں، شراب، کباب، چائے، تہوہ وغیرہ سے پرہیز کریں۔

موتّر کر چھ، پیشاب کا مشکل سے آنا، ڈس یوریا، (Dysuria)

پیشاب کا بند ہو جانا، ریٹنشن آف یورین، (Retention of Urine)

موتّر اپن نہ ہونا، پیشاب کا بیدار نہ ہونا، اسکوریا، (Ischouria)

پیشاب کا رک جانا، سپریشن آف یورین، (Suppression of Urine)

تعریف مرض :- اس مرض میں پیشاب مشکل سے آتا ہے، بند ہو جاتا ہے، پیدا نہیں ہوتا یا رک جاتا ہے۔

وجوہات :- پیشاب کی نالی میں رکاوٹ، پُرانا سوزاک، پتھری، بوڑھوں میں پراسٹیٹ گلینڈز بڑھ جانے کی وجہ سے بھی پیشاب میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، بعض دفعہ پیشاب کو زیادہ دیر روکنے سے مثانہ کے ڈھیلا پن، عورتوں میں بچہ دانی کے امراض سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے یا رک رک کر آتا ہے، کبھی پیشاب بالکل آتا ہی نہیں، پیشاب کی دھار بار یک ہو جاتی ہے، مریض کو پیشاب کی بندش سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔

طوakطری علاج :- مریض کے پیڑ و پر گرم پانی کا ترسٹرا دیں، بچوں میں شکایت ہو تو اکثر گرم پانی میں بٹھانے سے آرام آ جاتا ہے، بطور دوا گرین پوٹاسیم برد مائیڈ ایک اونس پانی میں گھول کر پلائیں، پراسٹیٹ گلینڈز بڑھ جانے سے یہ عارضہ ہو تو آپریشن ہی موثر علاج ہے، جو کہ ایک سرجن کر سکتا ہے، پیشاب پیدا نہ ہونے کی صورت میں پیشاب کھولنے کے لئے نہ تو ادویات دیں اور نہ ہی بار بار کیٹیٹر مثانہ میں ڈال کر پیشاب نکالنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس مرض میں گروہ بالکل پیشاب پیدا ہی نہیں کرتے، اس لئے گروہوں کے مقام پر خشک گلاس لگائیں یا سینک کر پیشاب کی رکاوٹ کے لئے مندرجہ ذیل نسخہ جات مفید ہیں :-

۱۔ الکلائن ڈائیوٹیک مسچر

پوٹاسیم سائیٹراس

۴ گرین

ٹنکچر ہائیوسم
واٹر

۳۰ منم
ایک اونس

یہ ایک خوراک ہے، کمزور مریضوں کو دوبار دیں، فارماکوپیا ہسپتال
ہائے سرکاری جدید کا کامیاب نسخہ ہے۔

۲۔ الکلائن ڈائیورٹیک مکسچر

پوٹاسیم سائٹریس ۳۰ گرین
سوڈیم بائیکارب ۳۰ گرین
واٹر ایک اونس

وی بے فارماکوپیا (پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں مروج

فارماکوپیا) کا مشہور پیشاب آور کامیاب نسخہ ہے۔

۳۔ الکلائن ڈائیورٹیک اینڈ انٹی سپازموڈک مکسچر

پوٹاسیم سائٹریٹ ۳۰ گرین
سوڈا بائیکارب ۳۰ گرین
ٹنکچر آف ہایوسم ۲۰ منم
واٹر ایک اونس تک

یہ پیشاب آور مکسچر درد گردہ، درد مثانہ کو دور کرنے کے علاوہ
پیشاب کی جلن دور کرنے کے لئے بھی مفید ہے۔ یہ پنجاب کے سرکاری
ہسپتالوں کے فارماکوپیا کا مشہور نسخہ ہے۔ نہایت اعلیٰ اور مفید
نسخہ ہے۔

۴۔ الکلائن پیشاب آور مکسچر

پوٹاسی سائٹریس ۲۰ گرین
لکریامینو ایسیٹاس ۲۰ منم
ٹنکچر آف ہایوسم ۲۰ منم
اکوا ایک اونس

میڈیکل کالج لدھیانہ میں مروج فارماکوپیا کا مشہور پیشاب آور
نسخہ ہے۔

۵۔ مکسچر پوٹاسی سٹراس

پوٹاسی سٹراس ۱۵ گرین
پوٹاسی بائیکارب ۱۰ گرین
پوٹاسی ایسیٹاس ۱۰ گرین
انفیوژن بکو ۱/۲ اونس

پیشاب آور، گردہ اور مثانہ کی صفائی کے لئے مفید ہے۔ یہ
کرسچین میڈیکل کالج لدھیانہ میں مروج ڈاکٹری فارماکوپیا کا مشہور نسخہ ہے۔

۶۔ مکسچر ایمونیا کلورائیڈ

ایمونیا کلورائیڈ ۱۰ گرین
سپرٹ آف اورنج ۱ ڈرام
اکوا ۱ اونس

پیشاب کی صفائی کے لئے یہ بھیجی کے ہسپتالوں میں مروج
فارماکوپیا کا نسخہ ہے۔

۷۔ سوڈا بائیکارب و بیلا ڈونا مکسچر

سوڈا بائیکارب ۳۰ گرین
پوٹاسی سائٹریس ۳۰ گرین
ٹنکچر بیلا ڈونا ۸ منم
ٹنکچر آف ہایوسم ۲۰ منم
پوٹاسی برومائیڈ ۱۵ گرین
پیرینٹ آیل ۱ منم
انفیوژن بکو ایک اونس

سوزش آلات بول، تویج، انٹریوں و پریٹ کے درد کے
لئے جمشید جی ٹاٹا گروپ کے ہسپتال ہائے بھیجی میں مروج ڈاکٹری فارما
کوپیا کا مشہور نسخہ ہے۔

۸۔ الکلائن مکسچر

پوٹاسی سٹراس ۱۵ گرین
پوٹاسی ایسیٹاس ۱۵ گرین
واٹر ایک اونس

امراض مثانہ کے لئے فارماکوپیا کنگ ایڈورڈ میموریل ہسپتال
بھبھی کا نہایت مشہور اور مفید نسخہ ہے۔

۹۔ ایمونیا کلورائیڈ مکسچر

ایمونیا کلورائیڈ ۳۰ گرین
ایکسٹریکٹ گلانی سرزہ لکھنؤ ۳۰ منم
سپرٹ کلوروفارم ۱۰ منم

پوٹاسیم سٹریٹ ۱۵ گرین
سپرٹ آف کلوروفارم ۱۰ منم
پانی ایک اونس
اُتر پردیش کے فارماکوپیا کے سرکاری ہسپتال کا مشہور نسخہ ہے۔

یہ نسخہ پیشاب آور کے ساتھ ساتھ ہاضم بھی ہے۔

۲۱/۲ ملی گرام کی ٹیکہ روزانہ یا ہفتے میں دوبار تازہ

پانی سے مریض کے مرض کے مطابق دیں، پیشاب رُک رُک کر یا درد سے یا قطرہ قطرہ آتا ہو یا رُک گیا ہو تو جاری ہو جاتا ہے۔

۲- ایسی ڈرکس (Esidrex) سہا ۲۵ ملی گرام کی ٹیکہ دن میں دو سے تین بار تازہ پانی سے دیں۔

۳- نیفرل (Nephrol) فز ۱۰ ایک ملی گرام دن میں ایک بار کھانا کھانے کے بعد تازہ پانی سے دیں، اس سے اگر سر

چکرائے، کمزوری و متلی ہو تو یہ دوا بند کر دیں۔

۴- ڈایامکس (Daimox) لیڈرے ایک ٹیکہ صبح تازہ پانی سے دیں، زیادہ مقدار میں لینا منع ہے، کیونکہ اس سے جسم

میں پوٹاسیم کی کمی ہو جاتی ہے۔

۵- ڈائی ایڈی مل (Di Ademil) ساراجائی یہ ایک اچھی پیشاب لانے والی دوائی ہے۔ ایک سے دو گولی صبح تازہ

پانی سے دیں۔

یونانی علاج :- گل ٹیسو پانی میں جوش دے کر نیم گرم پیڑ و پرنٹول کریں۔ مٹی کا نمک دیں، نہ ملے تو مٹیوں کو کاٹ کر پانی نکالیں اور

دو سے تین تولہ دن میں دو یا تین بار دیں، پیشاب کھولنے کے لئے نہایت کامیاب علاج ہے یا نوشادر پھلی پانچ رتی، ایک اونس پانی میں گھول لیں

چار خوراک بنائیں اور ہر تین گھنٹہ بعد ایک ایک خوراک دیں، پہلی یا دوسری خوراک سے پیشاب کھل جائے گا۔

مندرجہ ذیل تجربات نہایت مفید ہیں :-

۱- جو کھار، نمک مولی، قلمی شورہ، نوشادر پھلی، ریوند چینی ہر ایک چھ ماشہ، مصری دو تولہ، خوراک چار سے چھ ماشہ تک صبح و شام ہمراہ پانی دیں

پیشاب جاری کرنے کے لئے نہایت مفید علاج ہے۔

۲- جو کھار، نمک مولی، قلمی شورہ برابر وزن لے کر ڈیڑھ سے دو ماشہ تک بکری کے دودھ کے ساتھ کھلائیں، پیشاب کھولنے کے لئے مفید ہے۔

۳- نوشادر پھلی پانچ رتی ایک اونس پانی میں گھول لیں، چار خوراک بنائیں اور ہر تین گھنٹہ بعد دیں۔

۴- شورہ قلمی دورتی، چینی چھ ماشہ پانی کے ساتھ دیں۔

۵- جو کھار، ریوند چینی، شورہ قلمی، سولف، نمک مولی، ہر ایک ایک تولہ، مصری چار تولہ ملا کر سفوف بنائیں، خوراک چار ماشہ صبح و چار ماشہ شام

ہمراہ تازہ پانی استعمال کریں۔

۶- شورہ قلمی چھ ماشہ کو پیس کر پانی میں حل کر کے ایک کپڑے کی گدی بنا کر اس میں تر کر کے پیڑ و پر رکھیں۔

سفوف اندری جلاب :- شورہ قلمی، ریوند چینی ہر ایک سات ماشہ، جو کھار چھ ماشہ، زیرہ سفید ایک تولہ، چینی بارہ تولہ، سب دواؤں کو ٹ

چھان کر پیس ہوئی کھانڈ ملا لیں، خوراک چھ ماشہ ہمراہ لسی دودھ گائے یا بکری دیں، مڈر بول ہے، پیشاب کی رکاوٹ دور کرے، پیشاب کی نالی کے

واٹر ایک اونس
فارماکوپیا ہسپتال کے سرکاری جدید کا مشہور نسخہ ہے جو کھانسی
بدھنی اور امراض پیشاب کے لئے مفید ہے۔

۱۰- الکلائن مکسچر

پوٹاسیم بائی کاربونیٹ ۱۰ گرین

سودیم بائی کاربونیٹ ۵ گرین

ماڈرن ادویات :- ۱- اپری تاکس (Apri nox) بوٹس

پانی سے مریض کے مرض کے مطابق دیں، پیشاب رُک رُک کر یا درد سے یا قطرہ قطرہ آتا ہو یا رُک گیا ہو تو جاری ہو جاتا ہے۔

۲- ایسی ڈرکس (Esidrex) سہا ۲۵ ملی گرام کی ٹیکہ دن میں دو سے تین بار تازہ پانی سے دیں۔

۳- نیفرل (Nephrol) فز ۱۰ ایک ملی گرام دن میں ایک بار کھانا کھانے کے بعد تازہ پانی سے دیں، اس سے اگر سر

چکرائے، کمزوری و متلی ہو تو یہ دوا بند کر دیں۔

۴- ڈایامکس (Daimox) لیڈرے ایک ٹیکہ صبح تازہ پانی سے دیں، زیادہ مقدار میں لینا منع ہے، کیونکہ اس سے جسم

میں پوٹاسیم کی کمی ہو جاتی ہے۔

۵- ڈائی ایڈی مل (Di Ademil) ساراجائی یہ ایک اچھی پیشاب لانے والی دوائی ہے۔ ایک سے دو گولی صبح تازہ

پانی سے دیں۔

یونانی علاج :- گل ٹیسو پانی میں جوش دے کر نیم گرم پیڑ و پرنٹول کریں۔ مٹی کا نمک دیں، نہ ملے تو مٹیوں کو کاٹ کر پانی نکالیں اور

دو سے تین تولہ دن میں دو یا تین بار دیں، پیشاب کھولنے کے لئے نہایت کامیاب علاج ہے یا نوشادر پھلی پانچ رتی، ایک اونس پانی میں گھول لیں

چار خوراک بنائیں اور ہر تین گھنٹہ بعد ایک ایک خوراک دیں، پہلی یا دوسری خوراک سے پیشاب کھل جائے گا۔

مندرجہ ذیل تجربات نہایت مفید ہیں :-

۱- جو کھار، نمک مولی، قلمی شورہ، نوشادر پھلی، ریوند چینی ہر ایک چھ ماشہ، مصری دو تولہ، خوراک چار سے چھ ماشہ تک صبح و شام ہمراہ پانی دیں

پیشاب جاری کرنے کے لئے نہایت مفید علاج ہے۔

۲- جو کھار، نمک مولی، قلمی شورہ برابر وزن لے کر ڈیڑھ سے دو ماشہ تک بکری کے دودھ کے ساتھ کھلائیں، پیشاب کھولنے کے لئے مفید ہے۔

۳- نوشادر پھلی پانچ رتی ایک اونس پانی میں گھول لیں، چار خوراک بنائیں اور ہر تین گھنٹہ بعد دیں۔

۴- شورہ قلمی دورتی، چینی چھ ماشہ پانی کے ساتھ دیں۔

۵- جو کھار، ریوند چینی، شورہ قلمی، سولف، نمک مولی، ہر ایک ایک تولہ، مصری چار تولہ ملا کر سفوف بنائیں، خوراک چار ماشہ صبح و چار ماشہ شام

ہمراہ تازہ پانی استعمال کریں۔

۶- شورہ قلمی چھ ماشہ کو پیس کر پانی میں حل کر کے ایک کپڑے کی گدی بنا کر اس میں تر کر کے پیڑ و پر رکھیں۔

سفوف اندری جلاب :- شورہ قلمی، ریوند چینی ہر ایک سات ماشہ، جو کھار چھ ماشہ، زیرہ سفید ایک تولہ، چینی بارہ تولہ، سب دواؤں کو ٹ

چھان کر پیس ہوئی کھانڈ ملا لیں، خوراک چھ ماشہ ہمراہ لسی دودھ گائے یا بکری دیں، مڈر بول ہے، پیشاب کی رکاوٹ دور کرے، پیشاب کی نالی کے

خون کو دھو کر صاف کرتا ہے، قرص کے اندمال کے لئے مخصوص دوا دینے سے پہلے استعمال کرایا جاتا ہے۔

مجنون قرطم: مغز بیج قرطم، مغز بادام چھلے ہوئے، پھول گلاب، سنار کے پتے ہر ایک چھ تولہ، سفوف سوکھ ہر ایک دو تولہ، دار چینی ایک لہ، دانہ الائچی چھوٹی و بڑی ہر ایک ایک تولہ، انجیر ولایتی، سوز منقہ ہر ایک ۴۰ عدد۔

ترکیب تیاری: مغز بیج قرطم اور مغز بادام کو مقوڑا سا پانی ڈال کر علیحدہ پیس اور انجیر و منقہ کو دھو کر اس طرح علیحدہ پیس، باقی ادویہ کوٹ چھان سفوف بنائیں اور تین گنا خالص شہد میں پہلے مغزیات، انجیر، منقہ کا شیرہ شریک کر کے قوام بنائیں، بعد ازاں لقیہ دواؤں کا سفوف ملا کر مجنون تیار کریں۔

راک ۹ ماشہ ہمراہ عرق سولف دیں۔ مدر بول اور نبض کشا ہونے کے علاوہ معدہ کو تقویت دیتی ہے۔

شربت آلو بالو: آلو بالو آدھ سیرے کر دو سیر پانی میں رات کو بھگو دیں، صبح کو جوش دے کر مل چھان کر چینی سفید دو سیر ملا کر قوام بنائیں اور ٹھنڈا ہونے

تیلوں میں بھر لیں۔ خوراک دو سے چار تولہ ہمراہ عرق انناس دس تولہ یا پانی میں حل کر کے پلائیں۔ مدر بول ہے۔ پتھری گردہ و مثانہ کے لئے مفید ہے۔

شربت سکنجین بزوری محتدل: بیج کاسنی، سولف بیج کرنس ہر ایک تولہ، موٹا موٹا کوٹ کر ڈیڑھ سیر پانی اور چھ تولہ سرکہ انگوری خالص میں رات کو بھگو دیں۔

لو چینی سفید ایک سیر کے ساتھ قوام بنائیں، خوراک دو سے چار تولہ تک صبح کو عرق گاؤ زبان تولہ کے ساتھ پلائیں، پیشاب کھول کر لاتی ہے اور جگر دہلی کے فضلوں کو خارج کرتی ہے میں بھی مفید ہے۔

شربت انناس: انناس کا پانی ایک سیر، چینی سفید ڈیڑھ سیر، بطریق معروف شربت دیں، خوراک چار تولہ پانی میں ملا کر پیئیں۔ دل کو فرحت دیتا ہے اور پیشاب کھول کر ہے۔

کھار جو: جو کے سالم پودوں کو سایہ میں خشک کر کے بطریق معروف کھار حاصل جو کے سبز پودے اُس وقت کاٹے جائیں، جب سٹ لگ چکا ہو اور بیج نہ پڑا ہو، خوراک اسے ایک ماشہ۔ مدر بول اور مخرج بلغم ہے، کمزوری ہضم، یرقان، پتھری گردہ و مثانہ کے


لئے مفید ہے۔

پیشاب کی رکاوٹ کے لئے: سولف چار ماشہ، مغز خربوزہ، مغز کھیر، مغز، گوکھرو چھوٹا ہر ایک تین ماشہ۔ پانچ تولہ پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور چھ ماشہ کر لیں۔

دیگر: شورہ قلمی چھ ماشہ، جوہے کی میٹگنی ایک تولہ، پانی میں پیس کر لیپ بنا کر پیرو میں۔ پیشاب کی رکاوٹ کے لئے مفید ہے۔

پیشاب کی رکاوٹ کا جڑی بوٹیوں سے علاج

بالنسہ کے پتے ایک تولہ، قلمی شورہ تین ماشہ، بیج کاسنی چھ ماشہ، گھوٹ چھان کر پلائیں، اس سے پیشاب بکثرت جاری ہوتا ہے اور یرقان کے لئے بھی از حد مفید ہے۔



۲۔ کنگھی بوٹی کے پتے آدھ سیرے کران کو چار سیر پانی میں جوش دیں۔ جب آدھا پانی رہ جائے۔ تو صاف کر کے اچھی طرح پھولیں۔ پھر سنگ یہود دو تولہ کو اس پانی میں اچھی طرح کھل کر کے ٹکیاں بنائیں اور سایہ میں خشک کر لیں۔ اس ٹکیہ کو کنگھی بوٹی کے نغذہ میں رکھ کر گل حکمت کر کے پانچ سیر ایلوں کی آگ دیں کشنگ ننگ یہود تیار ہوگا، پیشاب کی بندش و پتھری کے لئے مفید ہے۔ خوراک ایک رتی کھلا کر اوپر سے گرم گرم دودھ ایک پاؤ کنگھی اڑھائی تولہ چینی اڑھائی تولہ ملا کر پلائیں۔ فوراً فائدہ ہوتا ہے۔

۳۔ اچار مولی چند دنوں تک متواتر کھلائیں، بندش پیشاب کے لئے از حد مفید ہے۔

۴۔ مولیوں کو کدو کش کر کے موٹے کپڑے میں چھان لیں۔ اور پانی کو کڑا ہی میں ڈال کر پکائیں۔ جب بالکل گاڑھا ہو جائے تو اٹار لیں۔ یہ ننگ مولی یا رب تیار ہے۔ بندش پیشاب و درد گردہ میں یہ ننگ ایک ماشہ سے تین ماشہ تک کھلائیں، نہایت ہی مفید ہے۔

۵۔ اگر مولی کا رس دو تولہ نکال کر پلائیں تو اس سے پیشاب کی بندش دور ہونے کے علاوہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے۔

آیور ویدک علاج :- موتر کرچھ کی آٹھ قسمیں ہیں :-

۱۔ وات یعنی ریح سے، ۲۔ پت یعنی صفرا سے، ۳۔ کف یعنی بلغم سے، ۴۔ تر دوش یعنی تینوں خلطوں سے، ۵۔ آگنتک یعنی بیرونی چوٹ و جوش سے، ۶۔ پریشج یعنی مٹی روکنے سے، ۷۔ پتھری گردہ یا مثانہ سے، ۸۔ شکرزج یعنی ویرج کو روکنے سے مرض موتر کرچھ ہوتا ہے۔

ریاحی موتر کرچھ کے لئے :- بیرونی نارائن تیل کی پیرد پر ماش کریں۔ خوراک ہینگ بریاں ایک تولہ، سونف چار تولہ، الاچی خورد و تولہ، گوکھرو چار تولہ، مغز خربوزہ چار تولہ، جو کھار ایک تولہ، ننگ سیندھا ایک تولہ، سب کو باریک کر کے سفوف بنائیں۔ اس میں سے بقدر ایک سے دو ماشہ درم میں دو یا تین بار گرم پانی یا عرق سونف سے کھلائیں یا ہینگ بریاں، جو کھار، قلمی شورہ برابر وزن لے کر دو درنی کی گولیاں بنائیں اور ایک سے دو گولی ہمارہ ع سونف یا گرم پانی دیں۔

صفراوی موتر کرچھ کے لئے :- مغز کھیرا ایک تولہ، لمبھی چھلی ہوئی تین ماشہ، دونوں کو ٹھنڈے پانی میں سردائی کی طرح گھوٹ کر چھان کر مہ ملا کر پلائیں، صفراوی موتر کرچھ کے لئے مفید ہے۔ اور ٹھنڈے پانی کے حوض میں بٹھایا جائے۔

بلغمی موتر کرچھ کے لئے :- سفوف گوکھرو خورد تین ماشہ، ہمارہ جوشاندہ سونٹھ چار ماشہ استعمال کرائیں، بلغمی موتر کرچھ کے لئے مفید ہے۔

تینوں خلطوں کے موتر کرچھ کے لئے :- جو کھار تین ماشہ، گڑ تین ماشہ، دونوں کو ملا کر گرم یا تازہ پانی سے دیں۔ نزد دوشج موتر کرچھ کیلئے مفید۔

حاد ثانی موتر کرچھ کا علاج :- حاد ثانی موتر کرچھ کا علاج بطور ریاحی موتر کرچھ کے کیا جائے اور جوادیات ریاحی موتر کرچھ میں لکھی گئی ہیں، مغی پاخانہ روکنے سے موتر کرچھ کا علاج :- روغن ارند (کیڑا تیل) چار تولہ، دودھ گائے نیم گرم میں پلائیں۔ قبض دور ہونے سے پیشاب بھی کھل جائے گا۔ جو کھار کا استعمال بھی مفید ہے۔

پتھری سے موتر کرچھ کا علاج :- بطور پتھری کے کریں اور گردہ کی پتھری میں جو نئے لکھے گئے ہیں۔ وہ اس مرض میں بھی مفید ہیں۔

ویرج روکنے سے موتر کرچھ کا علاج :- شلا جیت شدہ دورتی، شہد میں ملا کر استعمال کرائیں، ویرج کے باعث رکھا ہوا پیشاب کھل جاتا ہے۔

۲۔ گوکھرو خورد کا سفوف تین ماشہ روزانہ، مغز کھیرا کی سردائی کے ساتھ استعمال کرائیں، ویرج کے باعث موتر کرچھ ہو تو بہت مفید ہے۔

۳۔ ملاپ سے بھی یہ عارضہ دور ہو جاتا ہے۔

ہر قسم کے موتر کرچھ کے لئے آسان آیور ویدک نسخے

۱۔ جو کھار تین ماشہ، مہری چھ ماشہ، تازہ پانی کے ہمراہ کھلائیں، رکھا ہوا پیشاب کھل جائے گا۔

۲۔ جو کھارتین ماشہ، نو ماشہ شہد میں ملا کر کھلانے سے پیشاب کھل جائے گا۔

۳۔ کھیتی پانچ تولہ کا جو شانہ تیار کر کے اس میں ایک ماشہ جو کھار اور ایک رتی ہینگ ملا کر پلانے سے پیشاب کھل جاتا ہے۔

۴۔ کیکر کے نرم نرم پتے آدھا تولہ بطور سردائی کے گھوٹ کر پلائیں۔ پیشاب کھولنے کے لئے از حد مفید ہے۔

۵۔ چوبے کی مینگلیں پانچ تولہ، تلمی شورہ ایک تولہ، دونوں کو پیس کر پیڑ و پرلیپ کریں، پیشاب کھل جائے گا۔

علاوہ ازیں طب آیور وید میں ترنیترا اکھیر رس، دردنا آدی لوہ، موتر کرچھ انشک رس، کرچھ آتشک رس، کشا اولیہ بھی مفید ادویات ہیں۔

ہومیوپیتھک علاج :- پیشاب کی تشنجی روکاؤٹ، پیشاب کی فوری اور بے سود کوشش، درد مشانہ وغیرہ ہو تو "کینٹھرس" جب ہسٹریک کے دورہ بعد پیشاب رک جائے تو "اوپیم" کا استعمال مفید ہے۔ جب مشانہ میں بوجھ ہو، جنگاسہ میں در دیں ہوں، پیشاب کے نیچے خونی تپچھٹ بیٹھتی ہو اور مشانہ گردن میں گرمی محسوس ہو، پیشاب کی خواہش متواتر بنی رہتی ہو اور خاص کر جب کہ بخار بھی ساتھ ہو تو "ایکوناسٹ" کا استعمال مفید ہے۔ علاوہ ازیں مریض، رم پانی میں بڑا نا بھی بندش پیشاب کے لئے مفید ہے۔

کیٹھی ٹر سے پیشاب کی رکاؤٹ کا علاج

کیٹھی ٹر دراصل پیشاب نکالنے کی لچک دار ربر کی سلائی ہے، جس سے رکا ہوا پیشاب جاری کیا جاتا ہے۔ یہ سلائی مختلف قسم کی بنی ہوئی مارکیٹ میں ہیں۔ اور عام معالجین کو ہمیشہ نمبر ۸ تا نمبر ۱۰ کی ربر کی لچک دار سلائی ہی استعمال کرنی چاہیے۔ چاندی یا دھات کی کیٹھی ٹر ہمیشہ تجربہ کار ڈاکٹروں کے لئے ہیں اور عام طبیبوں کو اس کے استعمال کی جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ جس قدر مٹی سلائی داخل کی جائے گی، اسی قدر غلط سمت میں جانے کا خطرہ کم ہو گا۔

پیشاب کی نالی کے سوراخ کی تنگی کے باعث مٹا کیٹھی ٹر داخل نہ ہو سکے تو نمبر ۸ تا نمبر ۱۰ استعمال کریں۔ سب سے پہلے کیٹھی ٹر کو خوب اُبلتے پانی میں ڈال کر کر لیں اور پھر ویزلین سے خوب چکنا کر کے مریض کو پشت کے بل لیٹادیں گھٹے کھڑے کئے ہوئے ایک دوسرے سے فاصلہ پر ہوں۔ سلائی داخل کرنے کا سب سے پہلا مرحلہ مریض کی چار پائی کے بائیں طرف کھڑا ہو کر دائیں ہاتھ سے پیشاب کی نالی میں آہستہ آہستہ داخل کرتا ہے، اس سلسلہ میں دھیان ہے کہ کیٹھی ٹر کو اگر کوئی ٹکڑے محسوس ہو تو زور سے اندر داخل نہ کریں بلکہ ذرا پیچھے ہٹا کر دوبارہ پھر آہستگی سے داخل کریں، پیشاب کی نالی لگ بھگ آٹھ انچ لمبی ہوتی ہے اور جب کیٹھی ٹر اندر پہنچ جاتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ مشانہ کے اندر پہنچ گیا ہے اور پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔ پیشاب کا برتن دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھا جانا چاہیے، بعض دفعہ کیٹھی ٹر کے سرے والا چھدر (سوراخ) بند ہونے کے باعث پیشاب نہیں نکلتا۔ اس لئے کیٹھی ٹر کو پیشاب کی نالی میں داخل کرنے سے بھی طرح خوب صاف کر لینا چاہیے۔ نازک مزاج مریضوں کو کیٹھی ٹر کی برداشت کم ہوتی ہے۔ اس لئے نہایت احتیاط سے داخل کرنا چاہیے، بعض دفعہ سے سے بخار بھی چڑھ جاتا ہے۔

غذا و پینے :- غذائیں تلی و پیشاب آور چیزیں جیسے آتش جو، دودھ وغیرہ دیں، سویم گرم ہو تو دودھ سوڈے کا استعمال بھی مفید ہے۔

بے ارادہ پیشاب نکل جانا، سلس البول، انکانٹینیٹس آف یورین، (Incontinence of urine)

سوتے میں پیشاب نکل جانا، بول فی الفراش، بیڈ وےٹنگ، (Bed-wetting)

پیشاب کی جھڑی، سلس البول، ویسائیکل پریلےسس، (Vesical paralysis)

تعریف مرض :- اس مرض میں پیشاب روکنے کی طاقت زائل ہو جاتی ہے۔

وجوہات :- پیشاب کا بلا ارادہ کے جاری رہنا درحقیقت بذات خود کوئی مرض نہیں بلکہ یہ کمزوری مشانہ یا خراش مشانہ وغیرہ کی علامت ہے۔ پیشاب کی جھڑی کا باعث بھی عام طور پر مشانہ کا ڈھیلا پن ہے، بعض دفعہ جنرل کمزوری یا فالج سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے، بچوں میں پیٹ کے کیڑے، کا پنچ نکلنے یہ عارضہ ہو جاتا ہے اور بچہ بستر پر رات کو سوتے ہوئے پیشاب کر دیتا ہے۔

علامات :- ڈھیلا پن و کمزوری مشانہ کی تمام علامات موجود ہوتی ہیں، ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ جنرل کمزوری کے علاوہ کمزوری کی علامات موجود ہوتی ہیں۔ مریض نہایت ٹھکان محسوس کرتا ہے اور کم ہمت ہو جاتا ہے۔

ایلو پتھیک علاج :- سونے میں پیشاب نکل جانے کے عارضہ کے لئے ٹنکچر سیلا ڈونا مناسب مقدار میں دینا مفید ہے یا ٹنکچر سیلا ڈونا تین یا پوٹاسیم برومائیڈ تین گرین پانی میں گھول کر کھانا کھانے کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد دیں۔ دس سال کے بچے کے لئے یہ مقدار کافی ہے، جہاں تک ممکن ہو۔ اصل سبب مرض کو دور کریں۔ بچے کی عام صحت کو بحال کریں، اگر کمزوری اعصاب سے یہ عارضہ ہو تو الیگزڈامین بی کمپلیکس کا استعمال کریں یا ڈامین کمپلیکس عضلاتی طور پر انجکشن دیں، اگر بچے کو یہ عارضہ ہو تو اسے زرد کو ب نہ کریں بلکہ رات کو پیشاب کر کر سلائیں اور انعام وغیرہ کی تحریک دے کر بے پیشاب کرنے سے رکھیں، بے ارادہ پیشاب نکل جانے (سلس البول) کے لئے گرم، قابض اور مقوی مشانہ ادویات استعمال کریں۔ علاج بطور کمزوری گردہ کے کریں۔

یونانی علاج :- بچہ کو گردٹ کے بل سلانا چاہیے اور گو لہے کا حصہ نیچے گدی یا تکیہ دے کر قد سے اونچا رکھیں، سونے سے پہلے پیشاب کر دینا چاہیے، جب رات کو بچہ دو گھنٹے تک سوچکے تو اسے جگا کر پیشاب کرادیں۔ چھوٹے بچوں کو دن کے وقت ہر تین گھنٹے بعد پیشاب کرانے عادت ڈالیں۔ عام حالات میں تیل کی ریوڑیاں، تیل کی گزک اور تیل کے لڈو کھانے سے ہی یہ عارضہ دور ہو جاتا ہے۔ بطور دوا مندرجہ ذیل مفید ہیں :-

کشتہ بریضہ مرغ :- سیلان منی دودی، سیلان الرحم اور سلس البول کے لئے نافع ہے۔ مرغی کے انڈوں کے چھلکے نمک کے پانی میں گھسنے سے رکھیں، پھر ہاتھوں سے خوب مل کر دھوئیں تاکہ اندر دنی چھلی دور ہو کر چھلکا صاف ہو جائے۔ اس کے بعد ایک چینی کے برتن میں ڈال کر سرکہ اتنا ڈالیں کہ تین انگلی اوپر ہے، جب سرکہ خشک ہو جائے تو نکال کر کوزہ گلی میں گل حکمت کر کے خشک ہونے پر اینٹ یا چوڑے کی بھٹی میں رکھ کر ٹھنڈا ہونے پر نکال لیں اور پیس لیں۔ خوراک ایک رتی بڑوں کو استعمال کریں۔ اینٹ یا چوڑے کی بھٹی کے علاوہ اُپلوں کی آگ میں بھی کشتہ تیار ہیں۔ چھوٹے بچوں کو نہ دیں۔

معجون فلاسفہ :- سونٹھ، مروج سیاہ، پپلی، دارچینی، آمہ شدہ، چھلکا بہیڑہ، شیطرح ہندی، زراوند مد جرح، خضتہ الشلب، مغز حلقوز، بابونہ ہر ایک تین تولہ، بیج بابونہ ڈیڑھ تولہ، مویز منقہ ۹ تولہ۔ ان دواؤں کو کوٹ کر چھان لیں اور تین گنا شہد خالص کے توام میں معجون تیار کر خوراک چھ ماشہ صبح کو پانی یا دودھ سے دیں۔ بوڑھوں یا سرد مزاج مریضوں کو موافق ہے۔ دودھ گائے سے اس کا مضر اثر دور ہو جاتا ہے، گرم مزاجوں کے لئے ضرر ہے۔ یہ طب یونانی کی مشہور و مقبول دوا ہے۔ ہاضمہ کو درست کرتی ہے، بھوک لگاتی ہے۔ جوڑوں کے درد، درسیان، بار بار پیشاب آنے کو مفید ہے۔ مولہ منی اور مقوی بھی ہے۔ منہ کی بدبو زائل کرتی ہے۔

سفوف ماسک البول :- پھول انار، پشکڑی سفید ہر ایک پانچ ماشہ، گوند کیکر، دھنیا خشک بریاں، گل ارمنی ہر ایک دس کندراڑھائی تولہ، بلوط چار تولہ، سب کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں۔ خوراک بڑوں کے لئے چھ ماشہ، بچوں کو ایک سے دو ماشہ عمر کے دیں۔ مفید ہے۔

دیگر :- جفت بلوط پانچ تولہ، گوند کندر پانچ تولہ، تل سفید پانچ تولہ، سب کا سفوف بنائیں، بچے کو ایک سے دو ماشہ بڑے کو

زیادتی پیشاب کے لئے مفید ہے۔

دیگر:- پھول انار، مائیں چھوٹی، گوند لیکر دھنیاں بٹنا ہوا، تل کا لے، گڑ، بقدر ضرورت۔ پہلی پانچ دواؤں کا سفوف بنالیں اور گڑ بقدر ضرورت ملا لیں۔ بمقدار چھ گرام استعمال کرائیں۔

دیگر:- سنگھاڑہ خشک، چینی برابر، چھ ماشہ، دن میں دو بار دیں۔

دیگر:- انار کی چھال سفوف بنا کر تین ماشہ رات کو سوتے وقت استعمال کرائیں۔

علاوہ ان میں معجون کنر پانچ ماشہ یا جوارش جالینوس چھ ماشہ ہمراہ عرق سولف آٹھ تولہ کھلائیں۔ بڑوں کے لئے یہ نسخہ بہت ہی مفید ہیں۔

چھوٹے بچوں کیلئے سوتے میں پیشاب نکل جانے کیلئے مفید نسخے

۱۔ مصہاگی رومی تین رتی، کنر تین رتی، گل قند شہد والا ۹ ماشہ ملا کر روزانہ کھلائیں۔

۲۔ تل کا لے، اجوائن، کوٹ کر برابر گڑ ملا کر لڈو بنائیں اور مناسب مقدار میں کھلائیں۔

۳۔ تل کا لے بھون کر گڑ کے ساتھ لڈو بنائیں اور بچہ کو کھلائیں۔

۴۔ چھلکا ہڑ زرد، چھلکا ہڑ، چھلکا آملہ، پھول انار، جفت بلوط، پھول گلاب ہوزن سفوف بنائیں اور روغن گل سے چرب کریں اور تین گنا مصری کے قوام میں ملا دیں اور دو ماشہ کے قریب بچہ کو کھلائیں۔

۵۔ کنر، پھول انار، ہر ایک ساڑھے چار ماشہ، مصطکی ساڑھے تین ماشہ، پیس کر شہد کے ساتھ معجون بنائیں، بچوں کو ایک سے دو ماشہ تک دیں۔

۶۔ مغز اخروٹ ایک حصہ، کشمش دو حصہ بقدر مناسب کھلائیں۔

۷۔ چھوٹے (نخود) بھونے ہوئے ہمراہ شکر تری ملا کر پانچ یا چھ ماشہ کھلائیں۔

۸۔ خشخاش سفید دو تولہ، مصری دو تولہ، سفوف بنائیں اور دو سے تین ماشہ حسب عمر کھلائیں۔

۹۔ مازہبزر ایک عدد، بیج ریحان چھ ماشہ، سفوف بنائیں اور چار رتی سے ایک ماشہ بچے کو کھلائیں۔

اس سلسلہ میں بچے کی خوراک میں خاص احتیاط کریں، غذائیں مرطبات کا استعمال کم کر دیں۔ رات کو زیادہ پانی اور دودھ نہ دیں، بچے کو گرم بستر اور گرم مکان میں سنانے کا انتظام کریں، بستر کی پائنتی سرہانے کی نسبت ذرا اونچی رکھیں۔ سونے سے پہلے بچے کو پیشاب کرائیں، رات کو کسی وقت جگا کر پیشاب کرا دیا کریں۔ اس کو ہدایت کریں کہ جب دن کے وقت اس کو پیشاب کی بار بار حاجت ہو تو وہ کچھ عرصہ کے لئے پیشاب روکنے کی کوشش کرے۔ تاکہ پیشاب کا آنا اس کے اختیار میں ہو جائے۔ رات کے وقت چت لیٹنے سے پرہیز کرائیں۔ اگر عضو تناسل کے گھونگھٹ میں میل جمع ہو رہی ہو تو اسے صاف کر دیں۔ اگر پیٹ کے کیڑے یا شانہ کی بھری اس کا سبب ہو تو اس کا علاج کریں۔ عام طور پر یہ مرض بڑے ہونے پر خود بخود بھی غائب ہو جاتی ہے۔ کیونکہ شانہ میں قوت آ جاتی ہے۔

ہومیو پیتھک علاج:- بطرز عارضہ گروسے کی لاغزی (براٹ ڈسیزیز Bright-Disease) کے کریں، جس کا اندراج پہلے کیا جا چکا ہے۔

موترنلیکا پر واہ، پیشاب کی جلن، سیمپل یوریتھرائٹس

(Simple Urethritis Ardor Urine)

تعریف مرض:- اس مرض میں یوریتھرائٹس (احلیل) میں سوجن ہو جاتی ہے۔ دراصل یہ مرض ورم شانہ سے وابستہ ہے۔ جس کا ذکر پہلے کیا

جا چکا ہے۔

وجوہات :- دراصل یہ بذاتِ خود کوئی مرض نہیں ہے۔ اس کا اصل سبب دریافت کریں۔ عورتوں میں اس کا سبب بڑا سبب ادھور ملاپ یا جلق ہوتا ہے۔ جو اعلیل کے اندر اور ارد گرد امتلاز دموی کی وجہ سے درم کی حالت پیدا کر دیتے ہیں اور یہ عارضہ مردوں کی نسبت عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے۔

علامات :- پیشاب میں جلن اور پیشاب کی نالی میں سوجن ہوتی ہے۔ مریض کو پیشاب کرتے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے۔
علاج :- دیسی طریقہ علاج میں شیرہ تخم خیارین، شیرہ خارخسک، شیرہ بیج خربوزہ ہر ایک تین ماشہ، پانی میں نکالیں اور شربت برزوری چار تولہ ملا کر پلائیں۔ ایلو پیتھک، آیور ویدک اور ہومیو پیتھک علاج بطرزوم مشانہ کے کریں۔
غذا پر ہیز :- گوشت، انڈہ، لال مرچ، مینگن، مچھلی، دال مسور اور مصالحہ دار غذاؤں سے سخت پرہیز کریں۔ شراب نہ پینے دیں اور ملاپ سے بھی پرہیز ضروری ہے، فدا زود ہضم اور مقوی استعمال کی جائے۔

موتردوشی جوڑ، پیشاب کا زہر، یوے میا، (URAMIA)

تعریف مرض :- آلاتِ بول کے امراض کی وجہ سے پیشاب مشانہ سے خارج نہ ہونے کی وجہ سے خون کا زہر یا مادہ بدن میں جمع رہنے سے یا مشانہ سے خون میں جذب ہونے کی وجہ سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

وجوہات :- گردہ کے امراض سے پیشاب پیدا ہونا کم ہو جائے یا مشانہ و مجری بول کے امراض میں اس کا اخراج بند رہے یا مشانہ میں دیر تک رکا ہے تو اس کا زہر خون میں جذب ہو کر یوے میا کا عارضہ پیدا کر دیتا ہے۔

علامات :- سر میں شدت کا درد، سانس میں شکر کی بو، منہ میں عفونت، غنودگی، ہڈیاں، تشنج اعصاب، پھٹوں میں درد، سانس، نظر اور سننے کی طاقت میں بھی فرق ہو جاتا ہے، بعض اوقات تھکے، متلی اور دست ہو کر جسم کے بعض حصوں میں فالج کا اثر ہو جاتا ہے۔

علاج :- جس مرض کی وجہ سے یوے میا کا عارضہ پیدا ہوا ہے۔ اس کا علاج کریں، مشانہ پر سینک کر انہیں، گرم پانی میں بٹھائیں، اگر مشانہ میں پیشاب بند ہے تو کیتھیٹر داخل کر کے پیشاب نکال دیں، ہلکے مدرات کا استعمال کریں، شیرہ تخم خیارین چھ ماشہ، شیرہ سولف پانچ ماشہ، شیرہ خارخسک چھ ماشہ، پانی میں شیرہ نکال کر شربت برزوری دو تولہ ملا کر پلائیں، گردوں کے مقام پر خالی گلاس لگائیں۔

ڈاکٹری طریقہ علاج میں میگنیشیا سلفاس چار ڈرام پانی میں حل کر کے گھنٹہ گھنٹہ بعد پلائیں، یہاں تک کہ خوب کھل کر دست آنے لگیں۔
پائلوکارپین (Pilocarpin) سے ۱/۸ سے ۱/۴ گرین کی زیر جلد سچکاری کریں۔ یہ پسینہ و پیشاب آدر ہے۔ دل کو کمزور کرتی ہے، لہذا اس کا ٹیکہ احتیاط سے کرنا چاہیئے۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ بذریعہ لمبرینکچر (نخاعی شگاف) کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ علاج ایک مستند و ہوشیار ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے، گردوں کے مقام پر سینک کریں، خشک گلاس لگائیں اور گرم تر چادر میں مریض کو لپیٹیں، تاکہ پسینہ کھل کر آجائے، پوٹاش ایسی ٹاس پندرہ گرین، پوٹاشیم سائٹراس پندرہ گرین، لائیوڈارامیو نیاس ایسی ٹاس ایک ڈرام ایک اونس ہر تین گھنٹہ بعد دیں۔ کمزوری میں گلوکوز کی وریدی سچکاری کریں۔

۲۔ پوٹاشیم سٹراس ۲۰ گرین، ہڈیم بائیکارب ۲۰ گرین۔ واٹر ایک اونس، یہ پیشاب آور کسچر ہے۔



۳۔ پوٹاسیم سائٹریٹ ۳ گریں، سوڈا بائی کارب ۳ گریں، پنچر آف ہالوسم ۳۰ سم، پانی ایک اونس تک، یہ پیشاب درد دور کرنے والی اور پیشاب لانے والی دوائی ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب کی بندش میں دی گئی ادویات بھی استعمال کی جاتی ہیں۔

۴۔ خون اور بافتوں کا فوری طور پر زہر لایا اثر دور کرنے کے لئے "پیرسٹن این کا انجکشن" ویدی لگایا جاتا ہے۔ یہ انجکشن فوری طور پر انفیوژن بوتل میں دستیاب ہوتا ہے اور بہت سے سرایتی امراض خناق و بانی، کزاز، زحیرتپ محرقہ، غذا کا زہر، دوا کا زہر، جگر کے دبائی امراض میں مفید ہے، علاوہ ازیں یہ انجکشن پیشاب کھولنے، گردہ کی سوجن اور پیشاب کے زہر کو دور کرنے میں بھی مفید ہے۔ غذا و پرہیز۔ فے اور متسی کے دقت سنگترے یا مٹے کا عرق، دودھ سوڈا، آتش جو اور عام حالات میں دودھ بہترین غذا ہے، تیل کی اور گرم چیزوں سے سخت پرہیز کریں۔

رکت موثر، پیشاب میں خون آنا، ہیمے ٹوریا، (Hematuria)

تعریف مرض :- اس مرض میں پیشاب کے ساتھ خون مل کر آتا ہے۔

وجوہات :- گرم چیزوں کا زیادہ استعمال، درم گردہ، گردہ دھانہ کی پھتری، مٹانہ یا گردہ کی رسولی، بوا سیر کے خون کی بندش، عورتوں میں ایام کی رکاوٹ، چوٹ یا سخت سردی لگنے، مکھی اور نارہین کے زہر وغیرہ سے بھی پیشاب میں خون آنے لگتا ہے۔

علامات :- خون پیشاب سے پہلے یا پیچھے پیشاب کے ساتھ ملا ہوا یا کرتا ہے کبھی پیشاب کی بجائے خالص خون بھی آتا ہے۔

تشخیص مرض :- خون کا پیشاب کے شروع میں آنا، اچیل اور نازہ میں مرض کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ پیشاب اور خون ملا ہوا آئے، تو گردہ سے آنے کی علامت ہے، مٹانہ سے جب آتا ہے تو اکثر پیشاب کے آخری حصہ میں آتا ہے۔ گردہ سے خون آنے کی صورت میں خون کا رنگ سیاہی مائل ہو گا۔ گردہ کے زخم میں پیپ اور چھلکے خارج ہوتے ہیں اور گردوں کے مقام پر درد ہوتا ہے۔

علاج ڈاکٹری :- پیشاب میں خوردبین کی مدد سے خون کے ذرات تشخیص کئے جاسکتے ہیں۔ مریض کو آرام سے لیٹر پر لیٹا نا بہت ضروری ہے۔ کیلیم لکٹیٹ ۱۵ سے ۲۰ گریں تک ہمراہ پانی دیں، خون بند کرنے کے لئے پنچر آف اوپیم کا استعمال مناسب مقدار میں بہت مفید ہے، مندرجہ ذیل ادویات بھی اس مرض کا موثر علاج ہیں۔

۱۔ ہیموپلاسٹین (Hemoplastin) یہ بی، ڈی کمپنی کی تیار کردہ ہیموسٹیک سیرم (Hemostatic-serum) ہے۔ جسم کے کسی حصہ میں سے خون نکل رہا ہو تو اس کو روکنے کے لئے نہایت مفید ہے۔ اس کا ٹیکہ عام طور پر دوسری سی کی مقدار میں زیر جلد یا عضلاتی کیا جاتا ہے۔

۲۔ کوآگولین (Coagulin) یہ سببا کمپنی کے خون سے تیار کردہ انجکشن ہیں۔ جسم کے کسی حصہ سے جریان خون ہو رہا ہے۔ اس کے ٹیکے سے رگ جاتا ہے۔ خونی پیشاب کے علاوہ بوا سیری خون، کثرت ایام، خونی فے اور معدے و انتڑیوں سے خون گرنے کے لئے از حد مفید ہے۔ ایک سے پانچ سی سی یا زیر جلد عضلاتی دیں۔

۳۔ سٹیپٹین (Stypticin) :- جسم کے کسی حصہ سے جریان خون روکنے کے لئے بہت مفید انجکشن ہیں۔ مارکیٹ میں مختلف کمپنیاں اسے مختلف ناموں سٹیپٹین گان (Styptigon)، سٹیپٹین (Styptin) اور سٹیپٹال (Styptol) ناموں سے فروخت کرتی ہیں۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ روٹین (Rutin) برٹش ڈرگ ہاؤس — پشیاہ میں خون آنے، خون بہنے اور شریاؤں کی سختی میں مفید ہے۔
۲۔ وٹامن 'کے' (سینکاوٹ - روش) ایک سی سی کا عضلاتی انجکشن کرنا، خون کے پشیاہ کو روکنے کے لئے مفید ہے۔ یہ وٹامن 'کے' کی خامی سے خون آنے میں از حد مفید ہے۔

۳۔ وٹامن سی (سی لین - گلیکسو) .. اعلیٰ گرام امپول عضلاتی انجکشن دیں۔ خونی پشیاہ یا بول الدم میں از حد مفید ہے۔
۴۔ سٹیپٹوبیون (Styptobion) ای مرک — ایک دو گولی دن میں تین بار دیں۔ ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی خون آنے کو روکنے کے لئے از حد مفید ہے۔

یونانی علاج :- ۱۔ دم الاخوان ایک تولہ، گل ارمنی دو تولہ، سنگ جراحی دو تولہ، گیر و ایک تولہ، رب کاسفون بنا کر رکھیں اور تین ماشہ پانی کے ساتھ ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔
۲۔ انار کی کلیاں دو یا تین عدد رگڑ کر اور کھانڈ ملا کر دیں۔

۳۔ کتھہ گلابی سفوف بنا کر دو ماشہ کی مقدار میں ہمراہ دہی ایک چھٹانک دیں۔
مندرجہ ذیل مجربات خونی پشیاہ کے لئے از حد مفید ہیں :-

کشتہ سنگ جراح :- برگ نیم سبز ایک پاؤ کے بھرتہ میں سنگ جراح پانچ تولہ رکھ کر اوپر کپڑی کر دیں اور ہوا سے بچا کر دس سیراپلوں کی آگ دیں۔ سرد ہونے پر نکال لیں، مٹیالے رنگ کا چمک دار کشتہ تیار ہوگا، خوراک دو سے تین رتی، خونی پشیاہ، خونی قے، خونی بوا سیر کے لئے از حد مفید ہے۔
دوائے خونی پشیاہ :- گل ارمنی، سنگ جراحی ہوزن لے کر کھل کر کے محفوظ رکھیں، خوراک ایک ماشہ ہمراہ پانی، خونی پشیاہ و کثرت ایام کے لئے نہایت مفید ہے۔

دیگر :- پھول پلاس ساڑھے چار تولہ کورات بھڑف گلی میں بھگو دیں اور صبح آب زلال سے کرختوڑی مصری ملا کر پیئیں، آرام ہوگا۔
کشتہ عقیق :- عقیق سرخ کو آگ میں گرم کریں اور دھما سے بوٹی کے رس میں یہاں تک سرد کریں کہ کھڑے ہو جائے۔ پس کر دھما سے کے رس میں کھل کر کے ٹکیہ بنائیں اور دس سیراپلوں کی آگ دیں۔ یہ عمل سات بار کریں، عقیق کا کشتہ تیار ہوگا۔

فوائد :- خونی پشیاہ، خونی دست، کثرت ایام، خونی قے، پھیپھڑے سے خون آنا وغیرہ کے لئے مفید ہے۔ مردہ اور جگر کو تقویت دیتا ہے۔
آیور ویدک علاج :- بطر یونانی طریقہ علاج کے کریں۔ کشتہ سنگ جراحی کا استعمال از حد مفید ہے۔

ہومیوپیتھک علاج :- کینتھرس ۳۰ (Cantharis 30) جب کہ پشیاہ درد اور تکلیف سے آئے۔ پریٹ کے نچلے حصہ میں کلٹنے والی تشویش دردی ہوں۔ پشیاہ کے ہمراہ خون ملا ہوا آئے، یا خون متوازن خارج ہو تو بہت مفید ہے اور مرکوریس ۱۲ (Mercurius-12) عمدہ ادویات ہیں۔
بالوکیک طریقہ علاج میں میٹرم فاس، میٹرم سلف اور سلیشیا بہترین ادویات ہیں۔

قدرتی علاج :- چھوٹا کر یا پانی میں پس کر اور چھان کر چند دن مرین کو پلائیں۔
غذا پر مبنی :- دودھ، چاول، کچھڑی، کدو، خرفہ کا ساگ، تلی، ٹینڈا، مونگ کی دال، وغیرہ دیں۔ تیز مرچ، انڈہ، گوشت، چائے اور شراب وغیرہ سے سخت پرہیز کریں۔

زیادہ گرم مصالحے، پکڑے، اچار، میٹھی میٹھیوں وغیرہ سے بھی بچاؤ ضروری ہے۔ سیب، پپیٹ، بری توری، پیٹھا، مونگ، پانک، استعمال کر سکتے ہیں۔

مدھومیہ، پیشاب میں شکر آنا، ذیابیطس شکاری، ڈایا بیٹیر میلیٹس (Diabetis-Mellitus)

تعریف مرض :- اس مرض میں شکر آمیز پیشاب بکثرت آتا ہے اور جسم لاغر و کمزور ہو جاتا ہے۔

وجوہات :- جرمنی کے مشہور ڈاکٹر کوہنم نے اپنے وسیع تجربات سے ثابت کر دیا ہے کہ بلبہ کی اندرونی رطوبت (ہارمون) ناقص پیدا ہونے سے یا کسی وجہ عضلات تک نہ پہنچنے سے عضلات میں شکر کا تغذیہ نہیں ہوتا بلکہ گردوں کی راہ سے پیشاب خارج ہو جاتا ہے نیز کسی حیوان کے جسم سے بلبہ کو نکال دیا جائے تو اس کو فوراً شکر آنے لگتی ہے، اس مرض کے اسباب میں یہ خاص دلیل ہے، علاوہ ازیں زیادہ شراب پینے، نشا سنا دار چیزوں کے زیادہ استعمال کرنے، ملاپ کی زیادتی، زیادہ دماغی محنت، حرام مغز کے امراض، بلبہ کا چھوٹا ہو جانا، منوئیہ، معیادی بخار، موسمی بخار (ملیریا)، بواسیر، انٹریوں کے امراض، گردہ کے عوارض، بعض میڈیکل کھاریوں نے ان ہی اسباب کے پیش نظر اس مرض کی مندرجہ ذیل اقسام بیان کی ہیں :-

- ۱۔ ذیابیطس معوی :- یہ مرض زیادہ شکر خوری اور آنتوں کے نقائص سے پیدا ہوتا ہے۔
- ۲۔ ذیابیطس کبدی :- یہ مرض جگر کی خرابی، زیادہ خوراک و زیادہ شراب پینے سے پیدا ہو جاتا ہے۔
- ۳۔ ذیابیطس عضبی :- یہ مرض زیادہ دماغی محنت، زیادہ جنسی ملاپ کرنے، سرد و یرطہ پر چوٹ لگنے سے پیدا ہو جاتا ہے۔
- ۴۔ ذیابیطس عضبی و کبدی :- یہ عارضہ جگر و اعصاب کی خرابی سے پیدا ہوتا ہے۔
- ۵۔ ذیابیطس نفرا سی :- یہ مرض بلبہ کے نقص یعنی چھوٹا ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں مریض بالکل کمزور ہو جاتا ہے، بعض دفعہ عورتوں میں بچہ دانی کے امراض اور ہسٹیریا بھی اس کا خاص سبب ہوتے ہیں۔

علامات :- پیشاب شکر والا آتا ہے، زیادہ پیاس لگتی ہے۔ منہ خشک اور جسم بالکل کمزور ہو جاتا ہے، مردوں میں مردی قوت ختم ہو جاتی ہے، اور عورتوں میں ایام کا آنا بند ہو جاتا ہے، جسم پر پھوڑے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، مریض جہاں پیشاب کرتا ہے۔ وہاں فوراً ہی کپڑے کھوڑے جھج جاتے ہیں، پیشاب میں گھاس کی بو آتی ہے، شکر کی مقدار دو اڑھائی فیصدی سے لے کر دس اور بارہ فیصدی تک ہوتی ہے۔ اور پیشاب کا وزن مخصوص ۱.۰۲۵ سے ۱.۰۷۰ تک ہو جاتا ہے، جلد کھردری رہتی ہے، پھوڑے و کارنیکل نکلتے ہیں۔ مریض زیادہ خوراک کھاتا ہے۔ مریض کے مزے بھی شکر کی بو آتی ہے۔ اس مرض کی تشخیص کے لئے تین خاص علامات یہ ہیں :-

- ۱۔ پیشاب میں شکر آنا، ۲۔ پیاس و بھوک زیادہ لگنا، ۳۔ جسم کا لاغر و کمزور ہوتے جانا۔

اس مرض میں اگر توجہ سے علاج کیا جائے تو جلد آرام آ جاتا ہے۔ ورنہ آنکھوں میں موتیا پند ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ نظر ختم ہو جاتی ہے بعض دفعہ رست، شدید کمزوری یا قومائے ذیابیطس سے مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں اگر گردوں میں دم ہو جائے، پیشاب میں البیوس آنے لگے یا مریض کو تپ دق یا منوئیہ ہو جائے تو انجام خراب ہوتا ہے۔

قومائے ذیابیطس :- ذیابیطس کے نوجوان مریضوں اور قبض میں مبتلا اشخاص کو قومائے ذیابیطس کی شکایت ہو جاتی ہے، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ پہلے پیشاب کم آتا ہے اور شکر بھی کم خارج ہوتی ہے، نبض سریع اور کمزور ہوتی ہے، بدن سرد اور پیٹ میں درد ہوتا ہے، قومائے ذیابیطس کے علاج میں یہ نکتہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر مریض کے مزے شکر کی بو آرہی ہے۔ اور خون میں شکر کی زیادتی ہے تو اس کو خون سے اعصار کی طرف ہذب اور تبدیل کرنے کے لئے انسولین کا استعمال نہایت مفید ہے۔ اگر خون میں شکر کم ہے تو منہ کے راستے شکر یا دیریدی پچکاری کے ذریعے انگوری شکر (گلوکوز) کا استعمال کیا جائے۔ شدید قومائے ذیابیطس (Diabetic coma) میں مریض کی زندگی اور موت سے جنگ ہوتی ہے جس میں خون

کی شکر پر انسولین کی مناسب مقدار سے قابو پالینا نہایت ضروری ہے، لیکن خون میں شکر کی مقدار کا اندازہ بار بار کئے بغیر انسولین کی زیادہ مقدار جاری رکھنے سے نامعلوم طور پر قوتائے ذیابیطسی تبدیل ہو کر ہائپوگلیکائی سیمیا (Hypoglycaemia) ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لئے مریض کا با احتیاط علاج ضروری ہے۔ علاج ڈاکٹری :- انسولین ذیابیطس شکر کی خاص علاج ہے۔ یہ نیکریاس (بلیہ) کا جوہر ہے جو کئی محلول کی صورت میں بذریعہ جلدی انجکشن استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر سادہ انسولین، زنک انسولین اور گلوکون انسولین کی صورت میں استعمال ہوتی ہے، مقدار انجکشن ۵ سے ۱۰ یونٹ شکر کی مقدار کے مطابق کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ پہلے صبح و شام بذریعہ جلدی انجکشن استعمال کیا جاتا ہے اور پھر حالات مریض کے مطابق مقدار آہستہ آہستہ بڑھائی جائے۔ اگر انجکشن لگانے کے بعد گھبراہٹ یا دل کی دھڑکن معلوم ہو یا آنکھوں کے آگے اندھیرا آجائے تو فوراً گلوکوز ایک اونس، اگر یہ نیند تو دیسی شکر کا شربت پلائیں یا چینی کا استعمال کریں، اگر انسولین کی مقدار زیادہ حل ہو جائے تو چینی، گلوکوز یا شکر کا استعمال کریں اور ڈرینالین آدھ سے ایک سی سی کا انجکشن لگائیں۔

انسولین کا استعمال شروع کرنے سے پہلے اس بات کی کوشش کی جائے کہ غذا میں اصلاح کرنے سے شکر کا آنا موقوف ہو جائے، اس غرض کے لئے مریض کے لئے ایسی غذا تجویز کی جائے جس کی کیلوری طاقت ۱۵۰۰ ہو۔ اس کے بعد غذا جسمانی ضرورت کے مطابق بڑھائی جائے، نشاستہ غذاؤں کو ایک دم چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے مریض کمزور ہو جاتا ہے۔ البتہ مریض مٹا ہو تو جب تک جسمانی وزن درست نہ ہو جائے یہ پرہیزی غذا جاری رکھی جائے، معمولی مرض میں صرف اس پرہیزی غذا سے بھی آرام آ جاتا ہے۔ مٹا ہو تو اس پرہیزی غذا سے بھی فائدہ نہ ہو تو انسولین کا استعمال کیا جائے۔

پینٹنٹ ادویات میں پنکیریاپے ٹین (Pancreatin)، پنکریزال، انٹی ڈایا بیٹین، ڈایا ملین، ٹریپوجن وغیرہ بہترین ادویات ہیں، تازین علاج میں نکوٹینک ایسڈ چار سو سے پانچ سو ملی گرام دن میں دوبار دینا مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کے استعمال سے انسولین کم مقدار سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔

مادرین ادویات :- ۱۔ انسولین (Insulin) چار قسم کی ہوتی ہے :-

(1) Plain insulin (2) Protamine zinc insulin (P. Z. I)

(3) Insulin lente (Isophane) (4) Ultra lenisemilente Insulin.

یہ مندرجہ ذیل کمپنیوں کی ملتی ہیں :-

بولٹس - بی، ڈی، ایچ کمپنی - ہلی کمپنی - ساراجائی کمپنی - مرک کمپنی - بی، ڈبلیو کمپنی - الملبیک کمپنی وغیرہ۔

اس کی مقدار انجکشن مرض کے مطابق دس یونٹ سے چالیس یونٹ یا اسٹی یونٹ تک ہو سکتی ہے، انسولین کا انجکشن زیر جلد کیا ہے۔ انسولین کو ہمیشہ ریفریجریٹر میں رکھنا چاہیئے اور انسولین کا لیبل معیار دگر کرنے کی دھیان میں رکھ کر اور سولیوشن کی یونٹ نہ کرنی چاہیئے۔

انسولین کے زیادہ استعمال سے انسولین کا رد عمل پیدا ہو سکتا ہے، مثلاً عصبی چرچڑاپن، کمزوری، بے خوابی، تو مایہ وغیرہ عمل کو دور کرنے کے لئے چینی کی کوئی ڈلی، بتاشہ، سنگترہ کارس وغیرہ فوراً استعمال کرانا چاہیئے۔ یہ دوا عام طور پر انسولین کے نام ہی دستیاب ہوتی ہے۔

۲۔ ٹولامید (Tolamid) سپلا - یہ ٹولامیڈ کی ٹکیاں ہیں۔ ہر روز ایک ٹکیہ شروع کر کے آہستہ آہستہ بڑھانی چاہئے۔ جتنی شکر کم ہو جائے۔ اس کے مطابق خوراک قائم کرنی چاہیئے۔

۳۔ یونی ٹول بڈ (Uni Tolbid) یونیکم ————— خوراک دو ناندے ۲ کی طرح ہیں۔

۴۔ راسٹینان (Rastinon) بکسٹ ————— ۲ کی طرح استعمال کریں۔

۵۔ ڈائیونل ایک گولی دن میں تین سے چار بار مرض کے مطابق دیں۔

۶۔ ڈایا بینسر (Dia benese) فزر ————— ۲۵ ملی گرام کی ایک ٹکیہ روزانہ تین دن سے ایک ہفتہ تک بعد میں ۱/۲ سے ۱/۴ ٹکیہ بڑھانی یا گھٹانی چاہیے (شکر کی مقدار دیکھتے ہوئے) مقدار خوراک بڑھانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ مرض کے قابو آ جانے پر صرف ۱/۴ ٹکیہ ہر روز اور کبھی کبھی ایک دن ناعہ کر کے دینا کافی ہے، کمزور و بوڑھے مریضوں کو ۱/۴ گولی سے زیادہ شروع نہیں کرنی چاہیے۔

۷۔ ناڈی سان (Nadisan) یہ ایک مخصوص کیمیائی ساخت کا سلفا مرکب ہے جو براہ دہن استعمال کیا جاتا ہے، بڑی جلدی جذب ہو جاتا ہے۔ چالیس سال سے زیادہ عمر کے مریضوں کے لئے جب مرض شدید نہ ہو تو مفید ہے۔ نو عمر مریضوں کے لئے یہ دوا موزوں نہیں ہے، ایک ایک ٹکیہ دن میں تین بار کھانا کھانے کے بعد دیں۔

۸۔ ذیابیطس سادہ میں پٹر سین ٹے نیٹ (Pitressin Tannate) پارک ڈیوس ————— سوتے وقت ایک عضلاتی انجکشن لگائیں اس کے بعد حالات مرض کے مطابق لگائیں، امپول کو ہلکا کر استعمال کرنا چاہیے، شکر کے مریض چینی کی جگہ سکریں (Secrin) کی گولیاں استعمال کریں۔

یونانی علاج :- اصل سبب مرض کو معلوم کر کے اس کے مطابق علاج کریں۔ قبض نہ ہونے دیں، گڑ مار بوٹی طب یونانی میں ذیابیطس شکر کی خاص دوا ہے۔ اس سلسلہ میں گڑ مار بوٹی چار تولہ، معز جاسن چار تولہ سفوف بنا کر رکھیں اور تین ماشہ کی مقدار میں صبح و شام ہمراہ پانی لیں یا معز بنولہ ایک تولہ آدھ سیر پانی میں بھگوئیں، صبح جوش دیں، آدھ پاؤ رہنے پر چھان کر سرد کر کے پلائیں یا کنگھی بوٹی کا سفوف ایک تولہ کھلا کر چھ چھ دس تولہ اوپر سے پلائیں۔ یا جاسن کے پتوں کا جو شانہ صبح، دوپہر اور شام نمک ملا کر پلائیں۔

مندرجہ ذیل مجربات ذیابیطس شکر کے لئے خاص طور پر مفید ہیں :-

دوائے ذیابیطس :- گڑ مار بوٹی دو تولہ، سونٹھ ایک تولہ، معز جاسن ایک تولہ باریک پیس کر سفوف بنائیں، خوراک تین ماشہ ہمراہ دودھ استعمال کرائیں۔

دیگر :- انیون ایک تولہ، کشتہ فولاد جاسن والا دو تولہ، کشتہ بیضہ مرغ دو تولہ، خستہ جاسن دس تولہ، تمام ادویات کا سفوف بنائیں خوراک دھاما ماشہ ہمراہ عرق گاؤ زبان دیں، ذیابیطس کے لئے مفید ہے۔

دیگر :- گٹھلی جاسن ایک تولہ، انیون دورتی، خوب ملا لیں، خوراک ڈیڑھ ماشہ صبح و شام ہمراہ پانی دیں۔

دیگر :- کشتہ بیضہ مرغ، کشتہ فولاد جاسن والا، کشتہ مرجان جواہر والا آدھی آدھی رتی دن میں دو بار ہمراہ بالائی دیں، مجرب ہے۔

دوائے ذیابیطس :- بیضہ مرغ دس عدد لیموں کا رس آدھ سیر، برانڈی ایک پاؤ، تینوں اجزاء کو ایک شیشے کے برتن میں ڈال دیں موسم رباعی سات دن کے اندر اور موسم سرما میں پندرہ دن کے اندر انڈے حل ہو جائیں گے۔ بس تیار ہے، خوراک ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام بعد از غذا دیں ایک ماہ کے استعمال سے آرام آ جاتا ہے۔

دیگر :- گلوے خشک ایک ماشہ کی مقدار میں صبح و شام ہمراہ پانی دیں۔

دوائے ذیابیطس :- انیون ایک حصہ، کشتہ فولاد دو حصہ، خستہ جاسن ۴ حصہ سفوف بنائیں، خوراک آدھ سے ایک ماشہ ہمراہ عرق گاؤ استعمال کرائیں۔

دیگر :- آم کی گٹھلی کا معز اور گٹھلی جاسن مساوی سفوف بنائیں، خوراک ۴ ماشہ ہمراہ آب تازہ دیں، ذیابیطس، جربین، بوا سیرخونی اور

خونی دستوں کے لئے مفید ہے۔

دافع ذیابیطس :- گڑ مار بوٹی تین ماشہ، گلو دوماشہ، سونٹھ چار رتی، ست سلاجیت دو رتی، کشتہ فولاد ایک رتی، مغز خستہ جامن دو ماشہ، سب کو ملا کر سفوف بنائیں، دو خوراکیں بنائیں اور ایک خوراک دودھ کے ہمراہ بغیر میٹھا ملائے استعمال کریں۔ ذیابیطس کے لئے خاص چیز ہے۔

رُب جامن :- جامن پکے ہوئے سیاہ رنگ کے بے کر کسی مٹی کے برتن میں صاف ہاتھوں سے مل کر موٹے کپڑے سے چھان لیں، اگر ایک سیررس ہو تو جوش دیں اور چوتھائی پہنے پر ایک پاؤ چینی شامل کریں اور گاڑھا توام بنالیں۔ خوراک چھ ماشہ سے ایک تولہ ہمراہ عرق سولف دیں، ذیابیطس شکری اور دستوں کو روکنے کے لئے مفید ہے۔

قرص کا نور :- ذیابیطس و گردہ مثانہ کے امراض میں بہت مفید ہے۔ بیج کا ہو یا بیج تولہ، بیج خرنوب نے چار تولہ، طباشیر، ست مٹھی ہر ایک اٹھائی تولہ پھول گلاب، دھنیاں خشک ہر ایک سو تولہ، افاقہ، صندل سفید، گل ارمنی، پھول انار ہر ایک چھ ماشہ، کانورسات رتی، عرق گلاب کے ساتھ قرص (گولیاں) بنائیں۔ خوراک تین ماشہ ہمراہ پانی کھلائیں۔

دولت ذیابیطس :- جامن کی گٹھلی بارہ تولہ، اکیس مرتبہ شیرہ گڑ مار بوٹی میں ترو خشک کریں اور سفوف بنالیں، کشتہ فولاد ڈیڑھ ماشہ (جو کیکر کی پھلیوں میں بنایا گیا ہو) شامل کر کے تین خوراک بنالیں، صبح و شام ہمراہ پانی ایک خوراک دیں، ذیابیطس کے لئے مفید ہے۔

آیور ویدک علاج بھڑک یونانی کے ہے، آیور ویدک مجربات میں لبنت کسما کر رس ایک رتی ہمراہ بالائی دیں یا موصلی پاک ایک سے دو تولہ ہمراہ دودھ دیں یا کشتہ فولاد ایک رتی ہمراہ بالائی یا کشتہ پوست سفید مرغا ایک رتی ہمراہ مکھن دیں۔

ہومیوپیتھک علاج :- یورینم ٹریٹیکم (یورینم ٹریٹیکٹ) اس مرض کی اعلیٰ دوائی ہے، مشہور ڈاکٹر میوگس اور ڈاکٹر بل اس دوائی کے بے حد مداح ہیں۔ اس کے استعمال سے پیشاب کم ہو کر شکر بھی گھٹ جاتی ہے۔ علاوہ ازیں فاسفورک ایسڈ (عصبی ذیابیطس) کے لئے اور برائی ادویا (ذیابیطس کبدی کے لئے) بہترین ہومیوپیتھک ادویات ہیں۔

ذیابیطس شکری کا جڑی بوٹیوں سے علاج

۱۔ برگد (بوہڑ) کا چھلکا چھ ماشہ کو دس تولہ پانی میں جوش دے کر پلائیں۔ ذیابیطس شکری کے لئے مفید ہے۔

۲۔ برہمی بوٹی کو دودھ میں بھگو دیں اور پچوڑ کر خشک کر کے گھی میں بھون لیں۔ برہمی بریاں تین تولہ، مغز بادام چھ تولہ، مغز چار دو تولہ، دھنیاں چھ ماشہ، الائچی خورد چھ ماشہ، طباشیر چھ ماشہ، موصلی سفید چھ ماشہ، مصری پانچ تولہ، سب کو کوٹ پیس کر رکھیں۔ ہمراہ دودھ تازہ تین ماشہ سفوف کھلائیں، یہ ذیابیطس و دماغی کمزوری کے لئے مفید ہے۔

۳۔ نکھا ہوئی بوٹی کی جڑ چھ ماشہ، جڑ سنہا لو ڈیڑھ ماشہ جوش دے کر صبح و شام پلائیں۔

۴۔ لعاب گھیکو اور بوٹی چھ ماشہ، ست گلو ایک ماشہ، ملا کر صبح و شام کھلائیں، ذیابیطس کے لئے مفید ہے۔

۵۔ جامن کے خشک بیجوں کا سفوف ۵ سے ۵ اگرین تک لذائذ تین بار کھلانا یا چھ بار پانچ پانچ گرین کی مقدار میں استعمال کرنا بہت مفید ثابت ہوا ہے اس سے آٹھ سے دس پونڈ پیشاب کم ہو جاتا ہے اور ۴۲ ع۔ ۱ کے تناسب سے شکر میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔

۶۔ جامن کے سیل رُب کو دن میں تین بار ایک سے دو ڈرام تک دینا ذیابیطس کے لئے مفید ہے۔

۷۔ ایک پاؤ پانی میں ایک تولہ پھول جامن پیس کر نمک ملا کر پلانا ذیابیطس کے لئے مفید ہے۔

۸۔ گڑ مار بوٹی کے پانچ اجزاء یا صرف پتے سفوف تین ماشہ، سفوف سونٹھ ڈیڑھ ماشہ، سفوف خستہ جامن ڈیڑھ ماشہ، دو خوراک بنالیں، ایک پڑی صبح و شام

پانی یا دودھ (غیر میٹھا ملے) کے ساتھ دیں۔ ذیابیطس کے لئے مفید ہے۔

۹۔ جامن کی گٹھلی ۳ گرام، سفوف بنا کر تین تین ماشہ پانی کے ساتھ دن میں دو بار دیں۔

۱۰۔ بنولہ کی گری دو ماشہ، پانی ۲۵ گرام میں جوش دے کر چھان کر دن میں دو بار دیں۔

قدرتی علاج: کرلیہ بہترین علاج ہے۔ اس سلسلہ میں پختہ کرلیہ کا چھلکا اُتار کر سایہ میں سکھا کر سفوف بنالیں اور چار ماشہ کی مقدار میں ہمراہ پانی دیں یا چھ ماشہ کرلیہ سبز کا رس یا کچا کرلیہ کھانا مفید ہے۔ آگ پر پکا کر کھانے سے اس کا اثر ضائع ہو جاتا ہے۔ کرلیہ "ذیابیطس کے لئے نہایت کامیاب قدرتی علاج ہے" ناظرین کو اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیئے، انار کا استعمال بھی بعض اوقات حیرت انگیز فائدہ پہنچاتا ہے۔ سر دیوں میں میٹھی کا استعمال بھی مفید ہے۔

غذا و پرہیز: اندہ کا استعمال مفید ہے۔ اگر اندھے نے کھا سکیں تو اس کی جگہ بادام استعمال کریں۔ شکر کا استعمال بالکل بند کر دیں، دودھ، مکھن اور دیگر معوی غذائیں دیں۔ پیر، بالائی، دہی، مکھن، گھی، مچھلی کا تیل، سیب، ناشپاتی، آٹو، جامن، فالسہ، سوڑہ، ہرستم کے ساگ کرلیہ، آلو مع چھلکا، دودھ لے سکتے ہیں۔ زیادہ کمزوری ہو تو بکرے کے خیسے، گردے اور سببہ گھی میں بھون کر کھلانا مفید ہے۔ دہی کا پانی یا ناریل کا پانی بھی مفید ہے، شکر قند، گنا، کھجور، انگور، مٹھائیاں وغیرہ بالکل نہ دیں۔

نوٹ: ذیابیطس شکر کے مریض کو موہائی سفر یا پہاڑی سفر سے پرہیز ضروری ہے۔ علاوہ ازیں کسی قسم کا آپریشن کرانا بھی مضر ہے۔

ہوموثر، ذیابیطس سادہ، ڈایابٹیز، انسپیدس، پالی یوریا

(Diabetes-Insipidus polyuria)

تعریف مرض: اس مرض میں ہلکے رنگ کا پیشاب زیادہ آتا ہے، لیکن اس میں شکر یا البیومن نہیں ہوتی۔

وجوہات: ڈاکٹری تحقیقات کے مطابق پیچوٹری گلینڈ کے نقص سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔ دلی صدمہ، فکر، خراب غذا، زہریلے زخم، دماغی ورم، بھوکے رہنا، زیادہ شراب نوشی وغیرہ سے بھی یہ عارضہ ہوتا ہے۔ یہ مرض بچوں اور نوجوانوں کو بکثرت ہوتا ہے۔

علامات: اس مرض میں ہلکے رنگ کا پیشاب بکثرت آتا ہے، لیکن اس میں شکر یا البیومن نہیں ہوتی، گردوں میں غیر طبعی حرارت کی وجہ سے ان کی قوت جاذبہ معمولی سے زیادہ پانی کو جذب کرتی ہے اور چونکہ گردوں کی محدود وسعت اس کثرت مائیت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لئے متواتر پیشاب آتا ہے۔

ذیابیطس سادہ میں پیاس کا ہونا ضروری نہیں جب کہ ذیابیطس شکر میں پیاس کا لگنا ضروری ہے۔ ذیابیطس شکر و ذیابیطس سادہ کی تشخیص کے لئے پیشاب کی میڈیکل جانچ ضروری ہے۔

علاج: آدھی سے ایک سی سی پچوٹرین کے روزانہ انجکشن دیں، زیادہ مقدار میں دینے سے خون کے دباؤ میں اضافہ کرتی ہے۔ مرکبات فولاد و پچلہ بھی مفید ہیں۔ الکسبرو مائیڈولیرین، ایسٹن سیرپ، فیلوز سیرپ کا استعمال بھی مفید ہے۔ اگر آشک کی وجہ سے یہ عارضہ ہو تو اس کے مطابق علاج کیا جائے۔

یونانی علاج: کشتہ فولاد آدھی رتی، کشتہ زرد آدھی رتی ہمراہ پنہ دانہ دن میں دو بار دیں یا معجون خربث الحدید دو ماشہ صبح و شام دیں۔

ایورویڈک علاج: سلاجیت شدہ ایک رتی سے دو رتی صبح و شام ہمراہ دودھ گائے نیم گرم دیں۔

ہومیوپیتھک علاج: بایو ڈونا (Bio Donna)، نیٹرم سیور، مرکیورس (Mercurius) زیادتی پیشاب کے لئے بہترین ادویات ہیں۔

غذا و پرہیز :- زود صبحم اغذیہ دیں، پیشاب آور غذائیں بند کر دیں۔

رکت (خون) میں شکر کی کمی، ہائپو گلائمیسمیا، (Hypogly caemia)

تعریف مرض :- انسولین کی زائد مقدار کا انجکشن کرنے سے خون میں شکر کی مقدار کافی حد تک کم ہو جاتی ہے۔

وجوہات :- جب ذیابیطس کے مریض کو خون میں شکر کی مقدار بہت زیادہ لمبے عرصے تک متواتر جاری رہی ہو تو اس شکر کی زیادتی کو ایک دم کم کرنے سے شکر کی کمی کی بڑی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔

علامات :- غشی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنا، بھوک لگنا، ٹھنڈا پسینہ آنا، بعض اوقات مریض پاگل ہو جاتا ہے یعنی چیخنا، چلاتا اور ہنستا ہے۔
علاج :- بطور حفظ مائع انسولین کے انجکشن لینے والے ذیابیطس کے مریضوں کو ہائپو گلائمیسمیا کی بڑی علامات اچھی طرح سمجھا دینا ضروری ہیں۔ اور ان کو ہر وقت مصری یا کھانڈ کی ڈلیاں اپنی جیب میں رکھنی ضروری ہیں، مرض کی معمولی حالت میں بڑی علامات محسوس ہوتے ہی مریض کھانڈ کی دو ڈلیاں یا دو چھوٹے چمچے گھول کر پئے، اگر آرام نہ آئے تو گلوکوز دس گرام استعمال کیا جائے، اگر فوری کھانڈ یا گلوکوز نہ مل سکے تو سنگتے کا رس بکٹ یا روٹی کھلائی جائے، اگر مرض شدید ہو اور مریض کچھ نہ کھا سکے تو ڈریسینالین گھول ایک میں ایک ہزار نصف سی سی سے ایک سی سی کا جلدی انجکشن کیا جائے یہ انجکشن خون کی شکر کو بڑھا دیتا ہے۔ جب مریض ہوش میں آجائے تو اسے شکر یا گلوکوز کا فوری استعمال کرایا جائے، بعض دفعہ مریض کے تندرست ہونے اور انسولین نہ لینے کی حالت میں بھی اس مرض کی خفیف علامات دیکھنے میں آتی ہیں۔ خاص طور پر خالی معدہ، سخت ورزش یا مشقت کرنے یا خالی معدہ ملاپ کرنے سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

غذا و پرہیز :- انسولین کا استعمال جب تک خون میں شکر کم ہو، بند کر دیا جائے، شکر، گلوکوز، سنگتہ، میٹھا وغیرہ میٹھے پھلوں کا رس دیا جائے تاکہ جسم سے شکر کی کمی دور ہو جائے۔

خون میں شکر کی کمی کا پھلوں سے علاج


جو لوگ مرض ذیابیطس میں گرفتار ہوں، ان کو پھل بکثرت کھانے چاہئیں، خاص طور پر جب خون میں شکر کی کمی ہو اور مرض انتہا تک پہنچ گیا ہو تو میٹھے پھل جیسے کھجور اور انجیر کا استعمال کیا جائے۔

کمزوری گردہ میں بھی پھل اور میوہ جات بہت ہی مفید ہیں۔ آم کو قدرت نے گردہ کی شکل و صورت میں پیدا کیا ہے اور یہ خاص طور پر گردہ کی طاقت اور خون میں شکر کی کمی کو دور کرنے کا مجرب علاج ہے۔

اس سلسلہ میں خون میں شکر کی کمی کے لئے انگور و چیکو کا استعمال بھی از حد مفید ہے۔

چونکہ پھلوں میں نکلیات پائے جاتے ہیں۔ اس لئے ان میں ادراری یعنی پیشاب کھول کر لانے کی خاصیت ہے، جس سے گردوں کے ناقص اور ردی فضلات خارج ہو جاتے ہیں۔

اس مطلب کے لئے موسمی، نارنگی، لیموں، سنگتہ نہایت مفید ہیں۔ چنانچہ ان پھلوں کا رس گردوں سے نہ صرف فضلہ ہی خارج کرتا ہے، بلکہ اس سے گردوں کا فعل بھی تیز ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں مشانہ کی بڑھی گرمی بھی زائل ہو جاتی ہے، اور صحت طبعی توازن پر آ جاتی ہے۔



تیرھواں باب

مردوں کے امراض

اس سے پہلے کہ ہم مردوں کے امراض کا بیان کریں، مناسب ہے کہ اس جگہ پر مردانہ اعضائے تناسل کا بیان کر دیں تاکہ امراض جس جگہ پر ان کا بیان آئے اُس کو سمجھنے میں آسانی رہے۔

انسان تو کیا حیوانات بلکہ نباتات ہر ایک میں اپنی اپنی نسل کی بڑھوتری کے لئے اعضائے تناسل موجود ہیں، پس اعضائے تناسل کی صحت و افعال کا تعلق بقائے نسل سے ہے، اعضائے فاعلہ مردوں کے اعضاء کا نام ہے اور اعضائے قابلہ عورتوں کے اعضائے مخصوصہ کو کہتے ہیں عورتوں کے اعضائے قابلہ کا بیان ہم اگلے باب میں کریں گے۔ اب مردوں کے اعضائے فاعلہ کے متعلق بتایا جاتا ہے۔

مردانہ اعضائے فاعلہ کی دو قسمیں ہیں :-

۱۔ اعضائے منی یعنی وہ اجزاء جن میں منی (دیرج) کی پیدائش ہوتی ہے اور

۲۔ اعضائے ناقلہ جو منی (دیرج) کو جائے مطلوب تک پہنچاتے ہیں۔

بیرونی اعضائے تناسل مردانہ میں صرف قضیب ہے، جس کو ذکر اور آلت بھی کہتے ہیں۔ ہندی زبان میں اندری اور طبی اصطلاح عضو مخصوص کہتے ہیں۔

یہ عضو تین لمبے لمبے اجسام کا بنا ہوا ہے۔ اس میں دو اوپر کی طرف واقع ہیں، جن کو کارپس کورنوسم (Corpus Cavernosum) یا جسم طرف کہتے ہیں۔

جسم آجوف کے درمیان اور تنچے کی طرف ایک تیسرا جسم ہے جس کا نام کارپس اسپنجی اوسم (Corpus Spongiosum) یا جسم متخلخل کہتے ہیں۔ اسے جسم مجوف الاغیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس لئے کہ پیشاب کی نالی اس کے بیچوں گزرتی ہے۔ ان تینوں اجسام کی بناوٹ اس طرح پر ہے کہ ایک دوسرے کے درمیان ایک جال بنا ہوا ہے، جس کے اندر خانے خانے یا اعضاء کی اندرونی فضائیں اسفنج کی طرح بنے ہوئے ہیں۔ ان اندرونی

فضاؤں کے اندر خون جمع رہتا ہے۔ اور ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یعنی خون کے ایک خانہ سے دوسرے خانہ میں جا کر اندرونی فضاؤں کے اندر دورہ کر سکتا ہے۔

فضاؤں کے اندر ایک طرف سے شریانیوں کے ذریعہ خون داخل ہوتا ہے اور دوسری طرف دریدوں کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے، ٹھہراؤ کی حالت میں جتنا خون شریانیوں کی راہ سے آتا ہے، اتنا ہی خون دریدوں کی راہ سے خارج ہوتا ہے اور عضو ڈھیلا اور نرم رہتا ہے، شریانیوں کی دیواروں کے چاروں طرف باریک باریک پھوٹوں کا ایک جال لپٹا ہوا ہے۔ ان پھوٹوں کے نکلنے سے شریانیوں میں بھول اور سکڑ سکتی ہیں۔

اعضائے تناسل مردانہ :- ۱۔ اندرونی حصہ ۲۔ پیشاب کی نالی ۳۔ کیساۃ المنی (شکراشیہ) ۴۔ مجری المنی (شکر پرنالی) ۵۔ خبیثے یعنی (اندکوش) ۶۔ بال ۷۔ نابھی ۸۔ جلد ۹۔ گوشت ۱۰۔ مثانہ ۱۱۔ بال ۱۲۔ جلد ۱۳۔ عضو تناسل کا جسم ۱۴۔ سپاری (حشفہ) ۱۵۔ پیشاب کی نالی

تشریحی تصویر اسی کتاب میں دکھائیں۔ ویرج کے کپڑوں کے لئے بھی مندرجہ تشریحی تصویر ملاحظہ فرمائیں۔
دریدوں کے اوپر عضو کی جڑ کے قریب غرارہی پھوٹوں کا ایک پردہ لپٹا رہتا ہے، جب یہ پھٹے حرکت میں ہوتے ہیں تو ان کے زور سے دریدوں دب جاتی ہیں اور ان میں سے خون کا جانا بند ہو جاتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خون جمع ہو جانے سے عضو کا جسم پڑ ہو کر تن جاتا ہے۔ اس نام انتشار ہے۔

طبی نقطہ نظر سے اور جسمانی بناوٹ کے مطابق عضو کی جلد کے اندر لمس نہایت ذکی اور لطیف ہے۔ جس سے یہ خصوصیت پیدا ہو گئی ہے کہ..... کے ساتھ چھونے یا رگڑنے سے نر کے اندر ایک عجیب قسم کی فرحت اور سرور پیدا ہوتا ہے۔

یوں تو شہوت "عضو" کی تمام جلد میں موجود ہوتی ہے۔ مگر یہ حشفہ میں نہایت تیز ہوتی ہے، شہوت کا دوسرا جز قوت باہ ہوتا ہے۔ اس کے سبب سے عضو کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے، حالت سکون میں عضو تناسل نرم، ڈھیلا اور پیچھے کی طرف لٹکا رہتا ہے، انتشار کی حالت میں موٹا ہو کر سخت اور ایلتادہ ہو جاتا ہے۔ یہ عضو دو کام آتا ہے، برائے نعل نطرت یعنی ملاپ اور برائے اخراج پیشاب۔

عضو کا وہ حصہ جو پیڑ کی ہڈی اور نشست گاہ کی ہڈی سے چسپاں ہے، اسے جڑ کہتے ہیں، اور جڑ اور حشفہ کے درمیانی حصہ کو جسم نیز سپاری یا سرآلت کو حشفہ کہتے ہیں، حشفہ کے درمیانی سوراخ کو سوراخ بول کہتے جاتا ہے، حشفہ کے اوپر ایک مضبوط جھلی لپٹی رہتی ہے جو ہاتھ سے پیچھے ہٹائی جاسکتی ہے، اسے گھونگھٹ کہتے ہیں اور دنیا کی بعض قوموں میں یہ گھونگھٹ کاٹ دیا جاتا ہے اور پھر سرآلت نکال دیتا ہے مذہبی سپردوں سے قطع نظر صرف صحتی نقطہ نظر سے گھونگھٹ کا ہٹانا عضو مخصوص کی جسمانی صفائی کا عمل ہے، جو خاص طبی اہمیت رکھتا ہے۔

لخن (Smegma) سپاری پر کچھ مخاطی غدد بھی ہوتے ہیں، جن سے ایک خاص قسم کی بو دار سپید گاڑھی رطوبت پیدا ہوتی ہے۔ جس کا اصطلاحی نام لخن (سٹراہو آشک) ہے۔ یہ رطوبت گھونگھٹ کے نیچے ایک تھیلی (تحت العلفہ جیب) میں جمع ہوتی رہتی ہے، مگر چھوٹے گھونگھٹ والے اشخاص زیادہ اشخاص جن کا گھونگھٹ کاٹ دیا جاتا ہے، میں اسے جمع ہونے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ اکثر دھل دھلا کر یا زیر جامہ کپڑوں سے لگ کر دور ہو جاتی ہے۔ لیکن جب گھونگھٹ کا چڑا تنگ اور سپاری پر چسپاں ہوتا ہے تو اسے سپاری پر سے پیچھے نہیں ہٹایا جاسکتا اور یہ بدبو دار گاڑھی رطوبت تحت العلفہ جیب میں بند ہو جاتی ہے اور پھر باہر نکلنے نہیں پاتی، پھر اس کا جماؤ زیادہ ہو کر رفتہ رفتہ گاڑھا ہو جاتا ہے اور سپاری پر کی مخاطی جھلی صحیح تندرست حالت میں نہیں رہنے پاتی، اس کے برعکس جن کا گھونگھٹ ہٹا ہوتا ہے۔ ان افراد میں یہ گندگی پیدا ہی نہیں ہوتی اور ان کی سپاری ہمیشہ صاف سمھری اور خشک حالت میں رہتی ہے۔ جو اعضائے جنسی کی صحت و تندرستی کے لئے بہت لایفہ و نایک ہے۔

تنگ اور لمبے گھونگھٹ سے پیشاب کے عموماً آخری چند قطرے باہر نہیں نکلنے پاتے اور پیشاب کی نالی کے اندر رہ جاتے ہیں یا کچھ ٹپکاؤ رساؤ کی وجہ سے تحت العلفہ جیب کے اندر پہنچ کر وہیں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس بند پیشاب میں نتیجہ کے طور پر ایمنیاتی عفونت اور سٹرانڈ پیدا

لگتی ہے، جس کا لگاؤ مخاطی جھلی کے ساتھ دیر تک رہتا ہے۔ جس سے مخاطی جھلی کی قوت مدافعت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس لئے تنگ گھونگھٹ کی اندرونی سطح پر کی جھلی جنسی امراض (سوزاک و آتشک وغیرہ) کی سراجیوں سے نسبتاً بہت جلد متاثر ہو جاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوگا کہ گھونگھٹ کی صفائی نہ صرف جسمانی صفائی ہے۔ جس سے تندرستی حاصل ہوتی ہے بلکہ جنسی امراض کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔

طبی رو سے اور جسمانی بناوٹ کے تحت فعل مجامعت میں التذاذ کا احساس اس وقت بہت بہتر ہوتا ہے، جبکہ سپاری کا مخاطیہ براہ راست (کسی چیز کے حامل ہوئے بغیر..... کے مخاطیہ کے ساتھ) رگڑ حاصل کرے۔ مگر تنگ گھونگھٹ کی موجودگی مردانہ اور زنانہ مخاطیہ کے دوران حامل ہو کر ان دونوں متجانس جھلیوں کے باہمی عمل فرک میں مداخلت پیدا کر کے فریفتن کو صحیح اور قدرتی طبی لذت سے محروم کر دیتی ہے۔ اس سلسلہ میں بانجھ پن (اولاد کا نہ ہونا) بعض اوقات لمبا اور تنگ گھونگھٹ ہو سکتا ہے۔

کیونکہ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ پیشاب کے چند آخری رُکے ہوئے قطروں کی سڑاند سے حیوانات منویہ (ویرج کے کیڑوں) کی نقل و حرکت کے کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کیونکہ پیشاب کا تعامل تیزابی ہوتا ہے اور منی کا تعامل جو قلدی ہوتا ہے، پیشاب کی اس بیرونی رکاوٹ کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے، طبی طور پر اولاد کے کیڑے تیزابیت کی غیر معمولی تفسیر سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں، چنانچہ اگر پیشاب کرنے کے فوراً بعد آخری قطروں کو کسی کیڑے کی دھجی یا خشک مٹی کے ڈھیلے سے صاف کئے بغیر منی کا اخراج ہو تو ویرج کے کیڑے کی نقل و حرکت نسبتاً زیادہ سست ہوتی ہے۔ لیکن جب پیشاب کی نالی بالکل خشک ہو اور اس میں آخری قطروں کی تری باقی نہ ہو تو کیڑے تیزی سے حرکت کر سکتے ہیں۔ اس طرح پیشاب کے فضلاتی اور ایمنیاتی عفونی اجزاء کے لگاؤ سے بھی ویرج کے کیڑوں کی حرکت سست ہو جاتی ہے۔ منی کے ہر اخراج میں لاکھوں کروڑوں زندہ حوینات وجود ہوتے ہیں جو تیزی کے ساتھ حرکت کر کے رحم میں عورت کے اندھے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان میں سے وہ کیڑا سب سے زیادہ تیز اور جست ہوتا ہے۔ منزل مقصود تک رسائی حاصل کر کے اندھے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور باقی ماندہ سے ناکام رہ کر فنا ہو جاتے ہیں۔

الغرض استقرار حمل کے لئے کیڑوں کی تیز رفتار نقل و حرکت نہایت ضروری ہے، گھونگھٹ کے اندر بند ہونے والے شتاب کے قطرے کیڑوں کی نقل و حرکت کے لئے زہر قاتل ثابت ہو سکتے ہیں۔

تندرست و صحت مند قضیب :- طبی نقطہ نظر سے تندرست اور صحت مند قضیب (پینس) کی مندرجہ ذیل اہمات ہونی چاہئیں :-

۱۔ لمبائی چھ سے سات انچ تک اور موٹائی دو انچ تک - ۲۔ انتشار کی حالت میں بالکل سیدھا، ۳۔ جڑ والا حصہ اگلے حصہ سے موٹا، ۴۔ صحت مند کے ہوئے خیسے ہر ایک تقریباً دو انچ لمبا اور ایک انچ موٹا، ۵۔ انتشار میں خوب تناؤ اور سختی۔

غذہ مذی (پراسٹیٹ گلینڈ) (Prostate Glands) :- سپاری کی مانند ایک چھوٹی سخت اور مخروطی شکل کی گلی ہے۔ اس کی لمبائی ایک انچ۔ چوڑائی ڈیڑھ انچ اور موٹائی پون انچ ہوتی ہے اور وزن چھ ڈرام ہوتا ہے۔ اس میں پندرہ سے بیس تک نالیاں ہوتی ہیں، جو پیشاب کی نالی میں گھلتی ہیں۔ اس ایک رطوبت تراش پاتی ہے جسے مذی کہتے ہیں، یہ رطوبت پتلی، سفیدی مائل اندھے کی سفیدی کی طرح لیس دار ہوتی ہے، ملاپ سے قبل بعض دفعہ پھوڑی شکل آتی ہے اور انزال کے بعد پیشاب کی نالی کو تر کر دیتی ہے۔ یہ رطوبت بعض آدمیوں میں کثرت سے نکلتی ہے اور کمزوری کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ گلی یا غدد ناب کی نالی سے شروع اور مثانہ کی گردن کے سامنے موجود ہے۔ اس کا وزن ایک تولہ ۱۴ ماشہ کے قریب ہوتا ہے۔ پیشاب کی تیزی پیشاب کی نالی کو نقصان نہ پہنچائے منی کی تیزی اور اچھل کر نکلنے کی وجہ سے خراش پیدا نہ کرے۔ یہ منی کے راستہ کی مصلح ہے۔

مردانہ اعضاء تناسل



۱۔ سپاری، ۲۔ شریانیں
۳۔ پیشاب کی نالی

(**خصیصے (Testis)**) :- خصیصے انسانی نشین میں ایک نہایت قیمتی اور کارآمد حصہ ہیں، ان میں مادہ الحیات یعنی جوہر انسانی پیدا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی اندھے جیسی گلیٹیاں ہیں، جن میں دیرج پیدا ہوتا ہے، ہر خصیصہ ڈیڑھ انچ لمبا، ایک انچ چوڑا اور سوا انچ موٹا ہوتا ہے، ہر ایک میں تین حصے ہوتے ہیں، (۱) بیرونی یا غلافی طبقہ (ٹیونیکا الیوجینیا) منی اسی طبقہ کے چھوٹے چھوٹے لوٹھڑوں میں پیدا ہوتی ہے، (۲) درمیانی طبقہ (ٹیونیکا الیوٹوسا) اس میں کثرت سے رگیں ہوتی ہیں، جن سے خصیصہ کی پرورش ہوتی ہے۔

ہر ایک خصیصے میں منوی حویات مسلسل بنتے رہتے ہیں اور یہاں سے اغذیہ دس اور قنات ناقہ میں سے گزر کر منوی خزانہ میں جمع ہو جاتے ہیں، جو پیچ دار تقیلیوں کی شکل میں مشانہ (پیشاب کی پتیلی) کے قاعدے اور مستقیم (آنت کے آخری حصے) کے درمیان واقع ہیں۔ ان خزانوں میں ایک دودھ جیسا سیال بنتا ہے، جس کے ساتھ منوی حویات مخلوط ہوتے ہیں۔ دونوں منوی خزانوں کے درمیان ایک شاہ بلوط جیسی غذی ساخت (پراسٹیٹ گلینڈ) ہوتی ہے، اس کے اندر بھی ایک دودھ جیسا سیال پیدا ہوتا ہے اسی سیال سے منی کا بیشتر حصہ بنتا ہے۔



مردانہ اعضاءے تناسل

۱۔ خصیصہ، ۲۔ سپاری، ۳۔ عضو مخصوص، ۴۔ مشانہ

دونوں منوی خزانے اور پراسٹیٹ گلینڈ پیشاب کی نالی کے پچھلے حصہ کے اندر کھلتے ہیں، جب منی کا اخراج (انزال) ہوتا ہے۔ تو منوی خزانوں اور پراسٹیٹ گلینڈ کا افراز ایک ساتھ پیشاب کی نالی کے اندر خارج ہو کر اس کے راستے سے قضیب کے اندر سے فواروں کی شکل میں باہر نکل جاتا ہے۔ منوی حویات جو منوی خزانوں کی رطوبت سے متعلق ہوتے ہیں وہ پراسٹیٹ گلینڈ کے افراز کے ساتھ شامل ہو کر منی بناتے ہیں۔

منوی حویات پیدا کرنے کے علاوہ خصیصوں کا ایک دوسرا کام بھی ہوتا ہے وہ ایک قسم کی کیمیائی شے (مردانہ ہارمون) پیدا کرتے ہیں، جو دوران خون کے ساتھ جسم میں پہنچ کر ثانوی مردانہ خصائص (جیسے چہرہ پر داڑھی کے بال، بڑی کاٹھیاں، بالیدگی، مردانہ آواز) وغیرہ پیدا کر دیتی ہے، اگر اس مردانہ ہارمون کا افراز کم یا خراب ہوتا ہے تو لڑکا ایک لڑکی کی طرح (زنائے شکل) کا نظر آتا ہے، ویرج کے کیڑوں کی پیدائش نہیں ہوتی اور منی کے اندر صرف منوی خزانوں اور پراسٹیٹ گلینڈ کے افرازات موجود ہوتے ہیں، منوی حویات کی عدم موجودگی کے باعث ایسی قیمتی منی بھینوں کی باروری نہیں کر سکتی اور اس سے بچے پیدا نہیں ہو سکتے، مردانہ ہارمون کی پیدائش عنفوان شباب میں شروع ہو کر زندگی بھر جاری رہتی ہے، اس کا آغاز منوی حویات کی پیدائش سے بہت پہلے ہی ہو جاتا ہے۔

غدد ودی (کاوپرز گلینڈ) (Cowper's Glands) :- یہ مٹر کے دانے کے برابر زرد رنگ کی دو گلیٹیاں ہیں اور پیشاب کی نالی کے جزو غشائی کے اگلے حصہ کے ٹھیک نیچے واقع ہیں، ان میں ایک خاص قسم کی رطوبت پیدا ہوتی ہے، جس کو ودی کہتے ہیں۔ یہ پیشاب کے وقت پیشاب کی نالی کو تر کر دیتی ہے تاکہ پیشاب باسانی خارج ہو جائے اور اس کی تیزی محسوس نہ ہو۔ یہ عام طور پر اخراج پیشاب میں سہولت بہم پہنچاتی ہے۔

مجرائی منی (واس ڈیفرنس) :- یہ دو نالیاں ہوتی ہیں، ہر ایک کی لمبائی دو فٹ ہوتی ہے۔ ایک بائیں طرف، دوسری دائیں جانب رہتی ہے، پیچ دار راستہ طے کرنے کے بعد اوجیہ منی کی نالی سے مل کر قاذف المنی (اجاکو بیٹری ڈکٹ) میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی یہ نالی پیٹ کے خارجی سوراخ کے راستہ سے مجری آریہ میں داخل ہوتی ہے اور نالی مذکور طے کرتی ہوئی شکم کے اندر منی سوراخ سے جوف شکم میں داخل ہو کر مشانہ سے گزرتی ہے۔

اوعیہ منی (ولسی کیول سمنی نلر) (Seminal Vesicle) :- یہ محزوطی شکل کی دو خانہ دار غشائی تقیلیاں ہیں۔ منی انہیں کے اندر جمع رہتی ہے۔ اور ان سے ایک مخصوص رطوبت تراوش پاکر منی میں شامل ہوتی رہتی ہے، اس سے منی کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ تقیلیاں ریشہ دار جھلیوں میں لپیٹی رہتی ہیں اگر اس جھلی کو کھول دیا جائے تو یہ لمبی ہو کر نالی بن جاتی ہے۔ ان میں عضلاتی ریشوں کے باعث سکڑنے کی طاقت ہوتی ہے، اسی وجہ سے انزال کے وقت منی کو دکر خارج ہوتی ہے، اس کا چوڑا سرا پیچھے اور تنگ سرا سامنے ہوتا ہے، جو غده مذی کی جڑ کے قریب اپنی جانب کے مجرائی منی کے ساتھ مل کر تاذف المنی بناتا ہے۔ ضرورت کے وقت اس نالی کے ذریعے منی پیشاب کی نالی میں آتی ہے۔

ان کو خزانہ منی، منی کی تقیلیاں اور کیساۃ المنی بھی کہتے ہیں۔ یہ تقیلیاں اڑھائی انچ لمبی اور نصف انچ چوڑی ہوتی ہے۔ صرف ایک جانور رکھتے ہیں خزانہ منی موجود نہیں ہیں اور اس کا سبب ابھی تک ماہرین جنیات کو معلوم نہیں ہو سکا۔

مادہ منویہ (منی) (Semen) :- جو ہر حیات، جو ہر فضلہ، منی، لطفہ، دیرج وغیرہ اس کے مختلف نام ہیں۔

انزال کے وقت پیشاب کی نالی سے سفید رنگ کی جو رطوبت پوری لذت کے ساتھ خارج ہوتی ہے۔ اس کو منی کہتے ہیں۔ یہ خُصیوں میں پیدا ہوتی ہے اور خون خُصیوں میں جا کر منی کی صورت اختیار کرتا رہتا ہے، خُصیوں کی غددی ساخت جو منی کی باریک نالیوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے، ان میں خون سے منی تیار ہوتی ہے، بالغ ہونے کے بعد خُصیوں کی باریک نالیوں میں ہر وقت منی بنتی رہتی ہے، لیکن میجان کے علاوہ اس کی تیاری کم اور آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ تیاری کے بعد یہ منی کی دونالیوں کے ذریعے خُصیوں میں سے خزانہ منی میں چلی جاتی ہے اور وہیں جمع رہتی ہے۔ انزال کے وقت خزانہ منی سے زیادہ مقدار میں نکل جاتی ہے، ورنہ مذی اور مجرائی بول کی رطوبت کے ساتھ مل کر پیشاب کے ہمراہ نکلتی رہتی ہے۔ منی ایک گاڑھی رطوبت ہے، جس میں دو چیزیں شامل ہیں، (۱) آب منی (لائیکو آریمی نیس) جو اندھے کی رطوبت کی طرف شفاف اور لیس دار ہوتی ہے، (۲) واہتات منی (ذرات منویہ سمنل گرے نیولز) یہ چھوٹے چھوٹے گول ذرات یاد دلاتے ہوتے ہیں جنہیں منی کے کیڑے (Sperms) کہتے ہیں۔

جیسا کہ ہم لکھ آئے ہیں کہ منی بالائی جیسی شکل و قوام کی ہوتی ہے اور اس میں ایک ستم کی بو بھی پائی جاتی ہے، جو پراسٹیٹ گلینڈ کے افراز کی وجہ سے اس میں پیدا ہو جاتی ہے، دیرج کے کیڑے خالی آنکھ سے نظر نہیں آتے ہیں مگر خوردبین سے دیکھنے پر لمبے کیڑوں جیسے (مینڈک کے ابتدائی بچوں) ٹیڈ پول کی طرح اپنی دُموں سے حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور سر و جسم و دُم رکھتے ہیں۔ انسان کی پیدائش انہی کیڑوں پر منحصر ہے۔ منی ایک بہت ہی قیمتی جوہر ہے۔ جو بہترین خون سے مختلف تغذیرات کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اس کے اندر وہ کیڑے ہوتے ہیں، جن سے انسان بنتا ہے۔ اس لئے منی کو صحیح معنوں میں انسان کہنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس میں نہایت انمول رتن بھرے ہوئے ہیں۔ اس کا محفوظ نہ رکھنا صرف حسن اور جولی بلکہ پوری نسل کا محفوظ رکھنا ہے۔

منی (دیرج) کا اخراج جب مادہ عورت کے اندام نہانی کی نالی میں ہوتا ہے تو دیرج کے کیڑے بیضہ دان کی طرف تیزی کے ساتھ اوپر کو حرکت کرتے ہوئے اندھوں کی تلاش میں مصروف ہو جاتے ہیں۔

قضیب کی نالی میں سے منی کا اخراج جھٹکوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ پورے اخراج میں تقریباً ایک چمچ بھر منی خارج ہو جاتی ہے جس کے اندر تین سے چار ہزار ملیں (تین سے چار ارب) سے زائد یہ کیڑے موجود ہوتے ہیں۔ یہ کیڑے ایک دن میں عام حالت میں (منی خارج ہونے پر) مر جاتے ہیں۔ لیکن رحم میں دو سے لے کر سات روز تک زندہ رہتے ہیں، یہ کیڑے سرد، زیادہ گرم، ترشی، کھاری تیز اسٹیا سے مر جاتے ہیں۔ اسی سے جن عورتوں کو حمل نہ بھڑتا ہو، ان کے رحم کے معاینہ سے معلوم ہو سکے گا کہ وہاں کھاری، ترشی یا کوئی تیز خلط موجود ہوگی، جو ان حیوانات منویہ (دیرج کے کیڑوں) کی قاتل اور استفراہ حمل میں رکاوٹ ہے، آج کل حمل کی رکاوٹ میں بھی جن طریقوں کو اختیار کیا جا رہا ہے، اس میں

ٹوپی (غلاف رحم) ڈوش اور کوئین وغیرہ کو مناسب چیزوں کے ساتھ ملا کر رحم میں داخل کرنا بھی ہے، کوئین خشک اور قابض ہے، اس لئے وہ حیوانات منویہ کو قتل کر دیتی ہے، جس سے حمل نہیں ٹھہرتا۔

کئی ایک جنسی غلیلیوں کی وجہ سے بعض مردوں کی منی میں حمل ٹھہرانے والے حیوانات منویہ (اولاد کے کیڑے) موجود نہیں ہوتے، لیکن ان کا ویرج دیکھنے میں ٹھیک معلوم ہوتا ہے۔ ایسی حالتوں میں اگر انہیں اولاد کی خواہش ہو تو باقاعدہ علاج سے کیڑے پیدا ہو سکتے ہیں، ان حالات میں کسی ماہر جنیات مستند حکیم یا دسید سے مشورہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ انگریزی ڈاکٹر سے فائدہ حاصل ہونا ناممکن ہے۔ ویرج کے متعلق کوئی بھی شکایت ہو، ایسی معالجین سے ہی رجوع کرنا چاہیے، اگر مرض بہت بڑھ گیا ہو تو ہمیں لکھیں، مناسب طبی مشورہ اور پوری مدد کی جائے گی۔ تازہ منی (ویرج) کا مائیکروسکوپ یا خوردبین سے معائنہ کیا جائے تو اس میں بڑی چستی سے جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے، ویرج کے کیڑے ادھر ادھر دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، یہی وہ کیڑے ہیں، جن کی پیدائش اولاد کے لئے ضروری ہے، یہ کیڑے پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے اور ہر آدمی میں عمر کے چودھویں اور پندرہویں سال میں پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، مگر اس وقت پختہ اور چھت نہیں ہوتے۔ یہ عمر کے اٹھارہویں سال میں مکمل طور پر پکے لگ جاتے ہیں۔

امراض مردانہ اعضاء متناسل

امراض مردانہ بچپن کی غلط کاریوں سے پائے جاتے ہیں جو عورتوں اور مردوں میں یکساں پائے جاتے ہیں۔ مگر مردوں میں یہ شکایت زیادہ پائی جاتی ہے۔ کچی عمر میں منی (Semen) جیسی بیش قیمت چیز نادانی سے فضول سمجھ کر بازاری عورتوں کی قربت، جلق یا اغلام بازی میں کثرت سے ضائع کر کے مصنوعی لذت حاصل کرنے سے ہی یہ امراض پیدا ہوتے ہیں۔ چھت منٹ کی اس مصنوعی لذت میں جسمانی مواصلت نہیں ہوتی، فریقِ ثانی کی غیر موجودگی میں دماغ کی قوت متخیلہ پر جبر کر کے معشوق کی ایک خیالی تصویر تیار کی جاتی ہے، اس تصویر کے ذریعے سے دماغی دغدغہ بنتا ہے۔ یہ دغدغہ نخاع کے مراکز شہوانی تحریک پیدا کرتا ہے، مگر چونکہ تحریک کے بعد اعصابی طوفان پیدا کرنے کے لئے مراکز شہوانی جسمانی مواصلت کے محتاج ہوتے ہیں اور جسمانی مواصلت کے بغیر مٹیوں میں طوفان بپا نہیں ہو سکتا۔ جسمانی مواصلت کی عدم موجودگی میں مواصلت بھی قوت متخیلہ کو ایجاد کر کے مہیا کرنی پڑتی ہے اور ہاتھ مشت زنی، مسٹر بے شن، اغلام (بچہ) بازی اور حیوان یا اور کسی فعلِ بد سے انسانی مہبل (ویجاٹا) تصور کرنا پڑتا ہے اور اس قسم کے فرضی وسائل سے انتشار اور انزال پیدا کر کے لذت اور سرور حاصل کیا جاتا ہے۔

اس تمام فعلِ بد کے اندر شروع سے آخر تک پیکر معشوق خیالی، دغدغہ خیالی، مواصلت خیالی، عصبی طوفان خیالی ہوتا ہے۔ اور اب اس سے انتہا تک دماغ، اعصاب اور آلاتِ ملاپ کو ملاپ کا دھوکا دیا جاتا ہے اور انتشار اور انزال جو اس دھوکے سے پیدا ہوتا ہے نامکمل اور صحت و تندرستی کے لئے سخت نقصان دہ ہوتا ہے۔

مگر یہ اپنے آپ سے دھوکا بازی کا ٹھک کی ہانڈی کی طرح کتنی بار چڑھ سکتی ہے، بالآخر دماغ اور اعصاب دھوکا کھانے سے انکار کر رہے ہیں اور غیر فطری ملاپ کرنے والے کو دماغ اور اعصاب کو دھوکا دینے کے لئے نئی نئی ترکیبیں اور شدید اور شدید تر دھوکے اور لڑنے کے وسائل سوچنا اور ایجاد کرنے پڑتے ہیں، اس تذبذب سے دماغ کند ہو جاتا ہے اور دغدغہ بنانے سے قطعی انکار کر دیتا ہے، مراکز شہوانی بھی افزوں کمزور لہریں بناتے بناتے ٹھک جاتے ہیں اور ہمارے مصنوعی دغدغہ قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اساک اور انتشار معفود ہو کر اور ملاپ کی فطری لذت سے محروم ہو کر غیر فطری جنسی لذت حاصل کرنے والا اپنے آپ کو زندہ درگور سمجھنے لگ جاتا ہے۔

فزیا لوجی (شریہ کی بناوٹ) طب کی رو سے ہمیں صاف صاف بتاتی ہے کہ اگر فطری طریقے سے ملاپ کیا جائے، لیکن انزال واقع ہو

سے پہلے قضیب کو مہبل (ویجائنا) کے اندر سے باہر نکال لیا جائے تو اس صورت میں بھی یہ فعل غیر فطری اور غیر قدرتی ہو جاتا ہے، کس لئے کہ فطری ملاپ اس وقت مکمل ہوتا ہے کہ جب انزال ہو جائے۔ اور انزال تو طبی و صحیح نقطہ نظر سے مہبل (ویجائنا) کے اندر ہونا چاہیے۔ ورنہ ایک تو فعل نامتام رہنے کے سبب سے اور دوسرا انزال بے محل ہونے کے سبب سے ملاپ غیر فطری ہو جائے گا۔ انزال خارج از مہبل ہونے سے منی کامل طور پر خارج نہیں ہوتی، منی کا کچھ حصہ کیستہ المنی (Seminal Vesicle) کے اندر مضور رہ جاتا ہے۔ نایزہ اور آلات میں امتلا کی تشریحی تبدیلیوں کے باعث سرعت انزال وغیرہ کی شکایات اسی طرح پیدا ہو جاتی ہیں جس کو اوپر بیان کیا گیا ہے، اس قسم کا نامکمل ملاپ برکتہ کنٹرول کے خواہش مندوں کی طرف سے استقرار حمل روکنے یا فعل کو طول دے کر لذت بڑھانے کی غرض سے کیا جاتا ہے اور بعض اوقات قضیب کو باہر نکال کر انزال کو روک بھی لیا جاتا ہے جو صحت اور تندرستی کے لئے سخت مضر ہے۔

نامتام (ادھورا) ملاپ فریق ثانی کے لئے بھی بہت مضر ہے، ملاپ کے وقت عورت کے تناسلی اعضاء میں بھی خون کا اجتماع و امتلا ہوتا ہے جو غیر قدرتی نامکمل ملاپ ہونے کے سبب سے ملاپ کے بعد کامل طور پر غائب نہیں ہو جاتا بلکہ تکرار سے دائمی ہو جاتا ہے۔ بعض ماہرین جنسیات معالجین کی رائے میں غیر فطری ملاپ کے اوقات میں جب مہبل (ویجائنا) کے اندر ہوتا ہے تو منی کے اجزاء اس میں جذب ہو کر عورت کی جنسی صحت اور صحت و طاقت کے لئے مفید ہوتے ہیں۔ انزال خارج از مہبل ہونے کی حالت میں عورت اس قدرتی مفید اجزاء کی قوت سے محروم رہ جاتی ہے۔ (میڈیکل نقطہ نظر سے شائع کیا گیا ہے)

جَلَق، مَسْطَرَبے شَنْ، (Master-Bation)

تعریف مرض :- جلق اُن بُرے اعمال کا نام اور غیر طبعی فعل ہے کہ جب فریق ثانی کی غیر موجودگی میں جالق غیر فطری طریقوں سے اعضائے تناسل میں دھک (ماس) کر کے انتشار اور انزال پیدا کرتا ہے اور سرور حاصل کرتا ہے عام طور پر اس عمل سے جالق اپنے ہاتھ سے کام لیتا ہے، اس لئے اسے مشت زنی کہتے ہیں۔

ہاتھ کے علاوہ دوسری کئی قسم کی چیزوں سے بھی یہ فعل بد کیا جاتا ہے اور بعض نادان جالق تو رُبڑ کی بنی ہوئی اشیاء سے بھی مطلب براری کر لیتے ہیں نیز بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھیل کود کے دوران میں یا گھوڑے کی سواری یا بائیسکل کی گدی کی رگڑ لگنے سے اتفاقیہ طور پر انزال ہو جاتا ہے اور پھر اس فعل بد کی عادت پڑ جاتی ہے۔

جلق کی عادت مردوں میں ہی محدود نہیں ہوتی۔ عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے، اگر گندی فلمیں، فحش لٹریچر، سینما یا ٹیلیوڈوں میں عشق انگیز ماسے دیکھے جائیں تو ان صورتوں میں جوان عورت کا جلق کی بُری عادت کے ساتھ مانوس ہو جانا تعجب کی بات نہیں۔ اس مرض میں مرضی آپ کے بغیر ہاتھ یا رانوں کی حرکات سے آلہ تناسل کو رگڑ کر یا صرف فحش یا عریاں تصویر کے ذریعے مادہ منی خارج کرتا ہے، عورتوں کے جلق کو طلب میں استہزار بالید، سحق اور چپٹی کھیلنا کہتے ہیں۔

وجوہات :- بھرپور جوانی میں بھی شادی نہ کرنا، اُن بیاہتار رہنا، بُری صحبت میں رہنا، بڑھاپے میں رفیقہ حیات کا فوت ہو جانا، کثرت سے بائیسکل یا گھوڑے کی سواری کرنا، غلفہ تنگ یا لمبا ہو یا اس پر زخم بن جائیں، معقد کی بواسیر، دائمی قبض، پیرٹ کے کیڑے وغیرہ جس سے عضو مخصوص خراش پیدا ہو کر بُری عادت کچی ٹرے ہی شروع ہو جاتی ہے اور پھر جوانی تک نہیں جاتی اور مریض کو دین دُنیا کہیں کا نہیں چھوڑتی، عورتوں میں دم جنسی تسکین سے یہ مرض ہوتی ہے، جس کا باعث کمزوری یا سرعت ہوتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس کے کئی اسباب ہیں، جلق کی زیادتی سے عضو مخصوص کے رگ و پھٹوں میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس طرح کثرتِ پُخت نقصان دہ ہے، اسی طرح کثرتِ جلق بھی بے حد خطرناک ہوتی ہے۔

خلق سے کئی گنا نقصان کیوں زیادہ ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جتنا نقصان ملاپ سے اخراج منی ہوتا ہے۔ اتنا ہی نقصان خلق سے اخراج مادہ کی صورت میں ہوتا ہے، گویا اتنا نقصان تو برابر رہا۔

- ۱۔ خلق میں بار بار حرکت کرنے کا موقع ملتا ہے، آسانی ہوتی ہے، رکاوٹیں کم ہوتی ہیں، اس لئے آدمی اس بُرے فعل کا شکار زیادہ ہو جاتا ہے۔
- ۲۔ خلق سے سخت رگڑ کی وجہ سے رگ و پھوں میں خرابی ہوتی ہے۔
- ۳۔ خلق کا عادی یہ سمجھتا ہے، کہ وہ ایک ناجائز فعل کر رہا ہے۔ وہ ایک غیر فطری حرکت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ وہ ایک چوری جیسے فعل بد کا مجرم رہا ہے، ان باتوں کا اس کے ذہن اور اخلاق پر بُرا اثر پڑتا ہے اور وہ ذہنی انتشار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ نقصان ملاپ سے زیادہ ہوتا ہے۔
- ۴۔ ملاپ میں قدرت نے جو حظ اور لذت رکھی ہے، اس مسرت سے جو خون میں حرارت اور گرم جوشی پیدا ہوتی ہے، وہ خلق میں مفقود ہوتی ہے، لئے ویرج کا انزال تو ہو جاتا ہے، لیکن روح کی مسرت مفقود ہوتی ہے۔

یہ ہے فرق دونوں میں، خلق سے ذہن و دماغ پر جو اثرات ہادی ہوتے ہیں، وہ جالبی کو مریض بنانے میں زیادہ مدد و معاون ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جس بڑھ جاتی ہے، ذرا سے بھی سے تصور سے انہیں خواہشات ستاتی ہیں۔ منی اور مذی کا اخراج تصور میں ہی ہونے لگتا ہے۔ علامات :- اس مرض کی بڑی بھاری علامت یہ ہے کہ مریض اپنے کئے پر ایسا نادم اور پشیمان ہوتا ہے کہ شرم کا مارا علاج کرانے کے۔ باقاعدہ کسی ماہر جنیات طبیب کے پاس نہیں جاتا عام حکیموں یا ویدوں یا کسی انٹری یا کسی عطاری سے خفیہ دوا لے کر کھاتا ہے، اخباروں میں اشتہار پڑھ کر دوا منگواتا ہے کھاتا ہے اور نقصان و شرمندگی اٹھاتا ہے۔ آخر مجبور ہو کر یا تو کسی ماہر جنیات طبیب سے رجوع کرتا ہے یا مایوس ہو کر خود کرنے کی دل میں ٹھان لیتا ہے۔

جب مرض کی پوری بڑھوتری ہو جاتی ہے اور مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو چہرہ زرد، آہ سرد، سر جھکائے شرم کے مارے آنکھیں دوچار ہن کرتا، بات آہستگی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر منہ سے نکلتی ہے، جو بات پوچھو، اس کے جواب دینے میں ہچکچاتا ہے اور بات بات کو دہراتا ہے۔ قوت ارادہ کمزور ہو جاتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، دماغی یا محنت کے کام میں بہت جلد تھک جاتا ہے، سانس پھولتا ہے، سارا پ سینہ سے ترسیر ہو جاتا ہے، دل دھڑکتا ہے، نبض سریع (جلد جلد چلنے والی) ہوتی ہے۔ لہجہ اور پاؤں کانپتے ہیں اور سرد ہوتے ہیں۔ دن رات لیٹے رہنے کو جی چاہتا ہے، ہر بات میں وہم، ہر شخص پر شک رہتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے اور ہلکا رہتا ہے، جب نیند آتی ہے تو متوحش خواب دیکھتا یا احتلام ہو کر جاگ اٹھتا ہے یا سب علامات کتابوں یا اشتہاروں میں پڑھتا ہے، ان کو رٹ کر یاد کر لیتا ہے اور اپنے تئیں دُنیا بھر کے تمام دوا اور تکلیفوں کا مجسمہ بنا لیتا ہے اور خوبی یہ ہے کہ بہت سی بات چیت اور سوال و جواب کے بعد ادھر ادھر کی فضول باتیں بنا کر مشکلوں کے بعد مطلب کی بات بتاتا ہے اور کمزوری اور خلق کا اقبال کر لیتا ہے۔

عورتوں میں اس مرض سے فرج متورم، بنظر طویل، شفران بڑے، اندام نہانی کا منہ بڑا اور دھیملا ہو جاتا ہے، ضعف عام، کمی خون اور رکیہ کمزور ہو جاتے ہیں۔

علاج :- عادت بد کی حالت میں سب سے پہلے مریض کو اس فعل سے توبہ کرنی چاہیے۔ خیالات کو درست رکھنا اپنے اختیارات کا کا ناول، سینما اور بُری صحبتوں سے بچنا چاہیے، گرم مصالحہ دارا اشیار کے کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، سادہ غذا، روزانہ غسل، سرد پانی کی دھو، عضو مخصوص اور جڑ پر روزانہ ڈالنا چاہیے، سیر و ورزش وغیرہ انحال میں مصروف رہنے سے اس عادت کو انسان فراموش کر جاتا ہے۔ بعض لوگ جو کسی طرح بھی اس بُری عادت کو ترک نہ کر سکیں انہیں مسکن ادویات دی جاتی ہیں، جس میں دھنیاں، پوٹاشیم برومائیڈ اور مشہور جڑ ہیں، بعض اوقات ان سے بھی نجات حاصل نہیں ہوتی تو عضو مخصوص پر کوئی تیز دوا معالج کے مشورہ سے لگا کر آبلہ اٹھایا جاتا ہے۔

تاکہ انسان اس حرکت کو کر ہی نہ سکے، خوراک کی طور پر مسکن ادویات دینے سے کچھ دنوں تک سکون حاصل ہوتا ہے، مندرجہ ذیل دیسی نسخہ انگریزی ادویات سے یقیناً بہتر اوصاف کا حامل ہے :-

تخم کا ہو دو ماشہ، تخم خیار چھ ماشہ، تخم خرفہ چھ ماشہ، دھنیاں دو ماشہ پیس کر شیرہ نکالیں اور شربت نیلو فر کے ساتھ استعمال کریں، اگر جس بہت بڑھ گئی ہو تو اس میں تخم ریحان چھ ماشہ کا اضافہ کیا جاسکتا ہے نیز اس نسخہ کا استعمال صرف گرمیوں میں کرنا چاہیئے۔
اگر مریض گھوٹنے سے متغیر ہو تو ان دواؤں کا سفوف تیار کر کے شربت یا پانی سے دیا جاسکتا ہے، اس مرض کے علاج میں ہدایات و تدابیر جربان، احتلام کے علاج میں لکھی گئی ہیں، ان پر عمل کریں، اور پہلے مریض کو ذکاوت جس دور کرنے کے لئے احتلام کے علاج میں دیئے گئے کسی ایک نسخہ کا استعمال کریں، پھر اندرونی طور پر معقوی دواؤں اور بیرونی طور پر طلا وغیرہ کا استعمال کریں، جو کمزوری کے بیان میں لکھی گئی ہیں، اس سلسلہ میں دھیان ہے کہ حلق اور کمزوری کا علاج عام طور پر دو تین مہینوں سے لے کر چار پانچ ماہ تک ہوتا ہے۔ یعنی آہستہ آہستہ انسان صحت کی طرف جاتا ہے، بعض حالتوں میں اس سے بھی زیادہ وقت علاج معالجہ میں صرف ہوتا ہے، جو نقصان سالہا سال کی بے اعتدالیوں سے پیدا ہوئے ہیں، ان کا ازالہ چند دنوں میں ہو سکے، تو پھر انسان دل کھول کر یہ لطف اٹھائے۔

سٹیاں بھے کو تو ال اب ڈر کا ہے کا

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نقصان کی تلافی کسی طرح ہو ہی نہیں سکتی، جو انسان سے سرزد ہو چکی ہوتی ہے، علاج معالجہ سے صرف اتنا ہوتا ہے ناکارہ مشین کی مرمت ہو جاتی ہے اور وہ کام دینے لگتی ہے، مگر جس طرح نئی مشین اور مرمت شدہ مشین کے کام میں فرق ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، نئی مشین مرمت کے بعد آئے دن بگڑتی رہتی ہے اور بار بار اس کی مرمت اور احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح سے حلق اور کمزوری کے مریض کی مشینری جب چالو ہو جائے تو اس مشینری کی دیکھ بھال اور مرمت پر خاص توجہ رکھنی چاہیئے اور اس کی تقویت کے لئے ہماری رائے میں سال خصوصاً موسم سرما میں بغیر ضرورت بھی ایک دو ماہ معقویات کا استعمال کرنا اور ملاپ سے لمبے عرصے کے لئے پرہیز کرنا ضروری اور مفید ہوتا ہے۔

شادی سے پہلے یا بعد کی کمزوری

تعریف مرض :- اگر طاقات بالکل ختم ہو جائے تو اس کو شادی سے پہلے یا بعد کی کمزوری کہتے ہیں، لیکن جب اس قوت میں کمی ہو جائے تو اسے کمزوری کا نام دیا جاتا ہے۔

وجوہات :- کثرت ملاپ، جلق، اغلام، کثرت احتلام، جربان، عضو تناسل کے نقائص، خصیہ کا ورم (جو بوجہ زہریلے زخم کے ہو)، ویرج، زیادہ دماغی و جسمانی محنت، رنج و غم، جنرل کمزوری، مٹاپا، نشیلی چیزوں کا استعمال، بعض دفعہ یہ مرض ذہنی و نفسیاتی بھی ہوتا ہے، کیونکہ کئی اب صاحب اولاد اور قوت درست ہونے کے باوجود شکایت کرتے ہیں کہ ان کا عضو چھوٹا ہے، اندک کوشش (خفیہ) چھوٹے ہیں، دینج پٹلا ہے وغیرہ۔
علامات :- عضو سکڑاؤ میں ڈھیلا رہتا ہے، جس سے قوت ملاپ ناقص یا بالکل ختم ہو جاتی ہے، کبھی معمولی سا تناؤ ہو جاتا ہے اور کبھی طبیعت منتشر ہوتی ہے کہ تناؤ بالکل نہیں ہوتا اور کبھی ملاپ کی طرف بالکل رغبت ہی نہیں ہوتی، مریض سست، کمزور، پست ہمت اور چڑچڑا ہوا جاتا ہے۔
چہرہ زرد، نظر کمزور، ماتھے پاؤں سرد، سر کمزور اور پینڈ لیوں میں درد، نبض کمزور، لین بلی، نیند کم، ہاضمہ خراب، بھوک کم اور نسیان کے عوارض آتے ہیں، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں۔ اعصاب کے استرخار سے آلہ تناسل کے پشت کی دریدیں نمایاں ہو جاتی ہیں، اس سلسلہ میں تناسل کا طبی معائنہ کرنے سے آلات کی لاغری، کچی اور رگوں کا پھولا ہونا، نامکمل تناؤ کمزوری کو ثابت کر دے گا۔

جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ مرد جب تناؤ حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اس کی وجہ کمزوری ہے۔ یہ مرض انسان کو اس قدر مایوس اور ناامید کر دیتی ہے کہ اس میں ذرا بھی خود اعتمادی باقی نہیں رہتی، وہ اپنی کمزوری کا طبیب تک سے ذکر نہیں کرتا، کمزوری کا شکار شخص خود کو قبل از وقت بوڑھا محسوس کرنے لگتا ہے۔ کیونکہ وہ مردانگی کی حقیقی نشانی کھو بیٹھتا ہے، ایسے لوگ اس کمزوری کے اسباب سے قطعاً لاعلم ہوتے ہیں، اسباب کے لاعلم ہونے کی وجہ سے وہ علاج سے بھی قطعاً لاعلم ہوتے ہیں۔

کبھی کبھی حد سے زیادہ جسمانی محنت بھی کمزوری کا سب سے بڑا سبب ہے، حقیقت میں یہ کمزوری نہیں ہوتی، جسم کی استعداد سے زیادہ جسمانی محنت کرنے کی وجہ سے جوان و صحت مند مرد بھی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔

مغربی ممالک میں ایسے کھلاڑیوں کے کیس آئے دن اطباء کے سامنے آتے رہتے ہیں جو حد سے زیادہ جسمانی محنت و کسرت کی وجہ سے کئی مہینوں تک جنسی کمزوری کا شکار رہتے ہیں، حد سے زیادہ جسمانی محنت کی وجہ سے مرد کی جمع شدہ اعصابی طاقت کا خزانہ ختم ہو جاتا ہے دوران خون میں فٹور نمایاں ہو جاتا ہے اور دوران خون میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے اٹھنے سے چکر سا آنے لگتا ہے سر میں درد رہنے لگتا اور تمام رات گہری نیند سونے کے بعد بھی تازگی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ پھر مردگی چھائی رہتی ہے، وہ غدد جو دوران خون میں اعتدال رکھتے ہیں نظام جسم کی جدت کو برقرار رکھتے ہیں اپنے قدرتی عمل سے کم و بیش مخرب ہو جاتے ہیں۔ اس کا براہ راست جنسی غدد پر اثر پڑتا ہے کیونکہ دور خون اور کھوکھلے اعضاء جس میں خون کی وجہ سے نعوظ پیدا ہو جاتا ہے، جنسی اختلاط میں پراہم کردار ادا کرتے ہیں، چنانچہ جب دوران خون میں آجاتا ہے اور جدت جسمانی بھی معتدل نہیں ہوتی تو پورا نعوظ پیدا نہیں ہوتا، کھیلوں سے جسمانی تھکن پیدا نہیں ہوتی بلکہ پیشہ وارانہ کام میں سے مصروفیت سے بھی جنسی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، نیند کی کمی کی وجہ سے اعصابی قوت جمع نہیں ہو پاتی، حد سے زیادہ دماغی کام کا بھی یہی ہوتا ہے۔

مختلف لوگوں کی جنسی استعداد مختلف ہوتی ہے، ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں ملاپ کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، جو چوبیس گھنٹے مختلف لوگوں کی جنسی استعداد مختلف ہوتی ہے، ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں ملاپ کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، جو چوبیس گھنٹے ایک بار یا ایک سے زیادہ بار ملاپ کی استعداد رکھتے ہیں، اوسط جنسی استعداد رکھنے والے لوگ سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کے لئے ہفتہ ایک یا دو بار ملاپ کافی ہوتا ہے، ملاپ کی کشش میں کمی ہونے کے ساتھ ملاپ میں کمی واقع ہوتی رہتی ہے، تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کو مہینہ میں ایک بار ملاپ کی خواہش ہوتی ہے۔

اس سلسلہ میں اب یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ حد سے زیادہ ملاپ اور بہت کم ملاپ سے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔

بعض افراد شادی سے پہلے اور شادی کے بعد ملاپ حد سے زیادہ کرتے ہیں۔ ملاپ سے اول تو ابتدا ہی میں نقص ظاہر ہونے لگتا لیکن زیادہ سے زیادہ چالیس پر تالیس سال کی عمر میں یقیناً بڑھاپے کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں اور کھوکھلے اعضاء میں نعوظ پیدا نہیں بہت کم ملاپ کرنے کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سماجی، اخلاقی اور مذہبی وجوہات کی بنا پر ملاپ پر انسان پابندیاں عائد کر سکتا ہے۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ ملاپ سے پرہیز کرنے سے طاقت بڑھتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملاپ سے غیر معمولی پرہیز کرنے سے کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے۔ جو آخر کار شدید کمزوری میں تبدیل ہو جاتی ہے، کمزوری مکمل طور پر ملاپ سے پرہیز رکھنے سے کبھی دور نہیں ہو سکتی، اگر میں اعتدال برتنا چاہے تو قوتیں بحال ہو سکتی ہیں، ایسے لوگ جو بہت عرصہ تک ملاپ نہیں کرتے ان کی طاقت پھر مردہ ہو جاتی ہے۔

جذبات کا انسان کے نظام جسم پر گہرا اثر پڑتا ہے، خاص طور پر حساس طبع لوگوں کے نظام جسم پر جذبات کا بہت اثر ہوتا ہے، ناامیدی اور برافروختگی جیسے نقصان دہ جذبات کی فراوانی حساس لوگوں میں کمزوری اور ملاپ سے نفرت کا موجب ہو سکتی ہے۔ دماغ و غم اور نفرت کے جذبات بے ہونے کی وجہ سے حساس طبع لوگ وظیفہ زدگی ادا کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں، لاشعوری طور پر بھی یہ

ذہن میں موجود ہو سکتے ہیں۔ اور کمزوری پیدا کر سکتے ہیں۔ کمزوری کا ان کے حساس ذہن پر مزید بڑا اثر پڑتا ہے اور وہ مکمل طور پر یاس و ناامیدی کا شکار ہو جاتے ہیں۔

عام طور پر یہ لوگ اپنی کمزوری کا سبب رطوبات میں بے قاعدگی اور نقص تصور کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی جنسی رطوبات میں کوئی نقص نہیں ہوتا، غم و غصہ، یاس و نفرت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے ساتھ ہی کمزوری سے بھی نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔ جب تک ذہنی کش مکش باقی رہے گی، کمزوری بھی باقی رہے گی، احساس کمتری اور خود اعتمادی کی وجہ سے ہی اکثر لوگ کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن پر غم و غصہ اور یاس و نفرت کے جذبات اثر انداز نہیں ہوتے اور ان کی طاقت بدستور برقرار رہتی ہے۔ لیکن حساس طبع لوگوں میں یہی جذبات نظام جسم پر اثر انداز ہو کر کمزوری پیدا کر دیتے ہیں۔ اب جذبات کا جب جنسی غدد پر اثر پڑتا ہے تو ان کے فعل میں فتور پیدا ہو جاتا ہے۔ جب حقیقی طور پر خواہش ملاپ پیدا ہوتی ہے تو خضیوں میں سے خلیات نکل کر خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان خلیات کے خون میں شامل ہو جانے سے عضو مخصوص میں نعوظ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن خضیوں میں سے کافی مقدار میں یہ خلیات نہ نکلیں تو نعوظ پوری طرح پیدا نہیں ہو سکتا، اگر ملاپ کی خواہش حقیقی ہو تو خضیوں میں سے یہ خلیات نکل کر خون میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن ملاپ کی حقیقی خواہش نہ ہونے کی وجہ سے جب نعوظ پیدا نہیں ہوتا، تو وہ شخص خود کو ناکارہ تصور کرنے لگتا ہے۔

ذہن کے علاوہ جسمانی اسباب سے بھی کمزوری پیدا ہوتی ہے، موٹاپا، رگوں کا پھول جانا اور گنٹھیا جیسے امراض ہیں، جن سے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، ان امراض کی وجہ سے جنسی غدد قبل از وقت ناکارہ ہونے لگتے ہیں اور خواہش ملاپ کے وقت خضیوں میں سے رطوبات نکل کر خون میں شامل نہیں ہوتیں اور پورا نعوظ پیدا نہیں ہو پاتا، رگوں کے پھونکنے سے خاص طور پر کمزوری پیدا ہوتی ہے، اگر کمزوری پیدا ہوتے ہی یاس و ناامیدی محسوس ہونے لگے تو کمزوری مکمل ہو جاتی ہے اور مریض خود کو ناقابل علاج تصور کرنے لگتا ہے۔

شراب کا بھی طاقت پر بڑا اثر پڑتا ہے، شراب جنسی غدد کو ناکارہ کر دیتی ہے، تجربہ گاہوں میں جانوروں پر شراب سے تجربات کرنے پر معلوم ہوا کہ شراب کے لگاتار استعمال سے جنسی غدد ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شراب سے خضیوں کے خلیات سخت ہو جاتے ہیں۔ اور خضیوں کی جنسی رطوبت خون میں شامل ہو کر نعوظ پیدا نہیں کر پاتی، کئی سال تک لگاتار شراب پیتے رہنے سے طاقت کمزور ہونے لگتی ہے اور آخر کار بالکل ختم ہو جاتی ہے۔

بعض لوگوں میں پچاس سال گزرنے کے بعد بڑھاپے اور کمزوری کے آثار نظر آنے لگتے ہیں، جو آہستہ آہستہ مکمل کمزوری میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں میں کوئی جذباتی کش مکش نہیں ہوتی، اور ان کے غدد بھی صحت مند ہوتے ہیں، دوران خون بھی ٹھیک ہوتا ہے، لیکن عضو مخصوص کی رگوں کا معائنہ کرنے سے پتہ چلتا ہے، کہ اس کی رگیں پھول کر سخت ہو گئی ہیں، ان پھولی ہوئی رگوں میں جب خون پہنچتا ہے تو نعوظ پوری طرح سے نہیں ہوتا، بہت زیادہ شراب اور تمباکو کا استعمال کرنے سے بھی رگیں پھول جاتی ہیں جس کی وجہ سے نعوظ حاصل نہیں ہو پاتا۔

مختصر طور پر پچپن کی غلط کاریوں کے علاوہ مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر بھی کمزوری پیدا ہوتی ہے :-

- ۱۔ حد سے زیادہ ذہنی اور جسمانی تھکان - ۲۔ خیند کی کمی، ۳۔ ضرر رساں جذبات کی فراوانی، ۴۔ رگوں کا سخت ہونا اور پھول جانا نیز فریج لیدر (نمودہ) کا کثرت استعمال، ۵۔ بہت زیادہ ملاپ، ۶۔ ملاپ سے عرصہ تک قطعی پرہیز، ۷۔ جنسی غدد کا ناقص فعل، ۸۔ شراب کا حد سے زیادہ استعمال، ۹۔ بہت زیادہ تمباکو نوشی، ۱۰۔ زہریلے زخم، دق، گنٹھیا اور خون کا دباؤ۔

علاج :- جیسا کہ ہم اپنی جنسی نقصان شادی کی پہلی رات دگرہستی چاند اور جوانی دیوانی میں مردانہ امراض کے علاج میں کچھ آئے ہیں کہ کمزوری کے علاج کے لئے تین اصول ہیں :-

۱۔ تسکین

۲۔ تقویت

۳۔ تحریک

۱۔ مسکنات :- مسکنات سے مریض کے دماغ و اعصاب کا اضطراب و بے قراری دور کی جائے، یعنی تسکین دی جائے۔

۲۔ تقویت :- معده، جگر، اعصاب اور دماغ کو تقویت دی جائے، تاکہ کثرت ملاپ یا جلق سے جو طاقت ضائع ہوئی ہے، اس کی تلافی ہو جائے۔
یعنی تقویت دی جائے۔

۳۔ تحریک :- اعصاب کو تحریک دی جائے تاکہ ان کے اندر شہوانی لہر پھر عود کر آئے یعنی تحریک پہنچائی جائے۔

اگر معالج ان تینوں اصولوں کو سامنے رکھ کر علاج کرے گا تو یقیناً کامیابی ہوگی اور ادویات کے ساتھ مندرجہ ذیل ہدایات پر بھی عمل کیا جائے۔
۱۔ سست عادات سے نفرت کی جائے اور کھلی ہوا میں ورزش اور مقوی غذاؤں کا استعمال کیا جائے، (۲)۔ ریخ دالم سے دور رہا جائے۔
(۳) ملاپ سے پرہیز کیا جائے۔ (۴)۔ سست بخش مناظر دیکھے جائیں۔

بقول جالینوس پورے تناؤ کے لئے مرکز تناسل کے اعصاب، دماغ، دل، جگر وغیرہ کا بھی درست ہونا ضروری ہے، ورنہ ان میں سے کسی ایک کی خرابی سے طاقت میں مختلف نقائص پیدا ہو سکتے ہیں، چنانچہ کمزوری دماغ کے باعث کمزوری ہو تو ملاپ کی لذت کم ہوتی ہے۔
کمزوری دل کے باعث یہ عارضہ ہو تو تناؤ پورا نہیں ہوتا، ایسا ہی ریشہ و خفقان کی حالت میں ہوتا ہے، کمزوری جگر سے ہو تو عضو مخصوص میں سکڑاؤ اور ڈھیلا پن ہوتا ہے، کمزوری گردہ سے ہو تو پلا ارادہ و یرج نکل جاتا ہے، اس لئے کمزوری کے علاج سے پہلے عام صحت کی درستی ضروری ہے۔

ایلوپتھک علاج :- اس طریقہ علاج میں سب سے افضل علاج خضیوں کے ہارمون سے ہے اور ہائے تجربات میں یہ علاج پچاس برس سے اوپر کے مریضوں کے لئے بالخصوص فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، خصوصاً جن کو کمزوری خضیوں کی عام کمزوری کے سبب سے لاحق ہو۔

۱۔ پیرانڈرین (PERANDREN) :- یہ خضیوں کا جوہر لطیف تیل میں حل شدہ ہوتا ہے۔ اس کی طاقت ملی گرام کی صورت میں ہوتی ہے، جو کہ ۵ ٹی گرام اور ۲۵ ٹی گرام کی قوت کے ہوتے ہیں، کمزوری میں مفید ہیں، اس کا ایک سی سی کا عضلاتی ٹیکہ ہفتہ میں دو بار کیا جاتا ہے، کارنک کمپنی اس کو (Testandron) کے نام سے فروخت ہوتی ہے، اس کے ٹیکوں سے سخت تناؤ پیدا ہوتا ہے یا ٹیسٹورون (Testoviron) کے ٹیکے استھا کئے جائیں۔

۲۔ انڈرٹین (ANDROSTIN) :- یہ بھی خضیوں کا جوہر لطیف ہے، شادی سے پہلے و بعد کی کمزوری اور جنرل کمزوری کا کامیاب علاج ہے، اس کے انجکشن کرنے سے مردہ رگوں میں نئی طاقت کی رود درنے لگتی ہے۔ اس میں دو قسم کے ایمپولز ہوتے ہیں، جو کہ ایک روز "A" اور دوسرے "B" کرنا چاہیئے۔ "A" کے انڈرپانی میں حل ہونے والا جوہر لطیف اور "B" کے انڈرٹیل میں حل ہونے والا جوہر لطیف ہوتا ہے۔

۳۔ ٹیسٹوسائن (TESTOSYN) :- یہ خضیوں کے جوہر کا آبی محلول ہے اور کمزوری کے لئے مفید ہے، مقدار خوراک ایک سے دوسری روزانہ ۱۰ دیں۔ برٹش بائریکپنی کی یہی دوائی وری گان (Virigon) کے نام سے مارکیٹ میں ملتی ہے۔

۴۔ ٹیسٹی فورٹان (TESTI FOR TAN) :- یہ خضیوں، پچوڑی، متازائیڈ، سپرائیل وغیرہ غدودوں اور شریکینا، فاسفورس وغیرہ سے مرکب ہے کمزوری کے لئے مفید ہے، دوسری عضلاتی انجکشن روزانہ یہ دوائی مارکیٹ میں مختلف ناموں ٹیسٹی ٹوٹل (Testitotal) ٹیسٹو ہارما (Testo-Harmon) اور ٹیسٹو نورین (Testo-Phorin) ناموں سے بھی فروخت ہوتی ہے۔

۵۔ ٹیسٹارمون (Testar Mon) :- یہ بھی خضیوں کی ہارمون ہے، کمزوری کے علاوہ دماغی و اعصابی امراض کے لئے بھی مفید ہے، مارکیٹ دوائی ٹیسٹو پروپین (Lesto Propen)، ٹیسٹوسان (Testo San)، ٹیسٹو وی ریلین (Testo Vi rilin) وغیرہ ناموں سے ملتی ہے۔

۶۔ میتھیل ٹیسٹوسٹرون (METHYL TESTOSTERON) :- یہ مردانہ خصلتوں کی ہارمون ہے، جو کہ ہر قسم کی کمزوری کا طب جدید میں نہایت مفید علاج ہے۔ تمام فوائد پیرانڈرین کے مطابق ہیں۔

۷۔ ڈیٹا من بی ۱۲ (B. 12) :- یہ بورایکٹریٹ کا ایک جزو ہے۔ کمی خون، کمزوری، یرقان، سنگرہنی کے علاوہ شادی سے پہلے و بعد کی کمزوری کے لئے مفید ہے۔ طاقت بڑھانے کے لئے نہایت اعلیٰ چیز ہے۔ مقدار انجکشن ۱۰۰ میکروگرام عضلاتی طور پر دیں، اس سلسلہ میں میکراہین (Mecrabin) ساختہ گلیکوسومپنی نہایت موثر ہیں اور جنرل کمزوری و شادی سے پہلے و بعد کی کمزوری کے لئے مفید ہیں۔ پیٹنٹ ادویات میں ڈامیانہ پلز، فاسفورس پلز، کستوری پلز، ایسٹن سیرپ وغیرہ بہترین ادویات ہیں۔

۸۔ مائڈیک (Eldec) پارک ڈیوس ————— ۳۰ یا ۴۰ سال سے بڑوں کے لئے یہ علاج مفید ہے سرطان کے مریضوں کو یہ ہرگز نہ دیں، ایک کیپ شول دن میں تین بار کھانا کھانے سے پہلے تازہ پانی سے دیں، کمزوری کے لئے مفید ہیں۔

۹۔ انڈراٹین (Androsten) سیبا ————— ایک دو گولی دن میں دو بار تازہ پانی سے دیں۔ یہ خصلتوں کی ہارمون سے بنتی ہے۔

۱۰۔ اے وین (Ewon) مرک ————— مرد اور عورت دونوں کی کمزوری میں مفید ہے۔ یہ ڈیٹا من "ای" ہے۔ ایک تا دو گولی دن میں تین بار تازہ پانی سے دیں۔

۱۱۔ انٹیکس (Antex) :- مردانہ اور زنانہ کمزوری کو دور کرتی ہے۔ یہ حاملہ گھوڑیوں کے خون سے حاصل کردہ ہارمون ہے اور بذریعہ انجکشن استعمال کی جاتی ہے۔

۱۲۔ پیرینڈرین (Perandren) سیبا ————— یہ ٹیسٹوسٹرون پر پوٹینٹ کا تجارتی نام ہے، اس کی ٹیکہ زبان کے نیچے رکھ کر چوسی جاتی ہے یا انجکشن ۲۵ ملی گرام کا انٹرا اسکولر دیا جاتا ہے، اس کی کریم کمزوری کے لئے باہر سے ماس کی جاتی ہے یہ طلبہ کا کام کرتی ہے، یہ خصلتوں کی ہارمون ہے اور کثیر الاستعمال ہے۔ اس میں میتھیل ٹیسٹرون شامل ہے۔

۱۳۔ سکھائیٹ (Sukhaiit) ملتان دو خانہ (جربڑڈ) پانی پت، ایک گولی صبح و ایک گولی شام ہمراہ دودھ نیم گرم کھانا کھانے کے بعد دیں۔

۱۴۔ جیریٹون (Geriatone) جان واسٹھ ————— ایک کیپ شول روزانہ دن یا رات کو کھانا کھانے کے بعد لینا کافی ہے میتھیل ٹیسٹرون، ڈیٹا من بی ۱۲، ڈیٹا من سی، نوٹک ایڈ وغیرہ کا مرکب ہے، بڑھاپے کی کمزوری میں مفید ہے۔

۱۵۔ ڈامیانہ کمپونڈ میتھیل ٹیسٹرون (Damiana CPO with Methly Testosterone) سمٹھ ————— ایک کیپ شول روزانہ دن یا رات کو کھانا کھانے کے بعد دیں۔ ڈامیانہ، میتھیل ٹیسٹرون، فاسفورس وغیرہ کا مرکب ہے۔

۱۶۔ ڈیڈیمن (Didymen) بزوزولیکم ————— خصلتوں کے جوہر لطیف سے بنتی ہے، ایک تا تین گولی دن میں تین بار دیں۔

۱۷۔ زائیگان (Zygon) ساراجائی ————— یہ ڈیٹا من "ای" سے تیار ہوتی ہیں۔ ایک دو ٹیکہ دن میں دو سے تین بار تازہ پانی سے دیں۔

۱۸۔ ٹیسٹوویرون (Testoviron) شیرنگ ————— ۲۵ ملی گرام کی ٹیکہ منہ کے ذریعے لینے کے لئے، انجکشن کے لئے ۵۰ ملی گرام کے ایمپول ملتے ہیں۔ منہ سے لینے کی ٹیکہ کا مادہ میتھیل ٹیسٹرون ہوتا ہے۔

۱۹۔ پاسوماٹرانگ (Pasumastrong) ای مرک ————— ایک دو گولی دن میں تین بار دیں۔

۲۰۔ ٹسٹا فارم (Testaform) بی، ڈی، ایچ ————— ۵ کی طرح استعمال کریں۔

۲۱۔ یونی ٹیسٹرون (Unitestron) یونی کم ————— ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام کا عضلاتی انجکشن مرض کے مطابق کریں۔

۱۵۔ ٹیسٹو ویرون بکل ٹیبلس (Testo viron Buccal Tab) شیرنگ ————— یہ میٹیل ٹیسٹو سٹرون سے تیار کی جاتی ہیں، ایک ٹیکہ ایک سے تین بار زبان کے نیچے رکھ کر چوسنی چاہیئے اور انہیں سرد و تاریک جگہ میں رکھنا چاہیئے۔

۱۶۔ اورے ٹون ایم (Oreton-M) شیرنگ ————— یہ میٹیل ٹیسٹو سٹرون کا تجارتی نام ہے، خوردنی طور پر استعمال کرائی جاتی ہے اور ٹیسٹو سٹرون کے اوپر والے فوائد ہی رکھتی ہے، دس یا پچیس ملی گرام طاقت والی دوائی خوردنی استعمال کے لئے اور مرہم خارجی استعمال کے لئے مارکیٹ میں ملتی ہے۔

۱۷۔ نیو ہومبریول ایم (Neo Hombreol-M) روش ————— شیرنگ ————— بس ملی گرام والی ٹیکہ ہفتہ میں تین بار قبل از غذا کھلائیں یا پانچ ملی گرام زبان کے نیچے رکھنے والی (Sublingual) ٹیکہ استعمال میں لائیں۔ یہ دوا مقامی استعمال کے لئے بشکل مرہم ملتی ہے دو گرام مرہم میں چار ملی گرام ٹیسٹو سٹرون ہوتی ہے۔

۱۸۔ جوی نین (Juvenin) بائر ————— ایک سے دو گولی دن میں تین بار براہ دہن دیں، اس کے ایک سی سی کے ایمپولز بھی انجکشن کے لئے ملتے ہیں۔

۱۹۔ ٹیسٹو سٹرون پروپونیٹ ان آیل (Testo Sterone Propionate-oil) یہ گھول ۲۵ ملی گرام فی سی سی اور ۵۰ ملی گرام فی سی سی کے ایمپولز میں آتا ہے اور بذریعہ عضلاتی انجکشن مستعمل ہے۔

۲۰۔ جیرونل (Geronyl) رسل ————— قبل از طعام صبح و شام پانی کے ساتھ ایک ایک گولی نگل لینی چاہیئے، ہارمون اور حیاتین کی کمی کو دور کرتا ہے۔

۲۱۔ ٹسٹوفاس (Testophos) سوئیزر لینڈ ————— دو گولی رات کو دودھ کے ساتھ دیں، یہ میٹیل ٹیسٹو سٹرون، یوبیمین اور وٹامن بی وغیرہ کا مرکب ہیں۔

۲۲۔ اوکاسا (Okasa) دوٹکیاں روزانہ دن میں دو بار دیں۔

بعض دفعہ جو ہر خصلہ و اس کے مرکبات حضرت رساں بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اس لئے کمزوری کے علاج میں ہمیشہ ایسی علاج کو ترجیح دی جاوے چاہیئے۔ مندرجہ ذیل آسان مجربات کمزوری کے لئے بہت مفید ہے۔

یونانی علاج :- معالج کو مریض کی حالت کے مطابق ان مجربات میں سے کسی ایک نسخہ کو استعمال میں لا کر فائدہ اٹھانا چاہیئے۔
حب خاص :- یہ نسخہ حکیم اجل خان صاحب دہلوی کا معمول مطب تھا، جنرل ٹانک ہے، ہر مرض کے بعد کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور مقوی ہے۔ کشتہ فولاد کشتہ سونا، کچلہ شدہ، جدوار، جند بیدستر، بہمن سفید، عنبر اشہب، کستوری خالص، کیس کشمیری ————— تمام ادویات برابر وزن لے کر پان کے رس میں کھل کر کے مونگ کے دانہ کے برابر گولیاں بنائیں، ایک گولی بعد از غذا دیں۔

اس نسخہ کی کامیابی اصلی ادویات اور بہترین کشتہ جات پر منحصر ہے، ہر نسخہ استعمال کے بعد دو دن دوا بند رکھی جائے۔
حب عنبر مومیائی :- قوت کے لئے مخصوص ہے کمزوری اور سستی کو دور کرتی ہے :-

پنیر مایہ شتر اعرابی متن ماشہ، کستوری خالص ایک ماشہ، مصطکی رومی ایک ماشہ، لونگ ایک ماشہ، عنبر اشہب دو ماشہ، خصلہ الشعلة دو ماشہ، جڑ پان دو ماشہ۔

سب کو کوٹ چھان کر گولیاں چھوٹے ٹخوہ کے برابر بنالیں۔ ایک گولی رات کو سوتے وقت یا صبح کھا کر اوپر سے ٹخوہ خام کا پانی یا دودھ پی جائیں جو چینی سے میٹھا کر لیا گیا ہو۔

حب مقوی :- جادری، لونگ، کیسر، جانفل، طباشیر، دارچینی، ثعلب مصری، کشتہ قلعی ہر ایک چھ ماشہ، کچلہ شدہ تین ماشہ، انیون، کستوری خالص ہر ایک دو ماشہ، کوٹ چھان کر گوند کے پانی سے گوندھ کر گولیاں بقدر چھوٹے ٹخود کے بنالیں۔ خوراک ایک گولی ہمراہ دودھ کھانا کھانے کے ڈیڑ گھنٹہ بعد لیں اور ہر سات دن کے بعد دو دن دوائی بند رکھیں۔

کمزوری کے لئے مفید ہے، مادہ کو گاڑھا کرتی ہے، جن عورتوں کو کمزوری کا عارضہ ہو ان کے لئے مفید ہے۔ یہ دوائی احتلام کے مریضوں کے لئے نقصان دہ ہے۔

حلوائے بیضہ مرغ :- بیضہ مرغ (مرغی کے انڈے) ۲۴ عدد لے کر پانی میں جوش دے کر انڈوں کی زردیاں نکال لیں اور خالص گھی گاؤ پاؤسیر اس قدر بھونیں کہ خستہ ہو جائے، پھر مصری یا چینی آدھ سیر کا قوام بنا کر زردیاں بریاں شدہ ڈال دیں، بعد ازاں جانفل، جادری ہر ایک پانچ ماشہ، کوٹ چھان کر اور مغز بادام میٹھے آدھ پاؤ، پستہ پانچ تولہ کو گرم پانی میں بھگو کر چھلکا اتار کر پھانکیں بنا کر ملا دیں اور سب سے آخر میں کیسر تین ماشہ، روح گلاب یا روح بید مشک میں حل کر کے ملا دیں، خوراک دو تولہ بوقت صبح بطور ناشتہ استعمال کریں، اوپر سے گرم دودھ پی لیں۔

بدن کو موٹا کرتا ہے، کمزوری کو مفید ہے، موسم سرما کا بے نظیر تحفہ ہے۔

دولت کمزوری :- ایک انڈے کی سفیدی وزردی لے کر گھی خالص، پیاز کا پانی، گاجر کا پانی، ایک ایک انڈے کا خول بھر لیں اور پانچوں آگ پر نیم گرم کر کے پیس۔ مغزیات کا استعمال کریں اور تیل کی دترش چیزوں سے پرہیز کریں، کمزوری کو دور کرتی ہے، بدن موٹا اور ویرج زیادہ بڑا کرتی ہے، حکیم نابینا دہلوی کا مشہور نسخہ ہے۔

معجون بیضہ مرغ :- عقرقرچا، لونگ، سونٹھ ہر ایک تین تولہ، زردی بیضہ مرغ ۲۰ عدد، شہد خالص ۲۵ تولہ، معجون بنائیں، کستوری خالص ماشہ کیسر تین ماشہ، پیس کر اضافہ کریں اور ہر روز غذا سے پہلے ۹ ماشہ کھاتے رہیں۔ موسم سرما میں سرد مزاجوں کے لئے بہترین معوی ہے۔

حب مقوی :- کستوری خالص، جڑ پلن، جادری، درونج عقربی، جند بیدستر، ہوزن کوٹ کر برگد کے دودھ یا شہد خالص میں گولیاں بقدر لونگ بنائیں، دو گولی صبح و شام دودھ نیم گرم سے استعمال کریں، کمزوری دل اور اعصاب کی تقویت کے لئے نہایت مفید ہیں۔

کشتہ سونا :- برادہ سونا شدہ ایک تولہ کو تلسی بوٹی کے رس میں اس قدر کھل کر لیں کہ ایک پاؤ پانی جذب ہو جائے، پھر ٹکیاں بنا کر ان کے سکورہل میں رکھ کر گل حکمت کریں۔ اور دس سیراپوں کی آگ دیں، ایک چادل ہمراہ مکھن یا بالائی دیں، مقوی ہے، جسمانی طاقت بڑھانے کے لئے بے نظیر ہے۔

دیگر :- خالص درق سونا ایک تولہ، شہد خالص پانچ تولہ میں خوب حل کر کے ڈالیں کشتہ تیار ہے۔ خوراک دو چاول، دواء المسک معتدل جواہر دالی دیں، اعضائے رومیہ کو تقویت دینے میں نہایت مفید ہے۔

حب مقوی :- کشتہ چاندی ساڑھے چار ماشہ، جادری، کیسر، ریگ ماہی ہر ایک ڈیڑھ تولہ، جانفل ۹ ماشہ، سمندر سوکھ ۹ ماشہ، زہر مہرہ ۱ ماشہ، کستوری خالص ۱ ماشہ۔

کستوری و کیسر کو روح گلاب میں حل کریں، باقی دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف بنالیں اور رس پان میں جگلی بیر کے برابر گولیاں بنائیں۔ ایک گولی ہمراہ دودھ ۱۲ سیر کھلائیں، اوپر سے میٹھا پان چھائیں۔

زود جام عشق :- زعفران، دارچینی، جانفل، انیون، م، مشک، عقرقرچا، شکر، ق، قرنفل (لونگ)، سولے کستوری کے باقی تمام ادویات تین تین ماشہ، کستوری ایک ماشہ، عرق گلاب کے ساتھ روزانہ دن کھل کر لیں، آدھی رتی ہمراہ مکھن یا بالائی ایک تولہ میں لپیٹ کر کھلائیں، دن میں ایک بار، رات کو نیم گرم دودھ سے پلائیں، اگر مزاج گرم ہو تو ہر روز

کرنے کے لئے ایک گولی ڈیڑھ پاؤ بھری کے دودھ کے ساتھ شام کو لیں، پانچ روز کے بعد جسم پر چھوٹیاں چلتی معلوم ہوں گی، ایک ہفتہ کے بعد قوت کا ظہور ہوگا، کامل چالیس روز کے استعمال سے بہت طاقت پیدا ہوگی، اگر مرض برداشت کر سکے تو دو گولی روزانہ صبح و شام دی جائیں، دورانِ استعمال تیل کی ترشی اور ملاپ سے پرہیز ضروری ہے۔

کمزوری کے لئے مفرد ادویہ کا استعمال

- ۱۔ اگر اونٹنی کا دودھ بقدرِ ہضم بیس روز تک پیتے رہیں تو اس سے قوت پیدا ہوتی ہے۔
- ۲۔ اگر ملاپ سے آٹھ گھنٹہ پہلے پیز شربائے اعزابی بقدرِ دانِ خود تین چھٹانک عرقِ گلاب میں مل کر کے پی لیں تو تقویت کے لئے نہایت مفید ہے۔
- ۳۔ زنج ادنگن چار ماشہ انگوڑ کے رس کے ساتھ کھانا مقوی ہے۔
- ۴۔ گاجر کا مربہ شہد میں بنا کر کھانا مقوی ہے۔
- ۵۔ انڈے کی زردی گھی میں بھون کر اس میں سوٹھ ایک ماشہ سفوف بنا کر ملا کر کھانا بہترین مقوی ہے۔
- ۶۔ جڑ پان ۳ ماشہ کا سفوف ہمراہ دودھ کھائیں، مقوی ہے۔
- ۷۔ ثعلبِ مصری چھ ماشہ ہمراہ شہد پیس کر کھانا مفید ہے۔
- ۸۔ سوٹھ تین تولہ، پٹی ایک تولہ شہد کے ساتھ بھون بنا کر چار ماشہ گرم پانی سے کھانا مفید ہے۔
- ۹۔ کچلہ شدہ پراچاول، بالائی میں ملا کر اوپر سے دودھ پی لیں، بہترین مقوی اعصاب و مقوی ہے۔
- ۱۰۔ معز بادام و چروبنی بوقت صبح ہمراہ دودھ استعمال کریں۔

کمزوری کے لئے جڑی بوٹیوں کا استعمال

- ۱۔ اونٹ کٹارا بوٹی کی جڑ ایک تولہ پوٹلی باندھ کر ڈیڑھ سیر دودھ میں جوش دیں، اس میں ایک سیر پانی اور چار عدد چھوٹے بھی ڈال دیں، جب پانی خشک ہو جائے اور دودھ باقی رہ جائے تو آگ سے اتار کر پی لیں، کمزوری کے لئے مفید ہے۔
- ۲۔ مرغی کا اندہ ایک عدد توڑ کر اس کی زردی اور سفیدی کسی برتن میں ڈالیں، پھر پیاز کا پانی، ادراک کا پانی، گاجر کا پانی اور گھی گائے اس خول کے اندر بھر کر اور سب کو پھینٹ کر حلوا بنادیں۔ یہ حلوا ہر روز تیار کر کے کھانے سے قوت میں اچھا اضافہ ہوتا ہے، اگر قوت برداشت ہو تو مرغی کے اندھے اور دوسری ادویہ کی مقدار دگنی کر سکتے ہیں۔
- ۳۔ لاجبنتی بوٹی کے پتے تین ماشہ، روپیہ خالص چاندی شدہ کے تنچے اور اد پر دے کر ارد گرد ایک سفید کپڑا لپیٹ کر دوسیر ایلوں کی آگ دیں، سرد ہونے پر نکال لیں، کشتہ سالم الحروف تیار ہوگا، ایک چاول کھن میں دیں بے حد مقوی و اعصابی ہے۔
- آیور ویدک علاج :- قدیم آیور ویدک گرنتھوں میں باجی کرن ادویہ کا خاص طور پر ذکر ملتا ہے، سنکرت میں باجی گھوڑے کو کہتے ہیں، اہ کرن یعنی لسنے والی، پس جو ادویہ یا اغذیہ انسان کو گھوڑے کی طرح طاقتور بنائیں، ان کو باجی کرن کہتے ہیں، طب آیور وید میں باجی کرن مفرد ادویات حسب ذیل میں جنہیں استعمال کر کے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

- ۱۔ گائے یا بھینس کا دودھ یا مکھن، ۲۔ دودھ مع دال ماش، ۳۔ بادام کا حلوا، ۴۔ گھی اور شہد، ۵۔ ناریل کا معز، چلوڑہ، چھوٹے چروبنی، ۶۔ زردی بیضہ مرغ، ۷۔ ثعلبِ مصری، ۸۔ شقائقِ مصری، ۹۔ موسلی سیاہ یا سفید، ۱۰۔ بہن سرخ یا سفید، ۱۱۔ کستوری، ۱۲۔ موتی، ۱۳۔ کبیر

۱۴۔ مغز کوچ، ۱۵۔ موچرس، ۱۶۔ نیچ بند، ۱۷۔ تل کالے۔

ان اشیا میں سے حسب ضرورت استعمال کرنا اس مرض سے محفوظ رہنا ہے۔

کمزوری کے لئے آیورویدک تجربات

باجی کرن چورن :- مغز کوچ، اسگندھ ناگوری، تال مکھانہ، شقائق مسری ہر ایک پانچ تولہ، ان سب کا سفوف بنا کر برابر مسری ملا کر ہمارے صبح و شام ہمراہ دودھ گائے یا بھینس نیم گرم سے استعمال کریں۔

بست کسماکرس (رسیندرسار) :- کشتہ سونا، کشتہ چاندی ہر ایک دو دو تولہ، کشتہ قلعی، کشتہ سیسہ، کانت لوہ ہر ایک تین تولہ، کشتہ ابرق سیاہ، کشتہ مرجان، کشتہ موتی ہر ایک چار تولہ۔

ترکیب نیاری :- مذکورہ بالا ادویہ کو دودھ گائے میں بھادنا دیں، بعد میں رس گنا، رس برگ بانسہ، لاکھ کا کاڑھا، مشک بالا کا کاڑھا، جڑ کیلا کارس دیکھنے کے پھول کارس، سفید کل کارس، مالتی کے پھول کارس، ہر ایک رس کی سات سات بھادنا دیں کر کستوری ملا کر ایک ایک رتی کی گولیاں بنالیں، خوراک ایک گولی ہمراہ دودھ، مسری، بالائی یا مکھن کے ساتھ دیں، دل و دماغ اور نظر کو طاقت دیتا ہے۔ ذیابیطس کے لئے مشہور رساں ہے، جنرل ٹانک ہے، امراض دل، کمزوری اور کھانسی کے لئے مفید ہے۔

کستوری آدی گٹکا :- کشتہ سونا چھ ماشہ، کستوری خالص ایک تولہ، کشتہ چاندی ڈیڑھ تولہ، کیسر کشمیری دو تولہ، چھوٹی لاکھی اڑھائی تولہ، جافل تین تولہ، طباشیر تین تولہ، جادتری چار تولہ۔

ترکیب نیاری :- کیسر و کستوری کے سوا سب ادویہ کو علیحدہ علیحدہ سفوف بنائیں، پھر کیسر کو کھل میں پس کر دودھ بکری میں اس قدر کھل کریں، کہ مکھن کی طرح ہو جائے، پھر کستوری ملا کر کھل کر کے دیگر ادویہ ملا دیں اور دو تین روز تک بکری اور رس بنگلہ پان سے کھل کر کے ایک ایک رتی کی گولیاں بنائیں۔

خوراک ایک گولی صبح و شام کو بالائی میں رکھ کر دیں اوپر سے شہد ملا دودھ پلائیں۔
فوائد :- کمزوری کی کامیاب دوا ہے، اعصابی کمزوری، دل و دماغ، جگر، معدہ کی کمزوری کو دور کر کے بھلی کی لہر دوڑا دیتی ہے، شانہ کو طاقت دیتی ہے، سردیوں میں اس کا استعمال نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔

علاوہ ازیں رس سیندور، کشتہ شنگرف، کشتہ سونا، کشتہ سنگھیا، کشتہ فولاد خاص، کشتہ چاندی، کشتہ شنگرف مومیہ خاص، برہمت اشو گندھک آدی گھرت، سدھ مکردھوج، پورن چندر رس، مکردھوج رس، لکشمی ولاس رس، شری مدن آندھودک، کیسر آدی گٹکا، مہامد آندھودک، شتاوری مودک، مدن سندھین چورن، شوگٹکا، کام دیک رس وغیرہ بہترین ادویات ہیں۔

ضماد، طلا و پوٹلیاں

عضو کی خرابیوں کے علاج کے کئی طریقے رائج ہیں۔ لیپ، طلا، مالش اور کور کی ادویات دی جاتی ہیں، ادویات کے بغیر جو طریقے عضو کی تر اور تقویت کے لئے رائج ہو چکے ہیں، ان میں دو باتیں خاص طور پر قابل عمل ہیں۔

سیفی ریزر یا دوسرے اُسترے سے جو اچھا اور مصفی ہو، بلکہ اس غرض کے لئے مخصوص اُسترا ہونا چاہیے، اس سے عضو کے اوپر ارد گرد اور نیچے سے ہر روز بال مونڈنے چاہئیں، اس حجامت سے وہ تمام رگیں جو عضو کے اوپر سے آتی ہیں، تقویت پاتی ہیں، ناف سے ذرا نیچے سے لے

عضو کے اوپر تک تمام بال روزانہ یا دوسرے دن سیدھے اور اُسے طلیقوں سے صاف کرنے چاہئیں، جو لوگ اُسے سے نہ کرنا چاہیں وہ اس مقصد کے لئے سیفی ریزر کا انتظام کریں۔ اس عمل سے رگ و پھٹوں میں قوت اور خون کی حرکت پیدا ہو کر تقویت کا موجب ہوتی ہے۔

دوسری ترکیب یہ ہے کہ مریض نلکا کے نیچے بیٹھ کر غسل کرنے حمام ہو تو وہاں بھی دھار عضو کے اوپر پڑ سکتی ہے، ایسے حمام جہاں ٹب میں پانی سے کر نہایا جاتا ہے۔ اس غسل کے لئے موزوں نہیں ہے، سردیوں میں گرم پانی اور گرمیوں میں سرد پانی سے غسل کریں، اہتمام یہ ہونا چاہیے کہ ذرا اونچائی سے پانی کی دھار عضو کے اوپر اور جڑ پر پڑتی ہے۔ یہ عمل چار پانچ منٹ ہو تو عضو کے رگ و پھٹوں میں تقویت اور خون کی گردش خوب ہو جاتی ہے، اس ٹکور سے بے انتہا فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ عمل اگر روزانہ ہو تو بہت بہتر ہے۔ اگر اُسے صاف کر لینے کے بعد یہ عمل ہو تو سونے پر صوماگہ کا اثر رکھتا ہے۔ پانی میں قدرت نے جو بجلی پیدا کی ہے، مسلسل اور تیز دھار بندی سے عضو پر گرنے سے عضو میں بجلی کا سا اثر پیدا ہو جاتا ہے۔

دیگر جو تدا بیر عضو کی خرابیوں کو دور کرنے میں کار آمد ہیں، ان کے مفید نسخے درج ذیل ہیں :-

طلائے خاص، خراطین مصفیٰ تین ماشہ، بیر بہوٹی تین ماشہ، روغن ساندل ۹ ماشہ میں مل کر کے صبح و شام طلا کریں۔ یہ طلا پھٹوں کو طاقت دیتا ہے اور آبلہ نہیں پڑتا۔

دوائے ٹکور :- انہ ملہی، برادہ دندان فیل، مال کنگنی، نار جیل کہنہ ہر ایک ایک تولہ، سب کو کوٹ کر سات عدد پوٹلیاں بنالیں اور رات کو گرم کر کے ایک ہفتہ تک روزانہ ایک پوٹلی سے پندرہ سے بیس منٹ تک سینک کریں۔

طلائے جدید :- زردی بیضہ مرخ دس عدد، چربی ساندہ، جائفل، مال کنگنی، لونگ، دار چینی، بیر بہوٹی، عقرقرہ، گھونچی سفید ہر ایک دو تولہ۔ تمام ادویہ کو پیس کر اندھے کی زردی اور چربی ساندہ ملا کر گولیاں تیار کریں۔ اور اتنی شیٹی کے ذریعے روغن کشید کریں اور حشفہ و سیون چھوڑ کر چند روز لگائیں۔ پٹی آبلہ انگیز :- پلاسٹراف کینفر ٹیس لے کر چاقو کی نوک سے کپڑے پر لگائیں۔ اور رات کو سوتے وقت عضو کے اوپر جہاں نیلی رگیں ابھری ہوئی ہوں سب سے موٹی رگ پر لگائیں، حشفہ و سیون کو پچائیں، اس کے بعد روٹی کا ہلکا سا پھایہ رکھ کر اوپر پٹی اس طور سے پٹی دیں کہ اس پر دباؤ نہ پڑے، صبح کو کھول دیں، آبلہ نمودار ہو گا۔ اس کو سوئی کی نوک سے پھوڑ کر گندہ مواد خارج ہونے دیں، یہ پٹی کچی کی مخالفت طرف لگائی جائے، عضو کا ٹیڑھا پن دور ہو جائے گا۔ ب زخم کو درست کرنے کے لئے پیاز کے ٹکڑے گلے کے گھی میں جلا کر دن میں دو چار بار لگائیں، پٹی کے بعد مندرجہ ذیل ٹکور کرنی چاہیے۔

نوٹ :- سولے اشہ ضرورت کے آبلہ انگیز دوا استعمال نہیں کرنی چاہیے۔

دوائے ٹکور :- برادہ ہاتھی دانت چار تولہ، خراطین شدہ دو تولہ، بیر بہوٹی، عقرقرہ ہر ایک ۹ ماشہ، فرنیون، لونگ ہر ایک ایک تولہ تمام کو کوٹ کر سفوف بنائیں اور بقدر ۹ ماشہ مٹی کے ٹکڑے میں پوٹلی باندھ کر رکھ لیں، پھر ایک تنگ منہ کے برتن پر کپڑا باندھ کر اس میں ایک سیر بھیر کا دودھ ڈال کر ش دیں، کپڑے پر پوٹلی رکھ دیں، جب گرم ہو چکے تو اس پوٹلی سے عضو کے ہر طرف بلکہ کنج ران، پیڑو اور فوطوں وغیرہ پر بھی ٹکور کریں، جب پوٹلی سرد ہو جائے بھاپ پر گرم کر لیا کریں، روزانہ یہ عمل ۲۵ یا ۳۰ منٹ کر لیا کریں، پوٹلی تازہ تیار کر کے کام میں لا دیں، ایک ہفتہ کے اندر طاقت آجاتی ہے۔ اس کے بعد طلا کا استعمال کریں۔

طلائے کمزوری :- سم الفار ایک تولہ کو سات دن دودھ آگ میں کھل کر دیں، پھر پانچ دن روغن زردی میں کھل کر کے پلیٹ میں رکھ دیں اور وہ طرف طرف وہ دوائی ہو اونچی دھوپ میں رکھیں کہ گھی پھیل کر الگ ہو جائے، (گھی کو اس طرح نھاریں کہ نکھیا کی ذرا بھی سمیت یعنی ذرات نہ آنے پائیں) اس فی تولہ کے حساب سے ایک ایک رتی مندرجہ ذیل ادویات ڈال کر دو ہفتہ تک گھوٹ کر محفوظ رکھیں۔ زعفران اصلی، لونگ، کستوری، بیر بہوٹی، جادری، طین، حشفہ و سیون چھوڑ کر اس طلا کی ایک رتی کی ماش کریں، اوپر سے بھوج پتر یا پان کا پتہ یا ارند کا پتہ باندھ دیں، سات دن کے بعد جب پرت سی آئے تو چھوڑ دیں۔ اس طلا نے مایوس مریضوں کو نئی زندگی دی ہے۔ ملاپ سے پرہیز ضروری ہے۔

نوٹ :- یہ طلا فوطوں (انڈکوشوں) کو نہیں لگنا چاہیے۔

طلا خاص :- روغن بیضہ مرغ ایک تولہ، چربی سانڈہ ایک تولہ، دونوں کو آپس میں ملا کر اس میں بیر بہوٹی چھ ماشہ داخل کر کے آگ پر رکھیں جب بیر بہوٹی جل جائے، اتار کر کپڑے سے چھان لیں، زعفران اصلی، مشک خالص چار رتی، جلو تری، لونگ، عقرقرہ، جائفل ہر ایک دو ماشہ ملا کر تین دن متواتر کھل کریں۔ تاکہ مریم کی طرح بن جائے۔ رات کو بقدر دودھ و عضو پر مل کر انڈ یا پان کا پتہ باندھ دیں، صبح گرم پانی سے دھو دیں۔ دو ہفتہ کے استعمال سے پوری طاقت آجائے گی۔

طلائے مشک والا :- طاقت کو از سر نو تیز کرتا ہے، کستوری خالص چھ رتی، فرنیون ڈیڑھ ماشہ، عقرقرہ تین ماشہ، روغن جنیبی خالص بقدر ضرورت جوش دے کر چھان لیں، چند قطرے بطریق معروف ماش کر کے بنگلہ پان گرم کر کے باندھ دیں۔

طلا مقوی :- جنیبی کی کچی کلیوں کا رس پانچ تولہ کمال کر دس تولہ تلی کے تیل میں ملائیں اور آگ پر رکھ کر پانی جلا دیں، پھر آگ کے پودوں یا آم کے درختوں سے ۵۰ عدد سرخ سرٹے چوٹے اس تیل میں ڈال کر بوتل میں بند کر کے پندرہ روز دھوپ میں رکھیں۔ اس کے بعد چھان کر کام میں لادیں۔

سن منو کے گزر جانے کے بعد لمبائی بڑھانا ناممکن ہے۔ البتہ یہ طلا لمبائی و چوڑائی کے لئے مفید ہے۔

طریقہ یہ ہے کہ عضو کو کسی کھردرے کپڑے سے اس قدر رگڑیں کہ سرخ ہو جائے، پھر اس طلا کی ماش کریں، طاقت کے لئے "کستوری دٹی" کا استہما کیا جائے۔

طلائے سانڈہ :- روغن سانڈہ ایک تولہ میں جند بید ستر تین ماشہ کھل کر کے رکھیں۔ بوقت ضرورت عضو مخصوص پر نیم گرم ماش کر کے اور سے نیم گرم پان کا پتہ باندھ دیں۔

طلا خاص :- اونٹ کٹار کی جڑ کا چھلکا تین ماشہ، دار چینی چار رتی، پانی میں نہایت زور دار ہاتھوں سے کھل کر کے حقوڑی سی مقدار میں عضو پر لپ کریں۔ اوپر سے پان کا پتہ باندھیں، دو ہفتہ کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے، اس سے نہ زخم ہوتا ہے نہ آبلہ، دوران استعمال ملاپ سے پرہیز کریں، بالکل بے ضرر اور نہایت مفید علاج ہے۔

طلا مقوی :- پیاز کا رس پانچ تولہ، تیل زیتون تین تولہ، تیل مال کنگنی دو تولہ، بیر بہوٹی دو تولہ، سب کو حل کر کے آگ پر پکائیں، جب پانی جائے تو تیل صاف کر لیں، موسم سرما میں استعمال کریں، اس کی ماش خارجی طور پر کچی، استرخا، کوتاہی اور کمزوری کو دور کرتی ہے۔

طلا شامی :- کبوتر کی پیٹ کی سفیدی، چربی زچہ، چربی شیر، چربی سانڈہ ہر ایک ایک تولہ، مغز سرکنجشک، بیج سولی ہر ایک ایک تولہ لے کر لیں اور دس تولہ روغن کنجد سیاہ میں ملا کر خوب گھوٹیں، جب سب یک جان ہو جائیں تو بوقت ضرورت کام میں لادیں۔ اس کے استعمال سے بغیر تکلیف کے مردہ رگ و پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔

طلا خاص :- کستوری سات رتی، مرچ سیاہ، جند بید ستر، بیر سنگ، بیر بہوٹی ہر ایک پانچ پانچ ماشہ، سب کو کھل کر کے پانچ تولہ روغن جیند جلا دیں۔

فوائد :- یہ تیل کچی عمر کی غلیظیوں کی وجہ سے پیدائندہ عضوی خرابیوں کو دور کرتا ہے، کمزوری، جھکاؤ اور سستی کو دور کرتا ہے۔

اس تیل کی ماش کر کے پان کا پتہ باندھ دیں تاکہ باہر کی سرد ہوائ نہ لگے، متواتر استعمال کرنے سے عضو درست ہو جاتا ہے، سست اور کمزور رگوں میں خون دوڑنے لگتا ہے۔

ہومیوپیتھک علاج :- مندرجہ ذیل ادویات اس مرض کا موثر علاج ہیں :-

ایگنس کاسٹس :- اس مرض کی مشہور دوائی ہے، آلات تناسل ڈھیلے ڈھالے، پیلے اور ٹھنڈے ہوں اور خواہش معدوم ہو، جب بار

پیشاب کی نالی کی سوجن کا مرض ہو جانے کے باعث کمزوری ہو جائے تو یہ دوائی بہت مفید ہے۔

قاسفورک ایسڈ:- کمزوری کی یہ بھی ایک نہایت اعلیٰ دوائی ہے۔ جب عضو کمزور ہو تو یہ دوائی نہایت مفید ہے۔

کالی برومیٹم:- جس میں خُصّے لاغز ہوں، یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے، ۲x کی ہر چار گھنٹہ بعد خوراک دیں۔

نکس و امیکا:- ہاضمہ کی خرابی، قبض، عصبی کمزوری اور زیادتی عمر سے کمزوری ہو تو یہ دوائی مفید ہے، ۲x کی ایک خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دیں۔

لایکو پوڈیم:- بوڑھے مریضوں کے لئے یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے، جب کہ طاق زائل ہو چکی ہو اور خواہش بالکل کم ہو گئی ہو۔

علاوہ ازیں سیلنیم، کیلنڈنیم وغیرہ بھی بہترین ادویات ہیں۔

کمزوری کا الکٹرولکٹک مشین سے علاج:- اگر عضو اور خُصّے کثرت ملاپ کی وجہ سے دُبلے اور چھوٹے ہو گئے ہوں تو بجلی لگانا مفید ہے، اس

سلسلہ میں الکٹرولکٹک مشین کا ایک سرخارے کی زیریں جلد یعنی کمر سے ذرا نیچے اور دوسرا عضو، نوتوں، سیون اور سپریمیک کارڈ (جکل منوی) پر باری باری رکھنا

چاہئے۔ یہ عمل پندرہ پندرہ یا بیس بیس منٹ تک صبح و شام دو دفعہ روزانہ کر سکتے ہیں۔

قدرتی علاج:- مقوی غذائیں، دودھ، بالائی، انڈے، مکھن، بخود، مغزیات، مرغ کا شوربہ اور پھل کھائیں، بجرے کے پھوسے (انڈکوش، خُصّے)

گھی میں بھون کر کھلائے مفید ہیں، انڈوں کی زردی کا حلوہ، بالائی کا استعمال مفید ہے۔ اگر موسم سرما ہو تو ہر روز دس گری با دام، دو عدد چھوٹے ہار، آٹھ عدد چھوٹی

الاکچی، پچیس مغز چغوزہ، دودھ میں جوش دے کر اور اڑھائی تولہ خالص گھی ڈال کر پلائیں۔

خدا و پرہیز:- ملاپ، تیل کی ترش چیزوں سے سخت پرہیز کریں۔ مقوی ادویات لگاتار استعمال نہ کریں بلکہ ہر سات دن کے بعد دو دن دو بند کر دیا کریں۔

سپن دوش، احتلام، ناک بڑھنا، ناک بڑھنا (Nocturnal Emission)

تعریف مرض:- نیند کی حالت میں مہنی خارج ہو جاتی ہے یعنی انزال ہو جاتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں: ۱۔ احتلام طبعی (غیر مرضی) کثرت مہنی سے مہینہ

اس ایک دوبارہ نوجوانوں کو طبعی طور پر ہوتا ہے، یہ مرض نہیں ہے۔ ۲۔ احتلام غیر طبعی (مرضی) اعضائے تناسل کی ذکاوت جس اور کمزوری سے ہوتا ہے۔ یہ

مریض کی ایک قسم ہے۔

وجوہات:- کنوارا رہنا، جلق و مباشرت کی زیادتی، قبض کا رہنا، زیادہ کھانا اور گندے خیالات کا پیدا ہونا وغیرہ وغیرہ۔

علامات:- نیند میں خواب کے ساتھ یا بعض اوقات بغیر خواب کے انزال ہو جاتا ہے۔ عموماً ابتداء میں خواب کے ساتھ انتشار میں جنسی تعلق سے ہفتہ

شروع میں احتلام ہو جاتا ہے، لیکن جب مرض شدید ہوتا ہے تو بے خبری میں بغیر خواب یا انتشار کے ہفتہ میں دو تین دفعہ یا ہر روز یا گاہے ایک ہی رات میں دو

بار احتلام ہو جاتا ہے، اس کے ہمراہ کمزوری اور نسیان اور جربان وغیرہ اس کی مخصوص علامات ہیں۔

احتلام کو ہر وقت اور ہر حالت میں مرض قرار نہیں دیا جاسکتا۔ جو لوگ نوجوان ہوں اور ان کی شادی نہ ہوئی ہو اور نہ کوئی ایسے وصال اختیار کریں، جن سے

مہنی کا اخراج ہو جایا کرے، یعنی وہ جوان اور پرہیزگار ہوں، اس لئے ایسے لوگوں کو مہینہ میں ایک بار یا زیادہ سے زیادہ دوبارہ احتلام ہو جائے تو اسے مرض قرار

نہیں دیا جاسکتا، بشرطیکہ اس سے کمزوری پیدا نہ ہو، بلکہ ایسے نوجوانوں کے لئے ماہوار یا پندرہ روزہ احتلام ضروریات میں سے ہے۔ اس سے ان کو راحت حاصل

ہوتی ہے اور طبیعت سے گرانی دور ہوتی ہے، مگر جب پندرہ روزہ احتلام سے نوبت بڑھ جائے اور جلدی جلدی احتلام شروع ہو جائے اور جب کہ اس کے بعد

مضوری محسوس ہو تو اسے احتلام کا مرض سمجھنا چاہئے۔ اور یہ مرض کی وہ منزل ہے، جس کے لئے فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر اس وقت غفلت سے کام لیا گیا تو جربان

کا عارضہ لاحق ہو جائے گا۔ اگرچہ احتلام کا پندرہ روزہ یا ماہوار ہونا پرہیزگار نوجوانوں کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے

کہ احتلام کی عادت کا مستقل قائم ہو جانا سخت مضر صحت ہے اور یہ عادت پرانی ہو جانے پر مرض مشکل سے دور ہوتا ہے۔

علاج :- اصل سبب مرض کو دور کریں، رات کو غذا و دھنم و کم مقدار میں سونے سے تین گھنٹہ پہلے کھلائیں، نرم بستر کی بجائے سخت بستر پر سلائیں، تمام محرک شہوت امور سے بچیں، سونے سے پہلے اعضاء تناسل کو سرد پانی سے دھوئیں اور رنج حاجت کر لیں، علی الصبح اٹھیں، کثرت منی ہو تو ملاپ کی ہدایت کریں یا فاقہ اور ورزش کرائیں۔ قبض ہو تو سوتے وقت مرہ برڑ دو عدد یا الیسنول ۹ ماشہ ہمراہ پاؤ بھر دودھ کے ہمراہ دیں۔

اگر چیت لیٹنے کی عادت ہے اور چیت لیٹنے سے احتلام ہوتا ہے تو اس عادت کو دور کرنے کے لئے کپڑے پر گرہ لگا کر کمر سے باندھ دیا کریں تاکہ چیت ہونے پر اس گرہ کے اٹکنے سے نیند کھل جائے۔ جب رات کے پچھلے حصہ میں پیشاب کی حاجت ہو تو فوراً اٹھ کر پیشاب کر لیں۔ اور جب موسم سرما ہو تو نیم گرم پانی سے غسل کریں اور قواعد حفظ صحت کی پابندی کرتے رہیں، اس سلسلہ میں اعضاء تناسل کی بڑھی ہوئی حس کو کم کرنے کے لئے پہلے مریض کو دافع ذکاوت جس ادویہ کا استعمال کرائیں جب ان ادویہ کے استعمال سے ذکاوت حس دور ہو جائے اور احتلام رک جائے تو پھر مقویات پر عمل کریں۔

ڈاکٹری علاج :- پوٹاسیم برومائیڈ کا استعمال مفید ہے، لیکن اسے متواتر استعمال نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ سدر جہ ذیل نسخہ بھی مفید ہے۔
پوٹاسیم برومائیڈ دس گرین، ٹینکچر سیلاڈونا پانچ بوند، ٹینکچر ہالوسامیس پانچ بوند، ایکوا کلور و فارم ایک اونس، کھانا کھانے کے بعد صبح و شام قدرے پانی ملا کر پلائیں۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ پرنے ایلیو پیٹیک طریقہ علاج میں اس مرض کا علاج پوٹاسیم برومائیڈ سے کیا جاتا ہے، لیکن اس کے متواتر استعمال سے مریض کو نقصان پہنچتا ہے۔ اب نئی ریسرچ سے پتہ لگایا گیا ہے کہ اسرول (Rauwolfia Serpentina) سے چھوٹی چند بھی کہتے ہیں، کے مرکبات اس مرض کے قعدہ اور بے ضرر علاج ہیں۔

_____ میں نے خود سینکڑوں مریضوں پر اسرول کا استعمال کیا۔ اور اسرول کی آٹھ سے دس گرین کی خوراک دن میں تین بار دینے سے دو سے تین ماد کے اندر پرانے سے پرانا مرض بھی جڑ سے اکھڑ جاتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی بُرے اثرات پیدا نہیں ہوتے۔ _____
سلسلہ میں میرے تجربات کی پونہ کے میونسپل ہسپتال کے ڈاکٹر سری نواس ایم بی، بی، ایس نے بھی تصدیق کی ہے، انہوں نے بھی کئی مریضوں پر تجربات کر کے اسرول کی بنی ایلیو پیٹیک دوا سرپینا (Serpina) کی گولیاں استعمال کرائیں، ایک گولی کی مقدار میں دن میں تین بار دیں، اسرول چونکہ سخت کڑوی دوا ہے۔ اس لئے اسے باریک معجون بنا کر کیپ شول میں ڈال کر دینی چاہیے، اگر اس کے ساتھ ساتھ روزانہ ایک سے دو رتی سورن بنگ بھی ہمراہ شہد یا بالادیں تو جلد فائدہ ہو جاتا ہے۔ اسرول دلی بلڈ پریشر و جنون کا بھی مجرب علاج ہے، اسرول سے بنی کچھ دیگر پیٹنٹ ادویات جو احتلام کے لئے مفید درج ذیل ہیں :-

۲۔ سرپاسیل (Serpasil) سبب _____ ایک ایک گولی دن میں تین بار تازہ پانی سے دیں، یہ دوائی سی ایف کی ری سرپین (Reserpine) نام سے ملتی ہے۔ روڈاکسین (Raudixin) ساراجائی _____ میں مکمل سرپ گندھا (اسرول) شامل ہے۔ ایک ایک گولی دن میں سے تین بار تازہ پانی سے دیں۔

۳۔ ریٹے فین (Ralfen) بنگال کیمیکل _____ یہ راولفیا سرپینٹا کی جڑوں سے تیار کی گئی دوا ہے، احتلام و دلی بلڈ پریشر کے لئے مفید ہے۔ ایک سے دو ٹکیاں روزانہ دن میں دو بار کھانا سے پہلے تازہ پانی سے دیں۔

۴۔ سپو کپینی کی سرپینا یا سہالیہ کپینی کی سرپینا (Serpina) بھی دسی طب کی مشہور دوا اسرول سے بنی ہیں، جو احتلام و دلی بلڈ پریشر میں مفید ہیں۔ ایک ایک گولی دن میں دو سے تین بار مرض کے مطابق دیں، جب مرض کم ہو جائے تو دوا کی مقدار کم کر دیں۔

۵۔ اسرول مرکب کیپ شولز (سکھائیڈ ملٹانی دوا خانہ (رجسٹرڈ) پانی پت) ایک صبح و ایک شام ہمراہ تازہ پانی دیں۔

یونانی علاج :- دھنیا خشک کا استعمال بہت مفید ہے، مندرجہ ذیل مجربات احتلام کے لئے خاص طور پر مفید ہیں :-

- ۱۔ دھنیا خشک، شکر سفید ہوزن سفوف بنا کر چھ ماشہ روزانہ ہمراہ پانی دیں۔
- ۲۔ دھنیا خشک ڈیڑھ تولہ، بیج خرفہ تین تولہ، ایسبغول سالم دو تولہ۔ دھنیا اور خرفہ کوٹ کر ایسبغول شام میں ملا لیں، خوراک چار ماشہ ہمراہ دودھ گائے یا تازہ پانی دیں۔ گرم مزاج مریضوں کو جو جوانی میں احتلام، جریبان کا شکار ہوتے ہیں اور معمولی سی حرکت سے جوش میں آکر ویرج نکل جاتا ہے، کے لئے از حد مفید ہے۔

۳۔ کشتہ قلعی (برگ بھنگ والا) ایک رتنی ہمراہ مکھن یا بالائی میں رکھ کر دیں۔ مجرب ہے۔

۴۔ بیج کاہو، بیج خرفہ، بیج کاسنی، بیج دھنیا ہر ایک سات ماشہ، شیرہ پانی سے نکال کر شربت نیلو فرود تولہ ملا کر ہر روز شام کو لے جائیں۔

۵۔ بہن سرخ، بہن سفید ہر ایک ایک تولہ، چھلکا ایسبغول پانچ ماشہ، گوند کیکر چھ ماشہ، مغز بیج تمر نہدی (بریاں) ایک تولہ، ثعلب مصری ایک تولہ کوٹ چھان کر چینی ملا کر صبح و شام چھ سے نو ماشہ تک ہمراہ دودھ گائے استعمال کریں، مجرب ہے۔

۶۔ بیج کاہو (چھلے ہوئے) تین ماشہ، بیج خشخاش چھ ماشہ، دھنیا خشک ایک تولہ، سفوف کر کے برابر چینی ملا کر ۹ ماشہ کی مقدار میں رات کو کھلائیں، گرم مزاجوں کے لئے مفید ہے۔

۷۔ صندل سفید تین ماشہ، جوز مائل شدہ تین ماشہ، فیون ایک ماشہ، عقرقرہ تین ماشہ، گوند کیکر تین ماشہ، پوٹاسیم برومائیڈ ایک تولہ، ہارکک کر کے گولیاں بقدر چھوٹے ٹخود کے برابر بنالیں۔ ایک گولی شام کو ہمراہ دودھ گائے نیم گرم دیں۔ اسے متواتر استعمال نہ کریں۔

۸۔ دھنیا خشک، بیج بھنگ، مغز سیٹا پاری، انار کے پھول برابر وزن سے کر گولیاں بقدر ٹخود بنائیں۔ ایک سے دو گولی صبح اور شام ہمراہ پانی استعمال کریں۔

آیور ویدک علاج :- آیور ویدک کتب میں جریبان کی بیس اقسام تو بیان کی گئی ہیں، لیکن احتلام (سوچن پر مہیہ) کو علیحدہ بیان نہیں کیا گیا۔ چونکہ یہ مرض آج کل عام ہے، اس لئے ہم نے اسے علیحدہ بیان کیا ہے۔ اس مرض کے لئے مفید نسخے ج ذیل ہیں :-

آشوگندھ آدی چورن :- آسگندھ ناگوری پانچ تولہ، برہار پانچ تولہ، دونوں کو خوب پیس کر کپڑ چھان کر کے اس کے برابر ری کوڑہ ملا کر شیشی میں محفوظ رکھیں اور تین ماشہ سے چھ ماشہ تک ہمراہ تازہ پانی یا تازہ دودھ صبح و شام استعمال کریں، احتلام کو یقیناً آرام آجاتا ہے۔ ایسے مریض جو بہت مضبوط اور برہمچاری ہوں، انہیں یہ نسخہ ہمراہ دودھ نہ دے، بلکہ پانی یا تازہ دودھ دے۔

ستاوڑی چورن (شارنگدھر) :- ستاوڑ، گوکھرد، بیج کوپنج، بیج کنکھی، تال مکھانہ، برابر بنائیں، خوراک ایک سے ڈیڑھ تولہ، دودھ میں کھیر بنا کر مصری ملا کر استعمال کریں۔

Sper

فوائد :- پتلے ویرج کو گاڑھا کرتا ہے۔ احتلام، سرخست اور جریبان کو مفید ہے۔

کشتہ قلعی :- قلعی شدہ کو ریزہ ریزہ کریں اور برگ بھنگ سبز ایک سیر کا لغہ بنا کر ایک ٹاٹ پر بچھا دیں، پھر اس پر قلعی مذکور ڈیڑھ تولہ بچھا کر اور ٹاٹ کو احتیاط سے پیسٹ کرتے سیراپلوں کی آگ دیں اور ٹھنڈا ہونے پر راکھ سے دھان کی مانند پھولی ہوئی قلعی چن کر اس کو سات روز تک کھل کر کے ریشمی کپڑے سے چھان کر سبز بھنگ کے رس میں ہی سات دن کھل کر کے ایک ایک رتی کی گولیاں بنالیں ایک گولی رات کو ہمراہ پانی دیں، پہلے روز ہی آرام ہوگا۔

سوچن دوش چورن :- سمندر سوکھ، بیج بند، بیج سریالہ، بیج بھنگ ہر ایک ایک تولہ، کشتہ قلعی ایک ماشہ، کشتہ چاندی ایک ماشہ، ہارکک پیس کر سفوف بنائیں، خوراک دو ماشہ ہمراہ دودھ دیں، احتلام و جریبان کے لئے مفید ہے۔

شیرکھ آسن یا پلی مندر:۔ شیرکھ آسن ایک ایسا عمل ہے جس کی مشق سے جریان و احتلام کا مرض یقیناً رُک جاتا ہے اور آسن ہذا متواتر ایک سال کرنے سے کایا کلپ ہو جاتا ہے، سفید بال از سر نو سیاہ ہو جاتے ہیں، چہرے و جسم کی جھریاں دور ہو کر ستر سال کا بوڑھا بھی جوان ہو جاتا ہے، قوت باہ یا مٹی پر انسان کو قابو حاصل ہو جاتا ہے۔

شیرکھ آسن کا طریقہ:۔ نہایت عمدہ ہوا دار کمرے میں یا جنگل میں جا کر کپڑے اتار لیں اور لنگوٹ یا جانگھیا باندھ کر ایک سرہانہ یا چھوٹا سا نرم گدلا زمین پر رکھیں اور سر کے بل اُٹے ہو جائیں اور ٹانگوں کو بالکل سیدھا کریں پہلے روز دس سیکنڈ تک اس عمل کو کریں۔ دوسرے روز دس سے بیس سیکنڈ تک بڑھائیں اور ہر روز حسب طاقت بڑھاتے جائیں، تجربات کے مطابق دس یا پندرہ منٹ کی مشق کرنے سے مٹی کے کل امراسن دور ہو کر احتلام اور جریان دور ہو جاتے ہیں۔ جسم چست و چہرہ سُرخ و خون سے چمکنے لگتا ہے اور دماغ تیز ہو جاتا ہے، یہ عمل روزانہ صبح دشام کو کریں یا دو ٹولہ وقت رفع حاجت کے بعد خالی معدہ کرنا چاہیے بشرط میں یہ عمل دیوار کے سہارے یعنی پاؤں دیوار کے ساتھ لگا کر کریں۔ اور چند روز کی مشق کے بعد دیوار کا سہارا چھوڑ دیں۔

دماغی امراض کے مریضوں کے لئے مضر صحت ہے، اس لئے تندرست اصحاب کو ہی اسے استعمال میں لانا چاہیے۔
ہومیو پیتھک علاج:۔ احتلام کے بعد دماغی جسمانی کمزوری، دل کی دھڑکن، ایوناشیا، احتلام کے بعد موٹے جسم والے مریض میں، دماغی و جسمانی کمزوری، رات کے وقت پسینے کلکیر یا کارب ۲۰۰ - ۱۰۰۰۔ احتلام کے لئے مجرب دوائی، رات کو زیادتی، صبح اُٹنے پر کمزوری، چکر، سبلیئم ۶ - ۲۰۰۔ احتلام کی شکایت، دماغی کمزوری، شادی سے پہلے و بعد کمزوری ہو تو ایڈفاس ۲۰۰۔ بغیر خواب کے احتلام جیسی میم ۲۰۰۔ احتلام کے بعد عضو ڈھیلا اور سرد، قبض کی شکایت، نیٹرم میور ۶x۔ بکثرت احتلام، کانوں میں سائیں سائیں چائنا ۳۰ - ۲۰۰۔ احتلام کے بعد دل کی دھڑکن ڈیجی ٹلیس ۳۰ - ۲۰۰۔ ملاپ کی وجہ سے احتلام اور خواہش تیز فاسفورس ۳۰ - ۲۰۰۔ پاخانہ کے ساتھ ویرج کا اخراج ایڈ ایٹک ۶۔ احتلام بکثرت، خودکشی کو دل چاہے آرم میٹ ۲۰ - ۲۰۰۔ کسی ہم یا خیال کے بغیر احتلام ۳۰ - ۲۰۰۔ نیند میں احتلام، عضو کمزور نیو فریوٹیم ۳۰ - ۲۰۰۔

ہدایات متعلقہ احتلام: ۱۔ دودھ کا استعمال احتلام میں غیر مفید رہتا ہے، اگر عادت ہو اور ساتھ ہی پختہ تجربہ ہو کہ دودھ کا کوئی خراب اثر نہ ہو، تو بہتر ہے اسے استعمال نہ کریں، سورج غروب ہونے کے بعد دودھ ختم الوسخ نہیں پینا چاہیے۔ گرم دودھ تو بے حد نقصان دہ ہے، پانی بھی سورج رُخ سے پینا چاہیے۔
۲۔ دہ، بینگن اور کھٹائی، ماش کی دال، ربڑی، کھویہ اور رات کو پیٹ بھر کر سونا احتلام کے مریض کے خاص دشمن ہیں۔ (See)

۲۔ رات کو نیشاب کر کے پیر، عضو تناسل و خیمے ٹھنڈے پانی سے دھو کر سوتیں۔

۳۔ خیالات شدہ رکھیں، جب بھی خیالات بگڑیں خیالات کو اچھی طرف موڑ لیں۔

(ب) ۱۔ سونے سے تین گھنٹے یا کم از کم دو گھنٹے پہلے رات کا کھانا کھا لینا چاہیے، چوتھائی بھوک باقی رہنے پر کھانے سے ملنا کھینچ لینا چاہیے۔

۴۔ صبح نہاتے وقت کمر کے نچلے حصے پر اور عضو (اندری) پر ٹھنڈے پانی کی دھار ڈالیں۔

۵۔ خیالات بہت پاک پوٹر رکھیں، جہاں بھی کوئی شہوت پیدا کرنے والی بات ہو، وہاں سے بھاگ جانا چاہیے، سینما تھیٹر نہ دیکھیں۔

- ۶۔ اختلام کے مریضوں کو سختے الوسح عضو پر لگانے کا لیپ یا طلا استعمال نہیں کرنا چاہیئے۔
 - ۷۔ اختلام عام طور پر تین چار بجے رات کے بعد ہی ہوتا ہے، یعنی جب انسان اپنی نیند بچکتا ہے۔ جتنی کہ ضروری ہوتی ہے، گرمیوں میں چھ گھنٹے اور سردیوں میں سات گھنٹے سے زیادہ نہ سوئیں۔ جتنی دیر بعد سو سکیں، بہتر ہے سویرے جلدی اٹھنے کی کوشش کریں، تاکید ہے، صبح چاہئے کے قریب جاگ آنے پر دوبارہ سونے کی کوشش نہ کریں، ورنہ اختلام ہو جائے گا۔
 - ۸۔ رات کو کسی وقت پیشاب یا پاخانے کی حاجت معلوم ہو تو سستی نہ کریں، سپاری کے گرد تھوڑی تھوڑی میل اکٹھی ہوتی رہتی ہے، پردہ پوری طرح پیچھے کو الٹ کر دوسرے تیسرے روز دھو لیا کریں۔
 - ۹۔ پیٹھ کے بل نہ سونا چاہیئے، ہمیشہ دائیں یا بائیں کروٹ سوئیں یہ نہایت ضروری ہے۔
 - ۱۰۔ قبض نہ ہونے دیں، قبض کی شکایت ہو تو قبض دور کریں، اس سلسلہ میں گل قند، مرہ برہ یا دیگر قبض کشاد دوائی سے پیٹ کو نرم کریں، چھلکا الیغول بھی مفید ہے۔
 - ۱۱۔ بائیسکل کی سواری نہ کریں، مجبوری ہو تو آہستہ آہستہ سائیکل چلائیں، گھوڑے کی سواری بھی کم کریں۔
 - ۱۲۔ سیر اور ہلکی ورزش جس میں دوڑنا بھی شامل ہو، روزانہ کرنا چاہیئے۔
 - ۱۳۔ ملاپ کی قطعی ممانعت ہے۔
 - ۱۴۔ اختلام کے نقصان کو پورا کرنے کے لئے زیادہ طاقت بخش غذا نہیں کھانا چاہیئے، اس لئے اُلٹا زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، سادہ ہلکی اور زود ہضم غذا کھانے سے مرض جلدی رفع ہو گا۔ پیٹ ہلکا رہنے سے خوراک اور دوائی بہتر طور پر جذب ہو کر فائدہ حاصل ہوتا ہے۔
 - ۱۵۔ رات کو لنگوٹ باندھ کر سونا اکثر حالتوں میں مفید رہتا ہے، کسی کسی کو مفید نہیں بھی رہتا ہے، اس کا تجربہ ضرور کرنا چاہیئے۔
 - ۱۶۔ شیرش آسن جس کی تفصیل صفحہ نمبر ۳۰۴ پر دی گئی ہے، مفید رہتا ہے۔
- نوٹ :- علاج سے اختلام بہت گھٹ جائے گا، لیکن پھر کبھی نہ ہو، یہ بات ناممکن ہے۔
- غذا و پرہیز :- شروع میں زود ہضم، سرد اور مسکن غذائیں، خرفہ، پالک، کدو، ترئی، ٹنڈا، دال مونگ، چپاتی دیں، رفع مرض کے بعد گھی، دودھ، مکھن وغیرہ کھلائیں، محرک و گرم اشیا، چائے، قہوہ، انڈہ، گوشت، مچھلی، شراب، گرم مصالحہ سے پرہیز کریں۔

شکر پریمہ، جریان، سپرے ٹوریا، (Spermatorrhea)

تعریف مرض :- ملاپ کے بغیر دیرج کا نکلنا، خواہ وہ پیشاب سے پہلے، بعد یا درمیان میں خارج ہو یا چلتے پھرتے، کام کرتے وقت خیالات شہوانی کے پیدا ہونے سے جاری ہو جائے یا حرکات یا کسی چیز کو مس کرنے سے نکل جائے وغیرہ وغیرہ، غرضیکہ ملاپ یا کسی ایسی صورت کے علاوہ جس میں اخراج منی کی کوشش کی جائے، اگر منی بلا ارادہ خارج ہو تو جریان منی کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔

وجوہات :- خلق، کثرت ملاپ، کثرت منی، محرک شہوت مناظر دیکھنا، شہوانی خیالات، محرک اشیا مثلاً چائے، قہوہ، شراب وغیرہ، گرم مقوی غذائیں، گوشت، پلاؤ کا بکثرت استعمال، سوزش بول، کمزوری خزانہ منی وغیرہ اسباب ہیں۔

علامات :- پیشاب اور پاخانہ کے وقت منی (دیرج) کے قطرے نکلتے ہیں، کمزوری، لاغزی، سرعت، بدہضمی، درد سر، کمزوری دماغ، غزو عوارض پیدا ہو جاتے ہیں، خیسے چھوٹے اور نازک، آلہ تناسل سکڑا ہوا ہوتا ہے۔ مریض تنہائی پسند، کمزور ہمت، غمگین اور

سُست ہو جاتا ہے۔

تشخیص مرض :- جب یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی سفید یا زرد یا سیاہی مائل تیلی یا گاڑھی رطوبت عضو کے سوراخ کے راستے سے خارج ہوتی ہے تو اس امر کے تصفیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہ وہ رطوبت کیا ہے، کیا وہ فی الواقعہ منی ہے یا کوئی اور رطوبت، اس طرح عضو کے سوراخ سے مندرجہ ذیل رطوبات خارج ہو سکتی ہیں :-

۱۔ منی، ۲۔ ودی، ۳۔ مذی، ۴۔ گردوں کی چربی، ۵۔ پیپ اور دوسری رطوبات۔

یاد رہے کہ پیپ میں ایک قسم کی بو آتی ہے جو گندی چیزوں کی بو سے ملتی جلتی ہوتی ہے، اس کے علاوہ یہ بھی تشخیص ضروری ہے کہ پیشاب کی نالی یا مثانہ میں جہاں سے وہ نکل سکتی ہے، اس جگہ زخم اور سخت درد محسوس ہو اور کبھی نہ ہو اور اس کے ساتھ خون کا کوئی قطرہ نکل آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ پیپ ہے اور پیشاب کی نالی یا مثانہ وغیرہ میں زخم ہے۔ یہ منی نہیں، لہذا اس کے مطابق علاج کیا جانا چاہیے۔

پیپ کی تشخیصی علامت تو مندرجہ بالا ہے، اب متذکرہ چار رطوبات میں سے ایک دوسرے کو شناخت کرنا ضروری ہے۔

مذی اور ودی تو اس قسم کی رطوبات ہیں کہ ان کا خارج ہوتے رہنا ضروریات سے ہے، یعنی یہ کہ وہ عام طور پر پھوڑی سی غیر محسوس مقدار میں پیشاب کی نالی کے راستہ سے نکلتی رہتی ہیں۔

مذی :- ایک رطوبت ہے جو عضو کے تناؤ میں آجانے پر ————— یا شہوت انگیز مناظر دیکھنے پر یا شہوت انگیز خیالات ہونے پر پیشاب کی نالی سے جاری ہو جاتی ہے۔ تاکہ احوال اجزائے منی کے لئے چکنا ہو کر صاف ہو جائے اور منی بلا کسی رکاوٹ کے خارج ہو سکے۔ یہ رطوبت احوال میں جاری ہو کر پیاری کے منہ پر اس سوراخ کے باہر دالے حصے پر جو اس راستہ کا سوراخ ہے آ جاتی ہے اور تری سے معلوم ہوا کرتی ہے ودی :- اس رطوبت کا نام ہے جو پیشاب نکلنے کے وقت پیشاب کے سوراخ میں آ جاتی ہے اور اپنی لیس دار رطوبت کی وجہ سے احوال کی دیواروں کو رگڑے محفوظ رکھتی ہے، غرض ان دونوں رطوبات کا اخراج ضروریات سے ہے، مگر جب ان غدود کی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں تو یہ بھی کثرت سے شروع ہو جاتی ہیں۔ مذی تناؤ کے وقت بہت زیادہ نکل جاتی ہے اور عضو کے تناؤ کو کمزور کر دیتی ہے اور ودی پیشاب سے پہلے یا کبھی کبھی پیچھے نکل آتی ہے اور ایسی حالت میں جب یہ قدرتی مقدار سے زیادہ نکلیں تو انسان کو بہت کمزور کر دیتی ہیں۔

گردوں کی چربی :- خصوصاً اس وقت نکلتی ہے جب ملاپ کرنے کے بعد پیشاب کیا جاتا ہے اور دوسرے اوقات میں کبھی کبھی اس کا اخراج پایا جاتا ہے اور یہ ایک لیس دار سفیدی مائل اور پتلی رطوبت کے رنگ میں نکلتی ہے اور کمزوری گردہ کی علامات اس کے ساتھ پائی جاتی ہیں منی :- عام طور پر پیشاب سے ملی ہوئی یعنی پیشاب کے درمیان یا اس سے پہلے یا بعد میں خارج ہوتی ہے۔ اس کی شناخت یہ ہے کہ اس میں ایک قسم کی بو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو باقی رطوبتوں سے تمیز کیا جاسکتا ہے۔

دیرین کا خوردبین سے امتحان :- جو لیس دار رطوبت خارج ہو، اس کا ایک قطرہ لے کر صاف شیشے کے ٹکڑے پر رکھیں اور اس میں کچھ قدیم گرم پانی ملا کر پتلا سا کر لیں اور اسے خوردبین کے ذریعے دیکھیں۔ اگر اس رطوبت میں کچھ کیڑے حرکت کرتے ہوئے نظر آئیں اور ایسا معلوم ہو یہ زندہ ہیں تو اس بات کا اطمینان کر لیں کہ وہ خارج شدہ رطوبت منی (ویرج) ہے اور اگر جان دار کیڑے نظر نہ آئیں تو سمجھ لیں کہ اس میں کوئی رطوبت ہے، اگر پیپ ہوئی تو اس میں غشائے مخاطی بھی شامل ہوں گے۔

جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ منی نہیں بلکہ کوئی اور رطوبت ہے تو اس کی شناخت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس پیشاب کا کچھ حصہ لے کر ایک گول لی میں ڈال کر اس میں تھوڑا سا تیزاب شورہ ڈال دیں، اگر اس طرح پیشاب کا تگد ر صاف ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں فاسفید کے نمک لے ہوئے ہیں۔ اس پیشاب میں سے پھوڑا سا حصہ لے کر کا پچ کی گول لی میں ڈال دیں اور پھوڑی دیر پڑا رہنے دیں اور کچھ دیر گزرنے

بعد پیشاب کے سنبھلے سفید یا سرخ رنگ کے رسوب نہ نشین ہو جائیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس پیشاب میں املاح (یوریت) ملے ہوئے ہیں، اگر پیشاب سفید رنگ کا گدلا سا ہو تو اس میں سے تھوڑا سا کسی کپڑے کی ٹانگی میں ڈال دیں، اس میں قدرے ایقتر ملائیں، تھوڑی دیر میں پیشاب صاف ہو جائے گا، اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس کی بالائی سطح پر کچھ رطوبت سی جی ہوئی دکھائی دے گی اور خوردبین کے ذریعے دیکھنے سے اس میں دہنیت معلوم ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ گردوں کی چربی ہے اور رطوبت کا وہی قطرہ پہلے طریقے کے مطابق شیشے کے ٹکڑے پر رکھ کر دیکھ لیں، اور اگر اس میں منی کے کیڑے دکھائی نہ دیں تو فیصلہ یہ ہے کہ وہ یا تو ودی یا مذی ہے، اور اگر پیشاب کے پہلے یا بعد نکلتی ہے تو ودی ہے، اگر انتشار کے وقت نکلتی ہے تو مذی ہے۔

پس اگر منی، ودی یا مذی ثابت نہ ہو تو جریان ہے، اگر گردوں کی چربی ثابت ہو تو اس کے اسباب کی تشخیص کر کے اس کے مطابق علاج کریں۔ اور دوسرے رسوب یا املاح وغیرہ ہوں تو ان کی درستی کا طریقہ اختیار کریں اور اگر ودی یا مذی ہو تو اسے جریان نہ سمجھیں اور اگر سرف، منی نظر آئے تو جریان کا مرض سمجھنا چاہیے ورنہ سیدان ودی یا مذی اور ان کے علاج قریب قریب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور جریان کی دوائی اکثر سیدان ودی و مذی کے لئے بھی مفید ثابت ہوتی ہے۔

ڈاکٹری علاج :- مرض کا اصل سبب دریافت کر کے اس کے مطابق علاج کریں، اگر ہاضمہ کی خرابی سے یہ عارضہ ہو تو ہاضمہ درست کرنے والی ادویات دیں، جریان منی، اور مذی یا ودی کو بند کرنے کے لئے حسب ذیل نسخہ جات مفید ہیں :-

۱۔ پوٹاسیم برومائڈ پانچ گرین، سوڈیم برومائڈ پانچ گرین، پنچر سیلا ڈونا پانچ بوند، پنچر ہائیوسائیس پانچ بوند، ایکوا ایک تادوانس، ایسی ایک خوراک غذا کے بعد ۵ یا ۲۰ منٹ کے بعد صبح و شام دن میں دوبارہ دیں۔

۲۔ پوٹاسیم برومائڈ پندرہ گرین۔ پانی ایک گھونٹ میں گھول کر صبح و شام دیں۔

۳۔ پوٹاسیم برومائڈ ۵ گرین، پنچر سیلا ڈونا ۵ منم، پنچر ہائیوسائیس ۵ اسم، ایکسٹریکٹ گلبریزا ۲۰ منم، ایکوا ایک فر ایک ادانس، ایسی ایک خوراک صبح و شام پینے کے لئے دیں۔

۴۔ پیٹنٹ ادویات میں الکسبر برومائڈز، کیلیم بروائیٹ یا الکسبر برومائیڈز، بہترین ادویات ہیں۔

۵۔ اگر مرض پیشاب کی نالی کے زخم کا مرض رہ چکا ہو تو پینیسلین یا سٹریپٹو پینیسلین کے انجکشن لگائیں۔

بعض دندہ مرض کو اس زور سے مرض گھیر لیتا ہے کہ مسکن و منوم ادویات کوئی فائدہ نہیں کرتیں، ایسی حالت میں اس مرض کا علاج ہارمون سے کیا جائے تو خاطر خواہ کامیابی ہو جاتی ہے، اس سلسلہ میں پیرانڈرین (Perandren) انڈرائٹین (Androstin) ٹیسٹوفارم اور ٹیسٹوسائن (Testosyn) وغیرہ استعمال کرائے جاتے ہیں، تفصیل کے لئے کمزوری کا بیان ملاحظہ فرمائیں۔

یونانی علاج :- اصل سبب مرض کو دور کریں، اگر جریان، جلق یا کثرت ملاپ کے سبب سے پیدا ہو تو ان عادات کو دور کریں اور مرض غش خیالات ترک کرنے پر مجبور کریں، اگر کثرت منی کی وجہ سے جریان پیدا ہو ہو تو مرغن اشیا اور محرکات کا استعمال فوراً بند کر دیں اور اس بجائے سادہ اور زود ہضم غذا کی طرف رجوع کرائیں، اگر مرض غیر شادی شدہ ہے تو اس کی شادی کرائیں، اگر یہ مقتد (گدا) یا مٹانہ یا گردہ کی آتش سے پیدا ہو یا پیشاب کی نالی کے زخم یا چر نے یا بواسیر سے کوئی مرض اس کا سبب ہو تو پہلے ان امراض کا علاج کریں، جریان، خود و دور ہو جائے گا۔

اگر غلغلا یا گھٹنگھٹ کی وجہ سے یہ عارضہ ہو تو اس کی صحتائی رکھیں، اگر شام کمزوری انصبابی کی وجہ سے ہو تو متوی اعصاب اور مغزی اش ادویات کا استعمال کرائیں، اگر حشفہ زیادہ ذکی الجھس ہو گیا ہو تو اس کی ذکات جس کا علاج کریں، اگر خصیتین (اندکوش) ڈھیلے ہو

گئے ہوں تو ان کو چمڑے یا کپڑے کی پٹی سے باندھ دیں تاکہ خبیثے پیچھے نہ لٹکتے رہیں، گرم اشیا سے بالکل پرہیز کرائیں۔

مندرجہ ذیل نسخہ جات جریان کے لئے خاص طور پر مفید ہیں:-

۱۔ تچ، تال، مکھانہ، بیج بند، گوکھر و خورد، موچرس، بیج اوشنگ، گوند لیکر ہر ایک ۹ ماشہ، سنگھاڑا خشک، آسگندہ ناگوری، چنیا گوند، شقائق ہر ایک چھ ماشہ، موصلی سفید، موصلی سیاہ ہر ایک ایک تولہ، مصری سب کے برابر کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور چھ ماشہ صبح و شام بھر کے دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔

۲۔ ستاؤڑ، موصلی سفید، بیج بند، سمندر سوکھ، سردالی، معز بیج مترندی، موصلی سنبل، تچ، تال، مکھانہ، خشخاش سفید، دانہ الاچی کلاں، سنگھاڑا خشک برابر وزن لے کر سفوف بنائیں اور برابر چینی ملا کر صبح و شام ہمراہ دودھ استعمال کرائیں۔

۳۔ بیج بند، معز کو بیج، بھول انار، بیج اوشنگ، موچرس، بہو پھلی، تچ، اندر جو شیریں، تال، مکھانہ، سمندر سوکھ، موصلی سیاہ، موصلی سفید، ست گلو، سنگھاڑا خشک، مصطکی رومی، خضتہ الثعلب، کباب چینی، دانہ الاچی کلاں، طباشیر، خار خشک ہر ایک چھ ماشہ، نشاستہ، گوند ناگوری، سوڑ، بیج خشخاش ہر ایک چار ماشہ، چینی سب کے برابر ۹ ماشہ سے ایک تولہ صبح و شام تازہ پانی سے استعمال کریں۔
یہ نسخہ حکیم اجل خان صاحب مرحوم کا معمول مطب تھا، جو ناظرین کے فائدے کے لئے شائع کر دیا ہے۔

۴۔ اگر مرض جریان پیشاب کی نالی کے زخم کی وجہ سے ہے تو یہ سفوف کھلائیں:-

سلاجیت شدہ دوتولہ، طباشیر دوتولہ، الاچی خورد، سنگھاڑا ہولی ہر ایک دوتولہ، چینی دوتولہ، سفوف بنائیں اور ۹ ماشہ ہمراہ تازہ پانی دیں۔

۵۔ معز بیج اعلیٰ، ست برگد و بہو پھلی مرکب، موچرس ہر ایک پانچ تولہ، کشتہ سہ دھاتا تین تولہ، سب ادویات کو بوٹر (برگد) کے دودھ کے ساتھ ایک ہفتہ کھل کر کے بخود کے برابر گولیاں بنائیں، بوقت صبح ایک گولی کھلا کر اوپر سے دودھ گائے ڈیڑھ پاؤ جس میں مہری دوتولہ، چھلکا ایبغول چھ ماشہ حل کیا ہوا پی لیں، بہت جلدی آرام آجائے گا۔ چالیس دن کے استعمال سے مرض ہمیشہ کے لئے دور

جائے۔ یہ گولیاں جریان کے ہر درجہ کے لئے مفید ہیں۔

ترکیب ست برگد و بہو پھلی:- برگد کے نرم و تازہ پتے ایک حصہ، بہو پھلی ایک حصہ، دونوں کو کوندے میں ڈال کر ڈنڈے سے سردائی کی طرح گھوٹ کر چھان لیں اور آگ پر پکائیں، جب گاڑھا ہو جائے تو کھلے منہ کی شیشی میں رکھیں۔ یہ ست برگد و بہو پھلی ہے۔

ترکیب کشتہ سہ دھاتا:- قلعی، سیسہ، جست ہر ایک ڈیڑھ تولہ کو ایک ہانڈی میں ڈالیں جس کے پہلو میں سوراخ ہو۔ ہلدی، برگد، پوست ہر ایک دس تولہ کوٹ کر پاس رکھیں، جب دھاتیں گھل جائیں اور پیسی ہوئی ادویہ تھوڑی تھوڑی ڈالتے جائیں تاکہ دھاتیں خاکستر ہو جائیں ان کو کپڑے میں چھان کر ایک پہر جغرات (دہی) گاڑھی میں کھل کر کے ٹکیاں بنائیں اور گوزہ گلی میں گل حکمت کر کے تین روز ایلوں کی آگ دیا زرد رنگ کا عمدہ کشتہ ہوگا۔ خوراک ایک رتی یا مندرجہ بالا نسخہ میں استعمال کریں۔

۶۔ درخت لیکر کے پانچوں اجزاء یعنی پتے، بھول، گوند، چھال ہر ایک برابر وزن لے کر سفوف بنائیں اور ہم وزن چینی ملائیں، خوراک ۹ ماشہ سے ایک تولہ صبح و شام ہمراہ دودھ گائے نیم گرم سے استعمال کریں۔

۷۔ نگ جراثیم، چھلکا ایبغول، معز بیج اعلیٰ ہر ایک دوتولہ، ستاؤڑ چار تولہ، چینی چھ تولہ، سفوف بنائیں۔ تین ماشہ صبح اور تین ماشہ شام دودھ گائے دیں۔

جریان، شرعت اور ذکات جس کو دور کرتا ہے قبض نہیں کرتا، ہضم کی اصلاح کے بعد استعمال کرنے سے فوراً فائدہ ہوتا ہے۔

۸۔ گوکھر و کلاں، معز کنول گٹھ، پوست درخت گولہ ہر ایک ڈیڑھ تولہ، تال، مکھانہ، بیج بند سیاہ، بیج سردالی، گوند ڈھاک ہر ایک تین تولہ چینی

۳۳ تول، سفوف بنائیں، ۹ ماشہ ہمراہ تازہ پانی دیں، جریان کے لئے ازہد مفید ہے۔

۹۔ موصلی سفید، موصلی سیاہ، طباشیر، تال مکھانہ، گوکھرو، ثعلب مصری برابر وزن کوٹ کر سفوف بنائیں، دو ماشہ صبح اور دو ماشہ شام ہمراہ دودھ لیں، دھات کی خرابی کی اصلاح کرتا ہے اور رقت کو نافع ہے۔

۱۰۔ اسکندھ ناگوری، مغز بیج کو پخ، شقائق مصری، تال مکھانہ ہر ایک برابر وزن سفوف بنائیں اور برابر مصری ملا لیں، ۹ ماشہ صبح اور شام ہمراہ دودھ گائے دیں۔

مولد منی، مغلظ منی اور مفتوی ہے، جن لوگوں کا ہاضمہ خراب ہو وہ اس دوا کو استعمال کرنے سے پہلے ہاضمہ کی اصلاح کریں۔
۱۱۔ قلعی دو تول، چھلکا بیضہ مرغ دو تول، پہلے قلعی کو سات بار گچھلا کر نیم کے پتوں کے پانی میں سرد کریں (نہایت احتیاط سے کریں، اگر ذرا بھی غلطی ہوئی یا پانی تھوڑا ہوا تو قلعی پانی سے آواز دے کر اڑے گی اور نقصان کا باعث ہوگی)، پھر چھلکا انڈہ مرغ کو شدھ کر کے ہاون دستہ میں کوٹ کر باریک کریں، ازاں بعد قلعی کو لوہے کے تانبہ پر رکھ کر تیجے آگ جلا لیں، جب گچھل جائے تو چھلکا بیضہ مرغ کی نفوڑی تھوڑی چٹکی دینے جائیں اور کسی لوہے کی سلاخ سے ہلاتے جائیں، جب تمام سفوف ختم ہو جائے۔ اور اس کی رنگت سیاہ ہو جائے تو اُتار لیں، پھر ایک رات دن گھیکوار بوٹی کے رس میں کھل کر کے ٹیکہ بنا کر گوزہ گل میں گل حکمت کر کے پندرہ سیراپوں کی آگ دیں، سرد ہونے پر نکال لیں، کشتہ برنگ سفید میدہ کی طرح نکلے گا، کھل میں پس کر کسی ریشمی کپڑے سے چھان کر شیشی میں حفاظت سے رکھیں، خوراک ایک رتی ہمراہ مکھن یا بالائی دیں۔ جو صاحب جریان کا علاج کراتے کراتے بالکل مایوس ہو چکے ہوں، وہ اس نسخہ کو ضرور تیار کریں، یہ نسخہ پرانے جریان کے لئے پیام شفا ہے اور خاص صدری راز ہے۔

آیور ویدک علاج :- آشوگندھا آدی چورن (صفحہ نمبر ۳۰۳)، ستا وڑی چورن (صفحہ نمبر ۳۰۳)، سپن دوش چورن (صفحہ نمبر ۳۰۳)، کا استعمال مفید ہے، مندرجہ ذیل آیور ویدک تجربات اس مرض کا موثر علاج ہیں۔

پرمیہ آنتک چورن :- ستا وڑ، اسکندھ ناگوری، تال مکھانہ، موصلی سفید، موصلی سیاہ، مغز کو پخ بیج، بیج انگن، سنگھاڑہ، بہمن سفید، بہمن مرغ، تودری مرغ، تودری زرد، کیسر، سوڑیاں، رومی مصطکی، جملہ ادویہ برابر وزن خوب باریک پس کر چھان کر اس میں برابر وزن مصری لیں اور تین ماشہ تاجھ ماشہ ہمراہ دودھ گائے تازہ صبح و شام کھلائیں۔ یہ منی کو گاڑھا کرنے کے علاوہ ہر قسم کے جریان کو مفید ہے۔

سدھارس :- کشتہ قلعی، کشتہ چاندی، دانہ لاپچی خورد، طباشیر فقرہ، ست گلو شدھ، شلاجیت باریک چھ ماشہ، کشتہ مروارید ناسفہ دو ماشہ، سب باریک پس کر دو تین روز تک گلاب کے پھولوں کے رس میں کھل کر کے دو دور تکی کی گولیاں بنائیں اور ایک گولی سے دو گولی ہمراہ دودھ گائے صبح اور شام دیں، جریان کے لئے ازہد مفید ہے۔

چندر پر بھاوٹی (شارنگدھر) :- اس کا نسخہ سلس البول میں دیا گیا ہے۔ ایک گولی صبح و ایک شام ہمراہ دودھ نیم گرم استعمال کریں۔
سفوف جریان :- پھلی بول ایک تول، تال مکھانہ چھ ماشہ، بیج بندنن ماشہ، مصری پڑ ۲ تول، سب کا باریک سفوف بنا کر چھ ماشہ صبح اور شام گائے کھلائیں، ہر قسم کے جریان کو مفید ہے۔

دیگر :- کشتہ قلعی ایک رتی، سفوف دانہ لاپچی خورد چار رتی استعمال کرنے سے پرمیہ روگ شانت ہو جاتا ہے۔
دیگر :- پھل برگد سایہ میں خشک کر کے سفوف بنائیں اور برابر وزن مصری ملا کر ۹ ماشہ صبح و شام گائے کے دودھ سے کھلائیں۔ پرمیہ روگ کے لئے مفید ہے۔

دیگر :- بداری قند چار تول، موصلی سنبل چار تول، گوکھرو دو تول، مغز کنول گٹھ دو تول، سب کو باریک پس کر برابر وزن مصری ملا لیں، اس میں سے چھ

ماشہ صبح و شام گائے کے دودھ کے ہمراہ کھلائیں، پر مہرہ روگ دور ہو جاتا ہے۔

جریان کا جڑی بوٹیوں سے علاج

۱۔ اونٹ کٹارا بوٹی کی جڑ کی چھال تین ماشہ، گوکھرو تین ماشہ، مصری تین تولہ، سفوف بنائیں، جریان کے لئے ایسی خوراک روزانہ ہمراہ نیم گرم دودھ دیں۔

۲۔ آگندھ ناگوری چار ماشہ، ستا دھرتی ماشہ، موچرس ایک ماشہ، سفوف بنائیں، بقدر چار ماشہ لے کر شہد دگھی میں ملا کر استعمال کریں جریان دور ہو جائے گا۔

۳۔ برہمی تین تولہ، مغز بادام چھ تولہ، چار مغز دو تولہ، دھنیاں چھ ماشہ، الائچی خورد چھ ماشہ، طباشیر چھ ماشہ، موصلی سفید چھ ماشہ، مصری پانچ تولہ سفوف بنائیں، خوراک تین ماشہ ہمراہ دودھ دیں۔ جریان، ذیابیطس اور دماغی کمزوری کے لئے مفید ہے۔

۴۔ پیپل کی جڑ کی چھال، پیپل کا پھل برابر باریک پیس کر اور ہر دو کے برابر چینی ملا کر سفوف بنا کر رکھیں، خوراک چھ ماشہ سے نو ماشہ ہمراہ دودھ بکری دیں، جریان کے لئے از حد مفید ہے۔

۵۔ جڑ لنگھی بوٹی پانچ تولہ، ستا دھرتی دس تولہ، باریک پیس کر دو گنا شہد کے ساتھ معجون بنائیں اور چھ ماشہ سے نو ماشہ ہمراہ دودھ کھائیں، جریان اور کمزوری کے لئے مفید ہے۔

۶۔ رت سلاجیت اصلی، کشتہ مرجان، کشتہ قلعی ہر ایک دو تولہ، موصلی سفید، ثعلب مصری، ورق چاندی، گوند ڈھاک، تال مکھانہ، زنجبیر، لاجونی ہر ایک ایک تولہ، کوزہ مصری تین تولہ باریک کر کے سفوف بنائیں، صبح اور شام ڈیڑھ ڈیڑھ ماشہ ہمراہ دودھ گائے نیم گرم استعمال کریں از حد مفید ہے۔

ہومیوپیتھک علاج :- سخت قبض، صبح اٹھنے پر زیادتی، نکس و امیکا ۳۰ - ۲۰۰ جلق سے تکلیف ہو کمزوری ہو فوفا

اجابت کے وقت تکلیف، کلکیر یا فاس ۶ x ۶ خواہش کمزور ہو، سلیشیا ۶ x ۶ سفید رنگ کا پیشاب بار بار ہو،

خون کا اثر، ایڈ فاس ۳۰ - ۲۰۰ رفع حاجت کے وقت، ایڈ ایسی فلک ۶ - ۲۰۰ مایوسی و خود کشی

خیال بنا ہے، آرم میٹ ۳۰ - ۲۰۰ بلا ارادہ جریان و احتلام کی شکایت، کلاڈیم ۶ - ۳۰ - ۲۰۰

احتلام، نیوفروٹیم ۳۰ - ۲۰۰ چلتے پھرتے بغیر بو کے، سلینیم ۳۰ - ۲۰۰

اس سلسلہ میں دھیان رہے کہ روٹی سے دو یا تین یا چار گھنٹہ بعد جو پیشاب آتا ہے۔ اگر اس میں گاڑھا پن ہو، تو اس میں ہاضمہ کا قصور ہے

چاہیے اور ہاضمہ کو امداد ملنے سے یہ نقص دور ہو جاتا ہے۔

مریض کو ہدایت کی جائے کہ پاخانہ جانے وقت ہرگز زور نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ زور لگانے سے ویرج کے خزانہ پر بوجھ پڑتا ہے

جبنا پاخانہ پانچ سات منٹ آرام سے بیٹھنے سے آجائے، اس کے بعد اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ پیشاب جسم کا میٹل ہے، اس واسطے ہر ایک روز

کا پیشاب شیشی میں دو تین گھنٹے رکھنے سے ذرا دھندلا ہوا نظر آنے سے جو مریض گھبرا جاتے ہیں، وہ غلطی کرتے ہیں، اور فکر سے اپنی صحت بلا

خراب کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ مریض نہیں ہے۔

غذا پر مہرہ، گھیا، کدو، مونگ کی دال، روٹی وغیرہ دیں، کھانا مومنے سے دو چار گھنٹے پہلے کھلائیں، گرم اور طاعت درجیز چاہے

تہوہ، شراب اور ملاپ سے پرہیز کریں۔ ویرج کی کمی اور سچٹوں کی کمزوری میں ابلانڈ، ماس کا شوربا، دودھ نمک کا استعمال مفید ہے۔

سُرْعَت

تعریف مرض:۔۔۔ ملاپ کے وقت طبعی مدت سے کم وقت میں انزال یعنی مادہ منویہ (ویرج) کا اخراج ہو جاتا ہے۔ نیز سُرْعَت ایک ایسا عارضہ ہے جو فعل ملاپ کی تکمیل نہیں ہونے دیتا۔

طبعی مدت:۔۔۔ اختلاف مزاج و عمر کی وجہ سے مختلف اصحاب میں مدت یعنی منی خارج ہونے کے زمانے میں فرق ہوتا ہے، جوانی میں یہ زمانہ نسبتاً کم ہوتا ہے، حالت صحت میں یہ وقفہ ایک ڈیڑھ منٹ سے چار پانچ منٹ تک ہوتا ہے۔

وجوہات:۔۔۔ کثرت ملاپ یا جلق سے ذکاوت حس، منی کی کثرت، حدت و حرارت یا رقت منی، غرضہ تک ترک ملاپ، کمزوری اعضاء، ریشہ و اعصاب، پیشاب کی نالی کی سوجن، ورم غدہ مذی یا بعض اوقات بغیر ملاپ کے منی خارج ہو جاتی ہے۔

علامات:۔۔۔ ملاپ کے فوراً بعد یا بعض اوقات بغیر ملاپ کے منی خارج ہو جاتی ہے، بعض اوقات صرف شہوانی خیالات سے ویرج نکل جاتا ہے، اکثر کامل انتشار نہیں ہوتا اور طبعی لذت حاصل نہیں ہوتی، چونکہ مریض اپنے ارادے میں بخوبی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لئے نادم ہوتا ہے، کبھی ندامت کے مارے زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے۔

علاج ڈاکٹری:۔۔۔ اس مرض میں کثرت احتلام اور جریان دلی ادویات کا استعمال کیا جائے، اگر یہ عارضہ کثرت ملاپ سے ہو تو کچھ عرصہ ملاپ سے پرہیز کرائیں۔ مندرجہ ذیل مقویات وہ ادویہ یا اعذیہ ہیں جو عضو کی ساخت اور اس کے مزاج کو اعتدال پر لاتی ہیں، جب عضو کی ساخت اور مزاج درست ہو جائے۔ تو اس میں طبعی طور پر خود بخود طاقت آ جاتی ہے، اس غرض کے لئے سینکڑوں ادویات ہیں، جن میں سے صرف چند یہاں لکھی جاتی ہیں، یہ بتانا ضروری ہے کہ ہر معالج کو جہاں تک ہو سکے، پیٹنٹ ادویات کم تجویز کرنی چاہئیں اور سُرْعَت کے علاج کے لئے ہمیشہ دیسی علاج کو ترجیح دینی چاہیے۔ ایلوپیتھک پیٹنٹ ادویات درج ذیل ہیں:۔

۱۔ بی، جی، فاس الکسر (B. G. Phos Elixir) شارپ اینڈ ڈوہم ————— یہ وٹامن بی کمپلیکس B-Complex اور

معدنی اجزاء گلیسر و فاسفیٹ آف سوڈیم، پوٹاشیم، کیلیم اور مینگنیز کا خوش ذائقہ مرکب ہے۔

خوراک ایک ٹیبل سپون دن بھر میں تین بار غذا سے پہلے دیں۔

۲۔ پروٹی نیلکس:۔۔۔ یہ غذائی دوا ہے، خوراک ایک سے دو ٹیبل سپون بھر دن میں تین بار بعد از غذا دیں۔

۳۔ میٹا ٹون (Metatone) ساختہ پارک ڈیوس کمپنی۔ یہ سٹرکینین، گلیسر و فاسفیٹس آف کیلیم، پوٹاشیم، سوڈیم، مینگنیز اور وٹامن بی کا

مرکب ہے، ناتوانی اور بیماری کے بعد کی کمزوری میں استعمال کیا جائے۔

ماڈرن ادویات:۔۔۔ ۱۔ اس مرض میں اختلام میں دی گئی ادویات کا استعمال کرایا جائے تاکہ ذکاوت حس دور ہو کر مرض کو فائدہ ہو،

ایسے تھین مرہم (Anethin ointment) سببا ————— وقت سے بیس منٹ پہلے پیاری پیاری مرہم کا ہلکا سا لپ کر لیں

اس سے پیاری میں بیماری پن آ جائے گا۔ یہ عضو کی جمعی کو بے حس کر دیتی ہے۔ اس سلسلہ میں معالجین سے گزارش

ہے کہ یہ علاج صرف ضرورت مند اصحاب کو ہی دیں اور اس کے متواتر استعمال سے پرہیز کرائیں اور غلط آدمیوں کو یہ دوا نہ دے کر اپنے طبی پیشہ

کا وقار ہمیشہ بلند رکھیں، صرف ان ضرورت مندوں کو استعمال کرائیں جو واقعی اس نامراد مرض سے پریشان ہیں۔

۲۔ افروڈیسیک ٹانک (Aphrodisiac tonic) ایبٹ ————— ایک دو گولی دن میں دو سے تین بار کھانا کھانے کے

۲۲۔ سکھدائیک شکستی (سکھدائیک ملتانی دوا خانہ رحبڑ، پانی پت) ایک گولی صبح و ایک شام ہمارا دودھ نیم گرم دیں۔

یونانی علاج :- سبب کا علاج کریں، قبض کی حالت میں ایسبغول سالم سات ماشہ کھلا کر قبض رفع کریں، ذکاوت حس بڑھ گئی ہو تو اسے مسکنات اور محذرات کے استعمال سے اعتدال پر لائیں، جن کا ذکر اختتام اور جریان کے علاج میں کیا گیا ہے۔ رقت منی سے ہو تو کشتہ قاحی (برگ بھنگ سے تیار شدہ) ایک سے دور تکی تک معجون آرد خرما یا معجون ثعلب چار ماشہ ملا کر دیا کریں، رات کو سوتے وقت حب نشاط یا حب خاص امین عدد کھلائیں، عصبی کمزوری کی وجہ سے ہو تو حب کچلہ شدہ پاؤسیر دودھ سے دیں۔

سرعت کے علاج میں منشی چیزوں سے سخت پرہیز کیا جائے، کیونکہ اس قسم کی منشی دواؤں سے منی خشک ہو جاتی ہے اور بجائے فائدہ کے نقصان پہنچتا ہے۔ مندرجہ ذیل مجربات میں سے کسی ایک کا استعمال مفید ہوگا، لیکن یہ خیال ہے کہ جب تک عام صحت بحال نہ ہو، تب تک معقوی ادویہ کا استعمال مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔

۱۔ چھال ڈھاک، چھال موسری، چھال گولر، گوند سنبل، موصلی سنبل، مجیٹھ، گوند بول، گوند گولر، گوند ڈھاک، نخود بریاں برابر وزن لے کر سفوف بنائیں اور بقدر آدھا تولہ صبح و شام ہمراہ دودھ استعمال کریں۔

۲۔ گری کو پینچ پینچ تولہ، تال مکھانہ پانچ تولہ کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں، خوراک تین ماشہ سے چھ ماشہ تک صبح و شام دودھ نیم گرم کے ساتھ استعمال کریں بے ضرر و آزمودہ نسخہ ہے۔

۳۔ تال مکھانہ، گوند کیکر، بیج بند، الاچی، پھول سپاری، موصلی سیاہ، بیج خرفہ ہر ایک ایک تولہ، بیج لمر بندی (شدھ) چھ تولہ، سب کو بڑے دودھ میں تر کر کے سایہ میں خشک کر لیں، روزانہ دو گولی ہمراہ دودھ گائے استعمال کریں۔ گولی بقدر دانہ نخود بنائیں۔

۴۔ جائفل، جادتری، انیون، مازو، حرمل، مصطکی، زعفران، ناگ کیسر، گوگل، سپاری، دانہ الاچی خورد، طباشیر، اجوائن خراسانی، تمام دوائیں برابر وزن لے کر سفوف بنائیں اور پان کے پتوں کے رس میں گوندہ کر دانہ نخود کے برابر گولیاں بنائیں، ایک ایک گولی صبح و شام ہمراہ دودھ استعمال کریں۔ دو گھنٹہ پہلے ہمراہ دودھ نیم گرم استعمال کریں۔

۵۔ جائفل، شنگرف شدھ، عاقر قزح، انیون، دارچینی ہر ایک دو ماشہ، سب کو کوٹ چھان کر شہد کی مدد سے نخودی گولیاں بنائیں، دو گھنٹہ پہلے ایک گولی کھا کر ادھر سے دودھ پیئیں۔

۶۔ سنگھاڑ خشک، چنیا گوند ہر ایک چھ ماشہ، تال مکھانہ، ثعلب مصری ہر ایک چار ماشہ، مازو سبز تین ماشہ، مصری ہوزن ادویہ، سفوف بنا لیں، خوراک چار سے چھ ماشہ، ہمراہ دودھ نیم گرم دیں، معقوی ہے اور سرعت کے لئے مفید ہے۔

۷۔ اسپند (حرمل) بریاں دو تولہ، پوست خشناس ایک تولہ، ہر دو کو بار ایک کریں۔ اور چار چار رتی دوا صبح و شام دودھ کے ساتھ کھائیں، سرعت کو دور کرنے کے لئے مفید ہے۔

۸۔ سنگھاڑ خشک، گوند کثیر ہر ایک چھ ماشہ، نشاستہ، تال مکھانہ، ثعلب مصری ہر ایک چار ماشہ، مازو، مصطکی ہر ایک تین ماشہ، کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور مصری ہوزن ملا کر کھیں، چھ ماشہ یہ سفوف صبح و شام کھائیں، سرعت کے لئے مفید ہے۔

لڈو ناریل بہ جادتری چھ ماشہ، جائفل چھ ماشہ، زعفران خالص چھ ماشہ، چھلکا ایسبغول ایک تولہ، ناریل (گولہ) ایک عدد، ناریل دے کر اس میں سوراخ کر لیں، چاروں مندرجہ بالا اشیا رڈال دیں اور سوراخ پر وہی ناریل کا ٹکڑا دے کر وہاں ذرا سا آٹا لگا دیں اور پانچ بیر دودھ میں اس ناریل کو ڈال دیں۔ اور ساتھ ہی چھوٹے، چروبنی، مغز اخروٹ، مغز بادام، مغز ناریل ہر ایک پانچ تولہ ڈال دیں، جب کھویا بن جائے، اتار کر سب کو پیس لیں اور بار ایک ہونے پر دوسرگی خالص میں بھون لیں اور دوسر کے قریب مصری پیس کر ملا دیں اور چھٹانک چھٹانک کے لڈو لیں، آدھا ایک لڈو روزانہ دودھ کے ساتھ کھایا کریں، جریان، ذیابیطس اور سرعت کو دور کرتا ہے، طاقت بخشتا ہے۔

حب مقوی خاص :- عقرقرہ، شنگرف شدہ، لونگ، زعفران خالص، دارچینی، جانشن، انیون، مشک خالص، سب چیزیں ہموزن سے باریک کر کے ہمراہ شہد چھوٹے چنے کے برابر گولیاں بنائیں، خوراک ایک گولی ہمراہ دودھ نیم گرم استعمال کریں، موسم سرما کلبے نظر مختلف ہے، نئی زندگی بخشنے والی خاص انخاص چیز ہے۔

حب کچلہ :- کچلہ دو تولہ گیارہ ماشہ کو دودھ میں اس قدر جوش دیں کہ اس کا چمکا آسانی سے دور ہو جائے، پھر اس کا چھلکا دور کر کے مرچ سیاہ، نفل، دراز ہر ایک ایک تولہ ۳ ماشہ، عنبر سائیدہ ۳ ماشہ، سب ادویہ کو کوٹ کر ایک جگہ کر لیں اور چھوٹے جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنائیں، ایک گولی صبح و شام ہمراہ دودھ نیم گرم استعمال کریں۔

مسح الملک حکیم اجل خان صاحب اور ان کے خاندان کا یہ ایک مشہور نسخہ ہے، حکیم محمد محمود خان مرحوم بھی اسے تجویز کرتے تھے، پھٹوں کو تقویت دیتی ہے، نزلوں کو جذب کرتی ہے اور سرعت کو دور کرتی ہے، نہایت اعلیٰ اور مقوی چیز ہے۔

معجون آرد خرما :- مشہور قرابا دینی نسخہ ہے، رفت اور سرعت کو نفع دیتی ہے اور مقوی ہے، گوند کیکر بریاں، آرد خرما، نگھاڑ خشک ایک آدھ سیر، کوٹ چھان کر اور مغز بادام شیریں، مغز حلیغوزہ، مغز فندق ہر ایک پانچ تولہ علیحدہ علیحدہ پیس کر تر بنجین دھند خالص ہر ایک ایک سیر کا تمام کر کے دواؤں کو شامل کریں اور بعد ازاں مغز پیبہ دانہ ایک تولہ، لونگ چھ ماشہ، جادتری اور جائفل ہر ایک تین ماشہ کوٹ چھ کر ملائیں، خوراک ایک تولہ ہمراہ دودھ گائے استعمال کریں۔

دیگر :- مغز ہندو پانچ تولہ، تال مکھانہ ہر ایک ایک تولہ، مصری کوڑہ دس تولہ، تمام ادویہ کو پیس کر دودھ برگد سے کھل کریں اور ان کے برابر گولیاں بنائیں، سرعت کے لئے ایک گولی ہر روز بوقت شام کھلائیں، پانچ روز کے بعد ایک گولی بوقت شام اور ایک بوقت رات کو استعمال کریں اور رات کو از حد مفید ہے۔

دیگر :- موچر جس قدر چاہیں، چینی کے پیالہ میں رکھ کر اوپر دودھ برگد اس قدر ڈالیں کہ دوا نکل دوا سے اوپر ہے، اسے سایہ میں رکھ کر اور کسی باریک کپڑے سے ڈھک دیں جب خشک ہو جائے اور ڈال دیں، یہ عمل چالیس بار کریں، اس کے بعد موچر کا وزن کر کے چار گنا دودھ کے ہمراہ کھل کریں اور گولیاں بقدر بخود بنائیں، نہایت مفید ہے سے دو گھنٹہ قبل ایک گولی ہمراہ دودھ کھلائیں، حسب منشا فائدہ اگر اس دوا کی طاقت زائل کرنی ہو تو بخود بریاں کھلائیں۔

دیگر :- لاسچی خورد، لونگ ہر ایک سات عدد، انیون ایک ماشہ، جائفل ایک عدد کوٹ چھان کر سات جھٹے بنائیں اور سات عدد چھوٹا کی گھٹنی نکال کر ہر حصہ ایک ایک چھوٹا سے میں بھر دیں اور چھوٹا روں کے باقی حصہ کو دودھ برگد سے بھر کر ایک عدد کو علیحدہ علیحدہ آٹے پیسٹ دیں اور بھول میں بریاں کر کے پیس لیں، اس کے بعد دو عدد چڑے ذبح کر کے پیسٹ صاف کریں اور تمام دوا کو ان کے پیسٹ میں بھر کر سی دیں اور خالص گھی میں بریاں کر لیں، بعد کوٹ کر گولیاں بقدر بخود بنائیں، ایک گولی دودھ کے ساتھ کھلائیں۔

دیگر :- اسپند (حرل) اڑھائی تولہ، پوست خشخاش سات ماشہ، تل کالے سات ماشہ، گڑ پُرانا بقدر ضرورت، سات گولیاں ایک گولی سے دو گھنٹہ پہلے کھلائیں۔

دیگر :- مشک (کستوری) خالص ایک رتی، حرل تین ماشہ پیس کر گولیاں بقدر دانہ ماش بنائیں اور ایک گولی ہمراہ دودھ سے دو گھنٹہ پہلے ملائیں۔

دیگر :- ایک عدد مغز ناریل سالم لے کر اس میں ایک طرف سے سوراخ کریں اور تال مکھانہ دو تولہ انیون تین ماشہ پیس کر اس میں دیں اور دودھ برگد سے پر کریں، اس کے بعد اتار ہوا کھڑا اوپر رکھ دیں اور اس پر کپڑے کی دھجیاں پیسٹ کر غلہ گندم کے انبار میں

کے کبھی استعمال نہ کرنا چاہیے، جس روز ایسی دوا کی ضرورت پڑے، دودھ کے ساتھ استعمال کریں اور غذا موقوف کر دیں، البتہ دودھ اور شربتی کا استعمال کر سکتے ہیں۔
 کھانا اگر ضرور کھانا ہو تو بعد فراغت کھا سکتے ہیں، اس کھانا میں حلوہ بھی ہو تو بہتر ہے گا۔
 ہومیوپیتھک علاج :- ایک گفنڈ قبل سلیم ۳۔ ۲۰۰ کی مقدار کھالینے سے فائدہ ہوتا ہے۔
 غذا و پرہیز :- زود ہضم و لطیف غذائیں، دال مونگ، بٹڑا، توری، چپاتی وغیرہ دیں، گرم و محرک اشیاء سے پرہیز کریں۔

پریش بندھیا تو، مردانہ بانجھ پن، سٹریلٹی ان مین (Sterility in man)

تعریف مرض :- مرد کی منی میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس کے لئے مرض کا ضعف الباہ یا کمزور ہونا ضروری نہیں ہوتا۔
 اقسام :- دو قسمیں ہیں :- ۱۔ مردانہ بانجھ پن عارضی - ۲۔ مردانہ بانجھ پن اصلی۔
 وجوہات :- خصلتوں کا پیدائشی طور پر نہ ہونا یا جو ف شکم سے نپٹوں میں نہ اترنا یا پیدائش کے بعد کٹ جانا یا پیشاب کی تالی کے زخم وغیرہ سے بے کار ہو جانا، منی کی دونوں نالیوں کا بند ہونا۔
 مذی اور خزانہ منی کے مخصوص امراض جن سے ویرج کے کیڑے ہلاک ہو جاتے ہیں، غرض منی کا نہ ہونا یا اس میں منی کے کیڑوں کا فقدان منی کا سورمزاج، آلت تناسل کا موجود نہ ہونا یا عضو مخصوص کا چھوٹا ہونا، لیکن اگر منی صحیح ہو تو اسے آلات کے ذریعے رحم (بچہ دانی) میں پہنچا حمل ٹھہرایا جاسکتا ہے۔

عدم انزال، (Aspermia)

۱۔ اس مرض میں انزال کے وقت منی کا اخراج نہیں ہوتا اور شہوت بچھ جاتی ہے۔ اس مرض کی دو صورتیں ہوا کرتی ہیں - ۱۔ ویرج کا سرے سے پیدا ہی نہ ہونا - ۲۔ کسی طبی مزاحمت کی وجہ سے خارج نہیں ہو سکتی، ایسے مرض میں قوت مردانہ ختم ہو جاتی ہے، بعض دفعہ غیر انزال مشا سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے، کبھی ڈر، خوف، فکر، اندیشہ وغیرہ کے آپریشن سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔
 علامات :- مندرجہ بالا اسباب ہوتے ہیں، عورت کے صحت مند ہونے کے باوجود بچہ پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ عدم انزال یا انزال کے باوجود ویرج میں اولاد پیدا کرنے والے کیڑے نہیں ہوتے، آتشک کے مریضوں میں مردانہ بانجھ پن دو طرح سے پیدا ہوتا ہے، ایک تو اس مرض کے زب اثرات سے ویرج کے کیڑے تلف ہو جاتے ہیں، دوم خصلت کے اندر ورم اور گٹھا (گانٹھ) پیدا ہو کر خصلت بے کار اور نکم ہو جاتا ہے، اس سوزاک سے بھی ویرج کے کیڑے تلف ہو جاتے ہیں، دق سے بھی اس قسم کے نتائج پیدا ہوتے ہیں، سرطان اور اورام خصلت سے بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔

ویرج کے کیڑے نہ ہونا :- اس تناسلی نقص کا نام ہے، جب ویرج کے کیڑے منی کے اندر موجود ہوں، اور اولاد پیدا کرنے کی اہلیت ہو، مگر کچھ خارجی اسباب کے باعث ویرج منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے اور ویرج کے کیڑے کی عورت کے اندر کے کسی طرح ملاقات نہ ہو سکے۔


مرد کے اندر اس قسم کے اسباب موجود ہوں جو فعل ملاپ کو مقدم طور پر اور فعل تناسل کو ثانوی طور پر سراسر انجام نہ ہونے دیں، :-

عضو تناسل کا نقص، عضو تناسل کا چھوٹا پن، حشفہ (سپاری) کے امراض، پیشاب کے سوراخ کا پیدائشی طور پر عضو مخصوص کی نچلی طرف ہونا، پیشاب کے سوراخ کا پیدائشی طور پر عضو مخصوص کی پیٹھ پر ہونا یا مرض ایڈروسل (فٹوں کی تھیلی میں پانی اترنا)، ہرنیا موٹا پاؤ وغیرہ۔

جوان عمر درمیانی عمر اور بڑھاپے میں ویرج کے کیڑوں کی حالت



بڑھاپے کی عمر درمیانی عمر جوان عمر



مسی حیوانات منویہ کے ساتھ



ویرج کا کیڑا بہت بڑا کر کے دکھایا گیا ہے!

بعض اوقات مردانہ بانجھ پن عارضی عورت کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی مرد کی منی تو صحیح اور سالم ہو، مگر عورت کے اندر اس قسم کے نقص موجود ہوں کہ یا تو اس میں بیضہ بشریہ (انڈہ) موجود نہ ہو یا کسی سبب سے بیضہ بشریہ اور ویرج کے کیڑوں کی ملاقات نہ ہو سکے، مگر ان صورتوں میں عدم تناسل کا مرد ذمہ دار نہیں، یہ نسوانی نقص ہے، جس کا تعلق امراض زنانہ سے ہے، جس کا مفصل علاج اگلے باب میں تحریر ہے اس نسوانی نقص کو زنانہ بانجھ پن کہتے ہیں۔

”عام طور پر جب شادی کئے کچھ عرصہ گزر جاتا ہے اور اولاد نہیں ہوتی، تو اس عارضہ کا الزام عورت پر لگایا جاتا ہے، اس بہانہ سے دوسری یا تیسری شادی کر لی جاتی ہے، مگر دوسری شادی کی رائے دینے سے پہلے معالج کو شوہر اور بیوی دونوں کا اچھی طرح طبی امتحان کر لینا چاہیئے“

علاج :- سب سے پہلے اس بات کی تشخیص ضروری ہے کہ مردانہ بانجھ پن حقیقی ہے یا ثانوی، اس غرض سے مرد کے ویرج کا ایک قطرہ لے کر خوردبین کے ذریعہ معائنہ کرنا چاہیئے، اگر حیوانات منویہ (ویرج کے کیڑے) کافی تعداد میں موجود ہوں اور مضبوط ہوں اور ان کی حرکات چست و طاقت ور ہوں تو اس صورت میں مردانہ بانجھ پن اصلی نہیں۔

دوسری صورت میں اگر ویرج کے کیڑے ویرج کے اندر موجود نہیں تو اسے مردانہ بانجھ پن اصلی سمجھنا چاہیئے۔ اور اس کے اسباب میں زہریلے زخم، پیشاب کی نالی کے زخم، تپ دق، اور ام وغیرہ امراض کا استفسار ضروری ہے! طبی اصول پر باقاعدہ امتحان کرنے سے صورت حالات باسانی معلوم ہو جائے گی۔

اس سلسلہ میں اصلی سبب مرض کا علاج کریں، اگر ویرج کا انزال پیدائش سے نہ ہوتا ہو یا ویرج میں کیڑے پیدائش سے ہی موجود نہ ہوں تو مردانہ بانجھ پن لا علاج ہے، اگر کوئی ثانوی سبب موجود ہے تو آپریشن یا طبی دواؤں سے اس کا علاج ہو سکتا ہے، مختلف امراض ہرنیا، اور ام وغیرہ جو ملاپ میں فتح ہوتے ہیں، جراحی عمل سے علاج پذیر ہیں۔

اسی طرح زہریلے زخم، پیشاب کی نالی کے زخم اور تپ دق کے نتائج اور علامات مناسب ادویہ کے استعمال سے دور کئے جاسکتے ہیں، بشرطیکہ خفیہ جو کم کمل طور پر زائل نہ ہو گیا ہو، اگر عورت زیادہ موی ہو یا عضو میں خرابی ہو تو ان صورتوں میں بھی خاوند بیوی کو مناسب طبی ہدایات دینے سے نطفہ اور کاٹ رحم (بچہ دانی) میں داخل ہو سکتا ہے، اس مرض کے علاج میں بولڈات منی کا استعمال مفید ہے اور طب آیور وید و طب یونانی کا علاج سودمند ثابت ہو سکتا ہے، مندرجہ ذیل نسخہ جات اس مرض کا مفید علاج ہیں :-

حب معاون :- برہمی بوٹی سایہ میں خشک شدہ بڑھیا ۱۳ تولہ، ملھی چھلی ہوئی تین تولہ، دانہ الہچی خورد ایک تولہ، ورق چاندی بارہ عدد، ورق سونا چھ عدد، زعفران چھ ماشہ، کستوری خالص ایک ماشہ، تمام اجزاء کو باریک کر کے شہد خالص میں گوندھ کر گولیاں بنو کے برابر بنالیں، ایک ایک گولی صبح و شام ہمراہ دودھ گائے کھلائیں۔

دیگر :- شفاقل دو تولہ، مایہ شتر اعرابی، بہمن سفید ہر ایک چھ ماشہ لے کر اول مایہ شتر اعرابی کو گلاب میں حل کر کے باقی ادویہ کوٹ چھان کر ملائیں، اور دو تولہ شہد ملا کر حبوب بقدر دانہ بنو بنائیں اور ایک گولی صبح اور ایک گولی شام ہمراہ دودھ گائے نیم گرم استعمال کریں۔

دیگر :- کستوری خالص، مصطکی رومی، لونگ ہر ایک ساڑھے چار ماشہ، عنبر اشہب، ثعلب مصری، خولنجان ہر ایک ۹ ماشہ، مایہ شتر اعرابی ۱۳ ماشہ، رب کو کوٹ چھان کر گلاب میں گوندھ لیں اور حبوب بنو بنائیں۔ ایک یا دو گولیاں تازہ دودھ سے کھائیں۔

دیگر :- ثعلب مصری، مغز پنبدانہ، آرد سنگھاڑا ہر ایک تین ماشہ، ایک پاؤ گائے کے دودھ میں پس کر جب گاڑھا ہو جائے، تو مصری دو تولہ ملا کر پلائیں۔

دیگر :- دیر یہ پشٹ چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ دودھ گائے استعمال کریں۔

ہوارش گذر :- گاجریں شیریں اور بڑی لے کر چھلکے اور گٹھلی سے صاف کریں اور آدھ سیر دودھ اور شہد میں جوش دیں، اس کے بعد پتھر کی اگلی میں کوٹ کر چھلنی سے چھان لیں اور دو سیر شہد ملا کر نرم آگ پر رکھیں تاکہ پانی خشک ہو جائے، اس کے بعد سوخٹھ، مصطکی، دار چینی، پیپل، لونگ، اندر جو شیریں، زعفران، بال چھڑ، خولنجان ہر ایک ساڑھے دس ماشہ، شفاقل ڈیڑھ تولہ، کوٹ چھان کر ملائیں اور بقدر دو تولہ ہمراہ دودھ گائے کھلائیں۔

قدرتی علاج :- خضیہ مرغ تازہ سالم کا سالم ہی بریاں کر کے ورق نقرہ میں پیٹ کر نگلوائیں۔

غذا و پرہیز :- گرم و ترش چیزیں خصوصاً شراب، چائے، تہوہ وغیرہ سے پرہیز کریں، زرد مضم و مقوی اغذیہ استعمال کریں۔

ویرج کا پتلا پن، رقت منی، (Hydrospermia)

تعریف مرض :- اس مرض میں منی عام طور پر پتلی ہوتی ہے اور اس کا ٹھوس حصہ کم ہو کر مائع اجزاء بڑھ جاتے ہیں۔

وجوہات :- ترش اور کڑوی غذاؤں کا بکثرت استعمال یا زیادہ تیز و کڑوی ادویات کا استعمال، تیل کی بنی ہوئی چیزوں اور شراب وغیرہ کے زیادہ استعمال سے بھی ویرج پتلا ہو جاتا ہے۔

علامات :- مرد کے ویرج (منی) میں ویرج کے کیڑے (Sperms) کم یا بالکل مفقود ہو جاتے ہیں، منی بالکل پتلی ہوتی ہے، سرعت کا عارضہ ہو جاتا ہے۔

علاج :- ویرج کو گاڑھا کرنے والی اغذیہ و ادویہ دیں، مرض جریان کے بیان میں ویرج کو گاڑھا کرنے والے نسخے اس مرض میں بھی مفید ہیں۔ مندرجہ ذیل آسان تجربات اس مرض کا موثر علاج ہیں :-

- ۱۔ ثعلب مصری چار تولہ، مصطکی رومی ایک تولہ، چینی سفید میں تولہ سفوف بنا کر بقدر چھ ماشہ ہمراہ دودھ پیٹ استعمال کریں۔
- ۲۔ گوند ڈھاک، گوند کیکر، پھلی کیکر خشک (جس میں بیج نہ پڑا ہو)، چھال کیکر، موصلی سفید، موصلی سیاہ، موصلی سنبل، تال بکھانہ، انجو شیریں، بہمن مرنج ہر ایک ایک تولہ، کوٹ چھان کر ہوزن مصری ملا کر سفوف بنا کر رکھیں اور بقدر چھ ماشہ ہمراہ دودھ گائے صبح و شام استعمال کریں۔

۳۔ شقائق مصری، ستاؤڑ، ثعلب مصری، تودری سُرخ، تودری سفید، تال مکھانہ، تیج، بیج سروالی، بیج کوپنج (شدھ)، بیج انگن، سنز پنبہ دانہ زعفران کا آٹا، لالچی خورد، طباشیر، موصلی سفید، موصلی سیاہ، بہمن سفید، بہمن سُرخ، پھلی کیکر خشک (جس میں بیج نہ پڑا ہو) ہر ایک چھ ماشہ، سرب اجزاء کو باریک کر کے کوٹ چھان لیں اور برابر وزن مصری ملا کر سفوف بنالیں، خوراک چھ ماشہ ہمراہ دودھ گائے دیں۔

۴۔ تال مکھانہ، بیج سروالی، تیج قلمی، پھلی کیکر خشک (جس میں ابھی بیج نہ پڑا ہو)، ثعلب مصری، ستاؤڑ، موصلی سفید ہر ایک ایک تولہ، چینی ہموزن ادویہ کے کر سفوف بنائیں اور بقدر چھ ماشہ ہمراہ دودھ گائے استعمال کریں۔

آیور ویدک علاج بطر یونانی علاج کے کریں، ایلوپیتھک و ہومیوپیتھک علاج اس مرض کے لئے کوئی خاص فائدہ مند ثابت نہیں ہوا۔

دیرج کے پتلا پن کا جڑی بوٹیوں سے علاج

آونٹ کٹارہ کا استعمال :- آونٹ کٹارہ کی جڑ کی چھال تین ماشہ، گوکھرو خورد تین ماشہ، مصری تین ماشہ، سفوف بنائیں، ایک ایک خوراک روزانہ دودھ سے دیں۔

آسکندھ ناگوری کا استعمال :- آسکندھ ناگوری چار ماشہ، ستاؤڑ تین ماشہ، موچیس ایک ماشہ، سفوف بنالیں اور بقدر چھ ماشہ، ایک تولہ شہد اور رماشہ گھی خالص میں ملا کر استعمال کریں۔

پیل کا استعمال :- پیل کی جڑ کی چھال، پیل کا پھل ہموزن باریک پیس کر اور برابر مکھانڈ ملا کر سفوف بنائیں اور رکھ دیں، یہ سفوف رقت منی کے لئے مفید ہے، خوراک چار ماشہ دودھ سے دیں۔

کنگھی بوٹی کا استعمال :- بیج کنگھی بوٹی پانچ تولہ، ستاؤڑ دس تولہ، باریک پیس کر دو گنا شہد کے ساتھ معجون بنائیں، اور چھ ماشہ سے نو ماشہ ہمراہ کھائیں، دیرج کے پتلا پن کے لئے مفید ہے۔

غذا پر مہیز :- تیل کی ترش، کڑوی چیزوں اور شراب سے سخت پرہیز کریں، غذا زرد دھنم اور مقوی استعمال کر لیں۔

دیرج میں پیپ، پیپ دار منی، (Pyospermia)

تعریف مرض :- اس مرض میں دیرج میں پیپ پائی جاتی ہے۔

وجوہات :- سوزاک کا زہر، پیشاب کی نالی کے امراض سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- منی (دیرج) میں اگر پیپ کے ذرے ملیں تو اس کی رنگت کم و بیش ہو جاتی ہے اور سفید کپڑے پر اس کا دارع زرد یا زردی بھرا ہوا کرتا ہے، اگر پیپ پیشاب کی نالی سے ملتی ہو تو دیرج کے دھبے میں دارع بے قاعدہ اور دھاریوں کی صورت میں ہوں گے، مگر جب پیپ منی سے آرہی ہو تو منی کا دھبہ کیساں طور پر پھیلا ہوگا۔ اگر دیرج سُرخ مائل زرد ہو تو سمجھنا چاہیے کہ اس میں پیپ اور خون دونوں ملے ہوئے ہیں، دھیان رہے کہ مرض یرقان میں مبتلا مریض کی منی کا رنگ بھی مرض کے مطابق ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں مریض کی منی کا خورد بینی امتحان جاری ہے۔

علاج ڈاکٹری :- سلفا گروپ یا مینی سلین یا سٹریپٹومین سلین کا استعمال مفید ہے، بورک ایسڈ اوشن سے سپاری کو دھو کر بورک یا زینک یا ایڈمریم لکائیں اور بطر سوزاک علاج کریں، یونانی، آیور ویدک اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج بطر سوزاک کریں۔

غذا و پرہیز بطور سوزاک کریں۔

ویرج کا زیادہ گاڑھا ہونا، غلظت منی

تعریف مرض :- اس مرض میں ویرج معمول سے زیادہ گاڑھا اور جم جاتا ہے۔

وجوہات :- کافی عرصہ تک ملاپ نہ کرنا اور فقیرانہ زندگی بسر کرنا۔

علامات :- ویرج کے نکلنے وقت مریض کو خفیف درد محسوس ہوتا ہے اور انزال کے بعد بھی عضو مخصوص میں درد محسوس ہوتا رہتا ہے۔

علاج :- کڑوی چیزوں کا استعمال کرائیں، کوہن اور گلو کا استعمال کرائیں، گھیکوار کا حلوہ مفید ہے، علاوہ ازیں سنگترہ، مالٹا اور انار کا رس

بھی ویرج کو پتلا کرتا ہے، بطور دوا معجون فلاسفہ جدواری پانچ ماشہ ہمراہ عرق گاؤ زبان پانچ تولہ دیں۔

غذا و پرہیز :- لیس داراغذیہ و ادویہ نہ دیں، اردی، کچالو، دال ماش، بھنڈی توری کا استعمال غیر مفید ہے۔ زود ہضم اور سادہ

اغذیہ کا استعمال کرائیں۔

ویرج کی زیادتی، کثرت منی، (Polyspermia)

تعریف مرض :- انزال کے وقت ویرج قدرتی مقدار سے زیادہ خارج ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کی مقدار دو اڑھائی تولہ تک پہنچ جاتی

وجوہات :- منی کو بڑھانے والی اغذیہ و ادویہ کا زیادہ استعمال، مانس یا مصالحہ جات کا بکثرت استعمال یا عصبی تحریک بڑھ جانا

سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- ویرج پتلا ہو جاتا ہے اور مریض بے حد حساس ہوتا ہے، خون کا غلبہ پایا جاتا ہے اور ویرج میں غده قدامیہ یا ادویہ منی وغیرہ کی رطوبت

مجموعی طور پر بڑھ جاتی ہے۔

علاج :- منی پیدا کرنے و بڑھانے والی اغذیہ و ادویہ بند کر دیں، غذا کم کھائیں اور ملاپ کریں، بطور دوا مندرجہ ذیل تجربات کا استعمال مفید ہے :-

۱۔ شیرہ بیج کا ہوتین ماشہ، شیرہ بیج خرفہ تین ماشہ، عرق گاؤ زبان دس تولہ میں نکال کر شربت نیلوفر چار تولہ ملا کر پلائیں۔

۲۔ پوٹاسیم برومائیڈ دس سے پندرہ گرین ایک کسٹ پانی میں گھول کر پلائیں۔

۳۔ سکنجبین اور انار کا پلنی پلائیں۔

غذا و پرہیز :- ویرج کو بڑھانے والی اغذیہ نہ دیں۔ غذا زود ہضم و سادہ استعمال کرائیں۔

ویرج کا کم ہونا، قلت منی، (Oligospermia)

تعریف مرض :- اس مرض میں ویرج بہت کم نکلتا ہے۔

وجوہات :- زیادہ ملاپ، زیادتی عمر، زیادہ عرصہ تک بیماریوں میں مبتلا رہنا، زیادہ محنت و مشقت، غذا کی کمی، غده قدامیہ اور ادویہ

کے امراض وغیرہ سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- ویرج بہت کم نکلتا ہے اور وہ باریک تاروں میں نکلتا ہے، ملاپ کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔

علاج :- اگر یہ عارضہ بڑھاپے کی وجہ سے ہو تو زردی بیضہ مرغ، دودھ اور ویرج پیدا کرنے والی غذا پر اور ادویہ کا استعمال کرائیں، زیادتی ملاپ سے یہ عارضہ ہو تو کچھ عرصہ پر سہر کر لیں۔

مندرجہ ذیل تجربات اس مرض کے لئے خاص طور پر مفید ہیں :-

حریرہ :- ثعلب مصری تین ماشہ، سنگھاڑے کا آٹا تین ماشہ، بنولے کا آٹا دو ماشہ، ایک پاؤ دودھ گائے میں ملا لیں اور چھلکا الیغول چھ ماشہ مصری دو تولہ اضافہ کر کے آگ پر پکائیں اور کھیر بنا کر استعمال کریں۔

دیگر :- مغز بادام میٹھے (چھلے ہوئے) بیس عدد، مغز فندق بیس عدد، نشاستہ دو تولہ نرم آگ پر دودھ میں پکائیں اور ثعلب مصری دو ماشہ، بہن سفید چار ماشہ، شقائق مصری دو ماشہ اضافہ کر کے باریک پیس کر ملا کر کھیر بنا کر استعمال کریں۔

حلوائے قلت منی :- نشاستہ، نخود کا آٹا، چاول کا آٹا ہر ایک ۲۴ تولہ، زنج خرفہ، مغز بادام میٹھے (چھلے ہوئے)، مغز فندق، مغز پستہ ہر ایک بارہ تولہ، تودری سفید، تودری سرخ ہر ایک تین تولہ، مصری اور خالص گھی ہر ایک ہونڈن ادویہ کے کر بطریق معروف ملوہ بنالیں اور بمقدار پانچ تولہ استعمال کریں۔ غذا پر سہر :- پختہ کیلا، ابلّا ہوا انڈہ اور سنگھاڑا کا استعمال نہایت مفید ہے، زیادہ ترش، زیادہ گرم چیزوں کا استعمال غیر مفید ہے، غذا معوی اور زود ہضم دیں۔

ویرج کا اخراج نہ ہونا، عدم انزال (Aspermia)

تعریف مرض :- اس مرض میں ملاپ کے وقت ویرج نہیں نکلتا اور شہوت فرو ہو جاتی ہے، یا تو منی پیدا ہی نہیں ہوتی یا کسی جتنی مزاحمت کی وجہ سے خارج نہیں ہو سکتی۔

وجوہات :- سوزاک کا زہر، نظام عصبی کا نقص، بڑھاپا، غدہ قدامیہ کی سوجن یا قنات واقفہ، منی کی سوجن، بعض دفعہ غیر انزالی ملاپ کی مشق اور ر خوف، فکر، اندیشہ، مشانہ کی پھتری، مشانہ کے آپریشن وغیرہ سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- ملاپ کی خواہش عام طور پر کم ہو جاتی ہے، مریض کو نہ صرف کمزوری بلکہ مردانہ بائجنہ پن کا بھی عارضہ ہو جاتا ہے۔

علاج :- ویرج کو بڑھانے و کمزوری کو دور کرنے والے نسخے استعمال کریں۔ مندرجہ ذیل تجربات اس مرض کا موثر علاج ہیں :-

جوارش گذر :- گاجر شیریں اور بڑی لے کر گٹھلی دھچھلکا دو کر کریں اور آدھ سیر دودھ و شہد خالص میں جوش دیں، اس کے بعد پختہ کی اوکھل میں کوٹ کر چھلنی سے چھان لیں اور دو سیر شہد خالص ملا کر آگ پر رکھیں، آپرے دھیمی ہو، پانی خشک ہو جانے پر سوئٹھ، مصطکی رومی، دارچینی، جالفل، لونگ،

عفران، اندر جو شیریں، بال چھڑ، جڑ پان ہر ایک ساڑھے دس ماشہ، شقائق ڈیڑھ تولہ، کوٹ چھان کر ملالیں اور بقدر دو تولہ ہمراہ دودھ گائے استعمال کریں۔

حلوائے گذر بیضوی :- تراشہ گذر چار سیر، دودھ گائے چار سیر، زردی بیضہ مرغ، پچاس عدد، تراشہ گذر کو دودھ میں اس قدر پکائیں، کہ وہ بالکل گداڑ ہو کر گویا کی طرح بن جائے، پھر گھی گائے خالص میں اس قدر بھوین کہ دودھ اور گاجر دس کی مائیت جذب ہو جائے، پھر اس میں زردی بیضہ

رغ مذکور مع حسب ذیل اجزاء ملا کر محفوظ رکھیں۔

مغز بادام، مغز پستہ، مغز فندق، مغز چانوزہ ہر ایک پانچ تولہ ڈال کر چھینی حسب ذائقہ ملا کر درق چاندی ایک سو بیس عدد ملا کر اس

دو تین ماشہ کستوری شامل کریں، خوراک تین تولہ استعمال کریں۔

صلوائے گذر :- گذر (گاجر) لال گٹھی سے پاک شدہ کدکشی سے تراشیدہ ایک سیر کو دوسیر دودھ میں جوش دیں، جب کھویا بن جائے تو آدھ سیر گھی خالص میں بھونیں، جب سرخ ہو جائیں تو دوسیر چینی شامل کر کے اتار لیں اور مندرجہ ذیل ادویات کا سفوف داخل کریں۔

ثعلب مصری، بہمن سرخ، بہمن سفید، موسلی سیاہ، دانہ الاچی خورد ہر ایک ایک تولہ، مغز بادام، مغز پستہ، چہار مغز ہر ایک پانچ تولہ، تال لکھانہ دو تولہ،

دیگر :- گاجر سے عمدہ گٹھی سے صاف چھلی ہوئی ایک سیر دودھ گلے یا بھینس پانچ سیر میں خوب پکائیں اور زردی بینہ مرغ تیس عدد ملائیں اور دوسیر گھی خالص میں بھون لیں، پھر تین سیر چینی ڈالیں اور چھپے سے ہلائیں، بعد اکیس خالص چھ ماشہ، عرق کلاب پانچ تولہ میں گھوٹ کر ملائیں اور مغز بادام میٹھے، مغز پستہ، مغز چروخی، مغز پلغوزہ، مغز اخروٹ، مغز نارجیل، مغز بنولہ ہر ایک پانچ تولہ، صاف شدہ کتر کر ڈالیں، آخر توام میں ثعلب مصری تین تولہ، شقائق مصری، جڑ پان، موسلی سفید، موسلی سیاہ، دار چینی، جادتری ہر ایک دو تولہ، الاچی چھوٹی ایک تولہ، کوٹ چھان کر ملائیں اور برتن کو گٹھی سے چھپ لیں اور چکی جمالیں اور ورق چاندی یا ورق سونا بھی لگاویں، خوراک پانچ تولہ استعمال کریں۔

دیگر :- مغز بادام میٹھے (چھلے ہوئے) ایک تولہ، مغز بنج قرطم، مغز بنولہ ہر ایک ۹ ماشہ، بیج خشخاش سفید ساڑھے چار ماشہ، بہمن سفید، تودری سفید، ثعلب مصری ہر ایک سات ماشہ، سونٹھ دو ماشہ، عرق کلاب، دودھ گائے، ہر ایک دس تولہ، مصری چار تولہ، پہلے مغزیات اور خشخاش کا کلاب اور دودھ میں شیر نکالیں، پھر صاف کر کے جوش دیں، جب گاڑھا ہو جائے تو باقی ادویہ ہر ایک کر کے آخر جوش میں ملا کر اتار لیں۔

دیگر نسخہ جات جو مردانہ بانجھ پن میں دیئے گئے ہیں، اس مرض پر ابھی مفید ہے۔ آپور ویدک علاج بطرز یونانی علاج کے کریں۔
غذا و پرہیز :- منی کو خشک کرنے والی اغذیہ و ادویہ سے سخت پرہیز کریں، خالص دودھ، خالص گھی، بھنسن، سیب، انگور بہت مفید ہیں گرم و ترش چیزوں سے پرہیز کریں۔

ویرج کی جگہ خون کا اخراج ہونا، منی الدم، ہیموسپریمیا

(Haemospermia)

تعریف مرض :- اس مرض میں خون آمیز ویرج یا بجائے ویرج کے خالص خون نکلتا ہے۔

وجوہات :- کثرت ملاپ یا جلق کے باعث خستیتیں (انڈکوش) خون کو ویرج نہیں بنا سکتے، جس کی وجہ سے خون خارج ہونے لگتا۔

علامہ ازہر اعناتے منی میں سے کسی رگ کا پٹ جانا یا غده قدامیہ کی سوجن اور بڑھاپا وغیرہ سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- مریض ایک ایک رات میں دو دو یا تین تین بار ملاپ کرتے ہیں، ضروری ہے کہ ملاپ میں وقفہ نہ ہونے سے خون آجاتا ہے۔

اگر غده قدامیہ کی سوجن سے یہ عارضہ ہو تو خون اور منی ملے ہوئے ہوتے ہیں، اگر علاج نہ کیا جائے تو پرہیز بھی ساتھ آنے لگتی ہے۔

علاج :- اگر کثرت ملاپ سے یہ عارضہ ہو تو ملاپ سے پرہیز کریں، اگر انڈکوش کمزوری کی وجہ سے خون کو منی میں تبدیل نہ کر سکیں تو انڈکوش

اور گردوں کو تقویت دیں، اس سلسلہ میں خستیتیں پر روغن مصطکی کی مالش کریں، غذا میں بھیڑ کے خیسے یا زردی بینہ مرغ دیں، اگر کسی رگ کے

پٹ نہ ہونے سے یہ عارضہ ہو تو خون کی پیشاب کے مطابق علاج کریں، اگر مرض کا سبب پیشاب کی نالی کے زخم ہوں تو اس کے مطابق علاج کریں

بڑھاپے سے ہو تو عرق ماغزالہ دیں، اگر کوئی سبب معلوم نہ ہو تو خون روکنے کے لئے مندرجہ ذیل نسخے دیں :-

۱۔ کھرباشمی، طباشیر ہر ایک ایک تولہ، دانہ الاچی خورد، دم الاخوان ہر ایک چھ ماشہ، سب اجزاء کو باریک پیس کر بمقدار تین ماشہ مربہ آملہ میں ملا کر کھلائیں۔

۲۔ شربت حب آلاس یا شربت انجبار دو تولہ ہمراہ عرق بارتنگ دس تولہ دیں۔
روغن مصطکی (جسے انڈکوشوں، کمرادر مشانہ پر مالش کرنے سے انڈکوشوں و گردوں کو طاققت ملتی ہے) :- مصطکی رومی ایک تولہ باریک پیس کر تلوں کے تیل تین تولہ کے ہمراہ نرم آگ پر پکائیں، مصطکی گچھل کر تیل میں مل جائے گی، جب اچھی طرح حل ہو جائے، تو اتار کر کپڑے سے چھان لیں۔

غذا و پرہیز :- زود ہضم و مقوی غذائیں دیں، گرم و ترش چیزوں سے سخت پرہیز کرائیں۔

بوقت انزال پاخانہ کا اخراج، غلیوط

تعریف مرض :- اس مرض میں بوقت انزال بلا ارادہ پاخانہ خارج ہو جاتا ہے۔

وجوہات :- کثرت ملاپ اور پھٹوں کی کمزوری سے گڈا کے اعصاب اور عضلات مست ہو جاتے ہیں اور روح نفسانی تحلیل ہو جاتی ہے۔
علامات :- مریض کا خون پتلا اور اس میں تیزی پائی جاتی ہے، انزال کے بعد نہایت درجہ کی سستی لاحق ہوتی ہے اور غشی طاری ہو جاتی ہے، انزال کے وقت بے اختیار پاخانہ نکل جاتا ہے۔

علاج :- ملاپ ایسی حالت میں کیا جائے، جب معدہ اور انشرباں غذا سے خالی ہوں اور پاخانہ کی حاجت نہ ہو، اگر گڈا پر اس طرح چٹی باندھ لی جائے کہ پیٹ نہ پھیل سکیں تو پاخانہ خارج نہ ہو سکے۔

بطور دوا مندرجہ ذیل نسخہ جات بہت مفید ہیں :-

۱۔ مربہ بہمن سفید یا سرخ یا مربہ شقاقل کا استعمال کریں۔

۲۔ پھول انار، اقاقیہ، گل ارمنی، حب آلاس ہر ایک ساڑھے دس ماشہ، صندل سفید ڈیڑھ ماشہ، گوند کیکر ہر ایک سات ماشہ، سب کو کوٹ کر اور پیس کر سب کے پانی کے ساتھ گولیاں بنائیں اور بقدر پیم ماشہ ہمراہ شربت بہہ تین تولہ کھلائیں۔

۳۔ گل ارمنی، مصطکی رومی، کندر، پھول انار، برابر وزن سفوف بنائیں اور بقدر چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ رب بہہ اور رب انار شیریں ہر ایک ایک تولہ ملا کر کھلائیں اور اسی سفوف کا شیاف بنا کر رکھیں۔

غذا و پرہیز :- دما منز سے بھر پور اغذیہ دیں اور کثرت ملاپ اور زیادہ محنت سے پرہیز کریں۔

فعل خلاف وضع فطری کی عادت، علتہ المشائخ، اثرہ

تعریف مرض :- مریض کو خلاف وضع فطری کے بغیر تسکین نہیں ہوتی۔ یہ ایک بھاری اخلاقی و قانونی جرم ہے۔

وجوہات :- بعض لوگ فطرتاً اس بُری عادت کے عادی ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں میں بچپن ہی سے زنانہ پن پایا جاتا ہے اور دخول شے کی خواہش محسوس ہوتی ہے، چنانچہ جو مریض اس فعل کے عادی ہوتے ہیں یا جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ اس فعل کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کی

اولاد کو یہ مرض وراثتاً پہنچتا ہے اور ان کی معار مستقیم دو چار مرتبہ کی بُری حرکت اور منی سے واقف ہو کر ایک قسم کی بھوک محسوس کرتی ہے، لہذا ایسے لوگ بار بار حرکت کا ارتکاب کرتے ہیں، طبی نقطہ نظر سے ان کی معار مستقیم میں بلغم شور پیدا ہو جاتا ہے، جس سے گدائیں سخت خارش ہوتی ہے اور مریض کا جی یہ چاہتا ہے کہ کوئی سیال چیز اندر داخل ہو تاکہ سوزش اور جلن کو تسکین مل سکے۔

مشروع شروع یہ معار مستقیم کے مناسبات طاقت ور ہوتے ہیں، اس دیرج کو بخور کر باہر نکال دیتے ہیں۔ لیکن بار بار اس گندی حرکت سے گدائے کے پٹے کمزور ہو جاتے ہیں، جس سے وہ مکمل طور پر دیرج نہیں پھینک سکتے، جس کے نتیجے میں دیرج کا کچھ حصہ معار مستقیم کے اندر سٹرا اند پیدا کر دیتا ہے اور بعد میں یہی دیرج منی کے کیڑوں کی صورت اختیار کر کے معدہ میں ایک قسم کی خلش پیدا کر دیتے ہیں۔ جس سے مریض بار بار اس گندے فعل کو کرتا ہے، یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ کچی عمر سے ہی چوری چھپے اس فعل کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کی جنرل صحت بہت کمزور ہو جاتی ہے اور وہ قدرتی ملاپ سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے اور وہ اس کے لئے اپنی پہلی عادت پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

علامات :- مریض کو اس گندے فعل کے بغیر چین نہیں آتا۔

علاج :- نمک کے گھول سے حقنہ کریں، قبض نہ ہونے دیں، غذا سادہ دیں، گوشت و شراب سے سخت پرہیز کیا جائے، اگر مریض بچپن سے اس گندی عادت میں مبتلا ہے یا اس کا مزاج نسوانی ہے، تو اسے سخت تنبیہ کریں، لیکن عام طور پر ایسے مریض سخت بے مشرم ہوتے ہیں، ایسی حالت میں انہیں اس فعل بد کی اخلاقی و قانونی سزا کا خوف دلائیں اور اس طرح اس کو اس فعل سے باز رکھنے کی کوشش کریں، سینما، تھیٹر نہ جانے دیں، نیک آدمیوں کی صحبت و نگرانی میں رکھنا بہت ہی مفید ہے، صبح و شام مندر، گوردوارہ یا مریض کے مذہب کے مطابق اسے مالک و جہان کی عبادت کی طرف لگائیں۔

اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو ادویہ قاتل کرم دیں، گدائی خارش کو تسکین دینے کے لئے روغن بنفشہ اور لعابات کا حقنہ کریں۔
 جدوار اصلی کو پرانے سرکہ میں گھس کر روئی تر کر کے گدائیں رکھیں یا بیلا ڈونا سپوزیٹری کا استعمال کریں، شہوت کو کم کرنے کے لئے پھول گلاب ڈیڑھ تولہ، الیسیبول تین تولہ، زنج کا ہوا، زنج کا سنی، زنج خرفہ ہر ایک ساڑھے دس ماشہ، دھنیاں چار ماشہ، سفوف کر کے ۹ ماشہ کی مقدار میں صبح و شام ہمراہ تازہ پانی استعمال کریں۔
 غذا و پرہیز :- نیز مصالحہ دار و گرم و ترش غذاؤں سے پرہیز کریں اور مریض کو اپنے آپ پر قابو رکھنے کی ہدایت کریں۔

ادھک اُمنگ، کثرتِ شہوت

تعریف مرض :- اس مرض میں مریض کو ملاپ کی اتنی زیادہ اُمنگ ہوتی ہے کہ وہ بغیر ملاپ صبر نہیں کر سکتا اور ہر وقت اپنے جوہر زندگی کو ضائع کرنے پر اس کا دل چاہتا ہے۔

دبجومات :- خون و دیرج کی زیادتی، عصبی نظام کی کمزوری، اعضائے تناسل کے زخم یا خارش وغیرہ اس کی وجوہات ہیں۔
 علامات :- اگر دیرج میں تیزی ہے تو اخراج کے وقت سوزش محسوس ہوگی، پیشاب بھی جل کر آئے گا، سپن دوش، نظر کی کمزوری، سرعت کے علاوہ پیشاب میں زخموں کے چپکوں کے ساتھ پیپ خارج ہوگی۔
 علاج :- سادہ غذاؤں کا استعمال کریں، برت یا روزه رکھوائیں، روزانہ غسل مفید ہے۔
 مندرجہ ذیل مجربات، اس مرض کا مؤثر علاج ہیں :-

۱۔ سکنجین سادہ تین تولہ ہمراہ شیرہ خرفہ پندرہ تولہ دیں۔

۲۔ نیلوفر کے پتے یا بید کے پتے بستر پر بچھائیں۔

۳۔ ترش لسی کا استعمال کرائیں۔

۴۔ سفوف اسرول (چھوٹی چندن) بوٹی دو رتی کیب شولہ میں ہمراہ دودھ نیم گرم استعمال کرائیں۔

۵۔ کشتہ قلعی دورتی، جوارش مصطکی چھ ماشہ ملا کر کھلائیں اور اوپر سے عرق گاؤز بان پانچ تولہ شربت انار شیریں دو تولہ ملا کر پلائیں۔

۶۔ پوٹاسیم برومائیڈ کا مناسب مقدار میں استعمال کرائیں۔

غذا و پرہیز: گرم و مقوی اغذیہ سے سخت پرہیز کرائیں، غذا سادہ و زود ہضم استعمال کریں۔

وَرَمِ غَدَہِ مَذی، وَرَمِ غَدَہِ قَدَامِیہ، پَرِاسَے طَائِی لُس (Prostatitis)

تعریف مرض:۔ اس مرض میں مَذی کے غدود سوج جاتے ہیں۔

وجوہات:۔ امراض متعد، آلہ تاتاطیر کا غلط استعمال، پیشاب کی نالی کے پُرانے زخم، مثانہ کی پھتری وغیرہ سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات:۔ مرض کی جگہ اور مثانہ، گدرا (مقعد) اور سیون میں بوجہ معلوم ہوتا ہے اور یہ مقامات درد کرتے ہیں، جلن ہوتی ہے، پیشاب بار بار آتا ہے جس کے ساتھ درد ہوتا ہے۔ پاخانہ کرتے وقت بھی درد ہوتا ہے، جب سوزش زیادہ ہو جائے تو پیشاب کے ساتھ رطوبت آنے لگتی ہے، اگر گدرا کے اندر انگلی ڈال کر مثانہ کا جھتی معائنہ کیا جائے تو غدہ قدامیہ صاف بڑھا ہوا دکھائی دیتا ہے اور درد کرتا ہے۔

اس مرض کو مثانہ کی پھتری، کمزوری مثانہ وغیرہ سے تشخیص کرنا ضروری ہے۔

علاج:۔ ڈاکٹری طریقہ علاج میں اگر یہ عارضہ بہت پُرانا ہو تو بذریعہ آپریشن اس غدہ کو نکال دیا جائے۔ یونانی طریقہ علاج میں مرعین کو آرام سے بستر پر لٹائیں، مثانہ کے مقام پر ٹکور کریں، شدت درد کے لئے افیون وغیرہ کے مرکبات دیں۔ مندرجہ ذیل مرکبات اس مرض میں خاص طور پر مفید ہیں:۔

۱۔ بنفشہ، گاؤز بان، خطمی، عنب الثعلب، بی دانہ ہر ایک پانچ ماشہ، عنب سات دانہ، سب کا خیا، اندہ بنا کر شربت بنزوری معتدل دو تولہ ملا کر پلائیں۔

۲۔ اگر ورم شدید ہو تو یہ نسخہ دیں:۔

پوٹاسیم سائیٹریٹ ۵ گریں، ٹینکچر ہائیوسائیس ۲۰ منم، سپرٹ کلوروفارم ۵ منم، ایکوا ایک اونس، ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین بار دیں یا اس نسخہ کا استعمال کریں:۔

پوٹاسیم آیوڈائیڈ ۵ گریں، ٹینکچر ہائیوسائیس ۲۰ بوند، ٹینکچر سیلاڈونا ۵ بوند، سپرٹ کلوروفارم ۵ بوند، ایکوا تاکا ایک اونس، ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین بار دیں۔

آیور ویدک علاج بطور یونانی علاج کے کریں۔

ہومیو پیتھک علاج:۔ ایکونائٹ، مرکبوس، سیلاڈونا، پلاٹا، سلفر اور آیوڈیم مفید ہیں۔

غذا و پرہیز:۔ گرم و ترش، اغذیہ سے پرہیز کریں، غذا مقوی اور زود ہضم دیں، دودھ، آشس جو، کچھڑی اور مونگ کی دال کا پانی مفید ہے۔

علاج کے دوران بستر پر آرام سے لیٹے رہیں تاکہ مرض کو جلد آرام آ سکے۔

پراسٹیٹ گلینڈ کی بڑھوتری، غدہ ندی کا بڑھ جانا، غلظت غدہ قدامیہ

تعریف مرض :- اس مرض میں غدہ قدامیہ معمول سے بڑھ جاتا ہے۔
 وجوہات :- غدہ قدامیہ کی بڑھوتری اکثر شدید ورم غدہ قدامیہ کا نتیجہ ہوتی ہے۔
 علامات :- سیون کے مقام پر بیمار معلوم ہوتا ہے، پیشاب میں رسوب سوت کے رشیوں کی طرح نکلتے ہیں۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، کبھی پیشاب رک کر اور کبھی تکلیف سے آتا ہے، جب یہ مرض پرانا ہو جاتا ہے تو ہر وقت اس کی تکلیف معلوم ہوتی ہے، کبھی ورم میں پیپ بڑھ جاتی ہے۔
 علاج ڈاکٹری :- اگر مریض کا پیشاب بند ہو جائے تو کیفی ٹری یا قاتاطیر سے فی الفور نکال دیں اور جس قدر جلد ہو سکے، غدہ قدامیہ کو بذریعہ آپریشن نکال دیا جائے، (یہ عمل ایک مستند سرجن ہی کر سکتا ہے) کیونکہ پرانی صورت میں آپریشن کے وقت اس قدر خون نکلتا ہے کہ مریض کے تلف ہو جانے کا کاؤر ہوتا ہے، طب جدید کے نظریہ کے مطابق چونکہ یہ مرض ادویات سے دور نہیں ہوتا، اس لئے جس قدر جلدی بذریعہ آپریشن علاج کیا جائے بہتر ہے۔

یونانی علاج :- درد و تکلیف کی حالت میں گل ٹیسو جوش دے کر سیون اور مشانہ کے مقام پر ٹکڑ کر دیں اور بطور دوا گل بنفشہ، سولفہر ایک چھ ماشہ، سویز منقی ۱ دانہ، جڑ کاسنی، مکہ خشک، بیج قرطم، بیج خطمی ہر ایک چھ ماشہ جوش دے کر صاف کر کے شربت بزوری چار تولہ ملا کر پلائیں، مریض کو چاہیے کہ وہ کامل آرام و سکون میں رہے اور ملاپ سے قطعاً پرہیز رکھے۔
 آپروریدک و ہومیوپیتھک طریقہ علاج بطور یونانی طریقہ علاج کے کریں۔
 غذا و پرہیز :- گو بھی، دہی، چھاچھ جیسی دیرینہم اغذیہ سے سخت پرہیز کریں، غذائیں دیرینہم اور مقوی دیں۔

اندکوشوں کی سوجن، خُصیوں کا ورم، آرکائٹس (Orchitis)

تعریف مرض :- خُصیوں یا ان کے خاص حصوں میں سوجن یا ورم ہو جاتا ہے۔
 وجوہات :- میلاکچیلار ہنا، مقام مرض پر اخلاط اربعہ یا ریح کا غلبہ سردی یا چوٹ لگنا، آتشک و سوزاک، پھتری مشانہ، جوڑوں کا درد، تقریباً بعض شدید متعدی بخار، پیشاب کی نالی کا زخم، کیفی ٹری کا استعمال وغیرہ۔

علامات :- خُصیہ بڑا اور سخت ہوتا ہے، اس میں درد ہوتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، متلی اور آبکالی اکثر لیکن قے بہت کم ہوتی ہے، کبھی زخم ہو کر فوطوں کی جلد مردار ہو کر فوطے پر منہ ہو جاتے ہیں۔

علاج ڈاکٹری :- مریض کو آرام سے لٹائیں، رانوں کے درمیان ایک تکیہ رکھ کر خُصیوں کو اونچا رکھیں، ۴ گھنٹہ میں تین یا چار بار بورک پوڈر کے نیم گرم گھول سے ٹکور کریں اور ٹکور کر کے ہر بار گلیسرین آف بلیاڈ و نالگائیں، ورم کے رفع ہونے پر اگر سختی باقی ہو تو ٹنکچر آیوڈین یا آیوڈکس لگائیں اگر آتشک و سوزاک کے باعث ہو تو اس کے مطابق علاج کریں، شدت درد کے لئے سارڈین یا نوڈلجین یا پریکسیون ایک کیپ شولز دیں۔

یونانی علاج :- سبب کا تدارک کریں، قبض ہو تو اسے دور کریں، زیادہ درد ہو تو گل ٹیسو، پورست خشخاش ہر ایک دو تولہ پانی میں جوش دے کر ٹکور کریں اور اس کے پھوک یا بھنگ کے پتوں کو پیس کر گرم کر کے اس پر انڈکاپتہ رکھ کر باندھیں، خوراک کی طور پر عرق مصفی خون و شربت

عذاب پلائیں اور بیرونی طور پر مقام ورم پر گُل بابونہ، اکیلل الملک، بیج خلی، جیدوار شیریں ہر ایک چھ ماشہ ہری مکو کے پانی میں پیس کر اور ردغن گُل ایک تولہ اضافہ کر کے نیم گرم لیپ کریں۔

آیور ویدک علاج :- ۱۔ کر بوجہ کے بیج، تل کالے، کالی زیری، مصبر، ہدی برابر پیس کر نیم گرم لیپ کریں اور اُد پر سے ارند کے پتے باندھیں۔
۲۔ ٹیسو کے پھول پانی میں جوش دے کر یا بھنگ کے پتے کوٹ کر اور گرم کر کے باندھیں پینے کے لئے رکت شدہ (خون صاف کرنے والی) اوشدھیوں (ادویات) کا استعمال کریں۔

ہومیوپیتھک علاج :- ڈاکٹر ٹیڈم لکھتے ہیں کہ متورم خصیہ پر صابن کا پستری لگانا نہایت مفید ہے، یہ عام طور پر اس موقع پر زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے جبکہ مرض شدید اور سوجن پوری ترقی پر ہو، اس کی ترکیب یہ ہے کہ ایک انچ چوڑے کئی ٹکڑے کپڑے کے جن کی لمبائی اتنی کافی ہو کہ فوطے پر بخوبی آجائیں ان پر صابن (سن لائٹ وغیرہ مفید ہے) پگھلا کر پھیلاتے ہیں۔ یہ پستری کے ٹکڑے ایسی ترکیب سے فوطے کے اوپر لگائے جاتے ہیں کہ تمام فوطہ ان سے ڈھک جاتا ہے اور یہ پستری کئی دن تک لگا رہنا چاہیئے، حتیٰ کہ ورم کم ہو جائے۔
مندرجہ ذیل ادویات اس مرض کا موثر علاج ہیں :-

ایکونائٹ، پلسٹا، بیلارڈونا بہترین ادویات ہیں، حسب موقع استعمال کی جائیں، جب عصبی دردوں کا زور ہو اور خصیہ کی نسبت منی کی دوری میں زیادہ درد ہوتا ہو تو ایسی حالت میں آرنیکا گھول (آرنیکا مدرنکچر ایک ڈرام صاف پانی پانچ تولہ میں ملا لیں) میں کپڑا بھگو کر اور پر رکھیں یا اسی کی پلٹس درد والی جگہ پر باندھنی چاہیئے۔

غذا و پرہیز :- زود بھنم و سرد غذائیں، مونگ کی کھچڑی، چپاتی، دودھ، آتش جو، ساگ دیں، گرم، ثقیل اور مصالحو دار چیزوں سے سخت پرہیز کریں،

اندکوشون کا درد، خصیوں کا درد، نیوریلجیا آف دی ٹیسٹیکلز

(Nevralgia of the Testicles)

تعریف مرض :- یہ خصیوں کا عصبی درد ہے، اس کے ساتھ ورم یا سوجن نہیں ہوتی بلکہ درد ٹھہر ٹھہر کرتا ہے۔

وجوہات :- ملاپ کی زیادتی، نامکمل تناؤ، سرعت، سوزاک کا زہر، اعضائے تناسل کے امراض، جوڑوں کا درد، ورم خصیہ، ملاپ کی زبردستی، انگ پونے پر ملاپ نہ کرنا، برہمچریہ، زیادہ گرمی، زیادہ سردی اور ریاح کی وجہ سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- ایک یا دونوں خصیوں میں رک رک کر درد ہوتا ہے اور درد کے وقت خصیہ اوپر چڑھ جاتا ہے، خصیہ کو ہاتھ لگانے یا کپڑا لگنے سے سخت درد ہوتا ہے۔ مرض کی زیادتی کی صورت میں مریض بے تاب ہو جاتا ہے، بعض دفعہ بخار بھی ہو جاتا ہے۔

علاج ڈاکٹری :- بطور ورم خصیہ (آرکائیٹس) کریں، مسکنات درد دے پی، سی پوڈریا، سارڈین یا کوڈوپارین یا نوولجین وغیرہ ایک ٹکچ کھلانے سے آرام آ جاتا ہے۔ اگر سوزاک کی وجہ سے ہو تو پنی سلین یا پروکین پنی سلین کے عضلاتی انجکشن دیں، سلفا ڈایازین یا سپٹران کا استعمال بھی مفید ہے، لڑائشک کی وجہ سے ہو تو اس کے مطابق علاج کریں۔

یونانی علاج :- اگر درد بہت زیادہ ہو تو معجون برشعشا کا استعمال کریں، بیرونی طور پر مکوہ سبز کا بھرتہ ردغن گُل شامل کر کے خصیوں پر باندھیں، و آب مکوہ سبز روق میں شربت بزوری ملا کر پلائیں۔

آیور ویدک علاج :- تیل سرسوں پر ۲ تولہ ہدی باریک شدہ ۶ ماشہ، افیون ایک ماشہ بخوبی حل کر کے بیرونی طور پر لیپ کریں اور بطرز

”انڈکوشوں کی سوچن“ کے علاج کریں۔

ہومیو پیتھک علاج :- قبض ہو تو حقنہ سے دور کریں، برف یا سرد پانی میں کپڑا بھگو کر مقامِ ماؤن مقام پر رکھیں، بطور دوا آرم میٹلیکیم ہامیلر کو نیم بہترین ادویات ہیں۔ انہیں مریض کے حالات کے مطابق استعمال کیا جاسکتا ہے۔

انڈکوشوں (فوطوں) کی خارش، پرورائیکوسکروٹائی، (Prurigoscroti)

تعریف مرض :- اس مرض میں فوطوں میں اس قدر شدید خارش ہوتی ہے کہ مریض بے چین ہو جاتا ہے۔

وجوہات :- میل کچل لگنے یا گرم و تیز مصالحہ دار غذاؤں کا استعمال، یو ایس، قبض اور فوطوں پر بالوں کی جوڑوں سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔

علامات :- فوطوں میں اس قدر شدید خارش ہوتی ہے کہ مریض کھجاکھجا کر انہیں زخمی کر دیتا ہے۔

علاج ڈاکٹری :- اصل سبب مرض کو دور کریں، قبض یا یو ایس ہو تو اس کے مطابق علاج کریں، گرم مصالحہ دار غذیہ سے پرہیز کریں، تمام علاج بطور

گدا (مقتد) کی خارش کے کریں، زنک یا بورک اسٹینٹ لگائیں، اگر زیادہ تکلیف ہو تو ویزلین ایک ادس میں کار بالک ۲۰ قطرے ڈال کر لگائیں یا کافور ایک حبہ

بورک ایسڈ ۲ حبہ، سٹارچ ولایتی ۴ حبہ، زنک اوکسائیڈ ۲ حبہ، سب کو ملا کر ہتھوڑا محوڑا چھڑکیں۔

یونانی علاج :- کمیلہ یا گندھک تیل سرسوں میں ملا کر لگائیں اور مصفی خون ادویہ دیں۔

ہومیو پیتھک علاج :- گرلیفائیٹس اس مرض کا عمدہ علاج ہے، مناسب مقدار میں استعمال کر کے فائدہ اٹھادیں۔

غذا پرہیز :- سرد و مسکن غذائیں استعمال کریں، گرم اغذیہ سے پرہیز کرائیں۔

انڈکوشوں کی بڑھوتری، عظم خستیں

تعریف مرض :- اس مرض میں خستے بڑے ہو جاتے ہیں۔

وجوہات :- خستوں میں خون زیادہ مقدار میں آنے لگتا ہے جس سے اُن کا سائز بتدریج بڑھتا رہتا ہے۔

علامات :- یہ مرض اچانک شروع ہوتا ہے، خستوں میں کوئی ورم یا درد وغیرہ نہیں ہوتا۔

علاج :- شروع مرض میں سرد اور محذر ادویہ کا بیرونی استعمال کریں، گل ارینی و سفیدہ کالیپ کریں، افیون کو دھنیاں کے پانی میں پیس کر لگائیں، یہ

سب ادویہ شروع مرض میں فائدہ دیتی ہیں، جب یہ مرض پختہ ہو جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔

غذا پرہیز :- گرم و ترش چیزوں سے پرہیز کرائیں، غذا زود ہضم دیں۔

انڈکوشوں (فوطوں) کی رگوں کا پھولنا، ویریکو سیل، (Varicocele)

تعریف مرض :- اس مرض میں انڈکوشوں کی وریدیں پھول جاتی ہیں اور سخت ہو جاتی ہیں۔

وجوہات :- کثرتِ ملاپ، قبض، امراضِ جگر وغیرہ کے باعث گندہ مواد فوطوں کی رگوں میں داخل ہو کر ان کو موٹا کر دیتے ہیں، بعض دفعہ

قبض، بوجھ اٹھانے، چوٹ لگنے سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- ماؤف طرف کے اندکوشوں کے اوپر ایک گول صورت کا ابھار کھجور کے خوشہ کی طرح معلوم ہوتا ہے، جو اوپر سے تنگ اور نیچے سے کھلا اور گرہ دار محسوس ہوتا ہے، زور سے کھانسنے، سانس لینے، کھڑا ہونے یا بولنے سے درم زیادہ ہو جاتا ہے، مقام ماؤف پر درد ہوتا ہے، جس کی ٹیس رانوں اور جڈوں تک جاتی ہیں، یہ مرض عام طور پر بائیں اندکوش میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بائیں خضیہ کمزور ہوتا ہے، مریض چل پھر نہیں سکتا۔
علاج ڈاکٹری :- قبض نہ ہونے دیں، سنسپٹری بنیڈج لگائیں، ذرا ڈھیلا لنگوٹ باندھیں، مقامی طور پر سرد پانی کا استعمال کریں، ملاپ سے سخت پرہیز کیا جائے، جب مرض بڑھ جائے تو اس مرض کا آپریشن ہی موثر علاج ہے۔

یونانی علاج :- ارندھی کے بچوں کو دودھ گائے میں پکا کر مقام مرض پر لپیپ کریں، سرد و خشک غذائیں نہ دیں۔ اگر ضرورت ہو تو منہج دہل سے دوا پلا کر مرض کا تنقیہ کریں۔

اندکوشوں (فوطوں) میں پانی اترنا، ہائیڈروسل (Hydro Cele)

تعریف مرض :- اس مرض میں اندکوشوں کی تھیلی میں پانی اتر آتا ہے۔ ہر ایک اندکوش پر تین جھلیاں بطور غلاف چڑھی ہوتی ہیں، ان میں سے بیرونی جھلی کو طبقہ غذیہ کہتے ہیں، اس جھلی کے دوپرت ہیں، ان میں سے ایک پرت خضیہ کی بیرونی سطح کو ملفوف کرتا ہے اور دوسرا پرت فوطہ کی اندرونی طرف رہتا ہے، ان دونوں پرتوں کے درمیان ایک رطوبت ہوتی ہے، جس سے خضیہ تر رہتا ہے، اگر کسی وجہ سے یہ رطوبت بہت زیادہ ہو جائے، تو ہائیڈروسل کا مرض ہو جاتا ہے۔

وجوہات :- فوطوں کی عروق جاذبہ بند ہو جاتی ہیں۔ جس سے جلد اور اس کے نیچے کی بناوٹ خراب ہو جاتی ہے اور خضیہ اپنا قدرتی فعل انجام نہیں دے سکتے اور ایک قسم کی رطوبت مانع پیدا ہو کر خضیہ کی تھیلی میں تراوش پانے لگتی ہے۔

علامات :- فوطے رفتہ رفتہ بڑھتے جاتے ہیں اور ان میں گرانی معلوم ہوتی ہے، ان کا بڑھاؤ شروع میں نرم لیکن آخر میں سخت ہو جاتا ہے۔ جس کی شکل اندھے کی طرح یا گول ہوتی ہے، دبائے سے وہ دل دلا سا معلوم ہوتا ہے لیکن اس میں درد نہیں ہوتا، اس مرض کی خاص علامت یہ ہے کہ اگر فوطوں کے ایک طرف طارح سے روشنی کریں تو دوسری طرف روشنی محسوس ہوتی ہے۔

علاج ڈاکٹری :- اوپر کے حصہ میں شگاف دے کر غلاف خضیہ کا کچھ حصہ قطع کر کے نکال دیں اور اسے الٹا دینا شافی علاج ہوتا ہے لیکن قسم کا علاج ایک لائق سرجن ہی کر سکتا ہے، مرض کی معمولی حالت میں دن و رات لنگوٹ بندھوائیں، سیلاڈونا گلیسرین تین مرتبہ فوطوں پر لپیپ کریں یا نیچر آئیوڈین لگائیں۔

یونانی علاج :- جذب رطوبت کے لئے معجون کندرسات ماشہ یا معجون فلاسفہ خبث الحدیدہ چھ ماشہ یا اطر فیل صغیر ایک ٹولہ روزانہ سچ اور شام کھلائیں، پانی کم پیئیں۔

مندرجہ ذیل مجربات اس مرض کا موثر علاج ہیں :-

۱۔ کشتہ فولاد آدھی رتی، کشتہ پوست بھینہ مرغ ایک رتی، معجون فلاسفہ سات ماشہ میں ملا کر کھلائیں۔

۲۔ دو بڑے خنظل لے کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں اور تیلوں کے تیل آدھ سیر، کنوئیں کے پانی ایک سیر میں ملا کر سب کو جوش دیں، جب پانی جل کر تیل رہ جائے تو اس کو صاف کر کے مقام ماؤف پر لگاتے رہیں۔

۳۔ موم زرد ڈیڑھ تولہ، زفت، اشق ہر ایک ساڑھے تین ماشہ، پھسکڑی سفید اڑھائی ماشہ، پہلے اشق کو قدرے گرم پانی میں حل کریں، بعدہ موم اور زفت کو تیل زمیون تین تولہ میں پگھلائیں اور پھسکڑی باریک پیس کر باہم ملا لیں اور کھل میں آپس میں ملا کر مرہم بنالیں اور فوطوں پر لگاتے رہیں، مجرب ہے۔

۴۔ بلدی باریک پیس کر بقدر چھ ماشہ صبح و شام پانی سے کھلاتے رہیں، مفید ہے۔
۵۔ نوشادر ایک ڈرام، شراب ایک اونس، پانی آٹھ اونس آپس میں ملا کر مقام ماؤن پر بار بار لگائیں۔
ہومیوپیتھک علاج :- آیوڈم، پلیٹلا، گریفائیٹس، برائی اونیا بہترین ادویات ہیں غذا و پرہیز :- پانی کا کم سے کم استعمال کریں، سبزیاں بھی خشک استعمال کریں۔

انڈکوش (فوطے) کی تھیلی میں رکت (خون) بھرنا، میٹے ٹوسل،

(Haematocele)

اکثر یہ عارضہ فوطوں پر چوٹ لگنے سے ہوتا ہے، ایسی حالت میں مریض کو لٹائے رکھیں، فوطوں کو لٹکنے نہ دیں، بلکہ ان کو سہارا دے کر اونچا رکھیں۔

نوشادر دس گرین، الکومل نوے فیصدی ایک ڈرام، پانی ایک اونس ملا کر مقام ماؤن پر لگاتے رہیں، اگر خون زیادہ مقدار میں جمع ہو گیا ہو تو بڈر ٹروکارکینولا (نالی دار پولی سلائی) سے نکال دینا کافی ہو سکتا ہے، لیکن اگر خون کا اخراج زیادہ ہو کر کچھ دن گزر گئے ہوں، جس کی وجہ سے خفیہ کا پردہ موٹا ہو گیا ہو، بلکہ خون کی تہیں پیدا ہو گئی ہوں، تو ایسی صورت میں ایک قابل سرجن شکاف دے کر جما ہوا خون نکال سکتا ہے۔

شش مند (سپاری) کی سوجن، ورم حشفہ، بیلانائٹس، (Balanitis)

تعریف مرض :- اس مرض میں سپاری پر سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔
وجوہات :- یہ بیماری عام طور پر غلاظت یا مرض سوزاک کے سبب ہو جایا کرتی ہے۔
علامات :- حشفہ یعنی سپاری میں سوزش، ورم اور درد ہوا کرتا ہے۔
علاج :- مقام ماؤن کو گرم پانی سے خوب صاف کریں، پھر بورک زینک آئنٹمنٹ لگائیں، اگر سوزاک سے یہ عارضہ ہو تو اس کے مطابق علاج کریں۔

یونانی علاج :- لعاب بی دانہ تین ماشہ، شیرہ عناب پانچ دانہ، عرق شاہترہ چار تولہ، عرق گاؤ زبان آٹھ تولہ میں نکال کر شربت نیلو مزدو تو ملا کر پلائیں۔

برہونی جدوار خطائی، یخ خطمی، رسونت ہر ایک تین ماشہ، بدستور لگائیں۔
غذا و پرہیز :- غذا معوی و زود ہضم استعمال کریں، گرم چیزوں سے پرہیز کریں۔ مونگ یا سالم مونگ کی دال، چپاتی، دودھ، ہری توری کدو، پیٹھا دیں، کرلیا، بھنڈی، آلو، اروی کا استعمال منع ہے۔

شش مند (سپاری) کی پھنسیاں، ہرپیز آف دی گلیٹنس

(Harpes of the Gland)

تعریف مرض :- اس مرض میں شش مند (حشفہ) پر پھنسیاں پیدا ہو کر باعث سوزش ہوا کرتی ہیں۔
وجوہات :- یہ بیماری عام طور پر غلاظت یا مرض سوزاک کے سبب سوزش ہو جانے کے بعد ہو جایا کرتی ہے۔ گندی جگہ پر پیشاب کرنے سے
یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- سپاری (حشفہ) میں سوزش، ورم اور درد ہوا کرتا ہے اور حشفہ کی جھلی پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں پیدا ہوا کرتی ہیں۔
علاج :- مقام مرض پر پہلے برگ مکو سبز چار پانچ تولہ کو پانی میں پکا کر نطول کریں، اس کے بعد مقام ماؤف کو خشک کر کے زنک آکسائیڈ
رم سفیدہ لگائیں، سوزاک یا آتشک کے سبب سے ہو تو اس کے مطابق علاج کریں۔
۱۔ مردارنگ ہلدی، پھول انار، زراوند، کیسہ ہر ایک ایک حصہ، مازو آدھا حصہ، سب کو پیس کر دیز لین سفید پانچ حصہ میں ملا کر کام
میں لائیں۔

۲۔ رسوت، گل ارمنی، ہر ایک چھ ماشہ، کافور ایک ماشہ، سبز مکوہ کے پانی میں پیس کر لگائیں۔
۳۔ مردارنگ، گل ارمنی، مازو، رسوت برابر وزن لے کر دھنیاں سبز کے پانی اور عرق گلاب میں پیس کر طلا کرنا مفید ہے۔
۴۔ پیسے کے لئے لعاب بی دانہ تین ماشہ، شیرہ عنب پانچ دانہ، عرق شاہترہ چار تولہ، عرق گاؤ زبان آٹھ تولہ میں نکال کر مشرب عنب
تولہ ملا کر پلانا مفید ہے۔

غذا و پرہیز :- زود مضام و سرد غذا میں، مونگ کی کھجڑی، چپاتی، دودھ، آتش جو، ساگ دیں۔ گرم، ثقیل اور مصالحہ دار اشیاء سے
پرہیز کریں۔

کار آمد اوزان (جو کتب ہذا کے فارمولوں میں دیئے گئے ہیں)

ڈاکٹری و طبی اوزان کا مقابلہ


ایک ادس برابر ہے تقریباً ۲ تولہ ۶ ماشہ، آٹھ ادس برابر ہے تقریباً ۴ چھانک۔
ایک گرین برابر ہے ۱ رتی۔ ایک سکروپول تقریباً ایک ماشہ ۱/۴ رتی۔
ایک پونڈ برابر ہے ۱۶ سیر تقریباً۔ ایک ہنڈ روٹ برابر ہے تقریباً ۵۴ سیر۔
ایک ٹن برابر ہے ۱۶ من۔ من برابر ہے تقریباً ۸۰ رطل۔
رطل برابر ہے ۴۰ تولہ۔ پونڈ برابر ہے تقریباً ۴۰ تولہ۔
ادس برابر ہے ۱/۴ تولہ۔ سیر برابر ہے ۸۰ تولہ۔
۸ چاول برابر ہے ایک رتی۔ ۸ رتی برابر ہے ایک ماشہ۔
۱۲ ماشہ برابر ہے ایک تولہ۔ ۵ تولہ برابر ہے ایک چھانک۔

عشری پیمانے (تول و ناپ)

ایک گرام = ایک ماشہ سے کچھ اوپر (۱۱ ۳/۴ گرام = ایک تولہ)۔
ایک کلو گرام = ایک سیر ۶ تولہ (۱۰۰۰ گرام = ۸۶ تولہ)۔
ایک گرام = ایک ماشہ سے کچھ اوپر وزن ہوتا ہے۔

انگریزی اوزان کی ویسی مطابقت

ایک گرام برابر ہے ایک ماشہ تقریباً۔ ایک ڈرام برابر ہے تقریباً ۴ ماشہ۔
ایک گرین برابر ہے ۱/۴ رتی تقریباً۔ ایک ادس برابر ہے ۱/۴ چھانک تقریباً۔
ایک پونڈ برابر ہے ۱۶ سیر تقریباً۔ دو پونڈ برابر ہے ایک سیر تقریباً۔



چودھواں باب

زنانہ امراض

جب لڑکی جوان ہونے لگتی ہے

جب ایک لڑکی ایک دو تیرہ بننے کی تیاری کرنے لگتی ہے اور شباب میں قدم رکھنے لگتی ہے تو اس وقت قدرت اس کو جوانی کی عمر کی علامت عطا کرنے میں ذرا بھی کسر نہیں رکھتی، یہ عمر لڑکی کے لئے نہایت اہمیت کی ہوتی ہے۔ کسی لڑکی کو جوانی کب شروع ہوتی ہے؟ اس کے لئے مقررہ وقت نہیں مگر یہ چھوٹی عمر میں گیارہویں اور سولہویں سال کے درمیان گنتی جاتی ہے، آرام و آسائش کے ماحول میں پرورش پانے والی لڑکیاں عزیز گھروں کی لڑکیوں کی نسبت جلدی جوان ہو جاتی ہیں، ہندوستان جیسے گرم ملک میں لڑکیاں گیارہ سال کی عمر میں ہی جوان لگتی ہیں، لیکن ٹھنڈے دیش کی لڑکیاں سولہ سال کی عمر میں جوان ہوتی ہیں، اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی کا جوان ہونا مقامی رہن سہن، جل و آلو (آب و ہوا) اور کاروبار، جسمانی حالت، آرام و سخت محنت و غیرہ کئی باتوں پر منحصر ہے۔

بیرونی علامات :- جب لڑکی جوان ہونے لگتی ہے تو اس وقت یہ صاف دیکھا جاسکتا ہے کہ وہ لڑکی تیزی سے بڑھنے لگی ہے، اس کے بغا خاص جگہوں میں بال اُگنے لگتے ہیں، اُس وقت اس کی چال میں فرق آجاتا ہے۔ اپنے دوپٹے کو پہلے کی طرح ادھر ادھر نہ ہونے دینے کی اُس کی عادت ہے اور اُنھے بالوں والی پھوٹ لڑکی کی طرح ادھر ادھر اڑتی پھرتی ہوتی ہے، اب سنجیدہ ہو جاتی ہے۔

خور سے دیکھنے پر پتہ چلے گا کہ اُس کے پستان معمولی اُٹھنے لگے ہیں، جو دھیرے دھیرے بڑھتے ہوئے لڑکی کی بیرونی خوبصورتی کو چار چاند لگائے۔ اس وقت چہرہ پر لالی آجاتی ہے، گال بھر جاتے ہیں، چہرہ اور جسم بھر اُدھار دکھائی دینے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں سارا جسم سُدول بن جاتا ہے، جس سے لڑکی خوبصورتی میں کشش ہو جاتی ہے، لڑکی کو ایام بھی اس وقت شروع ہو جاتے ہیں۔

اندرونی تبدیلیاں۔ جوانی کے شروع ہونے پر بیرونی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اندرونی تبدیلیاں بھی تیزی سے ہونے لگتی ہیں اور پیدائش سے تعلق رکھنے والے اعضاء بڑھنے اور مضبوط ہونے لگتے ہیں، اس وقت جسم کی کچھ گرنٹھیاں مضبوط ہو کر خاص صورت سے حصہ لینے لگتی ہیں۔ جس کے نتیجے میں لڑکی میں عورت پن کی تمام علامات پیدا ہونے لگتی ہیں۔

مانسک تبدیلیاں۔ جوانی شروع ہونے کے وقت ایک لڑکی میں بیرونی اور اندرونی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی مانسک تبدیلیاں ہونے لگی ہیں، جو کہ دوسرے تو ایک طرف ماں باپ پر ظاہر نہیں ہوتیں، اسی وجہ سے لڑکی کی اس وقت کی منورتی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کبھی کبھی لائق ماں باپ یا اس سرپرست بھی غلطی کر بیٹھتے ہیں، جس سے لڑکی کا سارا جیون ہی چوڑھو جاتا ہے، اس وقت لڑکی شرم و حیا سے بے لگتی ہے، بزرگوں اور اپنے سے بڑوں سامنے آنے میں گھبراتی ہے، اپنی خوبصورتی کا کسی اکیلی جگہ میں جانچ کرنے کی عادت سی پڑ جاتی ہے، اپنے آپ کو مستقبل میں بندھن میں بندھ جانے کے رے خواب دیکھنے لگتی ہے، کبھی ہسلیوں کے ساتھ خوش گپیوں میں آند آنے لگتا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ محبت کرنے لگتی ہے۔ تاکہ سماج اس کو اب کم عمر لڑکی نہیں بلکہ دوشیزہ کی صورت میں دیکھے، بات بات میں غصہ آنا اور چڑچڑاہٹ اس کے مزاج میں شامل ہو جاتا ہے، اس طرح اس کی مانسک اور مہنقا لٹی تبدیلیاں ہونے لگتی ہیں۔

ماں باپ کا فرض۔ لڑکی کے جوانی کی عمر میں پہنچنے پر اس کے متعلق اس کے ماں باپ اور پرپوار کے دوسرے لوگوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ طوفانی ہوتا ہے۔ ماں باپ کا فرض ہے کہ لڑکی کے استاد، بھائی، دوست، گھر کے جوان ملازم، پڑوسی کے جوان لڑکے، دور کے رشتہ دار لڑکے، کوئی بھی ہو، ان پر کڑی نگاہ رکھی جائے، یہ ٹھیک ہے کہ ایسے تمام لوگ خراب نہیں ہوتے، لیکن آج کل کے ماحول میں کسی پر یقین رکھنا مناسب ہے۔

عام طور پر پہلی بار ایام آنے پر خون دیکھ کر لڑکی ڈر جاتی ہے، اور سمجھ نہیں پاتی کہ یہ کیا ہو گیا اور اس وقت اسے کیا کرنا چاہیے، اس لئے ماں کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسا ہونے پر اس کے متعلق تمام باتوں کو لڑکی کو سمجھا دیں اور بتا دیں کہ اس کے ہی نہیں بلکہ تمام لڑکیوں کے جیون میں ایام ضرور ہیں۔ اور یہ کہ ہر ماہ بار بار مقررہ وقت پر ایسا ہوا کرتا ہے، جب تک کہ شادی کے بعد حمل نہیں ٹھہر جاتا۔

لڑکی جوانی کے جوش میں آکر کہیں منزل سے ہٹا جائے۔ اس کے لئے ماں باپ کا فرض ہونا چاہیے اور دیکھتے رہنا چاہیے کہ وہ کسی ایسی ٹی یا ماحول میں نہ پڑ جائے، جہاں اس کے منزل سے ہٹا جانے کا خطرہ ہو، آخری اور ضروری فرض ماں باپ کا یہ ہے کہ اپنی جوان لڑکی کے اس کی حسب خواہش (جس پر ماں باپ بھی راضی ہوں) لڑکے سے اس کی شادی کر دینی چاہیے۔

لڑکی کا فرض۔ جب لڑکی میں جوانی کی علامات ظاہر ہونے لگیں، اس وقت سے لے کر جب تک شادی نہیں ہو جاتی اسے حوصلہ سے کام لیئے اور جو کچھ کرنا ہو اسے خوب اچھی طرح سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔

جوانی کی عمر میں ہی جسم کو بڑھوتری حاصل ہوتی ہے اور جو لڑکی یہ نہیں جانتی کہ اس وقت کیا کیا کرنے سے اس کی صحت و جوانی قائم رہے، اس کی زندگی کو نا کامیاب ہی سمجھئے، ایسی نا سمجھ لڑکی کے جسم کی بڑھوتری اس کی عمر کے مطابق نہیں ہوتی، ایسی لڑکی کب جوان ہوتی، کب شباب آیا اور کب بوڑھی ہوتی، پتہ ہی نہیں ملتا، اس میں عورت پن کی پوری بڑھوتری نہیں ہو پاتی، اس کے الٹ جو سمجھ دار لڑکی جوانی کی موت تک، قدرتی زندگی بتائے گی، وہ ضرور ہی اسی نوے یا سو سال کی عمر تک دوشیزہ مندری اور خوب صورت صحت مند بنی رہے گی یہ وراثت سال کی عمر گزر جانے کے بعد بڑھاپے کا آجانا ضروری ہے، صرف بھرم ہے۔

قدرتی جیون میں پہلا تمام قدرتی خوراک کو دیا گیا ہے، اچھی خوراک سے صحت، خوب صورتی اور جوانی، تینوں کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، مکمل اناج کی کھان، تازہ موسمی ساگ سبزیاں، خالص دودھ سوکھے میوے اور کچی سبزلیوں کا سلاد وغیرہ قدرتی خوراک کہلاتی ہیں، ان میں قدرت نے وہ

گن بھر رکھے ہیں جو بیان سے باہر ہیں، انہی قدرتی خوراک کو استعمال کرنے سے لڑکی آدرش، سندر اور صحت مند عورت بننے کی امید کر سکتی ہے۔
 جوان اور خوبصورت بنے رہنے کے لئے مستقل ورزش کی بھی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ورزش سے ہی جسم کے نقائص دور ہوتے ہیں اور
 شدہ ہوتا ہے اس سے جسم خوبصورت اور سڈول ہوتا ہے۔
 ورزش کے بعد آرام اور مقوی خوراک کا استعمال نہایت مفید ہے، اس سے محنت میں خرچ کی ہوئی طاقت واپس ملتی ہے۔
 مندرجہ بالا ہدایات کے علاوہ خوش و خرم رہنا، گہری نیند، گرمی جیون میں قدرتی اصولوں پر چلنا ایسی عادتیں ہیں، جس سے آدمی دیوتا
 عورت دیوی بن سکتی ہے۔

زنانہ اعضاء تناسل

پہلے اس کے کہ ہم امراض زنانہ اعضاء تناسل کے متعلق کچھ عرض کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ زنانہ اعضاء تناسل کی تشہ
 دیں۔ تاکہ امراض میں جس مقام پر ان اعضاء کا ذکر آئے، اس کو سمجھنے میں آسانی ہو اور کسی غلط فہمی کا امکان نہ رہے۔ زنانہ اعضاء تناسل دو قسم
 ایک بیرونی جو پیڑ کے جوف کے باہر نظر آتے ہیں، دوسرے اندرونی جو پیڑ کے جوف کے اندر ہوتے ہیں۔ اور ظاہری طور پر نظر نہیں آتے ہیں،
 میں مرد اور عورت کے اعضاء تناسل کا فطری فرق ہی فریقین میں مخصوص جنسی جذبات پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے، اگر عورت کے جسم کی بناوٹ
 ہوتی تو قدرت کی وہ مرضی پوری نہ ہوتی، جس کا منشا انسانی نسل کی بڑھوتری ہے۔ درحقیقت عورت کے وہ حسین جسمانی گوشے ہی ان میں عوا
 پیدا کرتے ہیں، جن کے اندر قدرت نے نئے نئے روپ ڈالتی رہتی ہے۔

عورتیں عام طور پر اپنے جسم کے ان خوب صورت گوشوں، پیچیدگیوں اور ان کے افعال و وظائف سے واقف نہیں ہیں جو انہیں کا نسا
 سب سے بڑے مقام کا مستحق بناتے ہیں، عورت اگر ماں اور بیوی نہ ہوتی تو یقیناً وہ کچھ بھی نہ ہوتی، حسن و شباب کی کشش، عنائی رخسار
 دلفریبی اور نشیلی آنکھوں کی سحر طرازی اپنی اپنی جگہ ناقابل انکار ہے، لیکن صنفِ نازک ان سب خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک اور زبردست
 رکھتی ہے اور وہ ہے "ماں" بننے کی صلاحیت، جس سے انسانی نسل کی بڑھوتری ہوتی ہے، اگر عورت کے حسن اور جوانی میں وہ جنسی کشش
 وہ مغرور سے مغرور مرد کو بھی اس کے قدموں پر جمکا دینے کی قوت رکھتی ہے تو اسے دنیا میں کوئی امتیاز حاصل نہ ہو سکتا تھا، اس طر
 چھاتیوں سے اپنے بچہ کو خون دل پلا کر ایک تنومند اور توانا نسل کی بڑھوتری کا سبب نہ ہوتی تو اس کے کالے اور لمبے بال، نازک
 لگے ہاتھ پتے لمبے اور نازک ہونٹ، سفید و صاف موتیوں کی لڑیوں کی طرح دانتوں کی قطاریں اور سینے پر پھرتے ہوئے آگینے، کبھی
 اور خوب صورتی کا مرکز بن سکتے، عورت اپنی جنسی کشش کو جنم دینے والے مخصوص جنسی اعضاء ہی کی وجہ سے محبوبہ اور حسینہ کا لقب حاصل
 محبت اور جنس کے درمیان نہایت گہرا رشتہ ہے، بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ محبت جنسی رجحان کا ہی ردِ عمل ہے۔

سگنڈ فریڈ کا خیال ہے کہ انسان بچپن ہی سے جنسی رجحان لے کر پیدا ہوتا ہے، جو محبت اور نفرت میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔
 گرمی زندگی کا خیال بھی جنس ہی کی حیرت انگیز کار فرمائی کا نتیجہ ہے۔ ان حقائق کا تقاضہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کے اپنے
 اعضاء، ان کے افعال و وظائف خصوصاً عورتوں کو اپنے اعضاء مخصوصہ کے متعلق واقفیت اور ان میں ہونے والی بیماریوں اور ان کے
 پوری طرح واقف ہو جانا چاہیے، کیونکہ نسل تو عورتوں کے ذریعے ہی چلتی ہے نیز یہی اعضاء ان کی فطرت میں نسوانی لوح اور خوبصورتی
 ہیں اور ان کی سلامتی اور صحت ہی نوالہ و تناسل کی سنہری زنجیر کو مربوط رکھتی ہے۔ اگر ان کے افعال و وظائف میں معمولی سا فرق بھی آجاتا

ایک عورت کی صحت ہی خطرے میں پڑ جاتی ہے، بلکہ انسانیت اور اس کے مستقبل پر بھی ادبار کی کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں، اس باب میں پہلے عورتوں کے مخصوص جنسی اعضاء کی تشریح بیان کی گئی ہے، اس کے بعد زنانہ اعضاء تناسل کے بارے میں روشنی ڈالی گئی ہے۔

عورت کے مخصوص جنسی اعضاء دو قسم کے ہوتے ہیں :-

ایک اندرونی جو پیڑو کے جوف میں رہتے ہیں۔

دوسرے بیرونی جو پیڑو کے باہر ہوتے ہیں، باہر والے حصے جن کا مصرف بس جنسی ملاپ ہی اور اندر والے حصے جو نسل بڑھانے کے کام آتے ہیں۔

زنانہ اعضاء تناسل

- ۱۔ رقب (مازوںے نے رس) ۲۔ بڑے لب (شفر کبیر) (Labia majora) ۳۔ چھوٹے لب (شفر صغیر) (Labia minor) ۴۔ بظر (کلی ٹورس) (Clitoris) ۵۔ دبیز فرج (ویٹی بیول) ۶۔ پیشاب کا سوراخ (Urethral Orifice) ۷۔ سوراخ فرج (یونی) (Ori-fice of the Vagina) ۸۔ پردہ بکارت (Hymen) ۹۔ مقعد (Anus) -

اندرونی اعضاء تناسل زنانہ :- ۱۰۔ بچہ دانی ۱۱۔ قاذف ۱۲۔ خفیۃ الرحم (اووریز) عورت کا اندر (بضہ بشر) جسے اپنے اصلی تڑ سے تین ہزار گنا مدت و قامت میں دکھایا گیا ہے ۱۳۔ بیرونی جھلی ۱۴۔ مخی حصہ ۱۵۔ نواۃ -

عورت کے اعضاء تناسل بیرونی یہ ۱۰ کے نیچے جانگوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، اس میں باہر سے دکھائی دینے والے اعضاء تناسل کو ایسی طب میں شرم گاہ یا اندام نہانی اور انگریزی طب میں ولوا (Vulva) کہتے ہیں، ان میں مندرجہ بالا اعضاء شامل ہیں۔

۱۔ رقب (مازوںے نے رس) :- یہ ایک نرم، اونچی، گول چربی کی گدی ہے۔ جو پیڑو کی ہڈی کے سنانے کے فرج کے اوپر ایک گول بلندی میں نمایاں ہوتی ہے، اس پر بالغ ہونے کے بعد بال پیدا ہوا کرتے ہیں، چربی کی یہ گدی اپنے نزدیک بیرونی اعضاء کو مختلف صدمات سے اور اندرونی اعضاء کو سردی بچاتی ہے۔

اس کی بناوٹ میں سب سے اوپر والا حصہ ہے، جس میں تین قسم کے غدود پائے جاتے ہیں :-

- ۱۔ غدود دہنیہ ————— جس سے ایک قسم کی چکنی رطوبت نکل کر جلد کو نرم اور چمکانا کرتی ہے۔
- ۲۔ غدود عرق ————— جس سے پسینہ پیدا ہوتا ہے۔
- ۳۔ غدود شعریہ ————— جن سے بال پیدا ہوتے ہیں، جلد سے نیچے ایک خانہ دار جھلی میں چربی بھری رہتی ہے، جو چالیس پینتالیس سال کی

عمر میں جب عورت کو حیض بند ہو جاتا ہے، بعد میں چربی بتدریج کم ہو کر زائل ہو جاتی ہے، جو عورتیں ضبط تولید (برتھ کنٹرول) کی عادی ہوتی ہیں، ان میں شروع میں یہ چربی بڑھ جاتی ہے اور پھر کم ہو کر ناپید ہو جاتی ہے۔

۲۔ بڑے لب (لبیا میجورا) (Labium Majura) :- اندام نہانی یا فرج کے دروازے دونوں طرف بڑے لب ہوتے ہیں، یہ جلد کی دو

ری ہوئی چٹیں ہوتی ہیں۔ جو رقب سے شروع ہو کر نیچے سے گزرتی ہوئی مقعد کے قریب اور اس سے ایک انچ آگے سیون میں ختم ہو جاتی ہے، ان دونوں لب (ہونٹوں) کے درمیان ہلالی شکاف میں فرج یا اندام نہانی کا سوراخ اور اس سے ذرا اوپر پیشاب کا باریک سوراخ ہوتا ہے۔ ان کی بیرونی بناوٹ پر ہوتے ہیں، عام حالت میں اس کا اندرونی حصہ آپس میں ملا رہتا ہے، ملاپ اور بچہ پیدا ہونے کے وقت یہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہونٹ نازک اعضاء کو چمپا کر انہیں خواش وغیرہ سے بچاتے ہیں۔ شہوت کے وقت ان لبوں میں انبساط اور انقباض پیدا ہوتا رہتا ہے۔ نازک مزاجوں میں زمانہ حمل کے اندر ان ہونٹوں کی وریدیں پھول کر معمول سے زیادہ دوران خون پیدا کر دیتی ہیں، اور اگر ایسی کوئی رگ پھٹ جائے، تو شدید

جریان خون ہونے لگتا ہے۔

۳۔ چھوٹے لب (لبیا مینورا) (Labium Minura) :- یہ لعاب دار جمعی کی دو چھوٹی چھوٹی چٹائیں ہیں، اور بڑے لبوں کے درمیان اندر کی طرف واقع ہیں۔ ہر ایک کی لمبائی تقریباً دو انچ ہوتی ہے، یہ دانہ شہوت (بظر) سے شروع ہو کر ترقی طور پر نیچے باہر آ کر یونی (فرج) کے سوراخ میں ختم ہو جاتے ہیں، چھوٹے لب (ہونٹ) عام طور پر بڑے لبوں کے اندر رہتے ہیں، نوجوانی میں ان کے اندر غوطہ ہو کر تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، ملاپ کے وقت تن کر یہ ملاپ میں لذت پیدا کر دیتے ہیں، عورتوں میں ملاپ کا لطف ان کی درستی و صحت سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔

باہر کی طرف ان کا تال میل بڑے لبوں سے ہے اور اندر کی طرف یونی (فرج) کی اندرونی سطح سے اس پُر کوئی بال نہیں ہوتے، چھوٹی عمر میں اور بھرپور جوانی میں یہ دونوں لب بڑے لبوں سے پوشیدہ رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے جدا کرنے پر نظر آتے ہیں۔ بعض عورتوں میں غیر فطری جنسی تسکین سے یہ لب بڑھ کر بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے لبوں سے باہر نکلے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے یونی (فرج) کی شکل زیادہ مکرہ ہو جاتی ہے۔ ۴۔ دانہ شہوت (بظر، کلی ٹورس) :- یہ ایک چھوٹا سا بڑھاؤ اور مستطیل شکل کا گوشت کا ٹکڑا ہے، جو چھوٹے لبوں کے ملاپ سے تقریباً نصف انچ نیچے سوراخ فرج سے اوپر لٹکتا ہے اور چھوٹے ہونٹوں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس میں ذکاوت حس موجود ہے اور شہوت کے وقت اینٹھ کر سخت ہو جاتا ہے، غیر فطری جنسی تسکین کی عادت اور غیر منزل ملاپ سے عورتوں کا بظر بہت بڑھ جاتا ہے اور نہایت بد نما معلوم ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی زائد بڑھوتری سے زائد شہوت یا تفسیر شہوت کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔

اس کی بناوٹ کو مردانہ اعضائے تناسل کے قائم مقام سمجھنا چاہیے، یہی وجہ ہے کہ اسے قضیب زن یا کلی ٹورس کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، افریقہ کی بعض حبشی اقوام میں یہ بعض اوقات چار یا پانچ انگشت تک پایا گیا ہے، بعض قوموں میں اس کا خلیہ کرا دیا جاتا ہے تاکہ عورت کی جنسی خواہشات میں کمی واقع ہو جائے۔

۵۔ دہلیز فرج (لمبائی ویٹی بول) :- دانہ شہوت (بظر) سوراخ فرج (یونی) کے اوپر اور فرج کے چھوٹے ہونٹوں کے درمیان یہ ایک گوشہ شکل کی چکنی جگہ ہے اس کو دہلیز فرج کہتے ہیں، جس کے اوپر کی طرف دانہ شہوت اور نیچے یونی (فرج) کا سوراخ اور ہر دو پہلوؤں پر چھوٹے ہونٹ نظر آتے ہیں، اسی کے درمیان پیشاب کا سوراخ نظر آتا ہے، جو دانہ شہوت سے ایک انچ کے فاصلہ پر ہوتا ہے، دہلیز فرج کی بناوٹ لعابی غدود بکثرت ہیں، جن کے افرازات سے یہ جگہ ہمیشہ تر رہتی ہے نیز دہلیز فرج کے دونوں طرف دانہ شہوت سے لے کر یونی تک چھوٹے ہونٹوں سے ذرا نیچے ایک گلی سی ہوتی ہے، جو لعاب دار جمعی سے ڈھکی رہتی ہے، اس کی لمبائی تقریباً ایک انچ اور شکل گاؤں دھم ہوتی ہے، اس بناوٹ میں پھونسنے اور سکڑنے والا مادہ، جال، شریانیں اور اعصاب شامل ہیں، شہوت کے وقت یہ گلیاں پھول جاتی ہیں، یہ مردانہ اعضائے تناسل کے جسم اسفنجی کے پھیلاؤ کے قائم مقام ہیں، ان کو عدد دہلیز (لمبائی ویٹی بولائی) کہتے ہیں۔

۶۔ پیشاب کا سوراخ (می ٹیس یوری ٹیرس) :- عورتوں میں پیشاب کی نالی کا سوراخ دہلیز فرج میں دانہ شہوت سے تقریباً ایک انچ سوراخ فرج کے عین اوپر ہوتا ہے، یہ ایک انچ نالی ہے جو شانہ سے شروع ہو کر دہلیز فرج میں پیشاب کے سوراخ پر آ کر کھلتی ہے۔ اور اس کے نیچے پتہ خارج ہوتا ہے۔ یہ سوراخ ہر وقت بند رہتا ہے، صرف پیشاب کرتے وقت کھلتا ہے، عورتوں کے سوزاک میں دوا کی پچھلے اور پیشاب بند ہو جانے میں، ملاپ اسی سوراخ میں ڈالی جاتی ہے۔

۷۔ سوراخ فرج (آری فس آف دی ویجائنہ) :- فرج کے دونوں چھوٹے لبوں کے درمیان پیشاب کے سوراخ کے نیچے واقع ہے، یہ سینوں غلاف (شکاف) ہوتا ہے، یہی فرج کا سوراخ ہے اور عورت کے کنوے میں یہ پردہ بکارت (ہائمن) کے کم و بیش بند ہوتا ہے، یہ گول اور تنگ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی گولائی کچھ کم ہو جاتی ہے، حیض اور نفاس کا خون اسی سوراخ سے آیا کرتا ہے، بچہ کی پیدائش بھی اسی راستے سے ہوتی ہے اور ملاپ

بھی یہی ہے، سوراخ فرج عورت کے اندرونی اور بیرونی اعضائے تناسل کے درمیان واقع ہے، اسی راہ سے منی رحم میں داخل ہوتی ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ نالی نیچے سے تنگ، اوپر سے کشادہ اور عنق الرحم سے ملی ہوئی ہے۔ اس کے اندر پردہ مخاطی کی چینٹیں پائی جاتی ہیں، جو ملاپ کے وقت پھیل جاتی ہیں، باکرہ اور بے اولاد عورتوں میں سوراخ فرج تنگ ہوتا ہے۔ بعض عورتوں کی دیوینی ہوتی ہیں، انہیں دو فرج کہتے ہیں، اگر دو فرج والی عورتوں کے ساتھ رحم (بچہ دانی) بھی رہے تو ایسی عورتیں عام طور پر بانجھ (بے اولاد) ہوتی ہیں۔ اگر بچہ دانی ایک ہو تو ان میں حمل قائم کرنے کی قدرتی طاقت موجود ہوتی ہے، عنق الرحم اور رحم (بچہ دانی کا منہ) بھی بچہ دانی کے اندر واقع ہیں۔ اگر ڈوش کرنے میں احتیاط سے کام نہ لیں، تو رحم کے منہ کی راہ سے ڈوش کا پانی رحم میں پھنچ جاتا ہے، اور وہاں پر سڑ کر خطرناک امراض پیدا کرتا ہے۔

۸۔ پردہ بکارت (ہائمن (Hymen) :- یہ فرج کی عاب دار جھلی کی ہلالی شکل کی ایک باریک چنٹ یا پردہ ہے، جو فرج کے سوراخ کے نیچے ایک حصہ تیار ہوتا ہے، گویا یہ پردہ شرم میں سالم اور بے سوراخ ہوتا ہے، لیکن جوانی میں اس کے درمیان ایک یا کئی جھوٹے چھوٹے سوراخ پیدا ہو جاتے ہیں، جن کی راہ سے حیض کا خون جاری ہوتا رہتا ہے، جب عورت پہلی دفعہ مرد سے ملاپ کرتی ہے تو یہ پردہ پھٹ جاتا ہے۔

اندرونی اعضائے تناسل زنانہ

۱۔ فرج (یونی)، ۲۔ رحم (بچہ دانی)، ۳۔ خفیصۃ الرحم (اوریز)، ۴۔ فلوپین ٹیوبز (قاذبین)، ۵۔ بچہ دانی کی گردن (عنق الرحم) (Ser vixutri) :- قعر الرحم (Uterhs Fun dus)، ۷۔ عورت کا اندہ یا بیضۃ بشر، ۸۔ قاذف نالی کا جھلدار حصہ۔

پہلے ملاپ کے بعد پردہ بکارت ٹوٹنے سے اس کے کنارے سوراخ فرج کے چوگرد چھوٹے چھوٹے اُبھار پیدا کر دیتے ہیں اور فرج کے سوراخ کو پھیلے دیتے ہیں، پردہ بکارت کی موجودگی کو عام طور پر عورت کے باکرہ (کنواری) ہونے کی صدقہ دلیل سمجھا جاتا ہے۔ یہ پردہ جب ملاپ کے وقت پھٹ جاتا ہے، تو اس کے کنارے چھوٹی چھوٹی گول بندلیوں میں بدل جاتے ہیں۔ بعض اوقات پردہ بکارت بالکل موجود ہی نہیں ہوتا، بعض دوشیزاؤں میں سیلان الرحم خرابی حیض کے باعث ضائع ہو جاتا ہے، اس لئے اس کا ہونا یا نہ ہونا عورت کی دوشیزگی قطعی دلیل ہرگز نہیں ہو سکتی۔

۱۔ مہبل، فرج، یونی، اندام نہانی (دیجائنا (Vagina) :- یہ ایک غشا دار نالی ہے جو فرج (دیجائنا) ظاہر سے لے کر رحم (گر بھاشی) تک پھیلی ہوئی ہے اور جوف عامہ کے اندر مثلے کے پیچھے اور معاء مستقیم کے سامنے واقع ہے، اس نالی کا رخ ذرا پیچھے کو اوپر کی طرف ہے۔ اس کی دیواریں عموماً ملی رہتی ہیں۔ اور اگلی دیوار تقریباً دو اپنچ اور پچھلی تقریباً پونے تین اپنچ لمبی ہوتی ہے، یونی کا درمیانی حصہ کھلا اور پچھلا حصہ تنگ ہوتا ہے، اس کی اگلی اور پچھلی دیواروں میں ایک خط کھڑا ہوتا ہے، جسے عموماً فرج (کالم آف دی دیجائنا) کہتے ہیں، ان عمودی اُبھاروں کے دونوں طرف بہت سی آرڈی لیکریس (حمل الفرز روجز) ہوتی ہیں۔ ان میں بہت سے چھوٹے چھوٹے اور لمبائی غدد ہوتے ہیں، جن سے ملاپ کے وقت سی نالی میں قضیب (مرد کا جنسی عضو) داخل ہوتا ہے اور حیض و بچہ پیدا ہونے کا راستہ بھی یہی ہے، اس کا سوراخ کنواری عورتوں میں تنگ اور پردہ بکارت سے بالکل یا کسی قدر بند رہتا ہے، اور ملاپ کے بعد کسی قدر بڑا بادیامی شکل کا لمبا شگاف پیدا ہو جاتا ہے۔

فرج (یونی) کے زخم سے بعض اوقات زبردست جریان خون ہو جاتا ہے، اس سلسلہ میں بیڈی ڈاکٹر اور دایہ کو یونی میں انگلی یا آلہ لئے وقت یونی کی رفتار اور خیمہ گیوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، چونکہ یونی کی چینٹوں اور شکنوں کی وجہ سے فرج میں بہت سے نشیب و فراز ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے عورتوں میں سوزاک کا مرض بہت شدید ہوتا ہے، کیونکہ سوزاک کا مادہ ان نمکوں میں قائم رہتا ہے اور صاف نہیں ہو سکتا۔ یونی میں انگلی داخل کر کے تمام زنانہ اعضائے تناسل کو ٹیوٹل کر طبی معائنہ کیا جاسکتا ہے۔

یونی کے لبوں کو ہر وقت تر رکھنے کے علاوہ ملاپ کے وقت جو رطوبت ذرا زیادہ بہتی ہے یہ بارہتولین گلینڈز

(Barthol ine Gland) جسے طب میں غدود بارتولین کہتے ہیں، سے آتی ہے، یہ بادام کی شکل کے دو غدود ہوتے ہیں، جو مردوں کے غدود (Coper Glands) کے قائم مقام ہوتے ہیں اور یونی کے اندر گھسے ہوئے ہوتے ہیں۔

۲۔ رحم، بچہ دانی (یوٹرس) (Uterhs) :- رحم (بچہ دانی) زنانہ اعضاء تناسل کا سردار ہے، اس میں ہی مرد کے ویرج کے کپڑے اور عورت کے انڈے کا ملاپ ہوتا ہے اور حمل قائم ہوتا ہے اور پوری نشوونما کے بعد وضع حمل کے وقت بصورت بچہ باہر آتا ہے۔ دوشیزہ لڑکیوں کا رحم ناشپاتی کی طرح ہوتا ہے اور آگے سے جوں جوں پیچھے کو ہٹنا جاتا ہے، توں توں چپٹا ہوتا جاتا ہے۔

رحم کی لمبائی تقریباً تین انچ، چوڑائی دو انچ اور موٹائی ایک انچ ہوتی ہے اور وزن اڑھائی تو لے سے سوا تین تو لے ہوتا ہے، رحم کا بالائی حصہ زیادہ چوڑا ہوتا ہے، اسے قعر رحم کہتے ہیں۔ یہ حصہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے، ایام حیض میں بڑھ کر رحم گول ہو جاتا ہے اور اس کے لب متورم ہو جاتے ہیں۔ نیز حمل کے دنوں میں جنین رحم میں قیام پا جاتا ہے اور رحم کے اندر ہی رہ کر اپنی مدت پرورش پوری کرتا ہے۔ چنانچہ حمل کے زمانہ میں اس کا وزن بارہ چھٹانک سے ڈیڑھ دو سیر تک وزنی ہو جاتا ہے اور بچہ کی پیدائش کے بعد رحم تقریباً اپنی اصلی حالت پر واپس آ جاتا ہے، لیکن اس کا جوف دوشیزہ لڑکی کے رحم سے بڑھ جاتا ہے۔ بڑھاپے میں رحم سکڑ کر زرد اور دبیز ہو جاتا ہے، اس کا اندرونی و بیرونی سوراخ تقریباً بند ہو جاتا ہے اور لب (مونٹ) بھی مسدوم ہو جاتے ہیں۔ رحم کے تین حصے ہیں :-

۱۔ قعر رحم، ۲۔ جسم رحم، ۳۔ گردن رحم۔

۱۔ قعر رحم (فنڈس یوٹرائی) :- رحم کا بالائی وہ چوڑا اور محدب سر ہے جو آب دار چھلی (بارلیٹون، پیری ٹونیم) میں لپٹا رہتا ہے۔

۲۔ جسم رحم (بادی آف دی یوٹرس) :- یہ رحم کا درمیانی حصہ ہے۔ اس کی اگلی سطح چھٹی، پچھلی سطح محدب ہوتی ہے اور سب پر آب دار چھلی لگی رہتی ہے۔

۳۔ گردن رحم (سروکس رحم) :- یہ رحم کا پچھلا تنگ اور گول حصہ ہے، اس کے نیچے ایک نالی ہوتی ہے، جس کی لمبائی تقریباً نصف انچ ہوتی ہے، یہ نالی اگلے اور پچھلے سروں پر تنگ اور درمیانی حصہ میں کھلی ہوتی ہے۔ اس کے اگلے سوراخ یعنی گردن رحم کے بیرونی سوراخ کو نم رحم (آس یوٹرائی) کہتے ہیں، گردن رحم کی درمیانی نالی کے بالائی یا پچھلے سوراخ کو جو جوف رحم سے ملا ہوتا ہے، ہم رحم باطن (آس یوٹرائی انٹرنم) کہتے ہیں۔

رحم کی بناوٹ میں تین طبقات ہوتے ہیں :- (۱) بیرونی طبقہ آب دار چھلی کا ہوتا ہے، (۲) بیچ والا طبقہ عضلاتی ریشوں کا ہوتا ہے۔ یہ بہت دبیز اور سخت ہوتا ہے، (۳) اندرونی طبقہ لعاب دار چھلی (غسلے مخاطی میوکس ممبرین) کا ہوتا ہے، جو بچہ دانی کے جوف میں استر لگائی ہوئی بیرونی طرف نادرین ٹیوبز (قاذبین) کی لعاب دار چھلیوں سے اور پچھلی طرف یونی کی استر لعاب دار چھلی سے ملی ہوئی ہے، حمل کے دنوں میں رحم کا سنبند ہو جاتا ہے۔

۳۔ ڈمب گرنٹھیاں، خلیۃ الرحم (اووریز) (Ovaries) :- ان کی شکل کبوتر کے انڈے (Coiumba Livathe Common indian Pigeon) کی طرح ہوتی ہے۔ مشہور طبیب جالینوس نے اس کا نام خلیۃ النساء رکھا ہے، چونکہ یہ گلتیاں عورتوں میں مردوں کے خلیوں کی جگہ ہوتی ہیں، ہر ایک خلیۃ الرحم ڈیڑھ انچ لمبا، پون انچ چوڑا اور تہائی انچ موٹا ہوتا ہے۔ اور ڈمب گرنٹھ (اووریز) کا وزن عموماً پچھ تو لہ ہوتا ہے

یہ بیرونی طرف ایک چھوٹی اور باریک ڈوری کے ذریعے فلوپین ٹیوب کے جہاز دار سرے سے حسپاں رہتا ہے، خلیۃ الرحم کا بیرونی غلاف آب دار چھلی کا ہوتا ہے، اگر خلیۃ الرحم کا آپریشن کر کے دیکھا جائے، تو اس کی اندرونی بناوٹ جس کو سڈوما کہتے ہیں، ایک طرح کی خانہ دار اور ریشہ دار اور سُرخ رنگ کی سفید ساخت ہے۔ اس میں ریت کے باریک ذرّوں کی طرح نہایت چھوٹے چھوٹے ذرّے یا بلب ہوتے ہیں جن کو گراویسل گراف (Graafian Follicle) کہتے ہیں۔ ان کے اندر مادہ تولید ہوتا ہے، جس کے اندر زرد سا پانی بھرا رہتا ہے، اس پانی کے اندر (بیضہ انشی اووم بیضہ نش) ہوتا ہے اور نہایت

حفاظت سے رہتا ہے۔ جوانی کے بعد ان حویصلات کی بڑھوتری شروع ہوتی ہے، جوانی میں یہ دانے پک کر پھٹتے ہیں، ان کا مادہ مردوں کے مادہ تولید (منی) سے مل کر حمل قائم کرتا ہے۔ یہ دانے خفیۃ الرحم میں بچپن سے لے کر اس وقت تک بٹتے اور پختہ ہوتے رہتے ہیں، جب تک عورت ماں بننے کے قابل رہتی ہے، کبھی لڑکی یہ دانے کچے ہوتے ہیں۔ جوانی کے بعد رانی کے دانے سے لے کر مڑ کے دانے کے برابر ہو جاتے ہیں، ایسے ہر دانے بیٹلے میں عورت کا مادہ تولید (اندہ) سیال کے جیسے کے ساتھ ہی فلوپین ٹیوب سے گزر کر بچہ دانی میں چلا جاتا ہے۔

اوریز (خفیۃ الرحم) میں ایک اندہ اٹھائیس دن میں تیار ہوتا ہے اور ہر ایک اندہ ۱۲/۱۳ اپنچ کا ہوتا ہے، ماہواری آنے سے پہلے خفیۃ الرحم کچھ بھولتی ہے۔ اس وقت اس حالت میں ایک بار بائیں طرف اور دوسری بار بائیں طرف خفیۃ الرحم میں اندہ پختہ ہو کر پھٹتا ہے، اسے ڈمب پر نالی کی جھال پکڑ لیتی ہے، ڈمب پر نالی (قاذف نالی) کے راستے سے گزر کر وہ فلوپین ٹیوب سے بچہ دانی (رحم) میں پہنچ جاتا ہے، بچہ دانی (گرہائشہ) میں اندہ سے دیرج کے کیڑے (Sperms) سے ملاپ ہو جانے پر حمل ٹھہر جاتا ہے۔ ورنہ نہیں۔

اس سلسلہ میں دودھ دینے والے جانوروں اور عورت میں اندہ سے کامل ہونا اور بھیلی سے باہر آنا خاص خاص اور مقررہ اوقات میں ہوتا ہے، جو عورتوں میں جن کا زمانہ ہے اور جانوروں میں زمانہ حیول (مستی) ہے اس وجہ سے حمل کا ٹھہرنا عورتوں میں حیض کے بعد قریب کے زمانہ میں ہوتا ہے۔

۴۔ قاذفین (فلوپین ٹیوبز) (Fallopian Tubes) :- یہ دو پتی نالیاں ہیں جو خفیۃ الرحم سے رحم تک واقع ہیں، ان کا کام صرف یہ ہے کہ اندہ سے رحم (بچہ دانی) تک پہنچا دیں، ہر ایک کی شکل شہنائی کی طرح ہوتی ہے، اس لئے ان کو نیفرین بھی کہتے ہیں، یہ رحم کے دونوں طرف خفیۃ الرحم اور رحم کے درمیان واقع ہیں۔ اور خفیۃ الرحم سے عورت کا مادہ تولید (اندہ) لے کر بچہ دانی تک پہنچاتی ہیں، ہر ایک کی لمبائی تقریباً چار پانچ اپنچ ہوتی ہے اور آخری پھیلے ہوئے سرے جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے، جھال کی طرح ہوتے ہیں، اسی لئے اس سرے کو جھال دار سر کہتے ہیں، ان میں سے ایک خفیۃ الرحم کی بیرونی طرف سے ملا ہوا ہوتا ہے، عورت کا اندہ خفیۃ الرحم سے خارج ہوتا ہے، تو یہ جھال دار سر اسے سنبھالتا اور رحم تک پہنچا دیتا ہے، اس کی بناوٹ میں بھی رحم کی طرح تین طبقات ہوتے ہیں، لاطبقہ مصلیٰ، دوسرا عضلاتی اور تیسرا مخاطی ہوتا ہے۔

خفیۃ الرحم (اوریز) کے کام :- ان کا پہلا کام اندہ تیار کرنا ہے اور دوسرا کام عورت کے جسم میں صحت، تندرستی اور خوب صورتی قائم رکھنا، حیض کی باقاعدگی کو قائم رکھنا ہے، پہلے دونوں کام آغاز شباب سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، جس طرح مرد کے خفیۃ (Testes) میں ایک خاص جگہ کا جوہر پیدا ہو کر خون میں مل کر مردوں کی داڑھی (Berad) مونچھیں (Moustache) وغیرہ پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح عورت کی ڈمب خفایاں (اوریز) میں بھی ایک خاص قسم کا مادہ بچپن سے ہی بن کر ان کے خون میں ملتا رہتا ہے، اس کے خون میں ملنے سے عورتوں میں جوانی اور زنانہ جان کے آثار پیدا ہوتے ہیں، یہ مواد ان میں شرم، تحلل، خوب صورتی وغیرہ خاص طور پر زنانہ رجحانات کو بھر دیتا ہے، مطلب یہ کہ جسم مضبوط ہوتا ہے، رے پر نور برسنے لگتا ہے اور خوب صورتی بڑھتی ہے۔ آنکھوں میں خاص چمک اور بچان پیدا ہوتا ہے اور عورت کے جسم کے چھوٹے سے چھوٹے حصہ میں ایک خاص طرح کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔

عورت میں بھی مادہ منویہ موجود ہے :- اکثر نادانف لوگ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ عورتوں کو بھی انزال ہوتا ہے، لیکن یہ ایک نیقت ہے کہ اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی اسے جھٹلایا جاسکتا ہے، جیسا کہ ڈمب گرنٹیاں (اوریز) کی سطح پر جب آبلہ اچھی طرح پختہ جاتا ہے اور اس کے اندہ کامل ہو جاتا ہے، تو اس کے غلات میں شدید تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں قاذف نالی کا جھال دار خفیۃ الرحم سطح پر جہاں آبلہ پک کر پھٹنے کے لئے تیار ہو گیا ہے، اچھی طرح آچھٹتا ہے، اس کے چوسنے کی حرکت نیز ملاپ کی آمنگ اندرونی تحریک ہے، یہ وقت تمام زنانہ جنسی اعضاء میں گدگدی کی طرح محسوس ہوا کرتی ہے، اور ساتھ ہی ملاپ کی حرکات سے آبلہ کا نازک پردہ پھٹ پڑتا ہے اور اس کے اندر سے اندہ اور اس کے گرد کا مواد خارج ہو کر قاذف نالی میں داخل ہوتا ہے اور قاذف نالی کے عضلاتی ریشوں میں اس کی اندرونی جھیلی

کے باریک رویں دار اجزاء کی حرکت سے اندہ اپنی ہمراہی رطوبت کے ساتھ بچہ دانی میں داخل ہو جاتا ہے اور یہی عورت کا انزال ہے، انزال کے بعد اندرونی زنانہ جنسی اعضاء میں جو ہلکی سی لذت آفریں گدگدائی محسوس ہوتی ہے وہ قافز نالی کے عضلی ریشوں اور مادہ منی کے منتقل ہونے کی وجہ سے ہوا کرتی ہے ایسی حالت میں اگر عورت اور مرد کی منی بچہ دانی کے اندر مل جاتی ہے اور اگر دونوں میں طبی طور پر کوئی نقص نہ ہو تو حمل بٹھ جاتا ہے۔

اس سلسلہ میں اور بھی بہت سی دلیلیں عورت میں مادہ منویہ کی موجودگی کے بارے میں دی جاسکتی ہیں، مثال کے طور پر عورت بھی خواب میں انزال ہو جاتی ہے جسے طبی اصطلاح میں احتلام کہتے ہیں۔ اور میرے طبی تجربات میں دو تین ایسی مریضہ رہی ہیں جنہیں عمر میں دو تین بار احتلام ہوا، پس یہ احتلام بھی انزال ہونے کی وجہ سے عورت میں مادہ منویہ کی موجودگی ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مرد اور عورت کی منی کی رنگت اور کیفیت جدا ہے۔ ایک میں قوت منقذہ اور ایک میں عاقدہ، جیسا کہ دونوں کے باہمی ملاپ سے نطفہ بنتا ہے۔ (طبی نقطہ نظر سے جسمانی بناوٹ کے تحت شائع کیا گیا)۔

حیض (مین سیز - Menses): حیض اس خون آمیز رطوبت کا نام ہے جو عورت کی تندرستی کی حالت میں ماہ ب ماہ رحم سے خارج ہوتی ہے۔ یہ خون آمیز رطوبت مختلف وقتوں میں عورت کو آتی شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ گرم ملکوں میں جلد حیض آنا شروع ہو جاتا ہے اور سرد ملکوں میں بڑی عمر میں، علاوہ اس کے غذا کے اچھا ہونے یا نہ ہونے پر بھی اس کا بہت کچھ اثر ہوتا ہے، معتدل ممالک میں ۱۴ سے ۱۶ سال کی عمر میں حیض آنا شروع ہو جاتا ہے اور گرم ممالک میں دس سے چودہ سال کی عمر میں شروع ہو جاتا ہے۔

حیض کا آنا عورت کے بالغ ہونے کی بڑی علامت ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اس میں تاخیر ہو جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت کو بالغ نہ سمجھا جائے اور حمل بھی قرار نہ پائے نیز یہ کہ دوسرے جوانی کے آثار ظاہر نہ ہوں، چنانچہ بعض عورتیں اس قسم کی بھی دیکھی گئی ہیں، کہ باوجود حیض نہ ہونے کے صاحب اولاد ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہی ہوا کرتا ہے۔ اکثریت اس بات کی شاہد ہے کہ جب تک حیض صحیح طریقہ پر مقررہ مدت و مقدار میں نہ آئے حمل قرار نہیں پاتا ہے۔

ہندوستان جیسے گرم ملک میں لڑکیاں عام طور پر دس پندرہ سال کے درمیان بلوغت کو پہنچ جاتی ہیں، اس عمر میں ان کے اندرونی اعضاء کی بناوٹ میں ایسی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں جس سے وہ انسانی نسل کی بڑھوتری یعنی اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں، جس وقت کوئی لڑکی بلوغت کو پہنچتی ہے تو طبی رُوء سے اس کی بگلوں کے تپنے اور اندام نہانی کے اوپر کے حصے میں بال اُگنے لگتے ہیں، چھانٹیاں ابھر پڑتی ہیں، حیض بھی آنے لگتا ہے اور جسم کی نشوونما جلد جلد ہونے لگتی ہے، پس بلوغت کی یہی بڑی بڑی علامات ہیں۔

حیض ۳ روز کے بعد آتا ہے اور عام طور پر پانچ روز تک جاری رہتا ہے حیض میں خون اور گوشت کے ملے جلے اجزاء ہوتے ہیں، لیکن خون کی مقدار گوشت کے ذرات سے زیادہ معلوم ہوتی ہے اور عموماً اس کی مقدار آٹھ سے دس تولہ تک ہوتی ہے۔

ایام حمل اور بچہ کے دودھ پینے کے ابتدائی دنوں میں حیض نہیں آتا ہے، حیض کی بندش حمل بٹھ جانے کی ایک بڑی علامت ہے، عام طور پر ۵۴ سال کی عمر میں حیض کا سلسلہ سدود ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اولاد کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا ہے، لیکن یہ کلیہ قاعدہ نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات پچاس پچھن برس کی عمر تک بھی عورت اولاد پیدا کرنے کے قابل رہتی ہے۔

اس زمانہ میں لڑکیوں کو نو یا دس برس کی عمر میں بھی حیض آنے لگے تو اس میں حاملہ ہونے اور بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اتنی چھوٹی عمر میں لڑکیوں کو ہوس رانی کا ذریعہ اور بچہ پیدا کرنے کی مشین بنادینا اس پر ظلم کرنا ہے۔ دس پندرہ برس کی لڑکی بھی محض بچہ ہی ہوتی ہے، اس عمر میں اس کے دل و دماغ پوری طرح نشوونما نہیں پاتے، اگر وہ اس عمر میں حاملہ ہو جائے تو خود اس کی بڑھوتری رُک جائے گی اور اس کی اولاد بھی لاغر اور کمزور ہوگی، اس لئے ۲۰ سال سے پہلے کسی لڑکی کی شادی نہیں ہونی چاہیے اور اکیس بائیس برس سے پہلے کسی لڑکی کو ماں بننے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔

کوئی عورت بھی اپنی جسمانی فطرت اور زندگی کو نہیں بھول سکتی، کیونکہ ہر تیس دن کے بعد اس کو مخصوص ناخوش گوار اور تکلیف دہ عرصہ سے گزرنا پڑتا ہے، یہ عرصہ عورت کو کبھی نسوانیت اور اس کا تقاضہ بھولنے نہیں دیتا، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ یہ عرصہ ناخوش گوار اور تکلیف دہ ہی ہو، اور اس عرصہ میں روزمرہ کے معمولات اور زندگی میں تبدیلی واقع ہو۔

بغیر کسی پس و پیش کے کہا جاسکتا ہے کہ اس عرصہ کا تکلیف دہ ہونا چنداں ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول میں پڑھنے والی لڑکی یا پڑھانے والی عورت یا سیاسی یا سماجی کارکن اس عرصہ میں اپنے معمولات سے گریز نہیں کرتیں، ایسی عورتوں کی بھی مثال لی جاسکتی ہے، جو کہ برابر اس عرصہ میں کھیلوں کے مقابلہ میں حصہ لیتی ہیں، ایام کی وجہ سے وہ کبھی کھیل میں شرکت سے انکار نہیں کرتیں۔ گھرلو عورتوں کی نسبت اس قسم کی عورتیں ایام کے دوران بہت زیادہ محنت کرتی ہیں، لیکن ان کا کوئی نقصان یا تکلیف محسوس نہیں کرتیں۔ چنانچہ ان ایام میں جسمانی محنت سے گریز ضروری نہیں، اور نہ اپنے روزمرہ کے معمولات زندگی میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔

لیکن ماہر جنیت معالجین اور لیڈی ڈاکٹروں کے باہمی تعاون سے ایک جائزہ حال ہی میں لیا گیا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچاس فیصدی لڑکیاں اور عورتیں ایام ماہواری کے دوران شدید درد اور تکلیف محسوس کرتی ہیں، ایسی عورتوں میں اکثریت گھرلو عورتوں کی ہے، اس جائزہ کو دیکھ کر فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گھرلو عورتوں اور کھلاڑی عورتوں میں کیا فرق ہے؟ جس کی بنا پر گھرلو عورتیں ان ایام میں شدید درد اور تکلیف محسوس کرتی ہیں۔ گھرلو عورتوں اور کھلاڑی محنتی عورتوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے، کہ کھلاڑی اور پیشہ ور عورتوں کے پیٹھے اور جسمانی عضو زیادہ توانا اور مستحکم ہوتے ہیں، عورتوں کی ایک مخصوص لیڈی ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ ایام ماہواری میں درد اور تکلیف جھیلنے اور معمولات زندگی میں تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حسب معمول اس کو غسل کرائیں اور اعضائے مخصوصہ بیرونی طور پر صاف رکھنا چاہیے، جسمانی محنت میں کوئی کمی نہیں کی جانی چاہیے، امریکہ کی متعدد عورتوں کے کالج اور سکولوں میں تجربات کئے گئے ہیں کہ کولہوں اور پیٹ کے پٹھوں اور عضلات کی کثرت کرنے سے ایام ماہواری میں کوئی تکلیف یا درد محسوس نہیں ہوتا۔

لیکن ایک عام عورت کو ایام ماہواری میں معمول سے زیادہ جسمانی محنت ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اس عرصہ میں اسے گھوڑ سواری، تیرنا اور بھاگنے کوڑنے والے کھیلوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ایک عام گھرلو عورت کے لئے چلنا یا محض اپنے روز کے گھرلو معمولات پر عمل کرنا اچھی کسرت ثابت ہوتا ہے۔ ایام ماہواری میں عام طور پر پیٹ کے نچلے حصہ میں جھجھن اور درد محسوس ہوتا ہے، جو خون کے جمع ہوجانے سے ہوتا ہے، اس درد کو دور کرنے کے لئے کسرت ضروری ہے، کسرت سے نہ صرف درد و تکلیف ختم ہوجاتی ہے بلکہ عام صحت بھی اچھی ہوتی ہے۔

چت لیٹ جائیے، جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیجئے، ایک ہاتھ پیٹ پر رکھئے اور آہستہ آہستہ اندر سانس لیجئے، اور دیکھئے کہ پیٹ کتنا ابھرتا ہے، پھر سانس آہستہ آہستہ باہر نکال دیجئے اور دیکھئے کہ پیٹ کتنا اندر کو دھنتا ہے۔ اس معمولی اور آسان کسرت کو صبح و شام دس بار کرنا چاہیے، صبح جگنے میں اور رات کو سوتے وقت اس کسرت کو باسانی کیا جاسکتا ہے۔

یہ کسرت روزانہ کرنی چاہیے اور ایام ماہواری کے دوران بھی اس کسرت کو کرنا چاہیے۔

ایام ماہواری میں درد اور تکلیف ہونے کی وجہ سے غلط کھڑا ہونے کا طریقہ بھی ہے، اگر کمر جھکی رہتی ہے اور سینہ اندر کو دھن رہتا ہے، تو اس کا اثر پیٹ کے نچلے حصے پر پڑتا ہے، اس طرح زردر پڑنے سے ایام ماہواری میں درد محسوس ہوتا ہے۔

ٹھیک طریقہ یہ ہے کہ سر کو اوپر اور گردن کو نیچے رکھا جائے، کندھے آگے جھکے ہوئے ہونے کی بجائے تنے ہوئے ہوں، اور کمر ایک دم سیدھی ہونی چاہیے۔

قبض کی وجہ سے بھی ایام ماہواری میں درد اور تکلیف محسوس ہوا کرتی ہے، اگر قبض ناقص غذا کی وجہ سے ہو تو ایسی غذا بند کر دینا چاہیے اور عذاب ختم

ہونے والی غذا استعمال کرنی چاہیے۔

اگر رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو بھی ایام ماہواری میں درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ عام طور پر ایسی شکایات ایسی عورتوں کو ہوتی ہیں، جن کے ہاں با بچہ نہ پیدا ہوا ہو۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد بعض اوقات رحم اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں ایام ماہواری میں تکلیف نہیں ہوتی۔ کمزور رحم کی وجہ سے بھی ایام ماہواری میں تکلیف اور درد محسوس ہوا کرتا ہے۔ عام طور پر غیر شادی شدہ لڑکیوں یا بغیر بچوں والی شادی شدہ عورتوں کا رحم کمزور ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہو جانے سے رحم پوری طرح نشوونما پا جاتا ہے۔ بغیر حمل کے محض شادی بھی ایام ماہواری میں تکلیف کو دور کرنے کے لئے مفید ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنسی اختلاط رحم کی نشوونما کرتا۔ جس کی وجہ سے رحم اپنا فعل پوری طرح انجام دینے لگتا ہے۔

ایام کی خرابیوں کا علاج سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے نہیں کرنا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ کسی مستند ماہر جنیات طبیب کو حالات سے آگاہ کیا جائے اور اس کے مشورے پر عمل کیا جائے۔

اگر ایام ماہواری میں لگاتار درد محسوس ہوتا ہے اور اس کا علاج نہ کیا جائے تو اس سے ذیابیطس، سوزاک، گنٹھیا، خفقان، دق اور کمی خون کی شہ ہو جاتی ہے، چنانچہ ایام ماہواری کے درد کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور شرم کو بالائے طاق رکھ کر ظاہر کر دینا چاہیے۔

بعض عورتوں کو بعض قسم کی غذائیں ناموافق ہوتی ہیں اور ان غذاؤں کی وجہ سے ایام ماہواری میں درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس سلسلہ میں کے انڈے، دودھ، چاکلیٹ، پھلی، گرم مصالحہ اور گو بھی بھی بعض مزاجوں کو موافق نہیں آتی اور اس سے عورتوں کو ایام ماہواری میں درد محسوس ہو لگتا ہے، چنانچہ ایام ماہواری میں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ در کسی خاص غذا کی وجہ سے تو پیدا نہیں ہوتا، لیکن بہت کم عورتوں کو غذا کی وجہ سے شہ پیدا ہوتی ہے۔

ایام ماہواری میں درد اکثر ان عورتوں کو محسوس ہوتا ہے، جن کی عام صحت درست نہیں ہوتی اور جن کے جسم کمزور ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایام ماہوار کے درد سے چھٹکارا پانے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ عام صحت کو بہتر بنایا جائے اور صحت بخش غذا کھائی جائے اور اگر کافی جسمانی محنت نہ کر ہو تو کسرت کی عادت ڈالی جائے۔


ایام ماہواری کی بے قاعدگی اور درد کا سبب نفسیاتی بھی ہو سکتا ہے، بلوغیت سے پہلے لڑکیوں کے دل میں خوف کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، طریقوں سے لڑکی یہ محسوس کرنے لگتی ہے کہ ایام ماہواری ایک مصیبت میں جو ہر عورت کو جھیلنے پڑتے ہیں۔ جو ہر صورت میں تکلیف دہ ہوتے ہیں اور ایام ماہواری میں خصوصاً احتیاطی تدابیر نہایت ضروری ہوتی ہیں اور صحت کے اصولوں کو برابر مد نظر رکھنا پڑتا ہے، جسمانی محنت، صفائی، صحت بخش غذا، سے چھٹکارا اور صحت مند خیالات ایام ماہواری کے بغیر درد و تکلیف کے ہونے کے لئے ضروری ہیں۔

بڑھاپے کی لگ بھگ عمر میں جب ماہواری خون کے بہاؤ کے لئے بند ہونے کے دن آتے ہیں تو بھی بہت سی تبدیلیاں آنے لگتی ہیں، جسم سے ذہنی تبدیلی ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ یوں تو سہلے، خون اور پیٹ کی بناوٹوں پر بھی اثر ہوتا ہے، جب خون بند ہونے لگتا ہے تو یکبارگی نہیں ہو جاتا بلکہ کچھ دنوں میں گڑ بڑ ہوتی ہے۔ پھر خون میں کمی ہونے لگتی ہے اور آخر میں بند ہو جاتا ہے، اعصابی تناسل کے اندر والے حصے تبدیلی ہو جاتی ہے، چھاتیاں سکڑ جاتی ہیں اور بعض اوقات ان میں چربی جمع ہو جاتی ہے، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس وقت ان عورتوں میں کچھ مرد علامات پیدا ہونے لگتی ہیں۔ مثلاً چہرے پر بالوں وغیرہ کا پیدا ہونا۔

خون نہ نکلنے کے دنوں میں جب خون نکلنے لگتا ہے، تو اس عارضہ کا نام طب میں کثرت الطمث جسے ڈاکٹری میں مینورا جیا (خون کا بجزرت

کہتے ہیں، لیکن جب ایام باہواری کے دنوں کے علاوہ خون آئے تو اسے طب میں استخاصہ کہتے ہیں اور جب سفیدی یا زردی مائل رطوبت نکلتی ہے، تو اسے سیلان الرحم (لیکوریہ) کہتے ہیں۔

پستان (Mammary Glands) :- یہ دو گرنٹھیاں (غدد) ہیں۔ جن میں بچہ پیدائش کے بعد بچہ کی پرورش کے لئے دودھ پیدا ہوتا ہے۔ یہ عورتوں میں بڑی اور مردوں میں بالکل چھوٹی ہوتی ہیں، عمر کے مطابق علیحدہ علیحدہ عورتوں میں ان کی بناوٹ میں فرق ہوتا ہے، جوانی کی عمر سے پہلے یہ چھوٹی ہوتی ہیں اور جوانی میں آجائے پر یہ بھی زنانہ اعضائے تناسل کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہیں، حمل کی حالت میں اور بچہ کی پیدائش کے وقت یہ بہت بڑھ جاتی ہیں اور بڑھنے کی عمر میں یہ بالکل مڑ جھکا جاتی ہیں۔



عورت کے دونوں پستان تقریباً آدھے گولائی میں ہوتے ہیں۔ ہر ایک پستان اوپر سے دوسری پسلی سے لے کر تینچے چھٹی پسلی تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر کئی طرح کی دگدگ گرنٹھیاں ہوتی ہیں اور جلد بھی اکٹھی رہتی ہے، ہر ایک پستان کے اوپر دسے حصے کی چوٹی پر ایک بلندی ہوتی ہے۔ جسے اردو میں بھٹنی، ہندی میں چوچک اور انگریزی میں نیپل (Nipple) کہتے ہیں۔ چوچک کے چاروں طرف گہرے کائے رنگ کا ایک گھیر رہتا ہے۔ اسے ایری ادلا (स्तन मण्डल) کہتے ہیں چوچک میں دودھ لانے والے بارہ سے بیس تک سوراخ ہوتے ہیں۔ شروع جوانی میں دونوں پستان چھوٹے اور سخت ہوتے ہیں، عمر کی بڑھوتری کے ساتھ ساتھ ان کی بڑھوتری بھی ہونے لگتی ہے، عورت کے اعضائے تناسل سے اگرچہ اس کا تعلق براہ راست نہیں ہے، لیکن پھر بھی پستانوں کا اعضائے تناسل سے گہرا تعلق ہے، پستانوں کو چھونے سے یا ان کے کسی حصہ کو بھی حرکت دینے سے رحم کی مانس پیشی کا سکڑاؤ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں سائے جسم میں عورت کو سکھ محسوس ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں طبی رُوسے عورت کے پستانوں کو اس کے اعضائے تناسل میں ایک خاص اہمیت کا مقام حاصل ہے، کیونکہ پیدائش کے بعد جو ہنی بچہ ماں کے پستانوں سے دودھ پینے لگتا ہے، اعضائے تناسل کا سکڑاؤ شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔

زنانہ اعضائے تناسل کی نگہداشت

زنانہ اعضائے تناسل کی نگہداشت سے لاپرواہی زنانہ امراض کی بڑھوتری کا سبب بنتی ہے، اور اس غلطی کا خیارہ بچوں کو اس وقت بگڑنا پڑتا ہے جب وہ منزل شباب میں قدم رکھتے ہیں۔

عورت کی اندام نہانی کی صفائی اس قدر آسان نہیں، کیونکہ اندام نہانی میں کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں غلاظت جمع ہو سکتی ہے، گو قدرت نے اس کی بناوٹ میں یہ بات ضرور رکھی ہے کہ بیرونی غلاظت اندر داخل نہ ہو سکے۔ تاہم کسی نہ کسی طرح غلیظہ مادے اور جراثیم اندر بچہ دانی تک پہنچ سکتے ہیں، لیکوریا کی بیماری عام طور پر اس وجہ سے ہوتی ہے۔

اندام نہانی (زینی) کی صفائی کے لئے عام طور پر پچکاری کے استعمال کی سفارش کی جاتی ہے۔ لیکن یہ طریق سہل نہیں ہے نہ اس کے استعمال کے لئے ہولتیں میسر ہیں۔ اس لئے عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ ایام کے دوران اندام نہانی کو گید نہ ہونے دیا جائے، یہ خیال محض دہم کی حیثیت رکھتا ہے اور اس دہم نے ہزاروں کو دکھ پہنچایا ہے، پانی کے استعمال میں اس قدر احتیاط کی البتہ شد ضرورت ہے کہ پانی ہمیشہ گرم ہو، صفائی خواہ دہ پچکاری

کے ذریعہ ہو یا دوسرے طریق سے ہمیشہ گرم پانی سے کی جائے، خاص طور پر ایام کے دوران سرد پانی کا استعمال مضر ثابت ہوگا۔

ایام کے دنوں میں دن بھر میں کم از کم ایک یا دو بار گرم پانی سے اندام نہانی کو صاف کیا جائے، ورنہ اندام نہانی کے منہ پر خشک خون جم جاتا ہے جس سے بدبو پیدا ہوتی ہے۔

ایام کا خون روکنے کے لئے صاف پتھرے پیسٹریٹ اور تولیہ استعمال کیا جائے اور انہیں جلد جلد بدل دیا جائے، تقریباً ہر روز تولیہ بدل لیا جائے، تو بہتر ہے گا۔ جریان خون کو روکنے کے لئے ربڑ کی ٹوپی یا ربڑ کی پیسری کی قسم کی کوئی چیز یا اسی قسم کا کوئی اور طریق اختیار نہ کیا جائے، ان اشیاء کے استعمال سے نالیوں اور معدہ میں سوزش پیدا ہونے کا خطرہ ہے، صاف کپڑے کا پیڈ جو عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کافی ہے، اگر اسے بھی جلد جلد بدلا جائے یا صاف کیا جائے۔

زنانہ اعضائے تناسل کی غلاظت سے شروع شروع میں معمولی تکلیف محسوس ہوتی ہے اور ایک قسم کی بدبو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جب یہ بے احتیاطی عرصے تک جاری رہے۔

ایک اور آسان طریقہ بتایا جاتا ہے کہ ایک صاف کپڑے گرم پانی میں بھگو لیا جائے اور اس سے اندام نہانی کو صاف کیا جائے، یہ طریقہ بہت آسان ہے، احتیاط کی جائے کہ اندام نہانی کے تمام اندرونی حصے صاف کئے جائیں۔

جو عورتیں پچکاری کے طریق کو پسند کرتی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس کے استعمال سے آگاہ ہوں، پچکاریاں دو قسم کی ہیں، جس قسم کی پچکاری استعمال کی جائے۔ یہ خیال ہے کہ اس کا طریق استعمال اچھی طرح معلوم ہو، ورنہ بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا، اس امر کو بھی فراموش نہ کیا جائے کہ پچکاری اعلیٰ درجہ کی خریدی جائے اور اس کا وہ سرا جو یونی کے اندر داخل ہوتا ہے کم از کم آدھ اپن موٹا ہو، اس انتباہ کی اس لئے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں جو پچکاریاں اس غرض کے لئے فروخت ہو رہی ہیں، ان کے سرے بہت نازک اور پتلے پائے گئے ہیں، یہ سرے ادوریز کی نالی میں داخل ہو کر باعث تکلیف بن سکتے ہیں، اس قسم کی پچکاری کا استعمال حد درجہ خطرناک ہوتا ہے

پچکاریوں میں دستی پچکاری کی سفارش کی جاسکتی ہے۔ اس کا استعمال بھی قدرے سہل ہے اور سفروغیرہ میں استعمال کی جاسکتی ہے، صفائی گرم پانی سے کی جائے، پچکاری کے ذریعے اندام نہانی کی صفائی کے لئے چار پائی پر پشت کے بل لیٹنا چاہیے اور پچکاری استعمال کی جائے، بستر کو پانی سے بچانے کے لئے ربڑ کی چادر چار پائی پر بچھالی جائے، دوسرا طریقہ بیٹھ کر پچکاری کرنا ہے، لیکن یہ پہلے طریقہ سے ذرا کم آرام دہ ہے، کھڑے ہو کر پچکاری کرنا قطعی ممنوع ہے کیونکہ یہ وقت ضائع کرنے کے علاوہ بے فائدہ بھی ہے، ایام کے دوران میں بھی اعضائے نسلی کی صفائی ضروری ہے۔

بعض دفعہ یونی کی صفائی نہ رکھنے سے اعضائے نسلی کی مختلف قسم کی سوزشیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اندام نہانی کی سوجن سے اس کے بیوں میں غارتگی پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح پیشاب کی نالی میں سوجن ہوتی ہے، یہ سب غلاظت یا صفائی نہ کرنے کی مہربانیاں ہیں کیونکہ سوزاک اور صرف غارتگی میں تیز کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لئے فوراً طبی امداد حاصل کی جائے۔

علاوہ ازیں جہاں زنانہ اعضائے تناسل کی صفائی اس قدر اہم ہے وہاں یہ امر بھی فراموش نہ کیا جائے کہ پیشاب یا فضلہ کو دیر تک روکے رکھنا بھی نقصان دہ ہے۔ نوجوان لڑکیوں اور عورتوں کو خاص احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ تناسلی اعضا پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔

حمل کس طرح قرار پاتا ہے :- حمل قرار پانے میں عورت و مرد کے اعضائے تناسل حصہ لیتے ہیں، جس کے متعلق مفصل معلومات یہ کی جاسکتی ہیں، اب فقط اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ بوقت ملاپ بچہ دانی میں مرد کے ویرج کے کیڑے جنہیں دوسرے الفاظ میں اولاد کے کیڑے بھی کہا جاسکتا ہے، عورت کے فڈے سے ملاپ ہونے کو ہی گرہ دان یا حمل کہتے ہیں، حمل ٹھہرنے سے جو چیز بنتی ہے، اسے گرہ یا حمل کہتے ہیں، ڈمب (عورت بچہ) اندہ دانی (اوریز) خلیۃ الرحم میں پیدا ہوتا ہے اور ڈمب پر نالی سے ہوتا ہو اگر بھاشیہ (بچہ دانی، یوٹرس (Uterus) میں پہنچ جاتا ہے عورت

اور مرد کے ملاپ سے مرد کے دیرج کے کیڑے یونی کے اندر پہنچتے ہیں، کبھی کبھی دیرج کے کیڑے میدھے گر بھاشیہ (بچہ دانی) میں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ چونکہ عورت کے اندھے اور مرد کے دیرج کے کیڑے میں کشش ایک قدرتی امر ہے۔ اسی لئے دیرج کے کیڑے ویجاٹنا (یونی) سے ہو کر بچہ دانی میں پہنچ جاتے ہیں، حمل قائم ہونے کے لئے دیرج کے کیڑے کا بچہ دانی میں پہنچنا ضروری ہے، اس سلسلہ میں اگر بوقت ملاپ غفلت کی جائے تو دیرج مہل سے نکل جاتا ہے اور حمل قرار نہیں پاتا۔

میرے پاس متعدد ایسے بے اولادی کے کیس آئے جنہیں ملاپ کے خاص نکات سمجھانے پر وہ بلا دوا با اولاد ہو گئے۔ ان حالات کے پیش نظر برقعہ کنٹرول (ضبط تولید) کے خواہش مند اسی لئے ایسی ادویات، آلات و طریقے استعمال کرتے ہیں جس سے دیرج کے کیڑے اور عورت کے اندھے کا ملاپ نہ ہو۔ اس سلسلہ میں یاد ہے کہ بچہ دانی میں اور اندام نہانی وغیرہ میں دو سے سات دن تک دیرج کے کیڑے زندہ رہتے ہیں اور حمل قائم کرتے ہیں۔ حمل قائم کرنے کے لئے دیرج کے صرف ایک گرم کی ہی ضرورت ہوتی ہے، اگر دیرج کا زیادہ حصہ رحم سے باہر بھی نکل جائے اور ایک کیڑا بھی ڈمب (عورت کے اندھے) سے ملاپ کر جائے تو حمل قائم ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ بعض اوقات جب دیرج کے کیڑوں کو عورت کا اندھہ نہیں ملتا تو وہ ڈمب پر نالی میں ہی بڑھ جاتے ہیں، وہاں ڈمب سے ملتے ہیں، مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے، دیرج کے کیڑے جب ڈمب تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ ڈمب کو چاروں طرف سے چپٹ جاتے ہیں اور اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ طاقت ور کیڑا ہوتا ہے، وہی ڈمب (عورت کے اندھے) کے اندر گھس کر حمل قائم کر دیتا ہے، عام طور پر دیرج کا ایک کیڑا ہی ایک ڈمب کے ساتھ ملتا ہے اور ایک بار میں ایک ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں یا کچھ دنوں کے بعد دیرج کے دو کیڑوں کا عورت کے دو اندھوں سے ملاپ ہو جاتا ہے، ایسی حالت میں حمل بھر جانے کے بعد عورت دو بچے پیدا کرتی ہے، اسی طرح کبھی کبھی دو سے زیادہ بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک سے زیادہ بچے ایک ساتھ ہونے سے کبھی کبھی وہ فوراً ہی مرجھاتے ہیں یا بہت کمزور رہتے ہیں، بعض اوقات دو دیرج کے کیڑوں کا عورت کے ایک اندھے کے ساتھ ملاپ ہو جاتا ہے، ایسی حالت میں دو بچے پیدا ہوتے ہیں۔

بعض سرکاری ہسپتالوں کے زچہ خانے میں بہت سے ایسے عجیب و غریب نمونے شیشے کی بوتلوں میں بذریعہ آپریشن حاصل کئے جاتے ہیں۔

..... کے ایک ہسپتال کے ایک زچہ خانے کی عجائب گاہ میں بہت سے ایسے عجیب و غریب نمونے شیشے کی بوتلوں میں محفوظ رکھے ہوئے ہیں جو اس ہسپتال میں آپریشن کر کے حاصل کئے جاتے ہیں۔ ان میں ایک رحم مکمل حالت میں ایک بڑے برتن میں رکھا ہوا ہے جس کے اندر تین بچے ایک ساتھ موجود ہیں، یہ رحم ایک بس کے پچھلے آئی ہوئی کسی حاملہ مردہ عورت کا پورٹ مارٹم کر کے نکالا گیا تھا۔ ایک برتن میں ایک بچے کی لاش موجود ہے، جس کی شکل بندر سے ملتی ہے، ایک مردہ بچہ ایسا رکھا ہوا ہے، جس کی شکل نہایت خوفناک یعنی سر بہت بڑا اور بانی اعضاء بہت چھوٹے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ بچہ کی شکل اور صحت کا انحصار حیوانات منویہ کی شکل اور صحت پر منحصر ہے، اگر دیرج کا کیڑا ناقص ہوگا تو بچہ بھی عام قدرتی حالت میں نہیں ہو سکتا۔

ہر روز اخبارات میں ایسے عجیب انخلقت بچوں کی پیدائش کے بارے میں قدرت کی کرشمہ سازیاں دیکھنے میں آتی ہیں، اس سلسلہ میں یہ ہے اس بچی کی تصویر جو دھوری (پنجاب) کے قریب کولسری ریلوے اسٹیشن پر پیدا ہوئی اور چند یوم سے زیادہ بچ سکے، تصویر دیکھنے سے پتہ لگے گا کہ اس مخلوق کے دسر اور چار بازو ہیں، لیکن دونوں دھڑ پیٹ سے ملے ہوئے ہیں اور ٹانگیں صرف دو ہیں، اس عجیب خدائی مخلوق کو دیکھنے کے لئے کئی روز تک آنے والوں کا تاننا لگا رہا۔ ہمارے خیال میں ناظرین پر بخوبی واضح ہو گیا ہوگا کہ غیر قدرتی اشکال والے بچے پیروں، فیضوں یا دیوی دیوتاؤں کی ناراضگی کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتے بلکہ اس امر کا تعلق انسانی مادہ تولید کی صحت سے ہے، اگر حیوانات منویہ (دیرج کے کیڑے) تندرست ہوں گے، تو بچہ بھی تندرست اور تمام جسمانی نقص


سے پاک ہوگا۔

جڑواں بچوں کا علاج :- جڑواں بچوں کے علاج کے سلسلہ میں آج تک ہندوستان میں تو علیحدہ کرنے کا کوئی دافعہ ہمارے علم میں نہیں ہے البتہ یورپ میں پچھلے چند سالوں کے اندر اس قسم کے کئی آپریشن کئے جا چکے ہیں جن میں سے کئی ایک کامیاب بھی ہوئے ہیں، دو جڑے ہوئے بچوں کو بذریعہ آپریشن کاٹ کر جدا کر دیا جاتا ہے لیکن یہ عمل نہایت خطرناک اور بے حد نازک ہے جس میں رتی بھر بھی بے احتیاطی ہونے سے دو معصوم زندگیوں کے ضائع ہو جانے کا ہر لمحہ امکان رہتا ہے، لہذا آپریشن میں لانے سے پہلے اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آیا دونوں جڑے ہوئے بچوں کے اعضائے رئیسہ علیحدہ علیحدہ ہیں یا مشترکہ اگر دہل، جگر، گردہ وغیرہ علیحدہ علیحدہ ہوں تو دونوں کو درمیان میں سے کاٹ دیا جاتا جاتا ہے لیکن اس کے برعکس اس کے اگر اعضاء مشترکہ ہوں تو آپریشن سے دونوں کی موت یقینی ہے، اس حالت میں اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے کتاب میں شائع کی گئی تصویر میں لڑکی کے دوسرے ہیں، چار بازو ہیں۔ دھڑ اور ٹانگیں دو ہیں۔ اس حالت میں اگر بچی کے دو دل مختلف جگہوں پر ہوں تو سرجری کی مدد سے شانوں سے سیدھا پیچھے کی طرف اس طریقہ سے کاٹ کر ایک سر اور دو بازوؤں کو علیحدہ کیا جاسکتا ہے، جس سے کہ اس کے تمام جسامہ اعضاء کا ایک سیٹ مکمل رہتا، لیکن ایسے کیس بہت کم زندہ رہتے ہیں۔

ابھی کچھ عرصہ پہلے دہلی کے ایک ہسپتال میں ایک بچہ پیدا ہونے کی اطلاع ملی، جس کا دل اور جگر جسم کے باہر چھپاتی کے اوپر لٹک رہے تھے۔ نوٹو بھی اخبارات میں شائع ہوئی تھی، فاضل ڈاکٹروں نے عمل جراحی سے چھاتی کی کھال کے نیچے کچھ جگہ بنا کر دل اور جگر کو دل لٹکا دیا اور خیال تھا کہ پلاڑی سر جری کی امداد سے کر دل کی حفاظت کے لئے مصنوعی پردے لگا دیئے جائیں گے، لیکن بچہ دو دن کے بعد ہی مر گیا۔

علامات حمل :- حیض کا بند ہو جانا، سویرے اُبکائی اور تھے آنا، چھاتیوں میں اُلٹ پھیر، جنین کا ہونا، مثانہ کا جھپلا ہونا، سچوں وغیرہ کے اُلٹ پھیر، پہلی نشانی یعنی ماہواری کا بند ہو جانا سچی بات نہیں، کیونکہ دق و سِل کے پہلے دنوں میں بھی خون رُک جاتا ہے یا ان عورتوں میں جن کو حمل مانگ ہوتی ہے، حیض رُک جاتا ہے، یہی نہیں بلکہ حمل کے شروع مہینوں میں بخوڑا سا خون حیض کی طرح نکل آتا ہے، دوسری نشانی صبح کی متلی تین عورتوں میں ملتی ہے، جو دوسرے مہینے سے شروع ہو کر تیسرے مہینے میں رُک جاتا ہے، یہ متلی صبح پلنگ سے اُٹھ کر ہوتی ہے اور کبھی تھے۔ ساتھ بخوڑا سا بلغمی مادہ بھی نکل آتا ہے۔ پیٹ کی تبدیلیوں میں پہلی تبدیلی کھال میں سیاہی کا ہونا اور پیٹ کا آہستہ آہستہ بڑھنا ہے۔ چوتھے مہینے میں رحم پیٹ کے اوپر سے ٹوٹ کر معلوم کیا جاسکتا ہے، پہلے تین مہینوں میں ناف زیادہ گہری ہو کر کھینچ جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ابھرنا شروع ہوتی ہے اور درمیان کے تین مہینوں میں اُتھل سمٹھل ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ چھ مہینے گزرنے پر پیٹ کے برابر ہو جاتی ہے اور کبھی آخر کے دو مہینوں میں


کو بھی اُبھر جاتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹ کے نیچے حصہ میں رحم جگہ گھیر لیتا ہے اور آنتیں وغیرہ سب دب کر اوپر آ جاتی ہیں۔ پانچویں دلچسپ نشانی یہ ہے کہ ساڑھے چار مہینے کے لگ بھگ پیٹ میں حاملہ کو ایسا لگتا ہے جیسے ہاتھ میں دبائی ہوئی زندہ چڑیا کا پتہ لگتا ہے، حمل کے آخری دوسرے یا تیسرے ہفتہ میں مثانہ میں خارش ہوتی ہے۔ اور جلدی جلدی پیشاب آتا ہے۔ یہ بات مثانہ پر رحم کے دباؤ سے ہوتی ہے جو پہلے مفتوں میں رحم کے آگے جھکنے اور بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور آخری دو مفتوں میں جنین کے حانہ میں نیچے اترنے کی وجہ سے ہوتا ہے



عورت کے
اندے اور
دیرج کے
کیڑے کا
ملاپ

پھٹوں وغیرہ کے الٹ پھیر سے چڑچڑاپن، ڈر، نہ کھانے والی چیزوں کو کھانے کو جی چاہنا، خصوصاً مٹی وغیرہ، یہ سب باتیں صرف قیاس کی ہیں۔ لیکن ان باتوں سے زیادہ کاملاً حمل کا شبہ پیدا کر سکتا ہے، حمل کی مزید شناخت کے لئے ایک تجربہ کار دایہ رحم کے منہ اور گردن کا معائنہ کر کے حمل کے متعلق صحیح رائے دے سکتی ہے، چنانچہ حمل کے پانچویں یا چھٹے مہینے رحم کی گردن اندام نہانی میں نکلی ہوئی محسوس ہوتی ہے، عنق الرحم پھیل جاتی ہے اور ملائم ہو جاتی ہے۔

اگر دایہ رحم کی گردن میں انگشت رکھ کر آہستہ سے دھکیلے تو وہ حرکت محسوس کرتی ہے، مگر یہ علامت پانچویں یا چھٹے ماہ میں معلوم ہو سکتی ہے۔ اس سلسلہ میں نبض کی حالت لڑکے کے حمل والی عورت میں تیز صاف اور باقاعدہ ہوتی ہے اور لڑکی کے حمل والی عورت میں نبض کی حرکات میں بے قاعدگی اور بھاری پن ہوتا ہے۔



پریٹ کی بڑھوتری
چوتھے سے نویں ماہ
تک

بعض عورتوں کو اور ممکن کو تمام ایام حمل میں جنین کی حرکت محسوس نہیں ہوتی، حرکت محسوس کرنے کی بہترین ترکیب یہ ہے کہ ممکن اپنے ہاتھ کو سرد پانی سے تر کر کے شکم حاملہ پر رکھے، اس سے بچہ حرکت کرنے لگتا ہے، حمل کے پانچویں ماہ شکم حاملہ پر آکر اسے سکوپ (سینہ بین) لگانے سے دل کی حرکت کی آواز سنائی دیتی ہے، جو شمار کی جا سکتی ہے۔ یہ آواز حاملہ کے دل کی آواز سے مختلف ہوتی ہے، حاملہ کے دل سے یہ حرکت تیز ہوتی ہے، کیونکہ جنین کا قلب زیادہ تیزی سے حرکت کرتا ہے۔

حمل کی شناخت کے لئے لہسن کی ایک پھلی چھیل کر رات کو اندام نہانی میں رکھیں۔ اگر صبح لہسن کی بو محسوس نہ ہو تو سمجھو حمل نہیں ہے۔ اگر بو محسوس ہو تو سمجھنا چاہئے کہ حمل ہے۔

حمل کی چھ قسمیں

- ۱۔ حمل طبعی :- عورت کے اندر سے دینے اور اس کے باردار ہو کر جو رحم میں پرورش پانے کا نام حمل طبعی یا حمل صادق ہے۔
 - ۲۔ حمل غیر طبعی :- اگر عورت کا اندر باردار ہو کر رحم میں جانے کی بجائے پردہ صفاق یا حیض میں چلا جائے اور اس کی بڑھوتری وہیں ہو تو اس کو حمل غیر طبعی کہتے ہیں، اس قسم کا حمل خطرناک ہوتا ہے۔
 - ۳۔ حمل بسیط :- اگر مولود ایک ہی ہو تو حمل بسیط ہوتا ہے۔
 - ۴۔ حمل توام :- اگر دو مولود ہوں تو یہ حمل توام ہوگا۔
 - ۵۔ حمل مختلط :- اگر مولود کے علاوہ اور کچھ غیر جنسی چیز پائی جائے، تو یہ حمل مختلط ہوگا۔
 - ۶۔ حمل کاذب :- کبھی حمل صادق یا غیر جنسی چیز یا خون جیھڑ رک جانے سے جس میں شاذ و نادر جان بھی پڑ جاتی ہے، حمل ہو جاتا ہے، اس میں خون حیض بھی بند ہو جاتا ہے اور پیٹ بھی بڑھ جاتا ہے، اس مرض کو بعض لوگ کڑنگ بھی کہتے ہیں۔
- جنین کی بڑھوتری :- جب نطفہ یعنی تخم بچہ دانی میں پہنچ کر ٹھہرتا ہے، تو ماں کا خون اس کی بڑھوتری کے لئے اس تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے اور اس خون کے پہنچنے سے رحم کی جھلی نرم ہونے اور پھولنے لگتی ہے اور نطفہ کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے۔ اور غلاف کی طرح اس پر چھا جاتی ہے، اب نطفہ کی بڑھوتری ہونے لگتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ بچہ دانی کی جھلی بھی پھولتی جاتی ہے۔ تاکہ جنین کے بڑھنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ اب ہمیں ایک مہینے سے لے کر نو مہینے تک جنین کو دیکھنا ہے، چنانچہ ایک مہینے کا جنین آدمی کے لگ بھگ لمبا، بہت سیڑھا سا ہوتا ہے اور اس کا وزن کم از کم ۱۰ ماشہ کے لگ بھگ ہوتا ہے، دماغ اور حرام معز لپٹ کر بند ہو چکے ہوتے ہیں، آنکھ، کان، ہاتھوں

اور پیروں کے نشان بن جاتے ہیں۔ دل چار خانوں میں بٹنے کے لگ بھگ ہونے لگتا ہے۔ دو مہینے کے جنین کی لمبائی ایک انچ اور وزن چار ماشہ کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ سر کی شکل انسانوں جیسی، دم غائب اور لقمہ پیر دکھائی دینے لگتے ہیں، آنکھوں اور کانوں کو پہچانا جاسکتا ہے، عضو تناسل اور مقعد معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن لڑکے اور لڑکی کی پہچان مشکل سے ہو سکتی ہے، تین مہینے کے جنین کی لمبائی ساڑھے تین انچ اور وزن تین ماشہ کے لگ بھگ ہوتا ہے، نال میں بل پڑنے لگ جاتے ہیں، آنٹیں پیٹ میں ہوتی ہیں، لڑکے اور لڑکی کی پہچان صاف دکھائی دیتی ہے، بدن پر مہین مہین روئیں دکھائی دیتے ہیں۔ پانچ مہینے کے جنین کی لمبائی سات یا آٹھ انچ اور وزن ساڑھے آٹھ نو اوونس کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ سر نسبتاً بڑا اور بدن پر ایک سفوف کا چمکا پیر کی طرح کا مادہ ہوتا ہے۔ نال ایک فٹ کے لگ بھگ ہو جاتی ہے، چھ مہینے کے جنین کی لمبائی بارہ انچ اور وزن اڑھائی پونڈ کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ جلد کے نیچے چربی پیدا ہو جاتی ہے اور سر پر بال نکلتے لگتے ہیں۔ سات مہینے کے جنین کی لمبائی ساڑھے چودہ انچ اور وزن اڑھائی پونڈ کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ آنکھ کے پوٹے کھلے، غشائے ہر بی غائب، تمام بدن پر روئیں نکل آتے ہیں، آنٹوں میں بھوڑی سی کالک لکھ ہر مادہ ہوتا ہے، جس کو عقی (میکونیم) کہتے ہیں۔ اس وقت جنین پیدا ہونے کے بعد مشکل سے جی سکتا ہے، آٹھ مہینے کے جنین کی لمبائی سوا انچ اور وزن ساڑھے تین پونڈ کے لگ بھگ ہوتا ہے، سر پر بال ہوتے ہیں، ناخن بھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں، لیکن پوری انگلیوں کے سرے تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس وقت جنین ان تمام محنت کے بعد جی سکتا ہے، نو مہینے کے جنین کی لمبائی ساڑھے سترہ انچ اور وزن ساڑھے پانچ پونڈ کے لگ بھگ ہوتا ہے، جلد کے نیچے چربی پائی جاتی ہے۔ لہذا چہرہ اور بدن پر جھریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ اور دسویں مہینے کے جنین کا وزن سات پونڈ کے لگ بھگ ہوتا ہے، ناخن انگلیوں کے سرے تک پہنچ جاتے ہیں۔ جلد کا رنگ گلاب کی طرح ہوتا ہے، بدن پر روئیں گھٹے کم اور پیر جیسا مادہ زیادہ ہوتا ہے، جنین کے خبیثے صفع میں اتر آتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جنین ہر طرح سے پورا ہو چکا ہوتا ہے، عام طور پر پہلا جنین چھوٹا ہوتا ہے۔

ماں کا خون بذریعہ شریانی رگوں (شریانی رگیں) وہ مٹرخ خون والی رگیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے تمام جسم میں خالص خون دورہ کرتا ہے اور جن رگوں میں خراب خون ہوتا ہے ان کا رنگ نیلیوں ہوتا ہے، یہ وریدیں کہلاتی ہیں، بچہ دانی میں پہنچتا ہے اور آنول سے نال کے اندر سے ہوتا ہوا (پریٹ میں نیچے کو کہتے ہیں) کی ناف کے راستے سے جنین کی رگوں میں داخل ہو کر دورہ کرتا ہے۔ جس سے بچہ طاقت پکڑتا ہے، اس ذریعہ سے وہ خوراک اور ہوا حاصل کرتا ہے اور بچہ کے جسم میں دورہ کر کے پھر نال اور آنول کے ذریعہ ماں کے خون میں ملتا ہے، تاکہ جو خراب ہوا اور فاسد مادہ ہو، وہ ماں کے پیپٹریوں میں صاف ہو کر درست ہو جائیں اور فضلا ماں کے فضلا دور کرنے والے راستوں سے دور ہو جائے۔

جنسی تبدیلی

جنسی تبدیلی یعنی عورت سے مرد اور مرد سے عورت بن جانے کے واقعات مغربی ممالک کے اخبارات میں عموماً شائع ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک پاکستانی طالبہ خالدہ شفقت جعفری آف لاہور کی جنسی تبدیلی کا دلچسپ واقعہ عرصہ تک ہندوستانی و پاکستانی عوام کی دلچسپی کا باعث بنا، تبدیلی جنس کا یہ دلچسپ واقعہ کسی آپریشن کے بغیر محض قدرت کی نیرنگیوں کے باعث ہوا، اور خالدہ شفقت جعفری صنف نازک کے سب سے نکل کر جنس کرخت میں شامل ہو گئی، نسوانیت کے آثار خود بخود غائب ہو گئے اور اب اس خالدہ شفقت جعفری صرف مٹرخ شفقت جعفری بننے لگی۔ نال کا امتحان و طیفہ کے مکر پاس کیا، امتحان پاس کرنے کے بعد وہ اپنے گاؤں سانگلہ ہل ضلع لائل پور چلی گئی، جنوری ۱۹۵۴ء میں خالدہ شفقت جعفری تبدیلی کی علامات محسوس کیں اور پھر بتدریج قدرتی عمل سے لڑکا بن گئی۔ اب اس نے اپنے بال کٹوا دیے ہیں، مردانہ لباس پہنتی ہے اور بروج اتار دیا ہے۔

اخبار مذکور کے نامہ نگار کو ایک ملاقات کے دوران خالدہ نے بتایا کہ تبدیلی جنس سے پہلے میں ایک عام لڑکی تھی، بھولیوں کے جھڑ

میں کھیل کود کر بڑی ہوئی، مجھے بھی وہ تمام چیزیں پسند تھیں جو لڑکیوں کو ہوتی ہیں، بالخصوص بھڑکیلے لباس اور دیگر زنانہ مشاغل سے مجھے بہت رغبت تھی۔ پانچ ماہ پہلے جنسی تبدیلی کا دم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا۔

خالدہ میں اب بھی دو شیرازوں ایسا شریلاپن موجود ہے، گاؤں کی لڑکیاں اُسے ملنے آتی ہیں، تو وہ شرم و حیا کے مائے چھپ جاتی ہے، شہر کی بیشتر سیلیوں سے اس کی خط و کتابت تھی، لیکن اب جنسی تبدیلی کی اطلاع پا کر چند ایک نے قلمی دوستی بند کر دی۔

خالدہ کا ارادہ تھا کہ وہ میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم کے لئے سمندر پار جائے گی۔ اس مقصد کے لئے وہ اپنے بھائی کی رفاقت کی محتاج تھی، لیکن یہ کہتی ہے کہ مجھے تعلیمی عزائم کی تکمیل کے لئے مرد کی حفاظت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔

خالدہ کی آوازیں اب بھی نسوانیت کا لوہا موجود ہے۔ اس کے ماسواہ اس میں کوئی نسوانی عادت یا علامت نہیں پائی جاتی، اپنی پسند کی لڑکی شادی کے ذکر سے بھی قطعاً نہیں شرماتی بلکہ اسے فطرت کا تقاضہ قرار دیتی ہے۔

لیکن اس سے بھی دلچسپ ایک اور عجیب واقعہ جو پنجاب کے اخبار میں مرقوم ہے۔ موضع غازی دٹ ضلع جہلم کے ایک کھار کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، جس کا نام فضل نور رکھا گیا، اٹھارہ برس کی عمر میں والدین نے اس کی شادی کر دی، جب فضل نور کو اپنے شوہر کے پاس پہنچے تو چار سال گزر گئے اور اس کی عمر ۲۳ سال کے قریب ہوئی، تو اس کے دفعتاً محسوس کیا کہ اس میں تمام مردانہ علامات نمودار ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر بھی اور موخپیں بھی نکل آئیں، اور رفتہ رفتہ فضل نور بلبا آپریشن کامل مرد بن گئی، جب فضل نور کے شوہر نے دیکھا تو اپنی آرزوؤں راع گل کر کے فضل نور سے علیحدہ ہو گیا۔

اس کے باپ نے سابقہ بیٹی یعنی موجودہ بیٹے کا نام عبداللہ رکھ دیا اور ایک عورت کے ساتھ اس کی شادی کر دی، جواب تک اس کے گھر آباؤ اجداد کی لڑکی بھی پیدا ہوئی، ایک پُر لطف واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ نے جب وہ نیا نیا مرد بنا تھا ایک لڑائی میں حصہ لیا، پولیس نے اسے گرفتار کر لیا، اس کا ڈاکٹر کی معائنہ کرایا، ڈاکٹر نے رائے دی کہ عبداللہ میں مرد اور عورت کی دونوں خصوصیات غالب ہیں اور اب مردانہ خصوصیت دور دورہ ہے، لیکن دونوں صورتوں میں وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں، لیکن جب اس کی شادی ہوئی تو لڑکی پیدا ہونے سے ثابت اس کے اولاد بھی ہو سکتی ہے۔

عبداللہ اب سیالکوٹ میں ملازم ہے اور بچی اس کے پاس ہے۔

ہم نے صرف دو واقعات پیش کئے ہیں، اطباء نے قدیم سے بھی اس قسم کے واقعات تحریر کئے ہیں۔

جنسی اور طبی سائنس کی رو سے تبدیلی جنس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جب نطفہ لطن مادر میں ہوتا ہے تو وہ اس جگہ مردانہ اور زنانہ ہر دو اثرات کا حامل ہوتا ہے، لیکن بعض مخصوص اثرات کے تحت بچہ میں جو خصائل زیادہ نمایاں ہو جائیں، انہیں کے زیر اثر وہ لڑکا یا لڑکی بن جاتا ہے جس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ ہر فرد میں زنانہ و مردانہ دونوں صفات موجود ہوتی ہیں، خواہ وہ کم و بیش کسی تناسب سے ہوں، اس لئے بعض عورتوں کی مانند ہوتی ہیں اور بعض مرد عورتوں کی طرح حرکتیں کرتے ہیں۔

ان حالات کے تحت تبدیل جنس ممکن ہے اور بعض طبی اثرات کے تحت اس قسم کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔

مغربی ماہرین جنسیات اس مسئلہ پر مدت دراز سے دلچسپی لے رہے ہیں اور تجربات سے یہ ثابت بھی ہو چکا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جانوروں میں تبدیل کیا جاسکتا ہے، ہم نے خود خصوصی تجربات کے بعد بیس مرغیوں کو تبدیلی جنس کے لئے ایک خاص قسم کی غذائی تو کچھ عرصہ بعد اس مصنوعی طریقہ کی جنس تبدیل ہوتے دیکھی گئی۔

ڈنبرا یونیورسٹی کے پروفیسر کوخ کو میٹڈکوں اور کبوتروں پر تجربات کرنے سے بھی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس سلسلہ میں ایک روسی سائنسدان

سب سے بازی لے گیا، اس نے اعلان کیا کہ وہ انسانی صنف کو بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک ہماری رائے ہے، کئی طور پر تو شاید ممکن نہ ہوں، لیکن مخصوص حالات میں وہ ایسا کر سکتا ہے۔ یعنی تمام مرد عورتیں اور تمام عورتیں مرد تو نہیں ہو سکتیں، لیکن خاص حالات ایسا ممکن ہے، ہمارے تجربات کے مطابق اگر جانوروں کی جنس کو تبدیل کیا جاسکتا ہے، تو ممکن ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آجائے جب انسانوں پر بھی تجربات کا میاب ہو جائیں۔

لڑکا پیدا کرنے کا راز

ماہرین جنیات کے تجربات اس بات کے گواہ ہیں کہ جس عورت کے اولاد نہ ہوتی ہو، اسے بانجھ پن کا مرض تصور کرنے مناسب علاج معالجہ سے بانجھ عورتیں صاحب اولاد ہو جاتی ہیں، اسی طرح بعض عورتوں کے ہاں ہمیشہ لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں اور وہ لڑکا پیدا کرنے کے لئے بے قرار رہتی ہیں، اولاد کا نہ ہونا یا لڑکیاں پیدا ہونا یہ سب عوارضات مرض میں داخل ہیں، جس کا مناسب علاج کرنے سے بانجھ عورت صاحب اولاد اور لڑکی پیدا کرنے والی لڑکا پیدا کر سکتی ہے اور ایسی کوشش کسی بھی حالت میں خالق مطلق کے اختیارات کا یہ میں دخل اندازی کے مترادف نہیں بلکہ مرض کا درست علاج ہے۔

طب جدید کے ماہرین جنیات ڈاکٹروں کو بار بار کے تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ عورت کے دونوں خصیتہ الرحم (اورینز) سے ہر ماہ ایک ایک بیضہ انشی خارج ہوتا ہے۔ دائیں طرف کے خصیتہ الرحم سے جو بیضہ انشی خارج ہوتا ہے، وہ بار آور ہونے سے حمل نرینہ ہوگا، اور بائیں طرف کے خصیتہ الرحم سے جو بیضہ انشی برآمد ہوتا ہے، وہ بار آور ہونے سے حمل مادینہ ہوتا ہے۔ اور ہر ماہ یہ خصیتہ الرحم باری باری بیضہ انشی خارج کرتے ہیں، مگر جب تک کوئی بچہ پیدا نہ ہو، یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ اس ماہ کس خصیتہ الرحم کی باری ہے، ہاں ایک بچہ پیدا ہونے کی حالت میں استقرار حمل کا مہینہ معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اور اس حساب سے نر اور مادہ بچے پیدا کرنے والے مہینوں کا حساب آسانی سے لگایا جاسکتا ہے۔ لہذا جو لوگ لڑکا پیدا کرنے کے خواہشمند ہوں، وہ اس ماہ — ملاپ کریں، جس ماہ دائیں خصیتہ الرحم سے بیضہ انشی نکلنے کی باری ہے۔ مزید شناخت کے لئے یہ طریقہ ہے کہ اکثر عورتوں کو حیض آتے وقت ہر ماہ باری باری ایک طرف تکلیف ہوتی ہے۔ جس طرف جس ماہ تکلیف ہو تو سمجھ لیں کہ اس ماہ کے خصیتہ الرحم سے بیضہ انشی برآمد ہوا ہے۔ بلکہ اس طرف کے پستان میں معمولی سادرد معلوم ہوتا ہے اس نظریہ کی تائید میں ایک ماہر جنیات لکھتے ہیں کہ عورت کے بائیں خصیتہ الرحم کو اگر آپریشن کے ذریعہ نکال دیا جائے تو ہمیشہ لڑکا ہی پیدا ہوگا، کیونکہ اگر خصیتہ الرحم کو پورے طور سے نکال بھی لیا جائے، لیکن اگر اس کا ذرا سا حصہ بھی رہ جائے گا، تو وہ پھر نشوونما پا کر اپنا کام کرنے لگے گا۔

بعض قدیم اطباء نے بھی اس نظریہ کی تائید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ دائیں طرف اولاد نرینہ کے لئے مخصوص ہے، اس وجہ سے کہ وہ زیادہ گرم رہتی ہے۔ لہذا جو عورتیں ہمیشہ اپنی داہنی کروٹ لیٹا کریں، خصوصاً — ملاپ کے بعد، تو ان کے عموماً اولاد نرینہ ہوگی۔

ایک ماہر جنیات لیڈی ڈاکٹر اپنے وسیع تجربات کی بنا پر لکھتی ہیں کہ جس عورت کو حیض اپنے معززہ وقت پر یعنی ۲۸ دن سے پہلے شروع ہو جاتا ہے اور خون بکثرت آتا ہے۔ ان کے ہاں عموماً لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں اور جن عورتوں کو ۲۸ دن کے بعد درکم تعداد میں آتا ہے۔ ان کے ہاں لڑکے پیدا ہوتے ہیں نیز ایام ماہواری کے ابتدائی حصہ یعنی تیسرے اور چھٹے دن کے اندر بہت کم حالتوں میں لڑکے پیدا ہوتے ہیں۔

مذکورہ لیڈی ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ نوعمر عورتیں جو حمل کرنے کی مجرمانہ حرکت کرتی ہیں یا استقاط حمل جو خواہ کسی حادثہ کا نتیجہ ہو، خواہ بے وقوفی سے اس سے عورت کے خصیتہ الرحم اور ماؤف پر خون بہنے سے ایک قسم کا سکتہ پیدا ہوتا ہے، جس سے اس کے بعد اس کی نفیلت بند ہو جاتی ہے اور اس کی طاقت اور مصروفیت دوسرے خصیتہ الرحم یعنی بائیں طرف تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور اگر رحم کا بائیں

شہ زیادہ مستعدی اور چستی و تحرک پیدا کر کے مادہ تولید پیدا کرتا ہے جس کے نتیجہ کے طور پر ایسی عورتیں مستقبل میں اولادِ نرینہ سے محروم ہوتی ہیں اور ایسی عورتوں کو عام طور پر لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، جو تمام نظریات کا قابلِ تسلیم نچوڑ ہے۔

حاملانِ طبِ قدیم کے اس نظریہ سے ہم بھی اتفاق کرتے ہیں کہ رحم میں جب نطفہ قرار پاتا ہے تو قوتِ حصورہ کے فعل سے ایک قسم کی جھاگ سی پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے درمیان دو نقطے پیدا ہوتے ہیں، ایک ان میں سے دل کا اور دوسرا جگر کا حصہ بنتا ہے، اسی طرح نطفہ میں تبدیلیاں ہوتے تے آخر اعضا میں خدوخال معلوم ہوتے ہیں، پھر ان میں تیز معلوم ہوتی ہے، اس کے بعد جب تکمیلِ خلق ہو جاتی ہے تو جنین کو نر یا مادہ کہا جاسکتا ہے اور قدرت کا یہ فیصلہ عموماً چوتھے ماہ میں شروع ہو جاتا ہے، تکمیل اگر جنین نر ہے تو اوسط ۲۵ دن میں، اگر مادہ ہے تو ۴۵ دن کے قریب ختم ہوتی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تکمیل تکوین انات بہ نسبت ذکر و دیر میں ہوتی ہے۔ کیونکہ قوتِ حصورہ یا افعال کی بنا حرارتِ غریزی سے ہے۔ اس لئے رحم میں جنین کی تبدیلیوں اور بڑھوتری کا سبب حرارت اور رطوبتِ غریزی پر ہوتا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر حرارت و رطوبت غالب ہوگی یعنی حرارتِ غریزی اگر رحم میں زیادہ ہو تو تکوین جلد ہو سکے گی یعنی جنین نر بنے گا اور کم ہونے کی حالت میں اس کی تکمیل بدیر یعنی جنین مادہ ہوگا۔

اس آخری اور صحیح نظریہ کے بعد یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ حمل کے چوتھے ماہ جنین کے نر و مادہ ہونے کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور جس ت کے ہمیشہ لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، گویا اس کے رحم میں حرارت و رطوبتِ غریزی کی ہمیشہ کمی رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے ہاں حملِ مادہ ہوتا ہے، اب اگر حمل قرار پاتے ہی یعنی حمل کے پہلے، دوسرے یا تیسرے ماہ بچہ دانی میں اس کمی کو پورا کر دیا جائے تو یہ حمل نرینہ ہو سکتا ہے اور قصد کے لئے مندرجہ ذیل نہایت مجرب علاج پیش کیا جاسکتا ہے، جس کے باقاعدہ استعمال سے یقیناً لڑکا ہی پیدا ہوتا ہے، چاہے اس سے ہی لڑکیاں کیوں نہ پیدا ہو چکی ہوں، اس کے علاوہ اس معجون کا خاص فائدہ یہ ہے کہ اس کے استعمال سے حاملہ اکثر امراض سے محفوظ رہتی ہے، حمل اٹھ ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد بچہ حملہ امراض سے محفوظ رہتا ہے، طاقت و راور خوب صورت ہوتا ہے، دانت آسانی سے نکالتا ہے اور نہایت ہونہار ہوتا ہے نیز اسقاطِ حمل کی عادی عورتوں کے لئے آزمودہ نسخہ ہے اور اکثر امراضِ دماغی اور اعصابی سے محفوظ رہتا ہے، وہ نسخہ یہ ہے:-

مروریدِ ناسفتہ ۹ ماشہ، عنبرِ شہب ۲ ماشہ، ورقِ چاندی، ورقِ سونا بمیں بمیں عدد، کبریا شمع، کشتہ یخِ مرجان، صندل سفید، صندل سُرخ، طباشیر، درونجِ عقربی، عودِ صلیب، ابریشم خام شدہ، یخِ انجبار گُلِ ارمنی ہر ایک ۹ ماشہ، مغزِ پیٹھا، تخمِ خرفہ ہر ایک ڈیڑھ تولہ، شربتِ انگور، شہد ۵ اتولہ، چینی ۱۱ اتولہ۔

پہلی دوا دویہ کو روح کیوڑہ میں کھل کر کے اور دوسری ادویات کو الگ الگ کوٹ چھان کر شربت و شہد اور چینی میں ملا کر معجون بنا کر آخر میں لالیں، شروع حمل سے دو تین ماشہ یہ معجون ہمراہ دودھ یا عرقِ کلاب یا آبِ تازہ سے لگاتار تین ماہ استعمال کرائیں اور انتظار کریں انشاء اللہ لڑکا ہوگا۔

ایسی کئی دوائیوں کا علم بھی ہمیں ہے جس میں ایسا وصف پایا جاتا ہے، جس سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، ان حالات میں اگر سچے موتیوں اور موتیوں سے تیار کردہ "مشرینہ" حاملہ کو تیسرے ماہ کے اندر کھلا دیں تو اس کے استعمال سے لڑکا پیدا ہوتا ہے اور بھروسہ کی چیز ہے، قیمت ۴۵ روپے ہے۔

حفظِ صحتِ حاملہ:- چونکہ حمل ایک طبعی اور قدرتی حالت ہے، اس لئے ضروری ہے کہ اس کے نتیجہ میں عورت کی صحتِ خاطر خواہ طور پر رہے، کیونکہ قدرت کا کوئی طبی عارضہ ایسا نہیں جو انسان کو ضمناً فائدہ نہ پہنچاتا ہو اور یہ حقیقت ہے کہ حمل کی حالت میں عورت کی صحت

نمایاں طور پر ترقی کرتی اور اس کے حُسن و توانائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور میرے نزدیک حمل ہی قدرت کا وہ ٹیکا ہے جو عورت کی پوشیدہ طاقتوں کو نشوونما دیتا اور اندرونی حُسن کو نمایاں کرتا ہے۔

آج سے دو سو سال پہلے جب مغرب موجودہ تمدن کی لعنت سے کھیر پاک تھا۔ اور برکت کنٹرول کا بھوت سروں پر سوار نہ تھا۔ حاملہ عورت ہی حُسن و جمال کی دیوی سمجھی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ حمل میں ہی وہ اپنی تصویر بنواتی تھی۔ اور جو بد نصیب یا بچہ عورت تصویر بنوانے کی خواہش کرتی تو وہ بھی پریٹ پر روئی باندھ کر مصور کے سامنے جاتی، تاکہ اس کی تصویر خوبصورت معلوم ہو۔ اور اس کے عقر (بے اولادی) کا عیب چھپ جائے، مگر بد قسمتی سے آج مغرب اور اس کی بدولت مغرب زدہ مشرق میں حمل کو ایک بدترین لعنت خیال کر کے اس سے بھاگنے کی کوشش کرنا جدید فیشن میں داخل ہو گیا ہے۔ اس سلسلہ میں ہمارے پاس درجنوں ایسے نوجوان آئے، جو حقیقتاً اولاد کے خواہش مند ہوتے ہوئے بھی صرف خوبصورتی کی حفاظت کے لئے غلط خیال سے برکت کنٹرول کے خواہش مند تھے، گویا حمل ایک ایسا ٹیکس ہے جو تہذیب سے متاثر ہو کر مغرب زدہ مشرقی عورت برضا و رغبت ادا کرنا نہیں چاہتی ہے۔

نوجوان طبقہ کا یہ خیال بہت ہی جاہلانہ ہے کہ دودھ پلانے سے عورت کے حُسن و جمال میں انحطاط عارض ہو جاتا ہے اور یہ وظیفہ عورت کے جسم کی خوب صورتی، اس کے قد کی زیبائی، اس کے شانوں، گردن اور سینے کے بھراؤ اور خوب صورتی میں کمی پیدا کر دیتا ہے۔ اس لئے جس قدر بھی زمانہ قدیم میں شہرہ آفاق حسین عورتیں گزری ہیں، تاریخ سے کہیں پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے یہ فرضیہ خود ادا نہ کیا ہو۔

اس کے علاوہ اب بھی ایسی دوسری قومیں آباد ہیں، جو اپنے بچوں کو دوسری عورتوں سے دودھ پلانا عار سمجھتی ہیں اور موجودہ زہریلی تہذیب سے کوسوا میں۔ مگر ان قوموں کی عورتیں صحت، تندرستی، زیبائی، قد اور حُسن و جمال میں ان سے کہیں زیادہ ہیں، جنہوں نے دودھ پلانا ترک کر دیا ہے، قدرت کے اس قدر حادثات نسل کو تباہ کرنے کے لئے پہلے ہی موجود ہیں، اگر ان میں عورت کا جابرانہ ہاتھ بھی شامل ہو جائے۔ تو پھر انسانی نسل کی خیر نہیں۔ شرح پیدائش اور اموات میں کوئی تناسب نہیں، کیونکہ بچہ پیدا کرنے والی محضہ اگر ایک ہے تو مارنے والے ہزاروں، پھر پیدائش عموماً ایک بچہ کی دو تین سال کے بعد اور نوما کی طویل مدت میں ہوتی ہے، مگر موت ۹ منٹ کے قلیل عرصہ میں واقع ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ قدرتی حوادث، زلازل، طوفان، سیلاب، آتش زدگی، قحط اور وباؤں کی وجہ سے تو ایک منٹ میں ہزاروں جانیں موت کے گھاٹ اتر سکتی ہیں، لیکن پیدائش اس سرعت سے کبھی نہیں ہوتی، غرض عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ حمل ایک مقدس فرض ہے، زحمت نہیں بلکہ عین رحمت ہے، بیماری نہیں بلکہ صحت اور تندرستی ہے، آلام نہیں بلکہ انعام اور فضل ہے، قدرت نے اس طبعی فرض کو بخوبی سراسجام دینے کے لئے ایسے ایسے سامان فراہم کئے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، چنانچہ حمل کے ایام میں عورت کے جسم میں چربی زیادہ ہو جاتی ہے جو نہ صرف اس کے حُسن کو دوبالا کرتی ہے، بلکہ اس کو سردی و گرمی سے بچا کر غذا کا کام بھی دیتی ہے۔

وضع حمل کے وقت سب سے زیادہ خطرہ جریان خون کا ہو سکتا ہے جو آنول کی پیدائش کا لازمہ ہے، لیکن حاملہ کے خون میں ایسے ایسے ذرات کثرت سے اضافہ ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے خون گاڑھا ہو کر جریان خون کو روک دیتا ہے، مثلاً اقراص خون اور فائبرین کی زیادتی، دوسرا خطرہ جو وضع حمل کے بعد ہو سکتا ہے، وہ پریسوت کے بخار کا خطرہ ہے جو ہزاروں عورتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اس کا بھی قدرت نے یہ حکیمانہ انتظام کیا ہے کہ حمل کی حالت میں خون کے سفید دانے زیادہ ہو جاتے ہیں، جو موزی جراثیم کا اس خوبی اور چستی سے مقابلہ کرتے ہیں کہ بخار کا خطرہ عام حالات میں بہت کم ہوتا ہے، جہاں یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے، اس کا باعث ہماری غفلت، غلاطت اور قوانین صحت کی خلاف ورزی ہو کرتی ہے۔

جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے کہ حمل ایک طبعی اور قدرتی حالت ہے، لیکن اس کے باوجود آج کل کے چلن نے اسے ایک بیماری بنا دیا ہے، یہی ہے کہ حاملہ کے لئے حفظان صحت کا دھیان رکھنا بڑا ضروری ہے۔ حاملہ اپنے ضروری گھریلو کام کر سکتی ہے، رات دن دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ محنت کرنے والی عورتیں بہ نسبت آرام کرنے والی عورتوں کے حمل کے دنوں میں اور بچہ پیدا کرنے کے وقت بھی اچھی رہتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بدن

دماغ وغیرہ بالکل متکاڑا جائے۔ بلکہ تھوڑی سی سب چیزیں اختیار کی جائیں، بے سفر، خراب سڑکوں یا ریل پر ہوں، تکلیف پہنچا سکتے ہیں، کھانے میں صرف تازہ پھل اور سبز ترکاریاں اچھی ہیں، گوشت اور انڈے وغیرہ نہ کھانے چاہئیں، پاخانہ بھی چوبیس گھنٹہ میں ایک بار کھل کر، ہو جانا ضروری ہے، لیکن دست لانے والی تیز دوائیوں سے بچنا چاہیے، چوبیس گھنٹہ میں ایک بار مناسب حرارت رکھنے والے پانی سے نہانا چاہیے۔ وضع حمل کے دوران میں مجامعت ہرگز ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔

حمل کے ایام میں عورتوں کو متلی کی شکایت رہتی ہے، تھوک بکثرت پیدا ہوتی ہے، اس لئے ترش چیزیں استعمال کرنی چاہئیں، بعض حاملہ عورتیں بڑی عجیب چیزیں کھانے کی خواہش مند ہوتی ہیں، مثلاً ملٹانی مٹی (گا جنی)، چوہے کی مٹی، کوئلہ، سنگھاٹے، شکر قندی وغیرہ ان چیزوں سے جو معدہ کو تھکاتے اور قابض ہوں، ان سے پرہیز رکھنا ضروری ہے، حاملہ کی غذا زود ہضم اور قوی ہونی چاہیے۔

حتیٰ الوسع لباس حسب موسم ہلکا اور اس قدر ڈھیلا ہونا چاہیے کہ روشنی اور ہوا بخوبی تمام جسم کے ساتھ چھو سکے اور جو باندھنے والا نہ ہو بلکہ کندھوں پر پڑا ہے، وزنی لباس نہ صرف کام کاج میں تکلیف دیتا ہے بلکہ اس سے شکاوت بھی پیدا ہوتی ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ موسم سرما میں حاملہ کو زیادہ سے زیادہ کپڑے پہننے چاہئیں، لیکن یہ خیال غلط ہے بلکہ تھہرہ تھہرہ کپڑا پہننے والی عورتیں ہوائی تبدیلیوں کا مقابلہ سردی کھائے بغیر نہیں کر سکتیں، اس لئے جسم کے آرام اور سہولیت کے لئے موسم سرما میں ہلکا گرم لباس پہنا چاہیے، حاملہ کو ایسے کپڑے ہرگز نہ پہننے چاہئیں، جن سے اس کے پستان اور کمر کے نیچے کے اعضاء پر دباؤ ہو، انگلیہ اگر پہنے تو بہت ڈھیلی، لیکن جن عورتوں کے پستان بڑے ہوں، ان کو پستان پوش استعمال کرنا چاہیے۔

نیز حاملہ عورتوں کی حرکات و سکنات کا اثر ان کے پیدا ہونے والے بچے پر کتنا عجیب پڑتا ہے، اس کا اندازہ ذیل کے اس تاریخی واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے :-

مشہور طبیب بقراط کے زمانے میں ایک شہزادی کے یہاں حبشی کا بچہ پیدا ہوا، اس پر بد چلنی کا الزام لگایا گیا، آخر معاملہ عدالت تک پہنچا، بقراط نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ عورت کے کمرے میں ایک حبشی کی تصویر لٹکی ہوئی تھی۔ جس کو وہ اکثر دیکھا کرتی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لا شعوری طور پر اس کے ذہن میں حبشی کی تصویر مرسم ہو گئی اور اس کے یہاں حبشی بچہ پیدا ہوا۔

بقراط نے جب اپنی طبی شہادت دیتے ہوئے عدالت کو یہ حالات سنائے تو فاضل منصف نے شہزادی کو با عزت بری کر دیا۔ ڈاکٹر پائے ایک لڑکی کا حال لکھتا ہے کہ اس کے بدن پر ریچھ کی طرح بال تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ماں کے کمرے میں ریچھ کی تصویر تھی، جس کو وہ اکثر دیکھا کرتی تھی۔

پس ماں بننے والی ہر عورت کو چاہیے کہ حمل کے دنوں میں وہ نفسانہ تصورات اور منظرات مہیبہ اور تخیلات فاسدہ سے دور رہے اور خیالات و حالات پاک اور صاف رکھے۔

حمل کے چھٹے مہینے کے بعد حاملہ کو اپنے پستان اور سر پستان کی صفائی کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ کیونکہ دوران حمل میں پستانوں سے ایک قسم کی رطوبت مترشح ہوتی ہے اور سر پستان کے ارد گرد جمع ہو کر سوکھ جاتی ہے۔ اگر اس رطوبت کو اسی جگہ جمع رہے دیا جائے، تو پستان میں درد اور سر پستان کے ارد گرد کی جلد شق ہو جاتی ہے۔ اس تکلیف سے بچنے کے لئے حاملہ کو روزانہ بورک لوشن اور پاک و صاف روئی سے سر پستان کو اچھی طرح سے دھو کر مکھن یا صاف ویزلین لگا دینا چاہیے نیز حاملہ کو چاہیے کہ حمل کے آخری دنوں میں سر پستان کو انگلی اور انگوٹھے سے ذرا کھینچتی رہے تاکہ وہ باہر ابھر آئیں اور بچہ ان کو آسانی سے منہ میں لے کر چوس سکے۔ سر پستان کی میل کو اتارنے کے لئے نیم کے پتے ۵ گرام .. اگر گرام پانی میں ابالیں اور صاف روئی سے سر پستان کو اچھی طرح صاف کریں۔ بعد میں اوپر سرسوں کا تیل لگا دینا بھی مفید ہے۔

گرہ پات، اسقاطِ حمل، ایارشن، (Abortion)

تعریف مرض :- حمل کی طبعی مدت تقریباً نو مہینے اور کچھ دن ہوتی ہے، جب جنین مقررہ مدت سے پہلے ہی رحم سے خارج ہو جاتا ہے تو

اسقاطِ حمل کہتے ہیں۔

حمل کرنے کا خطرہ حمل قائم ہونے سے بچہ پیدا ہونے تک کسی وقت ہو سکتا ہے، لیکن اس کا زیادہ خطرہ سیرے ماہ تک ہوتا ہے، اس کے بعد حمل کے بچتے ہونے کے باعث اس کے گرنے کا اندیشہ بہت کم ہوتا ہے، اگر کسی وجہ سے ساتویں مہینے میں حمل گر جائے تو بچہ عموماً زندہ رہتا ہے اور سات ماہ سے کم عرصہ کا جنین عموماً زندہ نہیں رہتا

بغارت میں حمل گرانا قانوناً مجرم ہے اور کبھی حمل گرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، لیکن بعض حالتوں میں جب دو تین مستند معالج متفق ہوں کہ مریضہ کی زندگی بچانے کے لئے اسقاطِ حمل ضروری ہے۔ مثلاً حمل میں مرا، ہوا بچہ ہو۔ پرسوت کا درد ہو اور پتہ باہر نہ آتا ہو، مرے ہوئے بچے کی زچہ پھیل جانے سے عورت کے مرنے کا ڈر ہو یا حمل نہ گرنے سے عورت کو خطرناک امراض لاحق ہو جانے کا اندیشہ ہو، ان حالات میں مستند ڈاکٹروں کی صلاح سے مریضہ کی زندگی بچانے کے لئے ایسا کیا جاسکتا ہے۔ ان حالتوں کے علاوہ حمل گرانا بھاری مجرم ہے۔

وجوہات :- اچھلنا، کودنا، زینے پر چڑھنا، دہشت، کثرتِ مجامعت، رنج و غم، انکارِ دالام کی زیادتی، مسہدات یا قے لانے والی ادویہ کا استعمال، امراضِ رحم، عام کمزوری اور خون کی کمی، گرم اور ثقیل چیزیں کھانا، چوٹ لگنا، بھاری بوجھ اٹھانا، بھپکڑے والی سواریوں میں سفر کرنا، ارادہ حمل گرانا (جو ہندوستانی قانون کے مطابق مجرم ہے) اور بعض خاص امراض مثلاً چیچک، خسرہ، شدید ملیریا، منونیہ، سل، شدید کھانسی وغیرہ۔ بعض عورتیں بلا کسی خاص سبب کے اسقاطِ حمل کی عادی ہوتی ہیں، اس صورت میں عموماً تیسرے چوتھے مہینے اسقاطِ حمل ہو جایا کرتا ہے۔

علامات :- اسقاط سے پہلے عورت سُست اور بے چین رہتی ہے۔ کمزوریت اور رالوں میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد درد ہوتا ہے۔ جو آہستہ آہستہ بڑھ جاتا ہے اور بچہ دانی سے خون جاری ہو جاتا ہے، بعض عورتوں کو اسقاط کے وقت متلی ہوتی ہے یا قے آجاتی ہے۔ بعض کو خون کم آتا ہے بعض کو اتنا زیادہ آتا ہے کہ موت کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ بچہ دانی سے خون بہنے لگتا ہے، خصوصاً جب کہ دوسرے یا تیسرے مہینے کا حمل ساقط ہو، ہو، پستان نرم ہو جاتے ہیں، ان کی جسامت فوراً گھٹ جاتی ہے، اندام نہانی کشادہ اور ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ رحم اپنے مقام سے نیچے کی طرف مائل ہو جاتا۔ رحم کا منہ اس قدر کھل جاتا ہے کہ انگشت اندر جاسکتی ہے۔

علاج :- اسقاطِ حمل سے اس قدر قیمتی جانیں ہر سال ضائع ہوتی ہیں کہ ان کی تعداد امواتِ اطفال سے بھی زیادہ ہے، بعض عورتوں کو ایک دو بار اسقاطِ حمل ہو جاتا ہے تو ان کا حمل ہر بار گرنے کی ایک عادت سی ہو جاتی ہے۔ جس سے ایک تو اولاد پیدا نہیں ہوتی، دوسرے عورت کی صحت نہایت بُرا اثر پڑتا ہے۔

اسقاطِ حمل روکنے کے لئے فوراً ہی کسی لائق طبیب یا طبیہ کو بلا لیا جائے، معالج کو پہلے چار پائی کو پاؤں کی طرف سے چھ سات اینچ اونچا کر چاہیے تاکہ مریضہ کے خون کا بہاؤ سر کی طرف ہو۔

لیڈی ڈاکٹر یا طبیہ کا پہلا فرض یہی ہونا چاہیے کہ حمل کو بچا لیا جائے اور اس کے لئے علاج میں پوری کوشش ہونی چاہیے، اگر ایسی حالت ہو کہ بچا یا نہ جاسکتا ہو تو فوراً ہی بذریعہ آپریشن بچہ دانی کو صاف کر کے عورت کی زندگی بچانی چاہیے اور ایسی حالت میں دیر نہ کریں اور لیڈی ڈاکٹر مریضہ کو ریجین جیتے وقت آپسٹک (Asceptic) کا بہت دھیان رکھنا چاہیے، اپنے اوزاروں اور جو کچھ بھی استعمال کیا جائے وہ بھی کسی نئی

لوشن میں بھگو کر خشک کر لیا گیا ہو۔

گر بھپات (اسقاط حمل) کو روکنے کے لئے ایسی ادویات جن کا ذکر کثرت حیض میں بیان کیا گیا ہے۔ بہت مفید ہیں۔ اس کے علاوہ جنین کی حفاظت کے لئے ڈامسٹ ای کا بصورت گولی استعمال میں مفید ہے۔ جدید ڈاکٹری ادویات میں پروجیسٹرون (Progestrone) (ڈاکٹر سٹن برٹش میڈیکل میں رقمطراز ہے کہ اس نارضہ کو روکنے کے لئے ڈامسٹ ای سب سے بڑھ چڑھ کر ہے اور میں نے اسے پروجیسٹرون سے بھی بڑھ چڑھ کر پایا ہے، پروجیسٹرون کا استنما حاملہ عورت میں خطرات سے خالی نہیں جبکہ ڈامسٹ ای مضرات سے پاک ہے، مقدار پچاس بی ایم دن میں تین بار دیں) یا لیوٹوسائیکلین (Lutocyclin) کا ٹیکہ بھی ایک سے دوسری کی مقدار میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس کے خوردنی مرکبات پروجیسٹرون (Progestarol) اسقاط کے خطرہ کو روکنے کے لئے اور امراض رحم میں عمدہ علاج ہے۔ سب با کمپنی اسے لیوٹوسائیکلین کے نام پر تیار کرتی ہے جیسا کہ ہم کچھ چکے ہیں کہ اگر کسی حالت میں حمل کو نہ بچایا جاسکتا ہو تو مر فیضہ کی زندگی بچانے کے لئے بذریعہ آپریشن بچہ دانی کو صاف کر دینا چاہیے۔

ماڈرن ادویات، ۱۔ لیوٹوسائیکلین (Lutocyclin) سبباً دس اور پچیس بی گرام کا عضلاتی انجکشن دو یا تین بار ایک ہفتہ کے اندر دیں، عام طور پر اسقاط کو روکنے کے لئے دس بی گرام امپول کا عضلاتی انجکشن روزانہ کیا جائے۔ جب جریبان خون اور درد کم ہونے لگے تو انجکشنوں کا وقفہ بڑھا دیا جائے، مقدار استعمال رفتہ رفتہ کم کر کے علاج بند کر دیا جائے، یہی دو لیوٹوسٹیٹ، لیوٹوفام (بی ڈی، ایچ)، لیوٹوگل (روسل)، لیوٹرین (بائر ناموں سے مارکیٹ میں ملتی ہے)۔

۲۔ جن عورتوں کو اسقاط حمل کی عادت ہو، انہیں ویٹ جرم آئیل (ڈامسٹ ای) دو کیپ شولڈرن میں تین بار چند روز کھلائیں، اس کے بعد صرف دو کیپ شولڈرن روزانہ دیں، یہ دو جنین کی محافظ ہے، ڈامسٹ ای مندرجہ ذیل پیٹنٹ ناموں سے ملتی ہے :-

A ایفانیل (Ephyanal) _____ روش
C - زائی گون (Zygon) _____ سارا بجائی
E - ویٹولین (Vitoline) _____ گلیکو
B - ای وی من (Evimin) _____ سی ڈی، سی کمپنی
D - فائی ٹوفیرول (Phytofrol) _____ بی ڈی ایچ
F - رووی گان (Rovigon) _____ روش (ای ڈامسٹ ای اور ڈامسٹ ای کا مرکب ہے)۔

۳۔ پروجسٹین (Progestin) بی ڈی، ایچ _____ یہ کارپس یوٹیم ہارمون کا روغنی محلول ۵ یا ۱۰ بی گرام کا امپول نوڑ کر بذریعہ عضلاتی انجکشن روزانہ مرض کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کم کر کے پروجیسٹرون ایک دو کمیاں صبح و شام کھلائی جائیں۔

۴۔ اورے سکروا، (Orasecron) شیرنگ _____ یہ کمیاں پروجیسٹرون اور الیسٹروجن کی مرکب ہیں، ایک ٹیکہ روزانہ ایام شروع ہونے کے دن سے بارہویں تا پندرھویں دن کمندی شروع کی جائے، تو امید ہو جاتی ہے اگر امید نہ ہو تو ایام آنے پر علاج بند کر دیا جائے، اگر امید ہو چکی ہو تو اسقاط کے لئے یہ علاج چھ ماہ تک جاری رکھا جائے۔

۵۔ ڈائی سکرون (Disecron) شیرنگ _____ ایک سی سی بذریعہ عضلاتی انجکشن ہر تیسرے دن استعمال کی جاتی ہے، یہ علاج سابقہ ایام شروع ہونے کے دن سے شروع کیا جاتا ہے، اس کے فوائد کی طرح ہیں، ۵ دن کی ادویات حمل کی پہچان کے لئے بھی استعمال کی جاسکتی ہیں۔ اگر ۵ کا انجکشن روزانہ لگایا جائے اور سات دنوں کے اندر ایام نہ آئیں تو یہ امید ہو جانے کی دلیل ہے۔

۶۔ پرولولوٹا، (Proluton) شیرنگ _____ یہ پروجیسٹرون کا روغنی محلول ہے اور پانچ دس اور پچیس بی گرام کے امپول ملے ہیں۔ کھانے کے لئے پرولولوٹن سی ٹیبلٹس (Proluton C Tablets) بذریعہ دہن کھلانے کے لئے ملتی ہیں۔

۷۔ یونی پروجسٹین (Uni Progestin) یونیکم _____ کا ایک امپول عضلاتی انجکشن سے دیں۔

۸۔ پروجسٹروال (Progestoral) آرگنن ————— یہ کارس بیوٹم ہارمون کی گولیاں ہیں، خوراک ۵ سے ۱۰ ملی گرام معالج کی رائے کے مطابق دیں۔

۹۔ سیکروسترون (Secrosteron) برٹش ڈرگ ————— یہ ایک کامیاب پروجسٹرون ہے اور مخالف اثرات سے خالی ہے۔ عادی اسقاط میں ۵ ملی گرام روزانہ دیں۔

مستقبل میں اسقاط حمل کی عادت کو روکنے کی تدابیر میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حمل منالج ہو جانے کے بعد مریضہ کو کئی دن تک کسی قسم کی نقل و حرکت نہ کرنی چاہیے، عام طور پر عورتیں اسقاط حمل کے دو چار دن بعد ہی چلنے پھرنے لگتی ہیں، یہ سراسر مضرت ہے۔ جن عورتوں کو اسقاط حمل کی عادت ہو، ان کے متعلق معالج کو خاص توجہ سے تشخیص مرض کی ضرورت ہے۔ دایہ کی امداد سے اندرونی حالت بھی معام کی جاسکتی ہے اور پھر رنج سبب سے کام لیں۔

عادی اسقاط میں سب سے بڑا علاج حمل کے بعد عورت اور مرد کا بالکل علیحدہ رہنا ہے، پیٹ پر ہلکا سا دھاگا باندھنا بھی اسقاط حمل کو روکتا ہے، بشرطیکہ عورت پر اس بات کا اثر ڈالا جائے کہ یہ دھاگا کسی بزرگ نے دیا ہے اور اس سے اسقاط حمل ہرگز نہ ہوگا، ایسے دھاگے آٹھ مہینے گزر جانے پر کھول دینا چاہیے۔ اس سلسلہ میں اگر معز کر بخوہ سالم سات دانہ سُرخ ریشمی ڈورے میں پرو کر حاملہ عورت کی کمر میں باندھیں تو اسقاط حمل سے محفوظ رہے گی، "محافظ حمل" کے کچھ عرصہ متواتر استعمال سے حمل گرنے کا خطرہ نہیں رہتا اور بطور حفظ ماقدم حاملہ کو حمل کے دوران کھلانے سے زچہ اور بچہ دونوں کے لئے فائدہ مند ہے، قیمت ۱ روپے ہے۔

اسقاط حمل روکنے کے لئے مندرجہ ذیل نسخہ جات مفید ہیں :-

۱۔ لڑکا پیدا کرنے کا راز "میں جو نسخہ لکھا گیا ہے، وہ اس مرض کا بھی کامیاب علاج ہے۔

۲۔ تخم شولنگی چاندنی کپش میں لے کر عورت کے سایہ سے بچا کر سایہ میں خشک کر لیں، روزانہ دو دانہ علی الصبح باسی پانی سے کھلائیں، اولاد نرینہ صاحب عمر پیدا ہوگی۔

۳۔ برادہ دندان نیل، سپاری، گل انار، ابریشم مقرض ہر ایک ایک ماشہ، مرجان، شاخ مرجان، لیشب، صدف مرواریدی سوختہ، دھنیا خشک، عود ہندی، کباب چینی، گل سُرخ، گل ارینی ہر ایک دو ماشہ کوٹ کر سہ چند کھانڈ کے قوام میں معجون تیار کریں اور حمل کے جن دنوں میں اسقاط حمل ہوتا ہو، اس سے چالیس یوم پہلے دو سے تین ماشہ روزانہ دیں۔

۴۔ مروارید ناسفتہ، شاخ مرجان سوختہ، صندل سفید و سُرخ، طباشیر، مازو، ابریشم مقرض، عود صلیب، درونج عقربی، بیخ انجبار، گل ارینی ہر ایک ۹ ماشہ، مخم تخم ترہون، تخم خرفہ، قشر ہر ایک دو دانہ ماشہ، ورق طلا بیس عدد، ورق چاندی پچاس عدد، ان کو ساٹھ تولہ مصری کے قوام میں بطریق معروف معجون تیار کریں اور دو سے تین ماشہ عرق گلاب چار تولہ، عرق بید مشک چار تولہ کے ہمراہ چالیس دن اسقاط حمل کی مدت سے پہلے دیں۔

آلور ویدک علاج میں پھل گھرت چھ ماشہ سے ایک تولہ ہمراہ دودھ دیں۔

ہومیو پیتھک علاج میں دوسرے تعبیرے اور چوتھے ماہ حمل کا گزیرنا، رحم میں تپش اور درد معلوم ہونے کے شروع ہوتے ہی سے دوا شروع کر دی جائے۔ دانی برمن ۳۰ یا سبٹانا ۵۰ ————— چوٹ لگ کر اسقاط ہونے کا خطرہ، درد تیز آرنیکا ۳۰ ————— بغیر درد کے آستہ

ہو جائے ملی فلیم ۳۰ ————— رحم کی کمزوری سے اسقاط ہو تو الیٹری فیری نوسا ۳۰ دیں۔

غذا پر سیر ————— زرد بھم، مفتوی نذائیں کھائیں، مثلاً بجری کا شوربہ، چونسے کا شوربہ، ساگودان کی کھیر یا دلیہ وغیرہ دیں، چلنے پھرنے سے روک

دیں اور ملاپ سے پرہیز کریں۔ دیر بھگم اور نفع پیدا کرنے والی چیزوں سے سخت پرہیز کر لیں اور بالکل نہ کھائیں۔

وَلَادَتُ ، (Delivery)

استقرار حمل سے نو مہینے اور دس بارہ دن کے بعد پورے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں حاملہ عورتوں کو وضع حمل یعنی بچہ پیدا ہو جاتا ہے دوسرے الفاظ میں وضع حمل کا مطلب یہ ہے کہ اندہ یعنی جنین کی پوری بڑھوتری کے بعد ماں کے رحم سے الگ ہو جانا۔ یہ وقت حاملہ کے لئے بہت نازک ہو کرتا ہے، اگر ولادت کے وقت کامل احتیاط نہ کی جائے تو حاملہ کی زندگی سخت خطرے میں پڑ جاتی ہے، ایسے وقت کے لئے دایہ نہایت ہوشیار اور سمجھ دار ہونی چاہیئے جو ولادت خانے کی ضروری باتوں سے بخوبی واقف ہو، عطا دہ ازس دایہ تندرست اور توانا ہونی چاہیئے نیز دایہ کسی متعدی مرض میں مبتلا نہ ہو اور دایہ کے ناخن کٹے ہوئے ہوں۔ اور انگلیاں دھات کے بالکل صاف ہوں، ولادت کے وقت زچہ کے پاس عورتوں کا ہجوم نہ ہونا چاہیئے، دو تین ہوشیار عمر عورتیں اور دایہ کی موجودگی کافی ہے، ولادت کے وقت زچہ اور دایہ دونوں کا ——— امراض میں مبتلا ہو جانے کا سخت خطرہ ہوتا ہے۔

وضع حمل کو سمجھنے کے لئے تین جگہ بانٹ لیا گیا ہے۔ اس طرح پہلا درجہ اصلی دردوں سے شروع ہونے سے لے کر بچہ دانی (رحم) کی گردن کے پورے پھیلنے تک، دوسرا درجہ رحم کی گردن سے پورے پھیلنے سے لے کر جنین کے پیدا ہو جانے تک اور تیسرا درجہ جنین کے پیدا ہونے سے لے کر مشیمہ کے نکل جانے تک مانا گیا ہے۔

پہلا درجہ :- اس میں درد ہوتا ہے، یہ وہ درد ہے جو کہ ولادت کے وقت کی درد سے لے کر بارہ سے اٹھارہ گھنٹہ تک رہتی ہے، اس وقت بچہ دانی رہ رہ کر سکڑتی ہے، یہ درد پیٹھ سے شروع ہو کر کمر سے ہوتی ہوئی ٹانگوں تک پھیلتی ہے۔ اس عرصہ میں وہ یقینی جس میں بچہ ہوتا ہے بچہ دانی سے علیحدہ ہو جاتی ہے، اس درجہ سے خون اور آلائش مل کر باہر نکلتے ہیں۔

اس درجہ میں حاملہ سے کہا جائے کہ وہ ٹہلتی ہے، ایسا کرنے سے جنین اور رطوبت ہنوسی کا وزن بچہ دانی کی گردن پر زیادہ پڑتا ہے۔ اس سے رحم میں سکڑاؤ پیدا ہوتا ہے اور رحم کی گردن پھیلنے میں آسانی ہو جاتی ہے، مریضہ کو زور دینے سے منع کیا جائے، مریضہ سے پیشاب کرنے کے لئے کہا جائے یا کیمٹی ٹرسے پیشاب نکالا جائے، چائے، تہوہ یا دودھ وغیرہ کھوڑی کھوڑی دیر کے بعد دیا جائے۔

دوسرا درجہ :- یہ پہلے درجہ کے شروع ہونے سے خون و آلائش کے نکلنے کے بعد ایک سے تین گھنٹہ تک رہتا ہے، اس درجہ میں درد زیادہ ہو جاتا ہے، اس وقت بچہ دانی کا سکڑنا بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور اسے برداشت کرنے کے لئے حاملہ کو کسی سہارا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت حاملہ کو کھانا چاہیئے، اس سے قدرے آرام معلوم ہوتا ہے۔ اس درجہ میں بچہ کا سر اور مہبل (یونی) سے باہر آ جاتا ہے۔

چونکہ دوسرے درجہ میں رحم کی گردن پوری پھیلنے سے لے کر جنین کے خارج ہونے تک ہوتا ہے، اس وقت حاملہ کو لیٹ جانا چاہیئے۔ چمت یا بائیں کروٹ پر زیادہ مناسب ہوتا ہے، جس وقت زوروں کا درد ہو، حاملہ کو تنچے زور دینے کی کوشش کے لئے کہا جائے یا پھر ایک چادر وغیرہ باندھ کر تنچے زور دینے کی کوشش کے لئے کہا جائے، اس لئے جو نہی جنین کا سر باہر نکلنے لگے تو فوراً تیزی سے نہ نکلنے دیا جائے، کیونکہ اس طرح سیون کے پھٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو نہی سر مہبل میں ظاہر ہو، مریضہ کو زور دینے پھینچنے اور بلند آوازوں سے رونا کا جائے، سیون کی سینک کی جائے، کیونکہ اس طرح عضلات ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔

جب جنین کا سر اور آنکھیں باہر نکل آئیں تو ان کو ہلکے بورک لوشن سے دھونا چاہیئے، خصوصاً جب کہ حاملہ سوزاک وغیرہ میں مبتلا ہو۔

اب انگلی پر کوئی صاف ملائم اور مٹھر کپڑا پیٹ کر نیچے کے منہ اور حلق سے باغمل کو صاف کیا جاتے، اب نال کو گردن کے چاروں طرف سے سر یا کندھوں کے اوپر سے اتار دیا جائے، اگر اس طرح ممکن نہ ہو۔ تو دوسری چمٹیاں لگا کر نیچے سے کاٹ ڈالنا چاہیے، پھر حاملہ کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر نیچے دبایا جائے۔ یہ کام اس وقت کیا جائے جب رحم میں سکیٹر پیدا ہو رہی ہو، جس وقت بچہ باہر نکل آئے تو اسے ایک صاف بڑے نرم تولیے یا چادر پر رکھا جائے اور نکلنے وقت سمنے کی طرف اٹھا رکھا جائے۔ اگر نیچے کے نکلنے میں دیر ہو تو پھر یہ کام کئے جائیں۔

۱۔ ٹیکھے ہوئے ڈھنگ سے قاع رحم پر ہلکا دباؤ ڈالا جائے۔

۲۔ بچے کی ہنسی میں انگلی ڈال کر آہستہ سے کھینچا جائے۔

۳۔ بعض دفعہ جنین کے سر کو بھی کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہو، ایسا نہ کرنا چاہیے، کیونکہ جنین کے گردن کے پٹھوں کے خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے۔

جس وقت سارا بچہ باہر نکل آئے تو سب سے پہلے منہ اور نچھنے صاف کئے جائیں اور نیچے کی ناف سے دوپٹے کے لگ بھگ دو ایک منبسط اور صاف ڈور سے کس کر باندھ دی جائے۔ اگر دوسری گرہ عورت کی یونی کے پاس یا اس سے ملا کر نال میں اس طرح لگائی جائے کہ بچے کی ناف کے پاس دایا گرہ سے نصف انچ باہر کے لگ بھگ تیز صاف قلعینی سے کاٹ دیا جائے اور فوراً ہی کٹے ہوئے سرے پر کچر آؤ ڈین لگا دیا جائے، بعد میں ہی خون کو روکتے رہنا چاہیے، جب خون بند ہو جانے کا یقین ہو جائے، اس وقت چھوڑ دینا چاہیے۔ نال پر گرہ لگانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مشیمہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر نیچے آتا ہے تو نال بھی نسبتاً زیادہ باہر نکل آتی ہے اور گرہ بھی عورت کے بدن سے زیادہ دور ہو جانے سے پہچاننے میں مدد ملتی ہے۔ اس وقت بچے کو گرم فلائین سے لپیٹ کر رکھنا چاہیے، بچے کو بائیں کروٹ پر لٹانے سے باغمل وغیرہ کے نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد زچہ کے شفران (بھگوشٹ) کو الگ کر کے تیز روشنی میں طبیہ کو معائنہ کرنا چاہیے، نیز سپون اور یونی (مہبل) کی پھیلی دیوار کا بھی طبی معائنہ زچہ کو چپٹ لٹا کر ضرور کیا جائے، اگر تنگان ہو گیا ہو تو ٹانگے لگائیے جائیں، دوسرا درجہ پہلے حمل والی عورت میں دو گھنٹہ اور زیادہ حمل والی عورتوں میں ڈیڑھ گھنٹہ کے لگ بھگ ہوتا ہے۔

تیسرا درجہ :- یہ درجہ آدھے سے ایک گھنٹہ تک لیتا ہے اور اس درجہ میں دوئم درجہ کی نسبت حاملہ کو قد سے آرام ملتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد درد کی لہریں پھر شروع ہو جاتی ہیں، اور اب کے تمام بچہ دانی سے باہر آ جاتا ہے۔

یہ درجہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مشیمہ کے نکلنے تک مانا گیا ہے۔ اس درجہ میں زچہ کو چپٹ لیٹنا چاہیے کہ طبیہ اپنا آلٹا ہاتھ قاع رحم پر دبیرے سے رکھے اور ہاتھ کے اندر دنی کناسے کو پیٹ میں گاڑ کر قاع رحم کے پچھلے حصہ تک پہنچا کر بچہ دانی کو ہاتھ میں پکڑے، اس سے رحم کی جسامت بڑھنے اور نرم ہونے کا اندازہ ملتا ہے، یہ سب باتیں رحم میں خون بہنے کی ہوتی ہیں، جن کا جلدی سے جلدی معلوم کر لینا اچھا ہے اگر ضرورت ہو تو اس وقت قاع رحم کو ہلکا ہاتھوں سے مل کر دبایا جاسکتا ہے۔

اب ہمیں وہ باتیں دیکھنا ہیں، جن سے ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ مشیمہ رحم کی دیوار سے اکھڑ چکا ہے۔

۱۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے تو فحشہ الموبل کے باہر زائ کی لمبائی سوائی ہو جاتی ہے۔

۲۔ رحم پیٹ میں نسبتاً اونچا اٹھ جاتا ہے۔

۳۔ رحم کی شکل گول ہو جاتی ہے اور قوام نسبتاً سخت، ساتھ ہی برکت زیادہ ہو جاتی ہے۔

۴۔ فحشہ بہت خوش اسہ ہے۔

۵۔ اگر رحم پر دباؤ ڈال کر چھوڑ دیا جائے یا اور پھینچا جائے تو نال ساتھ نہیں کھینچتی۔

۶۔ دربدل میں کمی ہو جاتی ہے۔

کبھی مشیمہ رحم کی دیوار سے الگ ہو کر بچہ دانی کے گڑھے یا مہبل (یونی) میں کچھ دیر کے لئے ٹھہر جاتا ہے، اگر رحم میں پوری سیکڑ نہ ہو رہی ہو تو اسے ہاتھ کی انگلیوں سے قاع الرحم کو مل کر پٹنے اور پیچھے دبایا جائے یہ کام اس وقت کیا جائے جب رحم سکڑ رہا ہو اور اس سے مشیمہ مہبل سے باہر نکل آتا ہے، مشیمہ کے باہر نکل آنے کے بعد سیدھے ہاتھ پرے لینا چاہیے، زمین پر گر گرنے نہیں دینا چاہیے، اس وقت یہ احتیاط بڑی ضروری ہے کہ مشیمہ یا اس کا کوئی حصہ وغیرہ ٹوٹ کر اندر نہ رہ جائے۔ اس لئے اگر ممکن ہو تو قاع الرحم پر دباؤ کے لئے مددگار سے کہا جائے اور خود ہی مشیمہ کو اپنے دونوں ہاتھوں پر لیا جائے، جوں جوں مشیمہ باہر نکلتا جائے، آہستہ آہستہ دونوں ہاتھوں میں لے کر کھمایا جائے۔ جب تک بچہ دانی سکڑنی شروع نہ ہو جائے۔ اس وقت تک قاع الرحم پر سہارا رکھا جائے، جب مشیمہ باہر نکلتا ہے تو چھتری کی طرح اٹھا ہوا ہوتا ہے۔

وضع حمل کے لئے ضروری ہدایات

طبعی وضع حمل کے لئے جہاں تک انخام کا تعلق ہے، تو اس کے لئے سب سے پہلی ضروری چیز عددی یا انگلشن پہنچنے کے امکانات کو ختم کرنا ہے، یعنی تمام دوائیں، اوزار، کپڑے، لباس، کمرہ، چارپائی اور دیگر ضروری چیزیں کا پاک و صاف استعمال ہونا ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح خود حاملہ کے تمام بدن خصوصاً متعلقہ بناوٹوں کی صفائی طبی اور صحیح نقطہ نظر سے ضروری ہے، چنانچہ وضع حمل سے پہلے حاملہ کی مہبل (یونی) کے بال وغیرہ خوب صاف کئے جائیں اور حسب ضرورت دواؤں سے دوش کئے جائیں، کمرہ خوب، بڑا، روشن اور ہوا دار ہو، تمام غیر ضروری سامان، کمرے سے الگ کر دیا جائے، مثلاً تصویریں، پردے، فرنیچر وغیرہ وغیرہ، چارپائی لمبی، چوڑی اور تنی ہوئی ہو، بستر کی چادر اور گدے موچا مر کے ہونے چاہئیں۔ حسب ذیل دوائیں اور چیزیں بالکل صاف اور تیار رہنی چاہئیں:-

حقنہ دینے کی پچکاریاں، بند لگانے کی ڈوریاں، صاف کرنے کا سامان، دوش دینے کا سامان اور کئی ٹوٹیاں، زنانہ کیمچی، ٹرام، قینچیاں، شربانی، ٹیٹیاں، انجکشن سرنج، ربڑ کے دستانے، بڑے پیالے جن میں بورک ایسڈ کا محلول اور روئی گارز وغیرہ رکھا جاسکے، بڑے جگ، ابلتا ہوا گرم پانی، زیرہ سب چیزیں بالکل اسی طرح پاک و صاف کی جائیں، جیسے کسی بڑے آپریشن کے لئے کی جاتی ہیں۔

وضع حمل کے سلسلہ میں سب سے پہلے حاملہ کو مزاج کے مطابق غسل دیا جائے، جو کہ پہلے ہی کر لینا اچھا ہوتا ہے، اسی وقت زیر ناف بال صاف کئے جائیں اور پھر اس مقام پر پنکچر ایوڈین یا مرکب و کروم کا محلول وغیرہ لگا دیا جائے۔

مہبل امتحان سے پہلے طبیہ کو ہمیشہ ہاتھوں کو اچھی طرح سطلر ربڑ کے دستانے پہن لینے چاہئیں، اب مہبل کے باہر والے سب حصوں کو اینٹی سپٹک دوا کے محلول سے دھو لیا جائے، پھر روئی سے سامنے سے پیچھے کی طرف صاف کیا جائے، وضع حمل شروع ہونے سے پہلے حاملہ شایب کرے یا پھر حقنہ اور کیمچی ٹرام استعمال میں لائے جائیں۔

وضع حمل کے وقت زچہ کو بہت صدمہ پہنچتا ہے۔ جس سے زچہ میں غصہ طاری ہو جاتا ہے اور وہ بہت کمزور ہو جاتی ہے، اس سے بچنے کو اس وقت بالکل آرام کرنا چاہیے، بچہ پیدا ہونے کے دس روز میں بعد تک زچہ کو بستر سے نہ اٹھنا چاہیے، ورنہ رحم سے خون جاری ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے نیز رحم بھی سکڑ کر اپنی اصلی حالت پر نہیں آتا بلکہ ہمیشہ کے لئے بڑھا رہا جاتا ہے، جس سے اکثر عورتوں کے پیٹ بڑے ہو جاتے ہیں، بچہ پیدا ہونے کے تین ہفتہ تک زچہ کو اپنا معمولی کام کا راج بھی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ طرح طرح کے امراض پیدا ہو کر زچہ کو ساری عمر تکلیف کا لہرہ لاحق ہو جاتا ہے۔

بچہ پیدا ہونے کے ایک ماہ تک زچہ کو اپنے جسم پر ٹھنڈا پانی بھی نہ ڈالنا چاہیے اور نہ ہی ٹنڈے پانی میں بھگنا یا کام کاج کرنا چاہیے۔

ورنہ نفاس (لوکیا) - (Locia) بند ہو کر زچہ کے بیمار ہو جانے کا سخت خطرہ ہے، بلکہ ہاتھ منہ دھونے میں بھی گرم پانی ہی استعمال کرنا چاہیے۔ بچہ پیدا ہونے کے چھ گھنٹے بعد تک زچہ کو پیشاب آجانا چاہیے۔ اگر اس میں دیر لگے تو مہبل (دسجائنا) پرسیک کرنا چاہیے، بچہ پیدا ہونے کے ۲۴ گھنٹے بعد تک زچہ کو اجابت (ٹٹی) ضرور آنی چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ دیر لگے تو کیسٹر آئیل ایک سے ڈیڑھ ادنس تک مزاج کے مطابق نیم گرم گائے کے دودھ میں ملا کر زچہ کے پیٹ کو صاف کر دینا چاہیے، قبض ہرگز نہ ہونے دیں۔ مریضہ کو حمی نفاسیہ (پیورپریل سپٹی سی میا) (Puerpeal Septic-Aemia) سے محفوظ رکھنے کے لئے اکیٹرکٹ ارگٹ (Extractergot) دس بوند ایک ادنس پانی میں ملا کر ایسی دو خوراک دن میں چار پانچ روز تک پلائیں۔

زچہ کو چھ سات گھنٹے بعد بچہ کو دودھ پلانا شروع کر دینا چاہیے، وضع حمل کے بعد تقریباً ایک ماہ تک زچہ کے رحم سے ایک رطوبت خارج ہو کر تھپے جیسے نفاس (لوکیا) کہتے ہیں، نفاس کھل کر آنا زچہ کی صحت کے لئے اشد ضروری اور تندرستی و صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ پہلے چار روز تک نفاس خون آمیز اور سرخ رنگ کا ہوتا ہے، لیکن پانچویں دن سے نویں دن اس کی رنگت سبزی مائل ہو جاتی ہے۔ اس بعد گدے پانی کی سی ہو جاتی ہے، اگر نفاس کم آئے یا جلد بند ہو جائے یا بدبودار ہو جائے تو اس سے زچہ کو پرسوت کا بخار ہو جاتا ہے، سڑ پٹو کا کس نامی جراثیم سے پیدا ہوتا ہے، ایسی حالت میں مقامی طور پر رحم میں انٹی سپٹک ادویات مثلاً ڈیٹول وغیرہ کا دوش طبیہ کے مشورے سے کرنا چاہیے اور سوزش رحم کے لئے رحم میں اکتھول گلیسرین کی تھنی رکھنی چاہیے، اس سلسلہ میں خوراک کی طور پر سلفا ڈرگز مزاج کے مطابق چھ گھنٹے گولی تک روزانہ استعمال کرائی جاسکتی ہیں۔ سلفا ڈایازین عمدہ دوا ہے۔ بذریعہ انجکشن پر وکین پینی سلین چار لاکھ دن میں ایک مرتبہ پینی سلین پانچ لاکھ کی مقدار میں ہر چھ گھنٹے بعد یا سڑ پٹو پینی سلین مستند معالج کے مشورے سے دی جانی چاہیے۔

یونانی طریقہ علاج میں مندرجہ ذیل نسخہ استعمال کریں :-

گل بنشہ چھ ماشہ، گل سرخ اصلی چھ ماشہ، سولف دیسی چھ ماشہ، پوست بیرونی الملتاس کو فنتہ چھ ماشہ، افستین رومی ایک ماشہ، ڈیڑھ پاؤ پانی میں جوش دیں، جب دو چھٹانک پانی رہ جائے تو قند سیاہ (گڑ) مناسب ملا کر اور گھی دیسی کا تڑکا لگا کر (کھی دو تولہ سے کم نہ بطور چائے گرم گرم پلائیں، چند دنوں میں فائدہ عظیم ہوگا۔

نچھے بچے کی پرورش :- بچہ پیدا ہونے کے بعد جب اس دنیا سے فانی میں پہلا سانس لیتا ہے، اسی وقت سے اس انسانوں کے بنائے ہوئے قانون و اصول لاگو ہو جاتے ہیں اور اسے طبی مشیروں اور مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لئے یہاں پر ابتدائی باتیں تحریر کی جاتی ہیں۔ جس کی بچہ کو فوراً ضرورت پڑتی ہے۔

۱۔ بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد بک کر رونا جس سے بچے کے پیپیرے میں حرکت ہوتی ہے اور ہوا بچہ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اس کی زندگی کے لئے نہایت ضروری ہے، عام لوگوں میں رونے کی آواز سن کر مایوسی کی لہر دوڑ جاتی ہے، لیکن بچہ کا رونا غور کی علامت ہے، کیونکہ یہ علامت بچہ کے زندہ ہونے کی سب سے بڑی شناخت ہے۔

۲۔ بچہ کی نال کا ٹٹنا اور حفاظت سے مضبوط باندھنا چاہیے، ورنہ بچے کے فنانع ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔

۳۔ اس کے جسم پر لگی ہوئی رطوبت کو فوراً صاف کرنا یعنی غسل دینا جو بچہ کی صحت و تندرستی کے لئے نہایت ضروری ہے، غسل کا لحاظ رکھتے ہوئے نیم گرم پانی سے دینا چاہیے۔

۴۔ بچہ کو شہد اور کیسٹر آئیل ملا کر چٹانا چاہیے تاکہ پاخانہ آکر پیٹ کی لاکش صاف ہو جائے، جو بچہ کی صحت کے لئے ضروری ہے۔

۵۔ بچہ پیدا ہونے کے چند گھنٹوں کے بعد ماں اپنے بچہ کو دودھ پلائے، لیکن دودھ پلاتے وقت اپنی دونوں چھاتیوں کو گرم پانی

دھو کر صاف کر کے پھر بچہ کے منہ میں دے۔

بدقسمتی سے اگر بچہ کو ماں کا دودھ میسر نہ آئے تو آٹا یا دالی کا دودھ دیا جائے، دودھ خواہ کسی کا ہو، اصول حفظانِ صحت و اذقات کا خیال رکھنا چاہیے، مگر بدقسمتی سے ہمارے دلش میں یہ رواج عام ہے کہ جہاں بچہ رو یا ناں نے اس کے منہ میں دودھ دے دیا، خواہ بچہ کسی ہی وجہ سے رو رہا ہو، یہ عمل بچہ کی صحت و تندرستی کے لئے نہایت دکھدائیک ہے، حتیٰ کہ بڑے بچوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا ہے، جہاں رو یا اور روٹی کا ٹکڑا لہتہ میں دے دیا اور وہ چپکا ہو گیا، حالانکہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ طریقہ بچے کے لئے سخت نقصان دہ ہے، جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کے لئے مقررہ اوقات پر دودھ پلانا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ان ہی اصولوں کی پابندی کی بنا پر بچہ کے وزن میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل اوقات کے مطابق دودھ پلانے سے بچہ صحت مند اور تندرست رہتا ہے۔

دودھ پلانے کے اوقات کا نقشہ

عمر	بچے صبح سے لیکر ۹ بجے رات تک بچہ کو دودھ پلانے کے اوقات میں وقفہ	۹ بجے رات سے ۷ بجے صبح تک کتنی مرتبہ بچہ کو دودھ پلانا چاہیے	۲۴ گھنٹہ میں کتنی مرتبہ بچہ کو دودھ پلانا چاہیے!
پہلا دن	چھ گھنٹہ	ایک مرتبہ	چار مرتبہ
دوسرا دن	چار گھنٹہ	ایک مرتبہ	چھ مرتبہ
تیسرے دن سے ایک مہینہ	دو گھنٹہ	دو مرتبہ	دس مرتبہ
پہلے مہینے سے تیسرے مہینے تک	اڑھائی گھنٹہ	ایک مرتبہ	آٹھ مرتبہ
تیسرے سے پانچویں مہینے تک	تین گھنٹہ	ایک مرتبہ	سات مرتبہ
چھٹے سے سال بھر کی عمر تک	تین گھنٹہ	دو مرتبہ	چھ مرتبہ
ایک سال سے دودھ چھڑانے تک	پانچ گھنٹہ	ایک مرتبہ	پانچ مرتبہ

• مندرجہ بالا ہدایات اوقات کے مطابق بچے کو اگر دودھ پلایا جائے، تو مندرجہ ذیل نقشہ کے مطابق بچہ کے وزن کو بھی نوٹ کرتے جائیں۔

• اگر اس کی بڑھوتری نقشہ ذیل کے مطابق ہو رہی ہو تو سمجھ لیں کہ آپ کا بچہ تندرست اور صحت مند ہونے میں ماں کے دودھ کو بڑا دخل ہے، کیونکہ بچے کے لئے ماں کے دودھ سے زیادہ کوئی دوسرا دودھ موافق نہیں پڑتا ہے۔

• لہذا اس طرف سختی سے متوجہ ہوں اور کسی مستند معالج سے مشورہ لیں، ضرورت سمجھیں تو ہمیں لکھیں۔ اس سلسلہ میں مناسب طبی مشورہ دیا جائے گا۔

عمر کے مطابق بچہ کی بڑھوتری کا نقشہ

عمر	وزن میں بڑھوتری	کل وزن
پہلا مہینہ	۱۳ اونس	۸ پونڈ
دوسرا مہینہ	۲۰ اونس	۹ پونڈ ۱۴ اونس
تیسرا مہینہ	۲۷ اونس	۱۱ پونڈ ۹ اونس
چوتھا مہینہ	۲۶ اونس	۱۳ پونڈ ۳ اونس
پانچواں مہینہ	۲۱ اونس	۱۴ پونڈ ۸ اونس
چھٹا مہینہ	۲۰ اونس	۱۵ پونڈ ۱۲ اونس
ساتواں مہینہ	۱۷ اونس	۱۶ پونڈ ۱۳ اونس
آٹھواں مہینہ	۲۳ اونس	۱۸ پونڈ ۴ اونس
نواں مہینہ	۲۱ اونس	۱۹ پونڈ ۱۰ اونس
دسواں مہینہ	۲۰ اونس	۲۰ پونڈ ۱۴ اونس
گیارہواں مہینہ	۱۱ اونس	۲۱ پونڈ ۹ اونس
بارہواں مہینہ	۷ اونس	۲۲ پونڈ

دودھ پلاتے وقت ماں کو چاہیے کہ جس طرف کا دودھ بچہ کو پلائے اسی کرڈ لیٹ جائے اور بچہ کو اپنے ساتھ اس طرح چٹائے کہ بچہ آسانی سے بچہ کے منہ میں جاسکے۔ اس طریقہ سے ماں بھی نہیں تھکتی اور بچہ بھی آسانی سے دودھ پی لیتا ہے اگر دیر بھی لگ جائے تو ماں کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، ماں دودھ پلانے میں اس بات کا خاص خیال رکھے کہ بچہ کو سونے سے پہلے دودھ پیٹ بھر کر پلا دے تاکہ بچہ رات کو بار دودھ کی خواہش نہ کرے، کیونکہ ایسی حالت میں بچہ اور ماں دونوں کی نیند خراب ہوتی ہے جس سے بچہ کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے نیز یہ بھی اچھے طرح یاد رکھنا چاہیے کہ جب بچہ دودھ پیتا ہے تو ہوا بھی اس کے پیٹ میں دودھ کے ساتھ ساتھ جاتی ہے جس سے اکثر بچے رات کو بے چین ہوتے ہیں اور روتے ہیں اور سختے سختے کی پرورش کے اصولوں کی نادانقنیت کی وجہ سے اور لاپرواہی کی بنا پر بار بار اس کے منہ میں دودھ دیتی رہتا ہے جس سے بچہ چپ نہیں ہوتا بلکہ زیادہ روتا ہے۔ ایسی حالت میں ماں کو فوراً بچہ کا پیٹ دیکھنا چاہیے یا اگر بچہ اوپر کا دودھ پیتا تو ان تمام تکالیف جو عموماً بچہ کو پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ مندرجہ ذیل جنم گھنٹی کا شروع میں اگر استعمال کرایا جائے تو بچہ کی صحت و تندرستی بنی ہے

جنم گھٹی :- جنم گھٹی کا مندرجہ ذیل نسخہ نسخے بچے کے امراض کے لئے امرت ہے :-

گل بنفشہ، سنابریکی، مغز الملتاس ہر ایک دو ماشہ، پوست ہلیہ زرد، چھوٹی ہرٹ، بابڑنگ، گل سرخ ہر ایک دو ماشہ، مویر منقی، عتاب ہر ایک تین دانہ، سب کو تین چھانک پانی میں جوش دیں، جب نصف رہ جائے تو ذرا سی تر بجھیں اور شکر سرخ ملا کر ذرا چٹائیں، ایک بار میں چھ ماشہ تک اور دن رات میں دوبار چٹائیں، کانی ہے، اس سے پیٹ صاف ہو کر جگر، معدہ اور آنتیں اپنا ٹھیک کام کریں گی۔

ششوائیتی میں کٹھنائی، عسر ولادت

تعریف مرض :- بچہ آسانی خارج نہیں ہوتا، جس سے وضع حمل کے وقت عورت کو سخت تکلیف ہوتی ہے، بعض اوقات زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پیٹ میں بچہ مر جائے تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

وجوہات :- ۱۔ حاملہ کی کمزوری، خوف، پہلی دفعہ بچہ جننے میں گھبراہٹ، حد سے زیادہ موٹاپا (جس سے بچہ مشکل سے خارج ہوتا ہے) حد سے زیادہ نازک مزاجی۔

۲۔ بچہ کا حد سے زیادہ موٹا ہونا، حد سے زیادہ کمزور ہونا (بچہ دانی کی پکڑ میں نہ آ سکے)، بچہ کا دوسرا ہونا یا زیادہ ٹانگوں والا ہونا، بچہ دانی میں ایک سے زیادہ بچوں کا ہونا (جو ایک دوسرے کے نکلنے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں)، بچہ کی پیدائش غلط طریقہ پر ہونا یعنی پہلے بازو یا ٹانگہ وغیرہ کا باہر نکلنا۔

۳۔ بچہ دانی کا چھوٹا ہونا، بچہ دانی میں رطوبت نہ ہونا (جس سے بچہ پھسل کر نہ نکلے)، بچہ دانی کا ورم، بچہ دانی کے زخم، بچہ دانی کی بواسیر، بچہ دانی کی کمزوری وغیرہ۔

۴۔ مشیمہ کا حد سے زیادہ ڈٹا ہونا (جس سے وہ نہ پھٹ سکے اور بچہ نہ نکلے) یا وقت سے پہلے پھٹ جائے، جس سے بچہ کو پھسلا کر نکلنے والی رطوبات خارج نہ ہوں۔

۵۔ پتھری مشامہ، پٹیاب کی بندش، پیٹ یا پیڑ میں رسولی، یونی (مہبل) کی رسولی وغیرہ سے، جس سے بچہ دانی کے منہ پر دباؤ پڑنے سے بچہ آسانی خارج نہیں ہو سکتا ہے۔

۶۔ مدت حمل کے مکمل ہونے سے پہلے بچہ کا نکلنا۔

۷۔ بعض دفعہ دایہ کی غلطی سے بچہ کی پیدائش میں دیر ہو جاتی ہے۔

۸۔ سخت سردی جس سے اعنسلے ولادت نہ کھل سکیں، سخت گرمی سے جس سے طانت کمزور ہو جائے، سخت غم و فکر جس سے بچہ کی پیدائش میں دیر ہو جاتی ہے۔

علاج سے یا تو تکلیف دور ہو جاتی ہے یا کبھی سانس کی تنگی سے سینہ اور پیپھڑے کی رگیں ٹوٹ جاتی ہیں اور کھانسی میں خون آنے لگتا ہے، شدت و مدت سے اعصاب و عضلات منقطع ہو جاتے ہیں، تشنج و کزاز ہونے لگتا ہے، شدت مرض میں کبھی پیٹ کا پردہ ہراق پھٹ جاتا ہے۔ عورت ہلاک ہو جاتی ہے، عسر ولادت میں اگر عورت کو چھینکیں آئیں تو یہ ایک اچھی علامت ہے، اگر بچہ خارج ہونے سے پہلے خون اور رطوبات وہ مقدار میں نکل چکی ہوں تو بچہ کی پیدائش مشکل سے ہوگی، اگر خون آنے میں دیر ہو جائے تو بچہ کی پیدائش میں آسانی کی امید کی جاسکتی ہے۔ علامات :- عورت کو بار بار دردِ زہ اٹھتا ہے، لیکن بچہ باہر نہیں آتا، عورت زور لگاتی ہے اور درد سے چبھتی ہے، لیکن کوئی فائدہ

نہیں ہوتا، آخر عورت تھک کر بے دم ہو جاتی ہے اور درد کا اٹھنا کچھ عرصہ کے لئے بند ہو جاتا ہے، پھر وہ رہ کر کمر کا درد اٹھتا ہے۔

علاج بطور حفظ مآل قدم۔ اگر ۹ ویں ماہ کے شروع ہوتے ہی حاملہ کو ہر روز نہار منہ روغن بادام شیریں ۹ ماشہ، دودھ نیم گرم میں پلائیں، اور

غلظت، تیز قرش اور قابض غذاؤں سے پرہیز کرائیں، غذائیں و مرغن کھلائیں تو بچہ بلا تکلیف پیدا ہوتا ہے۔

علاج ڈاکٹری۔ زچہ کو دردِ زہ شروع ہوتے ہی بیٹھنے اور ٹھلانے کی تاکید نہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے بچہ دانی کا منہ زیادہ کھل جائے

سے پہلے ہی پانی کی پھٹی پھٹ جاتی ہے، جس سے بچہ پیدا ہونے میں بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، ہاں جب درد شدت سے ہونے لگیں تب ٹھلانے سے

فائدہ ہوتا ہے، اگر قبض ہو تو سوپ واٹر کا انیما کریں، دردِ زہ کو زیادہ کرنے کے لئے کوفین کا استعمال مفید ہے، اس سلسلہ میں کوفین سلفاس پانچ سے

دس گرین (کیپ شولز یا گولی) ہمراہ دودھ نیم گرم دیں یا کوفین کسچر دے سکتے ہیں، اس سے درد ہو کر بچہ دانی کا منہ کھل جائے گا، جس وقت رحم کا منہ پورے

طرح کھل چکا ہو اور دردِ زہ بند ہو جائے تو ”پٹ یوٹرین“ ایک سی سی کا زیر جلد انجکشن کریں، پانچ یا دس منٹ میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔

نوٹ۔ اگر بچہ دانی کا منہ نہ کھلا ہو یا بچہ کی ساخت یا وضع میں فرق ہو تو پھر پچوٹری کے استعمال سے بچہ دانی کے پھٹ جانے

کا خطرہ ہے، اس لئے اس سے پہلے تستی کر لینی ضروری ہے۔

دردِ زہ (بچہ کی پیدائش کے وقت) بے ضرر انجکشن۔ عین بچہ کی پیدائش کے وقت جب دردِ زہ اٹھ رہی ہوتی ہیں

وقت نرس یا دالی ڈاکٹر صاحب کو بلوا بھیجتی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے مریضہ کے پاس بھیجتے ہی کہا جاتا ہے کہ آپ اس کا جھٹکارہ کرنے۔

لئے انجکشن لگا دیں، اور عام طور سے دایاں ناخبرہ کار ہونے کے کارن بچہ کی صحیح حالت بتانے سے بھی قاصر رہتی ہیں۔ اگر بچہ کا سر سر وکس (

رحم) میں (Fix) ہونے سے مشیر اگر انجکشن پچوٹری لگا دیا جائے جو عام طور سے لگایا جاتا ہے۔ اور اس موقع کے لئے مخصوص ہے، تو مریضہ

جان کے لئے پڑ جاتی ہیں اور بعض اوقات آپریشن تک نوبت پیدا ہو جاتی ہے بعض ہوشیار ڈاکٹروں کو (Cora-mine) کا انجکشن

بھی دیکھا ہے۔ جس کا دردِ زہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ محض مریضہ اور دایہ کو تسلی دینے کے لئے اپنی فیس کھری کرنے کے لئے دے دیتے ہیں۔

عرصہ دراز سے اس بات کی کھوج میں تھا کہ کوئی انجکشن اس موقع کے لئے بے ضرر ہونا چاہیے جس کا کوئی برا اثر نہ ہو، نرس کی غلط تشخیص کا

غریب مریض کو نہ بھگتنا پڑے۔ آخر میری محنت سمجھ ہوئی اور سو فیصدی کامیاب، بے ضرر انجکشن دستیاب ہو گیا، جسے تاج الحکمت (پریکٹس آف

میڈسین) کے پریمیسوں کے لئے پہلی بار نذر کر رہا ہوں، پیشتر اس کے کہ میں اس انجکشن کا نام ظاہر کروں یہ بھی عرض کئے دیتا ہوں کہ اسے معمولی سمجھ

نظر انداز نہ کر دیں، اپنی روزانہ کی پریکٹس میں استعمال میں لائیں، آپ عیش عیش کر اٹھیں گے، چونکہ یہاں کی بہت بڑی آبادی میں کوئی زنانہ

نہ تھا۔ آنکھوں کے علاج اور زنانہ علاج کے پیچیدہ آپریشنوں کے مریض صرف میرے ہسپتال میں ہی آتے تھے۔ اب تو خیر گورنمنٹ

بدولت ایک اچھا ہسپتال زنانہ و مردانہ دونوں بن گئے ہیں اور کامیابی سے کام بھی ہو رہا ہے، اس لئے مجھے اس انجکشن کو دریافت کرنے میں کافی

ملی، یہ انجکشن سینکڑوں مریضوں پر لگایا ہے۔ بعد میں تاج الحکمت (پریکٹس آف میڈسین) کی بیعت کر رہا ہوں، صرف ان ڈیپوری کیسوں

جہاں آپریشن ہی ضروری ہوتا ہے۔ وہاں انجکشن کام نہیں دے گا، اگر لگا بھی دیا جائے تو کوئی نقصان نہیں۔

اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انجکشن کا نام تو ابھی تک نہیں لکھا۔ مینے بار و مہ میں کام آنے والے والا پور ایکٹریٹ کرڈ (Ver Extract)

(Crude) دوسری سی کی مقدار میں دے دیجئے۔ نرس سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ بچہ کی کیا پوزیشن ہے۔ اور آرام سے گھر آکر سو جائیں، آدھ گھنٹہ

ایک گھنٹہ کے اندر آرام سے بچہ پیدا ہو جائے گا۔

آپ ضرور پوچھیں گے کہ دورانِ حمل پور ایکٹریٹ کے انجکشن بہت لگائے جاتے ہیں، تو اس طرح حمل گر کیوں نہیں جاتا، چونکہ دورانِ حمل

مریضیوں پر ہم روزانہ لگاتے ہیں، اس وقت ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اگر کیوں کے جواب کے آپ مشتاق ہیں تو پہلے اپنے کم سے کم دو مریضوں

یہ انجکشن لگائیں۔

نوٹ:- لور ایکسٹریکٹ کروڈ (Liver Extract Croude) غیر صاف شدہ لور ایکسٹریکٹ ہوتا ہے اور اسے ہول لور

ایکسٹریکٹ (Whole Liver Extract) کا نام بھی دیا جاتا ہے، دیگر کئی کمپنیاں کروڈ (Croude) اور ہول (Whole)

کے نام سے بناتی ہیں، متذکرہ خوراک ایک سے دسی سی ٹیکہ صرف عضلاتی لگایا جاتا ہے، وریدی ہرگز نہیں لگانا چاہیئے۔

یونانی علاج:- دودھ گائے آدھ سیر گھی خالص پانچ تولہ، شکر سرخ پانچ تولہ ملا کر نیم گرم پلائیں، عورت تیس قدم جلد جلد چلے، پھر پاؤں کے
 ل میٹھ کر سانس کو بند کر کے تنچے کو زور کرے، اگر ولادت میں دیر ہو تو لعاب زیج کتان و بیج حلبہ کو تیل کتان میں ملا کر نیم گرم بچہ دانی کے منہ پر زور
 سے مالش کریں، جب سر کے علاوہ بچہ کے جسم کا کوئی اور حصہ پہلے نکلنے والا ہو، تب حاملہ کو فوراً کسی زنانہ ہسپتال میں پہنچا دینا چاہیئے یا لیڈی ڈاکٹر
 بلا لینا چاہیئے تاکہ غیر طبعی حالت کو درست کر سکے۔

دوائے غسر ولادت:- مشکطراح مشع، پر سیاوشاں، نخود سیاہ ہر ایک چھ ماشہ، پھلی الملتاس کا چھلکا، گڑ ہر ایک ایک تولہ، پانی میں
 دھو کر پلائیں۔

دیگر:- گل شفتالو ایک ماشہ پیس کر محمول کریں، مردہ جنین کو نکالنے میں مجرب ہے۔

حب تسہیل ولادت:- زچگی کے وقت بعض عورتوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ ایشور کی کرپا سے ان گولیوں سے بچہ آسانی سے پیدا
 جاتا ہے، نسخہ مندرجہ ذیل ہے:-

زعفران خالص، ہینگ خالص، دونوں برابر وزن باریک کر کے شہد کے ساتھ گولیاں نخود کے برابر بنائیں، بوقت ضرورت ایک گولی
 ۱۰ دودھ استعمال کریں۔

دیگر:- صرف زعفران خالص چار رتی پیس کر پھنکا دیں یا صرف دارچینی ایک ماشہ پانی میں پیس کر زیر ناف لیپ کریں اور دارچینی ایک ماشہ
 غونگ گرم پانی سے دیں۔

دیگر:- زعفران پانچ رتی گڑ میں ملا کر کھلانے سے بچہ جلد پیدا ہو جاتا ہے۔

دیگر:- الملتاس کی پھلی کا سیاہ چھلکا دو تولہ، ڈیڑھ پاؤ پانی میں جوش دے کر نصف رہنے پر چھان کر پلائیں، گڑ ڈال کر میٹھا کر لیں۔

دوائے مسقط جنین:- چھلکا الملتاس دو تولہ، زیرہ کرمانی تین ماشہ، تخم خربزہ چھ ماشہ، انستین چار ماشہ، شاہترہ چھ ماشہ جوش دے
 صاف کریں۔ اور گل قند تین تولہ حل کر کے پلائیں، مردہ بچہ نکالنے کے لئے بہت مفید ہے۔

نوٹ:- حاملہ کے لئے اس دوائی کا استعمال سخت منع ہے۔

آیور ویدک علاج:- اگر عورت بہت موٹی ہو تو روغن بنفشہ یا روغن زیتون کی نیم گرم مالش پیٹ و پیٹھ پر کرنے سے بچہ آسانی پیدا
 جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل نسخے اس مرض کا مؤثر علاج ہیں:-

۱۔ الملتاس کی پھلی کا سیاہ چھلکا دو تولہ، ڈیڑھ پاؤ پانی میں جوشائیں اور دس تولہ رہنے پر گڑ ملا کر زچہ کو پلائیں، بچہ فوراً پیدا ہوگا۔

۲۔ جند بیدستر چار رتی، ہینگ چار رتی، دونوں کو پیس کر ایک گولی بنا کر حاملہ کو گرم پانی سے کھلائیں، بچہ آسانی پیدا ہو جاتا ہے۔

۳۔ سوٹھ تین ماشہ، لہسن ڈیڑھ تولہ، دونوں کو کچل کر ایک پاؤ پانی میں جوش دیں، چوتھائی رہنے پر حاملہ کو دو یا تین بار پلانے سے مردہ بچہ
 آسانی خارج ہو جاتا ہے، حاملہ کے لئے منع ہے۔

جب بچہ یونی (مہسل) میں رُک جاتا ہے تو اس کو طب آیور وید میں موڑھ گر بھ کہتے ہیں، موڑھ گر بھ کا علاج عمل جراحی (آپریشن) ہے۔

سُشرت بھگوان اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ مستند سرجن کو نہایت احتیاط سے حاملہ کے جگر، تلی و اندرونی اعضا کو بچا کر نکال کرنا چاہیے، ورنہ کسی عضو کے کٹ جانے سے گرجہ دتی کی موت کا سخت خطرہ ہوتا ہے، سُشرت میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ عمل کسی نہایت قابل تجربہ کار لہسنہ مشق سرجن کو ہی کرنا چاہیے۔ اور حاملہ کے لواحقین سے اس علاج سے پہلے اجازت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ عمل جراحی سے حاملہ و جنین دونوں کی جان خطرہ میں ہوتی ہے۔

طب آیور وید کے مشہور گرنتھ سُشرت و چکروت میں ایک منتر چھپا ہے، (میں منتروں کے حق میں نہیں ہوں اور مستند ادویات پر بھروسہ کرتا ہوں جس میں لکھا ہے کہ اگر جنین زندہ ہو اور وہ کسی طرح باہر نہ آتا ہو تو مندرجہ ذیل جیون منتر کئی بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے حاملہ کو پلانے سے موڑ دھ کر بغیر کسی تکلیف کے پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ منتر مندرجہ ذیل ہے :-

مکتا کھوشرو پاشا شیخ مکتا سورین رشیہ

مکتا سرو بھیا دریدھ ایہ سے ہی ماچرم سواہا

ہومیو پیتھک علاج :- وضع حمل کے وقت سخت تشنجی درد ہو تو برائی اونیہ، بلاڈونا، کو میلا، اپنی کاک، سمی ہی فوگا، نکس و امیکا، پلسٹ آرٹیکا، کالوفانک، جلیسی سیم، پلاٹینا مفید ادویات ہیں۔ وضع حمل کیساتھ شدت کیساتھ کینٹی میں درد ہو تو کالوفانک، وضع حمل کے وقت درد کی شدت کے ساتھ پاخانہ پیشاب کی حاجت ہو تو نکس و امیکا، وضع حمل کے وقت درد کی شدت کے ساتھ غشی ہو تو نکس و امیکا۔ مفید ہدایات :- جب وضع حمل کے دن بالکل نزدیک ہوں تو مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کریں :-

- ۱۔ حاملہ کو غذا کم کھلائیں، دودھ یا شور بادیں، ٹھنڈی و ترش اشیا سے پرہیز کریں اور نچلے حصہ کو سردی سے بچائیں۔
- ۲۔ حاملہ کو ہدایت کریں کہ جب درد زیادہ اُٹھے تو شور و غل نہ کرے بلکہ صبر سے درد کو برداشت کر کے پاؤں کے بل بیٹھے۔
- ۳۔ جب بچہ جنمے کا وقت بالکل نزدیک ہو تو عورت کو گرم کمرے میں محفوظ اٹھوڑا چلائیں، پھر بیٹھے کی ہدایت کریں اور پھر چلنے کی ہدایت کریں آسانی سے پیدا ہو جائے گا۔

۴۔ اگر بچہ پیدا ہونے میں تکلیف ہو اور بہت درد ہونے پر بھی بچہ باہر نہ آئے تو دایہ کو چاہیے کہ تلوں کے تیل سے یونی کی ماش کرے یا کواندرونی جانب سے چڑھ کر تر کر دے۔

۵۔ حاملہ کو جب تھوڑا درد اُٹھے تو اس وقت پاخانہ و پیشاب کرا دیں، اگر قبض ہو تو کیٹر آیل سے انیما کریں۔

زچہ کی صحت و تندرستی کیلئے مفید ہدایات

- ۱۔ زچہ کو آرام سے بستر پر لٹائیں، موسم سرما میں گرم رکھیں اور بستر بھی گرم دیں، زچہ کا لباس و بستر پاک و صاف ہونا چاہیے۔
- ۲۔ وضع حمل کے بعد زچہ کو چاہیے کہ وہ دس دن بستر پر آرام سے لیٹی رہے اور چلنے پھرنے کا نام نہ لے، ورنہ بچہ دانی سے خون جاری ہو گا اور بچہ دانی سکڑ کر اصلی حالت پر نہیں آسکتی، بلکہ ہمیشہ کے لئے بڑھی رہتی ہے۔
- ۳۔ وضع حمل کے بعد زچہ ۲۱ دن کام نہ کرے، ورنہ کئی قسم کے امراض پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے۔
- ۴۔ بچہ پیدا ہونے کے ۳۰ دن تک زچہ سرد پانی جسم پر نہ ڈالے، کیونکہ اس سے نفاس بند ہو جائے گا، جس کا جاری رہنا زچہ کی تندرستی کے لئے ضروری ہے، اس لئے منہ لٹکھ دھونے اور نہانے کے لئے ہمیشہ گرم پانی کا استعمال کیا جائے، لیکن ابتدائی بیس دن نہانا منع ہے، بلکہ جسم کو گرم پانی دتو لئے سے پونچھ لیا جائے۔

- ۵۔ وضع حمل کے چھ گھنٹہ بعد اگر زچہ کو پیشاب نہ آئے تو پیڑ و پر گرم پانی کا سینک کرنے سے پیشاب آجاتا ہے۔
- ۶۔ وضع حمل کے ۲۴ گھنٹہ بعد اگر زچہ کو پاخانہ نہ آئے تو کلیٹر آئیل ایک تولہ سے لے کر اڑھائی تولہ تک گرم دودھ میں پلانے سے قبض کا عارضہ دور ہو جاتا ہے، جو کہ زچہ کی صحت کے لئے ضروری ہے۔
- ۷۔ بچہ پیدا ہونے کے بارہ گھنٹہ بعد اکثر زچہ کے پستانوں میں تناؤ اور گرانی محسوس ہوتی ہے۔ اور عام طور پر اڑتالیس گھنٹوں میں دودھ اتر کر پستانوں پر ورم آجاتا ہے، جس سے زچہ کو معمولی بخار بھی ہو جاتا ہے۔ اسے دودھ کا بخار کہتے ہیں، جو کہ بچے کو دودھ پلانے سے دور ہو جاتا ہے۔
- ۸۔ بچے کی پیدائش کے سات گھنٹے بعد ماں کو بچے کا دودھ ضرور پلانا چاہیے، کیونکہ بچہ دانی اور پستانوں میں ایک خاص عصبی تعلق ہے، جب بچہ پستانوں کو منہ میں لے کر چوسنے لگے، تو عصبی تعلق کی وجہ سے بچہ دانی کا سکڑاؤ شروع ہو جاتا ہے، جو زچہ کے لئے بہت مفید ہے، علاوہ ازیں دودھ نکلنے سے چھاتیوں کا جوش کم ہو جاتا ہے اور زچہ کا پہلا دودھ جلاب کا کام کرتا ہے، جس سے نفع بچے کا پیٹ صاف ہو جاتا ہے۔
- ۹۔ چالیس روز تک زچہ کی بچہ دانی سے ایک قسم کی رطوبت خارج ہوتی رہتی ہے، جس کو طب میں نفاس کہتے ہیں، اس کا کھل کر جاری رہنا زچہ کی صحت کے لئے بہت مفید ہے اور بند ہونے سے کئی قسم کی بیماریوں کا خطرہ ہے، خصوصاً اس سے پرست کا بخار ہو جاتا ہے۔
- ۱۰۔ ولادت کے بعد یونی پر سوجن ہو جاتی ہے، اسے سینک سے آرام آجاتا ہے۔
- ۱۱۔ بچہ ہونے کے بعد تین دن تک زچہ کو نرم اور جلد صہم ہونے والی غذا دیں، دیرینہم غذاؤں سے سخت پرہیز کرائیں۔
- ۱۲۔ ابتدائی ایام میں زچہ کو گرم پانی کی جگہ عرق کا و زبانی، عرق کو اور عرق سولف پلائیں، سرد ہوا کے جھونکوں اور ٹھنڈے پانی سے بچائیں۔
- ۱۳۔ صرف عرق سولف کا متواتر استعمال زچہ کو کئی امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔

کثرت نفاس

- تعریف مرض :-** بچہ پیدا ہونے کے چند گھنٹوں بعد یا آنول نکلنے وقت سخت جریان خون ہوتا ہے، اگر اس کا ہوشیاری سے علاج نہ کیا جائے تو زچہ کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔
- وجوہات :-** وضع حمل کے بعد کسی بے احتیاطی کی وجہ سے بچہ دانی کا سکڑاؤ درست نہ ہونا، آنول کو ہاتھ سے کھینچنا، آنول کا کوئی ٹکڑا دانی میں رہ جانا، آپریشن کے وقت بچہ دانی میں زخم ہو جانا، بچہ دانی کا منہ پھٹ جانا، زیادہ گرم غذاؤں کا استعمال، بعد وضع حمل چلنا پھرنا، زردی اعصاب وغیرہ سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔
- علامات :-** بچہ دانی سے زیادہ خون نکلتا ہے، زچہ کا چہرہ زرد اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ٹھنڈا پسینہ آتا ہے، نبض باریک و تیز چلتی ہے، کمزوری کے باعث مریضہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آجاتا ہے۔ شدت مرض میں بے ہوشی تک نوبت پہنچ جاتی ہے یا کل جسم تشنہ ہو کر مریضہ موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔
- علاج ڈاکٹری :-** مریضہ کو آرام سے چار پائی پر چت لٹائیں اور بالکل کسی قسم کی حرکت نہ کرنے دیں۔ دایہ بچہ دانی کے اندر انگلی ل کر معلوم کرے، اگر بچہ دانی میں آنول کے ٹکڑے یا خون کے جھپٹے موجود ہوں تو بذریعہ ڈوش سرنج یا انیما سرنج بچہ دانی کو دھو کر صاف کریں، دانی کو دبا دیں اور کوئیڈ ایکسٹریٹ ارگٹ ۲۰ مم، ایک اونس پانی میں ملا کر دیں یا ارگٹ کمپو (۱۰ سے ۱۵ مم ارگٹ، ۵ گرین کوہن) ہر چار گھنٹے

بعد دیں یا ایک گولی اربولین (Arbolin) اور ایک گولی کونین بیک وقت دن میں تین بار دی جاویں یا ارجومترین (Argometrine) ۲۴ گریں کا عضلاتی انجکشن دیں۔ اس سے آنول کے اخراج میں مدد ملتی ہے اور رحم سے زائد خون کے اخراج کا امکان نہیں رہتا یا پچوٹری پراسی سی کا زیر جلد سیک کریں۔ اگر خون بند نہ ہو تو ٹنکچر سیٹل ایک حصہ پانی دس حصہ ملا کر بچہ دانی کے اندر پکپکاری دیں، کیلشیم لیکلیٹ دس گریں ہر تین گھنٹہ بعد دیں، مریض بہت کمزور ہو تو برانڈی دیں۔ دل ڈوب رہا ہو تو تقویت دل کے لئے کورامین (Coramine) ایک سے دوسری سی کا ٹیکہ لگائیں اور خون بند کرنے کے لئے ان ادویات کا استعمال کیا جائے، جو جریان خون کے باب میں دی گئی ہیں۔

یونانی علاج :- ہدایات مذکورہ علاج ڈاکٹری کو سامنے رکھیں، خون بند کرنے کے لئے کثرت طمث کے بیان میں جو نسخے درج ہیں وہ اس مرض میں بھی مفید ہیں، مندرجہ ذیل نسخہ جات بہت مفید ہیں :-

شیاف قابض (جو خون کو بند کرتا ہے) :- پھول انار، پھول گلاب ہر ایک چھ ماشہ، کندر، کہربا ہر ایک تین ماشہ، سب کو باریکٹیر

کر اور جو شانہ مازو میں گوندھ کر بتیاں بنا کر ایک بتی یونی (مہبل) میں رکھیں اور کھلنے کے لئے مندرجہ ذیل نسخہ جات میں سے کسی ایک استعمال کریں

۱۔ گل ارمنی، دم الاغوائن، کہربا، صدف سوختہ، سنگ جراحی ہر ایک ایک ماشہ، باریکٹیر کر پیلے کھلائیں اور اوپر سے شیرہ جز انجبار چار ماشہ، عرق گلاب دو تولہ، عرق گاؤ زبان دو تولہ میں نکال کر تخم بارتنگ چھ ماشہ چھڑک کر پلائیں۔

۲۔ گيرو، سنگ جراحی ہر ایک ایک ماشہ، دونوں کو پیس کر پیلے کھالیں۔ اوپر سے شیرہ حب آلاس، شیرہ نیچ خرفہ سیاہ، شیرہ نیچ انجبار ہر

ایک تین ماشہ، عرق گاؤ زبان بارہ تولہ میں نکال کر شربت انار تین تولہ میں ملا کر تخم بارتنگ تین ماشہ چھڑک کر پلائیں۔

آلور ویدیک علاج بطور یونانی علاج کے کریں، ہومیو پیتھک طریقہ علاج میں بچہ جننے کے بعد خون بکثرت آئے تو ملی فولیم، سبائنا، آرنیکا

بلا ڈونا، کوسیلا، چائنا، ہامامیل، فیرم مٹ، سکیل کار، پلسٹا، کالی کارب بہترین ادویات ہیں۔ خون گاڑھا آئے اور سیاہ ہو تو چائنا کا

استعمال کیا جائے۔

غذا و پرہیز :- مریض کو آرام سے لٹائیں اور گرم چیزوں سے سخت پرہیز کریں۔

بندشِ نفاس

تعریف مرض :- اس مرض میں بچہ جننے کے بعد خون نفاس نہیں نکلتا اور عورت کو کئی قسم کی تکالیف ہو جاتی ہیں، اگر کمزوری کی وجہ سے

خون نفاس نہ آئے تو خطرہ نہیں ہے۔

وجوہات :- بچہ دانی میں خون کے نکلنے پھنس جاتے ہیں، جس سے نفاس نہیں آتا۔

علامات :- رطوبتیں خارج نہ ہونے سے زچہ کو پرسوت کا بخار ہو جاتا ہے، رحم و پیڑ میں سوجن ہو جاتی ہے، سانس جسم میں درد

ہوتی ہیں، کبھی بے ہوشی ہو جاتی ہے، مرض کی زیادتی کی حالت میں بچہ دانی کا درد، خفقان، جنون و تشنج کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔

علاج :- کپاس کے ڈوڈے تین تولہ، عرق مکو بارہ تولہ میں جوش دے کر اور صاف کر کے چند روز پلائیں یا بانس کی گرہیں تین

عرق مکو دس تولہ میں جوش دے کر صاف کر کے پلائیں یا چھلکا المٹاس ایک تولہ کا جو شانہ دیں، مندرجہ ذیل نسخہ جات اس مرض کا

علاج ہیں :-

۱۔ بیج کرنس، سولف، پرسیادشاں، مشکطرح شیع ہر ایک ساڑھے تین ماشہ صاف پانی میں جوش دے کر صاف کر کے چینی دو تولہ

کر پلائیں۔

۲۔ اگر بندش نفاس کے ساتھ بخار اور دم رحم و سوجن وغیرہ ہو تو یہ نسخہ دیں، بیج خطمی، سولف، غنب الشلب، ملٹھی چھلی ہوئی، بیج خرپڑہ ہر ایک چھ ماشہ، پانی میں جوش دے کر پلائیں۔

ڈاکٹری علاج میں مریضہ کے سر اور چھاتی کو ملائم تکیوں کے سہارے اونچا رکھیں، تاکہ نفاس رحم سے خارج ہونے میں مدد ملے، کسی دافع عفونت دوا مثلاً لائی سول کے ہلکے لوشن سے ڈوش کریں، بخار کی حالت میں سٹرپٹومین سیلین یا پینی سیلین کے عضلاتی انجکشن مفید ہیں یا ٹیسٹو سٹیکلین کا استعمال کریں۔

غذا و پرہیز :- بجائے پانی کے عرق کو پلائیں اور صحت درست ہونے تک مونگ کی نرم کھجڑی دن کو دیں، رات کو بخینی بغیر گھی کے دیں، دیرمضم غذاؤں سے پرہیز کریں۔

پرسوت جوار، پرسوت کا بخار، پیور پریل فیور (Puer Peral Fever)

تعریف مرض :- یہ چھوت دار بخار بچہ پیدا ہونے کے تین روز بعد عام طور پر ہو جاتا ہے۔

وجوہات :- بچہ کی ولادت کے بعد آنول کا پورے طور پر خارج نہ ہونا، نفاس کا بند ہو جانا، رحم یا اندام نہانی میں آنول کے ٹکڑوں یا خون کے ٹھکڑوں کا پھنس کر متعفن ہو جانا، جنین کا مردہ ہو کر بچہ دانی کے اندر متعفن ہو جانا، ورنج حمل کے وقت بچہ دانی کی بناوٹ میں خراش آ جانا، دایہ کے ہاتھوں یا اس کے اوزاروں سے کسی متعدی مرض کی چھوت کا لگ جانا یا دیگر ہر ایسے اثرات کا خون میں سرایت کر جانا اس کے اسباب ہوتے ہیں۔

علامات :- ۱۰۵ کے قریب بخار اور بچہ دانی کے مقام پر درد ہوتا ہے، چھاتیوں میں دودھ کی پیدائش رک جاتی ہے بے چینی، سر درد اور کمزوری معلوم ہوتی ہے، مرض کی شدت کی صورت میں بے ہوشی و ہذیان ہو جاتا ہے جو مریضہ کے لئے خطرناک ثابت ہوتا ہے، بنض بہت تیز جاتی ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، نفاس بند ہو جاتا ہے یا کم مقدار میں خارج ہوتا ہے جس سے بدبو معلوم ہوتی ہے۔

حفظ ما تقدم :- چونکہ یہ ایک نہایت متعدی اور چھوت دار مرض ہے، اس لئے ہر معالج اور دایہ کا جو زچہ کے پاس جائے فرض ہے کہ جب اس مرض کی مریضہ کا علاج کیا جائے تو وہ دوسری تندرست زچہ کے پاس نہ جائیں یا پہلے اپنے ہاتھوں کو دافع السرائت محلولوں سے صاف کر کے خوب نہا دھو کر اور صاف دھلے ہوئے دوسرے کپڑے پہن کر جائیں، علاوہ ازیں سُرخ بادہ، سُرخ بخار، خناق و بانی کے مریضوں کے پاس سے ہو کر ان کے دوشوں کا ملاحظہ کر کے بھی زچہ کے پاس جانے سے پرہیز کریں، کیونکہ ان امراض کی چھوت سے بھی زچہ کو پرسوت کا بخار ہو سکتا ہے۔

علاج ڈاکٹری :- پینی سیلین پانچ لاکھ کا عضلاتی انجکشن ہر چھ گھنٹہ بعد دیں یا پریکٹس پینی سیلین چار لاکھ ہر ۲ گھنٹہ کے بعد دیں، سلفا ڈرگز چھ گولی روزانہ دن میں تین یا چار بار استعمال کر سکتے ہیں، اس سلسلہ میں سلفا ڈایازین کا استعمال مفید ہے، ہمسے تجربات کے مطابق سٹرپٹومین سیلین کا ۲ گھنٹہ بعد عضلاتی انجکشن دیں۔ زیادہ مؤثر ہے۔

اگر بچہ دانی سے بدبو دار مادہ خارج ہو رہا ہو تو لائی سول (Lysol) گھول کا ڈوش کیا جائے، اگر پیٹ یا پیڑوں میں درد ہو تو آئیوڈکس کی ماش کر کے سینک کر ناکافی ہے۔ زیادہ تکلیف کی صورت میں انٹی فلاو جین کا پیسٹر لگائیں، اس مرض کے علاج پر برلیرم (Perpuralserum) سے بھی فائدہ دیکھا گیا جاتا ہے، لیکن اب سیرم کا علاج متروک ہو رہا ہے اور اس کی جگہ پینی سیلین اور سلفا گروپ نے لے لی ہے۔ اس مرض میں پرائیوٹ سیل ریڈ

(Prontosil Red) دو گولی دن میں تین بار دینی چاہیے۔

پرائنٹوسیل (سلفونامائیڈ سے مرکب باکٹیریا کے ٹیکے) بھی کئے جاتے ہیں، جو پروسٹ کے بخار کے علاوہ جراثیمی بخار، خارش، خرابی خون دسوجن کے مفید ہیں، اسے پانچ سی سی کی مقدار میں بذریعہ عضلاتی یا وریدی انجکشن لگایا جاتا ہے۔ جب تک کہ بخار نارمل نہ ہو، برٹش باکٹیرکپنی اسے پرائنٹامیڈ (Prontamidol) کے نام سے فروخت کرتی ہے۔

نوٹ :- پروسٹ کے بخار کی مریضہ کو مرض کے بعد عام طور پر شدید تسم کی کمی خون کا عارضہ ہو جاتا ہے، ایسی حالت میں وٹامن بی ۱۲ کا استعمال کیا جائے، بعض دفعہ پروسٹ کا بخار اپنی سلین اور سٹریپٹومائی سین سے دور نہیں ہوتا، ایسی صورت میں ٹائیفائیڈ بخار سے تشخیص کرنا ضروری ہے، اگر ٹائیفائیڈ فیور ہو تو کلورومائی ٹین یا سنٹھومائی ٹین کا استعمال کیا جائے۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ سلفاڈایازین (Sulphadiazine) یا سلفاٹرائیڈ (Sulpha triad) چھ گولی تک روزانہ دن : تین یا چار بار کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔

۲۔ ڈائی کرسٹی سین (Dicysticin) سارابھائی ————— یا کمبائیوٹک (Combiotic) فز ————— یا سکیلوماڈ (گلیکو) وغیرہ، سٹریپٹومائی سین (Streptopenicilin) کا ایک وائل ہر ۴ گھنٹہ بعد عضلاتی انجکشن دیں۔ صرف دو ٹیکوں سے ہی اتر جاتا ہے۔

۳۔ ٹیرامائی سین ایس۔ ایف۔ (Terramycin - S.F.) فز ————— یا لیڈرمائی سین (Ledermycin) لیڈرے ————— ایلسائیکلین (Alcyclin) المبیک ————— یا سوبامائی سین (Subamycin) وغیرہ ٹیراسائیکلین کے ایک دو کپ ہر چھ گھنٹہ بعد دودھ یا پھلوں کے رس سے دیں۔

۴۔ پروکین مینی سلین (Procaïnpenicillin) چار لاکھ یونٹ کا ایک وائل ڈسٹلڈ وارٹ پانچ سی سی میں حل کر کے عضلاتی انجکشن کریں یہ سٹریپٹومائی سین سے کم فائدہ مند ہے۔

۵۔ میڈریبون (Midribon) روش ————— پہلے روز دو گولیاں، بعد میں ایک گولی روزانہ۔ درم، سوزش اور شدید سرا میں مفید ہیں۔ صبح اور شام دونوں وقت مریضہ کے مہل کو ویجائیل ڈوش (پچکاری) کے ذریعہ صاف کریں۔ ہر روز یہ عمل جاری رکھیں، مریضہ بالکل تندرست نہ ہو جائے۔

ڈوش کے لئے ڈیٹول (Dettol) کا استعمال کیا جائے، بخار میں اگر قے بھی شامل ہو تو انٹھی سان (Anthisan) کی ایک گولی کے ساتھ دی جائے۔

یونانی علاج :- اصل سبب دریافت کر کے اس کے مطابق علاج کریں، اگر نفاس بند ہو گیا ہو تو اس کو جاری رکھنے کی کوشش اس کے لئے بیج خطمی، سولف، عنب الثعلب، لمٹھی چھلی ہوئی، چھلکا جڑ کپاس، بیج خرپڑہ ہر ایک چھ ماشہ، ان سب ادویات کو ڈیڑھ پاؤ پا جوش دیں اور مل چھان کر اس میں خمیرہ بھنڈہ دو تولہ مل کر اور صاف کر کے پلائی، تقویت کے لئے خمیرہ گاؤ زبان دبید مشک دیں یا مسکھرا ایک تولہ، چھلکا المٹاس ۹ ماشہ، پوست خرپڑہ، سولف، پرسیاؤ شان ہر ایک سات ماشہ، سب کو تین پاؤ پانی میں جوش دیں، جب تہائی رہ صاف کر کے موسم سرما میں گڑ چار تولہ ملا کر اور موسم گرما میں شربت بزوری دو تولہ ملا کر تین روز تک بجائے آب و دانہ کے پھوڑا پھوڑا پلاتے سے بند نفاس جاری ہو جاتا ہے۔

آیور ویدک علاج :- حفظہ القدم کے لئے پنچ جیرک پاک چھ ماشہ تا ایک تولہ ہمراہ دودھ گائے دیں، بخار کی حالت میں سوتکا آنک

رتی ہمراہ رس اور ک دیں یا برہت سوتکا دودھ رس آدھی سے ایک رتی ۔ مندرجہ ذیل نسخوں میں سے کسی ایک کا استعمال کریں :-
۱۔ جڑ کنول پھول، ناگ مورتھا، گلو، گندھال، سونٹھ، کھرنٹی، جملہ ادویہ برابر دو تولے کر جو شانہ بنا کر اس میں چھ ماشہ شہد ملا کر پلا میں، زچہ کے بخار اور کھانسی کے لئے مفید ہے۔

۲۔ سونٹھ، لکڑ سنگی، پلا مول برابر کا سفوف بنا کر ڈیڑھ ماشہ سے تین ماشہ گرم پانی سے پلا میں۔ زچہ کی کھانسی اور بخار کے لئے مفید ہے۔
ہومیوپیتھک علاج :- ڈاکٹر جہار صاحب اپنی مشہور تصنیف "فورٹ ایر پریکٹس" (چالیس سالہ پریکٹس) میں پر سوت کے بخار کے علاج میں تحریر کرتے ہیں :-

پر سوت کے بخار کے ساتھ خواہ پیٹ کی آب دار جھلی میں ورم ہو جائے یا ورم رحم ہو یا تپ محرقہ کی سی علامات پیدا ہو جائیں، اگر شروع ہی میں مجھے علاج کے لئے بلایا جائے تو میں ایکنائٹ ۳ سے علاج شروع کرتا ہوں، یعنی دو گولیاں بخورے سے پانی میں گھول دیتا ہوں اور اس میں ایک چھوٹا چمچ ہر دو یا تین گھنٹہ کے وقفہ پر دیتا ہوں، بعض اوقات یہ ایسی دوائی ہی شفا یابی کے لئے کافی ہے۔ اگر ایکنائٹ کافی ثابت نہ ہو اور سچہ دانی میں زیادہ تکلیف ہو تو میں سیلا ڈونا دیتا ہوں، اگر پیٹ کی آب دار جھلی زیادہ مبتلائے مرض ہو تو برائی ادیا دیتا ہوں۔
اگر شروع میں میرا علاج نہ ہو بلکہ اس وقت مجھے بلایا جائے جب کہ بخار تپ محرقہ کی صورت اختیار کر چکا ہو یا شروع بخار میں ہی تپ محرقہ کی علامات آشکارا ہوں اور بخار کا اثر دماغ پر ہو چکا ہو تو سیلا ڈونا یا ایوسامیس دیتا ہوں، خاص کر جب کہ تشنج شروع ہو گئے ہوں، برعکس اس کے اگر شکمی تکلیف زیادہ ہوں اور آبی بدبودار دست آتے ہوں اور جسم پر پھنسیاں یا تور کی نکل آئی ہو تو رسٹاکس یا آرسینک دیتا ہوں۔
ایک زیادہ خراب کیس میں جب کہ ایلیوپیتھک علاج سے تپ محرقہ کی سی حالت پیدا ہو گئی تھی اور مریض بالکل بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی، آنکھیں تارے لگی تھیں، چہرہ ہسیت ناک اور زرد تھا، کسی وقت بڑ بڑاتی تھی اور کسی وقت ہدیائ کا دورہ ہوتا تھا اور کھٹے منہ سے بدبودار سانس زور سے نکلتا تھا اور ایوسامیس، رسٹاکس دینے سے کوئی فائدہ نہ ہوا تھا، وہاں سلفز کے دینے سے غیر متوقع حالت بہتر ہوئی، اس کے بعد رسٹاکس دینے سے مکمل صحت ہو گئی تھی۔

غذا و پرہیز :- دیرینہ غذا سے پرہیز کریں، مونگ کی دال، دلیا وغیرہ دیں، دودھ و آتش جو کا استعمال مفید ہے، جب پر سوت کا بخار شروع ہو تو بچے کو زچہ کا دودھ پلانا بند کر دینا چاہیے۔

امراض زچہ کے لئے منتخب نسخہ جات

پیش زچہ :- لعاب ریشہ خطمی چار ماشہ، عرق غلب الثعلب ایک تولہ میں شربت بزدری تین تولہ، چہار تخم ایک تولہ ملا کر پلا میں اور بطرز پیش کے علاج کریں۔

دودھ کا بخار :- زچہ کو ولادت کے چھ سات گھنٹہ بعد بچے کو دودھ پلانے سے یہ عارضہ نہیں ہوتا، پھر بھی چھاتیوں میں تناؤ زیادہ ہو تو بذریعہ بریٹ پیپ نکال دینا چاہیے، بخار کی صورت میں ہلکے ملیتات پلا کر زچہ کی قبض کشائی کی جائے، اس سے چھاتیوں کا تناؤ کم ہو جائے، بطور دوا بیج خرپڑہ چھ ماشہ، عناب پانچ دانہ، مویز منقہ ۹ دانہ، خاکسی پانچ ماشہ، عرق سونف و عرق مکوہر ایک ۹ تولہ میں جوش دے کر صاف کر کے پلا دیں۔

ڈاکٹری علاج میں رفع بخار کے لئے معمولی فیور کمچر دیں۔ اور کیپٹرائیل ایک اونس کا جلاب دیں، طبیعت صاف ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی بخار ہو تو بخار کا علاج بطرز پر سوت کیا جائے اور بخار کو ہٹانے کے لئے سلفا ڈرگز اور بذریعہ انجکشن مینی سلین یا سٹریٹو مائی سین کا استعمال مفید ہے۔

دودھ کی زیادتی :- بعض دفعہ زچہ کی چھاتیوں میں زیادہ دودھ اتر آتا ہے اور بچے کی خوراک سے زیادہ ہوتا ہے، اگر اس کی تدبیر کی جائے تو ورم کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، دودھ کم کرنے کے لئے مندرجہ ذیل ادویات نہایت مفید ہیں۔

۱۔ مسور کو سرکہ میں پکا کر یا زیرہ سیاہ کو سرکہ میں پیس کر چھاتیوں پر لپیپ کریں۔

۲۔ گندم کا آٹا، باقلا کا آٹا، تلوں کے تیل اور پانی کی مدد سے گاڑھالیپ بنا کر چھاتیوں پر لگائیں۔

۳۔ سولف، بیج خرپڑہ، خارخک، بیج خیارین، حب کا کنج ہر ایک چھ ماشہ، سب کو پانی میں پیس کر چھان لیں اور شربت بزدوری تین تولہ ملا کر اور شام پلائیں۔

آیور ویدک علاج بطرزیونانی علاج کے کریں۔

ڈاکٹری علاج میں ہلکا جلاب دیں، دودھ پستانوں سے بذریعہ برلیٹ پیپ نکال دیں، پستانوں پر سیلاڈونا گلیسرین (سیلاڈ) ایک حصہ، گلیسرین آٹھ حصہ لگاویں۔

مریضہ کو سیال اغذیہ و اشربہ کم دیں، مثلاً دودھ، پانی، آش جو، نان گندم اور ڈبل روٹی وغیرہ شوربے میں بھگو کر کھلائیں۔

ہومیوپیتھک علاج میں ۱۔ پلسٹلا، ۲۔ کلکیریا کارب، ۳۔ برائی ادنیا، ۴۔ چائنا، بہترین ادویات ہیں، پستانوں پر سیلاڈونا گلیسرین (ایک حصہ سیلاڈونا مدرٹنکچر اور آٹھ حصے گلیسرین) ملا کر لپیپ کریں، مریضہ کو پینے کے لئے دودھ کم دیں۔

دودھ کی کمی :- بعض اوقات زچہ کے پستانوں میں دودھ کی اس قدر کمی ہوتی ہے کہ بچے کے لئے کافی نہیں ہوتا، دودھ کو بڑھانے کے لئے زچہ کو عمدہ اور مقوی غذا کھلائیں، خاص طور پر دودھ، مکھن، بالائی، میوہ جات، گیہوں کا دلیہ وغیرہ دیں۔

یونانی علاج میں مندرجہ ذیل نسخے اس مرض کا مؤثر علاج ہیں :-

۱۔ ارنڈ کے پتوں کو چھاتیوں پر باندھیں یا ارنڈ کا تیل (کیٹر آیل) کی چھاتیوں پر مالش کریں یا ارنڈ کے پتوں کی بھجیا پکا کر گرم گرم پستان پر باندھیں یا روغن زیتون کی چھاتیوں پر مالش کریں، نہایت مفید ہے۔

۲۔ ارنڈ کے پتوں کو جوش دے کر اور اس میں صاف کپڑا بھگو کر پستانوں پر اس کی ٹکڑی کر دیں، دودھ بڑھ جائے گا۔

۳۔ ستاؤڑ مناسب مقدار میں دودھ گائے میں جوش دے کر چینی ملا کر پلائیں۔

۴۔ تودری سُرخی ۹ ماشہ ہمراہ دودھ گائے نیم گرم دیں۔

۵۔ ستاؤڑ پُر تولہ، سولف پُر تولہ، سفوف بنائیں، یہ سفوف پہلے کھلائیں، اوپر سے نخود تین تولہ ایک پاؤ دودھ گائے میں بھگو کر کے یہ دودھ پلائیں۔

۶۔ زیرہ سفید برابر چینی ملا کر ایک تولہ کی مقدار میں پانی سے کھلائیں۔

آیور ویدک علاج میں زیرہ سفید دو تولہ، دانہ الاچی خورد ایک تولہ، مغز خیارین چھ ماشہ، مغز کدو چھ ماشہ، سب کو پیس کر آٹھ خوراک لیں اور ایک ایک خوراک صبح و شام دودھ سے کھلائیں، اس سے دودھ صاف ہو کر خوب بڑھ جاتا ہے۔

ڈاکٹری علاج میں کاڈیور آیل ایک ایکٹ چھ بعد از غذا پلائیں، جدید ادویات میں لیکٹا گول جو بنوں کے جوش اور فاسفورس کا مرکب ہے۔ یہ بچے والی عورت کے دودھ میں زیادتی کرنے کے کام میں لائی جاتی ہے۔ مقدار خوراک ایک چمچ دودھ م

سے تین بار دیں۔

پیدائش و افزائش دودھ کے لئے زچہ کو سیال اغذیہ دیں، آش جو، نخنی، بھیلوں کا پانی وغیرہ دیں۔

ٹانگ کا سفید ورم :- اس مرض میں زچہ کی ٹانگ پر ورم آجاتا ہے جس کی رنگت عام طور پر سفید ہوتی ہے۔ اگر ورم کو دبایا جائے تو اس میں گرٹھا نہیں پڑتا، یہ عارضہ جب رحم سے جریان خون ہوتا ہے اور اس کا متعفن مادہ خون میں سرایت کر جاتا ہے تو وریڈوں میں خون منجمد ہو کر اس جگہ کا دوران خون رُک جاتا ہے۔

یہ عارضہ ولادت سے دو ہفتہ بعد اکثر زچہ کی بائیں ٹانگ اور کبھی دونوں ٹانگوں پر نمودار ہوتا ہے، ٹانگ اور پاؤں میں شدید درد ہوتا ہے، عام طور پر سرین کے پنجے سے شروع ہو کر اوپر کو بھی پھیلتا ہے، مریضہ کو سردی سے بخار ہو جاتا ہے، جس سے سخت بے چینی ہوتی ہے، ڈاکٹری میں اس کو "وائٹ لیگ" کہتے ہیں۔ پندرہ بیس روز بعد تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے، پاؤں میں سختی کافی عرصہ تک رہتی ہے، زچہ کو کامل آرام و سکون سے اسے رکھیں، پاؤں کو تکیہ سے اونچا رکھیں اور جو شانڈہ پوست خشکاش اور گل ٹیسو سے مقام ماؤٹ پر سینک کریں، جو شانڈہ میں فلائین کے ٹکڑے لٹک کر مقام ورم پر رکھیں اور موم جامر لپیٹیں۔

ڈاکٹری طریقہ علاج میں اکیٹول گلیسرین یا سیلا ڈونا گلیسرین کا لیپ کریں، اس کے ساتھ ہی مینی سلین یا سٹرپٹو مینی سلین کا عضلاتی انجکشن کریں یا ٹوٹیل کھانے کے لئے گولیاں یا ایمپولز عضلاتی انجکشن کئے جاسکتے ہیں، ٹانگ کی سوجن دور کرنے کے لئے بورک گھول، ڈیٹول گھول سے ٹکور کرنی مفید ہے یا آیوڈکس کی مالش کا استعمال مفید ہے۔

یونانی دوا یور ویدک طریقہ علاج میں سولف، جڑ سولف، مکوشک، تخم خرپڑہ، پرسیا دشاں ہر ایک سات ماشہ، بیج قرطم پانچ ماشہ، یزمنقی ۹ دانہ، عناب پانچ دانہ۔

عرق مکو میں جوش دے کر صاف کریں اور شربت بزوری دو تولہ ملا کر خاکسی متن ماشہ چھڑک کر پلائیں اور بیرونی طور پر روغن گل و روغن نہ یار و عن زیتون کی مقام ماؤٹ پر مالش کریں اور جب تک مرض میں تخفیف نہ ہو موٹھ سالم یا مونگ سالم کا پانی یا گہیوں کا نمکین دلیہ لے رہیں اور بادی و فیتل چیزوں سے سخت پرہیز کریں۔

ہومیوپیتھک علاج میں ایکونائٹ (ابتدائے مرض میں) پلیٹلا (جب وریڈوں میں گانٹھیں پڑ گئی ہوں) ہو جب علامات مرض دیں۔ علاوہ ازیں سیلا ڈونا، آرنیکا، برائی اونیا، رسٹاکس وغیرہ ادویات بھی ————— اپنی اپنی علامات مخصوصہ کی موجودگی میں کام

تشنج زچہ :- کبھی دوران حمل یا زچگی کے زمانہ میں ہرگی کی طرح تشنج ہونے لگتا ہے، یہ عارضہ وضع حمل میں بے احتیاطی کرنے سے آہوتا ہے، کیونکہ رطوبات فاسدہ بچہ دانی میں رہ کر تعفن پیدا کر دیتی ہیں اور اس تعفن کا زہریلا مادہ خون میں جذب ہو کر تشنج کا موجب بنتا ہے، کبھی امراض گردہ کی وجہ سے جب گردے کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ خون کے زہریلے مواد کو براستہ پیشاب خارج نہیں کر سکتے، وہ زہریلا مادہ خون میں مل کر تشنج کا سبب بنتا ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق البومن نوزیا (بول زلالی) انیمیا (فقر الدم) سے یہ عارضہ آہوتا ہے۔

شروع میں سرور دہوتا ہے اور ہلکے آتے ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، ہاتھ پاؤں پر آس ظاہر ہوتا ہے، چہرہ اور منہ کے دوسرے عضلات میں لگاتار تشنج ہونے لگتا ہے، چہرہ تن جاتا ہے اور اس پر بل پڑ جاتے ہیں۔ کبھی زبان باہر نکل آتی ہے، کبھی اندر چلی جاتی ہے، منہ سے جھاگ نکلتی ہے اور پیشاب و پاخانہ بلا ارادہ خارج ہو جاتے ہیں۔ پسینہ سے بدن شرابور ہو جاتا ہے، من کی زیادتی کی صورت میں مریضہ کو کسی بڑے ہسپتال میں بھیجوائیں۔

ڈاکٹری طریقہ علاج میں دردوں کو کم کرنے کے لئے پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں سرکاری فارما کو پیاء کے نسخہ بروما یڈ کلورل

مکسچر (Bromide Chloral Mixture) کا استعمال کریں، جس کا نسخہ درج ذیل ہے :-

پوٹاسی برومائڈ ۲۰ گریں، کلورل ہائیڈریٹ ۱۰ گریں، شربت سادہ ایک ڈرام، کلوروفارم وائٹ ایک اونس تک۔
پینیدینے والا تسکین دہ مکسچر ہے، ایسی ایک خوراک ہر تیسرے یا چوتھے گھنٹہ بعد دیں، پیشاب کھولنے کے لئے اسی فارماکو پیائی الکلائن ڈائیورٹیک مکسچر (Alkaline Diuretic Mixture) کا استعمال کرائیں۔

پوٹاسیم سٹراس ۳۰ گریں، سوڈیم بائی کارب ۳۰ گریں، وائٹ ایک اونس تک، نینوں کا گھول بنا کر پلائیں۔ دیگر ادویات کے لئے تشنج (ٹینس) کا بیان دیکھیں۔

یونانی علاج میں سردی طور پر روغن قسط، روغن زعفران کی پشت و گردن کے مہروں پر نیم گرم مالش کریں یا زعفران (کنیر)، ایک ماشہ کستوری دورتی کو روغن بابونہ دورتی میں حل کر کے بلیں اور جائفل سالم منہ میں رکھ کر اس کا عرق چوسیں اور کھانے کے لئے حیض و نفاس کو جاری کرنے والی دوائیں دیں، اس سلسلہ میں جاؤ شیردوسے چار ماشہ پس کر شہد میں ملا کر چٹائیں یا شربت پودینہ دو تولہ سمراہ عرق سولف دس تولہ دیں۔

ہومیو پیتھک علاج میں جب کہ تشنج تمام جسم میں پڑتے ہوں یعنی آنکھوں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک تمام عضلات مبتلا ہوں تو ہائیوسکس دیں، کاپلی پیٹ میں کرپل، رعشہ اور تشنج ہوتے ہوں اور آنکھوں کی بینائی میں نقص ہو گیا ہو یعنی ایک کے دو دو نظر آتے ہوں تو جلیسی میم دیں۔

جنون زچہ (زچہ کی دیوانگی) :- کبھی ایسا جنون حمل کے دنوں میں خاص طور پر حمل کے ابتدائی تین ماہ کے آخر یا چوتھے ماہ کے شروع میں عام ہوا کرتا ہے اور کبھی بچہ کی پیدائش کے تھوڑے عرصہ کے بعد اور کبھی دودھ پلانے کے زمانہ میں ہوا کرتا ہے، اس سلسلہ میں حیوان رہے کہ بچہ کی پیدائش یا دودھ پلانے کے زمانہ میں جو جنون ہوتا ہے، اس کے اسباب تو عام طور پر وہی ہوا کرتے ہیں جو اوپر لکھے جا چکے ہیں، لیکن کبھی زچہ کا جریان خون یا مرض بول زلالی یا عرصہ تک بچے کو دودھ پلاتے رہنا بھی اس مرض کے اسباب ہوا کرتے ہیں۔

جب حمل کے دنوں میں یہ مرض ہو تو حاملہ ہمیشہ غمگین اور آسم تبتیا کی طرف مائل رہتی ہے، جب بچہ پیدا ہونے کے بعد دو ہفتے کے اندر یہ مرض ہو تو شدید قسم کا ہوا کرتا ہے، جس سے مرضیہ نہایت جذبہ اور جوش میں بے ہودہ ہو اس اور ڈراؤنی حرکات کرنے لگ جاتی ہے، نیند نہیں آتی بے چینی ہوتی ہے، کبھی دیوانگی اس قدر ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اور کبھی بچے کو نقصان پہنچاتی ہے۔

ڈاکٹری علاج :- سرپینٹا (Serpenta) یا سرپینا (Serpina) ایک گولی دن میں دو تین بار دیں یا تھیمو گارڈی نل (سے اینڈ بیکر) ایک

سے دو گولی روزانہ، اسے خالی پیٹ استعمال نہ کیا جائے، سپیلاکپنی ہی گولیاں تھیوبیٹال (Theo Betal) المیک کپنی تھامی نال (Tham inal) بولٹس کپنی ہی دوا تھیوبرین کپاؤنڈ اور بائرکپنی تھیومی نال (Theo minal) کے نام سے تیار کرتی ہے۔

علاوہ ازیں الکسر برومائڈ ولیرین یا پوٹاسیم برومائڈ کا استعمال بھی مفید ہے اور جنون میں دی گئی ادویات کا استعمال کریں۔
یونانی علاج :- غیند لانے کے لئے روغن کاہو، روغن خشخاش، روغن کدو، شربت ختران، ہوزن میں کپڑا تر کر کے ہر وقت سر پر رکھیں اور زچہ کاہو، بیج کاسنی، بیج خشخاش سفید، دھنیاں، مغز بیج کھیرا، بیج مغز کدو، ہر ایک تین ماشہ، مغز بادام سات دانہ، سب کو پیس کر شیره نکالیں اور شربت بنشتہ تین تولہ ملا کر صبح و شام پلائیں، تقویت کے لئے مغز غنبری یا مغز یا قوتی کا استعمال کریں۔

آپور ویدک علاج بطور یونانی علاج کے کریں اور جنون کے بیان میں دی گئی ادویات حالات مرض کے مطابق استعمال کرائیں۔
ہومیو پیتھک علاج بطور جنون و مایخولیا کے کریں، ایام حمل کا جنون عموماً وضع حمل کے بعد خود بخود دور ہو جاتا ہے، لیکن ایام زچگی کا جنون عام طور پر نہایت تکلیف دہ ہوا کرتا ہے۔ قبض نہ ہونے دیں، بچے کو الگ رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرضیہ بچہ کو نقصان پہنچائے۔
وہم پستان :- پستان میں ورم آ جاتا ہے۔ اگر مناسب علاج نہ کیا جائے تو پھوٹا بن جاتا ہے، اس سلسلہ میں جمع شدہ دودھ بریٹ

پ سے نکال دیں، ورم کو تحلیل کرنے کے لئے آئیوڈین کی مالش کریں۔ انٹی فلو جین یا سیلا ڈونا کا پلستر لگائیں اور عام سوجن و ہیپوٹروں کی طرح علاج کریں، پینی سلین، سٹرپٹومین سلین یا دونوں کے مرکب ٹیکے لگائیں، سلفا ڈرگز کا استعمال بھی مفید ہے یا سپٹران گروپ ادویات دیں۔
یونانی طریقہ علاج میں نوشادر چار ماشہ لے کر آدھ سیر جو شانہ پوست میں حل کر کے رکھ دیں اور اس میں کپڑا رت کے پستان پر رکھیں۔
بب خشک ہو جائے پھر تر کریں یا مصبر زرد ایک تولہ، گوگل چھ ماشہ، میدہ گندم ایک تولہ، سب ادویہ کو جو شانہ پوست خشکاش میں پیس دینا د کریں۔

بھٹنی کا زخم :- اگر سر پستان کو صاف نہ رکھا جائے تو اس پر پیل اور دودھ جم کر خراش پیدا کر دیتی ہے یا اس کا سر بھٹ جاتا ہے۔
اس سے زخم ہو کر باعث تکلیف ہوتا ہے، بطور حفظ ماقدم بچہ کو دودھ پلانے کے بعد پستان کی بھٹنی کو صاف کر لیں اور ہر روز ایک دو چھاتیوں کو گرم پانی سے دھوئے رہیں۔

اگر بھٹنی میں زخم پیدا ہو جائے تو زخم کو جو شانہ برگ نیم سے دھو کر یہ دوا استعمال کریں :-

پھلکڑی تین رتی، گوند کی کرتی ماشہ باریک پیس کر زخم پر چھڑکیں یا مرہم جرت لگائیں۔

ڈاکٹری طریقہ علاج میں برنول آسٹینٹ یا سبازول آسٹینٹ لگائیں یا بورک گلیسرین کا استعمال کریں، بدن و لباس کو پاک و صاف رکھیں، علاج بطور زخم کے کریں۔

چھاتیوں کا چھوٹا ہونا :- یہ عارضہ جنسی غدودوں کی کمزوری سے پیدا ہوتا ہے، جس سے چھاتیوں کی بڑھوتری میں کمی رہ جاتی ہے،
بیاں بالکل سکڑی ہوئی ہوتی ہیں اور بعض عورتوں میں تو پستان بالکل نظر ہی نہیں آتے جس سے ان کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، اس مرض کے لئے خصیۃ الرحم (اوریز) کے ہارمون استعمال کئے جائیں۔

۱۔ پراجی نان (Prodynon) :- یہ شیرنگ کمپنی کی تیار کردہ اوریز کے ہارمون کی گولیاں ہیں اور کمزوری رحم، ایام رحم کی بے قاعدگی اور بلوغت لانے کے لئے امراض زنانہ میں مفید ہیں، جہاں زنانہ ہارمون کے استعمال کرنے کی ضرورت ہو ان کا استعمال مفید ہے، ایک سے دو گولی دن میں دو سے تین بار کھانے کے لئے یا ایک سے دوسری سی عضلاتی انجکشن دیں۔

۲۔ سٹیلبا سٹرول (Stilboestrol) :- یہ بھی بناوٹی خصیۃ الرحم ہارمون ہے، بلوغت لانے و امراض رحم، خصیۃ الرحم کی کمزوری کے لئے مفید ہے، گلیکسو کمپنی اسے کلینا سٹرول (Clino Sterol) کے نام سے تیار کرتی ہے، ایک سے پانچ ملی گرام دن میں ایک سے دو بار دیں۔

۳۔ انڈرو جیسٹان (Andro Gestan) :- یہ شیرنگ کمپنی کی تیار کردہ دو خصیۃ الرحم کی ہارمون، خصیۃ الرحم کی ہارمون کی تیار شدہ گولیاں ہیں۔ جو خون حیض کی زیادتی یا بچہ دانی کی کمزوری و چھوٹاپن کے علاوہ چھاتیوں کو بڑھانے کے لئے مفید ہیں۔

۴۔ انٹیکس (Antex) :- یہ بی، ڈی، اینج کمپنی کی تیار کردہ حاملہ گھوڑیوں کے خون سے تیار کردہ ہارمون ہے، یہ خصیۃ الرحم اور خصیۃ الرحم کی تقویت کے لئے و کمزوری کے لئے مفید ہے، علاوہ ازیں اینٹی ٹیوٹرین (Antitutin) کا استعمال بھی مفید ہے۔ بیرونی طور پر اوو سائیکلین (Ovocyclin) مرہم کی مالش مفید ہے۔ باہر سے تلی کا تیل لگا کر بریٹ ڈولپر سے دیا یا کریں۔

چھاتیوں کا بڑا ہونا :- اس مرض میں عورت کے پستان معمول کی نسبت ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ یہ عارضہ پستانوں کو زور سے کھینچنے زیادہ سے ورزش نہ کرنے سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے، اس مرض میں تمام جسم موٹا اور ڈھیلہ ہو جاتا ہے۔

ڈاکٹری طریقہ علاج میں چھاتیوں کے چھوٹا ہونے کی صورت میں جو علاج تحریر کیا گیا ہے، یعنی زنانہ ہارمون اور ہارمون بلوغت کے ٹیکے دیا جائے، بیرونی طور پر سیلا ڈونا گلیسرین یا اوو سائیکلین (Ovocyclin) مرہم کی مالش کی جائے۔

ایسی طریقہ علاج میں مندرجہ ذیل تجربات اس مرض کا موثر علاج ہیں :-

۱۔ برگد درخت کی داڑھی کے نازک سرے جو سُرخ اور زرد رنگ کے ہوتے ہیں، پانی میں پیس کر چھاتیوں پر لپیپ کریں۔

۲۔ چھاتیوں پر چست انگیا پہنا بھی مفید ہے۔

۳۔ آم کے پھل جو بقدر خود چھوٹے ہوں، پھلی بول جو چھوٹی ہوں، مغزِ بزمِ ہندی، چھلکا انار، سب ادویہ کو سایہ میں خشک کر کے باریک پیس، اور یہ سفوف چھ ماشے کر آدھ پاؤ گھی گائے دھینی میں حلوا بنا کر چالیس دن کھائیں، پستان باکرہ کی طرح ہو جاتے ہیں۔

۴۔ پھل آم چھوٹے، پھلی بول کچی، مازد سبز، دھینی برابرے کر سفوف بنائیں اور بقدر ایک تولہ روز کھائیں۔

۵۔ بعض عورتیں صرف ایک مرتبہ بچہ پیدا ہونے سے چھاتی کی خوبصورتی کھو بیٹھتی ہیں، درج ذیل روغن نرم، لٹکی ہوئی بد شکل چھاتیوں کو اصلی حالت میں لاتے درخت انار کے پھول پتے کچے پھل اور چھلکا، چاروں کو نیم کوب کر کے ایک دن رات پانی میں بھگور کھیں، اس کے بعد جوش دے کر صاف کر کے

اس کے چہارم حصہ کے برابر تلوں کا تیل شامل کر کے جوش دیں، یہاں تک کہ پانی جل جائے اور تیل باقی رہ جائے، حقوڑا سا تیل سوتے وقت آہستہ آہستہ پانوں پر مالش کریں اور چست انگیا پہن لیا کریں۔

نوٹ :- اگر کوئی اندرونی بیماری صحت کو دیمک کی طرح چاٹنے والی ہو تو خارجی تدبیر بے کار ثابت ہوگی۔ داناؤں کا مقولہ

"Beauty comes from within" یاد رکھیں۔ اصل مرض کا علاج ضروری ہے۔ تندرستی کی حالت میں یہ تیل چالیس دن تک

متواتر استعمال کیا جائے اور چھاتیاں انگیا سے کس کر رکھی جائیں۔

۶۔ مازد سبز، پھول انار، چھلکا انار، پھلکڑی سفید، جفت بلوط، افاقہ ہر ایک چھ ماشہ، سرکہ انگوری میں پیس کر چھاتیوں پر ضماد کریں۔

۷۔ جو مقشر، مائیں، چھلکا انار باریک پیس کر دودھ میں ملا کر پستانوں پر لپیپ کر لیں اور چست انگیا پہنائیں۔

۸۔ پھول انار ایک تولہ، چھلکا انار ایک تولہ، چھلکا کیکر ایک تولہ، چھلکا جامن ایک تولہ، تمام ادویہ کو تین پاؤ پانی میں بھگور کھیں، صبح تلوں کے

تیل میں پکائیں۔ پانی جل جانے پر تیل محفوظ رکھیں، بوقت ضرورت پستانوں پر ملیں، اس سے پستان سخت ہو کر اصلی حالت پر آ جائیں گے

بطور حفظ مآلِ قدم بچہ کو لیٹ کر یا گود میں اٹھا کر دودھ نہیں پلانا چاہیے۔ ہاتھوں پر اٹھا کر بچے کے منہ کو چھاتی کے پاس لے جاؤ نہ کہ چھا

کو بچہ کے منہ کے پاس۔ علاوہ ازیں بچہ کا دودھ مناسب وقت پر چھڑا دینا بھی ضروری ہے۔ ایسا لباس پہنا جائے جس سے پستانوں کو ہمارا

حاملہ عورت و بچوں کو ٹیکے کب لگوائیں

مرض	دیکھیں	عمر
۲۔ ٹے ٹے نس	ٹی، ٹی (ماں اور بچے دونوں کو تحفظ دیتا ہے)	حاملہ عورت - ۱۶ ہفتے - ۳۶ ہفتے
۳۔ ڈیپتیریا، کالی کھانسی ٹے ٹے نس	ڈی، پی، ٹی	شیرخوار بچے - ۳ ماہ - ۹ ماہ
۳۔ پولیو	پولیو	" " " "
۱۔ تبہ دق	بی، سی، جی	" " " "
۱۔ خسرہ	خسرہ	شیرخوار بچے - ۹ - ۱۲ ماہ
۱۔ بوسٹر	ڈی، پی	" " - ۱۸ - ۲۴ ماہ
۱۔ بوسٹر	پولیو	" " " "

نوٹ :- ایک ڈوز اگر پیشتر ازیں دیا گیا ہو۔ دو ڈوزوں کے درمیان کم از کم ایک ماہ کا وقفہ ہونا چاہیے۔ معمولی زکام، کھانسی، اسہال کے دوران بھی ٹیکے دے

جاتا ہے۔ بہت زیادہ تکلیف میں ٹیکہ نہیں دینا چاہیے۔



پندرھواں باب

بچہ دانی و یونی کی بیماریاں

شویت پردر، سفید پانی آنا، لیکوریا، (Leucorrhoea)

تعریف مرض :- اس مرض میں عورت کی اندام نہانی سے سفید زردی مائل رطوبت خارج ہوتی ہے، جس میں کبھی بدبو بھی ہوتی ہے اور زمانہ مہیسی آلائش کی شکایت لگ بھگ سچاس فیصدی عورتوں میں پائی جاتی ہے۔

وجوہات :- چھوٹی عمر میں حمل قرار پانے، جنرل کمزوری، کمی خون، ورم رحم، کثرت ملاپ، زنانہ سوزاک، آتشک، بندش ایام، غم و خوف و ہراس وغیرہ سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

اخراج رطوبت کے لحاظ سے یہ مرض پانچ قسم کا ہو سکتا ہے :-

۱۔ یونی کے بیرونی حصہ سے رطوبت خارج ہوتی ہو، ۲۔ یونی کے اندرونی حصہ سے رطوبت کا اخراج ہوتا ہو، ۳۔ بچہ دانی کی گردن سے رطوبت نکلتی ہو، ۴۔ بچہ دانی کے اندرونی حصہ سے سیلان ہوتا ہو، ۵۔ لفزین سے رطوبت آتی ہو۔

علامات :- بیرونی طور پر یونی میں خارش ہوتی ہے اور اس سے سفید زردی مائل رطوبت نکلتی ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، پیڑوں میں بوجھ درد کی شکایت محسوس ہوتی ہے، بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے، ماہواری میں تکلیف ہوتی ہے، کام کاج کو جی نہیں چاہتا اور مرض کی موجودگی میں حمل نہیں ٹھہرتا، پانچ اقسام کے سبب سے علامات درج ذیل ہوتی ہیں :-

۱۔ پہلی قسم کا مرض نوجوان عورتوں کو ہوتا ہے، چنانچہ اس قسم کی مریضہ عورتوں کی یونی کے بیرونی حصہ سے ایک لیس دار چمکیلی رطوبت نکلتی ہے۔ جس سے یونی کے ہونٹ آپس میں چپک جاتے ہیں، جب رطوبت زیادہ مقدار میں نکلتی ہے، تو اس کے بیرونی حصہ میں جمع

ہو کر جم جاتی ہے۔

۲۔ دوسری قسم کی بیماری میں اکثر نئی دُلہنیں مبتلا ہوتی ہیں، چنانچہ ان کی اندام نہانی میں خراش اور سوزش محسوس ہوتی ہے۔ اور اس سے سفیدی مائل رطوبت خارج ہوتی ہے، اگر یہ رطوبت زیادہ خارج ہو تو زخم یا سرطان ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے، بوڑھی عورتوں میں پینر کی طرح اگر رطوبت خارج ہوتی ہو تو اس کے علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس عمر میں ایسی رطوبت کا اخراج ایک معمولی امر ہے، البتہ زردی مائل رطوبت کا علاج ضروری ہے۔

۳۔ تیسری قسم میں ایسی عورتیں مبتلائے مرض ہوتی ہیں جو دو تین بچے پیدا کر چکی ہوں، اس قسم کے مرض میں اندھے کی سفیدی کی طرح لیدار اور ترش رطوبت اندام نہانی سے نکلتی ہے، جس میں بعض دفعہ خون یا پیپ کی ملاوٹ کے باعث لالی یا زردی ہوتی ہے، اس قسم کا مرض اکثر زنانہ سوزاک کی وجہ سے ہوتا ہے۔

۴۔ چوتھی قسم کا مرض اُن بیاہتا نوجوان لڑکیوں، نئی دُلہنوں یا اُن عورتوں کو ہوتا ہے، جن کا زمانہ حیض ختم ہونے والا ہو، اس مرض میں بچہ دانی سے نکلنے والی رطوبت اندھے کی طرح ہوتی ہے، مگر اس میں گاڑھا پن نہیں ہوتا، اگر مرض پرانا ہو تو اس کی رنگت شوخ پیلا پن لئے ہوتی ہے۔

۵۔ پانچویں قسم کا مرض چوتھی قسم سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔

ایلوپیتھیک علاج :- مریضہ کی عام صحت کی تندرستی ضروری ہے، اس کے لئے مقویات استعمال کرائیں اور مقامی طور پر اندام نہانی کو صاف رکھیں، ورنہ رطوبت کی خراش سے زخم وغیرہ ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے، اس سلسلہ میں ڈیوٹل ایکٹ چمچ، پانی ایک پائینٹ میں ملا کر دن میں دو یا تین بار دوش کریں یا پھسکڑی تین ماشہ، پانی ایک گلاس یا پوٹاسی پرمینگنیٹ چار گرین، پانی ایک پائینٹ میں ملا کر دوش کریں۔

جدید ترین علاج میں کولپون (Kolpon) ساختہ آرگٹون ایک بوجی روزانہ یونی (مہبل) کے اندر رکھیں، یہ ایسٹروجن سے بنی ہوئی

ویجائیل بوجیز یعنی فرزجے ہیں۔ خاص طور پر بڑی عمر کی عورتوں میں ورم کی وجہ سے یہ عارضہ ہو تو نہایت خوش گوار اثر پڑتا ہے۔

ماڈرن ادویات :- بیرونی استعمال کے لئے مندرجہ ذیل ادویات استعمال کریں :-

۱۔ ڈیسولان (Desulan) سیلگ ————— یہ سلفا نے مائیڈ اور دیگر جراثیم کش دواؤں سے تیار کی گئی ہیں، جو اندر کی رطوبت

میں خود بخود گھل کر مادّہ جلی پر دوا کی تہ چڑھائیتے ہیں، ایک ٹکیہ رات کو سوتے وقت اندر دُور تک داخل کریں، اس قسم کی ادویات

سے اینڈبیکر۔ ایس۔ وی۔ سی (S. V. C) سارابھائی ————— مائیکوسٹین (Mycostatin) فز —————

ٹیرامائی سین ویجائیل ٹیبلٹ (Teramycin-Vaginal Tablets) گیگی ————— گائینوسٹروجن (Gynostero jan)

سبا ————— وائیوزول (Viozol) سارابھائی ————— ٹیسٹوٹین ویجائیل ٹیبلٹ (Talsutin-Vaginal-Tablets)

ناموں سے مارکیٹ میں ملتی ہیں۔

۲۔ ایسی ٹارسل ویجائیل کپونڈ (Acetarsol-Vaginal-Co) شیرنگ ————— یا ڈیوی گان (بائرن) ایک سے دو ٹکیہ دایہ سے

اندر رکھوائیں۔

۳۔ ٹرائی سلفا کریم (Tri-Sulpha-Cream) یا ٹریپل سلفا کریم (Triple-Sul pha-Cream) پچکاری سے دن میں دو بار اندر داخل کریں

۴۔ سوزاکی سرائٹ کے لئے مینی سلین کے عضلاتی انجکشن دیں یا سلفا گر وپ کی ادویات کھانے کے لئے دیں۔

۵۔ کھانے کے لئے فلاجیل (Flagyl) سے اینڈبیکر ————— ایک ٹکیہ دن میں تین بار معالج کی رائے کے مطابق سات دن تک تازہ

پانی سے دیں۔

۶۔ الطریس کارڈیل یا فیمل کارڈیل ایک سے دو چمچ صبح و شام دیں، کمزوری کے لئے وٹامن بی کمپلیکس دیں۔

مریضہ کی عام صحت کو درستی پر لائیں، وٹامن بی کا استعمال مفید ہے، میرے ذاتی تجربہ میں مقامی طور پر ایس، وی، سی اور کھانے کے لئے کشتہ جندہ مرغ یا دولے لیکور یا نہایت مفید ثابت ہوئی ہے۔

یونانی علاج :- پھنکڑی بریاں، مازو بریاں ہر ایک دو ماشہ، کتھہ سفید چار ماشہ، صاف پانی تین پاؤں میں جوش لے کر چھان کر اس پانی سے اندام نہانی دھوئیں یا افاقہ، پھول انار، سک (چمکا) انار، مازو سبز ہر ایک سات ماشہ، پھنکڑی، سنبل الطیب ہر ایک تین ماشہ، سب ادویہ کو باریک پیس کر پھر صاف اور ملائم کپڑے کو پانی میں تر کر کے چوڑ کر اور دوا کے باریک سفوف سے تر کر کے اندام نہانی میں رکھیں۔ مندرجہ ذیل مجربات اس مرض کا شرعاً علاج ہیں :-

سفوف سیلان :- ستاور، کندر، چنیا گوند، مصطکی رومی، ثعلب مصری، الاچھی خورد، پھول پستہ، پھول سپاری، رتج، طباشیر، موصی سفید، بھراحت، دودھ پٹھانی ہر ایک تین ماشہ، چینی سفید برابر سفوف بنائیں اور خوراک ۹ ماشہ صبح و شام ہمراہ دودھ گائے نیم گرم سے استعمال کریں۔
دیگر :- مصطکی رومی، چنیا گوند، پھول دھاوا، جفت بلوط، کمرس، مائیں خورد، مازو سبز، رتج، کندر ہر ایک ایک تولہ، چینی سب برابر سفوف بنائیں، خوراک ۹ ماشہ صبح و شام ہمراہ دودھ کھلائیں۔

دیگر :- پھول سپاری، پھول پستہ، گوند ڈھاک، ہر ایک چار تولہ، سریالی، آسگندہ ناگوری، اندر جو شیریں، ہر ایک دو تولہ، کشتہ قلعی کشتہ ان ہر ایک تین ماشہ، کشتہ عشق اڑھائی ماشہ، چینی آٹھ تولہ، کوٹ چھان کر سفوف بنائیں، خوراک ایک سے دو ماشہ ہمراہ دودھ گائے دیں، یہ سیلان الرحم کے لئے مفید ہونے کے علاوہ محافظ حمل بھی ہے۔

دیگر :- سپاری چکنی دکنی دس تولہ کوٹ کر دوسیر گائے کے دودھ میں ڈال کر آگ پر پکاویں، پھر اس میں مائیں خورد پانچ تولہ، مائیں کلاں تولہ، کمرس پانچ تولہ، مصری دس تولہ سفوف کر کے ملائیں، سرد ہونے پر اتار لیں اور چھ ماشہ صبح و شام کو نیم گرم دودھ سے دیں۔ دو ہفتہ میں آرام لے گا۔

دیگر :- سپاری ایک تولہ، مغز جامن، موچرس، گوند ڈھاک، مائیں خورد، گل دھاوا، گل انار، پھنکڑی ہر ایک ایک تولہ، افاقہ تین ماشہ، مازو دو تولہ، دتیار کریں۔ قبل از باہر سے استعمال کریں۔ یہ دوائی صرف باہر سے ایک چٹکی استعمال کریں۔

حب سیلان :- بابائے طب حکیم فرید احمد عباسی پرنسپل زنانہ طبیہ کالج دہلی میں بکثرت استعمال کرتے تھے، سیلان کسے نہایت مفید ہے، مغز تخم بتر ہندی، سمندر سوکھ، مازو، تینوں کو خوب باریک کر کے بخود کے برابر گولیاں بنائیں، ایک ایک گولی گائے کے نیم گرم دودھ سے دیں۔
حلولے سپاری پاک :- مسج الملک حکیم محمد اجمل خاں صاحب کے معمولات میں سے ہے، عورتوں کے سیلان اور مردوں کے جربان کے نہایت مفید ہے :-

سپاری دکنی پانچ تولہ، سوختہ تین تولہ، دونوں کو کوٹ کر ایک سیر دودھ میں جوش دیں، جب دودھ کا کھویا بن جائے، تو اس کو گھی میں بھونیں اس بعد گھیوں کا آٹا ایک پاؤ، سنگھارے کا آٹا دس تولے، گائے کے گھی میں بھونیں، پھر سب کو چینی سفید آدھ سیر کے قوام میں ملا کر حلوا بنائیں، آخر میں خورد، مائیں کلاں، پھول سپاری، گوند ڈھاک، گوند کیکر، تال مکھانہ، گل دھاوا، زنج بند، مغز تخم اعلیٰ ہر ایک دو تولہ، مازو سبز دو عدد، جائفل، جاوتری، زعفران ہر ایک چار ماشہ کو کوٹ چھان کر شامل کریں۔

خوراک دو تولہ، یہ حلوا بنا کر صبح نہار منہ کھا کر آدھ سے ایک پاؤ نیم گرم دودھ پیئیں۔

کشتہ بیضہ مرعہ :- مرعی کے اندوں کے چھلکے نلک کے پانی میں چوبیس گھنٹے بھگو رکھیں، پھر ہاتھوں سے مل کر خوب دھوئیں، تاکہ اندرونی جھلی دور ہو کر چھلکا صاف ہو جائے، اس کے بعد ایک چینی کے برتن میں ڈال کر تین انگل اوپر تک لیوں کا رس ڈالیں، جب لیوں کا رس خشک ہو جائے تو کوڑھ لگی میں بند کر کے گل حکمت کر کے اور گچھٹ (ایک ہاتھ یعنی دو فٹ چوڑا دو فٹ گہرا گڑھا کھود کر) کی آگ دیں۔

خوراک دورتی سے تین رتی تک مکھن یا بالائی میں دیں، اوپر سے گائے کا نیم گرم دودھ پلائیں۔

کشتہ مروارید :- مروارید ناسفتہ ایک تولہ، دودھ گائے پانچ تولہ میں کھل کر کے ٹکیاں بنا کر گاؤ زبان کے پھول ایک پاؤ کے نغہ میں رکھ کر گل حکمت کر کے چار سیر لپوں کی آگ دیں، سرد ہونے پر نکال کر محفوظ رکھیں، خوراک ادھی رتی صبح و شام مکھن یا بالائی میں دیں، جنرل کمزوری، دل کی کمزوری اور عورتوں کے سیلان کے لئے مفید ہے، غریب عورتوں میں کشتہ سیپ کا استعمال کیا جاسکتا ہے، اس کشتہ کو بغیر آگ کے بھی تیار کیا جاسکتا ہے۔

معجون موچرس :- رطوبت کو جذب کرتی ہے اور سیلان میں بہت مستعمل ہے، موچرس، سپاری، طباشیر، نشاستہ، مازوسبز، گل سرخ، حب آلاس، بلبلہ، بلبلہ، آملہ، گل مختوم، موصلی سیاہ، موصلی سفید، ہر ایک چھ ماشہ، چھلکا انار ۹ ماشہ، آب بھی، آب انار ترش ہر ایک سوا دو تولہ، چینی سفید اور شہد خالص دواؤں کے وزن سے تین گنا لے کر قوام بنائیں اور دواؤں کو کوٹ چھان کر اس میں ملا دیں۔

خوراک ایک تولہ صبح کو پانی یا دودھ کے ساتھ کھائیں، بعض اطباء آب بھی اور آب انار کی بجائے رب بھی اور رب انار ملا کر یہ معجون بناتے ہیں۔ دیگر :- سیپ جلی ہوئی سفوف بنالیں، آدھا سے ایک گرام دودھ کے ساتھ دن میں دوبار دیں۔

آیور ویدک علاج :- سپاری پاک (بھیشج رتناولی) کا نسخہ درج ذیل ہے، جو عورتوں کی تمام بیماریوں کے لئے از حد مفید ہے، کمزوری، سیلان، اولاد کی آرزو، حمل کی حفاظت کے لئے مفید ہے، اٹھراہ، کمردرد اور عورتوں کی ہر بیماری کے لئے مؤثر ترین پاک ہے، بسم میں طاقت پیدا کرتا ہے، سیلان کی اعلیٰ دوا ہے۔

سپاری مکھنی ۳۲ تولہ، الاچی خورد، تیز پات، ناگ کسیر، ترکٹا، لونگ، چندن سفید، سنبل الطیب (بال چھڑ)، آملہ، تالیس پتر، کنول گڑ، نیلوفر، بنسوجن، سنگھار، زیرہ سفید، ستاڈر، گوکھرو، بداری قند، گل مالتی چھ ماشہ، دار چینی، کافور ایک ایک تولہ۔ پہلے سپاری کا سفوف بنائیں اور دیگر ادویہ کا الگ سفوف بنائیں، دودھ گائے دو سیریں سپاری کا سفوف ڈال کر آگ پر رکھ کر کھویا بنائیں، اس کھوئے میں ایک پاؤ گھی ڈال کر بھوئیں، سرخ ہونے پر اڑھائی سیر کھاند کا قوام ڈال کر پکائیں، معجون کا قوام ہونے پر بقایا سفوف ملا دیں، خوراک چھ ماشہ سے ایک تولہ ہمراہ دودھ قبل از غذا دیں۔

اشوک آرٹھٹ (بھیشج رتناولی) :- اشوک کی چھال پانچ سیر، جو کوب کر کے ڈیڑھ من پانی میں اس قدر پکائیں کہ پانی سولہ سیر رہ جائے تب اتار لیں، سرد ہونے پر گڑ دس سیر گل دھاوا ۶۴ تولہ، زیرہ، ناگر موٹھا، سونٹھ، دار بلدی، نیلوفر، تر پھلا، مغز بیج آم، زیرہ سفید، بانسہ، صندل سفید ہر ایک چار تولہ بار یک کر کے ملائیں اور حسب دستور آرٹھٹ بنالیں۔

خوراک ایک تولہ تا دو تولہ ہمراہ پانی برابر وزن ملا کر دیں، سیلان و تمام زنانہ امراض کے لئے بے نظیر ہے۔

پر دراتشک رس :- پارہ شدہ، گندھک شدہ، کشتہ قلعی، کشتہ چاندی، کشتہ کوڑی زرد چھ ماشہ، کشتہ فولاد تین تولہ، پارہ و گندھک کی بجلی بنا کر باقی ادویہ ملا دیں اور رس گھیکواری میں ایک روز کھل کر کے دو دورتی کی گولیاں بنائیں۔

خوراک ایک ایک گولی ہمراہ دودھ صبح و شام دیں، سیلان الرحم، زیادتی احتلام اور کمزوری کے لئے مفید ہے، آیور ویدک گرنھوا کا مشہور رس ہے۔

پکا ہوا کیلہ، ہرے آنولہ کا رس، شہد ایک تولہ، سب کو ملا کر کھانا سیلان کے لئے نہایت مفید ہے یا ستاڈر کو رس آنولہ سبز میر

برابریات دن کھل کر کے ایک ایک ماشہ کی گولیاں بنائیں، خوراک ایک سے دو گولی ہمراہ دودھ دیں یا سفوف ملٹی (چھلی ہوئی) و سفوف آملہ برابر وزن میں دو چند شہد خالص ملا کر تین ماشہ سے چھ ماشہ ہمراہ دودھ گائے کھلانے سے بھی یہ مرض دور ہو جاتا ہے۔

ہومیوپیتھک علاج :- پلٹلا (Puls tila) اگر مواد پتلا و سفید ہو۔ اوواٹسٹا (Ovatesta) اگر ساقہ دردیں ہوں، بوراکس (Borax) اگر چھپڑے ہوں۔ سیپا (Sepia) اگر سفید بدبودار ہو، اور اگر ماہواری کی خرابی سے ہو تو ہائیڈرائسٹس (Hydrastis) مشہور ادویات ہیں۔

بالوکیٹک علاج :- نیٹرم سیر (Nat muir) شروع میں جب مواد پتلا و سفید ہو۔ مفید دوا ہے، سائی لیشیا (Silicia) مرض کی پُرانی حالت میں اور نیٹرم سلف (Nat-sulph) مواد زرد رنگ کا اور گاڑھا ہو، بہترین ادویات ہیں۔
غذا پر مہیز :- زود ہضم و مقوی غذائیں دیں، دودھ، دال مونگ، شوربہ، چپاتی، ساگو دانہ، مونگ کی کھجڑی، پالک وغیرہ دیں، گرم اشیا، تیل، ترشی، رنچ، الم، ملاپ اور دھوپ میں پھرنے اور ورزش سے پرہیز کرائیں۔

سنتان اچھا، اولاد کی آرزو

تعریف مرض :- اس مرض میں عورت کو حمل نہیں ٹھہرتا اور اولاد نہیں ہوتی۔

اقسام :- دو قسمیں ہیں۔ ۱۔ خلقی یا پیدائشی، ۲۔ غیر خلقی یا مرضی۔

وجوہات :- خلقی پیدائش :- زنانہ اعضاء تناسل رحم، رحم و خصیتہ الرحم کے پیدائشی نقصانات مثلاً بچہ دانی کا نہ ہونا یا چھوٹا ہونا، رحم (بچہ دانی) کا منہ یا گردن رحم کا مسدود ہونا، خصیتہ الرحم کا ناقص ہونا پردہ بکارت کا سوراخ بند ہونا، قاذف نالیوں کا فقدان یا سوراخ بند ہونا، اندام نہانی کا مسدود یا تنگ ہونا، مہبل (ویجائنا) کی رسولیاں۔

غیر خلقی نقائص :- امراض رحم، سیلان الرحم، سیلان، انقلاب رحم، سرطان رحم، رحم کی سوزش، رحم کے زخم، رحم کی بواسیر، استسقاء رحم، قاذف نالیوں (فلوپین ٹیوبز) اور خصیتہ الرحم (اووریز) کے امراض، کمی خون، موٹاپا، عام کمزوری، کثرت ملاپ، بڑھاپا، شراب، کوکین و افیون کا استعمال، بندش حیض اور کبھی اندام نہانی کی رطوبت مذکورہ زیادہ ترش یا کھاری ہو، تو دیر ج کے کیڑے اس میں زندہ نہیں رہ سکتے، مرض آتشک یا سوزاک خاص طور پر اس بیماری کا سبب ہو کرتے ہیں۔

علامات :- امراض مذکورہ بالا میں کسی نہ کسی مرض کا پایا جانا، مزاج کی سردی اور ملغم کی زیادتی میں عورت کا جسم چھونے سے سرد معلوم ہوتا ہے بدن کی رنگت بالکل سفیدی ہو جاتی ہے، رحم سے رطوبت جاری رہتی ہے، ہر وقت سستی و کالی اور انگریزیاں زیادہ آتی ہیں، عورت کو حمل نہیں ٹھہرتا۔
تشخیص مرض :- ۱۔ مشتبہ عورت و مرد کا علیحدہ علیحدہ پیشاب کدو یا کا ہو کے پوٹے کی جڑ میں ڈالیں۔ جس کے پیشاب سے پودا سوکھ جائے، اُسے مرض بانجھ پن کا باعث سمجھیں، کیوں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شدت حرارت نے اسے جلا دیا ہے، اس کا علاج کیا جائے۔
۲۔ مرد اور عورت کی منی علیحدہ علیحدہ پانی میں ڈال کر دیکھیں، جس کی منی پانی میں تیرنے لگے اور نہ نشین نہ ہو، اس کو تصور وار تصور کرنا چاہیئے اور اس کا علاج خصوصیت سے کرنا چاہیئے۔

۳۔ مرد کے تازہ حیوانات منویہ کا مائیکروسکوپ یا خوردبین سے معائنہ کیا جائے، اس سلسلہ میں مرد کو ہدایت کی جائے کہ پانچ چھ روز ملاپ سے پرہیز رکھے، اس کے بعد کسی دھلی ہوئی چوڑے منہ کی خشک شیشی میں منی نکال کر کسی ماہر علم الامراض (میٹاقوجسٹ) سے ایک دو گھنٹہ کے اندر استحان

کرائے، منی نکالنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی عورت سے ملاپ کرنے کے بعد انزال ہونے سے پہلے جدا ہو جائے، فریج لیدر اس غرض کے لئے موزوں نہیں ہے۔

طبعی حالات میں اخراج شدہ ویرج کی مقدار چار پانچ سی سی ہوتی ہے اور اس میں تقریباً دس کروڑ سپرماٹوزائی سی سی ہوتے ہیں، اگر ان میں بیس فیصد تک کی بیشی ہو تو کوئی ہرج نہیں ہے، لیکن خون یا پیپ کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، انزال کے بعد تین گھنٹے تک سپرماٹوزائی میں دس ہلا کر حرکت کرنے کی معمولی طاقت موجود رہتی ہے، اگر سیلان منی میں سپرماٹوزائی (حیوانات منویہ) بالکل نہ ہوں تو مکمل مردانہ نقص ہے۔ یہ مرض شاذ و نادر ہوتا ہے حیوانات منویہ کے کم یا ناقص الخلقیت ہونے کا مرض آج کل عام ہے، ایسی حالت میں بہترین علاج پچھلے باب میں ویرج میں کیڑے نہ ہونے کے عنوان سے لکھا جا چکا ہے۔ وہاں ملاحظہ فرمادیں۔

اگر مرد و عورت جسمانی صحت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ کافی دیر تک سویا کریں۔ ایسی غذا کھائیں جس میں پروٹین زیادہ ہو اور عورت کو ہارٹ کی جائے کہ ملاپ کے بعد دوش نہ کرے، چھینک نہ لے، بلکہ ملاپ کے بعد چار گھنٹے تک کمر کے نیچے تکیہ رکھ کر لیٹی رہے تو صحتی و طبی نقطہ نظر سے یہ طریقہ بلا اولاد کی آرزو کا علاج ثابت ہو سکتا ہے۔

ایلوپٹیک علاج :- اگر عورت کی کمزوری بے اولادی کا سبب ہے تو خصیۃ الرحم کے ہارمون پروگائی نان (Progynon) ، اندن (Unden) ، اووسائیکلین (Ovocyclin) وغیرہ بذریعہ عضلاتی انجکشن دیں یا کھانے کے لئے گولیاں استعمال کرائیں، مندرجہ ذیل ہارمون اس مرض کا موثر علاج ہیں :-

۱۔ ایتھسٹرون (Ethis Terone) :- یہ کارپس لیوٹوم ہارمون ہے اور اس کا نام پرگنیٹولون (Pergneninolone) بھی ہے، اس کا اثر پر وجسٹرون سے ملتا جلتا ہے، تمام ایسے مریضوں میں جہاں یہ عارضہ ہو اس کی آزمائش ضرور کرنی چاہیے۔ یہ ایام میں باقاعدگی لاتا ہے، اسقاط، بے قاعدگی، ایام کی کمی، زیادتی اور بچہ کی پیدائش کی بعد کی دردوں میں مفید ہے، اولاد کی آرزو کے لئے پانچ ملی گرام روزانہ ایام آخری پندرہ دنوں میں بے قاعدگی ایام میں دس سے تیس ملی گرام روزانہ بچہ کی پیدائش کے بعد کی دردوں کے لئے دس ملی گرام اور پھر دس ملی گرام چوبیس گھنٹے بعد اسقاط کے خطرہ کے لئے پانچ ملی گرام روزانہ ابتداء سے ۳۲ ہفتہ تک۔

۲۔ کلنوسٹرول (Clinosterol) :- یہ مصنوعی اورین ہارمون ہے اور بچہ دانی کو طاقت دیتی ہے۔ ایام کو درست کرتی ہے اور سن میں مفید ہے، خوراک ایک سے دو گولی دن میں تین بار۔

۳۔ سٹیلبوسٹرول (Stilbosestrol) :- یہ بھی مصنوعی تیار کردہ اورین ہارمون ہے اور ہر قسم کے امراض زنانہ میں مفید ہے، خصیۃ کی کمزوری، ایام کی بے قاعدگی اور سن یاس میں مفید ہے، مقدار خوراک ایک سے پانچ ملی گرام۔ بی، ڈی، ایچ۔ اے، ون۔ گلیکس کلیناسٹرول کے نام سے تیار کرتی ہے۔

علاوہ ازیں جنسی غدد دوائے کے ایکسٹریکٹ بھی استعمال کئے جاتے ہیں۔

۴۔ پروجیسٹرون (Projestrol) :- یہ بھی کارپس لیوٹوم ہارمون کی گولیاں خوردنی طور پر استعمال کے لئے ہیں، اسقاط کو روکنے کے اور اولاد کی آرزو و کمزوری رحم کے لئے مفید ہیں، خوراک دو ٹکیاں صبح و شام کھلائیں، سبباکینی اسے یوٹوسائیکلین (Ovocyclin) کے نام سے تیار کرتی ہے۔

۵۔ پراجینی نان (Progynon) :- یہ بھی خصیۃ الرحم کی ہارمون ہے، مقوی رحم اور اولاد کی آرزو اور بے قاعدگی ایام کا موثر علاج خوراک ایک سے دو گولی دن میں دو بار۔ سبباکینی اسے اووسائیکلین (Ovocyclin) کے نام سے تیار کرتی ہے، علاوہ

زنانہ جنسی غدود ہائے کے ایکٹریٹ بھی استعمال کئے جاتے ہیں جو کہ اولاد کی آرزو کا مؤثر علاج ہیں۔
اگر رحم یا اس کی نالیوں کے راستہ میں رکاوٹ ہو تو کسی مستند لیڈی ڈاکٹر سے آپریشن کروالینا چاہیے، اگر مرد کے ویرج کے کیڑے نہ ہوں یا سرجری جریان، اختلام، کمزوری کا عارضہ ہو تو پچھلے باب میں دیئے گئے نسخہ جات استعمال میں لائیں۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ لیوٹو اوووسائیکلین (Leuto Ovocycline) یہ ایٹھے سیٹرون (Ethisterone) سبب کی پانچ اور پچیس ملی گرام کی ٹکیاں ہیں، ایک ٹکیہ دن میں دو بار دیں۔ یا ایک ایمپول کا انجکشن لگائیں۔ یہی دوا آرگن کی منسروجن (Menstrogen) اور یونی کم کی ایسٹرو پروجن (Estroprogen) کے نام سے ملتی ہے۔

۲۔ فلیو لیوٹن (Flavolutan) ٹال۔ یہ پروجیسٹرون وٹامن ای کا مرکب ہے۔ یا پانچ ملی گرام ہر دوسرے دن معالج کی رائے کے مطابق دیں۔

۳۔ ویتولین (Vitioline) گلیکو۔ ایک ایک ٹکیہ دن میں تین بار دیں۔

۴۔ روویگان (Rovigon) روش۔ ایک ٹکیہ دن میں تین بار دیں۔

۵۔ اینچوٹرین، ایس (Antuitrin-s) پارک ڈیوس۔ حاملہ عورت کے پیشاب سے تیار شدہ یہ دوا بلوغت لائے و اولاد کی آرزو میں مفید ہے، ۱۰۰ سے ۲۵۰ یونٹ معالج کی رائے کے مطابق انٹراسکولر انجکشن کریں۔

۶۔ نارل سٹرین (Norlestrin) پارک ڈیوس۔ ایام کی کمی یا زیادتی اور اولاد کی آرزو میں مفید ہے۔ یہ ٹکیوں کی صورت میں براہ دہن استعمال کی جاتی ہے۔

یونانی علاج :- اصل سبب کو دور کریں، عام کمزوری ہو تو وٹامن داتا، غذیہ وادویہ دیں، موٹاپے کی وجہ سے ہو تو فاقے یا برت رکھوائیں اور ورزش کرائیں۔ اگر مریضہ کے صحت مند ہونے کے باوجود حمل نہیں بھڑھتا تو مندرجہ ذیل معاون حمل مجربات میں سے کسی ایک کا استعمال کرائیں۔
معاون اولاد کی آرزو :- بیج شونگی (چاندنی پکش)، انیون، بھنگ، جانفل، جادتری، کستوری خالص، برادہ، ہاضمی دانت اصلی، لونگ، سپاری ہر ایک تین ماشہ، پُرانا گڑ ایک تولہ، سب دوائیں، اڑہ اور اصلی لے کر کوٹ چھان کر چھوٹے چھنے کے برابر گولیاں بنائیں، اول پہلے در نہ دوسرے حد تیسرے ماہ ضرور کامیابی ہوگی۔

دیگر :- دارھی درخت، پیل سفید، بیج شونگی (چاندنی پکش) ایک تولہ، سفوف بنا کر خوراک ایک ماشہ ہمراہ دودھ گائے دیں۔

دیگر :- موصلی سیاہ، موصلی سفید، گوکھرد، بیج اونگن، چھلکا جڑ سنبل ہر ایک دو تولہ، کوٹ میں کر بعد فراغت ایام مرد و عورت ایک ایک تولہ ہمراہ دودھ گائے پانچ دن کھلاتے رہیں، اس کے بعد..... کریں۔

دیگر :- بچہ دانی کی جملہ خرابیوں کو درست کر کے اولاد کی آرزو پوری کرتی ہے، بشرطیکہ کوئی پیدائشی نقص نہ ہو اور ایام بے قاعدگی سے آتے ہوں۔

مشک دورتی، انیون، کیسر ہر ایک ایک ماشہ، جانفل ایک عدد، بھنگ ۳ ماشہ، چھالیہ تین عدد، لونگ چار عدد، پُرانا گڑ ۵ ماشہ۔ سب دواؤں کو کوٹ چھان کر گڑ ملا کر بخود کے برابر گولیاں بنائیں، خوراک ایک گولی صبح و شام ہمراہ دودھ یا مچھون موچر چھ ماشہ سے دیں اور ہر مہینے ایام کے بعد سات دن کھلائیں۔

دیگر :- گل دھاوا، گل نیلوفر، جڑ پیالائے، جڑ آسگندہ، سب برابر وزن لے کر کوٹ چھان کر سفوف بنائیں، بعد فراغت ایام یہ سفوف ماشہ کی مقدار میں گائے کے دودھ کے ساتھ بلاناغہ استعمال کریں۔

دیگر:- داڑھی درخت برگد ڈیڑھ تولہ کو باریک پس کر پانچ تولہ پڑا کھویا میں ملائیں اور ایام سے فراغت ہونے کے بعد کھلائیں۔ اگر خواہش ہو تو کھانے کے لئے اور کھوئے کے پیڑے دیں، اس کے سوا اور کوئی غذا نہ دیں، رات کو ملاپ کرائیں، اگر امید ہو جائے تو بہتر ورنہ ایام سے فراغت کے بعد دوسرے دسیرے ماہ بھی عمل کریں۔

آسان مجربات:- ۱۔ ناگ کیسرا صلی باریک کر کے بعد غسل چار ماشہ سے چھ ماشہ تک ہمراہ دودھ گائے سات دن استعمال کریں دودھ گائے میں گھی بھی شامل کر لیں۔

۲۔ کے وقت اپنی رانوں کی جڑ میں خوشبو لگائے اور کمر کے نیچے تکیہ رکھے تاکہ سر نیچا ہو۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ رقیق حیار کو اچھی طرح راغب کر لینا چاہیے، (دیکھیں شادی کی پہلی رات دگرستی چاند مصنفہ حکیم وڈاکٹر ہری چند ملتان)۔

۳۔ عورت بعد ملاپ لمبے لمبے سانس سے نطفہ اپنی جانب کھینچے اور کچھ دیر اسی طرح چت لیٹی رہے۔

۴۔ داڑھی درخت پیل سفید ایک تولہ بیج شولنگی (چاندنی پکش) ایک تولہ، سفونا خوراک ایک ماشہ ہمراہ دودھ دیں۔

۵۔ آگندھ چھ ماشہ پس کر مصری تین ماشہ ملائیں، گھی گائے ساڑھے تین ماشہ ملا کر شروع ایام سے ہر روز کھاتے رہیں، غذا دودھ خشک دیں۔ بعد ایام کریں۔ فائدہ ہوگا۔

۶۔ گائے پیل باریک پس لیں۔ برابر چینی ملائیں اور چار سے چھ ماشہ کی مقدار میں تین دن استعمال کریں۔ غذائیں چاول استعمال کریں اور بعد ایام کرائیں۔

۷۔ برادہ ہاتھی دانت تین تولہ بعد ایام تین سے چار دن کھلائیں۔

۸۔ آگندھ ناگوری چار ماشہ بعد ایام ایک ہفتہ دودھ سے دیں۔

۹۔ داڑھی درخت پیل چھ ماشہ ہوزن کھانڈ ملا کر دودھ سے دیں۔

جڑی بوٹیوں سے علاج

۱۔ آگندھ ناگوری پانچ ماشہ کو گھی گائے میں نرم آگ پر بریاں کریں۔ پھر اس میں دودھ اور مصری ملا کر ابالیں، جب قدرے گاڑھا ہو تو اتار کر سرد کریں۔ ایام سے فارغ ہونے کے تیسرے دن بعد یہ مرکب بارہ دن تک ہر صبح عورت کو استعمال کرائیں، اس جو شانہ شدہ کیا ہو گھی بھی بارہ یوم متواتر پلانے سے آرزو پوری ہو جائے گی۔

۲۔ برگد کی داڑھی سایہ میں خشک کر کے سفوف بنائیں اور برابر چینی ملا لیں، خوراک تین ماشہ صبح و تین ماشہ شام ہمراہ دودھ گائے کریں۔ اولاد کی آرزو اور سیلان کے لئے مفید ہے۔

۳۔ پیل کی داڑھی ۲۰ تولہ، چینی سفید ۲۰ تولہ، سفوف بنائیں، یہ سفوف بقدر ایک تولہ مرد و عورت صبح کے وقت دودھ کے ساتھ استعمال کریں اور اس کے بعد کریں، گودہری ہو جائے گی۔

۴۔ داڑھی پیل دو تولہ، داڑھی درخت بڑ (بوہڑ)، طباشیر، دانہ الاچی خور دہر ایک دو تولہ، ہاتھی دانت کا برادہ دو تولہ، سب کو پیس بنا لیں، جب عورت ایام سے فارغ ہو جائے تو تین تین ماشہ صبح و شام ہمراہ دودھ گائے دیں۔ سات روز تک استعمال کریں رات کو کریں۔ پہلے مہینے میں کامیابی حاصل ہوگی، ورنہ دوسرے، حد تیسرے ماہ ضرور گودہری ہوگی۔ ہم نے خود اس نسخہ اور نہایت مفید پایا ہے۔ فی الواقعہ اولاد کی آرزو کے لئے عجیب و غریب اور نہایت مفید ہے۔

نوٹ :- تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ اس دوا کو اس گائے کے دودھ سے استعمال کیا جائے، جس گائے نے بچہ جنا ہوا، تو اولاد زینہ پیدا ہوگی، یہ بھی ضروری ہے کہ ایام میں کوئی نقص ہو تو پہلے اسے دور کر لیا جائے۔

۵۔ پختہ بیج بٹونگی (چاندنی پکش) میں لے کر نہایت احتیاط سے رکھیں، جب عورت ایام سے پاک ہو تو تین بیج لے کر ایک ایک ماشہ گڑ میں پلٹ کر گولیاں تیار کریں۔ بس اس میں سے ایک گولی روزانہ صبح کو نہ بچھڑے والی گائے کے دودھ کے ساتھ کھلائیں، بعد تیسری گولی کھلانے کے ملاپ کیا جائے۔ انشاء اللہ آرزو پوری ہوگی۔ اگر اس ماہ میں کوئی امر واقعہ حمل قرار پانے کا نہ ہو تو تیسرے ماہ پھر اسی طرح عمل کریں۔ منزل مقصود تک رسائی ہوگی، تیسری بار عام طور پر اس وقت ضرورت ہوتی ہے، جب اور کوئی نقص مانع ہو۔ مثلاً کثرت ایام، کمی ایام، سیلان، سوزش وغیرہ۔ لہذا اس امر کی پہلے تحقیق کرنی ضروری ہے، معالج تمام امورات پر اچھی طرح غور و خوض کرے اور پہلے ان نقائص کو دور کر کے بعد اس کا استعمال کرے تو یقیناً کامیابی ہوگی۔

۶۔ کاک جنگھا بوٹی، ہاتھی دانت کا برادہ، گل عباسی ہر ایک چھ ماشہ، سب کو پیس کر سفوف بنائیں اور ۲۱ خوراک بنالیں۔ اس میں سے ایک خوراک دودھ میں ڈال کر عورت اور ایک خوراک مرد ایام سے فراغت کے بعد استعمال کریں، تین دن کے استعمال کے بعد..... کیا جائے۔ یہ دوا عورت اور مرد کی اولاد کی آرزو پوری کرتی ہے۔

۷۔ عورت ایام سے پاک و صاف ہونے پر صبح ہنار منہ قریباً ایک ہفتہ سفوف موم سا کرنی بوٹی تین ماشہ ہمراہ گائے کے نیم گرم دودھ سے استعمال کرنے سے نقائص دور ہو کر قوت منعقدہ ٹھیک ہو جاتی ہے، ایشور کی مہربانی سے فائدہ ہوتا ہے، ایسا سلسلہ تین ماہ متواتر کرنا چاہیے۔

آیور ویدک علاج :- برادہ ہاتھی دانت چار ماشہ پیس کر ایام جاری ہونے سے خشک ہونے کے بعد چار دن کے بعد ہمراہ دودھ گائے دیں۔ سفوف آگندہ پانچ ماشہ ایام جاری ہونے کے دن سے برابر آٹھ دن تک ہمراہ دودھ گائے نیم گرم دینے سے فائدہ ہوتا ہے، مندرجہ ذیل آیور ویدک بات اس مرض کا موثر علاج ہیں۔

پھل گھرت (شارنگدھر) :- ہرڑ، بہیرہ، آملہ، لمبھی (چھلی ہوئی)، ہلدی، دار ہلدی، کنکی، بابڑنگ، مومقائ، جڑ اندرائن، کایا پھل، ورچ، مہامیدہ، کاکولی، کھیر کا کولی، ساروا، پرینگو، سولف، سہنگ، راسنا، طباشیر، پھول چنبلی، چندن سُرخ، چندن سفید، نیلوفر، کھاند، دوا دنتی ہر ایک ایک تولہ، گھی گائے ایک سیر (گھی اس گائے کا ہو، جس کا ایک رنگ ہو اور کھچڑا زندہ ہو)، دودھ گائے چار سیر، حسب معمول گھی تیار کیا۔ خوراک ایک چمچ گرم دودھ میں ملا کر شام کو دیں۔

فوائد :- قابل اولاد بناتا ہے۔ اگر دوران حمل اسے استعمال کریں، تو بچہ تندرست، طاقت ور اور عقل مند پیدا ہوتا ہے۔ تقویت کے لئے از حد مفید، جس کی وجہ سے بچہ دانی کی پیچیدہ امراض کے لئے مشہور آیور ویدک اور شدمی ہے، علاوہ ازیں شتادری گھرت، ہباشتادری گھرت، اشوک گھرت، پاری پاک، اشوک ارشٹ وغیرہ بہترین ادویات ہیں۔ اگر بچہ دانی کی حالت درست نہ ہو تو مہایوگر گول (شارنگدھر) ایک گولی صبح و شام ہمراہ خالص مفید علاج ہے۔

ہومیو پیتھک علاج :- اشوکا مدرٹنکچر یہ دوا تمام زنانہ خرابیوں کی بے مثل دوا ہے، چنانچہ اولاد کی آرزو میں بطور کامیاب علاج کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اکثر مریض ایک ہی دوا کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، مقدار خوراک پانچ قطرے پانی میں ملا کر دن میں تین بار۔ اگر یہ عارضہ بچہ دانی کی کمزوری سے ہو تو الٹیرس فری نو سادرٹنکچر نہایت مفید علاج ہے۔

علاج بلا دوا :- ملاپ کا وہ عمل جس سے بلا دوا حمل ٹھہر سکتا ہے۔ ناظرین جو ابی لفافہ بھیج کر براہ راست مصنف سے دریافت کر کے دید ہو سکتے ہیں۔ جمپو انے کی قانونی ممانعت ہے، اس لئے صرف ہاتھ سے لکھ کر بھیجا جاتا ہے۔ ڈاکٹر حکیم ہری چند مٹنانی گولڈ میڈلسٹ

پانی پت (انڈیا) پتہ اتنا کافی ہے۔
غذا و پرہیز :- زود صہم و مقوی غذائیں دیں، بادی اور ثقیل اشیا سے پرہیز کریں۔

ایام کا دیر سے آنا، ایام کی کمی، ایام کی تنگی، ایام کا بند ہو جانا

تعریف مرض :- یہ چاروں امراض چونکہ قریب قریب ہیں، اس لئے ان کا بیان ایک ہی جگہ درج کیا جاتا ہے، دیر سے آنا عا پر بند ہو جانے کا پیش خیمہ ہو کرتا ہے۔ اس مرض میں یا تو شروع ہی سے ایام نہیں آنے یا کچھ مدت آکر بند ہو جاتے ہیں یا زیادہ دیر سے آتے ہیں، چنانچہ جب ایام کے درمیان دو ماہ کا عرصہ ہو جائے تو اسے بند ہو جانا سمجھنا چاہیے، حمل کے دنوں اور ایام بند ہو جانے کے یا بچے کو دودھ پلانے کے وقت کو ایام بند ہو جانے کا مرض نہیں سمجھنا چاہیے۔

وجوہات :- ایام بند ہو جانے کی متعدد وجوہات ہیں، مثلاً قلت خون، کسی پرانی بیماری جیسے سل و دق، خنازیر یا امراض گردہ، باعث یا پیدائشی کمزوری یا ناقہ کشی، جربان خون، بواسیر، نکیر یا تلی کے بڑھ جانے سے مریضہ کے جسم میں خون کم ہو جاتا ہے، بچہ دانی لگنے، سردی، خشکی، جسم کے موٹا ہونے، بچہ دانی کی سوجن، خون زیادہ گاڑھا ہونے، زیادہ سخت مشقت کرنے سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے حالات میں کثرت ملاپ، خفیہ الرحم کی سوجن، ایام کے دنوں میں سردی لگنے یا بارش میں بھگینے سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔

علامات :- بچہ دانی کی سوجن، کمزوری جگر تلی، بواسیر وغیرہ اس مرض کا سبب ہوگا تو خود ان امراض کا وجود اس پر دلالت کرے۔ خون کی حالت میں مریضہ کے جسم کا رنگ پھیکا ہوتا ہے، عام کمزوری اور سستی لاحق ہوتی ہے، مقوڑا سا کام کرنے سے دل دھڑکنے لگے جگر کمزور اور جسم لاغر ہوتا ہے، اگر رکت (خون) کے گاڑھا ہو جانے سے رگوں کے منہ بند ہو گئے ہوں تو جسم کا رنگ نیلا ہوگا، نبض میر اور صلابت پائی جائے گی، نیند زیادہ آئے گی، ہاضمہ کمزور ہوگا۔ اگر گرمی سے یہ عارضہ ہو تو گرمی کی علامات ظاہر ہوں گی، سردی کے یہ مرض ہوگا تو سردی کے آثار نظر آئیں گے، خشکی کی وجہ سے ہو تو جسم بے رونق اور کمزور ہوگا، جب بچہ دانی کی وضع بدل جانے سے دانی میں سخت درد محسوس ہوتا ہے، ملاپ کے وقت تکلیف ہوتی ہے، جب سردی لگنے یا بھگینے یا رنج و غم سے یہ مرض ہو تو مقوڑا، اچانک بند ہو جاتا ہے۔

مرض کی معمولی حالت میں عام طور پر اپنے آپ آرام آ جاتا ہے۔ اگر اس مرض کے علاج میں لا پرواہی کی جائے تو اس کا نتیجہ خراب اور اس سے بہت سے امراض پیدا ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے مثلاً بانجھ پن، مرگی، مایخولیا، فالج، تپ محرقة، غشی، فساد خون، اخذہ دمہ، بچہ دانی کی سوجن وغیرہ امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔

علاج ڈاکٹری :- اس مرض کا اصل سبب معلوم کر کے اس کا علاج کریں، اگر گریبہ (حمل) کی وجہ سے خون ایام بند ہوئے جاری کرنے والی کوئی دوا استعمال نہ کریں، ورنہ حمل گر جائے گا، مریضہ کو مناسب محنت اور ورزش کرنے کی ہدایات دیں۔ زیادہ سو تنگ لباس پہننے سے منع کریں، اگر جنسی عذودوں کی کمزوری سے یہ عارضہ ہو تو خفیہ الرحم کی مارمون اور مصنوعی زنانہ مارمون (جن کا بہ کی آرزو میں کیا جا چکا ہے) کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے، جن لڑکیوں میں بلوغت نہ آنے سے یہ عارضہ ہو یعنی چھاتیوں وغیرہ انہیں بلوغت لانے والی مارمونز دیں، جن کا بیان چھاتیوں کے چھوٹا پن میں کچھلے صفحات میں لکھ آئے ہیں کا استعمال کریں، بچہ دانی سے یہ عارضہ ہو تو اشوکا کا۔ ڈیل (Ashoka Cordial)، اشوکا کمپونڈ (Ashoka Comp)، ایٹرون (Aletrone)

(Aletris Cor dial) وغیرہ پیٹنٹ ادویات استعمال کریں۔ جنسی کمزوری کی حالت میں پراجی نان (Progynon) یعنی خُصیتہ الرحم کی ہارمون کی گولیاں ایک گولی دن میں دو بار دیں، اس سلسلہ میں مصنوعی ہارمون ہائے کلنوسٹرول (Clinosterol)، سٹیلبوسٹرول (Stilbostrol) اور ڈائی ناسٹرول (Dinosterol) بطور عضلاتی انجکشن دیں اور خوردنی طور پر بھی استعمال کی جاسکتی ہیں۔

علاوہ ازیں پروجسٹرون کے عضلاتی انجکشن بھی مفید ہیں، گزشتہ چند سالوں میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ پروجسٹرون کے چند انجکشنوں کے استعمال سے ایام کی رکاوٹ دور ہو سکتی ہے، چنانچہ پروجسٹرون پانچ سے دس ملی گرام کا دن میں ایک بار عضلاتی انجکشن پانچ روز تک کیا جائے تو عام طور پر آخری انجکشن سے چند روز بعد ایام جاری ہو جاتے ہیں۔

اگر عام حالات میں بندش ایام کا عارضہ ہو تو مندرجہ ذیل پیٹنٹ ادویات نہایت مفید ہیں :-

۱۔ اربولین (Erboline) :- یہ شدھ ارگٹ کی گولیاں ہیں، ایام کھولنے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد بچہ دانی کی صفائی کے لئے استعمال کی جاتی ہیں، مقدار خوراک ایک سے دو گولی۔

۲۔ ٹاول پلز (Towle Pills) :- یہ فولاد اور کچلہ وغیرہ سے مرکب گولیاں ہیں، جو کمی یا بندش ایام کے لئے مفید ہیں، خوراک دو گولی دن میں دو بار دیں۔

علاوہ ازیں ایلمو پیٹیک پیٹنٹ ادویات میں پل الوز ایٹ مرہ یا پل الوز ایٹ فرائی یا پل الوز ایٹ آسانی ٹڈا کا استعمال بھی مفید ہے، خوراک دو گولی دن میں دو بار دیں۔

کمی خون کی حالت میں مرکب فولاد اور وٹامن بی ۱۲ کا استعمال کیا جائے۔ ایام کے دنوں میں دردوں کے لئے کوڈوپائیرین یا ساریدان یا اے پی، سی پوڈر دیں۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ شدت درد کو تسکین دینے کے لئے نووا بچین یا کوڈوپائیرین کی ایک گولی یا پراکسی دن کیپ شولز تازہ پانی سے استعمال کرائیں۔

۲۔ اشوکا کارڈیل (Ashoka Cordial) یا فیمیل کارڈیل (Femalecordial) ایک سے دو چمچ دن میں دو بار دیں۔

۳۔ اوو سائیکلین (Ovocycline) سبباً آدھی ٹکیہ ایام کے پانچ دن سے ۲۴ دن تک دیں یا ایچی سائیکلین (Eticycline) سبباً اوو سائیکلین کی طرح دیں۔

۴۔ لیوٹو سائیکلین (Lutocycline) سبباً ایک ایک ٹکیہ دن میں تین بار دیں۔ اس کے امپول بھی انجکشن کے لئے ملتے ہیں۔ ایام سے چھ دن پہلے شروع کریں۔

۵۔ کلیناسٹرول (Clinestrol) گلیکو ————— معالج کی رائے کے مطابق خوراک مقرر کی جاتی ہے۔ یہ ایسٹروجن (Oestrogen) مرکب ہے۔

۶۔ الیٹریس الیکسر (Aletris elixir) المبیک ————— نمبر ۲ کی طرح استعمال کریں۔

۷۔ ڈوؤ گائی نان (Duogynon) شیرنگ ————— اگر ایام ٹل گئے ہوں تو یہ جاننے کے لئے کہ کس وجہ سے ٹلے ہیں تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اگر امید ہونے کے بغیر کسی بھی وجہ سے ٹل گئے ہوں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، ایک ٹکیہ ہر روز دو دن تک دیں۔ امید نہ ہونے میں ایک ہفتہ کے اندر ایام آ جاتے ہیں۔

آرگنیز پی دو امینسٹروجن نام سے بناتی ہے۔ اس کی ایک ایک ٹکیہ دن میں تین بار پانچ دن تک دیں، دونوں ادویات کا انجکشن بھی

ملتا ہے، بی، ڈی، ایچ کمپنی سیکرڈل کے نام سے بناتی ہے۔

۸۔ ایسٹرائڈ (Estroid) یونیکم ————— روزانہ ایک سے چار ٹکیاں تک کی خوراک دے سکتے ہیں۔

۹۔ لیوٹوفارم (Lutoform) بی، ڈی، ایچ ————— نمبر ۲ کی طرح استعمال کریں۔

۱۰۔ لیکوئڈ مینورین (Liq-menorin) یونیکم ————— نمبر ۲ کی طرح استعمال کریں۔

۱۱۔ نوراسیکلین-۲۲ (Noracyclin-22) سببا ————— ایام کے شروع کے چوتھے دن سے ہر روز ایک ٹکیہ بیس دن

ہر ماہ دیں، یہی دوا شیرنگ کمپنی گائونولر-۲۱ (Gynovlar-21) اور اینوولر-۲۱ (Anuvlar-21) کے نام سے بناتی ہے۔

۱۲۔ یوٹیرن (Uteron) بنگال کیمیکل ————— ۱ سے نمبر ۲ کی طرح استعمال کریں۔

۱۳۔ یونی پروجسٹین (Uni-progestin) یونی کم ————— پروجسٹران اور وٹامن ای سے بنی ہے۔ ایک سے دو سی انٹراسکو

انجکشن معالج کی رائے کے مطابق دینا چاہیے۔

۱۴۔ یوٹیرودین (Uterodyne) المیک ————— ایکٹ چھوٹے گرم پانی کے ساتھ ہر چار گھنٹے بعد نئی بیماری میں دینا چاہیے

۱۵۔ کوڈوپارین (گلیکو)، ایک ٹکیہ، بیرن (گلیکو)، ۵۰ ملی گرام، دونوں کو پیس کر ایک خوراک بنائیں اور دن میں دو بار کھانا کھانے کے بعد تازہ

پانی سے دیں، درد کو فوراً تسکین دینے کے لئے از حد مفید ہے۔

۱۶۔ کیفی اسپرین (بار) ایک ٹکیہ، بیرن (گلیکو)، ۵۰ ملی گرام، دونوں کو ایک ساتھ چائے سے کھلائیں، درد سر، درد ایام اور درد دشت

میں مفید ہے۔

۱۷۔ پروجسٹرون اور وٹامن ای کا مرکب "فلے وولیوٹان" بوسہنگر ————— کا ایک سی سی کا عضلاتی انجکشن ایام سے پہلے درد

میں مفید ہے، یہ انجکشن محافظ حمل ہے ————— یہ پانچ ملی گرام (ایک سی سی) کا امپول ملتا ہے۔

۱۸۔ ادوسائیکلین (سببا) ۵۰ ملی گرام کا امپول انٹراسکو لرا انجکشن ہر روز چھ دن تک لگانا عدم ایام یا قلت ایام میں مفید ہے زیادتی

کے لئے بھی مفید ہے۔

۱۹۔ سخت بے چینی، ذہنی پریشانی و قبل ایام تناؤ ایکوانیل (Equanil) واسٹ ————— ایک ٹکیہ تازہ پانی سے دیں۔

۲۰۔ نیوکلینسٹول (Neoclinestrol) گلیکو ————— ایک ملی گرام کی ٹکیہ، دس ملی گرام بیرن کی ایک ٹکیہ کے ساتھ دن میں

بار تازہ پانی سے دیں۔ ایام کی قلت میں مفید ہے۔

۲۱۔ ایسٹرو پروجن (Estroprogen) یونی کم ————— ایک ٹکیہ صبح، ایک شام سات دن دیں، ایام شروع ہو جائیں گے

شروع نہ ہوں تو "امید" سمجھیں ————— ایسٹرو پروجن فورٹ زیادہ تیز ہے، اس کے ایک، ہی عضلاتی انجکشن سے یا تو ایام آج

"یا" امید ہے کی تصدیق ہو جاتی ہے۔

۲۲۔ بارلگان (Baralgin) ہیکٹ ————— تشنج، اینٹھن و سخت درد میں فوراً آرام آ جاتا ہے۔ ایک گولی تازہ پانی

۲۳۔ ڈوفاسٹون (Duphaston) کروکس ————— بے قاعدگی ایام یا درد میں مفید ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ اس

دگر دواؤں میں پائے جانے والے نقائص جیسے چہرے پر بال اگنا، مردانہ پن سے بالکل خالی، مخالف اثرات بھی نہیں ہیں، یہ خال

ہے۔ وزن ٹکیہ ۵۰ ملی گرام، معالج کو اسے مرض کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، محافظ حمل ہے اور عادی اسقاط میں مفید ہے۔

۲۴۔ بے لیگل (Bellergal) سینڈوز ————— یہ گائی نر جین، بیلے فولین اور فینوباربیٹون کا مرکب ہے۔ وقت

بہت مفید ہے، ایک ایک ٹکیہ ہر تین یا چار گھنٹہ بعد دیں، آرام آنے پر بند کر دیں۔
یونانی علاج :- امراض نسوان میں ہمیشہ طب یونانی کو دوسرے علاجوں پر فوقیت حاصل رہی ہے، مندرجہ ذیل تجربات بندش ایام کے لئے نہایت مفید ہیں :-

بندش ایام پلڑ :- مصبر شدہ، دو تولہ، ہیرا کیس، دو تولہ، مرکی، دو تولہ، ہینگ خالص، دو تولہ ہمراہ پانی گولیاں خود کے برابر بنائیں اور وقت ضرورت ایک گولی ہمراہ عرق سولف یا گرم پانی دیں، بندش ایام کے لئے مفید ہیں۔

سفوف بندش ایام :- ریونڈ چینی، شورہ قلمی، جو کھار، زیرہ سفید ہر ایک ایک تولہ، شکر تری ہموزن ادویہ، سب کو کوٹ چھان کر سفوف لیں، خوراک چھ ماشہ ہمراہ پانی دن میں دو بار قبل از ایام ایک ہفتہ شروع کریں، ایام جاری کرنے کے لئے مفید ہے۔

دیگر :- صبر سقطری شدہ چھ ماشہ، ہیرا کیس تین ماشہ، زعفران خالص تین ماشہ، باریک پیس کر گولیاں چھوٹے چنے کے برابر یا کریں، خوراک ایک ایک گولی ہمراہ عرق سولف کھلائیں۔

حب بندش ایام :- مصبر، ریونڈ خطائی، افستین، زعفران ہر ایک تین ماشہ، ہیرا کیس دو ماشہ، تمام اشیاء کو باریک کر کے چنے کے برابر گولیاں بنائیں، خوراک ایک گولی صبح و شام ہمراہ شربت بزوری دیں۔

جوشاندہ بندش ایام :- بیج قرطم، سولف، گاؤ زبان، پرسیاؤ شاں، بیج خرپڑہ ہر ایک چھ ماشہ، سب کو تین پاؤ پانی میں جوش دیں۔ ب تہائی رہ جائے تو مل چھان کر شربت بزوری معتدل چار تولہ ملا کر پلائیں، از حد مفید ہے۔

فرز جبہ بندش ایام :- زعفران، لونگ، عود شیریں، ناگرموتھا ہر ایک ایک ماشہ، مشک، عنبر ہر ایک ایک رتی، پیس کر عرق گلاب میں حل ہیں اور ریشمی کپڑے میں لتھیر کر فرز جبہ بنا کر دایہ سے باہر سے رکھوائیں۔

حب خاص :- صبر سقطری زرد شدہ ایک تولہ، ہیرا کیس تین ماشہ، زعفران خالص چھ ماشہ، کستوری خالص ایک ماشہ، سب دو اؤں کو مل کر چھان لیں اور چنے کے برابر گولیاں بنالیں، ایک گولی صبح و ایک گولی شام ہمراہ عرق سولف دیں، چار یا پانچ دن کے استعمال سے ایام ہی ہو جاتے ہیں۔

حب ایام پیشل سٹرانگ :- مصبر شدہ، زعفران ہر ایک دو ماشہ، شورہ قلمی، گودہ خنظل، ہیرا کیس، جو کھار ہر ایک ایک ماشہ، لعاب سکوار میں چنے کے برابر گولیاں بنائیں، ایک گولی ہمراہ سولف چار ماشہ، گاؤ زبان چار ماشہ، مغز خرپڑہ بیج قرطم چار ماشہ، سونٹھ چار ماشہ، گڑ پُرانا تولہ کو عرق سولف میں جوش دے کر صاف کر کے پلائیں، اسی طرح ایک گولی صبح اور ایک گولی شام کو دیں۔

آسان نسخہ :- مصبر شدہ ایک رتی، ہینگ ایک رتی کھل کر کے گولیاں بنائیں، یہ ایک خوراک ہے، دودھ یا چائے کے ساتھ دن میں دو استعمال کرائیں۔

مطبوع قرطم :- مسج الملک حکیم محمد اجمل خان صاحب مرحوم دہلوی کے مطب میں بکثرت مستعمل تھا، بندش ایام بیغی کے لئے نہایت مفید ہے۔
بیج قرطم پانچ ماشہ، سولف، گاؤ زبان، بیج خرپڑہ، پرسیاؤ شاں ہر ایک سات ماشہ، چھلکا المتاس ۹ ماشہ، سب کو تین پاؤ پانی میں جوش دیں، جب ۲ حصہ رہ جائے، چھان کر شربت بزوری چار تولہ ملا کر نیم گرم پلائیں۔

دیگر :- سولف چار ماشہ، بیج قرطم چار ماشہ، گاؤ زبان چار ماشہ، مغز خرپڑہ چار ماشہ، المتاس کا چھلکا چار ماشہ، ایک پاؤ پانی میں جوش دے دھارہ بننے پر چھان کر گڑ ملا کر ایام آنے سے تین روز قبل پلائیں۔

حب مدر ایام :- مصبر شدہ، ہیرا کیس، ہینگ بریاں بڑھیا، سہاگہ بریاں، تمام ادویہ برابر لے کر کنوار گندل کے رس میں کھل کر کے دودھ

رتی کی گولیاں بنائیں، ایام جاری ہونے سے قبل ایک سے دو گولی صبح و شام ہمراہ عرق سولف یا گرم پانی دیں، ایام کے دنوں میں بھی استعمال جاری رکھیں۔
دیگر:- مصبر شدہ ایک رتی، ہیراکیس ڈیڑھ رتی، سفوف دار چینی ایک رتی، ہر سہ ادویہ کو شہد میں ملا کر ایک گولی بنائیں، ایسی گولیاں دن میں دو بار دیں۔ از حد مفید ہے۔

دیگر:- مصبر شدہ اصلی تین تولہ، مرکبی اڑھائی تولہ، ریوند خطائی ایک تولہ، ہیراکیس دو تولہ، فری ایٹ ایونیا سائٹراس سوا تولہ، بارکی سفوف کریں، خوراک پانچ گرین (۲ رتی) کیپ شول میں بھر کر صبح و شام عرق مکو، کاسنی دس تولہ، شربت دینار پانچ تولہ یا شربت بزوری دیا کریں، ایام جاری کرتا ہے۔ اور اچھا خون پیدا کرتا ہے، جنرل کمزوری کے لئے بھی مفید ہے۔

دیگر:- مصبر شدہ چار تولہ، مرکبی چار تولہ، زعفران ایک تولہ، کشتہ فولاد خالص ایک تولہ، ہینگ خالص ایک تولہ، شہد میں ملا کر چھوٹے ٹخوڑے کے برابر گولیاں بنائیں، ایک گولی صبح و شام ایام آنے سے دو ہفتہ پہلے دیں، بقیہ عدگی ایام، کمی خون، درد ایام، کمزوری جگر اور امراض نسوان کے لئے مفید ہے۔

نیز وقت ایام تشنجی میں رحم میں تشنج، المیخن ہونے کی وجہ سے جب ایام تکلیف سے آتے ہیں اور عام طور پر عصبی امراض و نازک مزاج عورتیں ہی اس قسم کے مرض میں مبتلا ہوا کرتی ہیں۔ اس مرض میں ایام آنے سے ایک دو روز پہلے مریضہ کمزور دیں مبتلا ہو جاتی ہے، جس کی ٹیسس پیڑ اور رانوں تک جاتی ہیں، بچہ دانی کا منہ اٹھ جاتا ہے اور نہایت شدت کا درد ہوا کرتا ہے اور ایام مقدار میں کم آتے ہیں اور درد نوبت بہ نوبت ہوا کرتا ہے۔

بھور دوا خوراک کی طور پر مندرجہ بالا نسخوں میں سے کسی ایک کا استعمال کرائیں اور مریضہ کے پیڑ و پر پوست خشخاش اور گل ٹیسو کے جوشاندے سے ٹھکور کریں اور گرم پانی میں مریضہ کو بٹھائیں، قبض ہو تو بذریعہ حقنہ یا مسہل رفع کریں۔
اگر مذکورہ علاج سے فائدہ نہ ہو تو فم رحم کو بوجی کے استعمال سے کشادہ کرنا مفید ہوتا ہے، لیکن یہ علاج کسی مستند اور ہوشیار ڈاکٹر کے مشورہ سے کرنا چاہیئے یا کسی تجربہ کار لیڈی ڈاکٹر سے یہ علاج کرانا چاہیئے۔

نوٹ:- بوجی ایک قسم کی بتی ہوتی ہے۔ جو بچہ دانی کے منہ میں رکھنے سے خود بخود پھول کر اس کو کھول دیتی ہے، اس قسم کی بتی جب کبھی فم رحم میں رکھی جائے تو اسے چھ گھنٹے سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیئے اور حمل کے دنوں میں اس قسم کی بتی ہرگز استعمال نہیں کرنی چاہیئے، کیونکہ بچہ دانی کا منہ کھل کر حمل گر جاتا ہے۔

وقتہ کی حالت میں غذا اور دوا - معوی دیں، حفظانِ صحت کی پابندی کریں۔

آیور ویدک علاج:- مہایوگر گراج گوگل (شارنگدھر) یا یوگر گراج گوگل (شارنگدھر) جن کے نسخہ جات بیشتر ازیں اس کتاب میں کئی جگہ دیئے جا چکے ہیں، ایک ایک گولی ہمراہ گھی ۲ تولہ یا گرم دودھ سے دیں، ایام کھولنے کے لئے نہایت مفید ہے۔
دیگر:- سوئے کے بیج، مولی کے بیج، گاجر کے بیج، میٹھی کے بیج ہر ایک تین ماش، دس تولہ پانی میں جوش دیں، آدھا رہتے پر چھان گڑ ملا کر دن میں دو بار پلائیں۔

دیگر آیور ویدک مجربات اولاد کی آرزو کے بیان میں دیکھیں۔

ہومیو پیتھک علاج:- اگر سردی لگ جانے سے ایام بند ہو گئے ہوں یا خوف کی وجہ سے بندش ہو اور ساتھ ہی بخار، تومرغ میں اکونائٹ دینے سے ایام جاری ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے پانی میں پاؤں رکھنے سے رکاوٹ ہو تو پیلٹا بہترین چیز ہے اگر شروع میں ایام آنے میں معمول سے زیادہ دیر ہو گئی ہو، سر میں پسینہ، پاؤں ٹھنڈے رہنا، دل کی دھڑکن کی علامات ہوں

سیریا کارب مفید ہے۔ اگر ایام کی جگہ نکسیر پھوٹے، جوڑوں میں درد اور پیاس ہو تو برائی اونیا بہترین دوا ہے، اگر ایام کی مقدار بھڑکی ہو، بوجھ ہو تو کالوفالکم فائدہ مند ہے، اگر دردیں ناقابل برداشت ہوں تو میگنیشیا فاس دیں۔ اگر کمر سے ران تک دھبے میں درد ہو اور جھے ہوئے ٹکڑے خارج ہوتے ہوں، مر لہبہ مارے دروں کے دوسری ہو جاتی ہو مانند زچگی دروں ہوں تو سعی سعی فیوگا دیں۔

جڑمی بوٹیوں سے علاج

اُلٹ کبیل :- ہو میو پیٹیک ریسرچ کنندگان نے اس بوٹی کے پتوں کا رس (ٹنکچر) ذیابیطس اور خرابی ایام میں مفید پایا ہے، اس کی تازہ چھال کا سفوف دو ماشہ ایام کھولنے کے لئے مفید ہے۔ تازہ چھال سے لیس دار رس (گوند) نکلتی ہے، جو قلت ایام کے لئے تین بار دی جا سکتی ہے، بنگال کیمیکل ورکس والمبک کیمیکل ورکس نے اس بوٹی کا ایکسٹریکٹ، لیکوئیڈ ایکسٹریکٹ آف ابروما گستا (Liquidum Extract of Abroma Mugu) یعنی اُلٹ کبیل سیال مارکیٹ میں ہر انگریزی دوا فروش سے مل جاتا ہے، خوراک ایک ڈرام تازہ ملا کر پلانی چاہیے۔ اس ایک ڈرام لیکوئیڈ ایکسٹریکٹ میں اُلٹ کبیل تازہ جڑ کی چھال کا جزو مؤثرہ ساٹھ گرین کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ بالنسہ :- بالنسہ کے پتے، مغز بنولہ ہر ایک ایک تولہ عرق سولف میں رگڑ کر اس میں پُرانا گڑ شامل کریں۔ ایام آنے سے تین دن پہلے اس کا شروع کریں، بندش ایام کے لئے مفید ہے۔

پیاز :- پیاز کو پانی میں جوش دے کر پلانے سے ایام کھل کر آتے ہیں، بطور تزکاری گھی میں پکا کر کھلانا بھی یہی فائدہ کرتا ہے۔ پٹھکنڈا (چڑچڑ) :- اگر کسی بیماری کی وجہ سے ایام بند ہوں تو اس کی جڑ کو چھیل کر صاف کر کے یونی میں رکھنے سے فوراً ایام جاری ہو جاتے۔ ملہ عورتوں کے لئے سخت منع ہے۔

سولف :- سولف ایک تولہ، گڑ ایک تولہ، ڈیڑھ پاؤ پانی میں جوش دیں، آدھا حصہ رہنے پر چھان کر پلائیں اور گرم کپڑا اور صا کر لہبہ کو ایام کے دنوں میں اس کی دو تین خوراکیں بندش ایام کو آرام دے دیتی ہیں۔

نیم :- نیم کے سبز پتوں کا رس ڈیڑھ تولہ، ادرک کا رس ۹ ماشہ، مکو کے سبز پتوں کا رس ایک تولہ، شربت دینار ۹ ماشہ، تینوں کو ملا کر (ہر ایک صبح و شام دونوں وقت پلانا اور سبز پتوں اور مکو کے سبز پتوں کو ابال کر تلوں کے تیل میں تل کر بقدر برداشت پیڑو پر بندھوانے سے عورتوں جم کو فوراً آرام آ جاتا ہے، اس داخلی و خارجی علاج سے ایام کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔

ہرن کھری :- ہرن کھری بوٹی دو ماشہ، اہل چھ ماشہ، چھلکا المٹاس ۹ ماشہ جوش دے کر صاف کریں۔ اور اڑھائی تولہ چینی ملا کر پلائیں، ایام کے لئے مفید ہے، حاملہ عورتوں کے لئے اس کا استعمال منع ہے۔

غذا و پرہیز :- سرد ترکاریوں، انڈہ، چائے سے پرہیز کریں، مونگ کی دال، ارہر کی دال، چپاتی خشک، بسکٹ، مکھن، دودھ سب ضرورت دیں۔

دنوں کی زیادتی، کثرت ایام

خریف مرض :- جب ایام ایام کے دنوں میں کثرت سے آتے ہوں، تو اسے آیو روید میں دنوں کی زیادتی اور یونانی

طب میں کثرتِ ایام کہتے ہیں، لیکن جب اپنے معمول کے خلاف زیادہ دنوں تک جاری رہیں تو اسے استخاصہ کہتے ہیں۔

وجوہات :- ۱۔ بدن میں خون کی زیادتی، ۲۔ صفرا کی آمیزش سے خون پتلا ہو جاتا ہے جس سے رگوں کا منہ کھل جاتا ہے۔ ۳۔ بلغمی خلط کے غلبہ کی وجہ سے بچہ دانی کے عضلات ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ۴۔ غلبہ سودا سے رگوں کے منہ کھل جاتے ہیں، ۵۔ بچہ دانی پر چوٹ سے رحم کی کوئی رگ ٹوٹ جاتی ہے، ۶۔ زیادتی ملاپ یا زیادتی اولاد یا جنرل کمزوری سے بچہ دانی کی طاقت کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بچہ دانی کا ٹل جانا یا جھک جانا، بار بار حمل کا گرنا، بچہ دانی کی سوجن، بچہ دانی میں آئول کا ٹکڑا رہ جانا، بچہ دانی کی پھینیاں بچہ دانی کی رسولی یا سرطان، جگر کے امراض سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- ایام بکثرت آتے ہیں، کبھی کبھی کم مقدار میں بار بار آتے ہیں، کبھی ایک ہی بار میں زیادہ مقدار میں خارج ہوتے ہیں کبھی زیادہ خارج ہونے سے مریضہ سخت کمزور اور نڈھال ہو جاتی ہے قبض رہتی ہے، چہرہ پر مردنی چھا جاتی ہے، جسم لاغر اور کمزور جاتا ہے۔ پیڑ اور کمر میں درد ہوتا ہے، بھوک نہیں لگتی، کبھی پاؤں پر درم آ جاتا ہے، کبھی کمزوری سے غشی طاری ہو جاتی ہے۔

وجوہات کے مطابق کثرتِ ایام کی حالت میں درد اور گرانی زیادہ ہوگی، چہرہ اور بدن کی رنگت لال ہوگی، خون کے زیادہ خارج ہونے کے باوجود کمزوری معلوم نہ ہوگی۔

غلبہ صفرا کی حالت میں بدن کی رنگت زرد ہوگی، خون کا قوام پتلا اور سوجن۔

غلبہ بلغم کی صورت میں خون سفیدی مائل اور گاڑھا ہوگا، پستان نرم ہوں گے، کمر میں درد محسوس ہوگا۔

سودا کی حالت میں سیاہ رنگ کا بدبودار خون خارج ہوگا، دائیں طرف سوجن محسوس ہوگی۔

چوٹ یا وضع حمل کی شدید حال

کی صورت میں بچہ دانی کی طاقت کمزور ہوگی، باقی علامات ظاہر ہوں گی۔

علاج ڈاکٹری :- مریضہ کو آرام سے چیت لٹائیں، پاؤں کی طرف سے چار پائی یا بستر کو ذرا بلند رکھیں، مریضہ کو اٹھنے بیٹھنے یا

پھرنے بلکہ ہلنے جلنے کی اجازت بھی نہ دیں، دن رات میں دوبار یا تین بار یونی میں تیخے لکھے گھول سے سچکاری کریں اور یونی کو انٹی سپکا

گاز سے خوب ٹھونس کر بھر دیں یا صاف کپڑا اس گھول میں تر کر کے یونی میں رکھیں، پھنگڑی پانچ رتی (دس گرین) نیم گرم پانی اڑھائی اور

میں گھول بنائیں اور استعمال کریں، موسم گرم ہو تو برف کی پھیلی پیڑ اور یونی پر رکھیں اور اصل سبب کو معلوم کر کے اس کے مطابق علاج کر

اگر کثرتِ ایام کا سبب مریضہ کے جسم میں کیلشیم کی کمی ہو تو کیلشیم کے مرکبات دیں، اس سلسلہ میں کیلیمی ما (Calcima) یہ سلا

کاتیار کردہ گلوکونیٹ سے مرکب دوا ہے اور جسم میں ہر قسم کی کیلشیم کی کمی کو دور کرتی ہے۔ ایک گولی دن میں تین بار یہی دوا اٹپکا

کپینی کیلیمی نول (Calcinol) پی، سی، ڈبلیو کپینی کیلیم (Kalzium) المبیک کپینی الکلیزیم (Alcalzium) کے نام۔

تیار کرتی ہے۔

علاوہ ازیں کیلشیم گلوکونیٹ و کیلسی فیول (Calci Glco with Ferol) ساختہ بروز ویکم یا کیلشیم سینڈوز کا استعمال مفید

اگر بچہ دانی کی کمزوری سے یہ عارضہ ہو تو خبیثہ الرحم کے ہارمون یا ایام کے دنوں میں دس ملی گرام پروجسٹرون (Progesterone) کا

دیا جائے۔ اگر سرطان یا رسولی کی وجہ سے ہے تو اس کے مطابق علاج کریں۔ اگر خون میں جماد کم ہے تو مندرجہ ذیل ادویات میں سے

ایک کا استعمال کیا جائے۔

۱۔ ارگو میٹرین (Ergometrine) ۱۔ رحم سے زائد خون کے اخراج کے لئے مفید ہے، مقدار انجکشن ۱/۱۰ اگرین بذریعہ عضلاتی

جائے۔ مریض کے حالات کے مطابق۔

۲۔ ارگوٹین (Ergotine) ۲۔ رحم، پیپھیٹریے یا بدن کے کسی دیگر اعضاء سے جریان خون ہو، تو یہ مفید رہتا ہے، مقدار انجک

۲۔ اگرین ایک سی سی ڈسٹلڈ واٹر میں حل کر کے زیر جلد دیا جائے۔

۳۔ ہیموپلاستین (Hemoplastine) :- یہ بی، ڈی کمپنی کا تیار کردہ ہیموسٹیک سیرم (Hemo Static Serum) ہے۔ جسم کے کسی حصہ سے خون کو روکنے کے لئے مفید ہے۔ اس کا انجکشن دوسری سی سی کی مقدار میں زیر جلد یا عضلاتی لگایا جاتا ہے۔

۴۔ کوگولین (Coagulen) :- یہ سببا کمپنی کے تیار کردہ خون کے عرق سے بنائے گئے انجکشن ہیں جو جسم کے کسی حصہ سے جریان خون کے لئے مفید ہیں، خصوصاً بوائیری یا ایام کے خون کو روکنے کے لئے مفید ہیں، علاوہ ازیں خونی قے، پھیپھڑے سے خون آنا، انٹریوں دسمدہ سے خون آنے کے لئے بھی مفید ہیں، ایک سے پانچ سی سی بذریعہ انجکشن زیر جلد عضلاتی یا وریدی دیا جاسکتا ہے۔

۵۔ سٹپٹارین (Stypttarnin) :- ساختہ ایلن بری یا سٹپی گان (Styptigon) ساختہ سی، ڈی، سی یا سٹپٹین (Styptin) ساختہ اور نیل کمپنی یا سٹپٹال (Styptal) ساختہ نال، ہر قسم کے جریان خون کو روکنے کے لئے نہایت مفید ہیں۔

عام حالات میں صرف کیلشیم لکٹیٹ پندرہ گرین کے دن میں دو یا تین بار دینے سے آرام آجاتا ہے، کثرت ایام سے خرابی ہو تو الیٹرس کارڈیل یا اشوکا کارڈیل مقوی رحم ادویات کا استعمال کیا جائے۔ اور مرضیہ کو ملاپ سے کچھ عرصہ سخت پر سیز کرنا چاہیے۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ ہمولین (Hemolin) ایڈ کو۔ بوائیر، کثرت ایام اور جسم کے کسی حصے پھیپھڑے، گلا، ناک، منہ سے خون جانے میں مفید ہے، دس سی سی کا ایمپول توڑ کر دودھ یا پانی میں ملا کر دیا جاتا ہے، دن میں ایک سے تین بار تک دے سکتے ہیں۔

۲۔ سٹپٹی بیون (Styptibion) ای مرک۔ یہ وٹامن "سی" وٹامن "کے" وغیرہ کا مرکب ہے، مشہور خون روک دوا ہے، کثرت ایام، دانت اکھاڑنے کے بعد خون بہنے، مسوڑھوں سے خون جانے میں مفید ہے، ایک ایک ٹکیہ دن میں تین بار تازہ پانی سے دیں یا شدید حالات مرض میں دوسری سی سی کا انجکشن لگائیں۔

۳۔ کیلسی آسٹیلن (Calci-ostelin) گلیکسو۔ دوسری سی سی کا عضلاتی انجکشن ایک دن چھوڑ کر لگائیں، کیلشیم کی کمی پوری کرنے کے لئے مفید ہے، کثرت ایام اور سفید پانی میں بھی مفید ہے۔ یہ سادہ اور وٹامن بی ۱۲ دونوں میں ملتا ہے۔

۴۔ ریڈوکسان (روش) ۵۰۰ ملی گرام، سنکاوٹ (روش) ایک ٹکیہ، دونوں کو پانی کے ہمراہ دیں، وٹامن سی اور کیلشیم کی خامی کے سبب یہ عارضہ ہو تو مفید ہے۔

۵۔ لیکوئیڈ مینورین (Liq-menorin) یونی کم۔ ایک چمچ کی مقدار میں روزانہ دو بار کھانا کھانے کے بعد دیں، معالج کی رائے سے مقدار میں تبدیلی کی جاسکتی ہے۔

۶۔ لیوٹوسائیکلین (Lutocyclin) سبا۔ یہ ایسٹے سیرٹون (Ethisterone) کی پانچ وچپیس ملی گرام کی ٹکیاں ہیں۔ ایام کے عوارضات بیج بیج میں ایام میں مفید ہے، ایک ٹکیہ دن میں تین بار تازہ پانی سے دیں، انجکشن کے لئے اس کے ایمپول بھی ملتے ہیں۔

۷۔ یوٹرون (Uteron) بنگال کیمیکل۔ ایام کی وقت اور ایام کی کثرت میں مفید ہے۔ ایک سے دو ڈرام مقوڑے پانی میں ملا کر دن میں تین بار دیں۔

۸۔ یونی پروجسٹین (Uni-progestin) یونی کم۔ یہ پروجسٹران اور وٹامن ای کا مرکب ہے، ایام کی قلت، زیادتی درد بے قاعدگی، اولاد کی آرزو میں مفید ہے، ایک سے دوسری سی سی انٹرا اسکولر انجکشن معالج کی رائے کے مطابق کرنا چاہیے۔

۹۔ یوٹروڈین (Uterodyne) المبیک ————— ایام کی زیادتی، کمی، بے قاعدگی میں بہت مفید ہے۔ ایک چمچ کی مقدار میں تھوڑے گرم پانی کے ساتھ ہر چار گھنٹہ بعد نئی بیماری میں دیں۔

۱۰۔ وٹا اشوکا کارڈیل (Vita-Ashoka--cordial) گلوکونیٹ ————— زیادتی ایام اور ایام کی تکلیف و عوارضات میں ٹانگ کا کام کرتا ہے، ایک سے دو چمچے تھوڑے پانی کے ساتھ روزانہ دو سے تین بار دیں۔

۱۱۔ وٹامن کے (سنکاوٹ، روش) کا انجکشن، ایک سی سی کی مقدار میں عضلاتی (انٹر اسکولر) کرنا مفید ہے، لیکن بیٹی یون انجکشن جس کا ذکر ۲ میں کیا گیا ہے، زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔

۱۲۔ کیلشیم سینڈوز "۵۰۰" (Calcium sandoz- '500') سینڈوز ————— اس میں وٹامن سی کے سب اوصاف ہونے کے ساتھ کیلشیم کے بھی فائدے ہیں، خون بہنے کو روکنے کے لئے دیتے ہیں۔ ایک سے دو انجکشن معالج کی رائے کے مطابق دریدی دیئے جاتے ہیں۔

یونانی علاج :- بیج سروالی تین سے پانچ ماشہ سوختہ تنہا سفوف کر کے دہی کے ساتھ صبح و شام دیں۔ از حد مفید ہے، مریض کو آرام سے لٹائے رکھیں۔ مندرجہ ذیل مجربات اس مرض کا موثر علاج ہیں :-

سفوف مفرح :- صندل سفید، کھربا، طباشیر، دانہ الاچی خورد، زہر مہرہ، ناریل دریائی، دھنیاں خشک ہر ایک ایک تولہ، پھول گاؤ زبان، گاؤ زبان ہر ایک تین ماشہ، کشتہ مرجان، کشتہ عقیق، کشتہ سنگ لیش ہر ایک ساڑھے چار ماشہ، ورق چاندی پچاس عدد، تمام ادویہ کو کوٹ چھان کر باریک سفوف بنا کر ورق ملا لیں، خوراک ایک سے دو ماشہ ہمراہ پانی استعمال کریں۔ فوائد :- کثرت ایام، اسہال خونی، پھیپھڑے سے خون آنا، نکیر کے لئے مفید ہے، علاوہ ازیں گرمی، گھبراہٹ، آبکائی و بخاروں کے لئے بھی مفید ہے۔

دوائے کثرت ایام :- سنگ جراحی خام اور گیر و ہموزن کا سفوف بنا کر بقدر تین ماشہ ہمراہ شربت انجبار دیں۔ فوراً خون بند ہو جائے گا۔

دیگر :- مازو سبز چھ ماشہ پیس کر ہمراہ دہی کھلائیں، مفید ہے۔

دیگر :- کتھ گلابی سفوف بنا کر حسب برداشت مریض دو سے تین ماشہ دن میں تین بار دہی یا پانی کے ساتھ استعمال کریں۔

کشتہ سنگ جراح :- سنگ جراح ایک پاؤ کو دو دھ گائے ایک سیر کے ساتھ خوب کھل کر کے آدھ آدھ چھٹانک کے گولے بنا کر خشک کر لیں اور سرد ہونے پر پیس لیں، خوراک دو ماشہ ہمراہ شربت انجبار استعمال کریں، مفید ہے۔

سفوف کثرت ایام :- برگ مور و دس تولہ کوٹ چھان کر مہری ملا کر خوراک ایک تولہ صبح ایک تولہ شام ہمراہ تازہ پانی دیں۔

حب کثرت ایام :- پشکڑی سفید، چنیا گوند ہموزن پیس کر شربت انجبار ملا کر گولیاں بقدر نسخہ بنائیں، دو گولی ہمراہ پانی دیں۔

فرزجہ کثرت ایام :- چھلکا انار، مازو سبز، پشکڑی بریاں تینوں کو باریک پیس کر ملائیں اور صاف و ملائم کپڑے کے ایک ٹکڑے

کو پانی میں تر کر کے اور اس میں دوائے مذکور لت پت کر کے یونی میں رکھیں۔

آیور ویدک علاج :- اشوک ارشٹ (بھیج رتناولی)، ایک تا دو تولہ ہمراہ تازہ پانی دیں یا کشتہ پروال (مونگا مرجان) ایک لی

ہمراہ مکھن یا شہد دیں۔ یہ اعلیٰ درجہ کا کیلشیم ہے، جو کثرت طمث میں جب خون پتلا ہو کر بہنے لگتا ہے۔ تو خون کو گاڑھا کر کے بہنے

سے روکتا ہے۔

ہومیوپیتھک علاج :- دوران اخراج خون میں سبباًنا اور دوران وقفہ میں فاسفورس بہترین ادویات ہیں۔

جرّی بوٹیوں سے علاج

آسگندہ ناگوری :- آسگندہ ناگوری تین ماشہ، رال سفید دو ماشہ، مصری چھ ماشہ، سب کو ملا کر تازہ پانی سے کھلائیں، کمزور مریضوں نصف خوراک دیں، کثرتِ ایام کے لئے نہایت مفید ہے۔

دھماسہ :- عقیق سُرّخ کو آگ میں گرم کریں اور دھماسہ بوٹی کے تازہ رس میں یہاں تک سرد کریں کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پیس کر دھماسہ کے رس میں کھل کر کے ٹکچہ بنائیں اور دس سیراپوں کی آگ دیں، یہ عمل سات بار کریں، دھماسہ بوٹی سے عقیق کا بہترین کشتہ تیار ہوگا۔

پانی پشاپ، خونی دست، کثرتِ ایام، خونی قے، پیچھے پھڑے سے خون آنے کے لئے مفید ہے۔

خوراک ایک رتی ہمراہ مکھن یا مربہ آملہ یا گاجر میں دیں۔

اتار :- انار کی چھال ۲ گرام کو ۱۰۰ گرام پانی میں جوش دیں۔ آدھا پہنے پر چھان کر صبح پلا دیں، ایام کی کثرت میں مفید ہے۔

غذا و پرہیز :- زود ہضم و مقوی غذائیں، دودھ، دال مونگ، شوربہ، چپاتی، ساگو دانہ، مونگ کی کھچڑی، پالک وغیرہ دیں، گرم سیار، تیل، ترشی، رنچ والہ، ملاپ اور دھوپ میں پھرنے اور ورزش سے پرہیز کریں۔

یونی کی خارش، شرمگاہ کی خارش، ولو اپرورائٹس (Vulvapruritis)

بچہ دانی کی خارش، رحم کی خارش، یوٹرائٹ پرورائٹس (Uterine-Pruritis)

بچہ دانی کی پھنسیاں، رحم کی پھنسیاں، ہرپیز آف یوٹرس (Herpes of Uterus)

بچہ دانی کے گھاؤ، رحم کے زخم، الشراف یوٹرس (Ulcer of Uterus)

تعریف مرض :- شرمگاہ کے مقام پر شدید خارش ہوتی ہے، کبھی خارش کی شدت سے پھنسیاں اور زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔

وجوہات :- لیکوریا، بچہ دانی کی سوجن، ایام کی خرابی، شرمگاہ کے بالوں میں جوئیں پڑ جانا، پیٹ کے کیڑے، سوزاک وغیرہ سے یہ

بھٹ ہو جاتی ہیں۔

علامات :- خارش اس قدر شدید ہوتی ہے، کہ مریضہ کھجاکھجاکر زخم کر لیتی ہے، خارش کی زیادتی سے بچہ دانی بھی باہر نکل آتی ہے۔

دفعہ پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ان سے پیپ دار مواد خارج ہوتا ہے، پھنسیاں و زخم بڑے لب ہٹا کر یا یونی دیکھنے کے آلہ سے

دیکھی جاسکتی ہیں۔

علاج ڈاکٹری :- اگر یونی کی خارش کا سبب یونی کے بال ہوں تو بال صفا پوڈریا بال صفا کریم سے صاف کریں اور پوٹاسیم پرمینگنیٹ

نحول یا ڈیٹول گھول سے مقام مرض کو صاف کریں اور کاربالک آئیل لگائیں، تکلیف شدید ہو تو سببا کی نو پریکینال (NuPer cainal) مرہم درد کو تسکین دینے اور سوزش کیلئے بیرونی طور پر استعمال کریں اور بطور خارش کے علاج کریں۔

بچہ دانی کی پھنسیوں و زخموں اور بچہ دانی کی خارش کے لئے بذریعہ انجکشن مینی سلین بہترین علاج ہے، جو کہ بصورت انجکشن استعمال کی جاتی ہے، اس سلسلہ میں سٹرپٹو مینی سلین کا استعمال بھی مفید ہے، اس کے علاوہ کھانے کے لئے سلفا نھایا زول یا سلفا ڈائزین کا استعمال مفید ہے، بعض دفعہ آماناڈین (Omnadin) ساختہ یا ٹرکمپنی یا آپساڈین (Apsadin) ساختہ سپلاکپینی ایک سی سی زیر جلد انجکشن لگانا مفید ثابت ہوتے ہیں۔

کئی بار صرف ہلک (دودھ) کے صاف شدہ انجکشن (جو مارکیٹ میں ملتے ہیں) نہایت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ ایک سے پانچ سی سی انجکشن کی صورت میں دیا جاسکتا ہے۔

بچہ دانی میں ڈیٹول گھول، لائی سول گھول وغیرہ اینٹی سیپک ادویات کا استعمال مفید ہے، سوجن کی حالت میں بیرونی طور پر ڈیٹول (Desulan) یا ایس، وی، سی (S. V. C.) گولیاں یونی میں رکھنے سے جلد فائدہ ہوتا ہے۔

علاوہ ازیں اکتھول گلیسرین دس فیصدی میں گدی تر کر کے یونی کے اندر رکھنا سوجن کو جلد آرام آجاتا ہے، مریض کو زیادہ چلنے پھرنے سے پرہیز کرایا جائے۔ اور علیحدہ کمرے میں سلانا چاہیے، زخم ہوں تو مینو ویٹ این (Betnovate-N) لگائیں۔

یونانی علاج :- مرض کا اصل سبب معلوم کر کے اس کا علاج کریں۔ کافور تین ماشہ، ویزلین سفید بارہ تولہ میں ملا کر مرہم بنا کر یونی میں لگائیں، خارش کو فوراً آرام ملے گا یا بالوں وغیرہ کو صاف کر کے یونی پر گل روغن یا روغن بنفشہ یا کافور عرق گلاب میں گھس کر لگائیں، پینے کے لئے پھول نیلوفر، گل خطمی، پھول گلاب، شامبرہ، عنب الشعلب، بیج کاسنی ہر ایک پانچ ماشہ، عناب پانچ دانہ، سب کو بھگو کر اور صاف کر کے شربت نیلوفر و تولہ ملا کر پلائیں۔

بچہ دانی کی پھنسیوں، زخم و سوجن کی صورت میں عرق مصفی خون چار تولہ ہمراہ شربت عناب ڈیڑھ تولہ دیں، علاوہ ازیں گلو، چرائیہ، عشبہ، پارہ وغیرہ کا استعمال بھی مفید ہے، اگر یونی کی پھنسیاں سادہ ہوں اور ان میں زہریلا مادہ نہ ہو تو ان کو نیم کے پتوں کے جوشانہ سے دھو کر مرہم کیلا لگائیں، جس کا نسخہ مندرجہ ذیل ہے :-

تیلوں کا تیل پانچ تولہ میں نیم کے تازہ پتے جلائیں، پھر ان کو نکال کر تیل میں موم زرد ڈیڑھ تولہ گلائیں، پھر اس میں کیدہ شدہ دد تولہ ڈال کر خوب جوش دیں۔ اس کے بعد اچھی طرح حل کر کے سرد ہونے پر چھان لیں، تاکہ تلچھٹ اور میل نہ آئے، اسے بدستور استعمال کریں، مندرجہ ذیل مجربات اس کا موثر علاج ہیں :-

مرہم داخلیوں :- طب یونانی کی مشہور دوا ہے، بچہ دانی کی سوجن اور سختی کو دور کرتی ہے، روغن زیتون کہنے (پُرانا) بارہ تولہ، مردار سنگ چھ تولہ، بیج خطمی، بیج مرلو، بیج السی، بیج السبغول، میٹھی ہر ایک دو تولہ۔

بیجوں کو رات کے وقت پانی میں بھگوئیں، صبح مل جھان کر لعاب نکالیں، اب مردار سنگ کو باریک پیس کر روغن زیتون میں شامل کر لیں اور آگ پر پکائیں، مردار سنگ کو بکڑی سے ہلاتے رہیں، بعد ازاں لعاب بھوڑا بھوڑا شامل کر کے پکاتے رہیں۔ جب محض روغن رہ جائے تو چھان کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال :- ہری کاسنی کا پانی، ہری ملو کا پانی بقدر ضرورت ملا کر اس میں روئی کا پھایہ تر کر کے رات کو سوتے وقت رحم میں رکھوائیں۔

حمول سوجن رحم :- (از معمولات حکیم نابینا صاحب دہلوی) - یہ دوا بچہ دانی کی سوجن کی تمام اقسام کے لئے مفید ہے اور بے ضرر اور آزمودہ نسخہ ہے ۔

ایسبول : بیج اسی برابر وزن لے کر دونوں کو پیس لیں اور شہد میں ملا کر کپڑا لت پت کر کے یونی میں رکھنا بچہ دانی کی سوجن کی تمام اقسام میں مفید ہے ۔

دیگر :- بیج کتان (اسی) ، ایسبول برابر وزن ، کوٹ کر شہد میں ملا کر چھوڑا کی گٹھلی کے برابر شیاف بنا کر یونی میں رکھیں ، بچہ دانی کی سختی اور سوجن کے لئے مفید ہے ۔

معجون دبیدالورد :- بچہ دانی کی سوجن و ورم جگر کے لئے مفید ہے :-

سنبل الطیب ، مصطکی ، زعفران ، طباشیر ، دارچینی ، اذخرمکی ، اساروں ، قسط شیریں ، بیج کرنس ، زراوند طویل ، حب بلساں ، عود عزقی ، لونگ ، دانہ الاچھی خور دہر ایک ساڑھے تین ماش ، بھول گلاب ہم وزن کل ادویہ ۔ ان ادویات کو کوٹ چھان کر تین گنا شہد خالص کے قوام میں ملا کر معجون بنا لیں ۔

مقدار خوراک :- چھ ماش ہمراہ پانی صبح اور شام کھائیں ۔ ترش اور بادی چیزوں سے سخت پرہیز کریں ۔ اگر اندام نہانی یا رحم سے تیزابی طوبت کے بہنے سے زخم پیدا ہو گئے ہوں تو تیزابی پیدائش کو روکنے کی تدبیر کریں ، اس سلسلہ میں شامہ ترہ ، چرایہ ، سر بھوک ، منڈی ، برادہ صندل ، سرخ ، ہڑسیا ہر ایک سات ماش ، عناب پانچ دانہ ، رات کو گرم پانی میں تر کریں ، صبح چھان کر عناب کا شربت تین تولہ ملا کر پلائیں ، مقامی طور پر مرہم کتھا کا استعمال کریں ۔ نسخہ مندرجہ ذیل ہے :-

موم سفید ایک تولہ ، کور و عن گل تین تولہ میں گلائیں اور اس میں کتھا ایک تولہ ، مردار سنگ تین ماش ، سفیدہ کا شغری تین ماش ہر ایک پس کر ملائیں اور صاف کپڑے کی موٹی تہی بنا کر اس پر مرہم لگائیں اور یونی میں رکھیں ۔

آیور ویدک علاج :- مشک کا فور چار رتی ، دیزلین سفید اڑھائی تولہ میں ملا کر مرہم بنا کر مقام مرض پر لگائیں ۔
ہومیوپیتھک علاج :- بورکیس اس مرض میں خاص ، نائدہ مند ہے ۔ اندرونی اور خارجی دونوں طریقوں سے استعمال کی جاتی ہے ۔
شریکہ کی خلوش کے لئے نہایت مفید علاج ہے ۔

اس مرض میں اندام نہانی کو پہلے گرم پانی و صابن سے دھونا چاہیے ، پھر بورکیس بنیں گرین ، ایک اونس پانی کا لوشن بنا کر کپڑا تر کر کے کئی بار اندام نہانی میں رکھنا چاہیے ۔

کاربالک صابن اور گرم پانی سے دھونا بھی مفید ہوتا ہے ، قدرتی طریقہ علاج میں ہپ باٹھ (کوہے تک گرم پانی میں بیٹھنا) دن میں کئی مرتبہ یہ عمل کرنا مفید ہوتا ہے ۔

غذا و پرہیز :- تیز مصالحہ دار غذاؤں اور آگ کے پاس بیٹھنے سے زیادہ کام کاج کرنے سے اور ملاپ سے پرہیز کریں ۔ لال مرچ کم کھائیں ، میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں ، گڑ ، تیل کی تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں ۔

بچہ دانی (رحم) کی گردن کی سوجن ، سروں آئی ٹس (Cervicitis)
گرہا شہ شویتہ ، ورم رحم ، مٹرائی ٹس (Metritis)

بچہ دانی (رحم) کی اندرونی سوجن، اینڈومٹرائٹس (Endometritis)

یونی کی سوجن، ورم مہیل، ولوائٹس (Vulvitis)

تعریف مرض :- بچہ دانی کی گردن یا بچہ دانی کے اندرونی حصہ میں یا یونی میں سوجن ہو جاتی ہے۔

وجوہات :- چوٹ لگنا، ماہواری کے دنوں میں سردی لگنا، بارش میں بھیگنا، بچہ دانی میں تیز ادویات کا استعمال، بچہ دانی کی سوجن سوزاک، زیادتی ملاپ، بچہ جننے یا حمل کرنے کے بعد احتیاط نہ کرنے کی، یونی کی صفائی نہ کرنا اور میل کچیل جمع ہو جانے سے بھی ورم کا عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- بچہ دانی کے ورم میں کمر اور پیڑ میں درد ہوتا ہے، ملاپ کے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے، بچہ دانی میں سوزش ہے، بچہ دانی میں بھاری پن ہو جاتا ہے۔ ایام تکلیف سے آتے ہیں، پیٹ میں اچھارہ اور لیکوریا کی شکایت ہو جاتی ہے، مرض شدت کی صورت میں سردی سے بخار آنے لگتا ہے۔ اگر یہ تکلیف کئی دن تک رہے تو بچہ دانی میں زخم ہو جاتے ہیں، ورم مہیل سے بھی سوجن صاف نظر آتی ہے۔ بچہ دانی کی گردن کے ورم کی حالت میں اندرونی جھلی میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے، رطوبت زیادہ ہے۔ ملاپ کے وقت اور ہلنے بھلنے سے تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے۔

علاج ڈاکٹری :- بچہ دانی کے ورم کی صورت میں پہلے اکیٹھول گلیسرین دس فیصدی میں گدی تر کر کے اندر رکھیں، لائی سے دوش کریں، جو تمام علاج ”رحم کے زخم“ کے بیان میں سمجھے گئے ہیں، مفید ہیں، بخار کی حالت میں سٹرپٹو پینیسلین کے عضلاتی موثر علاج ہیں، سلفا ڈرگز بھی دے سکتے ہیں یا دودھ کے ٹیکے ورم رحم میں نہایت مفید ہیں، عام طور پر پانچ سی سی کے امپولز میں ملتے ہیں، ہفتہ میں دوبار عضلاتی انجکشن کریں، بورک آئنٹمنٹ کا بیرونی استعمال بھی مفید ہے، مقام ورم پر بیرونی انسٹی فلز پلاسٹر لگانا بھی جلد آرام دیتا ہے یا کھانے کے لئے ٹیرامائی سین (ایس ایف) کیپ شولز ہر چھ گھنٹے بعد تازہ پانی سے استعمال کریں۔

یونانی علاج :- پیڑ کے اُد پر گرم سینک کریں، انسٹی سپٹک لوشن سے اندام نہانی کو دھونا اور بچہ دانی کے اندر دوش کرنا مفید اس سلسلہ میں پھٹکڑی تین ماشہ کو دس چھٹانک گرم پانی میں حل کر کے اس سے اندام نہانی کو دھوئیں، پیسے کے لئے گل نیلوفر، گل خطمی، ہر ایک ساڑھے چار ماشہ، ان ادویہ کو عرق مکو، عرق کا سنی ہر ایک پانچ تولہ میں جوش دے کر صاف کریں اور اس میں شیرہ مغزیج ہندو چھ ماشہ، گل قند دو تولہ ملا کر خاکی چار ماشہ چھڑک کر پلائیں، چوتھے روز جلاب دیں۔

آیور ویدک علاج بطور یونانی طریقہ علاج کے کریں۔

ہومیو پیتھک علاج :- ایکونائٹ (جب سخت بے چینی، گھبراہٹ، پیٹ درد، سوت کا ڈر ہو)، سیلا ڈونا (ابتدائی حالت میں جب خون دل کی طرف ہو اور نفاس رُک جائے)، رشاکس (گھبراہٹ و نیم بے ہوشی) میں مفید ادویات ہیں، ابتدائے مرض میں مرلیفہ کو گرم پانی میں یا تینس منٹ بیٹھا چاہیے اور اس کے کندھے اور پاؤں ڈھانپ رکھنے چاہئیں، جب تک پورا آرام نہ آجائے اور ورم رحم مدہم نہ پڑ جائے۔

غذا پر ہیز :- سادہ و لطیف غذا یعنی دودھ، آش جو، دودھ ساگودانہ، تلی کھجڑی، مونگ کی دال کا پانی دیں، دیرینہ غذیہ سے سخت

بچہ دانی (رحم) کا ٹانجانا، ڈسپلیمینٹ آف یوٹرس (Displacement of Uterus)

تعریف مرض :- اس مرض میں بچہ دانی (رحم) سامنے یا پیچھے کی طرف جھک جاتا ہے۔
وجوہات :- بچہ پیدا ہونے یا حمل کرنے کے بعد بے احتیاطی سے اپنی اصلی وضع پر نہیں آتی، بچہ دانی میں سوجن ہوتی ہے۔ بعض دفعہ زیادہ اُچھلنے، کودنے، دوڑنے یا مرد کے عضو تناسل کی زیادہ لمبائی اور غیر قدرتی طریقوں سے ملاپ کرنے سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے، بچہ دانی کی رسولیاں، دائمی قبض وغیرہ بھی اس مرض کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔

علامات :- مریضہ کے پیڑ و پشت کمر میں زبردست بوجھ و درد ہوتا ہے، ہلنے چلنے اور چلنے پھرنے سے یہ تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے، پیشاب رُک رُک کر آتا ہے۔ ماہواری میں بے قاعدگی ہو جاتی ہے، بچہ دانی میں سوجن ہوتی ہے، ملاپ کے وقت عورت کو سخت درد ہوتا ہے۔ میڈیکل معائنے کے لئے نرس اپنی انگلی داخل کر کے یا آلہ معاینہ فرج سے بخوبی معلوم کر سکتی ہے۔
ڈاکٹری علاج :- بچہ دانی کو انگلی سے اصلی حالت پر لا کر رُبڑ کا چھٹلا لگائیں اور پیڑ و کے مقام پر روئی کی گدی رکھ کر پٹی سے باندھ دیں۔ مریضہ کو چند روز نہایت آرام و سکون سے لٹائیں، قبض نہ ہونے دیں۔

مریضہ کی جنرل صحت درست کریں، غذا اور دوا مقوی دیں، قواعد حفظانِ صحت کی پابندی کرائیں، پٹھوں کی طاقت کی ادویہ دیں، اس سلسلہ میں ڈامین بی کمپلیکس کا استعمال مفید ہے، فولاد، کچلہ، فاسفورس وغیرہ کے مرکبات بھی اس مرض کا موثر علاج ہیں۔
یونانی علاج :- جس طرف بچہ دانی ٹل گئی ہو، اس کے دوسری طرف تیل چنبیلی میں قدسے کستوری حل کر کے اور کپڑے میں لت پت کر کے بطور فرزجہ دایہ سے رکھوائیں۔ دایہ کو ہدایت دیں کہ وہ انگلی کو صاف کر کے ویزلین یا تلی کے تیل میں چکنی کر کے بچہ دانی کو سیدھا کر دے، بعد ماش کی روئی ایک طرف سے کچی پکا کر اور اس پر گل روغن چھڑ کر نیم گرم ناف پر باندھیں، دل کی کمزوری کے لئے دوا المسک معتدل جواہر والی تین ماشہ صبح اور تین ماشہ شام کو ہمراہ دودھ گائے نیم گرم دیں۔

آیور ویدک علاج :- آیور ویدک علاج میں اشوکا و اشوگندھ کے مرکبات بچہ دانی کی تقویت کے لئے استعمال کرائیں۔
ہومیوپیتھک علاج :- سیپیا، ہیلونیس اور سیلا ڈونا مستعمل ہیں، علامات کے مطابق استعمال کی جاتی ہیں۔
نوٹ :- مرض کی معمولی حالت میں عام دایاں پیٹ کو مل کر درست کر دیتی ہیں، لیکن کمزوری کی حالت میں مقویات کا استعمال ضروری ہے۔

غذا و پرہیز :- غذا میں سبز ترکاریاں تنہا یا بکری کے گوشت کے ساتھ بخور روٹی کے ساتھ کھلائیں، قابض اور بادی چیزوں سے پرہیز کرائیں۔

بچہ دانی (رحم) کا باہر نکلنا، پروفلیپس آف یوٹرس (Prolapses of Uterus)

تعریف مرض :- اس مرض میں یا تو تمام رحم اپنی اصلی شکل پر باہر نکل آتا ہے یا اپنے اصلی مقام سے نیچے ہو جاتا ہے اور اس کی گردن یونی باہر نکل آتی ہے۔ مرض کی شدت کی صورت میں نہ صرف بچہ دانی بلکہ یونی اور مقعد بھی باہر آ جاتے ہیں۔

وجوہات :- عورت کا کسی ادنیٰ مقام سے چوتروں کے بل گر پڑنا، چوٹ لگنا، بوجھ اٹھانا، زور سے چلنا، زور سے چھینکنا، بچہ کا تکلیف سے پیدا ہونا، بچہ کا زیادہ موٹا ہونا، دایہ کا بچہ کی پیدائش کے وقت بچہ دانی سے بچہ کو کھینچنا یا بچہ کا غیر طبعی حالت میں پیدا ہونا، زیادتی ملاپ، غیر فطری ملاپ، بچہ دانی اور اس کے متعلقات کے زخم جس سے رحم کے رباطات گل جائیں وغیرہ وغیرہ سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- پیڑو، کمر اور پیٹھ میں زور کا درد ہوتا ہے، کبھی بخار بھی ہو جاتا ہے، عام طور پر پیشاب دیاخانہ بند ہو جاتا ہے، کبھی تشنہ اور رعشہ ہونے لگتا ہے، پیڑو میں ایک گول چیز اور یونی میں ایک نرم سی چیز اترنا محسوس ہوتا ہے۔ اگر بچہ دانی کا سوراخ چھونے سے محسوس نہ ہو تو اس امر کی علامت ہے کہ بچہ دانی پوری باہر آ چکی ہے۔

علاج ڈاکٹری :- بچہ دانی کو آہستہ آہستہ اصلی حالت پر لا کر بچہ دانی پر پیری (Pessary) چڑھا دیں، اگر ورم رحم ہو تو اس کے مطابق علاج کریں۔ بچہ دانی کو طاقیت دینے والی اغذیہ وادویہ دیں، بچوں کی تقویت کی طرف متوجہ ہوں، الیٹرس کارڈیل (Aletriscordial) بچہ دانی کی تقویت کے لئے مفید ہے یا الیٹرس الکسر (Aletris Elixir) ساختہ المبیک یا الیٹرس کمپونڈ (Aletris Compound) ایک سے دو چمچ دن میں تین بار دیں، اس سلسلہ میں وٹامن بی ۱۲ یا وٹامن بی کمپلیکس، وٹامن بی (بیرین) لیور ایکٹریٹ اور کیلشیم کے ٹیکے بھی دیئے جاسکتے ہیں یا خلیۃ الرحم کی ہارمون کے ٹیکے جن کا بیان بائجھ پن کے بیان میں درج ہے، رحم کی تقویت کے لئے استعمال کرائے جادیں۔

یونانی علاج :- بچہ دانی کو اصلی حالت پر لا کر اوپر پٹیاں باندھ دیں ہلکے قابضات کی پچکاری کریں، بچہ دانی میں برانڈی ایک حصہ آلیو آیل ایک حصہ ملا کر فرجہ کریں۔

اس سے پہلے گل روغن اور عرق گلاب میں صاف روئی کی گدی تر کر کے یونی میں رکھیں اور لنگوٹ کس دیں۔ اور مرضیہ کی کمر کے نیچے تکیہ رکھ کر چوبیس گھنٹہ تک اسی طرح آرام سے لٹائے رکھیں، پہلے جلنے سے منع کریں، کھانسی اور چھینک بھی نہ آئے تو بہتر ہے، دوسرے روز لنگوٹ کھول کر یونی سے گدی نکال کر رحم کے اندر سے چھپچھڑے بذریعہ پچکاری صاف کریں اور نئی گدی روغن گل و گلاب میں بھگو کر پھر یونی میں رکھیں اور لنگوٹ باندھ دیں، یونی کے ارد گرد قابض دوائیں مثلاً مازد سبز یا پٹیکری سفید یا جفت بلوط پیس کر شراب میں ملا کر لگاتے رہیں، تقویت کے لئے دوار المسک معتدل جواہر والی چار ماشہ صبح اور چار ماشہ شام ہمراہ دودھ نیم گرم استعمال کرائیں۔

آیور ویدک علاج :- سپاری پاک ایک تولہ صبح اور ایک تولہ شام ہمراہ نیم گرم دودھ استعمال کریں اور ملاپ سے سخت پرہیز کریں۔ ہومیوپیتھک علاج :- بلیا ڈونا (بچہ دانی کی سوجن اور ایسا معلوم ہو کہ ہر ایک چیز یونی سے باہر نکل جائے گی)۔ سی پیا (کمزور عورتیں جنہیں ہر وقت بچہ دانی کے نیچے کی طرف دباؤ معلوم ہو)۔ ہیلونا ئیز (رحم باہر نکل آتا ہو)۔ مفید ادویات ہیں، پیٹ پر پٹیاں باندھ کر اس کو سہارا دیں، تاکہ پیٹ کا بوجھ اوپر رہے۔

غذا و پرہیز :- چلنے پھرنے اور بوجھ اٹھانے سے سخت پرہیز کریں، موٹے آٹے کی روٹی اور سبزیات کا استعمال کریں، قبض نہ ہونے دیں۔

بچہ دانی (رحم) کا بڑھ جانا، سب ان ولوشن آف دی یوٹرس

(Sub in Volution of the Uterus)

تعریف مرض :- عورت کا رحم معمولی حالت میں چار تولہ کے قریب وزنی ہوتا ہے اور وضع حمل کے وقت اس کا وزن چودہ چھٹانک ہو جاتا ہے، جو مناسب احتیاط کرنے سے چھ ہفتہ کے اندر اندر مسکڑ کر خود ہی اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے، لیکن جب یہ رحم خود بخود اپنی اصلی حالت

پر نہ آئے اور اس کی دیواریں موٹی اور اس کا جوف کھلا ہو جائے اور اس میں خون جمع ہو کر اس سے رطوبت زیادہ مقدار میں نکلتی ہے تو تمام رحم کی صورت بڑھ جاتی ہے۔

وجوہات :- بچہ دانی کے آس پاس سو جن ہوتی ہے یا بعد وضع حمل آنول کا کوئی ٹکڑا یا خون کا کوئی لوتھر رحم کے اندر رہ جاتا ہے یا رحم میں رسولی پیدا ہو جاتی ہے جو رحم کو بڑھا دیتی ہے یا بعد وضع حمل زچہ بے احتیاطی سے چلنے پھرنے لگ جاتی ہے، جس سے رحم بڑھا رہا جاتا ہے۔ عورت کو بار بار حمل ٹھہرنے سے بھی یہ عارضہ پیدا ہو جاتا ہے، جس سے رحم کمزور ہو کر بڑھ جاتا ہے۔ اگر عورت کافی عرصہ تک بچے کو دودھ پلاتی رہے تو پٹے کمزور ہو کر بچہ دانی میں بڑھوتری ہو جاتی ہے۔

علامات :- پیڑو اور پیٹ میں بوجھ معلوم ہوتا ہے، مگر میں درد ہوا کرتا ہے۔ پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ جس سے حمل کا دھوکا ہوتا ہے، یونی میں آجھلی ڈالنے سے بچہ دانی کا منہ موٹا اور کھلا محسوس ہوتا ہے، مریضہ کو زیادتی ایام کا عارضہ ہوتا ہے۔

علاج :- اگر بعد وضع حمل ایک ہفتہ تک برابر رگٹ استعمال کیا جائے تو یہ عارضہ پیدا ہی نہیں ہوتا، علاوہ ازیں چالیس دن تک زچہ کو آرام کرنا چاہیے، یونی سے رطوبت نکل رہی ہو تو ڈیوٹل گھول سے دوش کر کے اندر اکیٹھول گلیسرین ہلکی طاقت کی گدی رکھنی چاہیے، اگر بچہ دانی کا منہ بہت کھلا ہو تو رنگ پیسیری یا باجز پیسیری کا استعمال ہی مؤثر علاج ہے۔ بچہ دانی کے پھٹوں کو طاقت دینے کے لئے اور بچہ دانی کو اصلی حالت پر لانے کی ادویات استعمال کی جائیں۔ اس سلسلہ میں الیٹرس کارڈیل، اشوکا کارڈیل، یوٹران (Uteron) وغیرہ مقوی ادویات ہیں۔

آیور ویدک علاج میں معجون سپاری پاک کا استعمال مفید ہے، اگر ادویات سے آرام نہ آئے تو بچہ دانی کی بذریعہ آپریشن صفائی کرانا درست علاج ہے۔

ڈائی کرٹسٹائین کے ٹیکے، ہلک کم آئیوڈین کے انجکشن کچھ دنوں تک دیتے رہنا درست ہے۔ اگر خون آتا ہو تو ڈٹامن کے (K) کا استعمال کرنا چاہیے، ملاپ سے پرہیز ضروری ہے، خون آنے کی حالت میں بستر پر آرام سے لیٹنا چاہیے۔

یونانی علاج :- ۱۔ پوست درخت بول ایک سیرنیم کوفتہ کر کے دس سیر پانی میں دو رات دن تک تر رکھیں، اس کے بعد اس قدر جوش دیں کہ نصف رہ جائے تو بوتلوں میں پُر کر کے رکھ دیں۔ ایام میں پیشاب کے بعد اس پانی سے استنجا کرتے رہیں۔
۲۔ کونیل پلاس (نزم) ایک سیر سایہ میں خشک کر کے باریک پیس لیں اور برابر چینی ملا کر ہر روز صبح کے وقت کھائیں، اکیس یا چالیس دن کے استعمال سے مکمل آرام آ جاتا ہے۔

۳۔ پھول سپاری، مازو، سولسری، مایں چھوٹی، پھلی بول برابر پیس کر پوٹلی میں باندھ کر یونی میں رکھیں۔
ہومیوپیتھک علاج :- کالوفائیم اس مرض کی بہترین دوائی ہے، اس دوائی کے استعمال سے رحم سکڑ کر وزن اور حجم میں کم ہو جاتا ہے اور بکثرت اخراج خون جو اس مرض کا نتیجہ ہے، اس کے روکنے کے لئے بھی یہ دوائی بڑی کارآمد ہے۔

ضروری ہدایات :- وضع حمل کے وقت دایہ کو اپنے ہاتھ خوب دھو کر صاف کر لیں چاہئیں، تاکہ گندے ہاتھوں سے بچہ دانی میں سو جن نہ کر اس مرض کا باعث نہ ہو، وضع حمل کے بعد اس بات کی بھی تسلی کر لینی چاہیے کہ بچہ دانی میں آنول کا ٹکڑا یا خون کا لوتھر باقی نہ رہ جائے، بعد ازاں ملاپ سے بھی پرہیز ضروری ہے۔

بچہ دانی کا چھوٹا ہو جانا۔ رحم کا چھوٹا ہونا۔ صغیر الرحم

سوپران وولیوشن آف ڈی یوٹرس (Superin of the Uterus)

تعریف مرض :- اس مرض میں بچہ دانی سکڑ کر بہت چھوٹی ہو جاتی ہے یا پیدائشی طور پر چھوٹی ہوتی ہے، جس سے عورت اولاد کے قابل نہیں رہتی۔

وجوہات :- جنرل کمزوری، عورت کی پیدائشی خلقت میں نقص، خشکی بدن وغیرہ۔

جدید تحقیقات کے مطابق یہ عارضہ خستہ الرحم کے ہارمون اور دوسرے جنسی ہارمون ہائے کی کمی سے پیدا ہوتا ہے۔

علامات :- بچہ دانی کے سکڑ جانے سے ایام کا آنا بند ہو جاتا ہے اور مریضہ بانجھ ہو جاتی ہے، اگر چربی پیدا ہو گئی ہو، تو جسم کی موٹائی

اور غلبہ بلغم کا وجود معلوم دے گا۔

علاج :- بچہ دانی بہت چھوٹی اور ناقص نہ ہو تو مناسب علاج معالجہ سے درست ہو جاتی ہے اور بانجھ عورت بھی با اولاد ہو سکتی ہے۔

جدید ادویات میں اس مرض کا کامیاب علاج صرف ہارمون ہائے کے ذریعہ ہو سکتا ہے اور اس کے لئے اوو سائیکلین کے ایک سے دوسری پٹھوں میں انجکشن ہفتہ میں دو بار دیں یا پراجی نان کی گولیاں ایک سے دو عدد دن میں دو بار اور پراجی نان کا ٹیکہ بھی ہفتہ میں دو بار لگایا جا رہا ہے۔

کلنکسٹروئل اور ٹیلبا سٹروئل ایک سے پانچ ملی گرام دینا بھی مفید ہے، علاوہ ازیں اگر بھرپور جوانی نہ ہونے سے یہ عارضہ تو انچوٹرین ایس (Antituitrin "s") یا انٹکس (Antex) بہترین ادویات ہیں، اس مرض میں بلوغت لانے والی ہارمون مناسب مقدار میں استعمال کرنی ضروری

نابت ہوتی ہیں۔ ایسٹین سیرپ یا فیلوزیرپ کا استعمال بھی مفید ہے۔ اس مرض میں الیٹرس کارڈیل اور اشوکا کارڈیل بھی موثر علاج ثابت ہوئی۔ یونانی علاج :- مریضہ کو مقویات کا استعمال کرائیں، بطور دوا حریر سے حلویات اور مغزیات وغیرہ کا زیادہ استعمال کرائیں۔

آیور ویدک علاج :- سپاری پاک، پھل گھرت اور اشوکا ارشٹ کا استعمال مفید ہے۔

غذا و پرہیز :- مریضہ کی عام صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ملاپ سے پرہیز کرائیں۔

بچہ دانی کی دُرگندہ، رحم کی بدبو، نشتن الرحم

تعریف مرض :- اس مرض میں بچہ دانی سے بدبو آتی ہے اور بدبو دار رطوبت بھی جاری رہتی ہے۔ کبھی اس رطوبت میں پریپ آنے لگتی ہے۔

وجوہات :- اس مرض کا خاص سبب بچہ دانی کے زخم ہیں، جس کی وجہ سے پیدا ہونے والا بچہ ماں کے پیٹ میں مرجاتا ہے۔

علامات :- یونی اور بچہ دانی سے سخت بدبو آتی ہے، کبھی اس کے ساتھ پریپ خارج ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی، بعض اوقات

رطوبت میں تلچھٹ بھی ہوتی ہے۔

علاج :- اگر رطوبت خارج ہوتی ہو تو سیلان کے بیان میں لکھے گئے تجربات استعمال میں لائیں، اگر زخم ہوں تو اس کے مطابق

کریں۔ ورنہ خوشبو دار ادویہ کا استعمال مفید ہے۔ مندرجہ ذیل تجربات اس کا موثر علاج ہیں :-

۱۔ کستوری، عنبر، عود ہندی ہر ایک تین ماش، سب کو پیس کر خالص شراب میں جوش دیں اور صاف لیشم کو آلودہ کر کے اندام نہانی میں

کا دھواں دیں، یونی کو تنگ، خوشبو دار بنانے کے لئے مجرب ہے۔

۲۔ کستوری خالص، عنبر اشہب ہر ایک ایک ماشہ، عود ہندی، سعد کوئی، اقا قیا، لونگ، مازو ہر ایک دو ماشہ، باریک پیس کر شراب ملا کر یونی میں رکھیں۔

۳۔ سک (چھلکا) انار، سنبل، کیسر، برابر وزن لے کر شراب میں ملا کر فرزجہ بنا کر یونی میں رکھیں۔
غذا و پرہیز:۔ زود ہضم اغذیہ استعمال کریں اور صاف لباس پہنائیں، قواعد حفظانِ صحت کی پابندی نہایت ضروری ہے۔

بچہ دانی کا منہ بند ہو جانا، رحم کا منہ بند ہو جانا، انسدادِ رحم

تعریف مرض:۔ اس مرض میں بچہ دانی کا منہ کسی وجہ سے بند ہو جاتا ہے۔

وجوہات:۔ کسی گندے مادے کا رحم کے منہ میں جم جانا یا اس میں کسی ریشہ دار بناوٹ کا پیدا ہو کر اس کو بند کر دینا، بچہ دانی کے منہ میں کوئی زخم پیدا ہو کر اس کا منہ بند ہو جانے سے اس کا بچہ دانی کی دیواروں سے چپک جانا یا بچہ دانی کے منہ میں زائد گوشت یا رسولی وغیرہ کا پیدا ہونا۔

علامات:۔ نرس یا دایہ بچہ دانی کے منہ میں اپنے ہاتھ صاف کر کے انگلی داخل کر کے میڈیکل جاپنچ کر سکتی ہے یا آلہ مفتاح الفرج سے یونی کو کھلا کر کے دیکھا جاسکتا ہے، خون کی رکاوٹ اور ایام کے دنوں میں بچہ دانی کے اندر خون جمع ہو جانے سے سخت تکلیف ہوتی ہے، اگرچہ ملاپ کے وقت مرضیہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن مرد کا ویرج بچہ دانی میں داخل ہونے کی بجائے یونی سے بہہ جاتا ہے اور حمل قرار نہیں پاتا، جس سے عورت بائجہ ہو جاتی ہے۔

علاج:۔ اصل سبب کو دور کریں، اگر کوئی رطوبت بچہ دانی کے منہ میں جمع ہو گئی ہو تو اس کو حل کرنے کے لئے صفائی کرنے والے فرزجے استعمال کریں، اس سلسلہ میں شہد خالص دو تولہ، دودھ گائے پانچ تولہ، زعفران باریک شدہ دو ماشہ، ہلدی مین ماشہ، سب کو نرم الپ پر پکائیں، جب گاڑھا ہو تو ہلدی نکال دیں۔ اس میں صاف روئی کی بتی آلودہ کر کے بچہ دانی کے منہ میں رکھیں، اسی طرح جو کھار اور سوز منقعی کا فرزجہ بھی نفع دیتا ہے۔

ڈاکٹری طریقہ علاج میں اس مرض کا موثر علاج آپریشن ہے، جس سے بچہ دانی کا منہ کھولا جاسکتا ہے۔

غذا و پرہیز:۔ زود ہضم و مقوی اغذیہ دیں اور رحم کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، امراض رحم میں گھوڑے کی سواری اور پاؤں سے رکت دینے والی سیونگ مشین چلانا و ملاپ کرنا سخت مضر ہے۔ اس لئے اس سے بچاؤ ضروری ہے۔

بچہ دانی کا کینسر، سرطان الرحم کینسر آف یوٹرس

تعریف مرض:۔ یہ عارضہ تمام بچہ دانی یا گردن یا بچہ دانی کے منہ میں پیدا ہو جاتا ہے، اس ورم کی شکل کیکڑے کے مشابہ ہوتی ہے اس لئے اسے طب یونانی میں سرطان الرحم سے موسوم کیا گیا ہے۔

وجوہات:۔ خرابی خون، بچہ دانی کا ورم جو پڑانا ہو کر سرطان کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ عام کمزوری وغیرہ خاص اسباب ہیں۔
علامات:۔ تین برس سے زیادہ عمر کی عورتوں کو یہ مرض ہوتا ہے، یہ پھوڑا ایک جگہ سے شروع ہو کر بہت جلدی سے ہر طرف پھیل

جاتا ہے۔ اکثر بچہ دانی کی گردن یا منہ کے قریب پیدا ہوتا ہے جو طبی جانچ سے نظر آ سکتا ہے اور دیکھنے پر گوبھی کے پھول کی صورت کا ہوتا ہے۔ جس کی رگیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، رنگت سُرخ یا سبزی مائل ہوتی ہے، اکثر چھوٹے سے سخت درد کرتا ہے۔ مرض کی زیادتی صورت میں بخار ہوتا ہے، ہاتھ، پاؤں سرد، پیڑ و اور کچ ران میں اس کی غلش محسوس ہوتی ہے، پیشاب رُک رُک کر قطرہ قطرہ آتا ہے، قبض ہوتی ہے، مریض دن بدن لاغر ہوتی جاتی ہے، پنڈ لیاں پتلی ہو جاتی ہیں، پاؤں پر ورم آ جاتا ہے۔ اگر موادِ رحم کا میڈیکل معائنہ کیا جائے یعنی خوردبین سے دیکھا جائے تو اس میں رحم کی شاخیں اور ریشے صاف دکھائی دیتے ہیں۔

علاج :- اگرچہ یہ مرض بہت مشکل سے قابو میں آتا ہے، پھر بھی اس کی ترقی کو روکا جاسکتا ہے، درد میں سکون پیدا کرنے کے لئے مرہم داخلیوں کا استعمال کیا جائے۔ اور خوراک کی طور پر ”دھما سہ بوٹی“ کا استعمال کیا جائے۔ اس سلسلہ میں روزانہ تقریباً دو تولے ہرے یا خشک پوٹے کو پیس کر اس کا رس نکال کر دو ہفتہ تک مریض کو پلانے سے حیرت انگیز نتائج نکلے ہیں۔ دھما سہ بوٹی کا مفصل بیان ”ہندوستان کی جڑی بوٹیاں“ مصنفہ حکیم ڈاکٹر سہری چند ملتانی میں دیا گیا ہے۔ دہاں ملاحظہ فرمائیں۔

ڈاکٹری علاج میں سرطان کا علاج سولے آپریشن کے ممکن نہیں، چنانچہ رحم کے گندے حصے کو کاٹ کر نکال دیا جاتا ہے اور اس پر ”کونوجائیٹل ہسٹی ریکیٹی آپریشن“ کہتے ہیں، کبھی تمام کا تمام رحم بذریعہ آپریشن نکال دیا جاتا ہے، لیکن یہ علاج بھی اس وقت تک مفید ہوتا ہے۔ جب کہ مرض ابھی محدود ہو اور گندہ مادہ رحم کی دوسری قریبی ساختوں میں سرایت نہ کر گیا ہو، ورنہ آپریشن بھی محض بے سود ثابت ہوتا ہے۔ دیگر پیچیدگیوں کے علاج کے لئے سرطان کا بیان دیکھیں۔

غذا و پرہیز :- غذائیں آش جو، اُبلّا ہوا اندھ، کدو، پالک، خرفہ، مونگ کی دال اور ساگودانہ کھلائیں۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔

بچہ دانی کا ناسور، زخم کا ناسور

تعریف مرض :- یہ ایک قسم کا پُرانا زخم ہے، جو بچہ دانی میں پیدا ہو کر ناسور بن جاتا ہے۔

وجوہات :- بچہ دانی میں زخم کا ہونا، بچہ دانی میں گندہ مواد جمع رہنا، زخم کے علاج میں غفلت کرنا وغیرہ اس اسباب میں

علامات :- بچہ دانی سے عرصہ دراز تک بدبو آتی رہتی ہے۔ زخم رحم بہت مدت سے رحم میں موجود ہوتا ہے، اور کسی علاج سے درد

نہیں ہوتا، اس میں بھی سرطان رحم کی طرح سخت درد ہوتا ہے۔

علاج :- زخم کو صاف اور خشک کرنے والی ادویہ جو بچہ دانی کے زخم کے بیان میں دی جا چکی ہیں، کا استعمال کرائیں، اس مرض میں آپریشن

سخت خطرناک ہے اور اس سے تشنّج ہونے لگتا ہے اور دماغ کی حالت میں فرق آ جاتا ہے، غشی پڑتی ہے، ہاں! اگر مریض کلو ر فارم سونگھنے طاقت رکھتی ہو تو ایک قابل سرجن آپریشن کے ذریعے ناسور رحم کو درست کر سکتا ہے۔

یونانی علاج :- مندرجہ ذیل تجربات اس مرض کے لئے مفید ہیں، حسب موقع استعمال کر کے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

۱۔ ہلدی، مردارنگ ہر ایک تین حصہ، گل روغن دو حصہ، موم زرد ایک حصہ، تمام ادویہ کو پیس کر روغن اور موم کے ہمراہ پانی میں پکائیں

پانی مل جائے اور ادویہ مرہم کی طرح ہو جائیں تو استعمال کریں۔

۲۔ بٹی کے سینہ کی ہڈی کو چھلکا ہڑ، بہیڑ، آملہ کے نقوع میں گھس کر لگائیں۔

۳۔ جلے ہوئے پکے چمڑے کی خاک، کتھ سفید، سنگ جراثیم، موم، ہر ایک برابر پیس کر گھی گائے (سُوبار پانی سے دھویا ہوا) میں ملا کر

بنائیں اور استعمال کریں۔

۴۔ عشبہ مغربی ۲ تولہ، چوب چینی، برادہ لکڑی شیشم ہر ایک ۲ تولہ، گل نیلوفر، گل بنفشہ، گاؤ زبان، پھول گلاب، شاہترہ، چرایہ، منڈی، سرپوکر، خار خشک، صندل سفید، صندل سرخ، ہر ایک دس تولہ، چھلکا ہڑ زرد، چھلکا ہڑ کالی، سنار کے پتے، مہندی کے پتے ہر ایک پانچ تولہ، سب ادویہ کو پندرہ گنا پانی میں ایک رات دن تر کر کے کل پانی کا دو تہائی عرق نکال لیں۔
خوراک پانچ تولہ صبح و شام ہمراہ شربت عشبہ تین تولہ دیں۔ ناسور رحم کے لئے نہایت مفید علاج ہے۔
دیگر پھیپھوں کا علاج بطور ناسور کے کریں۔
غذا و پرہیز۔ زود ہضم و مقوی غذا دیں، دیر ہضم غذا سے سخت پرہیز کریں۔

بچہ دانی کی رسولیاں، رحم کی رسولیاں، سلفۃ الرحم

تعریف مرض :- اس مرض میں رحم کے اندر کئی قسم کی رسولیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔
وجوہات :- زیادہ بچے جننے یا دیگر عوارض کے باعث رحم کی ساخت کا کمزور ہو جانا، کسی تکلیف یا دباؤ کے تحت رحم کی طرف خون کا دوران زیادہ ہونا وغیرہ اس کے اسباب ہیں۔

علامات :- عام طور پر چالیس بچاس برس کی عمر میں پیٹ حمل کے بغیر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، رسولی کے باعث رحم کے مقامات پر بوجھ اور تناؤ پڑ کر رحم کسی ایک طرف کو جھک جاتا ہے، ایام نہایت درد کے ساتھ زیادہ مقدار میں بے قاعدگی سے آتا ہے، پاخانہ کی بار بار حاجت اور سچیش کی علامات پائی جاتی ہیں۔ پیشاب جلن یا درد سے آتا ہے، رحم کے منہ پر رسولی کا پھیلاؤ معلوم ہوتا ہے۔ یہ مرض افریقہ میں شہرت ہوتا ہے۔

علاج :- کبھی یہ رسولیاں بنا علاج خود بخود گھل جاتی ہیں، کبھی ایک حالت پر رہتی ہیں اور ان کی بڑھوتری رک جاتی ہے اور ان سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کبھی زخم بن جاتے ہیں جو بعد میں سرطان الرحم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، کبھی زخم میں پیپ پیدا ہو جاتی ہے اور اس زہریلا اثر خون میں مل جانے سے مریضہ جانبر نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹری طریقہ علاج میں اس مرض کا آپریشن ہی مؤثر علاج ہے۔ جو ایک قابل سرجن خوبی کر سکتا ہے۔ دسی طریقہ علاج میں بیرونی طور پر مریم داخلیوں کا فرزجہ رکھنا نہایت مفید ہے۔ کھانے کے لئے مصفی خون ادویات استعمال کریں۔

گھٹیکوار بوٹی سے علاج

گھٹیکوار بوٹی (کنوار بوٹی) کا رس ایک تولہ، سہاگہ باریک شدہ ایک ماشہ، دونوں کو ملا کر رات کو سوتے وقت استعمال کریں۔ کمزور مریضوں کو نصف خوراک دیں۔

فوائد :- پیٹ یا رحم میں رسولی پیدا ہو گئی ہو، تو اس کے ازالہ کے لئے مفید ہے، واضح ہے کہ ڈاکٹری میں رسولی کا علاج سوائے آپریشن کے نہیں ہو سکتا، البتہ طب قدیم میں یہ خوبی ہے کہ وہ بغیر آپریشن کے صرف خوردنی دوا سے پیٹ کی رسولی رفع کر سکتی ہے، بشرطیکہ دیرینہ اور جسم میں زیادہ پھیلی ہوئی نہ ہو۔ علاوہ انہی یہ دوائی تلی اور باؤ گولہ کے لئے بھی مفید ہے۔
دوسری پھیپھوں میں علاج بطور رسولی کے کریں۔

غذا پر مہیز۔ مریض کو آرام سے رکھیں، ہلکی زود ہضم غذا کھلائیں۔ بادی اور نفاس غذاؤں سے پر مہیز کرائیں۔

بچہ دانی کی آرش، رحم کی بو اسیر، بو اسیر الرحم

تعریف مرض :- بچہ دانی میں بو اسیر کی طرح مٹے پیدا ہو جاتے ہیں۔
وجوہات :- بو اسیر یا ایام کے خون کی بندش، خُصیۃ الرحم کی سوجن، بچہ دانی کی سوجن، ورزش نہ کرنا، گرم اغذیہ کا بکثرت استعمال، شراب و مصالحوں کے زیادہ استعمال سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔
علامات :- یہ مٹے کبھی تو ہاتھ لگانے سے معلوم ہوتے ہیں، اگر یونی کا آلہ منظار الفرج سے طبی معاینہ کیا جائے تو بچہ دانی کے منہ پر مٹے دکھائی دیتے ہیں، جب ان میں خون کا اجتماع ہوتا ہے تو سخت درد ہوتا ہے۔ جب خون بہہ نکلتا ہے تو یہ پردہ ہو کر درد کو آرام آ جاتا ہے۔

ان سے سیامی مائل رطوبت نکلتی ہے، کبھی خفقان ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں میں سوزش ہوتی ہے، کبھی سرد پسینہ آتا ہے، یہ مرض مدتوں تک تکلیف دیتا رہتا ہے، یہ مٹے بو اسیر مقعد کی طرح بعض بہت لمبے بعض میخ کی طرح ہوتے ہیں۔ اور بعض مٹے تمام بچہ دانی میں پھیل جاتے ہیں، بعض کی شاخیں یونی تک آ جاتی ہیں اور بعض ایسے لمبے ہوتے ہیں کہ یونی سے بھی باہر آ جاتے ہیں۔

علاج ڈاکٹری :- بو اسیر مقعد کی طرح بو اسیر رحم کا علاج بھی آپریشن کے ذریعہ کیا جائے، خاص طور پر جب مریض بہت جلد کمزور ہو رہی ہو تو مرض کی صحیح تشخیص ہو جانے کے بعد فوراً عملِ جراحی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اگر غفلت کی جائے تو مریض اس قدر کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ آپریشن کے قابل نہیں رہتی اور مرض خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے، آپریشن کے بعد کمزوری دور کرنے کے لئے معویات کا استعمال کیا جائے۔

یونانی علاج :- بو اسیر کے باب میں لکھی گئی کھانے کی ادویات اس مرض میں بھی مفید ہیں۔ مندرجہ ذیل مجربات اس مرض کا مؤثر علاج ہیں :-

۱۔ گندنا کو کوٹ کر اس کا پانی نکالیں، اور اس پانی کے ساتھ اس کا پُر حصّہ تلوں کا تیل ملا کر نرم آگ پر جوش دیں، جب پانی جل جائے اور تیل باقی رہے، اس کو صاف کر کے شیشی میں رکھ دیں، یہ روغن بطور مالش مفید ہے، اگر اس کو بتی کے ذریعے رحم میں رکھوائیں تو بہت مفید ہے۔ بو اسیر کا خاص علاج ہے۔

۲۔ گول شُدھ، نرچور، چھلکا ہڑ زرد، رسونت سموزن پس کر لکر وندہ یا مولی کے پانی میں کھل کر کے گولیاں بنو کے برابر بنائیں اور ایک ایک گولی صبح و شام ہمراہ پانی کھلائیں۔

۳۔ چاکسو شُدھ، رسونت برابر وزن، آب برگ گل داؤدی میں پس کر گولیاں بقدر چھوٹے ٹنخو کے بنائیں، ایک گولی صبح و شام ہمراہ پانی استعمال کرائیں۔

۴۔ ہنگ کے پتے، اونٹ کی کوہان کے بال برابر وزن لے کر جلائیں، اس کا دھواں پہنچائیں، درد دور ہوگا۔

دیگر پیغمبیوں میں علاج بطرز بو اسیر کے کریں۔

غذا پر مہیز۔ گرم و ترش چیزوں سے پر مہیز کرائیں، غذا زود ہضم و معوی دیں۔

بچہ دانی میں پانی جمع ہو جانا، استسقاء رحم

تعریف مرض :- بچہ دانی میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔

وجوہات :- رحم کی قوت دفعہ کے کمزور ہو جانے کے باعث یا ورم رحم یا کمزوری جگر سے پانی کی رطوبت جمع ہو جاتی ہے۔
علامات :- ایام آنے بند ہو جاتے ہیں۔ پیٹ میں گیس ہوتی ہے، خاص طور پر چلتے پھرتے اور حرکت کرتے ہوئے زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ کبھی استسقاء کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، رحم سے اکثر رطوبت بہتی رہتی ہے، کبھی مریضہ پر گر بھ (حمل) کا گمان ہوتا ہے، لیکن حمل میں بچہ کی حرکت معلوم نہیں ہوتی، پیڑو اور پیٹ میں درد ہوتا ہے۔

علاج :- بدن اور بچہ دانی کا تنقیہ کریں اور ایام کھولنے والی ادویات دیں۔ زکچور، باؤکھنہ، سولف، باؤ بڑنگ، یج سوئے، منک سنگ، منک تلخ، منک طعام، جو کھار، سب ادویہ برابر کوٹ کر شیشی میں رکھیں اور بوقت ضرورت حقوڑی مقدار میں پوٹلی میں باندھ کر حمل کریں یا لونگ، مرکبی برابر پیس کر کپڑے میں پوٹلی باندھ کر ہر صبح و شام بچہ دانی کے منہ میں رکھیں اور علاج بطرز استسقاء کے کریں۔

دیگر پیچھتوں میں علاج بطرز استسقاء کے کریں، اگر مریضہ کا دل کمزور ہو تو محرکات قلب دیں۔ اگر ان تدابیر سے فائدہ حاصل نہ ہو تو عمل جراحی کی طرف رجوع کریں۔
غذا و پرہیز :- مریضہ کو بدایت کریں کہ وہ بھوک اور پیاس پر صبر کرے اور بقدر برداشت علاج ورزش کرتی رہے، دودھ، چاول، گھی، مکھن سے پرہیز کرائیں، پانی کم مقدار میں استعمال کرائیں، اگر ہو سکے تو اس کی بجائے عرق گاؤ زبان، عرق سولف اور عرق مکو کا استعمال کرائیں، مرغ، تیرا درجہ بکری کے گوشت کی بخنی بغیر گھی پلائیں۔

بچہ دانی کا درد، رحم کا درد، وجع الرحم

تعریف مرض :- بچہ دانی میں درد ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ ہی دوسرے متعلقہ اعضاء میں بھی درد کا احساس ہوتا ہے۔

وجوہات :- کثرت ملاپ، مردانہ اعضاء سے تناسل کی طوالت اور سختی، رحم کا ٹل جانا، بندش ایام، سوزش رحم وغیرہ سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- ملاپ کے وقت مریضہ کو سخت درد ہوتا ہے، کبھی کبھی ران، پنڈلیاں، پیچھ، پیڑو، معدہ اور سر کی چوٹی بھی اس درد میں شریک ہو جاتے ہیں، اگر مناسب علاج کیا جائے تو بہتر ورنہ کچھ عرصہ بعد مرض دائمی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

علاج :- برہمچریہ کا پالن کریں، مریضہ کو کامل آرام اور سکون سے رکھیں، سوزش رحم، رحم ٹل جانا، بندش ایام وغیرہ کا عارضہ ہو تو اس کے مطابق علاج کریں، قبض نہ ہونے دیں، غذا زود ہضم اور لطیف استعمال کرائیں۔

اصل سبب کو تشخیص کر کے اس کے مطابق علاج کریں، اگر بوقت ملاپ بچہ دانی میں درد ہوتا ہے تو ماز و بار یک پیس کر قبل از ملاپ حمل کریں، ریوند خطائی و ماشہ، برابر چینی ملا کر عرق سولف کے ساتھ کھلائیں یا نمک خور دنی بار یک پیس کر روئی میں آلودہ کر کے قبل

از ملاپ یونی میں رکھیں یا روزانہ کیسٹریل ۹ ماشہ، اونٹنی کے دودھ دس تولہ میں ملا کر ایک ہفتہ پلائیں، تمام اقسام کے بچہ دانی کے درد کیلئے مفید ہے یا روغن بادام یا روغن گل کا حمل کرائیں، نیم کے پتوں کی ٹکور مفید ہے۔
اگر بچہ دانی کے ٹل جانے سے یہ عارضہ ہو تو نرس سے بچہ دانی کو درست کروا کے پیسری رکھوائیں، شدید درد کی صورت میں ناف کے نیچے انٹی فلو جین کو گرم کر کے ضماد کرنا بھی مفید ہے۔
سوزش کی صورت میں مینی سلین کے عضلاتی انجکشن اور بیرونی طور پر اکتھول گلیسرین ہلکی طاقت کا مفید ہے، تقویت رحم میں گذشتہ صفحات میں لکھی گئی ادویات کا استعمال کرائیں۔
غذا و پرہیز: قبض نہ ہونے دیں، غذا زود ہضم اور لطیف دیں، دیر ہضم اغذیہ سے سخت پرہیز کرائیں۔

یونی کی اینٹھن، تشنج مہیل، وجائی نشمُس (Vaginis Mus)

تعریف مرض:۔ اس مرض میں یونی کو سیکڑنے والے عضلات کھینچ کر سخت ہو جاتے ہیں اور یونی اس قدر ذکی الحس ہو جاتی ہے کہ اگر اس کو خفیف سا بھی چھوا جائے تو وہ فوراً سکڑ جاتی ہے، جس سے ملاپ ناممکن ہو جاتا ہے۔
وجوہات:۔ اس مرض کا عام سبب یونی کے منہ کے قریب چھوٹے چھوٹے زخم ہو جاتے ہیں یا پردہ بکارت کے پھٹنے پر وہاں سوزش ہو جاتی ہے، کبھی عصبی مزاج کی نئی دہنیں اس مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔
علامات:۔ شدید حالتوں میں دردناک و عصبی ہوجان ہوتا ہے، مریضہ کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس کا گولہا اوپر کو اٹھ جاتا ہے، کمر کھانکے ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور رانیں زور سے بھیج جاتی ہیں اور ملاپ بالکل ناممکن ہوتا ہے۔
علاج:۔ اگر اس مرض کا کوئی قوی سبب نہ ہو تو عام طور پر کچھ دن ملاپ سے پرہیز کیا جائے، اس سے مرض کو خود بخود آرام آ جاتا ہے۔ اگر زخم اور سوزش کی وجہ سے یہ عارضہ ہو تو اس کے مطابق علاج کریں۔
مقویات کا استعمال کرائیں، اس سلسلہ میں ایسٹن سیرپ یا فیلوز سرپ کا استعمال مفید ہے۔ مندرجہ ذیل ادویات کا استعمال بھی اس مرض میں نہایت مفید ہے۔

- ۱۔ نیوروفاسفیٹ (Neuro Phosphate):۔ یہ گلابی سرورفاسفیٹ ہائے کیلشیم، سوڈیم اور دوسری ٹانک ادویات کا مرکب ہے دماغی اعصابی اور لنوں کی کمزوری کے لئے مفید ہے۔ خوراک ایک سے دو ڈرام دن میں تین بار دیں۔
- ۲۔ ہگزے نروگر (Huxlys Nerigor):۔ یہ بھی دماغی اور اعصابی کمزوری کے لئے مفید ہے اور گلابی سرورفاسفیٹ ہائے سے مرکب ہے۔ یہ اینگلو امریکن فارمیسیکل کمپنی کی ساختہ ہے، المیک کمپنی اسے نروی ٹون (Nervitone) کے نام سے تیار کرتی ہے ایک دو چمچ دن میں دو بار دیں۔

- ۳۔ بی، جی، فاس (B. G. Phose):۔ یہ وٹامن بی، رابو فلاوین، نکوٹینک ایسڈ اور گلابی سرورفاسفیٹ آف کیلشیم، سوڈیم وغیرہ مرکب ہے جو دماغی اور اعصابی کمزوری کے لئے مفید ہے۔
خوراک ایک سے دو چمچ بعد از غذا دیں، وٹامن داتا اغذیہ و ادویہ بہت مفید ہیں۔
اگر یونی کے باہر زخم ہوں تو انٹی بائیٹک مرہم یا بیٹنودیت این مرہم، اگر یونی زیادہ ذکی الحس ہو، تو بیرونی طور پر نیوپرکینا

(Nupercainal) مرہم استعمال کرائیں، کوکین مل سکے تو دو فیصدی کوکین مرہم کا مقامی استعمال نہایت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔

ہیجینی کاٹک، سن یاس، مینوپاز سڈروم (Menopausal Syndrome)

تعریف مرض :- اس مرض میں عورت کو ایام آنے بند ہو جاتے ہیں اور مختلف عوارض پیدا ہو جاتے ہیں۔
وجوہات :- عورت کے جسم میں زنانہ ہارمون کی کمی سے یہ عارضہ پیدا ہو جاتا ہے۔

علامات :- لگ بھگ چالیس سال کے بعد ایام بند ہو جاتے ہیں، بعض عورتیں موٹی ہو جاتی ہیں اور ہونٹ و ٹھوڑی پر بال پیدا
نے لگتے ہیں، چڑا چڑا پن، خفقان، لرزہ، خرابی خون، ذیابیطس شکر، درد شقیقہ، جوڑوں کے درد، خرابی ہاضمہ، بے خوابی، بلند پریشانی
زیر عوارضات پیدا ہو جاتے ہیں، چونکہ عورت کو ایام بند ہو جانے کے بعد اولاد سے مایوسی ہو جاتی ہے، اس لئے اس کو طب میں مایوسی کا زمانہ
ایام سن یاس کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

علاج :- چونکہ یہ مرض زنانہ ہارمون کی کمی سے پیدا ہوتا ہے، اس لئے اس کا درست علاج زنانہ ہارمون ہائے استعمال ہے، اس سلسلہ میں
سائیکلین (Ovocyclin) انڈین (Un den) پراجی نان، ایسٹروجن وغیرہ جن کا بیان اولاد کی آرزو کے بیان میں مفصل دیا
چکا ہے کا استعمال نہایت مفید ہے، علاوہ ازیں خستہ الرحم کے ہارمون ہائے بھی بذریعہ انجکشن خاص طور پر مفید ہیں، وٹامن ای (Vitamin-E)
اس مرض کا موثر علاج ہے۔ یہ آگتی ہوئی گندم سے حاصل کی جاتی ہے، گندم کے چھلکے میں بھی موجود رہتی ہے، افزائش نسل، بچہ دانی کی تسویت
سن یاس کا موثر علاج ہے۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ اوو سائیکلین (Ovo cyclin) سبباً ————— ایک یا پانچ ملی گرام کا عضلاتی انجکشن ہفتہ میں ایک بار دیں۔
تھیلین (Theelin) پارک ڈیوس ————— یہ ایسٹرون کا روغنی محلول ہے۔ ایک سی سی امپول کا عضلاتی انجکشن کریں، اس
دوا کو القطار ایام بوجہ سن یاس میں مفید خیال کیا جاتا ہے۔

۲۔ ڈیپو ایسٹرومینین (Depotostromenine) ای مرک ————— دوسری سی سی کا عضلاتی انجکشن کرنے سے سن یاس کی بے قراری
دور ہو جاتی ہے، آٹھ دن بعد آرام نہ ہو تو پھر اسی مقدار کا انجکشن دوبارہ لگائیں۔ دو ٹیکوں کا اثر تین چار ماہ رہتا ہے، اگر
اس کے بعد پھر شکایات پیدا ہوں، تو پھر اسی طرح انجکشن لگائے جائیں۔

۳۔ رووی گان (Rovigon) روش ————— تین سے چار ٹیکیاں ہر روز تازہ پانی سے دیں۔

۴۔ اووروائڈرینل کمپونڈ (Overoadrenal Compound) اینگلوفرینج ————— یہ گولیاں خستہ الرحم، تھائی رائیڈ، پوٹری
کے جوہر سے بنی ہیں، سن یاس، کمزوری اور جسم بھاری ہونے میں مفید ہیں۔ دو سے چار گولی دن میں تازہ پانی سے دیں۔

۵۔ اٹی سائیکلین (Eticyclin) سبباً ————— خستہ الرحم کی یہ ہارمون زبان کے نیچے رکھ کر چوسنی جاتی ہے، سن یاس کی
کمزوری میں مفید ہے۔

۶۔ پروکلائمن (Proclymon) سبباً ————— سن یاس کی علامات و علاج کے لئے مفید ہیں۔ دو گولی دن میں تین بار دیں،
تمام عوارضات میں مفید ہیں۔

۷۔ ڈائی ناسٹروول (Dinoestrol) برٹش ڈرگ ————— یہ ٹیبلٹس دس گنا طاقت ور ہے، مقدار خوراک معالج کی رائے

پر منحصر ہے، یہ مصنوعی خُصیۃ الرحم کی ہارمون ہے۔

۹۔ فی مینڈرن (Femandren) سببا ————— سن یاس کی ناخوش گوار علامات میں سکون دیتی ہیں، دو ٹکیاں روزانہ رخسارے کے جوف میں رکھ کر آہستہ آہستہ چوسی جائیں۔

۱۰۔ مپی لین (Mepilin) بی، ڈی، ایچ ————— دو سے چار ٹکیاں روزانہ دی جائیں۔

۱۱۔ مکسوجن (Mixogen) ایک سے دو ٹکیاں تازہ پانی سے دیں۔

۱۲۔ پیری میرین ایک ٹکیہ + ریڈ وکسان ایک ٹکیہ، دونوں کا مرکب درد کو کم کرتا ہے اور سن یاس کے دیگر عوارضات میں مفید ہیں، ہر دو ملا کر تازہ پانی سے استعمال کرائیں۔

ہائی بلڈ پریشر کے لئے سپلاکپینی کی سرپی نائیڈ اور ہمالیہ ڈرگ کمپنی کی سرپینا (Serpina) یا سبکپینی کی سرپاسیل (Serpasil) استعمال کیا جائے۔ یہ تمام نوا ایجاد گولیاں ہائی بلڈ پریشر کے لئے دسی طب کی مشہور دوا چھوٹی چندن کے بوٹی کے جزوی الکلائڈ سے تیار کی گئی ہیں۔

یونانی علاج میں چھوٹی چندن بوٹی چھرتی ہمراہ دودھ گائے یا عرق کلاب و کیوڑہ دیں۔

آیور ویدک علاج میں چھوٹا چندر یا سرپ گنڈھا دو سے چار رتی ہمراہ پانی دی جائے۔

بے خوابی کے لئے الگزر برومائڈ یا لوٹائیم برومائڈ کا استعمال کیا جائے، علاوہ ازیں وہ تمام ادویات جو بے خوابی و بلڈ پریشر میں لکھی گئی ہیں، استعمال کی جاسکتی ہیں، جسم کا سوٹا پاروکنے کے لئے سوٹا پا کے بیان میں لکھی گئی ادویات کا استعمال کرائیں۔

غذا و پرہیز۔ ڈائمنز سے بھرپور اغذیہ دیں، زیادہ دماغی و جسمانی محنت سے پرہیز کرائیں، ڈائمنز ای سے بھرپور اغذیہ دیں۔

یوشا البسمار، باوگولہ، اختناق الرحم، ہسٹریا، (Hysteria)

یادداشت :- یہ مرض عام طور پر عورتوں کو ہوتا ہے، خیال تھا کہ یہ بچہ دانی وغیرہ اعضائے تناسل کی خرابی سے ہوتا ہے، لیکن اس بعض مخصوص علامات مردوں میں بھی دیکھی گئی ہیں۔ جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عورتوں یا رحم کا خاص مرض نہیں ہے، جدید تحقیقات کے مطابق ہسٹریا دراصل ذہنی مرض ہے، جو اکثر عورتوں کو ہوتا ہے، جاہل لوگ اس مرض کو آسیب خیال کرتے ہیں۔

تعریف مرض :- یہ ایک عصبی مرض ہے، جو نظام عصبی کے افعال کے فتور سے واقع ہوتا ہے، اس کے جسمانی و روحانی افعال کم و بیش فرق آجاتا ہے۔

وجوہات :- عموماً اس مرض کی استعداد رکھنے والی جوان، نازک مزاج شہری عورتیں ہوتی ہیں، جن کا عصبی نظام کمزور ہوتا ہے، اصل اس بھی راز میں ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل اسباب کسی نہ کسی طرح ضرور اثر پذیر ہوتے ہیں، جنسی خواہش کی تشنگی، ایام کی خرابی، عیش و تنگی، غم و غصہ، خوف، مایوسی وغیرہ، نفسانی جذبات کی شدت، دماغی و جسمانی محنت، عورتوں کا زیادہ عمر تک کنوارا رہنا، دائمی قبض، شکم، جلق (مشت زنی)، عشقیہ اور جذباتی ناوولوں کا پڑھنا اور جنسی اشتعال دلانے والی فلمیں دیکھنا، ذکاوت جس، عصبی اشتعال وغیرہ۔

علامات :- مرض کی شدت و کمی کے لحاظ سے علامتیں مختلف ہوتی ہیں، عام طور پر مرض کو محسوس ہوتا ہے کہ پیڑو سے ایک گولاسا چڑھ رہا ہے، جو جلق میں جا کر انگ جاتا ہے، جس سے اس کا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور وہ بظاہر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ معمولی حالت

میں غشی برائے نام ہوتی ہے۔ اور مریضہ جلد ہوش میں آجاتی ہے، لیکن وہ غیر معمولی طور پر تنگن، درد سر وغیرہ عوارض اور مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے، مرض کی زیادتی میں مریضہ زور زور سے ہنسنے یا رونے لگ جاتی ہے اور پھر بے ہوش ہو جاتی ہے، اس کا چہرہ سرخ، سانس تیز، ہاتھ پاؤں سرد اور تشنچ ہوتا ہے۔ بعض اوقات مریضہ اپنے سر کے بال نوچتی ہے، بدن کے کپڑے پھاڑتی ہے اور دیوار سے اپنا سر ٹکراتی ہے اور اس پاس کے آدمیوں کو کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ اور بار بار گلے کی طرف انگلی لے جاتی ہے، گویا گلے میں کسی شے کے اٹکنے کا اشارہ کرتی ہے، جب مرض کا زور کم ہو جاتا ہے تو مریضہ ہانپنے کا پنپنے لگتی ہے تو کچھ دیر بعد علامات ملکی ہو جاتی ہیں اور مریضہ آرام سے لیٹی رہتی ہے۔ دوبارہ مندرجہ بالا علامات شدت سے ظاہر ہوتی ہیں، اسی طرح دورہ میں چند بار شدت و نرمی پیدا ہوتی ہے، پھر مریضہ سو جاتی ہے یا خاموش ہو جاتی ہے اور مرض کا دورہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ دورہ مرض چند منٹ سے چند گھنٹے یا تین یا چار دن تک رہتا ہے۔

علامات وقفہ :- گوناگوں اور چند در چند علامات کا ظہور ہوتا ہے اور کبھی وہ چڑچڑی اور کبھی وہ خوش ہوتی ہے۔ اکثر وہ فرضی امراض شکار ہوتی ہے، بعض اوقات اسے فالج ہو جاتا ہے، لیکن ایسی علامات بہت کم پیدا ہوتی ہیں، بعض اوقات گلابند ہو جاتا ہے، بعض اوقات لی، قبض، دست، نفخ شکم یا اختلاج قلب کی شکایت ہو جاتی ہے۔

علاج :- اصل سبب کی تشخیص کے بعد اس کا علاج کریں، مریضہ کو اس کے ماحول سے دور کریں، تبدیلی آب و ہوا کرائیں اور عزیز و اقارب سے دور رکھنے کی کوشش کریں، دماغی و جسمانی محنت سے پرہیز کرائیں، اس مرض میں نفسیاتی اور روحانی علاج نہایت کارگر ہے، اگر مریضہ غیر شادی شدہ ہو تو اس کی شادی کر دیں۔

دورہ کی حالت میں مریض یا مریضہ کو صاف کپڑے پہنا کر ہوا دار مکان میں لٹائیں، گلے کی بندش فوراً ڈھیلی کر دیں۔ زیادہ محبت کرنے سے یا ترس کھانے والوں کو نزدیک نہ آنے دیں، ہاتھ پاؤں کو مضبوطی سے باندھ دیں، رانی اور منک کو باریک پیس کر ہاتھ پیروں پر ملائے، منہ پر موسم کے مطابق ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں یا اونچے مقام سے ٹھنڈا پانی دھارے طرح ڈالا جائے کہ منہ اور ناک بھر جائے، مریض گھبرا کر منہ کھول دے یا اٹھ بیٹھے، گرم پانی میں بٹھانا بھی مفید ہے، خوشبودار چیزیں مثلاً جند بیدستر، جاو شیر، لہسن، پیاز یا کندش، سنگھانے لےئے اور خوشبودار چیزیں کستوری اور عنبر وغیرہ مناسب مقدار میں روغن چنبیلی ملا کر مہل (ویجائنا) پر ملنے کے لئے گول اور گندھک آگ ال کر اس کا دھواں ناک میں پہنچانے کے لئے، موسم کے مطابق برف کا پانی رحم میں پہنچانے کے لئے اور بیرونی آلات تناسل پر برف رکھنے کے لئے اور جبڑہ اگر بھیجا ہوا ہو تو کیسٹر آئیل یا گلیسرین حقنہ کے لئے، سانس کی تنگی اور شدید تشنچ کے وقت مریض کا منہ اور ناک کچھ دیر کے بعد سے بند کر دینے تا آنکہ مریض گھبرانے اور چلانے لگے، یہ سب رفع تشنچ اور ہوش میں لانے کی بہترین تدابیر ہیں۔

اگر ان تدابیر سے آفاقہ نہ ہو تو مریض کے کان سے منہ لگا کر زور سے چلائیں، پورہ ارمنی، زیرہ کرمانی پیس کر شہد خالص میں ملا کر فرزجہ استعمال کرائیں، اگر سبب احتباس مادہ منویہ ہو تو دایہ کو ہدایت کی جائے کہ وہ انگلی کو کسی خوشبودار تیل سے تر کر بچہ دانی داخل کر کے اور بچہ دانی کے منہ کو گدگدائے تاکہ مادہ مجتہ کا اخراج ہو کر آفاقہ ہو سکے۔ اگر مریضہ شادی شدہ ہو تو ملاپ اس کے بہترین علاج ہے، غیر شادی شدہ کو شادی کے لئے مجبور کیا جائے، بندش ایام کا سبب ہو تو اس کا علاج کریں۔ دورہ آفاقہ کے بعد مستقل علاج کیا جائے۔

ایلوپیتھک علاج :- دورہ کے وقت ایونیا کارب یا سپرٹ ایونیا ایرومیتک سنگھائیں، بطور دو اپوٹاسیم برومائیڈ، کلورل ہائیڈریٹ مسکن ادویات دیں، مندرجہ ذیل ادویات اس مرض کے لئے نہایت مفید ہیں :-

۱۔ لومینل برومائیڈ مکسچر (Luminal Bromide Mixture) :- یوٹاسیم برومائیڈ ۵ اگرین، فینوباربیٹون سوڈیم ۲۰۰ اگرین، پانی ایک

- اولس بے خوابی، ہسٹیریا، ہائی بلڈ پریشر اور دماغی امراض کے لئے فارماکوپیا ہسپتال ہائے سرکاری جدید مشرقی پنجاب کا نہایت مشہور نسخہ ہے۔
- ۲۔ برومائیڈ کلورل مکسچر (Bromide Chloral Mixture)۔ پوٹاسی برومائیڈ ۲۰ گریں، کلورل ہائیڈریٹ ۱۰ گریں، مشرب سادہ ایک ڈرام، کلوروفارم وارٹر ایک اونس، نیند آور اور تسکین دہ مکسچر ہے، اس سے ہسٹیریا کے دوروں کو آرام ملتا ہے، کمزور مریضوں کو نصف خوراک دیں، وی بے فارماکوپیا کا مشہور نسخہ ہے۔
- ۳۔ ٹیبلیٹ باربی ٹون سوڈیم (Tablet Barbitone Sodium)۔ مقدار خوراک ۵ سے ۱۰ گریں، نیند آور دوا ہے اور پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں مروج ہے۔
- ۴۔ ٹیبلیٹ باربی ٹون (Tab Barbitone)۔ مقدار خوراک پانچ سے دس گریں، نیند آور ہے اور پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں مروج ہے۔
- ۵۔ ٹیبلیٹ فینو باربی ٹون (Tab-Pheno Barbitone)۔ خوراک ہر اگرین رات کو سوتے وقت، نیند آور دوا ہے اور پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں مروج ہے۔
- ۶۔ ہسٹیریا مکسچر۔ ٹنگچرولیرین امونی ایٹا ۴۵ مسم، سپرٹ امونیا ایرومیک ۵ مسم، ایکوا ایک اونس، ایک خوراک دن میں دو سے تین بار، ہسٹیریا دوران مفید ہے، یہ لندن فارماکوپیا کا نسخہ ہے جو ولایت کے ہسپتالوں میں مروج ہے۔
- ۷۔ مکسچرولیرین۔ پوٹاسی برومائیڈ ۵ گریں، ٹنگچرولیرین امونی ایٹا ۳۰ مسم، ٹنگچرکارڈو ۲۰ مسم، سپرٹ کلوروفارم ۱ ڈرام، ایکوا ایک اونس، ہسٹیریا کے لئے نہایت مفید ہے اور صوبہ ممبئی کے سرکاری ہسپتالوں میں مروج فارماکوپیا کا نسخہ ہے۔
- ۸۔ دیگر۔ ٹنگچرولیرین امونی ایٹا ۴۵ مسم، سپرٹ امونیا ایرومیک ۵ مسم، ایکوا ۱۰ سے ایک اونس، ایسی ایک خوراک دن میں تین بعد از غذا دیں۔
- ۹۔ الکسر برومائیڈ ولیرین۔ یہ برومائیڈ کلورل ولیرین وغیرہ سے تیار شدہ نیند آور گھول ہے۔ جو ہسٹیریا، مرگی بے خوابی اور پاگل پن کے لئے ہے۔ یہ مارکیٹ میں مختلف کمپنیوں کے یہ الیکٹر اسی نام سے ملتے ہیں، خوراک ہر سے ایک ڈرام دن میں دو یا تین بار دیں یا مخفّی برومائیڈ (Three Bromide) گولیاں ایک سے دو حسب ضرورت دیں یا
- ۱۰۔ سیلیرینا (Celerina)۔ ہسٹیریا و دیگر امراض زنانہ کے لئے امریکی کی تیار کردہ دوا ہے، خوراک ایک سے دو چمچ دن میں تین بار دیں ازین الیٹرس کارڈیل (Aletris Cordial) کا استعمال بھی مفید ہے۔
- ۱۱۔ ولیرین (Valerin)۔ یہ جٹا بانسی یعنی مشک ہالا سے مرکب ٹیکے ہیں، جو درد شقیقہ و پاگل پن کے لئے مفید ہیں، ایک سی سی عضلات پر دینے مفید ہیں، اس انجکشن سے ٹٹے ٹٹے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، با احتیاط لگائیں۔
- ۱۲۔ سرپا سیل (Serpa Cil)۔ یہ دوا اسرول کے جوہر سے سہا کپنی تیار کرتی ہے، ہسٹیریا کے علاوہ بے خوابی، ہائی بلڈ پریشر، مرگی اور پاگل پن کے لئے مفید ہے، مارکیٹ میں کھانے کے لئے گولیاں اور انجکشن ملتے ہیں، مقدار ایک الیمپولز (ایک ملی گرام) عضلاتی طور پر دیں۔
- ۱۳۔ ڈامین بی۔ ۱۔ نسوں اور پٹوں کی کمزوری کی حالت میں اسے استعمال کیا جائے، بیرین (Berrin) یا بنروا (Benerva) کا مفید ہے، ایک سی سی عضلاتی طور پر دیں۔
- ماڈرن ادویات ۱۔ الیکٹر برومواول (Elixirbomoval) سپلا۔ ایک سے دو چمچ دن میں دو سے بار استعمال کریں۔

- ۲۔ البیرومال (Albromal) بنگال — دو سے تین چمچ دن میں تین بار دیں۔
 - ۳۔ لبریم (Librium) روش — اکوانیل (Equanil) — ایک ایک گولی دن میں دو سے تین بار دیں۔
 - ۴۔ الیپیرین (لوٹس) ۵۰۰ ملی گرام، ریڈ دکسان (روش) ۵۰۰ ملی گرام، بنروا (روش) ۱۰ ملی گرام — تینوں کو آپس میں پس کر دو خوراک بنائیں، ایک خوراک پانی کے ساتھ بخار کے وقت دیں، اختناق الرحم سے ہونے والے بخار کے لئے مفید ہے، اگر بخار کے ساتھ کچھ کھانسی وغیرہ ہو تو انٹی بائیوٹک ادویات بھی دی جاسکتی ہیں۔
 - ۵۔ اڈالین (Adalin) بائر — ایک ایک گولی دن میں تین بار تازہ پانی سے دیں۔ مہیڑ یا دہائی بلڈ پریشر کے لئے مفید ہے۔
 - ۶۔ امیبی نال (Embial) سے اینڈبیکر — پانچ گرین کی مقدار میں دیں، نیند لاتی ہے۔
 - ۷۔ تھری ولیورین (Threevalerin) بروز ویکم — ایک ایک گولی دن میں تین بار تازہ پانی سے دیں۔
 - ۸۔ سپارین (Sparine) جان وائٹ — اختناق الرحم کے اکڑاؤ کے ساتھ حملہ کی صورت میں اس کے دوسری سی عضلاتی ٹیکے سے فوراً آرام ملتا ہے۔ بے چینی دور ہو جاتی ہے، دہائی بلڈ پریشر کم کرتی ہے۔ ڈرو فکر کو کم کرتی ہے، اسے غشی کی حالت میں عام طور پر نہ دیں۔ عام پردے زائے سے بنی ہے، عام حالات میں صرف ایک سی سی کا ٹیکہ کافی ہے۔ ٹیکہ ۵۰ ملی گرام کی ملتی ہے۔
 - ۹۔ لارجیکٹیل (Largactil) سے اینڈبیکر — ڈر، فکر، بے چینی میں خاص طور پر مفید ہے۔ دماغ پر اثر ڈالتے ہوئے سوچنے کی طاقت کو مکمل طور پر ٹھیک کرتی ہے۔ ایک ٹیکہ پانی سے دیں۔
 - ۱۰۔ لبریم ایک گولی، بنروا ایک ٹیکہ دونوں کو ایک ساتھ پانی سے دیں، اگر بنروا نہ ملے تو اس کی جگہ ڈامن بی کیلیکس کی گولی ساتھ شامل کریں۔
 - ۱۱۔ الیکزبرو مائیڈ ولیورین ایک سے دو چمچ دن میں دو سے تین بار دیں۔
 - ۱۲۔ گارڈینیل (Gardinal) ایم بی — ۳۰ یا ۶۰ ملی گرام ایک ٹیکہ تازہ پانی سے دیں۔
 - ۱۳۔ سونیرگن (Sonergan) ایم بی — دورہ کے وقت ایک سے دو گولیاں پانی سے دیں، زیادہ تکلیف میں سونرل (Soneryl) ایم بی — ایک ٹیکہ تازہ پانی سے دیں۔
- یونانی علاج :-** ”مجموعہ سنجاح“ اس مرض کا موثر علاج ہے۔ یہ نسخہ اس کتاب میں درج کیا جا چکا ہے۔ علاوہ ازیں مندرجہ ذیل تجربات مرض کا موثر علاج ہیں :-
- حب مہیڑ یا :- ہینگ ایک ماشہ، پھول بابونہ ایک ماشہ، بال چھڑ ایک ماشہ، مٹھی شدھ ایک تولہ، سب کو باریک پس کر چنے کے برگولیاں بنالیں، خوراک ایک گولی صبح اور دوپہر کو دیں۔
- دیگر :- جند بیدستر ماشہ، ہینگ خالص، کستوری، عود صلیب ہر ایک ۴ ماشہ، عرق سولف سے گولیاں بقدر دانہ ماشہ بنا کر گولی روزانہ صبح کے وقت پانی سے کھلائیں۔
- زعفرانی پلتر :- زعفران، جادتری ہر ایک تین ماشہ، نفل دراز، جافل ہر ایک چھ ماشہ، ادک ایک تولہ، اسکندھ ۶ ماشہ، برگ پان ۶ عدد، ب کو پس کر دانہ مونگ کے برابر گولیاں تیار کریں، ایک ایک گولی پان میں رکھ کر دن میں دو بار دیا کریں۔
- دیگر :- ہیرا ہینگ ایک ماشہ، دونوں وقت مرصیہ کو کھلائیں اور گلے میں باندھیں۔ مفید ہے۔
- دیگر :- عطر گلاب کا شاذ کرانا اس مرض کے لئے نہایت مفید ہے۔ بیرونی طور پر استعمال کیا جائے۔
- سفوف مسکن :- پوٹاسی برو مائیڈ، سولف، دانہ الاچی کلاں برابر وزن کوٹ کر سفوف بنائیں، خوراک ایک سے دو ماشہ ہمراہ پانی دیں۔

ہیٹریا کے دورہ اور پاگل پن کے لئے نہایت مفید ہے۔

حب باؤگولہ :- مرچ سیاہ چار ماشہ، ہیرا ہینگ دو ماشہ، نمک سیاہ دو ماشہ، است پودینہ خشک پرا ماشہ، لیموں کے رس کے ہمراہ
کے دانہ کے برابر گولیاں بنائیں، خوراک ایک سے دو گولی ہمراہ عرق سولف یا پانی دیں۔

نوٹ :- ہیرا ہینگ ملانے سے پہلے اسے گھی گائے میں بھون لیں، کیونکہ ہیرا ہینگ میں سلفر (گندھک) ہوتی ہے،
اس لئے اس پر ورق چاندی چڑھانا منع ہے، کیونکہ چاندی اور گندھک مل کر کیمیاوی عمل رکھتی ہیں، اس لئے گولیاں سادہ بنائی
جائیں۔ یہ گولیاں پیٹ کی گیس، ہیٹریا اور پیٹ درد کے لئے نہایت مفید ہیں۔

دوائے ہیٹریا :- چھوٹی چندن (اسرول) بوٹی ایک تولہ، کالی مرچ ایک تولہ، ہر دو کوٹ پیس کر سفوف بنالیں، خوراک پراسے
ماشہ صبح و شام پانی سے دیں۔

ہیٹریا، ہائی بلڈ پریشر اور پاگل پن کے لئے نہایت مفید ہے۔

معجون اختناق الرحم :- مروارید ناسفتہ، مرجان، کہربا، درونج، ابریشم مقرر، نر کچور، بہمن سفید، بہمن سرخ ہر ایک سات ماہ
لونگ تین ماشہ، چھیلرا، سنبل الطیب، دانہ الاچی خورد، دھمال پتر، دارہینی، جندبیدتر، ہر ایک پراسہ ۳ ماشہ، طباشیر، زعفران، مصطکی رومی، صندل
سفید، صندل سرخ، دھنیاں خشک ہر ایک سات ماشہ، عنبر اشہب ۳ ماشہ، کستوری ۲ ماشہ، مصری دیسی ۱۶ تولہ، شہد خالص ۷ تولہ،
معروف معجون تیار کریں۔

خوراک دو ماشہ سے تین ماشہ ہمراہ عرق گلاب و گاؤ زبان استعمال کریں۔ یہ معجون مرگی، ہیٹریا اور کمزوری دل کے لئے نہایت مفید ہے
دیگر :- سنبل الطیب (بال چھڑ) جسے طب جدید میں ولیرین (Valerin) کہتے ہیں، دو ڈرام لے کر دس ادنس پانی میں ایک گ
نک ہلکی آگ پر پکائیں، پھر چھان لیں، خوراک دو تولہ صبح و شام دیں۔

دیگر :- جدوار ایک ماشہ، عود صلیب ایک ماشہ، باریک پیس کر خمیرہ گاؤ زبان میں ملا کر روزانہ دیں۔
دیگر :- برہمی بوٹی تازہ ایک تولہ، سپرٹ ریٹی فائیڈ ایک ادنس میں چوبیس گھنٹہ تک بھگور کھیں، پھر چھان کر تین یا چار قطرے پانی
ملا کر دن میں تین یا چار بار دیں۔

دیگر :- اسرول (چھوٹی چندن) بوٹی پرا ماشہ، ہال چھڑ ایک ماشہ، مرچ سیاہ چار رتی، اجوائن خراسانی دو رتی، سفوف بن
ایسی ایک ایک خوراک صبح و شام دیں، ہیٹریا کے لئے نہایت مفید ہے۔

دیگر :- سنبل الطیب (بال چھڑ) پانچ ماشہ، پودینہ چار ماشہ، انیسوں چار ماشہ، جوش دے کر چھان کر پہلے دو ابرامک معتدل
والی چار ماشہ کھلا کر یہ دوا اوپر سے بطور جوشاندہ پلا دیں، ہیٹریا کے لئے مفید ہے۔

دیگر :- پوٹاسیم برومائڈ ایک ماشہ، دھنیاں خشک تین ماشہ، برگ پودینہ خشک ایک ماشہ، سفوف بنا کر صبح و شام کھانا کھا
کے بعد تازہ پانی سے دیں، کمزور مریضوں کو نصف خوراک دیں۔

آیور ویدک علاج :- اشوگندھا آرٹھ (بھیشج رتناولی) ایک سے دو تولہ برابر پانی ملا کر یا دشمول آرٹھ (شارنگدھر) ایک
دو تولہ برابر پانی ملا کر دونوں وقت بعد از غذا دیں۔ اگر نقائص ایام یا دماغی کمزوری ہو تو سار سوت آرٹھ پراسے دو تولہ ہمراہ پانی ملا کر دینا

ازیں انما دگنچ کیسری رس ایک سے دو گولی ہمراہ برہمی گھرت یا دودھ گائے دیں، ہیٹریا و پاگل پن کے لئے مفید ہے۔
جب مریض بکواس کرنے لگے، جو اس کھو بیٹھے اور دل ڈوبنے یا دل گھبرانے کی شکایت ہو تو برہمت کستوری بھیرورس (بھیشج رتناولی)

ایک گولی ہمراہ شہد، برگ پان یارس ادرک یا دودھ گائے نیم گرم سے دیں۔

اگر اعصابی نظام کی خرابی و کمزوری بہت ہو تو بہت وات چنتا منی رس ایک ایک گولی صبح و شام ہمراہ شہد یا مکھن دیں، بالائی سے بھی دے سکتے ہیں۔ یہ رس کشتہ سونا، چاندی، ابرک، فولاد، مرجان، موتی، رس سندھور کا مرکب ہے اور بہترین ٹانک ہے۔


اگر خرابی رحم کی وجہ سے پاگل پن کی حالت ہو تو پرتاپ لنگیشور رس (لوگ رتناکر) ایک سے دو رتی ہمراہ شہد یا رس ادرک دن میں تین بار دیں۔ طب آیور وید میں چترنج رس کا استعمال بھی ہسٹریا کا مؤثر علاج ہے اور کشتہ سونا رس سندھور وغیرہ کا بے مثل رساں ہے۔ خوراک ایک ایک گولی صبح و شام ہمراہ شہد ایک چمچ میں چار رتی ہرٹ کا چورن ملا کر اس کے ہمراہ گولی نگلوائیں، اوپر سے دودھ گائے نیم گرم کا پیالہ دیں۔ اگر ایام کی رکاوٹ ہسٹریا کا سبب ہو تو ایام کھولنے کے لئے رجبہ پر درتنی دئی ایک سے دو گولی ہمراہ گرم پانی یا چائے استعمال کرائیں۔ ہو میو پیٹھک علاج :- آرسینک ایلب، فیرم، بلاڈونا، آرم میٹ اور پلسٹیل بہترین ادویات ہیں اور بالو کیمیک طریقہ علاج میں ٹیڑم پیور، کالی فاس بہترین ادویہ ہیں۔

ہسٹریا کا آج کل نیا علاج "سائیکو ایلی سس" سے کیا جا رہا ہے یعنی خیالی تکالیف (جنسی یا غیر جنسی) یا تلخ تجربات جو ذہن سے اُتر چکے ہیں، لیکن ان کے مابعد اثرات کا غیر طبعی طریقوں سے اظہار ہوتا رہتا ہے۔ ان کا علاج واقعات کو ظاہر کر کے مریض کے سامنے پیش کرنے سے مضر اثرات دور ہو جاتے ہیں۔

جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ دورے کی حالت میں مریضہ کو ہوا دار کمرے میں لٹائیں، سینہ کے ٹپن کھول دیں۔ اس کے بازو و رانوں کو کس کر باندھ دیں، پیاز یا لہسن سنگھائیں یا ہاتھ سے ناک و منہ پھوڑی دیر کے لئے بند کر دیں اور مندرجہ ذیل ادویات کا استعمال کریں :-

- ۱۔ ایونیا، ایفقر، کلوروفارم، کانور یا ایمائل نائیٹریٹ سونگھائیں۔
- ۲۔ جسم میں درد ہو تو کوئی دافع درد دوا لوزالجین، کوڈوپارین یا کرو سین کی ایک گولی چائے سے دیں۔
- ۳۔ کمزوری کے لئے وٹامن بی کمپلیکس گولیاں یا سیرپ دیں۔
- ۴۔ بدضمی یا گیس ہو تو وٹازائم یا ڈیجی پلکس ایک سے دو چمچ برابر پانی ملا کر دن میں دو سے تین بار کھانا کھانے کے بعد دیں۔
- ۵۔ دورہ سے جڑے بند ہو جائیں تو لائیکوار ایونیا فورٹ سونگھائیں۔
- ۶۔ بے خوابی کی حالت میں کامپوز کی گولی دیں۔
- ۷۔ متلی و قے دور کرنے کے لئے سکول یا ایومین کی گولی ہمراہ تازہ پانی دیں۔
- ۸۔ جسم کے کسی خاص حصہ پر بے جسی وجود ہو تو میڈیکو الیکٹرک مشین سے بے حس حصہ پرائیکٹرک شاک لگائیں۔
- ۹۔ فالج کا ڈر ہو تو اس کے مطابق علاج کریں۔
- ۱۰۔ عشقیہ ناول و کہانیاں پڑھنے، سینما بینی، دماغی محنت کی کثرت، بے ہودہ اور پریشان کن تفکرات و توہمات سے مریضہ کو بچائیں۔
- ۱۱۔ صبح و شام ہوا خوری کرائیں، روزانہ تازہ پانی سے غسل بھی مفید ہے۔
- ۱۲۔ جہاں تک ممکن ہو مریضہ کا خیال مرض کی طرف سے ہٹائے رکھیں۔
- ۱۳۔ دورہ کی حالت میں مریضہ کے پاس کھڑے ہو کر ہمدردی کی باتیں ہرگز نہ کریں، بہتر ہے اُسے تنہا اُس کے حال پر چھوڑ دیں۔

غذا و پرہیز :- سبز ترکاریاں، دودھ، مکھن، انار، انگور، سیب کھانے کو دیں، ثقیل، دیرینہ غذاؤں، محنت دماغی و جسمانی اور غم و غصہ دیر تک جاگتے رہنے سے پرہیز کریں۔



سولہواں باب

پرئو آ یو جن، خاندانی منصوبہ بندی، فیملی پلاننگ (Family Planning)

یہ ایک طبی حقیقت ہے کہ بچہ کی پیدائش کے بعد عورت کافی کمزور ہو جاتی ہے اور دوبارہ اپنی معمول کی حالت پر آنے کے لئے عورت کو کافی وقفہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر پہلے بچہ کی بہت ہی کم مدت کے بعد فوراً حمل قرار پا جائے اور دوسرا بچہ پیدا ہو جائے تو عورت کی صحت تندرستی ضائع ہو جائے گی۔ اور اسے اپنی کھوئی ہوئی صحت اور طاقت حاصل کرنے کا وقت نہ مل سکے گا۔ اس لئے پہلے بچہ کی پیدائش کے بعد اصولاً عورت کو کافی وقت ملنا چاہیئے، اس وقفہ کے دوران میں اولاد دوبارہ پیدا ہونے کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لئے عورت کو حمل محفوظ رکھنے کے لئے منبسط تولید (برفہ کنٹرول) (Birth Control) پر ہی عمل کرنا ہوتا ہے۔ تاکہ اس دوران میں عورت کی صحت دوبارہ بحال ہو کر معمول کے مطابق ہو جائے۔

مگر سب سے ضروری سبب جس کی وجہ سے آج کا مہذب انسان اولاد سے خائف ہے وہ اقتصادی بد حالی ہے، آج ہر انسان کی آمد محدود اور ناکافی ہے، زیادہ تر لوگ اقتصادی حیثیت سے معیار زندگی سے بہت نیچے ہیں، ایسی حالت میں اولاد میں اضافہ کرتے رہنا اپنا دباؤ نکالنا ہے، چونکہ ہماری زندگی کافی گراں ہے، اس لئے ایک نوزائیدہ بچہ کی آمد بلا خرچ نہیں ہوتی، بلکہ اولاد پیدا ہوتے وقت ڈاکٹر کی فیس، خانہ کے اخراجات، بیوی کی خوراک اور ادویات پر کافی خرچ ہوتا ہے۔ اس کے بعد صا جنزائے کی پرورش اور ان کے رکھ رکھاؤ پر بھی کچھ کم خرچ ہوتا ہے، ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ اگر پیدائش پر کنٹرول نہ کیا گیا تو اقتصادی کمزوری کی وجہ سے فاقوں تک نوبت آجائے گی اور اولاد بجائے کی دین ہونے کے قہر الہی ہوگی۔

اولاد کی زیادتی سے ماں کی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے، زیادہ صحتی خرابی اس وقت ہوتی ہے جب وہ ان بچوں کے رکھ رکھاؤ میں کے وہ لمحات بھی قربان کر دیتی ہے، جو ہر انسان کا حق ہیں، زچہ کے لئے آرام انتہائی طور پر ضروری ہے۔ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ آرام طلبکار ہوتا ہے۔ اس کو ملکی اور صحت بخش غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر مسلسل پیدائش اولاد کے سبب وہ ان تمام ضروریات سے محروم رہتی کھلی ہوا جو اس کے لئے غذا سے بھی زیادہ ضروری ہے، بالکل ہی میسر نہیں آتی، اس کو اپنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ کھڑکی سے باہر بھی جھانک سکے

ایام وقفہ	حمل نہ ہو سکنے کے ایام
۲۶ روز	ایک سے ۸ اور ۱۴ سے ۲۶ روز کے درمیان
۲۷	" " " ۲۷ " ۱۵ " ۹ " "
۲۸	" " " ۲۸ " ۱۶ " ۱۰ " "

مپیٹر بچر چارٹ سے اخراج انڈوں کا وقت معلوم کرنا

عام طور پر ایک تندرست عورت کے چارٹ میں جس دن مپیٹر بچر سب سے کم درجہ پر آجائے اور پھر اگلے روز ایک دم کئی پوائنٹ یا ڈگری بڑھ جائے تو وہ دن اخراج انڈہ کا سمجھا جائے گا۔ اگر آپ اس طریقہ سے چارٹ نہ بنا سکیں تو پھر سیدھا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ تاریخ نکھ کر اس کے آگے مپیٹر بچر اور ریمارکس لکھتے رہیں :-

تاریخ ہائے	ڈگری	ریمارکس
۱ اگست	۹۷	حیض شروع
" ۲	۹۷ ۶۱	x
" ۳	"	x
" ۴	۹۸	x
" ۵	۹۸ ۶۸	آج قدرے زکام و بخار ہے
" ۶	۹۸	x

نوٹ :- ۵ اگست کو اخراج انڈہ کے سبب سے مپیٹر بچر ۹۸ ۶۸ پر چلا گیا اور ۶ اگست کو نارمل پراکٹر طبیعت قدرے چڑھاؤ پر رہی۔ اسی طرح سارے مہینہ کا چارٹ تیار کریں !

ملاپ کا منقطع کرنا، (Coitus Interruptus)

اس عمل میں ویرج کے اخراج سے پہلے ملاپ منقطع کر دیا جاتا ہے اور مرد اپنے آلہ تناسل کو باہر نکال لیتا ہے تاکہ عورت کے رحم (بچہ دانی) میں نطفہ قرار نہ پائے۔ برتھ کنٹرول (Birth Control) کا یہ طریقہ زمانہ قبل سے رائج ہے، لیکن یہ عورت اور مرد دونوں کے لئے نہایت مضر ہے اور اس سے متعدد جسمانی اور دماغی مرض لاحق ہو جاتے ہیں، علاوہ ازیں مرد کی مذی (جو انزال کے بعد آہستہ آہستہ رستی رہتی ہے) اس میں بھی بعض اوقات حیوانات منویہ (ویرج کے کیڑے) پائے جاتے ہیں۔ اس لئے اس طریقہ کو برتھ کنٹرول (Birth Control) کے لئے سو فیصدی موثر نہیں کہا جاسکتا۔

نیز برتھ کنٹرول کے لئے بعض ماہر جنیات ملاپ کے فوراً بعد آٹھ بیٹھنے یا زور سے کھانسنے یا گودنے کا مشورہ دیتے ہیں، کھانسنے اور جھینک لینے کا اثر یہی ہوتا ہے، ملاپ کے فوراً بعد پیروں کو پھیلائے رکھنا اور پاؤں کے بل سیدھے ہو کر پندرہ منٹ تک بیٹھے رہنا۔ ادبھی جگہ سے گودنا، ٹیکسٹیں نکالنا بھی مفید بتایا گیا ہے، لیکن برتھ کنٹرول (Birth Control) کے ان طریقوں پر پورا بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں! اگر

میٹھے تیل میں بھگو کر روئی کا گولایا اسفنج ملاپ سے پہلے رکھ لیا جائے تو اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اندام نہانی میں تیل ہونے کی وجہ سے چکنا چٹ پیدا ہو کر ویرج فوراً باہر آجائے گا اور تیل ویرج کے کیڑوں کو ہلاک بھی کرتا ہے۔

یہ طریقہ غریب طبقہ کے لئے اچھا ہے اور جب کوئی سائنٹیفک طریقہ میسر نہ ہو، تو کبھی کبھار ان طریقوں سے لالچہ اٹھایا جاسکتا ہے۔
اسفنج (Sponge) کا استعمال :- اسفنج کا ٹکڑا دھو کر اور صاف و خشک کر کے باریک ٹل یا گاز کے ٹکڑے میں لپیٹ کر دھاگے کے ساتھ باندھ لیا جاتا ہے، پھر اسے ۲۰ فیصدی بورک لوشن میں بھگو کر اندام نہانی کے اندر ملاپ سے پہلے داخل کر لیا جاتا ہے، اسفنج سے رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اور ویرج کے کیڑے بچہ دانی کے منہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔

بورک لوشن کی بجائے سرکہ انگری ایک حصہ اور پانی دو حصہ ملا کر یا زیتون کے تیل (Olive Oil) میں یا بنوے کے تیل (کاسٹن سیڈ آیل (Cottonseed Oil) میں بھگو کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مطلب کے لئے ربڑ کے مصنوعی اسفنج بھی بکتے ہیں۔ جو زیادہ دیر پا ثابت ہوتے ہیں۔

ملاپ سے کچھ وقت پہلے ٹھنڈے یا تازہ پانی میں یا پشٹکڑی گھلے پانی میں اسفنج ایک دو منٹ رکھنا چاہیے، تب اسے پھوڑ کر انگلی کی مدد سے بیٹھ کر مہل میں چڑھا لینا چاہیے اور جہاں تک اسفنج اندر جاسکے، لے جانا چاہیے، تاکہ بچہ دانی کے منہ کے آگے تک پہنچ جائے اور بچہ دانی کا منہ ڈھک جائے، اسفنج کو مہل سے نکالنے سے پہلے اور بعد دوش کر لینا چاہیے۔ اسفنج کے ساتھ مندرجہ بالا جراثیم کش ادویہ کا استعمال کرنے سے پہلے برتھ کنٹرول کے بارے میں زیادہ بھروسہ ہو جاتا ہے۔

اس سلسلہ میں روئی کے ایک صاف ٹکڑے کو لے کر اس کو مٹھلی پر چڑا کر لیا جائے، اس کی موٹائی پون انچ کے قریب ہو، اس روئی کے رد گرد گولی کے دھاگے اور کروشے سے ایک جال سا بن لیا جاتا ہے اور اس کا سر المبار کھا جاتا ہے، پھر اس کو — ملاپ سے پہلے گلیسرین یا زیتون کا تیل یا صرف میٹھے تیل میں تر کر کے رحم کے سامنے رکھ لیا جاتا ہے، ملاپ سے چھ گھنٹہ بعد جال کا لمبا سر اکھینچ کر روئی باہر نکلی جائے، روئی کو باہر پھینک دیں اور جال کو محفوظ رکھیں تاکہ دوبارہ کام لے سکے، یہ حمل سے بچاؤ کا نہایت ہی آسان اور بے ضرر طریقہ ہے۔ اس کو فوراً بعد از ملاپ اندام نہانی سے نکالا جاسکتا ہے، دوسرے دن صبح کے وقت نکالنے میں بھی کوئی ہرج نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نکالنے سے پہلے اندام نہانی کو صاف کر لینا چاہیے۔

دوش (Douche) کا استعمال :- ملاپ کے بعد پیکاری کے ذریعہ سے اندام نہانی کو لوشن کے ساتھ دھو کر فوراً صاف کر لیا جاتا ہے، برتھ کنٹرول کے لئے دوش کرنا ہے تو بہت موثر مگر بعض اوقات منی بچہ دانی کے اندر براہ راست داخل ہو جاتی ہے، نیز دوش کرنے میں یہ بھی قباحت ہے کہ رات کے وقت اٹھنا اور پانی گرم کرنا پڑتا ہے، لوشن کئی قسم کے استعمال کئے جاتے ہیں، مثلاً منک پوٹاسیم مینگنیٹ، سرکہ اور لیکٹک ایسڈ وغیرہ محلول بنا کر اندام نہانی میں بذریعہ دوش کین (ایری گیٹر) یا سپری سرنج (Spray Sringe) داخل کیا جاتا ہے، اس سلسلہ میں پشٹکڑی ایک چٹکی ایک پائینٹ پانی میں ملا کر یا خالی نیم گرم پانی صرف گنگنا منک ملا ہو پانی بھی اچھا ہوتا ہے، اور اس سے حمل کا امکان کم ہو جاتا ہے۔

دوش کرنے کا طریقہ :- دوش کین کو بدن سے چار فٹ اونچا رکھو اور خود نیم لیٹنے کی پوزیشن میں بیٹھو، تقریباً تین انچ ویجاہیل فزل کو اندام نہانی میں داخل کرو، پھر پوری ٹونٹی کھول دو، جب دوش کین کا تمام پانی ختم ہو جائے تو ٹونٹی کو باہر نکال لو، دوش کے لئے محلول ہمیشہ نیم گرم ہونا چاہیے اور دوش کین اور ٹونٹی استعمال سے پہلے اور بعد خوب اچھی طرح گرم پانی سے دھو کر رکھنا چاہیے۔
 اس سلسلہ میں اگر سپری سرنج (Spray Sringe) استعمال کرنی ہو تو لیٹ کر، بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر نوزل کو جس میں کئی سو رانچ ہوتے

ہیں۔ اندام نہانی میں داخل کر کے بلب کو دبانا اور چھوڑنا چاہیے۔
 اس پچکاری کے لئے کسی علیحدہ جگہ کی ضرورت نہیں، بستر پر لیٹے ہوئے اس پچکاری سے دوش کیا جاسکتا ہے اور بستر پر پانی کی ایک بوند بھی نہیں جاتی نیز ملاپ کے بعد جس آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں بھی رکاوٹ نہیں پڑتی، دوش کرتے وقت اس بات سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ نوزل کے ذریعے پانی اتنے زور سے نہ جائے کہ بچہ دانی میں داخل ہو جائے، اس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے۔
 اس سلسلہ میں دیئے گئے سپرے سرخ اور ایری گیٹر اور ربر کے آلات وغیرہ "میسرز سکھدائیک ملٹانی دواخانہ (رجسٹرڈ) پانی پت (ہریانہ) انڈیا سے براہ راست منگوائے جاسکتے ہیں۔

آلات (مرد کے لئے)

ربر کا غلاف پہلے پہل ملک فرانس میں ایجاد ہوا تھا، اس لئے اس کا نام فرینچ لیڈر ہے اب یہ حمل کو روکنے اور سوزاک و آتشک سے بچاؤ کے لئے دنیا کے ہر حصے میں استعمال کیا جا رہا ہے، یہ مختلف موٹائی کا ہوتا ہے اور عام طور پر دو قسم کے ملتے ہیں :-
 ۱۔ مرد کے تمام اعضائے تناسل کو ڈھانپ لیتا ہے۔ ۲۔ صرف حشفہ پر ٹوپی کی طرح چڑھا لیا جاتا ہے۔ اس کو امریکن ٹپ (American Tip) کہتے ہیں۔ فرینچ لیڈر (French Leater) کے استعمال کرنے میں بعض ماہر جنیات اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ملاپ کے وقت دھک اور رگڑ سے ربر کے پھٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے، مگر آج کل نہایت عمدہ ربر کے بنے ہوئے غلاف ملتے ہیں جو اس اعتراض سے بڑا ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ ویرج عورت کی اندام نہانی میں جذب نہیں ہوتا، اس لئے عورت کی صحت پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ربر خواہ کتنا ہی باریک اور ملائم ہو، پھر بھی زنانہ اور مردانہ آلات تناسل کے درمیان ایک پردہ ضرور حائل ہو جاتا ہے۔ اور اس وجہ سے بعض مردوں کو افشار میں کمی ہو جاتی ہے۔ اگر ملاپ کے بعد فرینچ لیڈر کو اچھی طرح دھو کر چاک پوڈر لگا کر رکھا جائے تو موٹے فرینچ لیڈر کو کئی بار استعمال میں لاسکتے ہیں۔ لیکن تپتے فرینچ لیڈر کو استعمال کے بعد پھینک دینا چاہیے۔ باریک ربر سے بنا ہوا فرینچ لیڈر کبھی کبھی پھٹ جاتا ہے۔ اس لئے مضبوط ربر کا بنا ہوا فرینچ لیڈر استعمال میں لانا چاہیے۔ جو دگنی لمبائی تک کھینچنے سے نہ پھٹے۔
 نیز فرینچ لیڈر ایسا استعمال کرنا چاہیے جس کے آگے کے حصے میں ویرج خارج ہونے کے لئے ایک گھنٹڑی سی لگی رہتی ہے، اس کو استعمال کے وقت چھلے کی طرح بنا کر اس کے کھلے سرے کو عضو تناسل کے اگلے حصے پر لگا کر اوپر چڑھانا چاہیے، جس سے سارا عضو تناسل ڈھک جاتا ہے نوکیلے اور ٹوٹی دار فرینچ لیڈر کے آگے جگہ خالی رہتی ہے۔ اور جب عضو تناسل پر چڑھایا جائے تب آگے کی طرف آدھا پنچ جگہ خالی ہونا چاہیے تاکہ ویرج کا اخراج ہونے پر ویرج اس حصے میں رہ جائے جب یہ جگہ خالی نہیں چھوڑی جائے گی تب ویرج بوقت انزال اچھل کر نکلنے سے غلاف پھٹ جائے گا اور آگے کوئی جگہ نہ ملنے سے کئی دفعہ ویرج کی کچھ مقدار آلہ تناسل کے راستوں میں رہ جاتی ہے اور باعث خراش و زخم ہو کر پیشاب میں جلن اور سوزاک ہو جاتا ہے، امریکن ٹپ کے استعمال سے فائدے اور نقصان فرینچ لیڈر جیسے ہیں، امریکن ٹپ کا فرینچ لیڈر سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ فرینچ لیڈر کے استعمال سے مرد کے عضو تناسل کا کوئی حصہ مہبل (ویجائنا) (Vagina) سے رگڑ نہیں کھاتا، لیکن امریکن ٹپ کے اگلے حصے کو چھوڑ کر باقی عضو تناسل کا اندام نہانی کے تنقوؤں سے ملاپ ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک بھاری نقص یہ ہے کہ اگر یہ ٹپ اندام نہانی میں رہ جائے تو برقعہ کنٹرول کا مقصد پورا نہیں ہوتا اور بچہ دانی میں داخل ہو جائے تو عورت کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اس لئے اسے بہت کم استعمال میں لایا جاتا ہے۔
 آج کل پر یوار کلیان کے لئے "زودھ" کا استعمال کیا جا رہا ہے جو تجربہ میں کافی مفید ثابت ہو رہا ہے۔ ہر بار نیا ہی استعمال کرنا چاہیے۔

آلات (عورت کے لئے)

یہ موٹے ربڑ کی ٹوپی سی ہوتی ہے۔ اس کے کنارے پر چھلا بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب دباؤ تو دہرا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ریشمی دھاگا بندھا ہوتا ہے۔ چیک پیسری تین ناپ کی ملتی ہیں، بڑے ناپ کی، درمیانہ اور چھوٹے ناپ کی۔ عورت کے رحم کے منہ پر ربڑ کی یہ ٹوپی لگا دینے سے آدمی کا ویرج بچہ دانی کے اندر نہیں جاسکتا اور یہ پیسری کے اندر ہی رہ جاتا ہے۔ اس کا کنارہ ٹھوس ربڑ کا ہونے کی وجہ سے رحم کی گردن میں کس کر آ جاتا ہے، درمیان میں پتلا وکھو کھلا اور خالی رہتا ہے، جو بچہ دانی کے منہ کو ڈھک دیتا ہے، درمیان کا حصہ گنبد دار یا گہرا رہتا ہے، کیونکہ خاص — ملاپ کے وقت عضو تناسل کے اگلے حصہ کے دباؤ سے بھٹ نہ جائے۔ چیک پیسری چھوٹی یا بڑی ناپ کی کئی طرح کی ہوتی ہے، عموماً چیک پیسری تین طرح کی ہوتی ہے :-

۱۔ اُن عورتوں کے لئے جن کی اولاد ابھی نہ ہوئی ہو۔

۲۔ اُن کے لئے ٹھیک ہوتی ہے، جن کے کچھ بچے ہو چکے ہوں۔

۳۔ اُن عورتوں کے کام آتی ہے، جن کے زیادہ اولاد ہونے کی وجہ سے بچہ دانی کا منہ کافی بڑھ گیا ہو۔

بعض دفعہ ان عورتوں کے لئے بھی جن کے ایک یا دو بچے والی ماؤں کے لئے عام طور پر وزوں ہے، اور بڑا سائز تو فڈ اور عورتوں کے لئے جن کے ہاں کئی بچے ہو چکے ہوں مناسب ہے، نیز پیسری لگانے کے بعد جانبین کو اس کے وجود کا احساس مطلق نہیں ہوتا۔ ترکیب استعمال :- عورت زمین پر اکڑوں بیٹھ کر کچھ کچھ جھک کر مقوڑی مشق سے اس کو خود لگا لیتی ہے، پیسری میں ایک فیٹہ اس کو نکالنے کے لئے لگا رہتا ہے، اس فیٹے سے پیسری کو کھینچنے سے بچہ دانی بچنے کو جھک جاتی ہے اور نقصان پہنچتا ہے، بہر حال انگلیوں کی مدد سے پیسری آسانی سے نکل آتی ہے کچھ عورتیں ماہواری کے دنوں کو چھوڑ کر باقی دنوں میں برابر لگائے رہتی ہیں، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بچہ دانی سے جو مادہ جاری ہوتا رہتا ہے، اس کے رُک جانے سے کئی تکالیف پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور کئی دنوں تک برابر لگے رہنے سے ربڑ میں کئی سوراخ ہو جاتے ہیں۔ بہر حال — ملاپ سے کچھ دیر ہی پہلے پیسری لگانی چاہیے، اور دوسرے دن صبح نہاتے وقت نکال دینی چاہیے۔

اگر کئی دن ہی لگانا ہو تو ۲۴ گھنٹے میں ایک بار نکال کر اس کو دھو ڈالنا چاہیے اور صاف کر لینا چاہیے، پھر دو تین گھنٹے بعد لگالیں۔ لگانے سے پہلے باہر اور اندر کی طاقت کی "کوئین مریم" لگالیں تو چڑھانے میں آسانی رہتی ہے، پیسری نکالنے سے پہلے اور بعد کوئی "انڈام نہانی" کو کسی ویرج کے کیڑے مارنے والی دوائی کے پانی سے ضرور دھو لینا چاہیے۔ جس سے انڈام نہانی کے اندر ویرج کے کیڑے نہ رہنے پائیں، یہ کیڑے دس دن تک زندہ پائے گئے ہیں۔ اس سلسلہ میں عمدہ صابن اور گرم پانی ملا کر ڈوش کے ساتھ انڈام نہانی کو صاف کر دینا چاہیے، پیسری کو نکال کر صاف رکھنا اور جب ضرورت نہ ہو تو چاک پوڈر میں حفاظت اور صفائی سے رکھنا ضروری ہے، اگر حفاظت سے رکھا جائے تو پیسری سال بھر کام دے سکتی ہے۔

اگر دھونے میں کوئی تکلیف ہو تو نیم کایتل یا اور دوائیوں سے بنا تیل کو اسفنج یا صاف کپڑے، صاف روئی یا لٹنٹ میں لگا کر اس سے یوٹی کو پونچھ دینا چاہیے، ملاپ سے پہلے چیک پیسری کے ساتھ ساتھ اگر برتھ کنٹرول مریم وغیرہ لگا کر صاف اور ملائم کپڑے، صاف روئی یا اسفنج انڈام نہانی میں رکھ دیا جائے تو اور بھی اچھا ہے، ایسی حالت میں پوری کامیابی ملتی ہے۔

بعض ماہر جنیات ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ زیادہ محنت کھانے یا چھینکنے سے یہ پیسری اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے، اس لئے

اس سلسلہ میں مندرجہ بالا ہدایتوں پر سختی سے عمل کرنا چاہیے تاکہ برتھ کنٹرول کا مکمل طور پر مقصد پورا ہو سکے۔
نوٹ:- برتھ کنٹرول کے لئے عورتوں کے استعمال میں لانے والے دیگر آلات مثلاً دھات کی ٹوپی، دھات کے
بن، گرافین برگ رنگ وغیرہ کا علم بھی ہمیں ہے، لیکن ان کے فائدے کم ہیں اور نقصان زیادہ ہیں، اس لئے ان کا اندراج
ہم مناسب نہیں سمجھتے۔

تیل برائے برتھ کنٹرول:- تیل کے استعمال کا طریقہ بہت آسان اور سستا ہے اور غریب عورتیں بھی آسانی سے استعمال کر
سکتی ہیں۔ تیل کے استعمال کا سب سے اچھا طریقہ اسفنج کے ساتھ ہے، روئی یا کپڑے کا ٹکڑا اسفنج کی مانند تیار کر کے تیل میں بھگو کر پھوڑ
لیں۔ اور استعمال کریں۔ تیل بھی منی کے کیڑوں کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تیل کے استعمال میں کسی قسم کی شکل درمیان
نہیں آتی اور نہ ہی کسی لیڈی ڈاکٹر سے صلاح مشورہ کی ضرورت ہے، نقصان دہ نہیں، عورت کو اس کے استعمال سے کسی قسم کی نفسیاتی یا جسمانی
تکلیف نہیں ہوتی، مندرجہ ذیل تیل بغیر کسی ڈر کے استعمال کئے جاسکتے ہیں:-

۱۔ زیتون کا تیل	(Olive oil)	۲۔ تیل کا تیل	(Til oil)
۳۔ بنوے کا تیل	(Cotten seed oil)	۴۔ نیم کا تیل	(Neem oil)
۵۔ کافور نیم کا تیل	(Camphor Ated Neem oil)	۶۔ سیولائن آئل	(Mellowline oil)
۷۔ سپرمول آئل	(Sprmol oil)	۸۔ کونین ملا تیل	(Quininmixed oil)
۹۔ روغن بادام	(Alamond oil)	۱۰۔ بنا سستی گھی	(Vagetable Ghee)
۱۱۔ گھی دیسی	(Ghee)	۱۲۔ کیسٹر آئل	(Costor oil)

یہ سب تیل اسفنج اور گالے کے ساتھ استعمال کئے جاتے ہیں۔ ان میں جراثیم مارنے کی اتنی اہلیت نہیں ہے، یہ حیوانات کو بے حیل کر دیتے
ہیں، ملاپ کے وقت ان تیلوں کو استعمال کرتے وقت کسی قسم کی بدبو نہیں آتی اور ان کی موجودگی طبیعت کو بد مزہ نہیں کرتی۔
بازار کے تیلوں میں نیم کا تیل سب سے اچھا ہے، کیونکہ اس میں منی کے کیڑے ہلاک کرنے والی طانت ہے، بنوے کا تیل بھی اچھا ہے
سرسوں کا تیل دیہاتی عورتیں استعمال کرتی ہیں، لیکن اس میں نقص یہ ہے کہ یہ حیل پیدا کرتا ہے، ہماری رائے میں کوئی بھی تیل اس مقصد کے
لئے کارآمد ہو سکتا ہے۔

برتھ کنٹرول کے لئے ٹوپ کا استعمال

بچہ دانی (یوٹرس) - (Uterhs) کے اندر رکھے جانے والا جدید ترین آلہ ٹوپ پلاسٹک کا بنا ہوتا اور انٹریزی کے ڈبل لفظ ایس (S)
کی شکل کا ایک چھلا ہوتا ہے، جس کے ساتھ ایک ڈوری بھی بندھی ہوتی ہے۔ ٹوپ کو لیڈی ڈاکٹر کے ذریعے ایک خاص نی کی طرح بنے اوزار
کے ذریعے بچہ دانی میں بٹھا دیا جاتا ہے اور ایک بار بٹھانے کے بعد کئی سال تک اپنی جگہ پر فٹ رہتا ہے، یعنی مرد عورت جتنے سال چاہیں اسے
تمام رکھ کر برتھ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور جب اولاد کی ضرورت سمجھیں، اسے نکالوا کر اولاد حاصل کر سکتے ہیں۔

تجربات کے مطابق ٹوپ ماسوائے چند حالتوں میں یعنی جب عورت کی دو بچہ دانی ہوں یا ٹوپ اپنی جگہ سے اتر جائے تب ہی حمل قرار
سکتا ہے۔ ورنہ سو فیصدی کامیاب طریقہ ہے۔

ٹوپ فٹ کرنے میں صرف پانچ منٹ لگتے ہیں، عورت کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کسی کسی عورت کو اس کے لگانے سے معمولی خون آتا ہے

وہ عام علاج یا آرام سے لیٹنے اور ملاپ سے پرہیز کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔

ٹوپ فٹ ہو جانے کے بعد مرد و عورت کو ملاپ میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ بعض عورتوں میں کچھ دن کمر میں بوجھ یا درد محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کچھ عورتوں کو ٹوپ فٹ کرنے کے بعد خود بخود باہر نکل آتا ہے۔ ایسی حالت میں اسے دوبارہ فٹ کرانا چاہیئے۔

بچہ دانی کے کچھ امراض یعنی لیکوریا، کثرتِ ایام، ایام کے دنوں میں یا بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد ٹوپ فٹ کرانا مضر صحت ہے۔ باقی حالات میں بھی جب بار بار کثرتِ ایام کا عارضہ ہو تو اسے نکلو ادینا ہی بہتر ہے۔ اس بارے میں ابھی تحقیقات کی جا رہی ہے کہ بچہ دانی میں فٹ ہو جانے کے بعد یہ کس طرح حمل سے بچاؤ کرتا ہے، کیونکہ یہ نہ تو ویرج کے کیڑوں کو روکتا ہے اور نہ عورت کے انڈے کو بننے میں رکاوٹ ڈالتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بچہ دانی میں فٹ ہو جانے کے بعد کچھ ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ عورت کا انڈہ پھوٹ جاتا ہے اور وہ حمل ٹھہرانے کے قابل نہیں رہتا۔

ٹوپ کے فائدوں سے متاثر ہو کر بھارت، اور پڑوسی دیشوں کی سرکاروں نے عوام میں ٹوپ لگوانے کا اندولن چلایا ہوا ہے، دنیا کے اور بھی کئی دیشوں میں یہ طریقہ دن بدن ترقی کر رہا ہے، ہندوستان میں اب چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی فیمیلی پلاننگ سنٹر قائم کئے گئے ہیں اور سرکار کی طرف سے ٹوپ مفت لگائے جانے کا انتظام ہے۔ ایک ٹوپ کی قیمت صرف پندرہ پیسے کے لگ بھگ ہے۔ اب تو بھارت میں اس کی تیاری کے لئے ایک کارخانہ کھول دیا گیا ہے۔

ٹوپ کے متعلق ہمارا نظریہ یہ ہے کہ برتھ کنٹرول کے دوسرے طریقوں سے یہ طریقہ زیادہ آسان ہے، چونکہ اسے لیڈی ڈاکٹر فٹ کرتی ہے، اس لئے اگر بچہ دانی میں اس سے کوئی بھی نقص معلوم ہو تو انہیں کے مشورہ سے دور کیا جاسکتا ہے۔

برتھ کنٹرول کے سائنٹیفک نسخے

۱۔ پھسکڑی مرکب پیٹ

سفید ویزلین (White Vaseline)	۵ حصہ
لینولین (Lenoline)	۱/۲
کونین گولیاں	۳
کوکو بٹر	۱/۲ پونڈ
بورکس (Borax)	۵ ڈرام
سیلیک اسڈ (Salicylic Acid)	۱
کونین بائی سلفیٹ (Quinine Bisulphate)	۱/۲

پھسکڑی (Alum)	۲۰ حصہ
نشاستہ (Starch)	۲۰
شہد یا گلیسرین (Honey or Glacerine)	۸۰
۲۔ بڑھیا پیٹ	
کونین ہائیڈروم (Quinine Hydrochloride)	۱/۲

لو کو کمھن کو پہلے آگ پر پگھلاؤ، پھر اس میں سب دوائیوں کو ڈال کر کڑی کی کڑھی سے ہلاتے رہیں، جب خوب مل جائے، تب ٹھنڈی جگہ پر برتن کو رکھ کر کڑھی سے ہلاتے جائیں۔ اس سے دوا بہت جلد ٹھنڈی ہو جائے گی، سخت ہونے پر تیس گولیاں برابر بنالیں، پھر ان کا استعمال کریں۔ یہ گولیاں آسانی سے بن جاتی ہیں اور کم قیمت میں پڑتی ہیں۔

آیور ویدک و یونانی ادویات

قدیم تاریخ گواہ ہے کہ ہندوستان میں پرانے وقتوں میں بھی ضمیمہ تولید (برتھ کنٹرول) کے لئے ہندوستانی طریقہ علاج کے مطابق برتھ کنٹرول

کے متعلق ہدایات پر عمل کیا جاتا تھا۔ وہ طریقے یا ہدایات گو آج کل کے زمانے سے مختلف تھے، لیکن قدیم ماہرین طب جو بھی طریقے استعمال کرنے لگے، وہ مستند اور کامیاب تھے اور جو دوائیں وہ استعمال میں لایا کرتے تھے، ان ادویات کی بالتفصیل معلومات مندرجہ ذیل ہیں۔ ان میں سے کئی نسخے ہمارے اپنے آزمودہ ہیں جو تجربات پر پورے اترے ہیں، امید ہے کہ ضرورت منداظرین استعمال کر کے فائدہ اٹھائیں گے۔

۱۔ چترک کی جڑ کا سفوف ایک تولہ، کالی مرچ دو ماشہ، سبھاگہ بریاں دو ماشہ، بلدی ایک ماشہ۔

ترکیب استعمال :- ان ادویات کو لے کر کوٹ پیس کر اور چھان کر سفوف بنالیں، پھر اس کی ۱۶ خوراکیں کریں، اور جس دن سے ایام جاری ہو، اُسی دن سے ایک ایک خوراک صبح و شام نازہ پانی سے لے لیا کریں، آٹھ دن لگاتار استعمال کریں، اس سے حمل نہیں ٹھہرے گا۔

۲۔ چنبیہ کے جتنے پتوں کو رات کو پانی میں بھگو کر صبح اسی پانی سے ان پتوں کو گھوٹ کر ماہواری کے دنوں میں عورت پی لے تو اُن تین سال تک عورت حاملہ نہ ہوگی۔

۳۔ ہاتھی کی لپدے کر اس کا رس ایک تولہ نچوڑ لیں، اس میں ایک تولہ شہد خالص ملا کر صبح پی لیں، اسی طرح سات دن لگاتار استعمال کریں، اس سے عورت حاملہ نہ ہوگی، کمزور عورتوں کو نصف خوراک استعمال کرنی چاہیئے۔

۴۔ جانفل کو پیس کر تین سال کے پُرانے گڑ کے ساتھ ایام کے دنوں میں استعمال کرنے سے عورت حمل قبول نہیں کرتی۔

۵۔ کایا پھل کی چھال کا سفوف، ناگ کیسز کچور، چھوٹی ہرڑ، کلونجی، کالا زیرہ ہر ایک برابر وزن لیں، ان کو کوٹ پیس کر اور چھان کر پانی کی مدد سے جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنائیں۔ ایک گولی ہر روز صبح دودھ سے سات دن تک لیں۔ اس سے حمل نہ ہوگا۔

۶۔ پلاس کے بیجوں کو پیس کر خالص گھی اور شہد ملا کر تہی بنا کر یونی میں رکھنے سے حمل نہیں ٹھہرتا ہے۔

۷۔ ہاتھی کی تازہ لید میں روٹی کو بھگو لیں اور شاذ بنا کر ایام بند ہونے سے کچھ دن بعد تک برابر اندام نہانی میں رکھیں، حمل نہیں ہوگا۔

۸۔ بنوے اور نیم کا تیل برابر وزن لے کر اس میں روٹی کو بھگو لیں اور ملاپ سے پہلے اندام نہانی میں رکھ دیں۔ حمل نہیں ٹھہرے گا۔

۹۔ چوہے کی سنگنی شہد میں ملا کر شاذ بنالیں اور اندام نہانی میں رکھیں، حمل کو روکتی ہے۔

۱۰۔ عورت کو بعد فراغت حیض کھونچی شدہ ایک عدد دکھلانے سے ایک سال تک حمل نہیں ہوتا ہے۔

۱۱۔ حیض سے فراغت کے بعد چار ماشہ بلدی روزانہ صبح نازہ پانی سے ایک ہفتہ تک استعمال کرانا منع حمل ہے۔

۱۲۔ عضو مخصوص پر میٹھا تیل یا کیبٹر آیل اچھی طرح لگا کر ملاپ کرنا منع حمل ہے۔

۱۳۔ نیم کی نمولی شدہ ایک دکھلانے سے ایک سال، دو دکھلانے سے دو سال تک حمل قرار نہیں پاتا۔

۱۴۔ کانچ اور ہاتھی کی لپد کا استعمال منع حمل ہے۔

۱۵۔ منخرنم ارند شدہ سالم ایک عدد دکھلانے سے ایک سال اور دو سے دو سال تک حمل قرار نہیں پاتا۔

۱۶۔ سرسہ سفید کو بھڑکے دودھ میں دو روز کھل کریں اور دو پیالوں میں بند کر کے دس بارہ سیراپلوں کی آبخ دیں، ٹھنڈا ہونے پر بارک پیس کر رکھیں، ماہواری ختم ہونے کے بعد ایک رتی کی مقدار میں روزانہ چار یا پنج دن کھلائیں، اس سے حمل قرار نہیں پاتا ہے۔

اس طرح کے آپور ویدک اور یونانی مستند طبی کتب میں بہت سے نسخے دیے گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ ہمارے اپنے آزمودہ ہیں، ان نسخوں کو بنانے کے لئے جو جو ادویات لکھی گئی ہیں، وہ نازہ اور اصلی ہونی چاہئیں اور ان کا وزن بھی ٹھیک ہو!

جدید طبی تجربات سے ثابت ہو چکا ہے کہ انسانی غذا کے مختلف اجزاء میں، ان اجزاء کو دھامنے سے بی، سی، ڈی اور ای وغیرہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اگر انسانی خوراک میں ان میں

بہر تھ کنٹرول بذریعہ خوراک :-

سے کسی خاص جزو کا استعمال بند کر دیا جائے تو جسمانی اعضاء اپنا فعل انجام نہیں دے سکتے۔ مثلاً — وٹامن "بی" انسان کو نہ ملے تو مرض بیری بیری پیدا ہوتا ہے۔ اگر وٹامن "سی" کی خوراک میں کمی ہو جائے تو مرض سکروڈی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ حیاتین (وٹامنز) تازہ سبز یوں اور پھلوں میں پائی جاتی ہیں۔ اس طرح وٹامن "ای" کی غیر موجودگی میں حویات منویہ پیدا نہیں ہوتے، وٹامن "ای" کی عدم موجودگی سے اگرچہ عورتوں میں انڈے کی پیدائش پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن حمل دیر پا نہیں ہوتا۔ اور نطفہ رحم کے اندر فنا ہو کر جذب ہو جاتا ہے۔ اس لئے ماہرین طب نے عورت میں وٹامن "ای" کی کمی کو برتھ کنٹرول کے لئے مفید بتایا ہے۔

نیز وٹامن "ای" گوشت کے سرخ ریشوں، سبز یوں کے بیجوں، پتوں اور بعض خوردنی اجناس مثلاً جو یا گندم میں بکثرت پایا جاتا ہے گیہوں کا سفید آٹا بناتے وقت یہ جزو خارج ہو جاتا ہے۔ دودھ، مچھلی کے تیل، شکر، چائے، مکھن، بسکٹ، ایک وغیرہ میں یہ وٹامن کم مقدار میں پائی جاتی ہے۔ یہ چیزیں زیادہ تر امیر طبقہ ہی استعمال کرتا ہے اور عام طور پر وہ ہی اولاد کے لئے ترستے رہتے ہیں۔ برخلاف اس کے غریب طبقے میں اولاد کی زیادتی کے تباہ کن اثرات زیادہ تر دیکھے جاتے ہیں۔

برتھ کنٹرول بذریعہ آپریشن

اس آپریشن سے ویرج کے کپڑے یا انڈے کے راتے مسدود ہو جاتے ہیں۔ مردوں میں وہ نالیاں جن کے ذریعے سے مادہ تولید خُصیوں میں سے بن کر نائیزہ میں جاتا ہے اور عورت کی قاذف نالیوں کو کس کر باندھ دینے سے یہ مطلب حاصل ہوتا ہے۔

آپریشن کے ذریعہ مردوں کو بانجھ کر دینے کا یہ طریقہ اس طرح ہے کہ مردوں میں واس ڈیفیرنس (Vas Deference) کو دونوں طرف سے ایک یا دو انچ کے لگ بھگ کاٹ دیا جاتا ہے اور پھر اس پریٹیک کارڈ کو گھماؤ سے کھینچ لیا جاتا ہے۔ پھر واس ڈیفیرنس کو انگ کر کے ایک دوسرے سے ایک دو انچ کے فاصلے پر باندھ دیا جاتا ہے۔ اور درمیان کے حصہ کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس آپریشن میں ساری نالیوں اور نازک سچوں کو پوری احتیاط سے بچایا جاتا ہے، کیونکہ ان کے ذرا سے کٹ جانے سے فوطوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔

مردوں کو بانجھ بنانے کا یہ ایک آسان اور بے ضرر طریقہ ہے، جس سے ان کی تندرستی جنسی خواہش یا ملاپ کے طبی ڈھنگ میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی کوئی کمی ہوتی ہے۔ عورتوں کو بانجھ بنانے کا سب سے بڑھیا طریقہ یہ ہے کہ عورت کی دونوں فلیو مین ٹیوب کو ایک یا دو جگہ سے کاٹ کر باندھا جاتا ہے، جس سے بچہ دانی سے لے کر انڈہ کی تھیلی تک کا راستہ بند ہو جاتا ہے، جس سے انڈہ بچہ دانی تک نہیں جاسکتا اور نہ ہی منی کے کپڑے عورت کے نڈے تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ آپریشن ایک قابل سرحن ہی کر سکتا ہے۔ اس آپریشن سے ان کی تندرستی، صحت یا فطری جنسی ملاپ پر کوئی برا اثر نہیں ہوتا، ورنہ ہواری ایام بھی ٹھیک سے آتا رہتا ہے۔

عورت کے رحم یعنی بچہ دانی میں انڈہ لانے والی نالی (قاذف نالی) کو کٹا دینا پریٹ روکنے کے لئے سب سے زیادہ آسان اور پکا ڈھنگ ہے، جو سو فیصدی یقینی ہے۔ بعض عورتیں خُصۃ الرحم (اوریز) کو عمل جراحی سے نکلوا ڈالتی ہیں، لیکن دونوں خُصۃ الرحم کو نکلوانے سے عورتوں کے جسم پر موٹاپا آ جاتا ہے، قدرتی جذبات منفقود ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے زنانہ خُصائل جاتے رہتے ہیں اور زنانہ پن باقی نہیں رہتا جس کی وجہ سے — ایسی عورتوں کو تمام عمر اوویرین ہارمون کے ٹیکے لگوانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اس لئے دونوں خُصۃ الرحم کو نکلوانے سے سختی سے انکار کر دینا چاہیے۔

برتھ کنٹرول بذریعہ انجکشن

شوہر یا بیوی کو کچھ خاص ادویات کے ٹیکے لگا کر عارضی یا دائمی طور پر بانجھ بنا دیا جاتا ہے، غیر مالک میں ماہرین جنیات کافی دیر سے تجرباً

کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کامیابی نصیب نہیں ہوئی، اسی طرح ہارمونز، ریڈیم سے، انیس سے سے بھی برقعہ کنٹرول کیا جاتا ہے۔ لیکن اس بارے ابھی مزید کھوج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب تک تجربات مکمل نہ ہو جائیں۔ ان طریقوں کو تسلی بخش قرار نہیں دیا جاسکتا۔

ضبط تولید (برقعہ کنٹرول) کے لئے ہماری طرف سے بالتفصیل روشنی ڈالی گئی ہے، ناظرین ان طریقوں کو اپنے فائدوں کے لئے چنیں، ضرورت کے وقت اپنی گھریلو حالت اور اپنے مزاج کے مطابق ان کا چناؤ کیا جاسکتا ہے، امیر، غریب، دیہاتی و شہری سب بھائیوں کے لئے کم خرچ اور نہایت ہی مفید طریقے بتائے گئے ہیں، پھر بھی اگر ناظرین کوئی مشورہ حاصل کرنا چاہیں تو ہم ہر وقت حاضر ہیں۔

فیمیسی پلاننگ کے متعلق یہاں مختصر معلومات دی گئی ہیں۔ مفصل معلومات کے لئے ہماری مشہور و معروف تصنیف "سائنٹیفک برقعہ کنٹرول" (بالصویر) اردو یا ہندی کا مطالعہ کریں، قیمت روپے محصول اک علاوہ ہے، اور منیجرز لاجوگی پبلیکیشنز یانی پت سے منگائی جاسکتی ہے۔

زنانہ امراض کی جانچ کے لئے ماڈرن طریقے

ہر ایک عورت جو کسی معالج وید، حکیم، ڈاکٹر کے پاس آتی ہے، یہ چاہتی ہے کہ معالج اُن کی تکلیف سے متعلق ٹھیک ٹھیک جان لے اور مناسب علاج تجویز کر کے جلدی اچھا کر دے، معالج بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے مریض کی حالت کی پوری معلومات حاصل کرے، عورت کے مرض کا ٹھیک ٹھیک علاج کرنے کے لئے معالج کو واقف عورت کی موجودگی میں یا اگر وہ خود لیڈی وید، حکیم یا ڈاکٹر ہے کو اکیلے بھی اُسے مریضہ کی کہانی سن لینی چاہیے۔ مریضہ کو پوری آزادی اس بات کی ہونی چاہیے، کہ وہ اپنی تکلیف مکمل طور پر بیان کر سکے۔

عام طور پر نام، عمر، پتہ، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ، اولاد، مرض کتنے عرصہ سے ہے؟ پھر ایام کے بارے میں دریافت کرنا چاہیے کہ کتنی عمر میں شروع ہوا۔ جاری ہونے سے پہلے تناؤ یا درد ہوتا ہے یا نہیں، اگر درد ہوتا ہے تو اُسے کب آرام ملتا ہے، مہل کے راستہ میں درد یا سوجن یا خارش وغیرہ۔ ایام کی مقدار، رنگ۔ اس کے بعد اُس سے بچہ پیدا ہونے سے متعلق معلومات حاصل کرنی چاہئیں۔

پہلا بچہ کب ہوا، اگر ابھی حمل گرا ہے تو کب، کن حالات میں ایسا ہوا، حمل کے دوران میں اگر عورت کو کوئی تکلیف ہو تو اس کی معلومات حاصل کریں، موجودہ تکلیف سے مندرجہ ذیل معلومات کی جانی چاہئیں:-

- ۱۔ موجودہ تکلیف کب اور کیسے شروع ہوئی؟ ۲۔ اب اُس کی کیا حالت ہے؟ ۳۔ مرض کی وجہ کیا ہے؟ ۴۔ مریضہ کا ٹیپر بچہ کتنا ہے؟
- ۵۔ اُس کا بلڈ پریشر کتنا ہے؟ ۶۔ مریضہ کا جسم بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے؟ ۷۔ بچہ دانی کے راستہ، بچہ دانی کے اندر یا بچہ دانی کے آس پاس کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ معلوم کرنا چاہیے، مریضہ کے پافانہ، خون، پیشاب و حقوک کی جانچ کرانی چاہیے؟ ۹۔ اگر مریضہ تیار ہو تو سوالات میں یہ بھی دریافت کرنا چاہیے کہ موجودہ تکلیف کے پیچھے کوئی پیچیدہ تکلیف تو وجہ نہیں ہے؟ ۱۰۔ کبھی کبھی عورتیں اصل مرض کو چھپا کر ادھر ادھر سے لپٹا پوتی کرتی ہیں، معالج کا ایمان ہے کہ وہ صحیح حالات کو جاننے کے لئے اپنی طبی کتب کے بیان و سیدیکل تجربہ سے اصل مرض کو جان جائے۔



زنانہ امراض کیلئے یونی کی جانچ

پیٹ کی جانچ:- یہ جانچ عورت کے پیٹ کو چھونے سے اور دبا کر کرنی پڑتی ہے، سردیوں میں معالج کو اپنے ہاتھ گرم کر کے جانچ کرنی چاہیے، جانچ سے پہلے عورت کو

پیشاب و پاخانہ سے فارغ ہو جانا لازمی ہے۔

جاچ کے وقت پیٹ کا نا بھی یا نیچے کا حصہ دبا ہے یا ابھرا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے، حمل، گیس، چربی، پانی میں سے کوئی بھی چیز پیٹ کو اٹھا دیتے ہیں۔ اگر پیٹ ابھرا ہوا ہے تو یہ ابھار کس وجہ سے ہے۔ اس کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ قبض کی وجہ سے پیٹ پھولا ہوا ہے، تو گیس ہوگی۔

پانی کی وجہ سے پیٹ پھولا ہوا ہو تو اس کی نشانیاں ہوں گی، اگر حمل سے پیٹ ابھرا ہوا ہے تو حمل کی علامتیں ہوں گی، چربی کا گیان جسم کے دوسرے اعضاء میں چربی بڑھنے سے ملتا ہے۔

پیٹ کی جاچ میں دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں یا انگلیوں سے سب پیٹ یا پیٹ اور پیڑ کو چھو کر دیکھتے ہیں۔ ہاتھ گرم رہنے چاہئیں۔ عورت کو چپٹ لٹا کر اس کے پاؤں کو گھٹنوں پر سکڑ کر پیٹ کو پیڑ تک نکال کر کے کسی عورت یا نرس یا واقف عورت کی موجودگی میں جاچ کی جانی چاہیے۔

عورت کیا تکلیف بتاتی ہے، اس کے مطابق پیٹ چھونا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ پیٹ میں کہیں درد یا پیڑ آرک کر بتلاتی ہے تو معالج کا فرض ہے کہ وہ درد کی جگہ کو معلوم کر کے فیصلہ کرے کہ اُسے چھو کر بھی دیکھنا چاہیے یا نہیں۔ کبھی انٹرویل میں بھی سخت درد ہوتا ہے۔ اس حالت میں پیٹ کو ذرا بھی نہیں دبا نا چاہیے۔ ورنہ نقصان کا خطرہ ہے، حمل کی حالت میں پیڑ میں ابھار ملتا ہے، کبھی کبھی مشانہ میں پیشاب بھر جانے سے بھی ابھار رہتا ہے۔ ابھار کس وجہ سے ہے، اس کا گیان دیگر علامات سے لگایا جاسکتا ہے، حمل کی حالت میں ایام کا بند ہو جانا، صبح کے وقت آبکائیاں علامات ہوتی ہیں، جب کہ مشانہ کا پیشاب سے بھر جانے کی حالت میں پیشاب کی بندش وغیرہ علامات ملتی ہیں۔

یونی (مہبل) کی جاچ :- یہ جاچ برقم کے آلات برتھ کنٹرول لگانے سے پہلے ضروری ہے۔ یہ جاچ صرف لیڈی ڈاکٹر، لیڈی حکیم یا لیڈی وید کو ہی کرنی چاہیے۔

یونی کی جاچ سے پہلے یونی وادھر ادھر کے حصوں کو اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے اور جاچ کرنے والی لیڈی ڈاکٹر کو اپنے ہاتھوں کو پاچ منٹ تک دھوئے رہ کر صاف ربڑ کے دستانے پہن لینے چاہئیں۔ ایسا کرنے سے عورت کے اعضاء میں باہر سے کوئی جراثیم جانے کا خطرہ نہیں رہتا۔

یونی کی جاچ ایک خاص طبی جاچ میں آتی ہے۔ اسے طب کی تعلیم حاصل کرنے کے دوران میں ہی جولیڈی حکیم، وید و ڈاکٹر اس کی اچھی طرح تربیت پاتی ہے وہ جاچ کے وقت ایک دم درست فیصلہ کر لیتی ہے۔ اس سے ہی اس کا علم پریکٹیکل پورا ہونا چاہیے۔

عورت کے اعضاء تناسل اوپر سے دیکھنے میں کیسے ہیں، لبوں کے آس پاس یا بالوں میں کوئی زخم یا خراش تو نہیں ہے، جب اوپر سے باہر کے اعضاء کی جاچ ہو جائے۔ تب آس پاس صاف تولیہ لگا کر یونی کے دونوں لبوں کو دو انگلیوں سے کھول کر اندر وادھر ادھر کے حصوں کی میڈیکل جاچ کرنی چاہیے، پیشاب کا سوراخ کیسا ہے، لبوں میں کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ بڑے لبوں کے نیچے چھوٹے لب ہوتے ہیں۔ وہیں پر بارفولین گلینڈز کا منہ ایک ایک دونوں طرف ہوتا ہے، اس سے کوئی سیال تو نہیں نکل رہا۔ پیشاب کے راستہ سے پیپ تو نہیں آرہی۔ وہاں سوجن تو نہیں ہے، وہاں کارنگ کیسا ہے۔ یونی کے راستہ پر غیر شادی شدہ لڑکیوں میں ایک پتلی جھلی چڑھی ہوتی ہے، جسے

پرودہ بکارت (ہائمن) کہتے ہیں، وہ پردہ سخت، پٹا ہوا یا کیسا ہے۔ یہ بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ اس جگہ کوئی سیال یا پانی وغیرہ موجود ہو تو اس کا بھی معائنہ کرنا ضروری ہے اور اوپر پیڑ سے لے کر نیچے یونی تک مکمل حصہ ایک نظر میں آ جانا چاہیے۔ یہ سب دیکھ کر

یونی کی جاپنچ کرنی چاہیے۔

یونی کے لبوں کی جاپنچ کی سب سے اچھی حالت ہے۔ مریضہ کو بائیں کروٹ سے سٹاکر اس کے پیروں کو گھٹنوں پر سکوتر دینا، اس سے ایک کنائے سے باہر سے اعضائے تناسل آرام سے دیکھے جاسکتے ہیں۔ اگر عورت کو بائیں کروٹ بٹاکر بایاں ہاتھ پیچھے کی طرف کر دیا جائے، اور سیدھے گھٹنوں کو کھوڑا اور اوپر کھینچ لیا جائے تو اور بھی اچھی طرح سے باہر کے اعضائے تناسل کو دیکھا جاسکتا ہے، پیٹ کے بل لیٹی ہوئی عورت جس کے دونوں گھٹنے سکڑے ہوئے ہوں، آسانی سے لب دیکھنے کے لئے تب تک مفید ثابت نہیں ہوتی جب تک اسے خاص چوڑا نہ کیا جائے۔ آپریشن کے کمرے میں اتانی حالت میں ان اعضاء کو دیکھتے ہیں۔ اس کے لئے ایک مریض دیکھنے کی میز پر مریضہ کو ایسے لٹاتے ہیں کہ اس کے اعضاء میز کے کنائے پر آجائیں۔ اب پریٹ پر جانگھوں کو اور جانگھوں کو پیروں پر سیٹھرتے ہیں۔ پیروں کو دونوں طرف ڈنڈوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ مگر یہ بندھن ملائم رہنے چاہئیں۔ اور دیر تک نہ باندھا جائے۔ اس بات کا دھیان رکھا جائے۔

جاپنچ کے لئے کمرے میں روشنی کا انتظام ٹھیک ہونا چاہیے۔ یونی کی جاپنچ کے لئے سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں سے کوئی سیال تو نہیں نکل رہا۔ یونی ایک گہرا عضو ہے، اسے دیکھنے کے لئے ماڈرن وگیا نکوں نے یونی جاپنچ آلات کا انتظام کیا ہے، ان میں پہلا سمے، دوسرا کیوسکونے اور تیسرا فرگوسن نے ایجاد کیا۔ یونی جاپنچ آلہ کو انگریزی میں پے کیولم کہا جاتا ہے، یونی آلہ کو استعمال کرنے سے پہلے سٹرلائزڈ کر لیا جاتا ہے، ان کا استعمال کرنا ہر ایک لیڈی ڈاکٹر، لیڈی حکیم، لیڈی وید کو اچھی طرح آنا چاہیے۔ ان کی تصاویر کتاب میں ملاحظہ فرمادیں۔ ان تینوں پے کیولموں میں تیسرا پے کیولم بہت اچھا ہے۔ اسے یونی کے سائز کے مطابق چوڑا یا چھوٹا کیا جاسکتا ہے۔ یہ خود ہی یونی میں فکس ہو جاتا ہے۔ اسے کیسے ہی گھما پھرا سکتے ہیں۔ اس کا استعمال اتانی حالت میں عورت کو لٹا کر کیا جاتا ہے۔

یونی جاپنچ کی مدد سے یونی کا جتنا گیان ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ جاننے کے لئے یونی میں داہنے ہاتھ کی انگلی داخل کی جاتی ہے۔ ہاتھ میں ربڑ کا دستانہ شدھ کر کے پہنا جاتا ہے اور ترجبی انگلی کو داخل کرتے ہیں، انگلی پر تیل یا ویزلین چھڑ دیتے ہیں۔

یونی (مہل) کی دیواروں کی جاپنچ پہلے کی جانی چاہیے، یہ دیواریں کتنی چوڑی، سخت، ڈھیلی، گیلی یا ملائم ہیں۔ ان کا پہلے دھیان کرنا چاہیے۔ یونی سے نکلنے والے سیال کا کیا رنگ ہے، وہ سفید، پیلا، لال، ہرا، گلابی، نیلا کیسا ہے، اسے نوٹ کرنا چاہیے۔ اس سیال کی ایک بوند دو تین بوند تک پانی میں ملا کر مائیکروسکوپ کے نیچے دیکھتے ہیں۔ اگر ٹرائی کو مونس و سبائی نیلس نام کا لیٹر اس سیال کو پیدا کرنے والا ہو، تو یہ لیٹر مائیکروسکوپ کے ذریعہ چلتا پھرتا دیکھا جاسکتا ہے۔ پیپ والے سیال کا بھی ٹھیک ٹھیک گیان کر لینا چاہیے۔

یونی میں انگلی داخل کرتے وقت مریضہ سے نیچے کی طرف زور لگوانا چاہیے۔ اس سے اگر پیشاب کرنے پر بھی بوندیں ہوں تو اس کا پتہ لگ جائے گا۔ کھانسنے پر مریضہ کے پیشاب کے سوراخ پر پیشاب کی بوندوں کا آنا بھی اسی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ یونی کی دیوار میں کوئی پھوڑا بن رہا ہے تو اسے بھی چھونے سے پتہ لگایا جاسکتا ہے۔ اگر کوئی چیز باہر سے یونی میں آگئی ہو، تو اس کا بھی پتہ کر لینا چاہیے۔

ترجبی انگلی آہستہ آہستہ یونی میں اوپر تک جانی چاہیے۔ وہاں تک جہاں کہ یونی بچہ دانی کے نچلے حصے کے ساتھ ملتی ہے، کیونکہ بچہ دانی گریو احصہ یونی میں نیچے کی طرف دھنسا رہتا ہے۔ اس سے یونی اور بچہ دانی کی گریو کے درمیان ایک نالی سی بن جاتی ہے، جو آگے اٹھتی ہے گہری اور آزد باز و پیچھے کی بجائے کم گہری ہوتی ہے، ان کے آگے پیچھے اور باشر و چھتر لکاؤں کا نام دیا گیا ہے۔ انگلی داخل کرنے سے پہلے چھتر لکا نیچے کو دھکی اور پھولی ہوئی ہو تو بچہ دانی کے باہر کے حصہ میں سوجن ظاہر کرتا ہے یا وہاں کوئی پھوڑا بن رہا ہوتا ہے۔

انگلی کو پھر بچہ دانی کی دیوار اور بچہ دانی کے باہر کے راستہ تک پھرانا چاہیئے۔ گریو کی حالت کیا ہے؟ سائز کیا ہے؟ سطح کیسی ہے چکنی یا کھردری؟ اگر کھردری ہے تو اوپر تک ہے یا نہیں۔ معاینہ میں یہاں مرض کی سنس کو بھی معلوم کیا جاسکتا ہے۔

بچہ دانی کا پچلا حصہ جو ایکسٹرنل اوس کہلاتا ہے۔ اُن عورتوں میں جنہیں کوئی بچہ نہیں ہوا یا جو بانجھ ہیں، اُن میں یہ بے معلوم یا چھوٹا ہوتا ہے۔ پرنہیں کئی بچے ہو چکے ہوتے ہیں یہ چوڑا ہو جاتا ہے، کسی کسی میں تو انگلی کی نوک تک گھس جاتی ہے۔

بچہ دانی کی گریو سخت ہے یا نرم۔ اُس پر کوئی سخت اُبھارین رہا ہے یا کوئی اور چیز بن رہی ہے، اعضاء کو چھونے سے کیا جاتا ہے، گریو نی تنگ ہو تو صرف ایک ہی انگلی کو اس میں داخل کیا جانا چاہیئے۔

انگلیوں یا انگلی کے یونی میں داخل اور اوپر سے دباؤ سے بچہ دانی کو دونوں ہاتھوں کے بیچ محسوس کیا جاسکتا ہے۔ سب سے پہلے بچہ دانی کی گریو کی حالت کا گیان کرنا چاہیئے، اس کے بعد آگے والی چھتریکا میں انگلی ڈال کر اوپر سے دوسرے ہاتھ سے دبا کر بچہ دانی کے اوپر کے حصہ کا پتہ لگانا چاہیئے۔ اگر ایسا کرنے پر بچہ دانی کی حالت کا پتہ نہ چلے تو سمجھنا چاہیئے کہ وہ پیچھے کی طرف ہو گیا ہے، صرف جب بچہ دانی اپنی قدرتی انٹی ڈرشن حالت میں ہوتا ہے۔ تب ہی اس جا پخ پر اس کا گیان ہوتا ہے۔ اگر وہ پیچھے جھکا ہوگا، تو اس کا چھوٹا محسوس نہیں ہوگا۔ اگر پیچھے سے بچہ دانی کے جسم کا پتہ نہ لگے تو انگلی کو پیچھے والی چھتریکا میں لے جا کر اوپر لے ہاتھ سے دبا کر بچہ دانی کو محسوس کرنا ہوگا۔ اگر بچہ دانی کا منہ پیچھے کی طرف پٹ گیا ہو، تو اس کا ٹھیک ٹھیک گیان عورت کی گد میں انگلی ڈال کر اوپر پیٹ پر دوسرے ہاتھ کا دباؤ دینے سے اُس کا پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ بچہ دانی کے منہ کے پیچھے گدار ہتی ہے۔

کسی کسی موٹے پیٹ والی عورت کی جا پخ میں بچہ دانی کے منہ کے باسے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہے، کیونکہ پیٹ پر چڑھی چربی کی وجہ سے ہاتھ کا دباؤ نہیں پڑ پاتا، جس سے چھونے سے فیصلہ کیا جاسکے، بچہ دانی، گریو، بچہ دانی کے منہ کی جا پخ کر چکنے کے بعد یونی کے اندر والی انگلیوں کو پاشرو دانی چھتریکا میں پہلے بائیں طرف، پھر دائیں طرف داخل کر کے اوپر کے ہاتھ سے پیٹ کو اسی حالت میں دباتے ہیں۔ اس سے بائیں طرف دائیں طرف موجود ڈمب دائیں اور ڈمب دھار کا گیان کرنے کے لئے کوشش کی جاتی ہے، تندرست حالت میں ڈمب دائیں یا فلوپین ٹیوب ہو تو اسے چھونے سے نہیں جانا جاسکتا، اگر اس میں سو جن ہوگی یا پانی یا پیرپ بھرا ہوگا تو ضروری ہے کہ اُس طرف چھونے سے درد کرے گی، جس طرف کی ٹیوب میں خرابی ہوگی، اس طرف ہی وہ درد کرے گی۔ اندہ دانی کا گیان چھوٹے بادل جیسی گانٹھ کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ دبانے سے عورت اسی طرح محسوس کرتی ہے جس طرح انڈکوش دبانے سے مرد محسوس کرتا ہے۔

سو جن کی حالت میں یونی کے اندر آگے اور پیچھے کی چھتریکا دُن میں کسی میں انگلی ڈال کر بچہ دانی کو درست کر کے اوپر کے ہاتھ سے چھو لے ہوئے حصہ کو پیٹ کے اوپر والے ہاتھ سے پکڑ کر ہلاتے ہیں۔ اگر پھولا ہوا حصہ ہلانے سے بچہ دانی یا بچہ دانی کا منہ بھی ہلتا ہے تو سو جن بچہ دانی کے اندر یا اُس سے کہیں ساتھ ہے۔ اگر بچہ دانی اُس کے ساتھ نہ پہلے تو اُس چھو لے ہوئے حصہ کو بچہ دانی کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیئے۔ ایسا مان لینا چاہیئے کہ یہ سو جن اندہ دانی میں ہے یا اُس کے آسن پاس ہے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیئے کہ اگر پیٹ میں ٹیٹ بھری ہے تو دائیں طرف اگر سخت ٹیٹ ہے تو بائیں طرف ایسا معلوم ہوگا کہ دائیں یا بائیں طرف کی اندہ دانی کی نالیوں میں کوئی ٹیومور بن گیا ہے، اس لئے جا پخ سے پہلے انما دے کر پیٹ صاف کر لینا بہت ضروری ہے، اسے کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیئے، جن عورتوں کو برابر قبض رہتی ہے۔ اُن میں یہ جا پخ کافی احتیاط سے کی جانی چاہیئے۔

وہ لڑکیاں جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی۔ اُن کی یونی میں گدا کی جا پخ سے زنانہ اعضاءے تناسل کا گیان :- انگلی ڈال کر جا پخ نہ کرنا ہی مناسب ہے۔ اس

کے لئے اُن کی گڈ میں اُنکلی ڈال کر جانچ کی جاسکتی ہے۔ اُنکلی داخل کرنے کے لئے احتیاطیں وہی کی جائیں جو یونی میں اُنکلی داخل کرنے میں بتائی گئی ہیں۔


گڈ کے راستہ میں اُنکلی داخل کر کے اوپر سے دوسرے ہاتھ سے دبا دبا کر بچہ دانی کے منہ کی حالت یا سائز کا گیان ہو سکتا ہے۔ بچہ دانی کے پچھلے حصہ میں جو خرابیاں ہوتی ہیں، سو جن وغیرہ، اسی جانچ سے معلوم کی جاتی ہیں۔

پیشاب کی تکلیف کی جانچ

عورت کے اعضائے تناسل کے امراض کے گیان کے ساتھ عورت کے پیشاب کی تکلیف کا گیان بھی لیڈی حکیم، وید، ڈاکٹر کے لئے ضروری ہے۔ اس کے لئے سب سے پہلے اُسے پیشاب کے سوراخ کا معائنہ کرنا چاہیئے، اگر وہاں کوئی سیال ہو تو اُسے نوٹ کر لینا چاہیئے۔ وہ جگہ سو جن یا لال ہو گئی ہو تو اُسے بھی نوٹ کر لینا چاہیئے۔ اگر سیال کو جانچ کرنے کے لئے لیبارٹری میں بھیج دیا جائے تو اور بھی اچھا ہے۔ اس کے لئے ایک صاف کا پچ ٹی پر ایک بوڈلے کر پتلا لپیپ کر دیں۔ پھر گنور یا وغیرہ کی جانچ کے لئے رنگ دیتے ہیں۔ یونی میں اس راستہ کے ٹھیک پیچھے اُنکلی لے جا کر اس پر دباؤ ڈال کر سیال نکالنا بھی پڑ سکتا ہے۔ اس سیال سے دیگر امراض کی جانچ بھی کی جاسکتی ہے۔

کیٹھی ٹر کا استعمال

عورت کو جب پیشاب کی بندش ہو تو کیٹھی ٹر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں عورت کو پیٹھ کے بل لٹا کر اُس کے پاؤں کو گھٹنوں پر موڑ دیتے ہیں اور چوڑا کر دیتے ہیں۔ تاکہ یونی کا سب حصہ کھل جائے۔ اب صاف تولیہ سے دوسرے حصہ کو دھک کر لب کھول دیتے ہیں۔ لبوں کو گرم پانی سے صاف روئی سے صاف کرتے ہیں۔ پانی میں ڈیول ڈال کر آگے اور پیچھے سے پونچھتے ہیں۔ بائیں ہاتھ سے لبوں کو کھولے رکھ کر دائیں ہاتھ سے صاف کیٹھی ٹر کو پیشاب کے سوراخ میں داخل کرتے ہیں، کیٹھی ٹر یونی کے کسی حصہ کو نہ چھوئے، اس کا خاص دھیان رکھنا چاہیئے، کیٹھی ٹر مثانہ میں پہنچ جانے پر دھار باندھ کر پیشاب نکلتا ہے۔ جسے ایک صاف بوتل میں بھر کر جانچ کے لئے لیبارٹری میں بھیجتے ہیں۔ کیٹھی ٹر میں ایک دو بوڈل رہ جاتی ہیں۔ اُسے مثانہ میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ اس لئے جانچ کی پیٹی پر رکھ کر لیبارٹری میں اس کا گیان کرنے کے لئے بھیجنا چاہیئے۔



پیشاب کی تکلیف میں سوراخ فرج

(آری فس آف دی ویجاٹنا) کی جانچ

۱۔ ہاتھوں پر ربڑ کے غلاف۔

۲۔ سوراخ فرج (آری فس آف دی ویجاٹنا)

۳۔ مقعد (گڈا)

(مسمیٰ دہتی نقطہ نظر سے جسمانی بناوٹ کے تحت)



شخصیاتِ باب

بچوں کی بیماریاں

چلڈرن ڈیزیزز، (Children Diseases)

حفظانِ صحت :- امراضِ نسواں کے زیرِ عنوان تدابیرِ مولوداً ورنہ بچوں میں عام پیدا ہونے والے امراض کا کچھ ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس جگہ بچوں کی بیماریوں کے متعلق مفصل درج کیا جا رہا ہے۔

ہماری ہمیشہ امر ہے والے محبوب راہنما پنڈت جواہر لال نہرو کے شب و دن میں بچے دلش اور قوم کی بہترین نعمت ہیں۔ وطن، قوم اور نسلوں کی امیدیں ان ہی سے وابستہ ہوتی ہیں۔ اگر بچہ بیمار ہو تو سارا خاندان پریشان اور ویران نظر آتا ہے۔ اس لئے ان کی صحت اور پرورش کے اصولوں پر نہایت سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے سے بچہ اکثر بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔

خوراک :- جب بچہ صرف ماں کے دودھ پر پرورش پاتا ہو تو غذا کی بے قاعدگی یا دودھ پلانے میں بے احتیاطی یا کسی اور پر مہیزی سے مبتلائے مرض ہو جاتا ہے۔ اس لئے بچے کی ماں کی خوراک اور بچے کے دودھ کے اوقات کے متعلق ضرور احتیاط کرنی چاہیے، جب بچے کے دانت نکلنے شروع ہو جائیں تو اسے خستہ بسکٹ یا ڈبل روٹی کے بھنے ہوئے ٹوسٹ یا سیب کے ٹکڑے دینے چاہئیں تاکہ اسے دانت چلانے کا طریقہ آجائے اور دودھ چھڑانے سے بچہ بیمار نہ ہو۔

دودھ چھڑانے کے بعد بچے کو گائے کا دودھ مندرجہ ذیل طریقہ سے بطور غذا دینا چاہیے :-
گائے کا تازہ دودھ لے کر اس میں ایک تہائی پانی ملا کر اسے نرم آگ پر جوش دیں، پھر اس میں بقدر ذائقہ میٹھا ملا کر بچے کو پلائیں۔

جب بچہ دودھ کو ہضم کرنا شروع کر دے تو اسے مونگ کی دال کا پانی، بکرے کے گوشت کا پتلا شوربا، سرخ پکے ہوئے روٹی کے ٹکڑے اور دودھ میں ساگودانہ پکا کر کھلانے کی بتدریج عادت ڈالنی چاہیے۔ کبھی کبھی اسے موسم کے مطابق پکے سنگترے، انگور یا ناشپاتی کا رس ڈالنا چاہیے۔ غذا ہمیشہ مقررہ اوقات پر دینی چاہیے اور اس کا درمیانی وقفہ تین گھنٹے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس وقفہ میں بچہ روئے تو اسے غذا کی جگہ ابلے ہوئے پانی کے چند چمچے پلا دیئے کافی ہیں۔ جب بچہ چار برس کا ہو جائے تو اسے بکرے یا مرغی کا بھنا ہوا گوشت، خشک اور کچے پھل، بازاری مٹھائیاں اور برف سے سرد کی ہوئی اشیاء دے سکتے ہیں۔

ورزش: چھوٹے بچوں کی بڑھوتری کے لئے ویایام (ورزش) بے حد ضروری ہے۔ اس کا بہترین وقت صبح سویرے یا شام کا ہے۔ ان اوقات میں خالی معدہ کی حالت میں بچہ کو ہاتھ پاؤں مارنے اور کھیلنے کی اجازت دینی چاہیے، ننھے بچوں کو طبعی طور پر رونانے کے پھیپھڑوں کی بہترین ورزش ہے اور اس سے ان کے پھیپھڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ ہاں! یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ انہیں رونے کی عادت نہ ہو جائے۔

ہوا اور روشنی: بچوں کی بڑھوتری کے لئے سورج کی روشنی اور تازہ ہوا بھی نہایت ضروری ہے۔ اس لئے ان کے ناک اور منہ کو کسی وقت کسی چیز سے نہیں ڈھانکنا چاہیے، ہاں! ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں اور سردی اور گرمی سے محفوظ رکھنے کے لئے موسم کے مطابق لباس پہنا دینا چاہیے، بچوں کا لباس تنگ نہ ہونا چاہیے۔ اور نہ زیادہ کھلا، بلکہ ایسا ہونا چاہیے، جس میں بچہ آسانی سے اپنے ہاتھ پاؤں ہلا سکے۔

غسل: غسل بچوں کی صحت کے لئے نہایت ضروری ہے۔ شروع میں ہر روز دو یا تین بار اور چار برس کی عمر کے بعد ہر روز ایک بار نہلانا چاہیے۔ نہلانے کا بہترین وقت سورج نکلنے کے بعد کا ہے، نہلانے کا پانی مناسب گرم ہونا چاہیے، گرمیوں میں معمولی تازہ پانی سے بھی نہلایا جاسکتا ہے۔ جب بچہ چھ ماہ سے بڑا ہو جائے تو اسے بتدریج کم گرم پانی سے نہلانے کی عادت ڈالنی چاہیے، یہاں تک کہ وہ تازہ پانی سے آسانی سے نہا سکے۔ غسل سے پہلے بچے کے بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کر دینی چاہیے نیز بچے کے دانتوں کو صاف کر لینا چاہیے اور نہلانے کے بعد اس کی آنکھوں میں نہایت بار میک کالا سرمہ لگا دینا چاہیے۔

نیند: بچے کی بڑھوتری کے لئے نیند بھی نہایت ضروری ہے۔ اس لئے اس کو بے خوابی سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، لیکن نیند لانے کے لئے پوٹاسیم برومائیڈ، انیم وغیرہ ہرگز نہ دیں، بچے کو والدین سے الگ بستر پر اور کروٹ کے بل لیٹنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور موسم میں اس کے بستر کو گرم پانی کی بوتلوں سے گرم رکھنا چاہیے۔ بعض والدین اپنے بچے کو ساتھ سلا لیتے ہیں۔ یہ طریقہ بچے کی بڑھوتری کے لئے سخت مضر ثابت ہوتا ہے۔ اس لئے ہمیشہ بچے کو علیحدہ سلا نا چاہیے۔

پاخانہ و پیشاب: اگر بچے مقررہ وقت پر پاخانہ و پیشاب کرنا شروع کر دیں۔ تو وہ اکثر امراض کے حملوں سے محفوظ رہتے ہیں، اس لئے ان کو ایسی عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ مقررہ وقت میں پاخانہ و پیشاب کر سکیں۔

تندرست بچہ وقت پر پیٹ بھر کر کھاتا ہے۔ وقت پر پاخانہ و پیشاب کرتا ہے خوش و خرم رہتا ہے نیند خوب کرتا ہے اور بہت کم روتا ہے روزانہ وزن میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اگر ان افعال میں بے قاعدگی پیدا ہو تو اسے بیمار سمجھنا چاہیے اور اصل سبب مرض کے مطابق علاج کرنا چاہیے۔

ننھے بچوں کا طبی معائنہ

ننھے بچوں کی طبی جانچ نہایت مشکل کام ہے کیونکہ اس میں بیمار بچہ بالکل کسی قسم کی مدد نہیں دیتا، بلکہ طبی جانچ میں مزاحمت پیدا کرتا ہے

اس سلسلہ میں سب سے پہلے بیماری کی حالت اور اس کی تاریخ وغیرہ بچے کی والدہ یا دایہ سے دریافت کریں، جو اس کے حالات واقف ہو۔
۱۔ سب سے پہلے بچے کی اہم اور مخصوص شکایات کو دریافت کریں۔ پھر کیا دوا دی گئی اور کس ڈاکٹر یا حکیم دسید کا علاج کرایا گیا۔

۲۔ بچے کے ماحول، غذا، اینون وغیرہ کی عادت بھی دریافت کریں۔

۳۔ بچے کی سانس کی حرکت کی جانچ کے لئے پریٹ کی حرکت کو دیکھیں، کیونکہ یہ سینہ کی حرکت سے زیادہ واضح ہوتی ہے، تندرست نوزائیدہ بچے کی حرکت کی سانس فی منٹ چالیس ہوا کرتی ہے، دو سال کے بچے کا سانس تیس دفعہ فی منٹ اور پانچ سال کے بچے کا پچیس مرتبہ اور پندرہ سال کے بچے کا سانس فی منٹ صرف بیس مرتبہ ہوتی ہے، بچے کے سانس اور نبض کی نسبت ایک اور چار ہوتی ہے۔ اگر بچے کو کھانسی ہو تو دیکھیں سانس میں تنگی تو نہیں، کھانستے کھانستے قے تو نہیں ہو جاتی۔ اس کے علاوہ سینہ میں (اسٹھیٹیکوپ) لگا کر بھی چھاتی کا امتحان کر لینا چاہیئے۔

۴۔ بچے کی نبض کی ضربات فی منٹ معلوم کریں اور دیکھیں کہ دونوں طرف کی نبض مقابلتاً درست ہے یا غیر درست، طبعی ہے یا غیر طبعی۔ تندرست بچے کی نبض کا شمار اس طرح پر ہوتا ہے :-

نوزائیدہ بچہ کی نبض	۱۳ مرتبہ فی منٹ	دو سال کے بچہ کی نبض	۱۱ مرتبہ فی منٹ
۵ سال کے بچہ کی نبض	۱۰ مرتبہ فی منٹ	۸ سال کے بچہ کی نبض	۹ مرتبہ فی منٹ
۱۲ سال کے بچہ کی نبض	۸ مرتبہ فی منٹ		

بچہ جب نیند میں ہو تو اس کی نبض کی رفتار میں دس سے بیس حرکات کی کمی ہوتی ہے، اگر بچے کی نبض بہت سست اور غیر متواتر ہو تو یہ بچے کی کمزوری ظاہر کرتی ہے۔ بچے کی حرارت بدن معلوم کرنے کے لئے ہترما میٹر کو بغل میں رکھنا چاہیئے یا ویزلین سے چکنا کر کے لگا (مقعد) میں رکھنا چاہیئے اور یہ یاد رکھنا چاہیئے کہ بچے کی معمولی حرارت بچہ کے معمولی غصہ سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ بچہ کے سینہ کی جانچ کے لئے اسٹھیٹیکوپ کا استعمال کرنا چاہیئے۔

معالج کو بچے کے پیٹ، پشت، پیٹھ پھڑے اور دل کا امتحان بھی کرنا چاہیئے، بچے کی زبان کے معاینہ کے لئے اس کی ٹھوڈی کو نرمی سے نیچے دبائیں، بچہ منہ کھولے گا۔ اس صورت میں اس کی جانچ کی جاسکتی ہے، اس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ منہ میں جھاسے یا زخم موجود ہیں یا نہیں، بچے کی زبان کو مخصوص آلہ سے دبا کر اس کے حلق کا ملاحظہ کریں اور اس کے گلے کی حالت کا معاینہ کریں۔

سننے بچے کو اپنی عمر کی ابتدائی بارہ مہینوں میں عجیب و غریب تبدیلیوں سے گزرنا پڑتا ہے، ساتویں مہینے میں اس کے سانس ڈالے دانت نکل آتے ہیں اور دودھ کے تمام دانت تین سال کی عمر میں پورے ہو جاتے ہیں، تیسرے یا چوتھے مہینے میں بچہ کا سر قائم ہو جاتا ہے اور بچہ اپنے اردے سے سر کو پھیر سکتا ہے، نویں مہینے بچہ بے سہارا بیٹھ سکتا ہے اور زمین پر کھیل سکتا ہے اور پیٹ یا گھٹنوں کے بل لیٹنا سیکھ جاتا ہے۔

دسویں مہینے کا بچہ کھڑا ہو کر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور کچھ طوطے کی طرح الفاظ رٹتا ہے اور اسے اپنا نام خوب یاد ہو جاتا ہے، دوسرے سال میں تندرست بچہ چلنا پھرنا اور ٹھیک طرح بات چیت کرنا سیکھ جاتا ہے، لیکن جب بچہ بیمار ہو تو نہ تو اس طرح قدرتی حالت کی بڑھوتری ہوتی ہے اور نہ ہی بچہ فریہ و خوش نظر آتا ہے، بچوں کی بیماریوں میں دو چیزیں بچے کی بیماری کا خاص موجب ہوتی ہیں، پہلی غذا کی کمی یا زیادتی، دوسری خاندانی نقائص، امراض اطفال میں علاج سے پہلے تشخیص ضروری ہے، مندرجہ ذیل علامات کو اگر ذہن نشین کر لیا جائے تو بچوں کی بیماریوں کی تشخیص میں بہت مدد ملتی ہے۔

۱۔ اگر بچہ روتا ہے اور روز بروز کمزور ہوتا جائے تو اس سے یہ ظاہر ہو گا کہ بچہ معمولی قسم کے بخار میں مبتلا ہے۔

۲۔ اگر بچے کے ہاتھ پر لہریں پڑ جائیں اور وہ سوتے میں چونک اُٹھے اور رونے لگے یا کسی وقت سسکیاں لینے لگے تو وہ سینہ کی کسی بیماری میں مبتلا ہے۔

۳۔ اگر بچے کو کھانسی ہو، جلد جلد سانس لیتا ہو، سانس لیتے وقت منہ کھول دیتا ہو اور اس کی ناک کے نیچے پھول جلتے ہوں اور بہت روتا ہو تو اسے پسلی کا درد یا مونیا کا غرضہ سمجھنا چاہیئے۔

۴۔ اگر بچہ روئے اور اپنی انگلی کان کی طرف لے جائے تو اسے کان درد کا عارضہ سمجھنا چاہیے۔
۵۔ اگر بچے کی زبان میلی ہو اور اس کا پاخانہ بدبو دار سیاہی مائل اور خشک ہو یا اس کے منہ کے قریب بل پڑ جائیں، تو اس سے خرابی معدہ کا پتہ چلے گا۔

۶۔ اگر سچے روتے وقت گھٹنے نیکیڑے اور مہوئیں چڑھائے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے پیٹ میں درد ہے۔

۷۔ اگر سچے کے پیشاب میں سفید رسوب بیٹھ جائے تو یہ معلوم ہو گا کہ اس کا ہاضمہ خراب ہے۔

۷۔ اگر بچہ سے پیاب یا عید روٹ یا بیٹھ جائے تو یہ بچے کے پیٹ میں کیڑے ہونے کی علامت ہے۔
۸۔ اگر بچہ ہیند میں دانت پیسے اور ناک کھجائے یا پاخانہ یا پیشاب کی جگہ کو ملتا ہے تو یہ بچے کے پیٹ میں کیڑے ہونے کی علامت ہے۔
۹۔ بچے کے لئے جہاں تک ممکن ہو سکے، خوش ذائقہ اور خوش رنگ دوا تجویز کریں، کوئی تیز حلا ب یا زہریلی یا نشہ لانے والی دوا ہرگز نہ دیں۔
سخت ضرورت کے وقت نہایت احتیاط سے کم مقدار میں استعمال میں لاسکتے ہیں، جس سے بچے کی صحت پر مضر اثر نہ پڑے۔

۱۰۔ بچے کو دوا دینے سے پہلے مقدار خوراک اس کی عمر کے لحاظ سے مقرر کر لیں، یعنی دوا کی مقدار جو جوان آدمی کے لئے مقرر ہے، بچہ کو اس کی

کے لحاظ سے اس قدر کم مقدار میں دوا کا استعمال کرائیے، اس سلسلہ میں بیس سال کے ایک جوان آدمی کی عمر مان کر مقدار خوراک کو بیس

تقسیم کر دیں، یعنی ایک ادوائی جو جوان آدمی کو ۳۰ ستم دی جاتی ہے، دس سال کے بچے کو (۱/۲ حصہ) ۱۵ ستم اور پانچ سال کے بچے کو (۱/۴ حصہ) ۷.۵ ستم دی جاتی ہے۔

کو (۱/۴ حصہ) ۱/۴ منہم اور ۱/۴ سال کے بچے کو (۱/۸ حصہ) ۱/۸ منہم اور ۱/۸ سال کے بچے کو (۱/۱۶ حصہ) یعنی صرف ۱/۱۶

کافی ہے۔ مگر بچوں کو دوا دیتے وقت اس بات کا خیال ضروری ہے کہ انیون و دوسری رہنمائی ادویات کے سرکبات اول و ثانیہ نہیں چاہئیں، اگر ضروری دینے ہوں تو اس مقدار خوراک یعنی نصف سے کم مقرر کرنی چاہیے۔

اتکثیب۔ اُم الصبیان۔ صرع اطفال۔ تشنج اطفال۔ القضاہ کنولشنز۔

(Infantil-Convulsions)

تعریف مرض :- اس مرض میں بچوں کے جسم اور خاص طور پر چہرہ پر مرگی کی طرح تشنہ حرکات پیدا ہوتی ہیں۔ جس کی د سے یا تو جسم کے کل یا بعض ارادی یا غیر ارادی عضلات جلد جلد اٹھتے ہیں اور بے ہوشی کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کو جوگا یا کمپڑے بھی کہتے ہیں۔

و جومات :- یہ مرض سات یا آٹھ برس کی عمر تک کے چھوٹے بچوں کو ہوا کرتا ہے، کیونکہ اس عمر میں مرکزی نظام عصبی اپنے اسباب سے عصبی تحریک زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کو جاہل لوگ آسیب خیال کرتے ہیں۔ یہ مرض عام طور پر بدھنمی، ایچارہ، پرانے دست، پیٹ کے کیڑے، کبھی دانت نکالنے، ڈرنے، سردی لگنے، بھیکنے، ہڈیوں کی کمزوری، دماغی سوچ، کمزوری دماغ سے بھی ہو جاتا ہے، کبھی سخت امراض منوئیہ، شدید کھانسی، چیچک، خسرہ، زیادہ خون بہنے کی تکلیف سے اعصاب پر اثر انداز ہو

مرض کا ظہور ہوتا ہے اور تشنج ہونے لگتا ہے۔

علامات :- شدید حالت میں بچہ چیخ مار کر اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کھینچ جاتے ہیں، آنکھوں کے ڈیلے اوپر کی طرف چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بچہ دانت پیتا ہے کبھی منہ سے جھاگ آتی ہے، پیشاب و پاخانہ بے اختیار نکل جاتے ہیں اور بچہ ٹھنڈے پیسنے سے ترسیر ہو جاتا ہے، سانس مشکل سے اور آہستہ آہستہ آتا ہے، یہ حالت چند منٹوں تک رہتی ہے یا وقفے کے کر بار بار آتی ہے جب تک باری ختم نہ ہو جائے بچہ لگ بھگ بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے۔ یہ مرض جس قدر چھوٹی عمر میں ہو اسی قدر خطرناک ہوتی ہے۔

علاج :- نوبت کے وقت فوراً گلے پیسنے اور پیٹ کی پینڈش کو ڈھیلا کر دیں، چہرہ دگردن پر موسم کے مطابق سرد پانی کا اسفنج کریں یا بچہ کو گرم پانی میں بٹھا کر سر پر برف رکھیں، اگر بے حسینی اور شدید تشنج ہو، نوبت مرض بار بار آتی ہو تو کلورل ہائیڈریٹ بہترین دوا ہے۔ مقدار خوراک تین ماہ سے کم عمر کے بچے کو ہر گریں سے ایک گریں ہر دو گھنٹے بعد، یہاں تک کہ دورے بند ہو جائیں۔ چھ سے لے کر بارہ ماہ کے بچے تک کے لئے یہ دوائی دو گریں (ایک رتی) کی مقدار میں دی جاسکتی ہے۔ مناسب مقدار میں پوٹاسیم برومائیڈ کا استعمال بھی مفید ہے یا الیگزبر برومو ولیرین کا مناسب مقدار میں استعمال مفید ہے۔ دورہ مرض دور ہونے کے بعد اصل سبب کے مطابق علاج کریں، پیٹ میں کیڑے ہوں تو اس کے مطابق علاج کریں، ہڈیوں کی کمزوری میں وٹامن ڈی کا استعمال کریں، علاج بطور مرگی بالغان کے کریں۔

یونانی علاج :- تشنج دور کرنے کے لئے جندبیدستر کو روغن گل میں حل کر کے ہاتھ پاؤں پر مالش کریں یا قد سے کا فورتلوں کے تیل میں حل کر کے نیم گرم ملیں، بخار کی تسکین کے لئے شیر خشت چھ ماشہ ایک تولہ عرق سولف میں حل کر کے پلا میں تاکہ بچہ کا پیٹ صاف ہو جائے۔ سر پر بکری کا دودھ دوہیں یا اس میں کپڑا تڑ کر کے سر پر رکھیں اور مندرجہ ذیل نسخہ پلائیں :-

گاؤ زبان، لمبھی چلی ہونی، پھول گلاب ہر ایک ایک ماشہ، نمونہ منقہ، دودانہ پانی میں جوش دے کر اس میں تریخیمین چھ ماشہ ملا کر پلائیں۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں اور اس مرض کا باعث ہوں تو مکیلہ، بابڑنگ وغیرہ کے ذریعہ علاج کریں، اگر بچہ کمزور ہو تو اسے مرکبات فولاد، روغن جگرماہی (کاڈلور آیل) وغیرہ کا استعمال کرائیں۔

مندرجہ ذیل مجربات اس مرض کا مؤثر علاج ہیں :-

۱۔ خفیف مقدار میں عود صلیب عرق گاؤ زبان میں گھس کر پلائیں۔

۲۔ معمولی مقدار میں جدوا (خطائی ماں کے دودھ میں گھس کر پلائیں۔

۳۔ جندبیدستر، کستوری، عود صلیب ہر ایک دو ماشہ، عرق سولف کے نمونہ گولیاں بقدر مرچ سیاہ بنائیں، دودھ پیتے بچوں کو آدھی سے ایک گولی ماں کے دودھ میں حل کر کے دیں۔ بڑے بچے کو ایک سے دو گولی تک ہمراہ دودھ دیں۔

۴۔ جائفل، جلوتری، ہینگ خالص، منبر شدہ، ایک چھ ماشہ، کیسر خالص تین ماشہ، رب کو عرق سولف میں پیس کر مسروں کے دانہ کے برابر گولیاں بنائیں اور ایک گولی صبح اور ایک گولی شام کو دیں، بچوں کی مرگی کے لئے بہت مفید ہیں۔

تریاق اطفال :- پودینہ خشک، نربد سفید شدہ، چھلکا ہر ٹرڈ ہر ایک ایک تولہ، سفوف بنا کر روغن بادام سے چرب کریں۔ خوراک چار سے چھ رتی فی سال رات کے وقت پانی سے کھلائیں۔

آیور ویدک و ہومیو پیتھک طریقہ علاج بطور مرگی کے کریں اور جو ادویات بالغوں کو دی گئی ہیں، انہیں عمر کے مطابق کم مقدار میں بچوں کے لئے دیا جاسکتا ہے۔ نئی ماڈرن ادویات میں کارڈینال پر سے ہر گریں تک بلحاظ عمر دیں یا کلورل ہائیڈریٹ ایک گریں، سیرپ آف آرنج ۱۵ منیم، کلوروفارم و اثراتنا ملائیں کہ کل دوا ایک ڈرام ہو جائے۔ اس میں سے دن میں دو سے تین بار دیں۔

بچوں کا ورم دماغ - انفنٹائن منی نچائیس (Infantil Meningitis)

تعریف مرض :- یہ بچوں کا سرسام ہے اور بچوں کے لئے نہایت مہلک مرض ہے۔
 وجوہات :- والدہ کے دودھ کی خرابی، کمزوری مہنم، والدہ کا گرم غذاؤں کا زیادہ استعمال، بعض دفعہ دانت نکلنے کے زمانہ میں دماغ میں سوجن پیدا ہو کر یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔
 علامات :- بچہ کو بکثرت پیاس لگتی ہے، اکثر تالو کے مقام پر سے دماغ نیچے کو دب جاتا ہے، دماغ میں گرم مہنم کا ورم ہوتا ہے۔ بچہ سر کو ادھر ادھر پھیرتا ہے۔ یہ مرض عام طور پر موسم گرما میں شدت گرمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے بچہ کی آنکھیں و چہرہ زرد ہوتا ہے، مرض کی زیادتی کی حالت میں غشی ہوتی ہے کبھی دست زیادہ آتے ہیں اور ہاتھ پاؤں میں انہیں پیدا ہو جاتی ہے۔

علاج ڈاکٹری :- اس مرض کا علاج بالغوں کے ورم دماغ کی طرح ہے، انٹی بنجو کا کس سیرم (Antimeningo Cocus Serum) مناسب مقدار میں دی جائے، انٹی بائیٹک ادویات میں کادرومائیٹین، سنٹھومائیٹین، آریو مائی سین، ٹیرامائی سین، اگر دوائی سین وغیرہ بہترین ادویات ہیں۔

یونانی علاج :- والدہ کے دودھ کی اصلاح کریں، گرم غذاؤں کے کھلانے سے قطعی پرہیز کریں، بچہ کے سر اور تالو پر سرد اور قابض ادویہ کالیپ کریں۔ اس سلسلہ میں آملہ خشک، بیج خرفہ سیاہ ہر ایک چھ ماشہ، سب ادویہ کو سبز بارتنگ کے پانی میں پیس کر سفیدی بیضہ مرغ اضافہ کر کے حسب ضرورت تالو کی ہڈی پر لپیپ کریں۔

کھانے کے لئے سچے موتی، لمبا شیر، زہر مہرہ خطائی، زرد ہر ایک ایک رتی پیس کر نیچے کو کھلائیں، اوپر سے شیرہ خرفہ، شیرہ بیج کھیرا ہر ایک آدھا ماشہ، عرق بارتنگ، عرق کیوڑہ، عرق گلاب، عرق بید مشک میں نکال کر شربت انار ملا کر پلائیں، نیچے کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رکھیں یا گل گڑھل، بی دارہ، گل نیدوز، عناب ہر ایک تین ماشہ پانی میں تر کر کے صاف کریں اور شربت بزوری ملا کر دن میں چند بار پلائیں، اور سردی طور پر زری بیضہ مرغ اور روغن گل ہر دو ملا کر چند بار لگائیں۔

آیور ویدک و ہومیو پیتھک طریقہ علاج اور غذا و پرہیز بطور سرسام کے کریں۔

بچوں کی کھانسی، انفنٹائل برانکائیس (Infantil Bronchitis)

چھوٹے بچوں کو جب کھانسی پیدا ہو تو اس کی طرف بہت جلد توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بچوں کے پیپھڑے نازک ہوتے ہیں۔ بچہ بلغم کو آسانی سے باہر نہیں نکال سکتا، اس لئے بلغم پیپھڑوں میں جمع ہو کر ان کے چھوٹے چھوٹے فالوں کو بند کر دیتا ہے جس سے سانس کی رکاوٹ اور دم کشی پیدا ہو جاتی ہے۔

علاج :- بچے کو سردی سے محفوظ رکھیں، اسے پیلے گرم کپڑے پہنائیں، چھاتی پر لپی منٹ ٹرپن ٹائن کی نیم گرم مالش کر کے سینک کریں، قبض نہ ہونے دیں۔ تمام ادویات جو بالغ آدمیوں کی کھانسی کے لئے لکھی گئی ہیں، بچوں کی کھانسی کے لئے بلحاظ عمر کم مقدار میں دیں۔ اس سلسلہ میں زلیفول، کابن وغیرہ کا استعمال مفید ہے، اگر بخار بھی ساتھ ہو تو سلفا گروپ و مپنی سلین کا استعمال مفید ہے، کھانسی کے لئے بنے ڈرل ایکسیکٹورنٹ

آدھا چمچ ہر تین گھنٹہ بعد دیں۔

بچوں کی کھانسی کے لئے لندن فارماکو پریا کا یہ نسخہ نہایت مفید ہے :-

ٹینکچر اپی کاک ۵ سیم، ٹینکچر کمفر کو ۵ سیم، ٹینکچر سٹرا موئم ۵ سیم، سرپ ٹولو ۱۰ سیم، گلیسرین ۱۵ سیم، کلوروفارم وارٹر ۴۰ سیم، ایک چھوٹا چمچ پانی میں ملا کر دن میں تین بار دیں۔ علاج بطور کھانسی کریں۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ سلفا ڈرگز یا سیپٹران سیرپ مناسب مقدار میں دینی چاہئے۔

۲۔ سیرولین (Sirolin) مناسب مقدار میں دیں۔

۳۔ کھانسی کے بیان میں دیئے گئے پیڈنٹ کف مکسچر بچوں کو بلحاظ عمر دیں۔

۴۔ بینڈرل ایکسپیکٹورنٹ ۱/۲ چمچ شربت کی صورت میں بڑی عمر والے بچوں کو ہر تین گھنٹہ بعد عمر کے مطابق دیں۔

۵۔ ٹیکسی کف لکٹس (Tixuelix Coughlinctus) ایم بی ————— بچوں کے لئے مفید ہے۔

۶۔ زلفیزول (Zephrol) ایم بی ————— ۱/۲ چمچ دن میں تین بار دیں۔

۷۔ کلورومائیٹین پالمیٹریٹ (Chloromy cetin Palmitate) پی ڈی ————— ۱/۲ سے ایک چمچ، چار چار گھنٹے بعد

بنا پانی ملائے دیں۔ سردی کی کھانسی وکالی کھانسی میں مفید ہے۔

۸۔ وکس فارمولا ۴۴ (Vicks Formula- 44) ایک دو چائے کا چمچ صبح و شام سوتے وقت پلائیں۔

۹۔ چھاتی پر ملنے کے لئے وکس و برب یار ویکس استعمال کریں۔

یونانی علاج :- اگر سینہ پر بلغم جمی ہوئی ہو تو قدرے اسی اور زیرہ سیاہ پیس کر شہد میں ملا کر نیچے کر چٹائیں، اس طریقہ سے نیچے کوٹے ہو کر اس کا بلغم خارج ہو جاتا ہے۔

مندرجہ ذیل مجربات اس مرض کا مؤثر علاج ہیں :-

۱۔ کاکڑا سنگی ایک ماشہ باریک پیس کر شہد خالص چھ ماشہ میں ملا کر چار خوراکیں بنالیں اور ہر ایک خوراک ہر چھ گھنٹہ کے بعد بچہ کو چٹائیں۔

۲۔ کاکڑا سنگی، پپلی، آتیس، اصل السوس، گوند کیکر ہر ایک ایک ماشہ، باریک پیس کر شہد ایک تولہ میں ملائیں، رات کو چند بار ایک ایک انگلی بچہ کو چٹائیں۔

۳۔ لمٹھی چھلی ہوئی، پرسیا و شان، زونہ، لسوڑیاں، گل بنفشہ، موز منقہ ہر ایک ایک ماشہ، پانی میں جوش دے کر صاف کر کے چینی ۳ ماشہ ملا کر نیچے کو چٹائیں۔

۴۔ گاؤ زبان، گل گاؤ زبان ہر ایک تین ماشہ، غناب پانچ دانہ، مصری دو تولہ ملا کر پانی میں جوش دے کر صاف کر کے بچہ اور اس کی ماں دونوں کو پلائیں۔

۵۔ پھنکڑی سفید دو تولہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کسی مٹی کے کورے سکورہ میں رکھ کر منہ بند کر کے دو سیراپلوں کی آگ دیں، سرد ہونے پر باریک پیس لیں، خوراک ایک رتی عمر کے مطابق ماں کے دودھ میں حل کر کے دیں۔

۶۔ کاکڑا سنگی، رب السوس، بالنہ کے پتے، منقہ ہوزن باریک پیس کر شہد میں حل کر کے تھوڑا تھوڑا بچہ کو چٹائیں۔

آیور ویدک علاج :- ستوپادی چورن (چکروت) خوراک ایک سے دو رتی ہمراہ شہد نیچے کو چٹائیں۔

ہومیوپیتھک علاج بطرز کھانسی کے کریں۔ اور مقدار خوراک بلحاظ عمر دیں۔

ششک کاس، کوکر کھانسی، کالی کھانسی، ہونپکف، (Whooping Cough)

یہ مرض ایک متعدی وبائی مرض ہے، جس کا مفصل ذکر کالی کھانسی میں لکھا جا چکا ہے، مقدار خوراک بچہ کی عمر کے مطابق استعمال کی جائے۔ ڈاکٹری طریقہ علاج میں کلورومائیٹین یا سنتھومائیٹین بہترین ادویات ہیں۔ اور بچوں کے لئے ان کے شربت پالمیٹ (Palmitate) مارکیٹ میں ملتے ہیں اور ہمارے تجربات کے مطابق کلورومائیٹین پالمیٹ ہی اس کا موثر علاج ہے۔

یونانی علاج :- بچے کو علیحدہ گرم اور ہوا دار کمرے میں رکھیں۔ اگر سردی کا موسم ہو تو اسے گرم کپڑے پہنائیں اور تندرست بچوں سے نہ ملنے دیں۔ سیال قسم کی غذا نہایت موزوں ہے، کیلا خشک کے پتے ایک تولہ، رب السوس چھ ماشہ، نمک سیاہ، مرچ سیاہ، چھ ماشہ، سہاگہ، پھٹکڑی سفید، کاڑا سنگی ہر ایک تین ماشہ، سب کو کوٹ کر ایک کوری کلیہ میں رکھ کر گلی حکمت کریں اور پانچ سیراپوں کی آگ دیں، خاکستر کو پیس کر محفوظ رکھیں، خوراک آدھی رتی ہمراہ مکھن دیں، جو انوں کو چھ رتی تک دے سکتے ہیں۔

دوائے کالی کھانسی :- پھٹکڑی سفید ایک تولہ کو توڑے پر گھلا میں اور کیلے کے پتے کے رس کا چوبہ دیتے رہیں۔ تاکہ دس تولہ پانی جذب ہو جائے، اس کو بار یک پیس کر محفوظ رکھیں، ایک سال کے بچے کو ایک چاول، دو سال کے بچے کو دو چاول، تین سال کے بچے کو تین چاول عرق اجوائن کے ساتھ دیں۔

دیگر :- کاڑا سنگی، انیس، ملٹھی چھلی ہوئی، گوند کیکر ہر ایک ایک ماشہ کوٹ چھان کر شہد خالص میں ملا کر دن میں چند بار چٹائیں۔
دیگر :- الائچی خورد ایک عدد، پھول بالسنہ، منڈی، پر سیاہ شاں، بیج خطمی، پھول زوفہ، ابریشیم کچا شدہ، ملٹھی چھلی ہوئی ہر ایک ایک ماشہ، عرق سولف میں جوش دے کر مل چھان کر صاف کریں اور شربت خشخاش چھ ماشہ ملا کر پلائیں۔

آیور ویدک علاج :- لکھاں، انیس، ناگر موٹھا، کاڑا سنگی برابر وزن لے کر سفوف بنالیں، ایک سے دو رتی ہمراہ شہد چٹائیں، بچوں کے لئے نعمت ہے، بچوں کے بخار، کھانسی، دُم دق کے لئے مفید ہے، مسلسل استعمال کرنے سے بچے عام بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ طب آیور وید میں "کرشنا آدی چورن" کے نام سے مشہور ہے۔

ہومیوپیتھک علاج بطرز "کالی کھانسی" بالغان کے کریں اور اس کے مطابق بلحاظ عمر مقدار خوراک دیں۔

شواش نلی پرواہ۔ ڈبہ اطفال۔ بڑانکو مونیا۔ (Broncho Penumonia)

یہ مونیا کی قسم ہے جو تین سال سے کم عمر والے بچوں میں ہوا کرتا ہے، کمزور بچے اس میں زیادہ مبتلا ہوا کرتے ہیں، اس مرض میں شش کوپ (مسمع الصدر) لگا کر علامات ظاہریہ (فزیکل سائنسز) سننے سے بخوبی تشخیص ہو سکتی ہیں، ناک کے نچھنے پھوٹتے ہیں، سانس میں تنگی ہوتی ہے۔ سانس لیتے وقت پسلیوں کے نیچے اور منہ معدہ کے مقام پر گرٹھا پڑ جاتا ہے، کھانسی نوبت بہ نوبت، خشک اور تکلیف دہ ہوتی ہے، بخار کبھی ہلکا اور کبھی تیز ہوتا ہے، پھیپھڑے اور ہوا کی نالی میں ورم ہوتا ہے۔

ڈاکٹری علاج :- انٹی بائیٹک ادویات میں کلورومائیٹین یا سنتھومائیٹین پلمیٹ نہایت مفید ہیں۔ چھاتی پر لینی منٹ آف ٹرین ٹائٹن

بروزن میٹھاتیل ملا کر نیم گرم مالش کریں، اگر مرض بہت بڑھا ہوا نہ ہو تو سلفا ڈرگز سلفا میزاتھین، سلفا تھایازول، سیپران شربت یا ٹیرامائی سین بکرومائی سین ڈرائس کا استعمال بھی مفید ہے، کمزوری کی حالت میں ۱۵ بوند برانڈی یا دھسکی قدے پانی میں ملا کر گھنٹہ بعد دیں۔

لندن فارماکوپیا کا یہ نسخہ بھی برانکو نمونیہ کے لئے مفید ہے :-

ایونیہ کاربہم گرین، ٹنچر بیلادونا ۳ مہم، ٹنچر اپی کاک ۵ مہم، سپرٹ ایونیہ ایرومٹیک ۳ مہم، شربت سادہ ۵ مہم، ایکوا ۱۰ مہم، ایک جھوٹا پین دن میں چار بار دیں۔ یہ مقدار خوراک ایک سال کے بچہ کے لئے ہے۔

چھاتی پر بائی فلو جٹین (Ba: Phlogistin) کئی ڈاکٹر بنھواتے ہیں، لیکن یہ نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ بچہ کے سانس میں رکاوٹ ڈالتی ہے، البتہ لینی منٹ ٹرین ٹائن کو برابر وزن تلی کے تیل میں ملا کر دن میں دو بار مالش کر سکتے ہیں۔ انیم کے مرکبات اس مرض میں سخت مضر ہیں۔

یونانی علاج :- کشتہ بارہ سنگھا ایک ماش، کاکڑ اسنگی دو ماش، سوٹھ ایک ماش، سب کا سفوف بنا کر رکھیں اور ایک رتی سے دورقی بلحاظ رقی گاؤز بان میں حل کر کے ہر چار گھنٹہ کے بعد دیں اور پینے کے لئے عذاب دو دانہ، گل بنفشہ دو ماش، انجیر ۱۶ عدد، سوڑیاں تین دانہ، سب کو ش دے کر شہد سے میٹھا کر کے بخور اختور ایل میں۔

آیور ویدک دھرمیو پیچک علاج بطرز نمونیہ و برانکو نمونیہ کے کریں۔

ششوں کا شواس روک، دمہ اطفال، الستھما، (Asthma)

اس مرض میں بچہ کو سانس مشکل آتا ہے، چھاتی میں کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے اور تمام علامات مرلیف دمہ کی طرح ہوتی ہیں۔ ڈاکٹری علاج :- بطرز دمہ بالغان کے کریں اور بچوں کو عمر کے مطابق مقدار کم کر دیں، لندن فارماکوپیا (ولایت کے اسپتالوں مروج) کا یہ نسخہ نہایت مفید ہے۔ پوٹاسیم آلیو ڈائیڈ ایک گرین، ٹنچر سٹرا مونیم ۵ مہم، ٹنچر کمفر کو ۵ مہم، شربت سادہ ۲۰ گرین، کلوروفارم وارٹر رین آدھے سے ایک جھوٹا چمچ دن میں تین بار دیں۔

پانچ سال کے بچے کے لئے ہم گرین ایفی ڈرین کا استعمال مفید ہے، صبح و شام دیں، پھیپھڑوں کی تقویت کے لئے وارٹر بریز کمپونڈ، کادور آیل وغیرہ مفید ادویات ہیں۔

ماڈرن علاج :- ۱۔ پوٹاسیم برومائیڈ ایک گرین، ٹنچر سٹرا مونیم ۵ بوند، ٹنچر کارڈیمیم ۵ بوند، شربت سادہ ۲۰ بوند، کلوروفارم وارٹر ۱۰ بوند، ایک جھوٹا چمچ پانی میں ملا کر دن میں تین بار کر کے دیں۔

۲۔ ایفیڈرین ہارے ہارے گرین کامیاب ہے، رات کو سوتے وقت دیں۔

۳۔ مینڈرل سیرپ بلحاظ عمر ہارے سے ایک جھوٹا چمچ چٹانا مفید ہے۔

۴۔ پریاٹان (Priatan) نول ————— ہارے ہارے ٹنکیہ دن میں تین چار بار دیں یا شربت ہارے سے ایک چمچ پانی سے تین بار دیں۔

۵۔ کورامین ایفیڈرین (Coramine Ephedrine) عضلاتی ٹیکہ بلحاظ عمر لگائیں۔

یونانی علاج :- اجوائن دلیسی، اجوائن خراسانی، مرچ سیاہ، اجودہ، پپلا مول، سوٹھ، نمک سنگ، نمک خور دنی برابر وزن لے کر لعاب بکوار بوٹی سب ادویہ کا سہ چند برتن گلی میں گل حکمت کر کے بہت سے ایلونکی آگ میں جلا لیں۔ خوراک بقدر ایک رتی شہد میں ملا کر پچے لائیں۔

بچے کے سونے کے کمرے میں بلی یا کتا، بھڑ، بکری یا کسی اور پالتو جانور کی موجودگی بھی اس مرض کا سبب ہو سکتا ہے، چنانچہ اس کا ازالہ بھی ضروری ہے۔
آپور ویدک دھرمیو پتھک علاج بطرز دمہ بالغان کے کریں اور اس کے مطابق دوا کی مقدار کم استعمال کریں۔

شیشوؤں کے اتی سار، بچوں کے دست، اسہال اطفال، انفنٹل ڈائرہیا

(Infantile Diarrhoea)

اکثر بچوں کو خراش دار مادہ کی وجہ سے دست آیا کرتے ہیں۔ معمولی بد پرہیزی کی وجہ سے بھی دست آنے لگتے ہیں۔ عام طور پر غذا میں احتیاط کرنے سے خود بخود آرام آجاتا ہے یا کیسٹرائیل کا ایک چمچ پلانے سے دست بند ہو جاتے ہیں، اگر کیسٹرائیل دینے کے باوجود دست نہ رکے تو کلوروڈین یا کیمفور وڈین کا مناسب مقدار میں بلحاظ عمر استعمال کیا جائے، لیکن ٹینکچر اوپیم کم عمر کے بچوں کو نہ دینا چاہیے۔
بچوں کے اسہال کے لئے ولایت کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں مروج لندن فارماکو پیاس کا نسخہ درج ذیل ہے۔ جو دستوں کے لئے مفید ہے۔

کیسٹرائیل ۵ مہم، ٹینکچر اوپیم ۱۲ مہم، مہوسی لیج اکیٹیا ۱۵ مہم، پانی ۶۰ مہم، ایک چھوٹا چمچ دن میں تین بار۔ یہ مقدار خوراک چھ ماہ کے بچے کے لئے ہے۔

عفونی دستوں کے لئے سلفا ڈرگز خاص طور پر مفید ہیں، مرض کی بڑھتی ہوئی حالت میں کلوروڈائی ٹین یا آریو مائی سین یا ٹیرامائی سین وغیرہ کا استعمال مفید ہے۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ سلفا تھایازول بحساب دو گرین فی پونڈ جسمانی وزن دن بھر میں دی جائے۔ جب تھیکش کا شک ہو اس طرح تین خوراک دیں۔

۲۔ کرمیو سکسی ڈین (Creamosuxdine) ایم، ایس، ڈی ————— دو چھوٹے چمچے بڑے بچوں کو اور ایک چھوٹا چمچ بچوں کو دن میں تین بار دیں۔ سمر ڈائریا، پیراٹائیفائیڈ کے اسہال اور جراثیمی پھش میں مفید ہے۔

۳۔ کلوروسٹریپ (Chlorostrep) پارک ڈیوس ————— یہ کلوروڈائی ٹین اور ڈائی ہائیڈرو سٹریپٹومائی سین کا مرکب ہے شیر خوار بچوں کے لئے سس پنشن زیادہ موزوں ہے۔ لیکن بڑوں کے لئے کیپ شولز تجویز کئے جاتے ہیں۔ ایک سے دو چمچے سس پنشن ہر چھ گھنٹہ بعد مرض کے وزن کو ملحوظ رکھ کر دیں۔

۴۔ ڈائی مائی ٹین سیرپ (Dimycinsyrup) گلیکو ————— اس میں سٹریپٹومائی سین اور ڈائی ہائیڈرو سٹریپٹومائی سین مساوی حصہ پڑتے ہیں۔ جو کہ خوردنی استعمال کے لئے سب سے زیادہ بے ضرر انٹی بائیوٹکس سمجھے جاتے تھے، یہ دوا خاص طور پر شیر خوار بچوں اور چھوٹے بچوں کی معدی اور معوی سرائیوں کے علاج کے لئے تیار کی گئی ہے۔

۵۔ فارموسیبازول (Formocibazol) سیبا ————— یہ دوا آنتوں کی سرائیت اور بچوں کے اسہال گرمائی، بد ہضمی، بیلری ڈیسنٹری میں مفید ہے۔ ایک سال سے پانچ سال کے بچوں کو آدھی ٹیمپ اور پانچ سال کے اوپر کے بچوں کو ایک ٹیمپ دن میں تین بار دیں، دو تین دن کے بعد مقدار خوراک کم کر دیں۔ یہ علاج پانچ روز جاری رکھیں۔

۶۔ ڈایاپیک (Diapac) ڈیو میکس ————— یہ دافع جراثیم اور دافع سرایت اجزاء کا مرکب بچوں کے جراثیمی دستوں کے لئے از حد مفید ہے۔ نیومائی سین، سلفا ڈایازین، سلفا گوٹے ڈین، کے اولین، پیک ٹین، پنکچر بیلڈ ونا، پنکچر کارڈ کو کا مرکب ہے، بلحاظ عمر دیں۔

۷۔ انٹرو والوفارم، ایک سال کے بچے کو آدھی ٹکیہ کی تین خوراک بنا کر دیں۔

۸۔ کو مائی سین سیرپ (گلیکسو) ایک چھوٹا چمچ، میکراہین سیرپ ایک چھوٹا چمچ، دونوں کو باہم ملا کر پانی کے ساتھ دن میں دو سے تین بار دیں۔ یہ ایک انٹی بائیوٹکس + وٹامن بی کا مرکب ہے جو آنٹوں کی سوجن، تولون کی سوجن کے لئے مفید ہے۔

۹۔ میڈری لون (Midribon) روش ————— بچوں کے منویہ، دست، پھوڑے، پھنسی، ورم میں مفید ہے، بڑوں کو ٹکیہ اور چھوٹوں کو سیال قطروں کی صورت میں بلحاظ عمر دیں۔

۱۰۔ سٹریپٹومیکس سیرپ (وائٹ) یا کوکپٹال (رنیکسی) یا کلین وڈ نیومائی سین (ایبٹ) ہر سے ایک چمچ دن میں دو سے تین بار دیں۔

یونانی علاج :- اگر دست بکثرت آتے ہوں تو نارجل دریائی دورتی، طباشیر دورتی، زہر مہرہ اصلی دورتی، گھس کر دیں یا نارجل دریائی ایک تولہ، طباشیر اصلی ایک تولہ، زہر مہرہ سبز رنگ ایک تولہ، عرق کلاب پانچ تولہ، عرق کیوڑہ دس تولہ، عرق بید مشک پانچ تولہ، چینی کے کھل یا نہ گھسنے والے کھل میں کھل کر کے رکھیں، خوراک ایک رتی سے دورتی تک، اس سے بچہ دانت آسانی سے نکالتا ہے ہر قسم کے دست دتے و پیاس کے لئے از حد مفید ہے۔

سفوف اطفال :- ریوند خطائی، چھلکا ہر زرد، کچور ہر ایک ایک تولہ، سوڈا بائیکارب چھ ماشہ، سب کو پیس کر سفوف بناویں، ایک چٹکی دودھ میں حل کر کے بچے کو پلائیں، خراش دار و بد ہضمی کے دستوں کے لئے مفید ہے۔

پیش کی حالت میں لعاب ریشہ خطمی ایک ماشہ، لعاب بی دانہ ایک ماشہ، شربت بنفشہ یا شربت انجیر چھ ماشہ ملا کر پلائیں۔

بال گھٹی :- کا کڑا سنگی، ناگر موٹھا، انیس، پپلی، طباشیر، انجی خورد، نارجل دریائی برابر سفوف بنا کر کپڑے چھان کر چھان لیں، جھٹنے بیٹنے کا بچہ ہوا تھی رتی یہ دوا شہد میں ملا کر دن میں تین بار چٹائیں

رکاوٹ اسہال :- خستہ انبہ، بیل گری، اندر جو شیریں، گھل دھاوا ہر ایک ایک تولہ، سفوف بنائیں، خوراک ایک ماشہ جامن کے رب کے ساتھ دیں۔

یونانی گرائپ وائر :- سوئے آدھا سیر، کشمش آدھا سیر، پانی پانچ سیر، ان کا چار بوتل عرق نکالیں، اس میں ایک تولہ سوڈا بائیکارب ملائیں، پھر اس عرق میں سیرین ایک رتی میٹھا کرنے کے لئے ملا دیں۔

بچوں کی بد ہضمی، پیش مرور، ہرے پیلے دست، کھانسی و آنٹوں وغیرہ کی تکلیف کے لئے از حد مفید ہے، گرائپ وائر کی طرح ایک چھوٹا چمچ صبح اور ایک چھوٹا چمچ شام کو دیں۔

بال جیون :- ناگر موٹھا، کا کڑا سنگی، گھماں، طباشیر، چھوٹی الہچی، زہر مہرہ خطائی، دریائی نارجل ہر ایک چھ ماشہ، خوراک چھ ماہ کے بچے کو چار رتی، ایک سال کے بچے کو ایک ماشہ صبح و شام دیں، بچوں کی بد ہضمی، بخار، کھانسی، دست متھن، دانت نکلنے میں آسانی کے علاوہ کمزور بچے مضبوط ہوتے ہیں۔

بال شربت :- چوٹا آن بھاتا تین پاؤ، پانی دوسیر، رنگ الال (سوڈا وائر والا) تین ماشہ، رت پودینہ ایک رتی، چینی تین پاؤ۔ ترکیب تیاری :- کسی مرتبان میں پانی دوسیر ڈال کر جو نا ڈال دیں، دودھ بھیکائے، دن میں دو یا تین بار ملا دیا کریں، تیسرے دن

آدھ سیراس کا انتخاب کر صاف برتن میں آگ پر رکھیں اور چھ ماشہ سوڈا بائیکارب ملا دیں، بعد میں چینی ملا کر توام کریں، جب ٹھنڈا ہو جائے تو ست پودینہ پیس کر ملا دیں، رنگ کم و بیش ملا سکتے ہیں۔ بچوں کے دست دتے کے لئے مفید ہے۔
 آیور ویدک علاج :- گنگا دھر پورن بلجناط عمر دورتی ہمراہ عرق سولف دیں، دستوں کو روکنے اور تحیش کے لئے مفید ہے۔ سخت قابض ہے۔

غذا و پرہیز :- بچہ کو بار بار دودھ نہ پلائیں بلکہ کافی دیر کے بعد دودھ میں البومن واٹر (اندھے کی سفیدی کا پانی) مٹوڑی مقدار میں دینے سے دست بند ہو جاتے ہیں، بچے کی ماں کو دیر مضمت غذاؤں سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔

بچوں کی ات کلیش، بچوں کی قے و متلی، ناسیا و وامٹنگ

(Nausea and Vomiting)

عام طور پر بچے کو زیادہ دودھ پلانے یا غذا کی خرابی سے قے و متلی ہو جاتی ہے، بچے کا جی متلاتا ہے، اگر معدہ کمزور ہو تو کوئی بھی غذا مضمت نہیں ہوتی اور قے ہو جاتی ہے، اگر غذا کی خرابی سے ہو تو اچھی غذا اور دودھ مضمت ہو جاتے ہیں۔

علاج :- دو تین گھنٹے بچے کو دودھ نہ پلائیں، دودھ اور غذا کی اصلاح کریں، دودھ اور لائٹ واٹر ڈال کر پلائیں، اگر قبض ہو تو پہلے اسے رفع کریں۔ اس کتاب میں بالغان کی قے و متلی کے بیان میں لکھے گئے نسخہ جات استعمال میں لادیں اور بلجناط عمر بچے کو کم مقدار میں دیں۔ اس سلسلہ میں الپچی خورد، سولف، پودینہ، سوخٹ، متین تین ماشہ لے کر کوٹ لیں اور آدھ پاؤ پانی میں جوش دیں، جب نصف رہ جائے تو ٹھنڈا کر کے چھان لیں اور چھ خوراک بنا کر ایک ایک خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دیں، الٹی دتے فوراً بند ہو جائے گی، یا طباشیر، زہر مہرہ، نارجیل دریائی ہر ایک دورتی عرق گلاب میں گھس کر بچہ کو پلائیں یا زیرہ سفید، الپچی چھوٹی، پودینہ جوش دے کر قدرے پلائیں۔

ڈاکٹری علاج میں اگر بچہ بازاری دودھ پیتا ہو تو لائٹ واٹر ملا کر دیں یا گلوکوز دھچچہ (چھوٹا)، سوڈا بائیکارب ہم چھچھ (چھوٹا) ایک گلاس پانی میں حل کر کے دن میں کئی بار پلائیں، اگر نہایت کم سن بچہ ہو اور سپیدالشی طور پر معدہ کا نچلا دھانہ بند ہو (Puloricobest Ruction) کے عارضہ کا احتمال ہے، اس کا آپریشن ہی موثر علاج ہے، اس لئے بچے کو فوراً ہسپتال لے جانے کا مشورہ دیں۔
 ماڈرن ادویات :- ۱۔ کلورل ہائیڈریٹ ۲۔ اگرین دن میں تین بار ایک چھچھ پانی میں گھول کر بلجناط عمر دیں۔

۲۔ وانٹ اپی کاک ایک سے دو بوند دن میں تین بار ایک چھچھ پانی میں ملا کر دیں۔

۳۔ گلوکوز دو چھوٹے چھچھ، سوڈا بائیکارب دو گرین پانی میں گھول کر چھچھ کر کے پلائیں۔

۴۔ ایوومن (Avomine) ایم بی ————— ہا سے ہا تک دن میں تین بار دیں یا اسکازین (Eskazine) ایس کے ایف ————— ہا سے ہا تک دن میں دو سے تین بار دیں۔

۵۔ لارجیکل (ایم بی) الٹی نہ رکنے پر ہا سے ہا تک کو پیس کر ماں کے دودھ میں یا پانی میں عمر کے مطابق گھول کر دیں۔

آیور ویدک علاج بطرز یونانی علاج کے کریں، ہومیو پیتھک علاج میں بلجناط عمر مناسب مقدار اپی کاک دینے سے ہر قسم کی قے و متلی خواہ کسی سبب سے آتی ہو، آرام آجاتا ہے۔

بچوں کا پیٹ درد، گسٹریلجیا، (Gnstralgia)

ماں کی بے احتیاطی سے اور دیرینہ غذا کھانے سے بچے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، علاوہ ازیں بد ہضمی، اپھارہ اور قبض سے بھی بچوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے اور اس میں شدت کا درد ہوتا ہے، بچہ رونا اور چلاتا ہے، روتے دقت اپنے ننوں کو سیکڑتا ہے۔ بائیکا پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔

ڈاکٹری علاج :- گلیسرین کی چپکاری یا گلیسرین کی بتی سے قبض دور کریں اور پوری پانی چار گرین، سوڈا بائیکارب چار گرین پانی میں حل کر پلائیں، پیٹ درد، اپھارہ، قبض کے لئے نہایت مفید ہے یا کیٹر آئیل لگ بھگ تین ماشہ پلائیں، قبض و اپھارہ کے لئے مفید ہے۔ پیٹ درد شدید ہو تو کیٹر آئیل ایک ٹولہ، تیل تارپین ایک ٹولہ آپس میں ملا لیں۔ اور بچے کے پیٹ پر نرم نرم مالش کریں۔ پیٹ درد کے لئے مفید ہے۔

یونانی علاج :- اگر ریح کے سبب سے درد ہو تو پیٹ پر سینک کریں، نمک سلیمانی دورتی عرق سولف میں حل کر کے دیں۔ اگر پیٹ میں ہوا جو سے یہ عارضہ ہو، تو عرق سولف، عرق سویہ، عرق الاچی برابر وزن ملا کر ہتھوڑا ہتھوڑا نیچے کو پلاتے رہیں یا نمک سیاہ، نوشادر پھلی ہر ایک ایک ٹولہ، پودینہ ایک ٹولہ، ریوند چینی چھ ماشہ، سہاگہ بریاں نو ماشہ، سفوف بنائیں، خوراک ایک رتی سے ایک ماشہ حسب عمر دیں۔ آیور ویدک علاج بطور یونانی کے کریں۔

ہومیو پیتھک علاج :- کیو میللا x ۳۔ یہ دوا پیٹ درد، اپھارہ، توخ، ہسٹریا زرد رنگ کے دست آئیں اور دانت نکلنے کی ہفت میں ہر تین گھنٹہ بعد ایک خوراک دیں۔ اس دوائی کو بچوں کی دوائی کہا جاتا ہے، کم عمر والے بچوں کو کم مقدار میں دیں۔

بچوں کا وسوچکا، مہیضہ، کالرا، (Cholera)

موسم گرما میں شیر خوار بچوں میں پیاس کی زیادتی، بخار، قے و دست ہونے سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے، ملاپ کرنے کے بعد ماں کا بچہ دھ پلانا اس مرض کا خاص سبب ہے۔ اگر بروقت علاج نہ کیا جائے، تو بچہ کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

لیکن اسہال گرائی اور مہیضہ کے دستوں میں تشخیص ضروری ہے، اگر مہیضہ کے دست ہوں تو جراثیم کش ادویات دیں۔ اس سلسلہ میں سب مقدار میں آریو مائی سین، ٹیرامائی سین اور اکرو مائی سین کا استعمال مفید ہے۔ مرض کی معمولی حالت میں سلفا ڈرگز کا استعمال ہی ہے۔

یونانی علاج :- شراب میں عرق گلاب و عرق سولف ملا کر ہتھوڑا ہتھوڑا پلائیں، چوبیس گھنٹے تک نیچے کو کھانے کے لئے کچھ دیں۔

مندرجہ ذیل نسخہ جات اس مرض کا مؤثر علاج ہیں :-

- ۱۔ زہر مہرہ خطائی، طباشیر اصلی، نارجل دریائی، سب ادویہ کو ایک ایک رتی عرق کیوڑہ میں گھسی کر شربت انار ملا کر بچہ کو پلائیں۔
- ۱۔ چھلکا الاچی خوردین ماشہ عرق گلاب میں جوش دیں اور صاف کر کے بچہ کو پلائیں۔
- ۱۔ زہر مہرہ خطائی تین رتی، عرق گلاب میں جوش دیں اور صاف کر کے بچہ کو پلائیں۔

آیور ویدک علاج بطرز یونانی علاج کے کریں۔
ہومیو پیتھک علاج بطرز ہیفنہ بالغان کریں، لیکن عمر کے مطابق مقدار خوراک کم دیں۔

بڑواہکا، پچیش، ڈسینٹری، (Dysentery)

یہ ایک متعدی مرض ہے، مفصل معلومات پچیش کے بیان سے حاصل کریں۔ اس عارضہ سے بچہ کے پریٹ میں مروڑ ہوتا ہے، بار بار پاخانہ کی حاجت ہوتی ہے اور اس میں آؤں یا لہو خارج ہوتا ہے۔

ڈاکٹری علاج :- اگر شدہ ہو تو پہلے کیٹرائیل حسب عمر دے کر قبض دور کریں، بعد ازاں قابضات کا استعمال کریں، بچوں کی پچیش میں کیٹرائیل امیلشن جس کا بیان پچیش کے بیان میں درج ہے، کامیاب ثابت ہوتا ہے، جدید ادویات میں سلفا گوئے ڈین یا سلفا اتھیا زول مناسب مقدار میں دیں۔ آدھی گولی کی تین خوراک آٹھ ماہ کی عمر کے لئے درست ہے۔

انٹرو وایو فارم (Enterovioform) :- یہ سبباکینی کی آئیو ڈین سے تیار شدہ گولیاں ہیں جو اسہال، پچیش اور انٹریوں کی سوجن کے لئے مفید ہیں۔ ان کا استعمال سلفا گوئے ڈین کے ساتھ ساتھ بھی رکھا جاسکتا ہے، بچوں کو بلجاط عمر دیں۔
یونانی علاج :- چھلکا الیغول ایک ماشہ، شربت انجبار چھ ماشہ میں ملا کر چٹائیں۔

۲۔ لعاب ریشہ خطنی، لعاب بی دانہ ہر ایک ایک ماشہ نکال کر شربت انجبار یا شربت خشتا ش چھ ماشہ ملا کر چٹایا جائے۔
۳۔ سولف، بیل گری، سونٹھ ہر ایک تین ماشہ، مصری پانچ ماشہ، سفوف بنائیں، ایک ماشہ کی مقدار عمر کے مطابق دیں۔
۴۔ گاؤ زبان کے پتے، ریشہ خطنی، پھول گلاب، جڑ انجبار دو ماشہ، گل قند چھ ماشہ، پانچ تولہ پانی میں جوش دیں، آدھا پھن پر چھان کر پکے پلائیں، ماں کو سوائے کچھڑی کے کوئی غذا نہ دیں۔

آیور ویدک علاج :- ۱۔ رال سفید، موچرس، برابر وزن ہر ایک پیس کر خوراک پر رتی سے ایک رتی بلجاط عمر دیں، پچیش اور خونی دستوں کے لئے نہایت مفید ہے۔

۲۔ مغز دھنیا خشک، اتیس، کاکڑا سنگی، گج پیل ہر ایک برابر وزن، شہد بقدر ضرورت، تمام ادویہ کو ہر ایک پیس کر سفوف تیار کریں اور صفوڑا صفوڑا شہد میں ملا کر بچہ کو چٹائیں، بچوں کی سخت سے سخت پچیش بھی اس کے استعمال سے دور ہو جاتی ہے۔
ہومیو پیتھک علاج :- دیکھیں بیان پچیش ————— اگر پچیش کی تکلیف میں بیمار کو پیشاب بہت کم آئے یا بالکل نہ آئے تو مرکب کورس کار دیں، خوراک عمر کے مطابق دیں۔

بی وند، قبض، کانسٹی پیشن، (Constipation)

بچے کو پاخانہ کھل کر نہیں آتا یا زیادہ دیر سے آتا ہے، اگر بچے کی ماں کو بھی قبض ہو تو بچے کی ماں کو قبض کشا طات بخش پھل اور ہزیاں زیادہ مقدار میں کھلائیں، بچے کو کیٹرائیل چار ماشہ قدر سے شہد میں ملا کر چٹائیں اور کیٹرائیل یا زیتون کے تیل کی پریٹ پر ماسٹر ریں، چھوٹے بچوں میں گلیسرین کا حقنہ کریں، پانچ برس کے بچے کے لئے پڑ سے پڑ ۱ اوئس گلیسرین کی پچکا

کافی ہے۔

۱۔ ماڈرن ادویات۔ ۱۔ ملک آف میگنٹیا (Milk of Magnesia) ایک چھوٹا چمچہ دودھ پلانے کے بعد دیں۔
۲۔ کیٹر آئیل کا چمچہ رات کو پلائیں، کھانسی کی حالت میں نہ دیں۔

۳۔ پلور ہائی ۵ سے ۱۰ اگرین کی مقدار میں دیں، قبض کے لئے مفید ہے۔

۴۔ گلیسرین جی مقعد میں رکھیں، مقوڑی دیر میں پاخانہ آجائے گا۔

یونانی علاج :- جنم گھٹی جس کا نسخہ اسہال اطفال میں دیا گیا ہے، استعمال مفید ہے یا سولف ایک ماشہ، پھول گلاب ایک ماشہ، ریوند حبیبی تین رتی، گل قند چار ماشہ، سب ادویہ کو چار تولہ پانی میں جوش دے کر جب ڈیڑھ تولہ رہ جائے تو مل چھان کر بچے کو چمچہ پلائیں۔
جنم گھٹی :- گاؤ زبان کے پتے، گل بنفشہ، لمبھی، چھلی ہوئی، منقہ، عذاب، پھول گلاب، سنار کے پتے ہر ایک ایک ماشہ، پانی میں جوش دے کر گرم حالت میں گودہ امتاس چھ ماشہ، تربجین چھ ماشہ بھگو کر حل کریں، صاف کر کے بچہ کو چمچہ پلائیں، مفید نسخہ ہے اور ہر قسم کی قبض کے لئے بے ضرر ہے۔

آیور ویدک علاج بطر یونانی علاج کے کریں۔

ہومیو پیتھک علاج :- نکس و امیکا (پاخانہ مقوڑا آئے، حاجت برقرار ہے، پیٹ درد ہو)، برائی اونیا (جب بچہ کا پاخانہ بالکل خشک ہو اور مشکل خارج ہو، پیاس زیادہ، منہ، زبان اور ہونٹ خشک ہوں)۔

جب قبض سخت ہو اور سڈے جمع ہو گئے ہوں تو گلیسرین کی پچکاری ہی مؤثر علاج ہے، بچہ کی ماں کو دودھ اور گھی زیادہ استعمال کرنا چاہیئے۔

انٹسٹریوں کے کیڑے، انٹسٹینل ورمز، (Intestinal Worms)

پیٹ میں کئی قسم کے کیڑے پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن بچے اکثر چنوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اس مرض میں پاخانہ کی راہ چھوٹے چھوٹے کیڑے رچ ہوتے ہیں، کبھی گڈا کے اندرونی حصے میں جمع ہو جاتے ہیں، بچہ اپنی ناک کو نوچتا ہے، اس کی سیون و گڈا میں خارش ہوتی ہے، بچہ نیند نہ دانت پیتا ہے، اس کے منہ سے رال بہتی ہے، نازک بچوں کو اس مرض کے باعث تشنہ ہونے لگتا ہے۔ کبھی کبھی مرگی کے نعرے پڑتے ہیں۔

علاج ڈاکٹری :- سینٹونین بلحاظ عمر بالکل خفیف مقدار میں دیں، ورنہ بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا، بڑے آدمیوں کے لئے کی خوراک صرف دو گرین ہے، یا پیرن (Pipran) شربت کا استعمال کریں۔ تفصیل کے لئے دیکھیں بیان کرمی روگ، مندرجہ ج الحکمت۔

یونانی علاج :- ۱۔ ملدی (سالم)، باڈنگ ہر ایک دورتی، باریک پس کر شکر ملا کر چٹائیں۔

۲۔ رسونت، چاکو شدہ، ہینگ اصلی ہر ایک دو ماشہ، صبر ایک ماشہ، مزج سیاہ ۱۰ ماشہ، نیم کے پتے ۵ عدد، سب ادویہ کو پس کر گولیاں بقدر دانہ جوار بنا لیں، چھوٹے بچے کو ایک گولی اور بڑے کو دو یا تین گولیاں رات کے وقت کھلائیں۔
۳۔ رسونت، کیلہ ہر ایک ڈیڑھ ماشہ پانی کے ساتھ دیں۔

آیور ویدک و ہومیو پیتھک علاج کے لئے کرمی روگ بالغان کے بیان میں دیئے گئے نسخہ جات بلحاظ عمر استعمال کرائیں۔

شیشوؤں کا اناہ شول، قولنج، کالک، (Colic)

غذا ہضم نہ ہونے سے اکثر بچوں کے پیٹ میں سخت درد ہونے لگتا ہے۔ بچہ گھٹنوں کو پیٹ کی طرف لے جاتا ہے، اور بے انتہار روتا ہے۔
دودھ کی اصلاح کریں، پیٹ کی سینک کریں، علاج ڈاکٹری میں تیل نارہین سے پیٹ کی مالش کریں اور گلیسرین کی پچکاری۔
پاخانہ ملائیں۔

لندن فارماکوپیا کا یہ نسخہ بھی نہایت مفید ہے :-
کلورل ہائیڈریٹ ۲ گرام، سپرٹ امونیا ایرومیتھک ۲ سمن، شکر کارڈ کو ۲ سمن، گلیسرین ۵ سمن، ڈل وارٹر ۶ سمن، اس میں سے ایک ایک چھوٹا چھوٹا چمچ دن میں دو یا تین بار دیں۔
یونانی علاج :- سویا ایک ماش، سولف ایک ماش، دسینا خشک ایک ماش، موز منقہ دودھ دالنے، سب کو پانی میں جوش دے کر شہد سے میٹھا کر کے چمچ چمچ ملائیں۔
آیور ویدک و ہومیو پیتھک علاج بطور قولنج بالغان کے کریں اور بلحاظ عمر دوا کی مقدار دیں۔

ابجیرن، بدہضمی، ڈس پیپسیا، (Dyspepsia)

اس مرض میں بچے کے معدے کے افعال میں فرق آ جاتا ہے۔ یہ عارضہ دودھ کی خرابی، کھانے پینے میں بے اعتدال قبض، اچھارہ وغیرہ سے پیدا ہوتا ہے، کھانا کھانے کے بعد بچہ کے معدہ میں درد اور بے چینی ہوتی ہے، جی متلاتا۔ کبھی قے آتی ہے اور قبض ہو جاتی ہے، بچہ سوتے ہوئے چیخ اٹھتا ہے اور روز بروز کمزور ہوتا جاتا ہے۔
علاج :- دودھ اور غذا کی اصلاح کرائیں۔ وقت مقررہ پر دودھ اور غذا دیں، جو جلدی ہضم ہو جائے، بطور بعد غذا شہد چٹائیں یا سولف اور پودینہ کے پتے ایک ایک ماش پانی میں جوش دے کر بچے کو ملائیں۔
بدہضمی کے لئے عرق سولف، عرق پودینہ، عرق اجوائن ہر ایک ایک تولہ ملا کر چمچ چمچ بچے کو پلانا بھی جلد آرام دیتا ہے۔ اگر پیٹ درد کا عارضہ ہو تو پور یہائی چھ گرام، سوڈا بائیکارب چھ گرام عمر کے مطابق ایک یا دو خوراک بنا کر پانی میں حل کر ملائیں، پیٹ درد، قبض، اچھارہ کے لئے مفید ہے۔

قبض کی حالت میں کیٹر آئل تین ماش یا کم و بیش پلانے سے بھی بچوں کا اچھارہ و قبض کا عارضہ دور ہو جاتا ہے۔
بدہضمی بچگانہ :- کلورل ہائیڈریٹ آدھ گرام، کیٹر آئل ۵ سمن، میو سی لیج آکیشیا ۱۵ سمن، وارٹر ۶ سمن، ملش تیار کر اور ایک چھوٹا چمچ دن میں دو سے تین بار دیں، یہ لندن فارماکوپیا کا نسخہ ہے جو ولایت کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں مروجہ دوائے مالش :- کیٹر آئل ایک تولہ، تیل نارہین ایک تولہ آپس میں ملا لیں، بچے کے پیٹ پر نرم نرم مالش کریں۔

پیٹ درد و اپھارہ کے لئے مفید ہے۔

ہومیو پیتھک علاج :- کیومیلا پچہ کے پیٹ درد، اپھارہ، سبز یا ہرے دستوں کے لئے بہترین دوائی ہے، عمر کے مطابق مناسب مقدار میں استعمال کی جائے۔

بچوں کے دانت نکلنا، ٹیٹنگ (Teething)

دانت نکلنے کے وقت کمزور بچوں میں بد ہضمی وغیرہ کی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے جس سے والدین پریشان ہو جاتے ہیں، بچہ کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے اور بچہ کمزور ہو جاتا ہے، کبھی اٹلیاں اور کبھی دست آنے لگتے ہیں، کئی بار آنکھیں دھکنے لگتی ہیں اور منہ سے رال بہنے لگتی ہے، کبھی کبھی بخار اور تشنچ بھی ہونے لگتا ہے۔

نوٹ :- طبی نقطہ نظر سے چھ مہینے کا بچہ دودھ کے دانت نکلنا شروع کر دیتا ہے، اور تین سال کی عمر تک تمام عارضی دانت نکل آتے ہیں، پچھلے دانت چھ سال کی عمر میں نکلنے شروع ہوتے ہیں اور بارہویں سال تک عقل کی داڑھ کے سوائے سب دانت موجود ہوتے ہیں۔

علاج ڈاکٹری :- بطور حفظ مائع گرامپ وائر، سکھائیک بال شربت، گرامپ مکسچر، لائم وائر وغیرہ دیں۔ جب تشنچ و بے چینی ہو تو کلورل ہائیڈریٹ ایک گریں، گلیسرین دس منم، کلوروفارم وائر تا ۶ منم، ایسی ایک ایک خوراک دن میں دو یا تین بار دیں۔ اگر پاخانہ بدبودار ہو تو ٹیٹنگ پوڈ دیں۔

منہ کی سوجن کے لئے بورک گلیسرین یا پینکٹری گلیسرین پھیری سے لگائیں، بچے میں اگر کیشیم کی کمی ہو تو مندرجہ ذیل مرکبات استعمال کرنا مفید ہے۔

کلزانہ (Kalzana) :- کیشیم، سوڈیم الکیٹ سے مرکب گولیاں ہیں، جو ہڈیوں اور دانتوں کی کمزوری میں مفید ہیں، بلحاظ عمر ایک گولی دودھ میں گھول کر دن میں تین بار دیں۔ دانت نکلنے کے زمانے میں دینے سے بچہ آسانی سے دانت نکال لیتا ہے، یہی دوا کیلسی مل (بی، ڈی، ایچ) اور آسٹو کیلیم (گلیکسو) کے ناموں سے فروخت ہوتی ہے۔

علاوہ ازیں کیلسی ما (Calcima) یا کیلسی سیرپ یا کیلزم (Kalzium) یا کیلسی نول (Calcinol) یا الکازم (Alcal zium) کا استعمال مفید ہے، کیلیم گلوکونیٹ و کیلسی فیروں (بروزدیمک) کا استعمال بھی اس مرض کا موثر علاج ہے۔ کمزوری کی صورت میں آسٹین یا اڈیکولین یا ملٹی وٹا منز دیں۔ اڈیکولین (Adexolin) چھوٹے بچوں کے لئے لکڑی کی صورت میں فروخت ہوتی ہے، بچوں کے لئے ایک سے چار قطرے دن میں دو بار کافی ہیں۔

دانت نکلنے کے دوران میں مسوڑھوں میں سوجن سے آنکھوں میں بھی سوجن آ جاتی ہے اور آنکھیں دھکنے لگتی ہیں، اس کے لئے اکیری فلی وین گھول یا آر جی رول گھول یا پر وٹار گھول استعمال کریں یا اپنی سلین آئی آسٹینٹ یا آریو مائی سین آئی آسٹینٹ یا ٹیرامائی سین آئی آسٹینٹ کا استعمال کریں، تفصیل کے لئے آنکھ دھکنے کا بیان ملاحظہ فرمادیں۔

یونانی علاج :- مکھن چھ ماشہ اور شہد چھ ماشہ ملا کر مسوڑھوں پر ملیں، کیشیم کی کمی کے لئے کشتہ صدف مناسب مقدار میں دیں یا نارجیل دریائی ایک تولہ، طباشیر ایک تولہ، زہر مہرہ ایک تولہ، عرق گلاب پانچ تولہ، عرق کیوڑہ دس تولہ عرق بید مشک

- پانچ تولہ پھتر کے کھل میں کھل کر لیں، خوراک ایک رتی دیں، اس سے بچہ آسانی دانت نکال لیتا ہے۔
- آیور ویدک علاج :- ۱۔ سہاگہ بریاں ایک رتی، شہد میں ملا کر دن میں دو مرتبہ مسوڑھوں پر ملیں، دانت آسانی نکل آئیں گے۔
- ۲۔ گل دھوا اور پپی، رس آنولہ میں پیس کر مسوڑھوں پر ملنے سے دانت آسانی نکل آتے ہیں۔
- ۳۔ اشوگندھا آدی چورن، کرشنا آدی چورن، گنگا دھر چورن وغیرہ بچوں کی تکالیف میں مفید ہیں، علامات کے مطابق علاج کریں۔
- بایو کیمک علاج میں کلکیر یا فاس اور کلکیر یا فلور بہترین ادویات ہیں۔

بال شوش، سوکھا مٹان، دق الاطفال، مارسمس (Marasmus)

یہ خطرناک مرض اکثر بچوں میں دیکھا جاتا ہے۔ جاہل عورتیں پرچھانواں (سایہ) کا اثر گنڈے، تعویذ اور جھاڑ بھونک کا زیادہ اعتماد کرتی ہیں، لیکن دراصل یہ مرض آنٹوں کی کمزوری اور غذا کی کمی سے پیدا ہوتا ہے۔ خاص طور پر جب بچہ کافی عرصہ تک تھے اور دستوں میں مبتلا ہے تو یہ عارضہ ہو جاتا ہے، اکثر بچے کو مٹیالے اور بدبو دار دست آتے ہیں، کبھی سبزی مائل ہوتے ہیں۔ پیٹ بڑھ جاتا ہے اور تمام بدن سوکھ جاتا ہے۔ اس لئے اس کو سوکھے کی بیماری کہتے ہیں، چونکہ یہ ایک متعدی مرض ہے۔ اس لئے اکثر مرلین بچہ سے تندرست بچوں کو اس کی چھوت لگ جاتی ہے۔ حقیقتاً یہ چھوٹے بچوں کی سل ہے، کیونکہ بڑوں کو تب دق عام طور پر پھیپھڑوں میں ہوتا ہے اور بچوں کی آنتیں مٹیلے مرض ہوتی ہیں۔ اس عارضہ میں بخار چوبیس گھنٹے رہتا ہے۔ بچے کے منہ میں چھالے اور کبھی کھانسی ہو جاتی ہے۔

علاج ڈاکٹری :- بخار کھانسی وغیرہ کی حالت میں سٹرپٹومائی سین کے مناسب مقدار میں انجکشن ہر تیسرے دن عضلاتی دیں۔ نائیدزائید اور پاس بھی عمدہ ادویات ہیں۔ اگر دست آتے ہوں تو سلفاگوئے ڈین دیں۔ اگر کھل کر آتے ہوں تو کلوروڈین بلحاظ عمر دیں، حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی کریں۔ غذا و دھنم دیں، سفیدی بیضہ مرغ، لائم واٹر، چاولوں کی بیج وغیرہ کھلائیں، جسم پر کاڈلور آئیل کی مالش کریں۔

علاوہ ازیں کیلیم کے مرکبات اور وٹامن اے، ڈی، مٹی وٹامنز نہایت مفید ہیں۔ پیٹنٹ ادویات میں کیلسی نول (Calcinol) سوکھا دسل و دق کے لئے مفید ہیں، کیلسی نول و وٹامن ڈی زیادہ موثر ہے، کیلسی نول و وٹامن (Lung) دق و سل میں خاص طور پر مفید ہیں، مقدار خوراک بلحاظ عمر دیں یا کیلیم گلوکونیٹ و وٹامن (بروز و لیم) کا استعمال کریں، بعض بچوں کی ہڈیاں بالکل کمزور اور ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، بچہ کبڑا ہو جاتا ہے، اس کے لئے اڈیکسولین یا آسٹے لین (Ostoline) دو سے تین بوند دن میں تین بار دیں۔ دق اور جسمانی کمزوری کے لئے بہت مفید ہے۔

غریب بچوں کی کمزوری غذا کی کمی ہوتی ہے۔ اگر مناسب غذا دی جائے تو بہت جلد آرام آ جاتا ہے۔ ایسے بچوں کو سوکھا کامریض نہیں سمجھنا چاہیے۔

ماڈرن ادویات :- دق کے علاج کے لئے غذا میں انڈے، مکھن، گوشت، دودھ، وٹامن اے، ڈی و کیلیم موزوں مقدار میں ہونی چاہئیں۔ اس کے علاوہ سٹرپٹومائی سین یا (Ambistryn) انجکشن روزانہ بلحاظ عمر بچے سے ہر گرام عضلاتی لگایا جائے۔ آسٹرونیکس دن میں تین بار پراگولی اور پاس (P.A.S) ٹیبلٹ ہر گولی دن میں تین بار بلحاظ عمر دی جائے۔ دودھ کے ساتھ شارکوفیرول ایکٹ چھ ضرور دینا چاہیے، انجکشن آسٹو کیلیم و وٹامن بی ۱۲ ہر تیسرے دن لگانا ضروری ہے۔ ڈی، جی، پلیکس یا بی، جی، فاس الیگزرو الیگزرو آسٹو کیلیم و وٹامن بی ۱۲ وغیرہ میں سے کوئی ایک استعمال کرانے سے بچے پر

طاقت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ بچوں کے بدن پر روعن زیتون کی مالش کرنے سے بھی اچھی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔
 بیکا ڈیکس ڈرائس (گلیکسو) دو سے پانچ قطرے روزانہ پانی میں ملا کر دیا جائے یا ٹرائی ریڈی سول پیڈ یا ٹرک ڈرائس پانچ قطرے روزانہ پانی میں ملا کر پلانا بچوں کے سوکھاپن کے لئے مفید ہے۔

۲۔ پرنے کزین الیگز (Pernexine) شیرنگ ————— ہر سے ایک چھوٹا چمچہ دن میں دو سے تین بار دیں، فولاد،
 پور (جگر)، وٹامن بی کپڈیکس وغیرہ کا مرکب ہے۔

۳۔ ایراڈول (Irradol) پارک ڈیوس ————— آٹھ دس بوند بلحاظ عمر دیں، کمزوری مسان، سوکھا، دانتوں، ہڈیوں کی کمزوری
 میں مفید ہے۔ یہ مرکب وٹامن ڈی ہے۔

۴۔ زیدی ڈرائس (Zuvidrops) زندو ————— یا اڈکیولین ڈرائس (Adexolin) گلیکسو ————— آٹھ دس
 بوند بھلوں کے رس یا دودھ میں دن میں دو بار دیں۔

۵۔ کیلیسی مائے سی ڈی (Calcima A.C.D) سپلا ————— بچوں کو بصورت شربت ہر سے ایک چمچہ دن میں دو بار دیں
 کلزانہ کا استعمال بھی مفید ہے۔

۶۔ نو ایجاد دوا بڑی روؤ دنتی پھل کاسفوف دو سے پانچ گرین بچے کو دن میں تین بار گائے کے دودھ سے دیں۔
 یونانی علاج :- مروارید ناسفہ ایک ماشہ، ورق سونا ایک ماشہ، دونوں کو روح بید مشک میں سات دن کھل کر کے خشک کریں،
 خوراک ہر سے ایک چاول ہمراہ دودھ گائے دیں۔

مروارید ناسفہ چار رتی، زہر مہرہ، حجر الیہود، نارحیل دریائی، چھلکا ہرڑ زرد، مغز کنول گٹہ، طباشیر، دانہ الائچی خورد، زیرہ گلاب (نرورد)
 ہر ایک چھ ماشہ، سب کو پیس کر عرق گلاب کے ہمراہ مونگ کے دانہ کے برابر گولیاں بنائیں، خوراک ایک سے دو کوئی ماں کے دودھ میں گھسی
 رنچے کو دیں۔

قے، دست، بخار، پیاس، سوکھا وغیرہ تمام امراض کے لئے مفید ہیں۔

امراض اطفال و کلیجی پوڈر :- بچوں کے علاج کے لئے ”موگے والا ڈاکٹر“ کے نام سے آج کل خوب اشتہار بازی ہو رہی ہے
 ان دوا خانوں میں مندرجہ ذیل تجربات استعمال کئے جا رہے ہیں، بنا کر فائدہ اٹھا دیں۔

۱۔ کلیجی پوڈر، سوڈا بائیکارب، سلفا نامائیڈ گولیاں (پوڈر) مہوزن، ایک خوراک ایک رتی سے دو رتی تک بلحاظ عمر دیں، پھوڑے پھسنی خارش
 اور فساد خون کے لئے مفید ہے۔

۲۔ کلیجی پوڈر، سوڈا بائیکارب، سلفا گوئے ڈین برابر سفوف بنائیں، خوراک دو سے چار گرین تک پیمش اور ہرے پیلے دستوں کے لئے
 مفید ہے، دن میں دو بار دیں۔

۳۔ کلیجی پوڈر، یوکونین، سفوف بنائیں، میریائی بخاروں کے لئے مفید ہے، دن میں دو بار دیں، خوراک دو گرین سے چار گرین بلحاظ عمر دن میں
 دو سے تین بار دیں۔

۴۔ کلیجی پوڈر، پور ہائی کو، سوڈا بائیکارب برابر وزن سفوف بنائیں، بدھمی، اچھارہ، پیٹ کے درد کے لئے مفید ہے، خوراک دو گرین
 سے چار گرین دن میں دو سے تین بار بلحاظ عمر دیں۔

۵۔ کلیجی پوڈر ایک تولہ، سوڈا بائیکارب ایک تولہ، طباشیر ہر تولہ، الائچی خورد ہر تولہ سفوف بنائیں، بچوں کے سوکڑے کے لئے مفید ہے،

لاکھادی تیل (شارنگدھر) :- کچی لاکھ کا دانہ، گاسے کی دہی کا پانی چار چار سیر تلوں کا تیل ایک سیر سولف آسگندہ، برادہ دا ملہ دی، کھکی، رینو کا، مروا، کٹھ، مسشی، چندان، موکھاں، راسنا ہر ایک پہ اتولہ ۔

ترکیب تیاری :- اول لاکھ میں سولہ سیر پانی میں ملا کر کاڑھا بنائیں، جب پانی جل کر چار سیر رہ جائے تب تل چھان کر تیل کو چھان لیں۔ باقی ادویہ کو بطور چٹنی پیس کر کاڑھا ملا کر نرم آگ پر پکائیں اور تیار ہونے پر چھان لیں۔

فوائد :- اس تیل کی جسم پر مالش کریں۔ اس سے دق، چھاتی کی سوجن، سوکھا مسان وغیرہ امراض دور ہو جاتے ہیں۔
بدل اسٹوکیٹیم :- پروال جسم ایک رتی، سیپ جسم دورتی، سنکھ جسم دورتی، کوڑی جسم چار رتی، کچھوے کی پیٹھ کی جسم پانچ رتی، گنودنی جسم چھ رتی کو لیموں کے رس میں تین بھاو نادیں اور خشک کر لیں۔ یہ لوگ سدھ سنگرہ کا ہے مول پاٹھ میں دودھ کا انوپان ہے، لیکن بنگلہ پان کے سورس کے ساتھ دینے سے اچھا فائدہ کرتا ہے۔

دیگر :- صدف مرواریدی اصلی، خرمہرہ زرد، سنکھ جسم ہم سیر، لیموں کے رس میں ایک ہفتہ تر رکھیں، بعد ایک ہفتہ لیموں کے رس میں کھل کر کے خشک کر کے ٹکیہ بنا کر ایک من اُپلوں کی آگ دیں، بعد میں چھان کر تین تین رتی کی گولیاں بنائیں، یا صرف کشتہ صدف کا استعمال بقدر مناسب کریں۔

ہومیو پیتھک علاج :- کلکیریا کارب (بچوں کے سوکھا یا دق الاطفال کے لئے مفید دوا ہے، جب کہ پیٹ بڑھ جائے، ٹانگیں اور بازو کمزور پتلے، بڈیاں اور جوڑ سو جگے ہوں تو مفید ہے) سلفر (بچہ باوجود نہلانے کے گندہ نظر آئے اور اس سے بو آئے، پھوڑے، پھنسیاں نکلیں، ناک سے رطوبت بہے تو مفید ہے)، ابراہیم (لاغزی زیادہ نیچے کے دھڑ میں ہو سوکھے کے مرض میں پیٹ پھولا ہوا ہو اور بخار ہو تو مفید ہے)۔

بچوں کے عام امراض کیلئے مستند نسخے

نال کا پھندا :- بعض دفعہ بچے کی پیدائش کے بعد بچے کے گلے میں نال لپٹی ہوئی آتی ہے، اس سلسلہ میں فوراً ہی دایہ کو آبشگی پھندا نکال کر نال چھیدن کرنا چاہیے، جس کا طریقہ ولادت خانہ کے بیان میں لکھا جا چکا ہے۔

نال کا ورم :- عام طور پر نال چھیدن کے بعد چند روز میں بچے کی نال خشک ہو کر جھڑ جاتی ہے۔ بعض دفعہ سوجن ہو کر رطوبت نکلنے لگتی ہے، ایسی حالت میں ڈیٹول لوشن یا کاربالک لوشن سے دھو کر آئیڈوفارم بورک ایڈ میں ملا کر جھڑک کر باندھ دیں۔ یا سپاری، سفیدہ کا شغری، دم الاخوان، سنگ جراحی برابر وزن پیس کر تلی کے تیل میں ملا کر لگائیں۔

ناف پھولنا :- پہلے تین ماہ میں بچوں کی ناف باہر کو ابھرتی ہے، ایسی حالت میں سیسہ کا ٹکڑا یا سرمہ پوٹلی میں باندھ کر ناف پر رکھ کر سچی باندھنا چند روز میں ناف کو اصل حالت پر لے آتا ہے۔

سوتے میں دانت پھینا :- یہ عارضہ اکثر انٹریوں کے کیڑوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جن کا بیان پیشتر ازیں کیا جا چکا ہے۔
منہ پکنا :- سہاگہ بریاں ایک حصہ، شہد چھ حصہ ملا کر پھیری سے لگائیں یا بورک گلیسرین کا استعمال کریں زیادہ تکلیف یا بخار کی حالت میں سلفاڈایازین کا استعمال کیا جائے۔

ملیریا بخار :- یوکونین ایک سے دو گرین ہر چار گھنٹہ بعد دیں یا کلورو کوئین شربت دیں۔
اگر پیٹ میں درد ہو یا ابھارہ ہو تو یوکونین دو گرین، پلور یہائی کوہا اگرین، سوڈا بائیکارب ایک گرین، سب کو ملا کر ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین بار دیں۔

دسی علاج میں آئس بارک پسی ہوئی ایک تولہ، چینی ایک تولہ، سفوف بنائیں، خوراک ایک رتی ہمراہ پانی یا عرق کاؤ زبان دن

میں تین بار دیں۔

معیادی بخار :- کادرو مائی سٹین پالمی ٹیٹ یا سنتھو مائی سٹین پالمی ٹیٹ بلحاظ عمر چائے کا ایک چمچہ دن میں تین یا چار بار دیا جائے یا آریو مائی سین کا ایک کیپ شول، گلوکوز ایک ڈرام میں ملا کر آٹھ یا دس خوراک بنائیں اور دو سال کے بچے کو دن میں چار بار دیں۔ معیادی بخار کے علاوہ نمونیہ، پچیش، دست، کھانسی اور سرسام وغیرہ عوارضات کے لئے بھی نہایت مفید ہے۔
 خسرہ :- مفصل بیان خسرہ بالغان میں دیکھیں، بچہ کو سردی سے محفوظ رکھیں، سپٹران شربت یا سلفا ڈایازین ۲ گولی عمر کے مطابق کم و بیش تین خوراک بنا کر دن میں تین بار دیں۔

دلیسی علاج میں عناب، انجیر تین تین دانہ، موہیز منقہ پانچ دانہ، خاکسی تین ماشہ پانی میں جوش دے کر چینی یا شربت عناب ملا کر پلائیں، کمزوری کی حالت میں خمیرہ مروارید دیں، تبض کی حالت میں گلیسرین کی بتی یا گلیسرین کی پچکاری کریں۔ اگر خسرہ کے ساتھ نمونیہ ہو جائے تو با احتیاط مینی سلین کے بلحاظ عمر انجکشن کئے جائیں یا سپٹران شربت دیں۔

چیچک :- بطور حفظ ماقدم بچے کو چیچک کا ٹیکہ لگوایا جائے۔ جب مرض ہو جائے تو کوئی علاج موثر ثابت نہیں ہوتا۔ بطور علاج سلفا گروپ میں سے سلفا ڈایازین کا بلحاظ عمر استعمال کیا جائے، دانوں میں سٹرن یا زخم پیدا نہ ہونے دیں، جسم کو روزانہ صاف کپڑے اور گرم پانی سے صاف کریں۔ آنکھوں کو تندرست رکھنے کے لئے مینی سلین آئی آسٹیمینٹ یا ٹیرامائی سین آئی آسٹیمینٹ یا آریو مائی سین آئی آسٹیمینٹ کا استعمال کیا جائے، دانوں کو پوٹاسیم پرمینگنیٹ کے ہلکے گھول سے صاف کرنا چاہیے، منہ صاف رکھنے کے لئے نمک خور دنی گرم پانی میں گھول کر غرغزے کرائیں۔

یونانی علاج میں خمیرہ مروارید ۲ سے ایک ماشہ ہمراہ عرق گاؤ زبان دیں۔
 خسرہ اور چیچک کے بخار میں جلاب ہرگز نہ دیں۔ ادرنہ ہی خون کو ٹھنڈا کرنے والی غذا دیں، قدرتی علاج میں انجیر کا پانی اور مرض کا موثر علاج ہے۔

آیور ویدک و ہومیو پیتھک علاج کے لئے چیچک کا بیان دیکھیں۔
 ہڈیوں کا ٹیڑھا ہو جانا :- وٹامن بی نہایت مفید ہے۔ کاڈور آئیل یا ڈیکھولین اس مرض کا موثر علاج ہے۔ قدرتی علاج میں بچہ کو کچھ وقت دھوپ نکلتے وقت ننگا رکھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت سورج کی کرنوں میں الٹرا وائیٹ ریز کی بہتات ہوتی ہے جو کساح (Rickets) کا موثر علاج ہے۔

بچے کا یرقان :- وٹامن بی ۱۲ کا استعمال مفید ہے۔ وٹامن بی کمپلیکس، فولاد، پوریکسٹریکٹ وغیرہ کے مرکبات ہیں۔ کمزوری جگر و جگر بڑھ جانا :- لیورجن (Livergen) کا استعمال مفید ہے۔ وٹامن بی ۱۲ بھی جگر کی کمزوری کا موثر علاج۔ آیور ویدک علاج میں کماری آسو ولوہ آسو کا استعمال کریں۔

یونانی علاج میں کشتہ فولاد کا استعمال مفید ہے، (تفصیل کے لئے دیکھیں ضعف جگر بالغان مندرجہ تاج الحکمت)۔
 زیادتی پیاس :- اگر موسم گرم ہو تو گلوکوز ایک ڈرام، پانی دو ادس، مقوڑا مقوڑا پلائیں۔ دودھ میں قدرے آتش جو ملا کر پلائیں کنول گٹہ شدہ نیم کو فنتہ بچے کے پانی پینے کے برتن میں ڈال دیں، اس سے زیادتی پیاس کا عارضہ دور ہوگا۔
 بچے کا یرقان :- گلوبز پڑ تو لہ، پانی میں جوش دے کر صاف کر کے پلائیں۔
 بچہ کی ماں کو شربت دینار دو تولہ عرق مکود کا سنی میں ملا کر دیں، فولاد اور پوریکسٹریکٹ کے مرکبات، وٹامن بی ۱۲ کا استعمال مفید

تشنج :- کلورل ہائیڈریٹ دو ڈرام، شربت سادہ پانچ اونس ملا لیں، بلحاظ عمر صرف چھوٹا بچہ دیں، چند خوراکیوں سے تشنج دور ہوگا۔ دن میں تین بار سے زیادہ نہ دیں۔

علاوہ ازیں پوٹاشیم برومائیڈ اور کلورل ہائیڈریٹ کا استعمال بھی مفید ہے، بلحاظ عمر استعمال کیا جائے۔
بستر پر پیشاب کرنا :- عموماً یہ مریض بڑے ہونے کے بعد خود بخود غائب ہو جاتا ہے، سونے سے پہلے بچے کو پیشاب کرائیں، مندرجہ ذیل مجربات اس مرض کا موثر علاج ہیں :-

- ۱۔ تل کاٹے، ۱۰ جوائن برابر ملا کر گڑ کے ساتھ لٹو بنائیں اور بچہ کو دو یا تین ماشہ کھلائیں۔
- ۲۔ تل کاٹے بھون کر گڑ کے ساتھ لٹو بنائیں اور بچہ کو کھلائیں۔
- ۳۔ تلوں کی گجک یا خشخاش کے لٹو کھلائیں۔
- ۴۔ کندر پھول انار ہر ایک ۴ ماشہ، مصطکی رومی ۳ ماشہ، پیس کر شہد کے ساتھ معجون بنائیں، بچوں کو تین یا چار ماشہ دیں۔
- ۵۔ جڑ پان باریک پیس کر تین گنا شہد کے ساتھ معجون بنائیں اور ایک سے دو ماشہ صبح و شام دیں۔
- ۶۔ خشخاش سفید برابر مصری کے ساتھ سفوف بنائیں اور دو سے تین ماشہ عمر کے مطابق کھلائیں۔
- ۷۔ نخود بریاں ہمراہ شکر تری بموزن پیس کر پانچ ماشہ استعمال کرائیں۔
- ۸۔ مغز اخروٹ ایک حصہ، کشمش دو حصہ، بقدر دو حصہ کھلائیں۔

پیشاب کا بند ہو جانا :- اس مرض میں بچے کا پیشاب بند ہو جاتا ہے، مندرجہ ذیل نسخہ جات اس مرض کا موثر علاج ہیں :-

- ۱۔ نوشادر پھلی دورقی، دو تولہ پانی میں حل کر لے چھ خوراک بنائیں اور بچہ کو چھ چھ پلائیں۔
- ۲۔ جو کھار، نوشادر پھلی برابر وزن لے کر ایک رتی سے دورقی بلحاظ عمر دیں۔
- ۳۔ گرم پانی کی دھار مقام مشانہ پر ڈالیں، پیشاب جاری ہو جائے گا۔
- ۴۔ مولی کا رس چھ چھ پلانے سے پیشاب کھل جاتا ہے۔
- ۵۔ گل میسو (کیسو پھول) دو تولہ کو پانی میں اُبال کر مشانہ پر گرم گرم ٹکڑے کریں۔ اگر سلفا ڈرگز کے استعمال سے پیشاب بند ہو تو یہ بند کر دیں۔ اگر ادویات سے پیشاب جاری نہ ہو تو باریک کستھی ٹر کو پانی میں اُبال کر ٹنڈا کر کے تیل سے چکنا کر کے پیشاب کی نالی میں نرمی و آہستگی سے داخل کر کے پیشاب خارج کر دیں۔

نوزائیدہ بچے کے آبلے :- اس مرض میں بچے کے جسم پر آبلے یا چھائے نکل آتے ہیں، جن میں پانی بھرا ہوتا ہے۔ یہ سخت چھوت دار مرض ہے۔ پنی سلین کریم دن میں دو یا تین بار لگائیں یا سلفا ڈائزین، بورک ایسڈ، زنک اوکسائیڈ ہر سہ مناسب مقدار میں ملا کر آبلوں پر چھڑکیں۔
دلیسی علاج میں موم سات ماشہ، روغن گل چودہ ماشہ میں ملائیں اور سفیدہ کا شغری اکیس ماشہ چھان کر اور قد سے کافور ملا کر آبلوں پر لگائیں۔

بچہ کی آنا :- یہ عارضہ اکثر بد منجی واپھارہ سے ہوتا ہے۔ اس کے مطابق علاج کریں، شہد چٹائیں۔ عرق سولف یا عرق سویہ دیں یا سولف اور چینی سفوف بنا کر چٹائے رہیں۔ مندرجہ ذیل نسخہ جات میں سے کسی ایک کا استعمال کریں :-
۱۔ نار جلی کی چوٹی جو بالوں کی طرح ہوتی ہے۔ آگ میں جلائیں اور اس خاکستر کو پانی میں ملائیں، جب خاکستر نشین ہو جائے تو

چھچھچھ نھار کر پلائیں۔

۲۔ پودینہ خشک پیس کر چینی ملا کر بچہ کو چٹائیں۔

۳۔ شدید صورتوں میں کلورل ہائیڈریٹ ایک گرین، پوٹاشیم برومائیڈ دو گرین پانی میں گھول کر بلجائے عمر دیں۔
کو اکرنا :- اس مرض میں کو اڈھیلا ہو کر لٹک جاتا ہے، بار بار خشک کھانسی آتی ہے، بعض دفعہ کھانسی کی حالت میں قے

اور متلی بھی ہوتی ہے۔

۱۔ آرن کلیسرین کو کوئے پر لگائیں۔ بنکین گرم پانی کے غزغزے کریں۔

۲۔ چوہے کی مٹخ مٹی کو پیس کر نیم گرم کر کے نہار منہ کوئے کو دبائیں۔

۳۔ چوہے کی مٹخ مٹی، کونپل درخت بکائن پیس کر تالو پر لگائیں اور مازو و طباشیر کو پیس کر کوئے پر چھڑکیں۔

اگر ان تدابیر سے آرام نہ ہو تو بذریعہ آپریشن تھوڑا سا کٹوا دیں۔

نیند میں ڈر جانا :- عود صلیب اور جدوار ایک ایک رتی پیس کر خمیرہ گاؤزبان عنبری ایک ماشہ میں ملا کر کھلائیں اور اوپر سے عرق گاؤزبان دو تولہ دیں۔

اگر آنتوں میں کڑے ہوں تو اس کا علاج کریں۔ بلجائے عمر پوٹاشیم برومائیڈ کا استعمال بھی مفید ہے۔

کزاز (ٹے ٹے نس) :- ٹے ٹے نس انٹی ٹاکسک سیرم بلجائے عمر فوراً عضلاتی انجکشن کریں، تشنجی حالت میں پوٹاشیم برومائیڈ کا

استعمال کیا جائے۔ شدت مرض کی حالت میں بچے کو ہسپتال میں داخل کرانے کا مشورہ دینا چاہیے۔

دسی علاج میں قبض کی حالت میں کیسٹرائیل و شہد تیس تیس بوند ملا کر چٹائیں اور اسطرح دس ایک ماشہ جوش دے کر صاف کر کے چھچھ کر کے پلائیں یا جندبید ستر اصلی ایک رتی باریک پیس کر شہد میں ملا کر چٹانا مفید ہے۔

کن پیرے (ممپس) :- خوراک کی طور پر بلجائے عمر سلفا ڈائزین یا سیپٹران سیرپ دیں۔ مرض کی شدت ہو تو سٹریپٹومنیسلین کے عضلاتی انجکشن دیں۔ امتیاس کا گودانیم گرم پانی میں حل کر کے چھان کر اس کے غزغزے کرائیں۔

خناق وبائی (ڈفٹیریا) :- بطور حفظہ ماتقدم اور علاج کی حالت میں بھی بلجائے عمر ڈفٹیریا انٹی ٹاکسک سیرم کے عضلاتی انجکشن دیں خناق وبائی کے ساتھ دوسرے عوارضات بھی ساتھ ہوں تو مینیسلین کے عضلاتی انجکشن مناسب مقدار میں دیئے جائیں، دل کمزور ہو تو مقوی


قلب ادویہ دیں۔

نوٹ :- مردانہ و زنانہ امراض کے علاوہ بچوں کو عام طور پر وہ امراض ہوتے ہیں، جو بڑی عمر کے لوگوں کو ہو سکتے

ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دوا کی مقدار خوراک کم رکھی جاتی ہے۔ دوا کی خوراک مقرر کرنے کا عمل اس باب کے شروع میں دے دیا گیا ہے۔ دوا کی مقدار خوراک مقرر کرنے کے لئے نہایت قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے خصوصاً زہر پلا اثر و کمزور کرنے والی

ادویات میں احتیاط لازمی ہے! ————— مصنف





اٹھار ضوال باب

جلد (کھال) کی بیماریاں

گھاؤ۔ زخم۔ السرز، (Uleesirs)

تعریف مرض :- یہ تیز دھار آ لے یا سوجن یا خراش سے ہو جاتے ہیں۔
 وجوہات :- تیز دھار آ لے یا چاقو یا بلیڈ کا لگنا، لالھی کا وار یا کسی اور وجہ سے زخم ہو جاتا ہے۔
 علامات :- مقام زخم پر درد ہوتا ہے، خون بہتا ہے، سوجن ہوتی ہے اور زیادہ تکلیف کی حالت میں بخار بھی ہو جاتا ہے۔
 ایلو پیٹھک علاج :- تازہ زخموں کے اصول علاج میں صفائی رکھنا اور انٹی سپٹک ادویہ کا استعمال کرنا نہایت ضروری ہے۔ اگر زخم کا انگوڑ بڑھنے سے رک جائے اور کنا سے سخت ہو جائیں، تو کاربالک ایڈ سے کناروں اور گندی جگہ کو جلانا مناسب ہے، تاکہ زخم نیا ہو کر بھرنے لگ جائے۔

اگر سوجن ہو تو اس کو آئیوڈکس یا ٹینکچر آئیوڈین لگا کر دبائیں، اگر اس سے سوجن نہ دبے تو پھر اسی وغیرہ کی پٹس سے پکانا چاہیے۔
 جب ورم پک جائے تو پھوڑنے والی مرہیں یا شتر سے شگاف دینا ہی موثر علاج ہے اور پھوڑے و زخم کو صاف کرنے کے بعد انٹی سپٹک ادویہ کا استعمال کرنا چاہیے۔

زیادہ تکلیف کی حالت میں کھانے کے لئے بھی مصفی خون ادویہ کا استعمال کیا جانا ضروری ہے، پرانے زخم جو ناسور کی شکل میں ہوں ان میں دوائی بذریعہ ڈراپریاتی پہنچائی جائے۔

پیللا گھول :- اکیری فلی وین دو گرین، سپرٹ میٹھی لیٹیڈ دو ڈرام، صاف پانی دو ڈرام، آپس میں ملا لیں، گندے زخموں کو صاف

کرنے اور بھرنے کے لئے مفید ہے۔

کاربالک آیل :- کاربالک ایسڈ ایک ڈرام، تیلوں کا تیل ۱ اونس، آپس میں ملا لیں، گندے زخموں کو صاف کرنے اور بھرنے میں از حد مفید ہے۔

ٹینکچر آئیوڈین :- آئیوڈم ۱۶ ماشہ، پوٹاسیم آئیوڈائیڈ ۸ ماشہ، سپرٹ ایٹھی لیٹیڈ ایک پونڈ، پہلی دونوں دواؤں کو قدرے پانی میں حل کر کے سپرٹ ملا لیں، حسب ضرورت مقامِ مایوف پر پھیری سے لگائیں، رگڑ لگنے، چوٹ لگنے اور سوجن کے لئے بیرونی استعمال کے لئے مفید ہے۔

ایکری فلے وین مرہم :- ایکری فلے وین ۲ ماشہ، ویزلین سفید ۵ تولہ، دونوں کو ملا لیں، زخموں پر لگانے کے لئے بہت مفید ہے پیپ وغیرہ دور ہو کر زخم جلد درست ہو جاتے ہیں۔

دیگر :- بورک ایسڈ ۲ ڈرام، زنک اوکسائیڈ ۲ ڈرام، لینولین ایک اونس، ویزلین سفید ایک اونس، ایکری فلے وین ۸ گرین، گلیسرین ایک ڈرام۔

ترکیب تیاری :- پہلے مرہم بنانے والی پلیٹ پر مرہم و گلیسرین پھیلا کر اوپر ایکری فلے وین کو چھری سے حل کریں۔ اب بورک و زنک ملا کر لینولین اور ویزلین شامل کر کے چھری سے خوب حل کریں۔ زرد رنگ کی مرہم تیار ہوگی۔

مرہم جست :- زنک اوکسائیڈ (کشتہ جست) دو تولہ، ویزلین سفید یا زرد میں ملا کر مرہم تیار کر لیں اور جس زخم کو خشک کرنا ہو، وہاں لگا دیں، زخم جلد مندمل ہو جائے گا۔ یہ ذائد ایکری فلے وین مرہم کے نسخہ سے حاصل ہوتے ہیں۔

فوائد :- زخم و پیپ کو خشک کر کے جلد مندمل کر دیتا ہے۔ تازہ زخم کا خون بند ہو جاتا ہے، جلن اور درد دور ہو جاتی ہے، کٹی ہوئی انگلی کی ہڈی جڑ جاتی ہے۔ نازک جگہ کے زخم بلا تکلیف اچھے ہو جاتے ہیں۔ آشوب چشم میں سلامتی سے آنکھ میں لگائیں۔ چوڑوں و پھیسوں کے لئے بھی مفید ہے۔

انٹی سپٹک مرہم :- بورک ایسڈ ایک ڈرام، سلفا نامائیڈ پوڈر ایک اونس، ویزلین ایک اونس، مرہم بنانے والی پلیٹ پر مرہم بنائیں، جلدی امراض میں ہر قسم کے نئے و پرانے کے زخموں کے لئے مفید ہے۔

اکتھول گلیسرین :- ایکٹرٹیکٹ بیلٹا ڈونا دو ڈرام، کیمفر ۳ گرین، اکتھول ۲ ڈرام، گلیسرین ۶ ڈرام، سب ادویات شیشی میں حل کر کے رکھیں اور پھیری سے سوجن و درم پر بیرونی لگائیں۔ اگر بچہ دانی کی سوجن کے لئے استعمال کرنا ہو تو اکتھول ایک حصہ، گلیسرین ۲ حصہ بیرونی طور پر استعمال کریں۔

بورک گھول :- ایسڈ بورک ۳۲ گرین، آبلتا ہوا پانی ۴ اونس، زخموں کو دھونے کے لئے مفید ہے اور درد کو آرام دیتا ہے۔ ڈیٹول گھول :- ڈیٹول ایک چھوٹا چمچ، صاف پانی دس اونس، اس سے زخموں کو دھوئیں، نہایت عمدہ جراثیم کش و شش ہے۔ لائی سول گھول :- لائی سول ۱۲۰ گرام، صاف پانی ۲۰ اونس، زخم دھونے کے لئے بہترین جراثیم کش و شش ہے۔

پوٹاسیم پرمینگنیٹ گھول :- پوٹاسیم پرمینگنیٹ ۲ گرین، صاف پانی ایک اونس، بہترین جراثیم کش گھول ہے۔ گلیسرین آئیوڈو فارم :- آئیوڈو فارم ۵ گرین، گلیسرین ۴ ڈرام، زخموں پر لگائیں، میڈیکل کالج ہسپتال کلکتہ کا نسخہ ہے۔

گلیسرین آئیوڈین :- آئیوڈین ۱۰ گرین، پوٹاسیم آئیوڈائیڈ ۳۰ گرین، گلیسرین ایک اونس، میڈیکل کالج ہسپتال کلکتہ کے فارما کوپیلا کا نسخہ بیرونی استعمال کرنے سے درم کے لئے مفید ہے۔

پینٹ ادویات :- مندرجہ ذیل ادویات زخموں کے لئے نہایت مفید ہیں :-

۱۔ سبازول پوڈر (Cibazool Powder) :- ہر قسم کے زخموں اور جراثیمی امراض کے لئے بیرونی طور پر استعمال کے لئے بہت مفید ہے۔

۲۔ سافا کرائن (Solfa Crine) :- یہ سے اینڈ بیکر کا تیار کردہ پوڈر سلفا مٹھایا زول اور امائی ناکرائن (Amina Crine) سے مرکب ہے جو زخموں کے لئے بطور انٹی سپٹک استعمال کیا جاتا ہے۔

علاوہ ازیں فیلو وچل (Flavogel) مرہم لیکسو کمپنی یا مائی سٹریپٹون آسٹینٹ (Mystrepton Ointment) ساختہ گلیکسو کمپنی زخموں کے لئے بیرونی استعمال کے لئے مفید ہے۔

۳۔ بستہ کے زخم (Bed Sores) :- مرہم کو کروٹ بدل کر لٹاتے رہیں۔ اگر مرہم کمزور اور مرض لمبا غرضہ چلے، تو اس کے نیچے ہوائی تھکے رکھیں اور زخموں پر یہ پوڈر چھڑکیں :-

کیمفر پوڈر، گرین، بورک، ایڈ دوڈرام، زنک اوکسائیڈ دوڈرام، سٹارچ چارڈرام بطور ڈسٹنگ پوڈر استعمال کریں۔ گرمی والوں اور بستری زخموں کے لئے مفید ہے۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ ڈوسولین (Dosullin) گیگی ————— سلفا نامائیڈ کا بہترین بدل ہے۔ زخموں کو پھوڑے پھینچنے میں میند ہے۔ ٹیکہ کی صورت میں دیں، جھوٹے بچور کو لبورت سیال دیں یا سپرٹان گولیاں یا شربت دیں۔

۲۔ فنانسل (Fanasil) ریش ————— سلفا نامائیڈ معالجہ کی یہ نئی دوا پھوڑے پھینسی، اُسترے کی جھوت، ورم، سوزش و زخموں کو جلد بھرنے میں مفید ہے۔ ایک گرام کی خوراک دیں۔

۳۔ ایف کارلین معہ نیو ماڈسین مرہم (گلیکسو) لگائیں۔ یہ زراب زخموں میں بہت ہی مفید ہے۔

۴۔ کرسٹاپن مرہم (Crystapen) گلیکسو ————— یہ بنزائیل پنی سلین مرہم ہے۔ جلنے، زخم اور کٹے میں لگانے سے جلد فائدہ کرتی ہے۔

۵۔ کرائس (Crys) سارابائی ————— یہ پنی سلین کے انجکشن ہیں۔ جن میں پروکین پنی سلین جی اور کرسٹالین سوڈیم پنی سلین جی ہیں۔ عام طور پر کرائس ۱ چار لاکھ یونٹ استعمال ہوتے ہیں۔ بطریق معروضہ عضلاتی انجکشن لگائیں۔

۶۔ نیباسلف (Nebasulf) ڈومیکس ————— یہ ایک اعلیٰ انٹی بائیوٹک ہے، جو زخموں میں مواد پڑنے، پریپ وغیرہ آنے، پپڑی جھنے میں بہت مفید ہے۔ جلد کے استعمال کرنے کی مرہم کے لئے استعمال کریں، آرام آجائے گا۔

۷۔ ڈائی کرسٹی سین (سٹریڈ پنی سلین) کا ہر ۲ گھنٹہ بعد ایک عضلاتی انجکشن کریں۔ زخم بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔

۸۔ پیلوین (گلیکسو) ۵۰ ملی گرام، ریڈرکان (روش) ۵۰۰ ملی گرام۔ یہ مرکب دوا زبان کے زخم و سوجن کے لئے مفید ہے۔ وٹامن بی ۱۲ اور وٹامن سی کی خامی کو دور کرتا ہے، سرائیت کے لئے ٹرائی سین کیپ شول دیں۔

۹۔ ٹرائی سین جلد کی مرہم ہے مگر اس سے زخم پر پٹی باندھیں اور ٹرائی سین (مرکب شارپ ڈوم) ۲۵۰ ملی گرام، ریڈوکان (روش) ۵۰۰ ملی گرام، دونوں کو ایک ساتھ پانی کے ہمراہ کئی دن دیں۔ یہ دافع سرائیت علاج زخم کو جلد مندمل کر دیتا ہے۔

۱۰۔ ڈائی کرسٹی سین (سارابائی) چار لاکھ یونٹ، ڈسٹلڈ واٹر دو سی سی، دونوں کو باہم گھول کر سرخ بھر کر ہر ۲ گھنٹہ بعد عضلاتی انجکشن کریں۔ یہ ایک انٹی بائیوٹک علاج سے۔ بوزمریلے زخموں کے لئے از حد مفید ہے۔

- ۱۱۔ سلفا کرائن (Sulfacrin) مے اینڈ بیکر ————— یہ پوڈرز زخموں کے لئے انٹی سیپٹک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
- ۱۲۔ فلیووجل (Flavوجل) گلیکسو ————— یہ ایکری فلے وین سے تیار شدہ مرہم ہے، انٹی سیپٹک ہے۔ زخموں کو جلد بھرتی ہے، یہی دوا بولس فلے والٹون کے نام سے بیچتی ہے۔
- ۱۳۔ مائی سٹریپٹون آئینٹمنٹ (Mystrepton Oint) گلیکسو ————— یہ سوڈیم پینی سلین جی اور ڈائی ہائیڈرو سٹریپٹون مائی سین سے بنی مرہم ہے۔ ملی جلی مریضوں میں مفید ہے۔
- ۱۴۔ نیو بیکرین آئینٹمنٹ (Neobacrin) اسٹری کے زخموں پر لگائیں۔
- ۱۵۔ فیوراسن مرہم (Furacin Ointment) ایس کے ایف ————— یا انٹی سیپٹک کریم (مے اینڈ بیکر) یا شیلڈ کریم (ایس کے ایف) لگائیں۔
- ۱۶۔ ٹیرامائی سین (ایس کے ایف) یا ہوسٹا سائیکلین یا ٹریڈ اسائیکلین ایک کیپ شولز مسج و شام تازہ پانی سے دیں۔ زہریلے زخموں میں مفید ہے۔

یونانی علاج :- زخم وغیرہ سے جب گوشت کے اجزاء الگ ہو جائیں اور اس مقام پر پیپ نہ پڑی ہو تو اسے زخم کہتے ہیں۔ زخم کے شروع ہونے میں یہ خیال رکھیں کہ اس میں کوئی بیرونی چیز داخل نہ ہو جائے۔ زخم کے ہونٹوں کو ملا کر باندھ دیں۔ اگر باندھنے سے اس کی نیس نہ ملتی ہوں تو سوئی سے سہی کر ملا دیں۔

ذیل کی ادویہ ہر قسم کے زخموں کے لئے مفید ہیں۔

- ۱۔ کیکر کے پتے زیرہ سفید کے ساتھ پیس کر زخم پر باندھیں، زخم کو صاف کر کے اچھا کر دیتے ہیں۔
 - ۲۔ کندر، صبر، انزروت، دم الاخوان، موزن باریک پیس کر زخم پر چھڑکیں۔ یہ گوشت کو پیدا کرتا ہے اور زخم کو اچھا کرتا ہے۔
 - ۳۔ گل انار، زردرد، کندر، مرکبی موزن باریک پیس کر زخم پر چھڑکیں، نہایت سریع الاثر ہے۔
 - ۴۔ اگر زخم میں کیڑے پڑ جائیں تو افستین باریک پیس کر نمک ملا کر چھڑکیں اور روغن نیم پھریری سے لگائیں۔
- زخموں کے لئے عجیب و غریب سفوف :- یہ سفوف آیوڈو فارم سے بھی زیادہ مفید ہے، آگ کے پتے سایہ میں خشک کر کے (کچھ تر ہوں) ہنڈیا میں ڈال کر پیچے اور پانچ سیراپوں کی آگ دے کر نکال لیں، اب سیاہ رنگ کی راکھ کو پیس لیں، اور کپڑے سے چھان لیں، ہر قسم کے زخموں پر پوڈر کی طرح چھڑک دیں، زخموں کو مندل کر کے بھر لاتی ہے، مکھی نہیں بیٹھتی۔
- سودیشی آیوڈین :- شراب خالص ایک پونڈ، کید دس تولہ۔ کید کو شراب دسی میں ڈال کر چار دن تک مضبوط کارک لگا کر بوتل کو دھوپ میں رکھیں، اس کے بعد کھدر کے کپڑے سے چھان کر محفوظ رکھیں۔ زرد رنگ کا سودیشی ٹنگر آیوڈین تیار ہے، اگر شراب کی بجائے سپرٹ میٹھی لیٹڈ ڈال دیں، تو بھی پورا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔
- نوائڈ :- ولایتی ٹنگر آیوڈین سے بہتر ہے۔ پھوڑے، پھنسیاں، تازہ زخم اور پرانے زخم پر لگائیں، خون بند کرنے میں ٹنگر ٹیل سے بھی زیادہ سریع الاثر ہے۔

مرہم نیم :- موم سفید سات ماشہ، گھی گائے چھ تولہ، گھی کو آگ پر رکھیں۔ پھر نیم کی تازہ چتی مناسب مقدار میں گھوٹ کر ٹنگی بنا کر اس گھی میں ڈال دیں، یہاں تک کہ پتے جل جائیں اور سیاہ رنگ کا گھی رہ جائے، پھر موم داخل کر کے مرہم بنا کر محفوظ رکھیں۔ ہر قسم کے زخموں و نواسیر کے لئے مفید ہے۔

برنول کے مقابلہ کا فارمولا :- جست پھلا ہوا پانچ تولہ، تیل اسی بیس تولہ، کافور ایک تولہ، رال سفید پانچ تولہ، موم سفید پانچ تولہ۔ پہلے تیل و موم کو گھٹالیں، چھان کر رال حل کریں۔ اس کے بعد باقی اشیاء ملا کر مرہم بنائیں اور زخموں پر لگائیں۔ آگ سے جلے زخم کے لئے مفید ہے، پیلا کرنا ہو تو تیلوں والا پیلا رنگ ملا لیں۔

آپور ویدک علاج :- بطریقی نانی طریقہ علاج کے کریں۔
ہومیو پیتھک علاج :- ہیرسلفر، بیلادونا، مرکوریس، سلیشیا، فیرم فاس، کلکریا کارب بہترین ادویات ہیں۔
غذا و پرہیز :- زود مضام و مقوی غذا دیں، زیر مضام اغذیہ سے سخت پرہیز کرائیں۔

بزن، پھنسی، پھوڑا، بال ایب سس، (Boil-Abscess)

تعریف مرض :- اکثر موسم برسات یا موسم گرما کے آخر میں پھنسیاں یا پھوڑے نکل آتے ہیں۔ وجوہات :- خرابی خون سے یہ عارضہ پیدا ہو جاتا ہے جسم میں لکچل ہونے سے بھی یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ علامات :- پھنسی کی صورت میں جلد پر سوجن ہوتی ہے۔ اگر پھنسی میں بال نظر آئے تو اس کو کھینچ کر باہر نکال لیں، پھوڑے کی حالت میں شروع میں مقام ماؤف سرخ، متورم اور گرم ہوتا ہے۔ ورم میں میس اور درد بھی ہوتا ہے، اس کے بعد پیپ پڑ کر نرم ہو جاتا ہے اور کسی طرف منہ بنا لیتا ہے، پھوڑے کی خاص شناخت یہ ہے کہ اگر پھوڑے کے ایک طرف ہاتھ جما کر رکھیں اور دوسری طرف ایک یا دو انگلیوں سے ٹکرائیں تو ایک لہر محسوس ہوتی ہے۔ یہ لہر رسولیوں اور ورموں میں نہیں ہوتی۔

علاج ڈاکٹری :- پھنسی کی حالت میں اکٹھی اول آسٹیمٹ ۲۵ فیصد طاقت والی لہٹ پر لگا کر باندھیں، پھنسی کا مواد تندرست جگہ پر نہ لگنے دیں۔ مریض کے پیشاب کی جاسخ کی جانی بھی ضروری ہے، کیونکہ مرض ذیابیطس شکاری کی وجہ سے اکثر یہ مرض ہو جاتا ہے اور ایسی حالت میں اصل مرض یعنی ذیابیطس کا علاج کرنا ضروری ہے، اس سلسلہ میں آنتوں کا فعل بحال کریں اور غذا میں ہری تر کارباں کھلائیں۔ شکر بند کر دیں۔ پروکین مینی سلین کا استعمال بلحاظ عمر نہایت مفید ہے، شروع مرض میں یعنی پھوڑا پرنکچر ایوڈین یا ایوڈکس لگاتے رہیں۔ اگر اچھانہ ہو تو انسولی کی پکٹس دو انگشت موٹی چار بار دن میں لگائیں، جب پھوڑا پھوٹ جائے تو پھر زخم کو صاف کرنے و بھرنے کے لئے کالی مرہم (جس کا نسخہ آگے دیا گیا ہے) کا استعمال کریں، اگر خود بخود منہ بننے اور پھوڑا پختہ ہو کر پیلا ہو جائے تو شکاف دینا چاہیئے اور بطریق معروف ڈرلنگ کی جائے۔

مرض کی شدت میں سلفا گروپ، سیپٹران گروپ اور مینی سلین نہایت مفید ہے۔

پھوڑے کو جلد پکانے اور درد کو تسکین دینے کیلئے نیم گرم بورک گھول کی ہر چندہ منٹ بعد ٹکڑے مفید ہے، مقام ماؤف پر سپرٹ میٹھی لیٹیڈ لگانی بھی ضروری ہے، ورنہ ٹکڑے سے نزدیکی حصوں میں چھوٹ لگنے کا ڈر ہوتا ہے۔

بغل کے پھوڑے (کچھالی) نہایت تکلیف دہ مرض میں شمار کئے جاتے ہیں، کیونکہ چھوٹ لگنے سے یہ بار بار ہوتے ہیں بالوں کو اترنے سے صاف کر کے کسی ہلکے انٹی سٹیک گھول سے صاف رکھنا چھوٹ لگنے سے بچاؤ کے لئے مفید ہوتا ہے، دھیان سے ہے کہ ہونٹوں کے پھوڑوں کو نہیں دبانا چاہیئے، کیونکہ اس کی چھوٹ دماغ تک پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔

سٹنٹ ادویات میں سٹفلو کاکس ویکس کا ٹیکہ ایک سی سی ہفتہ میں ایک بار مفید بیان کیا گیا ہے، علاوہ ازیں سٹنا کسائل

(Stanoxyl) کی گولیاں بھی مفید بتائی گئی ہیں۔

ماڈرن ادویات :- سلفاڈایازین (Sulphadiazine) مے اینڈ بیکر ————— دو دو ٹکیاں دن میں تین سے چار بار پانی سے دیں، معمولی مقدار میں سوڈا بائیکارب بھی ملا لیں یا سپٹران گولیاں دیں۔

۲۔ اوری سل (Orisul) سبا ————— دو ٹکیہ صبح و شام دو دن بعد میں ایک ٹکیہ دن میں دو بار دیں۔

۳۔ میڈری بون (Madribon) روش ————— پہلے دن دو ٹکیاں، بعد میں ایک ٹکیہ ہر روز دیں۔

۴۔ ڈوسلفین (Dosulfon) گیگی ————— پہلی خوراک دو ٹکیاں، بعد میں ایک ٹکیہ دن میں تین بار تازہ پانی سے دیں اور چوتھے دن ایک یا دو بار لیں۔

۵۔ لیڈرکین (Lederkyn) لیڈرے ————— سلفا ادویات کی طرح ہی اس کا استعمال ہے، یہ لمبے عرصہ تک کام کرنے والی ہے۔ پہلے دن دو ٹکیہ اور دوسرے دن ایک ٹکیہ ہر روز دیں۔

۶۔ سلفا ٹرائیڈ (Sulphatriad) مے اینڈ بیکر ————— اس میں سلفا ٹھنڈا زول، سلفا ڈایازین، سلفا میرازین ملی ہوئی ہیں۔ دیگر سلفا ادویات کی طرح استعمال کریں۔

۷۔ سلفا ۴ (Sulpha-4) سٹینڈرڈ ————— تمام فوائد سلفا ڈایازین کی طرح ہیں، ایک دو گولی دن میں دو تین بار دیں۔

۸۔ سپرو مائیڈ (Sipromide) المبیک ————— تمام فوائد و خوراک سلفا ٹرائیڈ کی طرح ہیں۔

۹۔ سپرو نل (Supronal) بار ————— یہ دو سلفا ہیں۔ سلفا ادویہ کی طرح فوائد و مقدار خوراک ہے۔

۱۰۔ ڈائی کریسٹین (Dicrysticin) سارابھائی ————— عام طاقت کا ایک عضلاتی انجکشن ہر ۲۴ گھنٹہ بعد لگائیں۔

۱۱۔ الوٹائی سین (Motycin) ملی ————— یہ نئی انٹی بائیوٹک ہے۔ ایک سے دو گولی دن میں دو سے تین بار تازہ پانی سے دیں۔

۱۲۔ ٹرائی سین (Trycin) مرک شارپ ڈوم ————— یہ عام مشہور جراثیم مار ڈوائیٹر اسکیلین، ایڈروکلورائیڈ کا تجارتی نام ہے۔ ہر چھ گھنٹہ بعد ایک کیپ شولز دیں، تکلیف دینے والے پھوڑوں اور خرابی خون کو دور کرنے میں از حد مفید ہے۔

۱۳۔ ٹین پن - ایس (Stenpen-s) بروز دیکم ————— یہ سلفا اور مینی کامرکب ہے۔ اندرونی و بیرونی سوزش اور جلد کا ورم، ٹیلے پھوڑوں کا کامیاب علاج ہے، ایک ایک ٹکیہ ہر چار گھنٹہ بعد تازہ پانی سے دیں۔

۱۴۔ پیٹنڈ سلفاس (سارابھائی)، ایک ٹکیہ، ریڈ وکسان (روش)، ۵۰۰ ملی گرام، دونوں کو ملا کر ایک خوراک بنائیں، اور پانی کے ساتھ دن میں دو بار دیں۔ یہ انٹی بائیوٹک + سلفا مرکب ہے اور بال توڑ پھوڑے کے لئے مفید ہے۔

۱۵۔ سزمائی سین (فزر)، ایک کیپ شولز، سلفا ڈایازین (لیڈرے)، دونوں کو یکے بعد دیگرے پانی سے دن میں دو بار دیں، پھوڑے دھنسی کے لئے مفید ہے۔

۱۶۔ اسٹریپٹوٹریڈ (مے اینڈ بیکر)، ایک ٹکیہ، اسی پن ۱۰۰ ٹی گرام ایک ٹکیہ۔ ڈامن بی کیلیکس بی ۱۲ ایک ٹکیہ، تینوں کی ایک خوراک بنائیں اور پانی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد دن میں دو بار دیں۔ یہ انٹی بائیوٹک و مینوں سلفا ڈاٹا منز سے مرکب ہے۔ جو دقتی مرایت

کے سبب پھوڑوں میں بہت مفید ہے۔ بڑی توڑ پھوڑے کے لئے یہ علاج بہت ہی مفید ہے۔

۱۷۔ مائی ٹکلین وی (سارابھائی)، ایک کیپ شولز، بیکاڈیکس (گلیکسو)، ایک ٹکیہ، دونوں کو پانی کے ساتھ دن میں دو بار دیں، ہر قسم کے پھوڑے دھنسیوں کے لئے بہت مفید ہے، انٹی بائیوٹک، دافع فطر و ڈاٹا منز سے مرکب علاج ہے۔

۱۸۔ ٹرائی سین (ایم، ایس، ڈی) ایک کیپ شول، ریڈوکسان (روش) ۵۰۰ ملی گرام، دونوں کو تازہ پانی سے کھلائیں۔ تمام اقسام کی پھنسیوں اور پھوڑوں کے لئے مفید ہے۔

۱۹۔ کلورومانی سیٹن ڈرماٹولوجیکل انسٹیٹوٹ (مریم ہلڈ کلورم فینی کول) مقام ماؤنٹ پرلگانا اور ٹرائی سین کیپ شولز براہ دہن دینا ایک کامیاب

علاج ہے۔ پیمپ دار پھنسیوں کو ایک دو دن میں دور کر کے پھوڑے اور گلے ہوئے زخموں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔
یونانی علاج:۔ پھوڑے کو پکانے کے لئے اسی یا ان چھنے آٹے کی پلٹس بنا کر باندھیں یا بکائن یا نیم کے پتوں کی بھیجا باندھیں یا صابن ریوند چینی، مین پھل اور گولہ برابر وزن لے کر پانی میں گھس کر پھوڑے پر لپیپ کریں، پھوڑا پھوٹ جائے تو مندرجہ ذیل مجربات اس مرض کا موثر علاج ہیں۔

پلٹس برائے پھنسی:۔ اسی، گندم کا آٹا، نیم کے پتے ہر ایک تین تولہ کو پانی میں پس کر اور پلٹس بنا کر باندھیں یا رسونت اور نیم کی اندرونی چھال پانی میں گھس کر پھنسی پر لگائیں۔

پلٹس برائے پھوڑا:۔ یہ مریم پھوڑے کو پکانی ہے۔ اسی، میٹھی ہر ایک ایک تولہ، پیاز سفید ایک عدد، ریوند چینی، نمک خورنی، نیم کے پتے ہر ایک چھ ماشہ، گولہ چھ ماشہ، گندم کا آٹا پانچ تولہ، بدستور پلٹس بنا کر گرم گرم پھوڑے پر باندھیں۔

رسوت ولی:۔ رسوت شدھ پانچ تولہ، گھی خالص ایک تولہ، گیروتین ماشہ ملا کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں، آدھی سے ایک گولی ماں کے دودھ میں گھس کر دیں۔ بچوں کے پھوڑے پھنسی کے لئے زود اثر ہے۔ بڑوں کے لئے ایک سے دو گولی صبح و شام استعمال کریں۔
لال روغن:۔ یہ نسخہ حیدر آباد کے حکیم کا ہے جو "روغن سرخ" کے نام سے فروخت کر رہے ہیں، زخم، پھوڑا، پھنسی اور گنج کے لئے فائدہ مند ہے۔ علاوہ ازیں بالکل آسان نسخہ ہے:۔

میسوں کا تیل خالص ۲ تولہ کو آگ پر گرم کریں، پھر نیچے اتار کر جب قدرے ٹھنڈا ہو جائے تو خالص کبک (مٹی والا نہ ہو) ۲/۴ تولہ ڈال کر کسی لکڑی سے ہلایں، لال روغن تیار ہے۔

شریت مصفیٰ:۔ (یہ نسخہ حکیم اجل خان صاحب کا ہے) جسے ہندوستانی دوا خانہ اس سے ملتی جلتی "دوا مصفیٰ" کے نام سے فروخت کر رہا ہے) فارش، داد اور پھوڑے پھنسیوں کے لئے مفید ہے۔

عناہ ۵ تولہ، برادہ صندل سرخ، برادہ صندل سفید، سر پھوکہ، مہندی کے پتے، شاترہ، نیلوفر کے پھول، مکوہ خشک، بیج کاسنی، شیشم کی لکڑی کا برادہ، منڈی بوٹی کے پھول ہر ایک ۲ تولہ۔ سب دواؤں کو رات کے وقت آٹھ گنا پانی میں بھگو دیں، صبح کو جوش دیں۔ جب تہائی رہ جائے تو تین گنا چینی ملا کر شریت کا قوام بنائیں، خوراک دو تولہ صبح و شام پیئیں۔

شودھک:۔ ست چرایہ، (چرایہ ایک پاؤے کر دو سیر پانی میں جوش دیں، جب آدھا حصہ رہ جائے تو اتار کر مل چھان کر پانی کو پھر آگ پر رکھیں اور اس قدر پکائیں کہ گولی بنانے کے لائق ہو جائے۔ ست چرایہ تیار ہے، اسی طرح چھال نیم کا ست تیار کریں) ریوند خطائی، رسونت شدھ اصلی، ست نیم، چاروں ادویہ برابر وزن لے کر چھوٹے چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور ایک گولی صبح و ایک شام ہمراہ پانی کھلائیں۔

فوائد:۔ یہ نسخہ اعلیٰ درجہ کا مصفیٰ خون ہے، پھوڑے پھنسیوں، فارش، جذام اور زہریلے زخموں کے لئے مفید ہے۔
ملتان کی مشہور کالی مرہم:۔ تیلوں کا تیل ۲ سیر، سندھور ۱/۲ سیر، دیسی موم ۲ تولہ، کافور ایک تولہ، نیلا تھو تھو دوا ماشہ بروزہ تر دو تولہ، تیل میں سندھور ڈال کر پکائیں، جب سیاہ رنگ ہو جائے، تو ماسولے کا فور باقی ادویہ سفوف شدہ ڈال دیں۔

کافور نیچے اتار کر ملائیں۔ مرہم تیار ہے۔
 دیگر :- رسونت ۲ حصہ، سندھور ۱ حصہ، تیل تل ۵ حصہ، نیلا تھوٹھا ۱/۲ حصہ، موم ایک حصہ۔
 ترکیب تیاری :- تمام ادویات کو لے کر مرہم بنائیں، گندے سے گندے زخموں کو اچھا کرنے میں لاجواب ہے۔ رنگ و شکل اور فوائد میں ایلو پیٹھی سیلا ڈونا مرہم کا منہ توڑ جواب ہے۔
 دیگر :- تیل سرسوں ۵ تولہ، سندھور ۲ تولہ، نیلا تھوٹھا ۴ رتی، آک کے پتوں کا سفوف ۲ ماشہ۔
 ترکیب تیاری :- تیل میں سندھور اور آک کے پتوں کا سفوف ڈال کر نرم آگ پر پکائیں۔ جب قدرے گاڑھا ہو جائے، تو نیلا تھوٹھا پیس کر ملائیں اور نیچے اتار لیں۔ کپڑے پر حسب ضرورت لگا کر پھوڑے پر لگائیں، ہر قسم کے پھوڑے، گندے زخموں، خنازیر اور ناسور کے لئے مفید ہے۔

دیگر :- سندھور ۴ تولہ، تلوں کا تیل دس تولہ، نیلا تھوٹھا ایک ماشہ۔
 ترکیب تیاری :- تیل کو کڑھی میں ڈال کر آگ پر خوب گرم کریں، جب خوب گرم ہو جائے تو سندھور ڈال دیں، بار بار جوش اُٹھے گا۔ جو دوا باہر کو نکلنے لگے، فوراً کڑھی کو آگ سے اتار لیا کریں، جب جوش سرد ہو جائے تو پھر آگ پر رکھ دیا کریں۔ جب تیل کا رنگ سیاہ ہو جائے، تو نیلا تھوٹھا سفوف کیا ہوا ملا دیں، کڑھی کو آگ سے اتار کر سرد جگہ پر رکھیں اور لوہے کی سیخ سے کچھ دیر ہلاتے رہیں۔ سرد ہونے پر سیاہ رنگ کی مرہم تیار ہوگی۔

پھوڑے پھینسی پر لگائیں، نہایت مفید مرہم ہے ہر قسم کے پھوڑے پھینسی، بال توڑ، زخم وغیرہ کے لئے آزمودہ ہے۔
 پھوڑا پستان :- میدہ گندم میں بیضہ مرغ کی زردی ملا کر دو تین دفعہ لگانے سے پھوڑا پھوٹ جاتا ہے، پھوٹ جانے پر یہ پکٹس لگائیں، زخم بھر جائے گا۔

نیم کا تیل :- بہترین مصفی خون ہے، خوراک ایک بوند ہمراہ دودھ خالص اسے استعمال کرنا چاہیے۔
 آیور ویدک علاج :- کھدر ارشٹ (شارنگدھر) ایک تولہ سے دو تولہ ہمراہ تازہ پانی بعد از غذا دیں، گرمی یا کسی اور موسم میں جب کہ خرابی خون سے خارش اور پھوڑے پھینسیاں پیدا ہو جائیں تو سار لوادی آسو (بھیشج رتناولی) ایک سے دو تولہ برابر تازہ پانی ملا کر دیں۔ یہ آسو زہریلے زخموں، نفرس اور بھگندہ کے لئے مفید ہے اور خون کی گرمی کو کم کر کے تسکین دیتا ہے۔

خرابی خون کے لئے سدرشن چورن (شارنگدھر) ایک ماشہ سے تین ماشہ، ہمراہ پانی دن میں دو بار دینا مفید ہے، یہ چورن مصفی خون ہونے کے علاوہ بلیرائی بخاروں کے لئے بھی مفید ہے۔

فساد خون کے لئے طب آیور وید میں بہت منجھٹھا آدی کو اتھ ایک سے دو تولہ کا جوشاندہ بھی لایا گیا ہے۔ یہ کو اتھ اٹھارہ قسم کے کورٹھ اور خرابی خون کے لئے مفید ہے۔

خون صفا :- یہ دوا دہلی کے کئی دوا خانوں کی طرف سے مختلف ناموں سے فروخت کی جا رہی ہے۔ اصل نسخہ درج ذیل ہے :-
 صندل مرنج، ہرٹھ کالی، منڈی، چرایتہ، شاہترہ، عشبہ، برہم ڈنڈی، شیشم کا برادہ ہر ایک ۲ تولہ، عناب ۴۰ عدد۔
 تمام دواؤں کو چھ گنا پانی میں ملا کر رات کو پڑا رہنے دیں۔ دن کو جوش دیں۔ جب آدھا حصہ پانی رہ جائے تو مل کر چھان لیں اور ۱/۲ گنا کھانڈ ملا کر قاعدہ کے مطابق شربت تیار کریں۔ یہ دو تولہ شربت ایک چھٹانک عرق عشبہ میں ملا کر پیئیں۔ پھوڑے پھینسیاں خارش اور عام جلدی امراض کے لئے مفید ہے۔

ورن امرت شومیت مرہم :- کافور ایک تولہ، موم سفید پانچ تولہ، سفیدہ کا شغری دس تولہ، تلوں کا تیل دس تولہ — پہلے تلوں کے تیل کو گرم کریں اور قد سے اٹھٹا ہونے پر سفیدہ کا شغری ملا دیں، پھر کافور ملا کر مرہم بنالیں۔ یہ مرہم ہر طرح کی چھوٹی چھوٹی پھنسیوں و زخموں کے لئے مفید ہے۔

جرطی بوٹیوں سے علاج

عرق بالنسہ :- برگ بالنسہ ایک سیر کو پانی میں ۲۲ گھنٹہ تک بھگوئے رکھیں۔ دوسرے دن حرب معمول بھبکا لگا کر عرق کشید کریں اور بوتلوں میں محفوظ رکھیں، اگر عرق نکلا رکھیں گے تو اس میں نقص پیدا ہو جائے گا۔ اس عرق کے استعمال سے خرابی خون، کوڑھ، سل و دق کو فائدہ ہوتا ہے۔

دھما سہ ولی :- دھما سہ بوٹی کا پورا پودا (شاخ کانٹے وغیرہ جب کہ وہ سبز ہوں) سایہ میں خشک کر کے باریک پیس لیں۔ جب بچہ پیدا ہو۔ تو اس کو غسل دینے والے پانی میں یہ سفوف ایک تولہ ڈال کر جوش دیں، اس سے بچہ کو غسل کرائیں اور شہد کے ہمراہ گولیاں بقدر بخود بنا کر بچہ کی ماں کو ایک گولی روزانہ کھلائیں۔ بہت جگہ تجربہ ہو چکا ہے کہ ایشور کی کرپا سے بچہ چیچک سے محفوظ رہتا ہے ۲۱ روز کے بعد ہر ماہ میں سات دن ایک گولی بقدر دانہ جوار بچہ کو دودھ میں حل کر کے پلائیں۔ یہ ایک سال تک جاری رکھیں، ایشور کی کرپا سے بچہ چیچک سے محفوظ رہتا ہے۔

دیگر :- خون صاف کرنے کے لئے از حد مفید ہے۔ دھما سہ ۲۰ تولہ، ریوند چینی ۱۰ تولہ، مریح سیاہ ۲ تولہ، سفوف بنائیں تین ماشہ ہمراہ پانی دیں۔ پھوڑے، پھنسی، خارش، داد، چنبل کے لئے مفید ہے۔

پھوڑے :- دھما سہ بوٹی کو پیس کر پھوڑے پر باندھنے سے پھوڑوں کو آرام آجاتا ہے۔

عرق مصفی خون :- عناب پانچ دانہ، شاہترہ پانچ تولہ، سر بھوکہ پانچ تولہ، برادہ لکڑی شیشم پانچ تولہ، منڈی پانچ تولہ، مہندی کے پتے پانچ تولہ، بسفاج پانچ تولہ، ہڑکالی پانچ تولہ، چرایتہ دو تولہ، گاؤ زبان دو تولہ، عشبہ مغربی دس تولہ، پرسیاؤ شاں دو تولہ، کاسنی دس تولہ، مکوشک دس تولہ، سولہ سیر پانی میں رات کو تر کریں، صبح آٹھ سیر عرق نکال لیں، خوراک تین تولہ ہمراہ شربت عناب دو تولہ استعمال کریں، بغیر شربت بھی پیاجا سکتا ہے۔

شربت منڈی مرکب :- منڈی، سر بھوکہ، ہڑکالی، شاہترہ، چرایتہ ہر ایک سات تولہ، عناب ۶ تولہ، سب ادویہ کو گرم پانی میں بھگوئیں اور اچھی طرح جوش دے کر ۳ سیر چینی کا اضافہ کر لیں اور شربت بنائیں، خوراک پانچ تولہ شربت، بارہ تولہ عرق شاہترہ کے ہمراہ روزانہ صبح و شام دو ہفتہ تک پلائیں۔ اس کے بعد جلاب دیں، سودا کا منبج ہے اور خون صاف کرتا ہے۔

فساد خون :- پھل ناگ کیسہ ۹ ماشہ کا شیرہ نکال کر دو تولہ شہد ملا کر پینا فساد خون میں مفید ہے۔

دیگر :- سبز پتے نیم ایک پاؤے کر سل بٹہ یا کونڈی ڈنڈا سے پیس لیں، پھر اسے پانی کی بالٹی میں ڈال کر مستحانی سے دہی کی لسی کی طرح خوب مٹھیں، جب مٹھنے سے خوب جھاگ پیدا ہو تو یہ جھاگ بدن پر ملنے سے چمڑہ کی جلن، خواہ یہ خرابی خون کی وجہ سے ہو یا تیز دھوپ اور لو لگنے سے، دور ہو جاتی ہے، جلد میں ٹنڈک پڑ جاتی ہے۔ گاہے اس میں بقدر ضرورت کافور کا بھی اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ جس سے اثر دو بالا ہو جاتا ہے۔

ہومیوپیتھک علاج :- شروع پھوڑا میں گرم کیلنڈر دلا لوشن سے ہر دو تین گھنٹہ کے بعد دھوئے رہنا چاہیے اور جب پیپ

بن جائے تو بھی گرم کیلنڈر والا لوشن میں صاف کپڑے کا ٹکڑا بھگو اور چوڑکھٹکھٹ کر نی چاہیے، پھوڑے کے پھوٹ جانے پر بھی اس لوشن میں صاف رونی بھگو کر باندھنی چاہیے، ڈاکٹر کلارک صاحب لکھتے ہیں کہ بمقابلہ ٹیپس کے گرم کیلنڈر والا لوشن بدرجہا بہتر ہے، نسخہ درج ذیل ہے :-

بہتر ہے، نسخہ درج ذیل ہے :-
 کیلنڈر ولاندر ٹنچر ایک ڈرام، صاف پانی ۱۲ اپاؤ، لوشن تیار ہے۔ جب مقام ماؤف سرخ، گرم اور درد کرتا ہو، لیکن
 ابھی مواد نہ بنا ہو اور نہ ہی ورم بہت بڑھ گیا ہو، تو سیلا ڈونا دیں، جب باوجود بلا ڈونا کے استعمال کے ورم بڑھتا جائے تو مرکب
 دیں۔ جب مواد پکنے کے باوجود بھی پھوڑا نہ پھٹتا ہو یا پھٹنے کے بعد جلدی آرام نہ آتا ہو تو سلیشیا دیں، علاوہ ازیں، آرٹک ہیرپلر،
 کلکیر یا سلف بھی بہترین ادویات ہیں۔

غذا و پینے کی چیزیں۔ زود مضام و مقوی غذائیں دیں، شدید کھوڑے کی حالت میں مریض کو آرام سے لیٹر پر لیٹے رہنا چاہیے۔

کھجلی، خارش، سکے بیڑا (Scabies)

تعریف مرض :- اس مرض کا سبب ایک چھوٹا سا حیوانی کرم ہے جسے عام زبان میں حیم جوئی بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک متعدی مرض ہے، جس سے جسم پر خارش ہوتی ہے۔

وجوہات :- چھوٹے سے حیوانی کرم یا خارش والے مریض سے چھوت لگ کر یہ عارضہ ہو جاتا ہے ۔
علامات :- تمام جسم پر خارش ہوتی ہے ، خارش کبھی تر کبھی خشک ہوتی ہے ، زیادہ تر انگلیوں کے درمیانی حصہ ، کلائی ،
رانوں کے اندرونی حصوں اور انڈ کوٹوں پر ہوتی ہے ۔ خارش سے مریض بے چین ہو جاتا ہے ، اکثر رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے
کھجائے سے جلد پر آبلے یا چھوٹی پھینیاں بن جاتی ہیں ۔

ایلوپیتھک علاج :- مریض کو سلفر سوپ یا ٹیٹموسول سوپ (Tetmosol Soap) سے روزانہ غسل کرائیں 'بنزلی بنزوئیٹ' (Benzyl Benzoate) اس مرض کا موثر علاج ہے مختلف کمپنیاں اسے مختلف ناموں سے بناتی ہیں۔

۱۔ ایس کے بی اول (Ascabiol) ساختہ می اینڈ بیکر۔ یہ بنزیل بنزوئیٹ امیلشن کا تجارتی نام ہے۔ گرم پانی اور صابن سے غسل کرنے کے بعد تولیہ سے جسم خشک کر کے یہ امیلشن جسم پر لگائیں اور اسے خشک ہونے دیں۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ یہی عمل کریں۔ دوسرے دن گرم پانی سے غسل کر کے کپڑے تبدیل کر لیں، معمولی حالتوں میں صرف اتنے علاج سے آرام آجاتا ہے، ورنہ دو تین دن علاج جاری رکھنے کے بعد کپڑے تبدیل کریں، چھبوست دار کھجلی کا جدید علاج ہے۔

۲۔ سکے بیز آئیل (Scabbiesoil) :- یہ بھی بنزبل بنزویٹ سے تیار کردہ چھوت دار خارش اور چم جوڑوں کے لئے نہایت مفید دوا ہے۔ ترکیب استعمال سکے بی اول (مندرجہ بالا) کی طرح ہے، بولٹس کمپنی اسے سکے بی نول کے نام سے تیار کرتی ہے، یہ دوائی بصورت سکے بیز کریم (Scabbiiescream) بھی ملتی ہے۔

سلفر آکسائیڈ :۔ سلفر (گندھک) ایک حصہ، ویزلین دس حصہ، ہر دو کو ملا لیں اور بنانے کے بعد خارش والی جگہ پر لگالیں۔ لیکن آنکھوں وغیرہ پر نہ لگائیں۔ یہ مرہم صبح اور رات کو تین روز متواتر مالش کرنی چاہیئے۔ چوتھے دن گرم پانی سے نہا کر کپڑے تبدیل کر لینے چاہئیں۔ تین دن کے استعمال کے بعد گندھک مرہم کا استعمال نہ کیا جائے۔ بچوں کے لئے یہ مرہم دو فیصدی ہے۔

تینوں کی ایک خوراک ہے، ایسی تین یا چار خوراک روزانہ دیں، مرض کم ہونے پر دوا کم کرتے جائیں۔

۱۲۔ والرگان (Yallergeran) سے اینڈبیکر۔ جلد کے امراض میں دافع خراش اثر رکھتی ہے۔ دس ملی گرام کی ایک مکھیہ تازہ پانی سے دیں۔ یہ سب سے مؤثر اینٹی ہیشامین دوا ہے۔

۱۳۔ بنزوپڈ (Benzoped) ایلی لی۔ خارش و جلدی امراض میں اس کا بیرونی استعمال کیا جاتا ہے۔ گازی یا سفنج کے ساتھ چمڑے پر ہلکی مقدار میں لگائیں۔

۱۴۔ سکے بل (Scabal) المیک۔ یہ بنزل بنزوپڈ سے تیار کی گئی ہے، اسے بنزل بنزوپڈ کی طرح استعمال کریں

۱۶۔ وایوفارم (Vioform) کریم کبھی پر لگائیں۔ کھانے کے لئے بیناڈرل (Benadral) کیپ شولز استعمال کریں یا انتھی سان (Anthisan) کریم لگائیں یا سیکبی زن بیرونی طور پر استعمال کریں۔

خارش والے مریضوں کی جرابیں، چادر، کبل، پاجامہ، دھوتی، قمیص جو مریض استعمال میں لایا جا رہا ہو، سب کو کھولتے ہوئے پانی میں "ڈس انفیکٹ" کر لیا جائے۔

یونانی علاج :- خوراک کی طور پر شاہترہ، چرائیہ، منڈی، سرھو کہ، صندل سفید، ہڑ سیاہ ہر ایک پانچ ماشہ، عناب سات دانہ، ادویہ کو ہلکا پاؤ پانی میں بھگو کر صبح مل چھان کر اور شربت عناب دو تولہ ملا کر ملائیں اور بیرونی طور پر گندھک آملہ سار ایک تولہ، پارہ ایک تولہ باجی ایک تولہ، کیلہ ایک تولہ، مردہ سنگ ایک تولہ، نیلا تھوٹھا چھ ماشہ، مرچ سیاہ چھ ماشہ۔

پہلے پارہ و گندھک کی کجلی بنائیں، پھر دوسری ادویات ملا کر سفوف بنائیں اور ہلکا پاؤ مکھن گائے (جسے تین بار دھو لیا گیا ہو) میں مرسم بنائیں۔ نقوڑی سی مرسم جسم پر مل کر چند منٹ بعد بھینس کا گو بر مل کر صابن و نیم گرم پانی سے نہالیں اور جسم پر سرسوں کا تیل مل کر دو تین دن میں مکمل آرام آجائے گا۔ خارش کے لئے اوپر لکھی سلفر آئینٹمنٹ (گندھک مرسم) کا لگانا بھی مفید ہے۔ وہ تمام مصفی خون ادویات جو پھوڑوں کے لئے لکھی گئی ہیں، خارش کے لئے استعمال کرنی بھی مفید ہیں۔

دوائے خارش :- کتھ سفید ایک تولہ، رال ایک تولہ، مردہ سنگ چھ ماشہ، توتیا چھ ماشہ، کافور تین ماشہ، پارہ تین ماشہ، سب سے پہلے توتیا، کافور، پارہ کو اس قدر کھل کریں کہ ایک ذات ہو جائیں۔ اس کے بعد باقی دوائیں ملا کر اس میں ملائیں اور روغن تلخ (کڑوا تیل) اصناف کر کے خوب حل کریں اور تمام رات رکھ کر صبح باسی پانی سے ۲۱ مرتبہ خارش زدہ مقام کو دھو کر اس دوائی کا ہلکا لیپ کریں، آنکھ پر نہ لگے۔ تر خارش کے لئے از حد مفید ہے، خارش و سوزش کو فوراً آرام ملتا ہے، گندے مواد سے پاک کر کے جلد کو صاف کر دیتا ہے۔ جوشاندہ خارش :- چھلکا جڑ نیم، برادہ لکڑی شیشم، پھول نیم ہر ایک چھ ماشہ، پانی میں جوش دے کر چھان کر شہد ایک تولہ ملائیں۔ اگر پیاس و گرمی زیادہ لگے تو شہد نہ ڈالیں۔

دیگر :- شاہترہ، چرائیہ، سرھو کہ، پھول منڈی ہر ایک چار ماشہ، عناب پانچ دانہ، چینی چھ ماشہ، دس تولہ پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور چینی ملا کر میٹھا کر کے دن میں دو بار دیں۔

سفوف خارش خشک و تر :- گندھک آملہ سار چھ ماشہ، باجی چھ ماشہ، مردارنگ چھ ماشہ، ہلدی چھ ماشہ، کتھ چھ مار سنگ جراثیم چھ ماشہ، طوطیا تین ماشہ۔ سب کو پیس کر سفوف بنالیں۔ اس میں سے حسب ضرورت لے کر کڑوے تیل میں کھل کر کے کو خارش پر ملائیں، صبح گرم پانی سے غسل کریں، تین سے پانچ دن میں آرام ہوگا۔

دوائے مصفی خون :- بیج کاسنی، نیوفر، چھلکا جڑ زرد، شاہترہ، چرائیہ ہر ایک پانچ ماشہ، رات کو گرم پانی میں تر کریں

صاف کر کے شربت عنب دو تولہ ملا کر پلائیں۔

خارش کے لئے مکھن :- ایک سیر دودھ بھینس میں ایک تولہ سفوف گندھک ملا کر ضامن لگا کر دہی بلو کر مکھن نکالیں۔ یہ مکھن بدن پر ملیں۔ تین روز میں آرام ہوگا۔

روغن متباکو :- ہرے متباکو کے پتے، پانی دتلوں کا تیل برابر ملا کر آگ پر جوش دیں، جب پانی جل جائے تو تیل چھان کر بدن پر ملیں، خارش کے لئے مفید ہے، علاوہ ازیں اطر فیض شاہترہ سات ماشہ صبح سات ماشہ شام ہمراہ عرق مصفی خون دینا یا عرق عشہ خالص کا استعمال ہمراہ شربت عنب دینا نہایت مفید ہے۔

دوائے خارش :- ۱۔ ڈی، ڈی پوڈر ۲ تولہ، تیل سرسوں ۲ تولہ، ہر دو کو ملا لیں اور خارش زدہ مقام پر لگائیں، لیکن جسم کے نازک حصوں آنکھ وغیرہ کو بچائیں، ۳ گھنٹہ بعد نیم گرم پانی اور صابن کار بالک یا لائف بوائے سوپ سے غسل کریں اور صاف کپڑے پہنیں۔ نین دغہ کا استعمال کافی ہے۔ اس مالش کے بعد صابن سے نہانا ضروری ہے ورنہ جلد کو نقصان ہوگا۔

۲۔ گندھک آملہ سارچھ ماشہ، نیلا تقو تقا دو ماشہ، باجی چھ ماشہ، سب کو باریک کپڑ چھان کر کے مکھن پانچ تولہ (مکھن ایک سو ایک بار پانی سے دھویا گیا ہو) میں ملا کر اور تھوڑا سا لے کر دس بجے دن کو مالش کریں، ایک گھنٹہ بعد نیم گرم پانی و لائف بوائے صابن سے غسل کریں، بعد از غسل تیل سرسوں کی مالش کر کے صاف کپڑے پہنیں، پہلے دن دوا ذرا جسم کو لگے گی، دوسرے دن کم تیسرے دن بالکل کم، آنکھوں و دیگر نازک حصوں پر نہ لگنے دیں۔ مٹلی خارش کے لئے مفید ہے۔

معجون مصفی خون :- چھلکا ہڑ زرد دس تولہ، چھلکا ہڑ کابلی ساڑھے سات تولہ، چھلکا بہڑہ پانچ تولہ، آملہ صاف پانچ تولہ، سنار ملی اڑھائی تولہ، پھول گلاب ڈیڑھ تولہ، شاہترہ ساڑھے بارہ تولہ، شہد خالص بارہ چھٹانک، مصری بارہ چھٹانک، تمام ادویات کو علیحدہ علیحدہ کوٹ کر چھان لیں اور شہد و مصری کا قوام بنائیں، ادویات ملا کر معجون قوام میں لے آئیں، جن لوگوں کا خون خراب ہو گیا ہو یا آتشکی مادہ جسم میں کسی حد تک موجود ہو، بعد مسہل اس معجون کو استعمال کریں، خوراک چھ ماشہ ہمراہ عرق سولف چار تولہ و عرق شاہترہ چار تولہ ہر روز کھائیں، زبردست مصفی خون ہے۔

آیور ویدک علاج :- برن (پھوڑے) کے علاج میں مکھی گئی تمام آیور ویدک مصفی خون خوردنی ادویات خارش کے لئے بھی لایہ دایک ہیں۔ اس سلسلہ میں شدہ گندھک یا کھدر آرٹھ یا سار یوادی آسو کا استعمال مفید ہے۔ بیرونی طور پر مرچ آدی تیل کا استعمال نہایت مفید ہے۔

مرچ آدی تیل (شارنگدھر) :- مرچ سیاہ، تردی، چندن سُرُخ، ہڑتال ورنیہ، ناگر موکھا، منسل، جٹا بانسی، دار ہلدی، ہلدی، دیو دار، جڑ اندرائن، جڑ کنیر، کھٹ تلخ، دودھ آگ، رس گوبر گائے ہر ایک ایک تولہ، میٹھا تیلیا دو تولہ، سب کا کلک کا جل بنائیں۔ تیل سرسوں ایک سیر، پیشاب گائے اور پانی دو دوسیر، تیل تیار کریں۔ اس تیل کی معمولی مقدار آنکھوں کو بچا کر جسم پر مالش کی جائے، خارش خشک، سر اور بغل کی پھنسیاں، بھم، داد، چنبل، جذام اور تمام امراض جلد کے لئے مفید ہے، چونکہ اس نسخہ میں زہریلی ادویات ہیں، لہذا اسے با احتیاط تیار کرنا چاہیے۔

آسان آیور ویدک نسخہ

۱۔ مناسب مقدار میں گندھک آملہ سار تیل سرسوں میں ملا کر آنکھوں کو بچا کر جسم پر ملیں، مفید ہے۔

۲۔ زیرہ سیاہ، دو تولہ، سیندور اصلی دو تولہ، دونوں کو پیس کر نغدہ بنائیں اور دو گنا تیل سرسوں اور مین گسٹا پانی میں ملا کر برتن میں ڈال کر آگ پر پکائیں، جب تیل رہ جائے تو وہ چھان کر لپیپ کرنے سے خارش کو آرام آجاتا ہے۔

۳۔ سفوف ہلدی مناسب مقدار پانی میں پیس کر نغدہ بنائیں اور چار گنا تیل سرسوں اور تیل سے چار گنا رس برگ مدار (آگ کے پتوں کا پانی) سب کو ایک برتن میں ملا کر پکائیں، جب صرف تیل رہ جائے تو چھان کر استعمال کریں۔ خارش کے لئے نہایت مفید ہے۔

۴۔ گندھک آملہ سار ایک تولہ، سفیدہ جست ایک تولہ، سو بار دھویا ہوا مکھن ساڑھے سات تولہ میں ملا کر لگانے سے خارش کو مکمل آرام آجاتا ہے۔

ہومیوپیتھک علاج :- سلفر، سیپیا، آرسنک، گریفائیٹس، ایچی نیٹیا، کلکیریا کارب، ایگریکیس، ہائیڈرو کوٹائل، اناکارڈیم، کاربانک ایسڈ، نیٹرم سلف، کلکیریا سلف، سلیشیا نیٹرم میوز بہترین ادویات ہیں۔ انہیں حسب موقعہ استعمال کر کے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

پھلوں اور سبز لوں سے مڈرتی علاج

فی زمانہ جلدی امراض کا علاج سلفا ڈرگز (Sulpha Drugs) سے کامیابی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اگر اسے استعمال کرنے سے پہلے یہ جان لیا جائے کہ ان میں سے کون سا تریاق اعظم ہے، جو کہ ان موزی امراض سے فوراً نجات دلا سکتا ہے، تو وہ ہے سلفر (Sulphar)۔ یعنی گندھک، یہ جسم سے گندے مادوں کو خارج کرتی اور خون کو صاف کر کے جلد کو خوبصورت بناتی ہے اور بدن میں چستی پیدا کر دیتی ہے، جس طرح ادویات کی صورت میں سلفر (گندھک) کو استعمال کیا جاسکتا ہے، اسی طرح ان غذاؤں سے جن میں سلفر بدرجہ اتم موجود ہے سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ چنانچہ مندرجہ ذیل اغذیہ کے اندر سلفر کی مقدار بہت ہوتی ہے۔

گوشت، مچھلی، انڈے، پنیر، خشک کھجور، دودھ، مولی، لہسن، پیاز، گوبھی، ٹماٹر، انجیر وغیرہ، زیادہ موٹے آدمیوں کے لئے گندھک والی اغذیہ کا استعمال بہت ضروری ہے، اس کے دوران استعمال میں میگنیشیم والی اغذیہ مثلاً آلو بخارا، کھٹا سنگترہ، سیب، لیمو وغیرہ کے استعمال سے پرہیز کریں، اور ادویہ مثلاً نمکینی جلاب، میگنیشیم والی اغذیہ وغیرہ سے پرہیز کریں۔

غذا و پیرہیز :- غذا صحت بخش اور وقت پر کھائیں، تازہ ہوا میں سیر کریں، روزانہ نیم گرم پانی سے غسل کریں۔ جسم کو صاف ستھرا رکھیں، مٹھائی، اچار، گوبھی، آلو، دہی، لسی اور دیر بھنم اغذیہ سے پرہیز کریں، جسم پر تیل سرسوں یا تلوں کے تیل کی مالش مفید ہے۔ مونگ کی دال، سالم مونگ، گاجر کی سبزی، شلغم کی سبزی، پالک کا استعمال مناسب ہے۔

دَاو، رِنک وَرَم، (Ring worm)

تعریف مرض :- یہ ایک مشہور متعدی جلدی بیماری ہے، جو دائرہ کی صورت میں ہوتی ہے۔

وجوہات :- خرابی جگر، بد ہضمی، لیریائی بخاروں کے زہریلے اثرات، گرم اغذیہ کا بکثرت استعمال، بعض دفعہ تندرست شخص

بیمار شخص سے چھوت لگنے پر بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے

علامات :- یہ مرض عام طور پر کمر، سر، گردن کے پچھلے حصہ پر اثر کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی گول پھنسیاں اکٹھی اور خوشوں میں پیدا ہوتی ہیں، شروع مرض میں سوزش، میس اور جلن ہوتی ہے، اکثر شدید خارش ہوتی ہے، مقام مرض پر جلد سے اونچا داغ ہو جاتا ہے۔

ایلوپیتھیک علاج :- اس مرض کے علاج میں مرکبات سیماب (پارہ) سے داد کے کرم ہلاک ہو جاتے ہیں، چنانچہ مقام ماؤف کو گرم پانی اور صابن سے دھو کر خشک کر کے ایمونی ایڈ مرکری دس گرین سادہ مرہم ایک اونس ملا کر دن میں دوبار مالش کریں، مرض کی معمولی حالت میں نیچر آئیوڈین پھریری سے دن میں دو تین بار لگائیں، (اگر کوئی سیمابی مرہم لگایا جا چکا ہو تو نیچر آئیوڈین نہ لگائیں) یا ایڈ سلی سلک دو ڈرام ایڈ بنزویک ایک ڈرام، مرکری ایمونیا ایٹا پڑ ڈرام، ویزلین سفید پڑ ۲ اونس مرہم بنا کر لگائیں یا صرف ایڈ کرائی سو فینک پانچ فیصدی کی مرہم مفید دوا ہے، جب داد خشک ہو کر چھلکے بن جائیں تو ذیل کا مرہم لگائیں :-

سلی سلک ایڈ ۵ گرین، بنزویک ایڈ ۲۰ گرین، سفید ویزلین ۱۰ اونس، باہم ملا کر مقام ماؤف پر دن میں دو یا تین بار ملیں۔
ماؤرن ادویات :- ٹینافیکس (Tinea fax) بروز ویکم _____ داد و گزیما کے لئے نئی دریافت ہے۔
مقامی طور پر لگائیں۔

۲۔ انتھرالین (Anthralin) ایبٹ _____ کرائی سو فینک ایڈ سے بنی ہے، داد کے لئے مفید ہے۔
۳۔ ڈیرومین مرہم (Derobin) گلیکو _____ مقام داد پر لگائیں۔
۴۔ فینوفیکس (Phenofax) بروز ویکم _____ یہ کاربالک مرہم ہے، داد اور چنبل کے لئے مفید ہے۔
۵۔ نیکسوڈرم (Nixoderm) یا سلی سلک آئینٹنٹ یا کرائی سو فینک آئینٹنٹ یا سلی سلک فینول آئینٹنٹ لگائیں۔
۶۔ کیمبیسون (Cambison) ہکیٹ _____ داد اور کھال کے دیگر درموں میں مفید ہے۔ مقام متاثرہ کو صاف کر کے مرہم کا پتلا سالیپ لگائیں۔

۷۔ گرائی سووین ایف پی (Grisovin F.P.) داد پر بیرونی طور پر لگائیں۔
۸۔ پرنی ٹول (Purnatol) جان وائیٹھ _____ یہ ماؤرن مرہم داد، پاؤں کے داد کے لئے خاص طور پر مفید ہے، مقام مرض پر لگائیں۔

۹۔ اسٹروڈل (Asterol) روش _____ مقام مرض پر لگائیں، کم عمر بچوں کو نہ لگائیں۔
۱۰۔ مائی سل (Mycil) بی، ڈی، ایتج _____ مے کی طرح استعمال کریں۔
۱۱۔ گرائی سووین ایف پی (Grisovin-F.P.) گلیکو _____ اس کا استعمال پیمپھونڈی کی نوعیت جراثیم سے جو جلدی امراض پیدا ہوتے ہیں، مثلاً داد، گنج اور جسم کے مختلف حصوں کی پرائی خارش میں کیا جاتا ہے۔ ایک ایک ٹیکہ دن میں تین بار تازہ پانی سے دیں۔ یہ بالوں اور ناخنوں کی موذی ترین بیماریوں میں مفید ہے۔

۱۲۔ فل سین ایف پی (Fulscin-F.-P.) آئی، سی، آئی _____ اس کا استعمال ۱۱ کی طرح کیا جائے۔
۱۳۔ مرساجل (Mersagal) گلیکو _____ داد کے لئے معمولی مقدار میں لگائیں، مفید ہے۔
۱۴۔ رینگ ورمول (Ringwormol) المبیک _____ مقام مرض پر لگائیں۔ اس سے کپڑوں کو بچانا چاہیے، ورنہ داغ لگ جانے پر نہ اترے گا۔


۱۵۔ رنگ کڑیا جڑ مس کڑیا جڑ میکس یا بیٹیکس وغیرہ کوئی سرہم لگائیں۔

یونانی علاج :- پھوڑے کے علاج میں مکھ گئے مسفی خون نسخہ جات میں سے کسی ایک کا استعمال کریں اور بیرونی طور پر رال سفید تین تولہ، تلمی شورہ دو تولہ، پشکڑی سفید دو تولہ، نوشاد پٹی دو تولہ، تمام اجزاء کو باریک پیس کر گولیاں بقدر کنار دشتی بنائیں اور گلے کے دودھ کے ساتھ مقام داد پر گھس کر لیپ کریں۔ دن میں ایک دو بار صفا کرنا کافی ہے، کسی قدر خراب داد یا چھا جن ہو، ایک ہفتہ میں آرام آجائے گا۔

دوائے داد (دھدر) :- صابن دیسی، گندھک آملہ سار، برابر وزن کی مکھ بنا کر محفوظ رکھیں، مقام داد پر پانی میں گھس کر لگادیں۔
تیل گندم :- وہ بیماریوں با جس پر لوہے کو تپا کر مہتھوڑوں سے کوٹتے ہیں، پر چند دانے صاف گندم کے رکھ کر اس سے دبائیں، جو تیل نکلے، اس کو علیحدہ کر کے داد والی جگہ پر لگائیں، آرام آجائے گا۔
صناد بھینسیا داد :- گوگل، گندھک آملہ سار، سہاگہ بریاں ہر ایک ایک تولہ، عرق لیموں میں پیس کر گولیاں یا صناد بنائیں، بقدر ضرورت رس لیموں میں گھس کر داد پر لگائیں۔

برائے داد :- لکڑی درخت شیشم (برنگ سیاہ)، نار جیل کا چھلکا ہر ایک آدھ سیر، گندم صاف آدھ پاؤ، پتال جنتر کے ذریعے تیل نکالیں، داد اور چھیل پر لگائیں، بہت جلد آرام آجاتا ہے۔

پتال جنتر کی ترکیب :- ایک مٹی کا مستعمل برتن لیں۔ جس میں دوا آسکے۔ اگر برتن چرب ہو تو بہتر ہے، اس کے پندے میں ایک



پتال جنتر کی ترکیب

دو تین چار سوراخ باریک باریک حسب خواہش وسط میں کریں، اس میں دوا ڈال کر منہ پر سرپوش رکھ کر اچھی طرح گل حکمت کر دیں، پختہ زمین میں ایک گڑھا کھود دیں، جو ایک باشت ہو، چوڑا اس قدر ہو کہ وہ برتن اس پر رکھنے سے پورا آجائے اور گڑھے میں نہ چلا جائے۔ اب گڑھے میں چینی کا ایک پیالہ رکھ دیں، پیالے کے نیچے اگر کچھ پانی وغیرہ ڈال دیں تو بہتر ہے، تاکہ اوپر والی پندے کی حرارت سے محفوظ رہے۔ گڑھے کے منہ پر دوا والا برتن سیدھا رکھیں، اس کے پندے کے سوراخ چینی کے پیالہ کے علین مقابل ہوں، ان سوراخوں میں انسانی بال لگادیں، تاکہ جو تیل ان سوراخوں سے نکلے سیدھا پیالے میں چلا جائے۔ اس برتن کے پہلوؤں اور گڑھے کے کناروں کے درمیان چاروں طرف مٹی سے گل حکمت کریں تاکہ آگ کے شعلے اندر نہ چلے جائیں۔ گل حکمت خشک ہونے کے بعد برتن کے چاروں طرف اور اوپر اُپلے چن دیں اور آگ لگادیں۔ آگ کی حرارت سے ادویہ کا تیل سوراخوں کے راستہ سے نکل کر پیالہ میں جمع ہوتا جائے گا جب آگ سرد ہو جائے تو آہستگی سے برتن کے پہلوؤں کا گل حکمت دور کر کے برتن اٹھائیں، نیچے پیالہ میں تیل ہو گا۔ اسے استعمال میں لاسکتے ہیں۔

دوائے داد :- بے ضرر سائیفک علاج ہے، گندھک آملہ سار، پارہ، مردار رنگ، گوند کیکر برابرے کر خوب کھل کر کے پانی کے ساتھ گولیاں بنائیں، ایک گولی پانی یا عرق لیموں میں گھس کر داد کی جگہ پتلا سالیپ کریں، صبح و شام دو وقت، خارش تو پہلے دن ختم ہو جائے گی۔ دو تین دن میں مکمل آرام آجاتا ہے۔
دیگر :- سفیدہ کا شغری، گندھک آملہ سار، سہاگہ کچا، پشکڑی سفید، رال سفید، بھیر کے دودھ میں پیس کر گولیاں بنا کر باسی پانی سے لگائیں۔

داد آئیل :- کار بالک الیڈ دو ماشہ، کافور ایک تولہ، تیل تارپین ایک ادنس، کار بالک الیڈ و کافور کو ملا کر دھوپ میں رکھیں۔
 ب حل ہو جائے، تب تیل تارپین ملا کر حل کریں، دو تین مرتبہ مقام داد پر لگائیں، ہر قسم کے داد کے لئے از حد مفید ہے۔
آیور ویدک علاج :- مزیج آدی تیل (شارنگدھر) جس کا نسخہ پچھلے صفحات میں دیا جا چکا ہے، مقام داد پر لگائیں اور پھوڑے
 بیان میں لکھی گئی مصفی خون آیور ویدک ادویہ دیں۔
یونانی طریقہ علاج میں مندرجہ بالا مرکبوں کا استعمال کریں۔
ہومیوپیتھک علاج :- بیسی لائٹم ۳ یا ۲۰۰ کی ایک خوراک ہر ساتویں دن دینی چاہیئے، کھوپری اور بال والے حصوں کے لئے
 از حد مفید و مجرب ہے۔

غذا و پرہیز :- بطر زخارش (سکے بیز) کریں۔

پچرم دل، چینل، سورائیس (Psoriasis)

تعریف مرض :- اس مرض میں جلد پر سرخ داغ پیدا ہو جاتے ہیں، جلد پر سے مچھلی کے بیرونی حصہ کی طرح چھلکے اُترتے ہیں۔
 ش سے چھلکے اُتر کر خون خارج ہوتا ہے۔

وجوہات :- یہ مرض اکثر ان مقامات پر ہوتا ہے جو کپڑے سے ڈھکے رہتے ہیں، مثلاً سر، کہنیاں، گھٹنے، ٹخنے اور کبھی سارے جسم
 پیل جاتا ہے، سوداوی مواد کا غلبہ، شراب خوری، باصنمہ کی خرابی، میلا کچیلار ہنا، زہریلے زخم یا جوڑوں کے درد سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔
علامات :- اس مرض میں جلد سخت ہو جاتی ہے اور اس پر پتھریاں پیدا ہو جاتی ہیں، سنبھ چھلکے اُترتے ہیں، جب مرض بڑھ رہا ہو تو
 لہجہ زخارش ہوتی ہے۔

گرمی کے موسم کی نسبت سردی میں اور میدانوں کی نسبت پہاڑوں میں یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے۔
ایلیوپیتھک علاج :- سم الفار (سنکھیا) اس کے لئے مفید بیان کیا گیا ہے، اس سلسلہ میں لائیکوار آرینی کیس تین مہینہ دن میں دو
 دہائی میں ملا کر دینا مفید ہے اور ہفتہ استعمال کے بعد اسے دو دن بند رکھنا چاہیئے تاکہ زہریلے اثرات پیدا نہ ہو سکیں، اگر زہریلے زخموں کے سبب
 ہو تو اس کے مطابق علاج کریں۔ (ڈاکٹر انگریم ایم، ڈی "ماڈرن ٹریٹ منٹ آف سورائیس" میں لکھتے ہیں کہ مرض چینل میں سنکھیا
 استعمال عارضی طور پر فائدہ مند ہے، بعض مریضوں کو زیادہ عرصہ استعمال کرانے سے جلد کا خبیث ورم پیدا ہو جاتا ہے) جب یہ مرض جسم
 بہت زیادہ پھیل چکا ہو تو اسے اولان (Aolan) پانچ سے دس سی سی کا ہفتہ میں ایک بار عضلاتی انجکشن دیں، دودھ شدہ اور
 کر کے یہ دوائیاں تیار کی جاتی ہیں۔ جب مرض کا ازالہ دوائی تدبیر سے نہ ہو سکے تو اس کا انجکشن کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، نئے تجربات
 مطابق ہیلی چینل کے لئے بعض دفعہ ڈامن بی ۱۲ کے انجکشن نہایت مفید ثابت ہوتے ہیں، خصوصاً جب ساتھ کمی خون کا عارضہ ہو۔

بیرونی طور پر کرائی سار وین میں گرین، ویزلین سفید ایک ادنس مرہم بنا کر مقام ماؤف پر صبح و شام مالش کریں، دوران علاج میں صرف
 بے دن غسل کریں، سات دن کے بعد مقام ماؤف سرخ ہو جانے کے بعد اس کو موقوف کر کے زناک آسٹینٹ لگائیں۔ چینل کے لئے
 مفید ہے۔ اس مرہم کو آنکھوں وغیرہ پر نہ لگنے دینا چاہیئے۔ ڈیروبن (Derobin) ساختہ گلیکوکورٹیکوئیس جس میں سلی سلک الیڈ اور
 بھی شامل ہیں چینل، داد وغیرہ کے لئے مفید ہے، علاوہ ازیں کیوٹی کور مرہم، زہبک مرہم اور انٹی الرکب مرہم اس مرض میں مفید ہیں۔

۱۔ ماڈرن ادویات :- ۱۔ کال گلو فر (سینڈوز) ایک ٹکیہ، وٹامن بی کمپلیکس بی ۱۲ (گلیکسو) ایک ٹکیہ۔ دونوں کو ایک ساتھ ہمراہ پانی دن میں دو بار کھلائیں۔ یہ کیلشیم و وٹامن بی کمپلیکس کی کمی کے سبب سے چنبل میں مفید ہے۔

۲۔ پریڈنی سولون ۵ ملی گرام، کیلشیم سینڈوز ٹیبلٹ ایک ٹکیہ۔ دونوں کو پانی کے ساتھ دن میں دو بار دیں، یہ اسٹرائڈ، وٹامن سی، وٹامن ڈی اور کیلشیم کا مرکب ہے، جو چنبل سے پیدا شدہ گنٹھیا، چنبل و اگرزیمیا کے لئے مفید ہے، خاص طور پر پرانے جلدی چنبل و گنٹھیا میں مفید ہے۔

۳۔ اے اولان (A-olan) :- یہ خالص دودھ کے ٹیکے ہیں، جب مرض جسم پر بہت پھیل چکی ہو تو پانچ سے دس سی سی کا ہفتہ میں ایک بار عضلاتی انجکشن نمایاں فائدہ دیتا ہے۔ یہ پی سی لان (Picilan)، سالیولان (Siolan) وغیرہ ناموں سے بھی ملتا ہے۔

۴۔ انٹھرائلین (Anthralin) ایسٹ ————— پہلے کم طاقت کی، بعد میں تیز طاقت کی مرہم مقام مرض پر لگائی جاتی ہے۔

۵۔ ڈیروبن (Derobin) گلیکسو ————— یہ ڈائی تھرائیول کا مرہم ہے، جس میں سلی سلک ایسڈ اور کوئلار بھی شامل ہے، چنبل جلد کی فطری سرایتوں میں مقام ماؤف پر گاز کے ذریعے لگایا جاتا ہے۔

۶۔ سگنولین (Signolin) بائر ————— یہ ڈائی تھرائیول (بی، پی، سی) مرہم ہے، یہ مرہم چنبل میں بہت مفید ہے۔

۷۔ کرائی ساروبین ۲۰ گریں، ویزلین سفید ایک اولس، مرہم بنائیں اور مقام مرض پر صبح و شام مالش کریں، اس مرہم سے کپڑوں کو بچائیں اور نازک جگہوں (چہرہ وغیرہ) پر نہ لگنے دیں، جب جلد سُرخ ہو جائے تو اسے بند کر دینا چاہیے۔

۸۔ وائی کورٹ (Wycort) واسٹھ ————— ہائیڈرو کورٹیسون ایسی ٹریٹ مرہم ہے، ایک فیصدی، ۲/۴ فیصدی و دنیومائی سین تین اقسام میں ملتی ہے۔ دن میں دو سے تین بار دیں۔

۹۔ بنزویک ایسڈ (باریک پوڈر) ۶۰ گرام، سلی سلک ایسڈ ۳۰ گرام، واسٹ سافٹ پیرافین ۱۰ گرام، چنبل، اگرزیمیا، داد، خارش کے لئے مفید ہے۔

۱۰۔ ایوریکس کریم (Eurax cream) تکلیف دہ جگہ پر ایک دو بار لگائیں۔

۱۱۔ اوسٹو کیلشیم (Osto Calcium) دو ٹکیہ دن میں دو سے تین بار کھلائیں۔

یونانی علاج :- مصفی خون ادویہ دیں، جن کے نسخہ جات پھوڑے کے بیان میں لکھے گئے ہیں اور اطریفیل شاہترہ، معجون چوبھینی، عرق عشبہ کا استعمال مفید ہے۔

بیرونی طور پر درخت شیشم سیاہ دس تولہ، چھلکا ناریل دس تولہ، گندم ۲۵ تولہ، نوشادر دس تولہ، جملہ ادویہ کا بطریق پتال جنتر تیل نکالیں، روئی کے پھاریہ سے مقام ماؤف پر لگایا کریں، خشک ہونے پر دھوپ میں بیٹھیں، چنبل، داد کو دور کرنے کے لئے مفید ہے، تیل نکالنے کا طریقہ داد کے بیان میں دیا جا چکا ہے۔

روغن چنبل و داد :- کاربالک ایسڈ چھ ماشہ، کافور ایک تولہ، تیل تارپین ۲ تولہ۔ کاربالک ایسڈ اور کافور کو ملا کر دھوپ میں رکھیں، جب حل ہو جائے تو تیل تارپین ملا کر ہلائیں، دن میں دو بار مقام چنبل یا داد پر لگائیں۔

عرق مصفی خون :- عناب پانچ تولہ، شاہترہ پانچ تولہ، سرپھوکہ پانچ تولہ، برادہ شیشم پانچ تولہ، منڈی پانچ تولہ، برگ مہندی پانچ تولہ، بسفانج پانچ تولہ، ہرڑ سیاہ پانچ تولہ، چرائیتہ دو تولہ، صندل سفید دو تولہ، صندل سُرخ دو تولہ، الائچی کلاں دو تولہ، گاؤزبان دو تولہ، پرسیا و شاں دو تولہ، عشبہ مغربی دس تولہ، کاسنی دس تولہ، مکو خشک دس تولہ، سولہ سیرانی میں رات کو تر کریں، صبح آٹھ سیر عرق نکالیں۔

خوراک تین تولہ ہمراہ شربت عذاب دو تولہ استعمال کریں۔

روغن چنبیل :- کچور ایک ماشہ، نوشادر ایک ماشہ، مکیدہ پانچ ماشہ، مہندی دو ماشہ، کالی زیری ایک تولہ، سفوف بنا کر کڑوے تیل میں ملا کر مقام ماؤف پر لگائیں۔

دیگر :- اجوائن دیسی دس تولہ کو آگ کے دودھ بیس تولہ میں خوب کھل کر کے ٹکیاں بنائیں اور تلوں کے تیل آدھ سیر میں جلا لیں، پھر چھان کر یہ روغن لگائیں۔

دیگر :- آملہ سارگندھک، نوشادر، سہاگہ خام، لیموں کے رس میں گیس کر لپ کریں۔
دیگر :- سرسوں کے تیل ایک سیر میں مقوڑا سا ڈنڈا مقوڑا ڈال کر تیل کو آگ پر رکھیں، جب ڈنڈا جل کر کوئلہ ہو جائے تو لوہے کے دستے سے تیل کے اندر رگڑیں اور حل کریں، پھر وہ تیل شیشی میں رکھیں، صبح و شام لگائیں، چند روز میں چنبیل دور ہو جائے گی اور دوبارہ نہ ہوگی۔

چنبیل کا کامیاب علاج :- بھینس کے تازہ گوبر کی مالش اعلیٰ سے اعلیٰ صابنوں اور انٹی سیپٹک دواؤں سے زیادہ موثر ثابت ہوتی ہے۔

۲۔ پت پاڑہ پانچ تولہ، ہرن کھری بوٹی پانچ تولہ، کالی مرچ پانچ دانے، ٹھنڈائی بنا کر شہد پانچ تولہ ملا کر استعمال کریں، اس ٹھنڈائی سے اندرونی طور پر فائدہ ہوگا، زبردست مصفی خون ہے، ہر سفہ استعمال کے بعد بند رکھ کر پھر استعمال کرنی چاہیے۔

۳۔ آدھی چٹانک سرسوں کے تیل کو خوب گرم کریں اور چھ سرخ مرچ بمعہ ڈنڈی سالم ڈال دیں، جل جانے پر اتار کر لوہے کے دستے سے رگڑ کر مرہم بنائیں۔ نیم کے جوشاندہ سے چنبیل کے زخموں کو صاف کر کے یہ مرہم ہلکی مقدار میں لگائیں، بعض مریضوں کو حیرت انگیز طور پر فائدہ دیتا ہے، یا

۴۔ کتھ گلابی، ہرڑ کالی برابر وزن، دونوں کو باریک پس کر کپڑ چھان کر کے دبزلین حسب ضرورت میں ملا کر مرہم تیار کریں۔ اور چنبیل والی جگہ پر لگائیں۔

آیور ویدک علاج :- ۱۔ رائی، نمک سیندھا، گڑان کو پس کر لپ بنا کر لگانے سے چرم دل کو ٹھہ دور ہو جاتا ہے۔

۲۔ ورچ پانی میں پس کر لگانا مفید ہے۔

۳۔ اندر جو گائے کے پیشاب میں پس کر لگانا مفید ہے۔

۴۔ نمک سیندھا، گری مغز بادام برابر کے برتن میں پانی سے پس کر چرم دل پر لپ کرنے سے آرام آ جاتا ہے۔

۵۔ دادنا شک تمام ادویہ چنبیل کے علاج میں بھی مفید ہیں۔

جرطی بوٹیوں سے کامیاب علاج

۱۔ تلسی بوٹی کے ہرے پتوں کو پندرہ دن لگاتار چنبیل پر ملنا آرام دیتا ہے۔

۲۔ جل دھنیا بوٹی کو پس کر چنبیل پر لپ کریں، چھالے ہو کر آرام آ جائے گا۔

۳۔ دھانسنہ بوٹی ۲۰ تولہ، ریوند چینی ۱۰ تولہ، کالی مرچ ۲ تولہ، سفوف بنائیں، خوراک چار ماشہ ہمراہ تازہ پانی دیں، چنبیل اور دوا کے لئے مفید ہے۔

۴۔ کاک جنگھابوٹی تازہ پانی سے سل بڑے پر رگڑ کر چنبیل و داد پر لگائیں، چند دنوں میں آرام آجائے گا۔
ہومیو پیتھک علاج :- علامات مرض کے مطابق رسٹاکس (Rhustox)، سلفر (Sulphur)، اور سورائی نم (Psorinum) بہترین ادویات ہیں۔

غذا و پرہیز :- لطیف و زود ہضم غذاؤں میں پروٹینز اور وٹامنز خصوصاً وٹامن بی کی مقدار کافی ہو، استعمال کریں، شراب، چائے، کافی، تمباکو سے پرہیز کریں، قبض نہ ہونے دیں، نمک، انڈے، دودھ وغیرہ کم استعمال کریں۔

آبلے، چھالے، روپیا پمفی گس (Rupia-Pemphigus)

تعریف مرض :- اس مرض میں جسم پر چھوٹے یا بڑے چھالے پیدا ہو جاتے ہیں۔
وجوہات :- ہاضمہ کی خرابی، کثافت جسمانی، زہریلے زخم، سورج کی گرمی کا اثر، رنج و غم، فکر و تردد، خرابی خون وغیرہ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔

علامات :- جسم پر چھوٹے یا بڑے آبلے پیدا ہو جاتے ہیں، جو مٹر کے دانہ کے برابر سے لے کر مٹر کے اندھے کے برابر تک ہوتے ہیں اور ان میں جلن ہوتی ہے، زیادہ تکلیف کی صورت میں بخار بھی ہو جاتا ہے۔

ایلو پیتھک علاج :- میگ سلف یا فروٹ سالت کا ہلکا جلاب دیں، چھالوں کو تینچے سے چھید کر کوئی انٹی سیک مرہم لگائیں۔ اس سلسلہ میں زنک آکسائیڈ یا بورک آکسائیڈ یا پینی سلین انٹی سیک مرہم کا استعمال مفید ہے، خوردنی طور پر سپیران کی گولیاں ایک عدد دن میں تین بار دیں۔ بیرونی طور پر سبازول ڈسٹنگ پوڈر چھالوں پر لگائیں یا نیبا سلف سپرکلنگ پوڈر (Nebasulph Sprinkling Powder) یا برنول آکسائیڈ کا استعمال کریں، بخار کی حالت میں یا شدید سوجن کی صورت میں پینی سلین یا پروکین پینی سلین یا سٹریٹو پینی سلین کا استعمال کریں، سلفا ڈایازین کا استعمال بھی مفید ہے، بیرونی طور پر سلفا ڈرگز کی مرہم یا انٹی بائیوٹک مرہموں میں سے کوئی ایک مرہم استعمال کریں۔

یونانی علاج :- عرق عشبہ بہترین مصفی خون ہے، ۲ تولہ ہمراہ شربت عناب یا بغیر شربت کے استعمال کریں اور پچھلے صفحات میں مصفی خون کے نسخہ جات میں سے کسی ایک کا استعمال کریں، سارپیرلیا کا استعمال بھی مفید ہے، آبلے بھوٹنے کے بعد زخم کو اچھا کرنے کے لئے کیدہ سفیدہ کا شغری، سیندور و مردارنگ ہر ایک تین ماش، سب ادویہ کو باریک پیس کر موم سفید ایک تولہ کو گھی گائے تین تولہ میں گھلا کر سفوف ملا کر مرہم بنائیں اور لگائیں۔

آیور ویدک طریقہ علاج بطر یونانی طریقہ علاج کے کریں۔

ہومیو پیتھک علاج :- اگر جلد پر صفراوی دانے ہوں تو مرکیورس سال، آرسنک، نائٹریک ایسڈ، رس ٹکس، ہیر سلفر، کاسٹیکم، نریم، سلیشیا، نیٹرم میور، نیٹرم سلف بہترین ادویات ہیں، حالات مرض کے مطابق بلحاظ عمر استعمال کریں۔

غذا و پرہیز :- مریض کو مقوی و زود ہضم غذا دیں، تازہ ہوا میں رکھیں اور جسم کو صاف رکھیں، گرم اغذیہ سے سخت پرہیز کریں، تیل کی تلی ہوئی چیزوں و ترشی سے پرہیز کریں۔ خون کو خراب کرنے والی اغذیہ نہ دیں۔

پھلوں سے علاج :- جن پھلوں میں ترشی یا پیشاب کھونے کی خاصیت ہو، وہ آبلے چھالے، خارش، داد، فساد خون کو دور کرتے ہیں۔

شدت پت، چھپاکی، پتی اچھلنا، ارٹی کیریا، (Urticaria)

تعریف مرض :- اس مرض میں تمام جسم پر گول گول ابھار (دھپڑ) پڑ جاتے ہیں اور چند منٹوں یا گھنٹوں میں دور ہو جاتے ہیں۔
وجوہات :- گرم و تیز غذاؤں کا استعمال، اندھ، پنیر، گندہ گوشت، مینگن، کھجور، خراب مچھلی، پستو، کھٹل اور بعض دفعہ پنی سلین
دوسری انٹی بائیٹک ادویات کے استعمال سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- اس مرض میں تمام جسم پر گول گول سُرخ مائل دھبے اچانک ظاہر ہو جاتے ہیں، جن میں جلن اور زور کی خارش ہوتی
ہے، بعض دفعہ قیئیں بھی آنے لگتی ہیں اور معمولی بخار بھی ہو جاتا ہے، معمولی حالتوں میں دھبے دو تین دنوں کے اندر دور ہو جاتے
ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ عارضہ برسوں تکلیف دیتا رہتا ہے۔

ایلوپیتھک علاج :- جدید ترین ادویات میں چھپاکی کے علاج میں انتھی سان (Anthisan) ساختہ مے اینڈ بیکریا انٹی سٹین
ساختہ سبباکپینی الرجک حالتوں کے لئے مفید ادویات ہیں، چھپاکی، ہائی فینور، پنی سلین، سٹرپٹومائی سین، سلفا ڈرگز
سنگھیا وغیرہ کے زہریلے اثرات دور کرنے کے لئے بہترین ادویات ہیں۔ دُم، سُرخ باد اور خارش کے لئے مفید ہیں، مقدار
اک ایک ایک کیپ سٹولز (گولی) دن میں دو سے تین بار دیں، مرض کی زیادتی کی حالت میں اسے عضلاتی انجکشن دوسری سی کی مقدار
دیا جاسکتا ہے۔ بیرونی طور پر استعمال کے لئے انتھی سان کریم (Anthisan Cream) بھی استعمال میں لائی جائے تو بہت
فائدہ ہو جاتا ہے۔

ہمارے تجربات کے مطابق اس مرض میں انتھی سان زیادہ فائدہ کرتی ہے۔ ان دواؤں کی پہلی خوراک سے آدھے سے تین
گولے کے اندر خارش میں کمی ہو جاتی ہے، اس کے بعد دھپڑوں میں کمی ہو جاتی ہے، اگر انتھی سان کریم ساتھ استعمال کی جائے تو بہت
فائدہ ہو جاتا ہے۔

بچوں کی چھپاکی کے علاج میں بیرونی طور پر کیلے من لوشن جسم پر لگائیں اور مندرجہ ذیل نسخہ استعمال کرائیں :-

پلور ہائی (سفنو ریلونڈ) ایک گرین، سوڈا بائیکارب پانچ گرین، سیرپ آف جمبر پانچ سمن، کلوروفارم واٹر ٹائیک ڈرام، ایسی ایک
خوراک پانی میں ملا کر دن میں دو بار پلائیں اور کم عمر بچوں کو اس سے بھی کم مقدار دیں، اگر خارش کی وجہ سے بچہ بے چین ہو، تو الکسر آف
اڈرل (Benadryl) پچھلے سے پچھلے دن میں دو یا تین بار دیں۔

ایول (Avil) ایک ٹکیہ صبح، دوپہر، شام ہمراہ پانی بلحاظ عمر دیں۔ یہ انٹی ہسٹامین دوا کامیاب علاج ہے، پتی اچھلنا اور دُم
لئے مفید ہے یا ایفے ڈرین پم تا پم اگر پانی سے دیں، اکثر سپرہ منٹ میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ انٹی سٹین (Antistin) سا ۲۔ انتھی سان (Anthisan) مے اینڈ بیکر

بینڈرل (Bendryl) پارک ڈیوس ۳۔ ہسٹوسٹب (Histostab) بوٹس ۴۔ فرگن (Phenergan)

مے اینڈ بیکر ۵۔ الرجن (Alergin) سپلا ۶۔ سائوپین (Synopen) گیگی ۷۔ ہسٹیلزین

(Histalazine) سٹینڈرڈ ۸۔ ڈی بی سٹین (Dibistine) سا ۹۔ زیٹ (Zeet) المیک

وغیرہ کی ایک ٹکیہ تازہ پانی سے دن میں دو بار دیں، چھپاکی کا عارضہ فوراً دور ہو جائے گا۔

۲۔ پائری بنز امین (Pyribenzamin) سبباً ————— یہ بھی ایک انٹی ہسٹامین دوا ہے۔ ایک ٹکیہ دن میں تین بار بعد از غذا دیں۔ یہ دوا مقامی استعمال کے لئے کریم کی شکل میں بھی ملتی ہے۔

۳۔ ڈایاٹرین (Diatrin) وارنر ————— ایک ایک ٹکیہ دن میں تین بار بعد از غذا دیں۔

۴۔ انسیدل (Incidal) بارنر ————— ایک یا دو ٹکیہ دن میں دو سے تین بار تازہ پانی سے دیں۔

۵۔ ہسٹوسٹیپ کریم (Histostabcream) ہولس ————— یہ انٹازولین پیسٹے سلفونیٹ دو فیصدی کو لطیف بمیس میں ملا کر تیار کی گئی ہے، جلد کے حساسیتی حالات، کیڑوں کے کاٹنے میں نافع ہے، بیرونی مالش کی جائے۔

۶۔ ہسٹوفیکس (Histofax) بروز دلیکم ————— اسے بھی ۵ کی طرح استعمال کریں۔

۷۔ پیری ایکٹن (Periactin) ایم، ایس، ڈی ————— بڑوں کے لئے ایک ایک گولی دن میں تین بار۔ اسے بلغمی دمر کی روک تھام کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے، کئی بار اس دوا سے مریض اونگھنے لگ جاتا ہے، تب اسے بند کر دینا چاہیے، ہر ٹکیہ میں چار ملی گرام سائپر و ہسٹاڈین کلورائیڈ پڑتی ہے۔

۸۔ کیسی سین (Calcistin) بوہنگر ————— ایک سے دو ٹکیاں دن میں دو سے تین بار تازہ پانی سے دیں یا کثرت مرض میں ایک امپول کا عضلاتی انجکشن لگائیں۔

۹۔ کالاڈرل کوشن (Caladryl) پارک ڈیوس ————— کیمفر اور گلیسرین کے ساتھ انٹی ہسٹامین دوا بیناڈرل شامل ہے، یہ کوشن بدن کی کھال جھلس جانے، کھجلی، پتی اچھلنے وغیرہ میں بیرونی لگایا جاتا ہے۔

۱۰۔ کیلشیم سینڈوز "۵۰۰" (Calciu msaudoz "500") سینڈوز ————— ایک انجکشن دریدی کریں، اسے خون بہنے، الرجی والے امراض (چھپاکی، اگزیم) وغیرہ میں دیتے ہیں، پرانے شیت پت میں بہت مفید ہے۔

۱۱۔ آڈرینالین (Adrenalin) ۱ میں ۱۰۰ طاقت والی کاربیر جلد انجکشن کریں اور اس کے بعد ایفی ڈرین ہائیڈروکلورائیڈ پڑا کرین کھلائیں۔

۱۲۔ ایڈرینو ایفی ڈرین (Adrenoephedrine) کا ایک امپول زیر جلد انجکشن دیں۔

۱۳۔ بیٹ نے سول (Betnesol) گلیکو ————— والی سولون (Wysolone) ————— واسٹہ ————— سے بن (Precin) ————— المیک ————— ڈیلٹا کارٹرل (Deltacortril) فز ————— ملی کارٹن (Milicorten) سبباً —————

ڈیکاڈرون (Decadron) مرک شارپ ڈوہم ————— وغیرہ ایک ایک ٹکیہ دن میں تین بار تازہ پانی سے دیں۔ یہ ماڈرن ادویات زمانہ حال کی دریافت ہیں۔ جہاں یہ فوری طور پر شفا بخش ہیں، وہاں ان کا استعمال احتیاط سے کرنا لازم ہے، کیونکہ بعض دواؤں کے غلط استعمال سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔

۱۴۔ پرانی چھپاکی میں کیسی آٹے لین (Calci-ostelin) گلیکو یا کیسی آٹے لین ویدوٹامن بی ۱۲ (Calci-ostelin vit. B-12) گلیکو ————— ایک سے دو سی سی عضلاتی انجکشن ہفتہ میں دو تین بار مرض کے مطابق دیں۔

۱۵۔ شدید حالات مرض میں ڈیکاڈرون (Decadron) ایم، ایس، ڈی ————— ایک سی سی کا عضلاتی انجکشن دیں۔

۱۶۔ الیکز انٹھی سان (Elixir anthisan) ۴ سے ایکٹ محو دن میں دو سے تین بار دیں، باہر سے جسم پر انٹھی سان مرہم کی مالش کریں بچوں کی چھپاکی میں مفید ہے۔

یونانی علاج :- گل روغن ایک تولہ، عرق گلاب پانچ تولہ، سرکہ انگوری آدھا تولہ، سب کو ملا کر کافور ایک ٹہنی شامل کر کے مقام خارش پر لگائیں فوراً سکون ہوگا۔ یا ناگ کیسر چھ ماشہ سفوف کر کے شہد دو تولہ میں ملا کر صبح و شام چٹائیں۔ یا گبر و دو ماشہ، شہد خالص دو تولہ میں ملا کر چٹانا مفید ہے۔

دوائے چھپاکی :- پودینہ سبز ایک تولہ، شکر تری دو تولہ، بقدر ضرورت پانی ملا کر چھان کر ایک دو گھونٹ ایک ہی بار پلائیں۔ ایک بار میں چھپاکی کو فائدہ ہوگا۔ آرام نہ آئے تو بارہ گھنٹہ بعد دوبارہ دے سکتے ہیں۔

دیگر :- جلنیم بوٹی چار تولہ، مرچ سیاہ آٹھ تولہ، ہر دو کا سفوف بنا کر پانی کی مدد سے چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ ایک ایک گولی ہمراہ پانی دن میں تین بار دیں، چھپاکی و خارش کے لئے از حد مفید ہے۔

دوائے چھپاکی :- رال بڑھیا لے کر باریک سفوف بنالیں، خوراک آدھے سے ایک ماشہ دن میں تین بار دیں، چھپاکی کے لئے از حد مفید ہے۔ ذائقہ کے لئے برابر کھانڈ ملا سکتے ہیں، پچیش کے لئے بھی نہایت زود اثر ہے۔

دیگر :- تر بھلہ چھ گرام سفوف بنا کر رات کو ۵ گرام پانی میں بھگو کر صبح چھان لیں۔ اور اسی طرح یا تھوڑا سا شہد ملا کر لیں، یا سفوف کو ملکہ گرم پانی سے لیں۔

آیور ویدک علاج :- کھدر آرٹھ (شارنگدھر) ایک سے دو تولہ تک برابر پانی ملا کر کھانا کھانے کے بعد دیں یا چوب صینی آدی چورن چھ ماشہ، برہت منجشادی کو اٹھ کے ساتھ دیں یا برہت منجشادی کو اٹھ ایک سے دو تولہ کا جوشاندہ دیں۔

چھپاکی وٹی :- سنار شدھ، پیپل، کالی مرچ، سونٹھ، پرانا گڑ، سب ادویہ کو علیحدہ علیحدہ کوٹ چھان کر گڑ ملا کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک ایک گولی ۲ گھنٹہ بعد گرم دودھ سے دیں۔

شیت پت کٹھار :- (یہ انہنی سان کے مقابلہ کا آیور ویدک نسخہ ہے) چھوٹی چندن بوٹی کا سفوف ایک تولہ کشتہ صدف مرواریدی ایک تولہ سفوف بنائیں۔ ایک رتی سے دور تری دن میں دو سے تین بار تازہ پانی سے دیں۔ نئے مرض کے لئے مفید ہے۔

ہومیوپیتھک علاج :- آرسنک، سلفر، مرکپورس بہترین ادویات ہیں، بلحاظ عمر استعمال کریں۔

بایو کیمک علاج :- کالی میور، سائی لیشیا، کلکیر یا فاس عمدہ ادویات ہیں، علامات مرض کے مطابق استعمال میں لاسکتے ہیں۔ غذا و پرہیز :- گرم، تیز اور نمکین اشیاء، نیز بادی و ثقیل، فاسد اور خراب غذا سے پرہیز کرنا، غذا لطیف، زود ہضم اور مقوی دیں۔

پانی و ات، چھا جن، اگزیم، (Egzema)

تعریف مرض :- اس مرض میں چھوٹی چھوٹی پھنسیاں بہت گنجان پیدا ہوا کرتی ہیں، جلد لال ہو جاتی ہے اور زبردست خارش ہوتی ہے، تیسرے دن جلن کے ساتھ رطوبت پیپ میں بدل جاتی ہے، پھر پھنسیوں کے پھوٹنے سے گاڑھی رطوبت کھرنڈوں کی صورت میں جمتی چلی جاتی ہے۔ مرض کے بڑھنے کی صورت یہی مواد ہوتا ہے، جس کے آس پاس لگنے سے مرض بڑھ جاتا ہے۔ اور ان میں جلن پائی جاتی ہے۔

وجوہات :- ہاضمہ کی خرابی، جسمانی کمزوری، ذیابیطس یا نفرس، جوڑوں کے درد و گرم چیزوں خصوصاً انڈے، مچھلی اور تیز صابن

سے نہانے سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- شروع میں خشک فارش ہوتی ہے، پھنسیاں، چھلے یا گٹھلیاں پیدا ہوتی ہیں، کھرنڈ اترتے ہیں۔ جن کے نتیجے

پتی رطوبت ہوتی ہے۔ کھجلی شدید ہوتی ہے۔

ڈاکٹری علاج :- مقام ماؤف یا زخم کو صابن اور پانی سے نہ دھوئیں بلکہ پیلے زنک آسینٹھٹ (مرہم جست) موٹے کپڑے پر لگا کر پٹی باندھ دیں، جب دو چار بار لگانے سے کھرنڈ اتر جائیں اور مرض میں کسی قدر کمی ہو جائے تو فی اوکس زنک آسینٹھٹ پانچ رتی گندھک (سلفر) ملا کر اس مرہم کو کپڑے پر لگا کر زخموں پر لگائیں اور اوپر سے پٹی باندھ دیں، چند دن میں آرام آ جائے گا خوراک کی طور پر سیٹران کا استعمال کرائیں یا کھتی اول ایک ڈرام، زنک اوکسائیڈ، بورک ایسڈ ہر ایک ایک ڈرام، ویزلین سفید ایک اونٹ سب کو ملا کر مقام ماؤف پر لگائیں۔ اگر مرض بہت زیادہ ہو تو سٹرپٹو پیٹین سلین یا پیٹین سلین کے عضلاتی انجکشن لگائیں۔

جدید تحقیقات کے مطابق ایگزیم (Eczema) میں وٹامن بی کمپلیکس نہایت مفید ثابت ہوئی ہے، کیونکہ اس کے کچھ دن کے استعمال سے کھجلی دور ہو جاتی ہے اور ایگزیم یا دور ہونے لگتا ہے، خوردنی استعمال کے لئے ایگزیم وٹامن بی کمپلیکس اور انجکشن کے ربر کی ٹوپی والی شیشی میں دستیاب ہوتی ہے۔ ایک سی سی روزانہ عضلاتی انجکشن کے ذریعے اور پینے کے لئے دو چھوٹے چمچے رکھنا کھانے کے بعد استعمال کریں۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ ایف کارلین مرہم (Efcorlin) گلیکو۔ ایگزیم کے لئے مفید ہے، زیادہ تکلیف کی حالت میں ایف کارلین معہ نیو مائی سین لگائیں۔ یہ ہائیڈرو کارٹی سون کی مرہم ہے۔

۲۔ بیٹنووٹ مرہم (Betnovet) گلیکو۔ تمام قسم کے ایگزیم کے لئے مفید ہے۔ اگر یہ چھوٹ کے طور پر رہا ہو تو بیٹنووٹ این مرہم لگائیں۔

۳۔ نیبا کورٹیل مرہم (Neba-cortril) ڈومیکس۔ اس میں انٹی بائیٹک اور کورٹی کو سٹرائیڈ دونوں ملے ہوئے زخموں اور ایگزیم کے لئے بہت مفید ہے۔

۴۔ ٹینافیکس مرہم (Tenafax) بروز ویکم۔ مقامی طور پر لگائیں۔

۵۔ کیبسی سون مرہم (Cambison) ہکیٹ۔ مقام متاثرہ پر پتلا لپ کریں۔

۶۔ یورکس (Eurax) گیلی۔ خارش والے ایگزیم میں از حد مفید ہے۔ جہاں ایگزیم ہو۔ وہاں لگائیں۔

۷۔ ٹارسولون مرہم (Tarsolone) ہکیٹ۔ مقام مرض پر لگائیں۔

۸۔ ملی کارٹن والیو فارم (Milli corten vioform) سبا۔ مرہم کی صورت میں دن میں دو سے تین بار لگائیں۔

۹۔ ہائیڈرو کارٹی سون مرہم (Hydrocortisone) دن میں ایک دو بار لگائیں۔

۱۰۔ لانجیفین (Longifen) یونیکم۔ دن میں دو سے تین بار لگائیں۔

۱۱۔ بریڈیکس والیو فارم (Bradexvioform) سبا۔ دن میں دو سے تین بار لگائیں۔

۱۲۔ لارجی سے ایگزیم یا ہوتو لارگیٹل (Largactil) سے اینڈیکر۔ ایک ایک ٹیکہ دن میں دو سے تین بار دن

۱۳۔ ویلرگان (Vellergan) سے اینڈیکر۔ ایک ایک ٹیکہ دن میں دو سے تین بار دیں۔ ایگزیم یا کھجلی کے

از حد مفید ہے۔

۱۴۔ فزگن (Phenergan) سے اینڈبیکر ————— کی ایک ایک ٹکیہ دن میں دو تین بار دیں، ۱۲ کی طرح مفید ہے۔

۱۵۔ کیناڈرما آئینٹمنٹ (Kena derma ointment) اسکوب ————— یہ دوا جلد پر لگانے کے لئے ٹیوب میں دستیاب ہے۔ جلد کی جراثیمی سرایت و ایگزیمیا کے لئے مفید ہے۔

۱۶۔ کینامینا (Kenamina) سارا بھائی ————— یہ دوا "کورٹی کوٹامین تھیراپی" کہلاتی ہے، حساسیتوں کے لئے مفید ہے، خراش جلد اور ایگزیمیا کے لئے جلد فائدہ پہنچاتی ہے۔ ایک ٹکیہ کھانے کے لئے دیں۔ دس ٹکیوں کے سٹریپ میں دستیاب ہے۔

۱۷۔ میپاٹرامین میلی ایٹ (Mepyramine melete) یہ ایک انٹی ہسٹامین دوا ہے جو انتھی سان اور ایول نام سے دوسری سی کے ایمپول میں ملتی ہے اور عضلاتی انجکشن لگایا جاتا ہے۔ سیرم کی بیماری میں چھپاکی، آنکھ سے پانی بہنے اور ایگزیمیا کی خراش جلد میں مفید ہے، کئی بار دمہ کے دورہ کو بھی دبا دیتی ہے، اس سے بعض مریضوں میں غنودگی و چکر آنے لگتے ہیں۔ اس لئے با احتیاط استعمال کی جائے، چھوٹے بچوں کو استعمال نہیں کرائی جاتی ہے۔

۱۸۔ انٹی ٹین (Antistin) سبا ————— یہ دوا انٹی ہسٹامین قبیلہ سے تعلق رکھتی ہے۔ حساسیتی امراض، بلغمی درما، چھپاکی و ایگزیمیا کے لئے از حد مفید ہے۔ ایک ایک ٹکیہ دن میں تین بار تازہ پانی سے دیں یا ایک ایمپول کا عضلاتی انجکشن لگائیں۔

۱۹۔ لیڈرپلیکس (Lederplex) لیڈرے ————— نئی کھوج کے مطابق ایگزیمیا میں وٹامن بی کیپلیکس بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔ کیونکہ اس کے چند دن کے استعمال سے کھجلی غائب ہو جاتی ہے اور ایگزیمیا ختم ہونے لگتا ہے۔ ایک سی سی کا عضلاتی انجکشن روزانہ لگایا جائے۔

۲۰۔ نیوکورٹلف (Neo-cortef) اپ جان ————— یہ مرہم ہائیڈرو کورٹی سون اور نیومائی سین ملا کر تیار کی گئی ہے۔ چھوٹ دار ایگزیمیا میں مفید ہے، ۲۴ فی صدی کی مرہم مقام ماؤف پر دن میں ایک دو بار مالش کریں۔

۲۱۔ ایف کورٹی لین سکن آئینٹمنٹ (EF-Cortelen Skin Ointment) دن میں دو تین بار مقام مرض پر مالش کریں۔

۲۲۔ کلاڈرل لوشن (Caladrul Lotion) پارک ڈیوس ————— ایگزیمیا پر دن میں دو بار لگائیں۔

۲۳۔ ایف کارلین وڈ نیومائی سین مرہم (EF Corlin with Neomycin) گلیکو ————— ایگزیمیا پر لگائیں۔

یونانی علاج :- پہلے کڑوا تیل لگا کر پھر کسید صاف کیا ہوا ایک تولہ، مائیں ایک تولہ، سفوف بنائیں، ہر دو کو ملائیں اور بخور اُسا چھڑکیں، دو تین روز میں مکمل آرام آجائے گا، پینے کے لئے عرق مصفی خون یا شربت عذاب وغیرہ استعمال کرائیں۔
مرہم ایگزیمیا :- مردارنگ، کتھ، کسید، رال، مہندی کے پتے مساوی وزن کوٹ کر گائے کے مناسب مکھن میں ملا کر مقام مرض پر لگانا مفید ہے۔

آلیور ویدک علاج :- کھدر آرٹ ایک تولہ سے دو تولہ تک ہمراہ تازہ پانی بھون کے بعد پیئیں اور چوب چینی آدی پورن کا استعمال بھی مفید ہے۔

ہومیوپیتھک علاج :- گریفائیٹس، پٹرو لیم، سلیم، سیپا، کلکیریا کارب، ایگرکس ہاتھوں وغیرہ کے ایگزیمیا کے لئے نہایت مفید ادویات ہیں۔

بیرونی طور پر کاربالک ایڈ مریم (کاربالک ایڈ ۵ قطرے، ویزلین ایک اونس) لگائیں، خارش وغیرہ کے لئے مفید ہے۔
غذا پر سہیز: شراب، کباب، گوشت، اندھے، لہسن، پیاز، لال مرچ، گرم مصالحہ، مینگن، کھٹی اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں
ٹھنڈی سبزیاں و ترکاریاں مثلاً بٹڈے، مونگ کی دال، گاجر کی سبزی، سبز توری، کدو وغیرہ مفید ہیں۔

شویت کشت، پھلہری، برص، لیکوڈرما، (Leucoderma)

تعریف مرض :- یہ سفید داغ ہوتے ہیں، جو تمام جسم پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔

وجوہات :- مچھلی، مینگن کے بکثرت استعمال اور خراب غذاؤں سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے، عام طور پر مچھلی کھا کر دودھ پینے سے یہ عارضہ زیادہ پیدا ہوتا ہے، اکثر یہ مرض دروٹی بھی ہوتا ہے، میوہ جات کے بعد پانی پینے سے بھی یہ تکلیف ہو جاتی ہے۔
علامات :- جلد پر جا بجا سفید داغ پڑ جاتے ہیں، جو شروع میں تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ بڑھ جاتے ہیں، ویسے تو ہر حصہ جسم پر یہ مرض ہو سکتا ہے۔ مگر عام طور پر ہاتھوں اور چہرہ پر یہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ مرض بہق ابض سے مشابہ ہوتا ہے، فرق یہ ہے کہ پھلہری (برص) کی رنگت سفید اور مچھنی ہوتی ہے، یہ جلد اور گوشت میں داخل ہو کر بڑی تک پہنچتا ہے اور اس مقام پر جو بال پیدا ہوتے ہیں وہ بالکل سفید یا سفیدی مائل ہوتے ہیں۔ مقام مرض کی جلد باقی جسم کی جلد سے زیادہ نرم ہوتی ہے جب یہ مرض پکا ہو جائے تو اس جگہ سوئی چھوونے سے پانی کے رنگ کی سفید رطوبت بجائے خون کے نکلتی ہے۔ اگر اس جگہ کو ہاتھ سے مالش کریں تو وہ سُرخ نہیں ہوتی، اس کے برخلاف بہق کی سفیدی ہلکی اور پتلی ہوتی ہے جو جلد تک اثر کرتی ہے، اس جگہ جو بال پیدا ہوتے ہیں وہ سفید نہیں ہوتے، اگر چمڑی کو اوپر اٹھا کر اس میں سوئی چھوئیں تو خون سُرخ یا گلابی رنگ کا نکلتا ہے اگر سوئی چھوونے سے پانی نکلے تو فائدہ کی امید کم ہے اور اگر خون نکلے تو فائدہ کی یقیناً امید ہو سکتی ہے۔

علاج ڈاکٹری :- اس مرض کے علاج میں ایلو پیتھک، آیور ویدک اور یونانی طب کے حاملان نے "بابچی" کو زود اثر قرار دیا ہے۔ چونکہ یہ مرض مشکل سے دور ہوتا ہے، اس لئے اس کے علاج کو کافی دیر تک جاری رکھنے سے ہی فائدہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹری طریقہ علاج میں لودرمول (Ludermol) ساختہ سمٹھ کمپنی آئیل یا مریم کی صورت میں داغوں پر لگانے کے لئے عمدہ دوا ہے۔ خوراک کی طور پر لائیو آر آرسینی کیلس ایک سے دو سہم ایک گھونٹ پانی میں ملا کر بعد از غذا دن میں دو بار دیں۔ دھیان رہے کہ یہ سنکھیا کا مرکب ہے، اس لئے اسے با احتیاط استعمال کیا جائے اور ہر سات دن کے بعد دودن کا ناغہ کیا جائے۔ اس سلسلہ میں بیرونی طور پر لیوڈرمول (Ludermol) کا ٹیکہ مقامِ مادون پر کرنا بھی موثر علاج ہے یا چال موگرین (Challmo grin) داغوں پر لگائیں۔ ہمارے ایک دوست نے سفید داغوں کے لئے ہائپو (Hypo) جس سے نوٹو گرافر فلمیں دھوتے ہیں، کا استعمال کیا، جس سے برص کے داغ دور ہو گئے۔ اس سلسلہ میں نہاتے وقت ہائپو کا پتلا گھول پانی میں بنا کر داغوں پر کچھ دیر روزانہ ملا جائے تو کچھ دنوں میں آرام آ جاتا ہے۔

یونانی علاج :- ہرنال درقیہ ایک حصہ، بابچی چار حصہ، سفوف بنا کر پانی میں رگڑ کر سفید داغوں پر لپیپ کریں، پندرہ دن کے اندر تمام داغ دور ہو جائیں گے۔ یہ دوا آنکھوں پر نہ لگئے دیں، یا بابچی ایک سیرے کر کوڑہ گلی میں ڈال کر پتال جنتر کے ذریعہ تیل نکالیں خوش رنگ سنہری تیل برآمد ہوگا۔ روزانہ برش سے داغوں پر دن میں دو تین بار لگائیں۔ یا

روغن چال موگرا ایک اولس اور تیل بنولہ تین اولس لے کر برش سے داغوں پر لگائیں۔
مندرجہ ذیل تجربات اس مرض کا موثر علاج ہیں :-

دوائے برص :- چاکسو، یج پنوار، باجی شدھ، انجیر درخت کا چھلکا، درخت نیم کی اندرونی چھال ہر ایک دو تولہ، سب کو کوٹ چھان کر سفوف بنالیں۔ چھ ماشہ سفوف رات کو پانی میں بھگو رکھیں، صبح اس کا نتھار پلائیں اور پھوگ پیس کر داغوں پر لپیپ کریں، سوائے بیسنی روٹی کے اور وہ بھی بغیر نمک کے ہو، اور کوئی غذا نہ دیں۔ برص کے ہٹانے کے لئے یہ نسخہ مفید و مجرب ہے۔

دوائے پھلبہری :- سفوف کول ڈوڈہ (کول ڈوڈہ شدھ کریں) ایک سیر، سفوف الاچی خورد پندرہ تولہ، خوراک تین ماشہ ہر تازہ پانی صبح و شام لیں، بیرونی استعمال کے لئے سفوف باجی پم سیر، سفوف سرسوں سفید ایک تولہ، ہر دو کو ملا لیں اور ترش دہی کے ساتھ داغوں پر لگائیں۔ اس سے پھلبہری دور ہو جائے گی۔

سفوف باجی :- باجی شدھ، یج پنوار، انجیر، چاکسو، برابر وزن لے کر سفوف بنائیں، خوراک چھ ماشہ، پوٹلی میں باندھ کر رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح اس کا نتھار سپیں۔ اور اس کا پھوگ سرکہ میں پیس کر داغوں پر لگائیں، غذا صرف بیسنی روٹی بغیر نمک دیں، گھی زیادہ دیں، تیل گڑ اور لال مرچ سے پرہیز کریں۔

برص ولی :- نیل دیسی، باجی، شیطرج ہندی ہر ایک دو تولہ، سب کو باریک پیس کر سرکہ خالص میں کھل کر کے مازو کے برابر گولیاں بنائیں، ایک گولی پانی میں گھس کر دن میں دو تین بار لپیپ کریں۔

دیگر :- تخم باجی پانچ تولہ، تخم بکائن تین تولہ، دونوں کو علیحدہ علیحدہ باریک کر کے رکھ لیں، پھر ادھرک بقدر ضرورت رات کو بھگو رکھیں، صبح عرق گلاب مناسب میں گھس کر رکھ لیں، برص کے مقام کو کھردرے کپڑے یا گائے کے خشک اُپلا سے رگڑ کر خراش سی پیدا کریں۔ پھر اس پر دوا مذکور لگا کر قدرے آگ کی گرمی پہنچائیں، کچھ دیر کے استعمال سے فائدہ ہوگا۔ ذرا استقلال سے کام لینا پڑے گا، ضرور فائدہ ہوگا۔

باجی شدھ کرنے کی آسان ترکیب :- باجی لے کر ادھرک کے پانی میں ایک ہفتہ تک بھگوئے رکھیں، اس کے بعد خشک کر لیں اور برابر چینی ملا کر سفوف بنائیں اور برص کے لئے ایک ماشہ کھلائیں۔

سفوف برص :- سمندر سوکھ ایک تولہ، پھول منڈی دو تولہ، سفوف بنا کر چھ ماشہ کی مقدار میں ہمراہ دودھ دیں۔

دوائے برص :- کسیدہ شدھ، یج پنوار دو تولہ، باجی شدھ دو تولہ، کتھہ چھ ماشہ، مغز یج نیم چھ ماشہ، کونیل نیم چھ ماشہ، تمام ادویات کو باریک کر کے کونیل نیم سبز کے رس میں خوب کھل کریں اور گولیاں کوکن بیر کے برابر بنالیں، خوراک ایک گولی ہمراہ پانی صبح دیں، ان گولیوں میں سے ایک گولی یا زیادہ کو پانی میں گھس کر داغوں پر لپیپ کریں، خوراک بیسنی روٹی گھی کے ساتھ کھائیں۔

عرق برص :- ہلدی کچی، چھلکا درخت نیم، پھول منڈی بوٹی، گڑ برابر وزن، ٹکے میں ڈال کر پانی بقدر مناسب داخل کریں اور گھوڑے کی لید میں دو ہفتہ دفن کریں۔ بعد ازاں عرق نکالیں، پانچ سے دس تولہ صبح و شام پیئے رہیں۔ تین ماہ میں مکمل آرام ہو جائے گا۔

دیگر :- باجی، تخم مولی، سہاگہ ہم وزن باریک کر کے دہی میں ملا کر داغ والی جگہ پر (نازک جگہ پر نہ ہوں) لگائیں اور دھوپ میں بیچھیں۔

آیور ویدک علاج :- ۱۔ باجی کو گائے کے پیشاب میں سات دن تر رکھیں۔ پھر دھوپ میں خشک کر کے چھلکا اتار کر

صاف پانی سے دھولیں اور خشک کر کے پیس کر خوراک آدھے سے ایک ماشہ تک ہمراہ باسی پانی دیں اور اس سفوف کو ادرک کے پانی میں ملا کر داغوں پر لپیپ کریں۔

۲۔ بیج مولی ایک تولہ، باجی ایک تولہ، سب کو لمبوں کے رس میں کھل کر اور ایک گولی رس لمبوں میں گھس کر پھلہری کے داغوں پر لپیپ کریں۔

سفید داغوں کا علاج ”باجی“

باجی لپیپ :- بیج باجی پانچ تولہ، تخم بکائن تین تولہ، دونوں کو علیحدہ علیحدہ بار میک کر کے رکھ لیں، سوٹھ بقدر حاجت کو عرق گلاب میں بھگو دیں، صبح اس کو پتھر کی کوندی میں عرق گلاب ڈال کر خوب گھسیں، اور بقدر حاجت پیلا سالیپ بنالیں، پھر ان تینوں کو ملا لیں، داغ والی جگہ کو کھردرے کپڑے سے خوب سرخ کر کے اوپر یہ دوا لگا کر آگ سنکیں اور بار بار ٹمکور کرنی چاہئے۔

”سکھدائیک ملتانی دواخانہ پانی پت“ میں ہم نے سینکڑوں بار مریضوں کو استعمال کرایا اور یہ ہمارے مجربات سے ہے، اس سلسلہ پر خیال ہے کہ اگر برص کا داغ کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں سینک نہ کیا جاسکتا ہو۔ تو کپڑے کو گیند سا بنالیں اور اسے گرم کر کے رکھ لیا کر اور ایک مریض کو سفید داغ ہاتھوں اور سینہ پر تھے، مندرجہ بالا لپیپ اور خوراک کی طور پر ”دوائے برص“ دی گئی، مریض کو ایک ماہ میں صحت ہو گئی، ایسے داغ جہاں سوئی چبھو نے سے خون نہ نکلے، یہ دوا استعمال کرنی بے کار ہے، کیونکہ یہ مرض لا علاج ہے، کیونکہ خون نکلے قابل علاج ہے، ورنہ نہیں۔

دیگر :- باجی کو بیج مولی اور بلدی کے ساتھ پیس کر گائے کی دہی کے توڑ میں روزانہ گھنٹہ بھر تک برص کے داغوں پر ملیں آرام آجائے گا۔

دیگر :- باجی شدھ ڈیڑھ ماشہ، رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح اس کو نتھار پلانا اور پھوگ کو داغوں پر لگانا برص (پھلہری) کے لئے مفید ہے۔

دیگر :- باجی حسب ضرورت لے کر نہایت باریک پیس لیں، پھر اس میں جامن کے پھلوں کا رس ڈال کر برابر اکیس دن کھل کریں، ان آں پیشاب گائے کے ہمراہ اکیس روز تک کھل کریں اور گولیاں بنا کر خشک کر لیں، ان گولیوں کو ادرک کے رس میں گھس کر سفید کوڑھ داغوں پر لپیپ کریں، چند روز میں داغ دور ہو جائیں گے۔

حب باجی :- باجی، چھلکا درخت انجیر جنگلی، گندھک آملہ سار، مردار سنگ ہر ایک ایک تولہ، سب کو باریک پیس کر ادرک کے رس میں حل کر کے بڑی بڑی گولیاں بنا کر رکھ لیں، ضرورت کے وقت ایک گولی ادرک کے رس میں حل کر کے لپیپ کریں، برص، جذام اور سفید داغوں کو دور کرتا ہے۔

نوٹ :- بعض دفعہ لپیپ کی دوائیں برص کے داغوں پر سخت سوزش اور جلن پیدا کرتی ہیں، ایسی حالت میں سوزش ہونے پر دوا کا استعمال کم مقدار میں کیا جائے اور کچھ دنوں کے لئے بند کر دیا جائے۔

دیگر :- باجی شدھ، کرلیہ کے پھلوں کے رس میں گولیاں بقدر نغود بنائیں، ایک گولی صبح و ایک گولی شام ہمراہ تازہ پانی دیں، بیرونی طور پر کرلیہ کے پانی میں گھس کر داغوں پر لپیپ کریں۔

ہومیو پیتھک علاج :- ہائیڈروکلوٹائل مدینچر اس مرض کی مفید دوا زمودہ دوائی ہے۔ یہ دوائی لگاتار کچھ عرصہ استعمال کرنی چاہیے۔

روزانہ چار قطرے پانی میں ملا کر دیں، بیرونی طور پر بائیڈر کو ٹائل مرہم کا استعمال کیا جائے۔
غذا و پرمہیز:۔ زود ہضم و مقوی غذا دیں، اگر بیسی روٹی بغیر نمک کے زیادہ گھی ڈال کر کھائیں تو مفید ہے، دیر ہضم و ترش چیزوں سے سخت پرہیز کریں۔

آگ یا گرم پانی سے جل جانا، بزن اینڈ سکاڈ (Burns and Scald)

تعریف مرض:۔ گرم پانی یا آگ سے جل جانے سے معمولی حالتوں میں مقام سوختہ پر سطحی سُرخی اور جلن ہوتی ہے، مگر آبلہ نہیں ہوتا۔ زیادہ جل جانے پر آبلہ پڑ جاتا ہے۔

وجوہات:۔ گرم پانی جسم پر پڑنے یا کسی طرح آگ پر پاؤں یا ہاتھ وغیرہ پڑ جانے سے جسم کا کوئی حصہ جل جاتا ہے، عام طور پر چھوٹے بچے اس عارضہ کا شکار ہوتے ہیں۔

علامات:۔ مقام ماؤف پر زبردست جلن و درد ہوتا ہے، اگر معمولی تکلیف ہو تو بہت جلد دور ہو جاتی ہے۔ آخری درجہ میں پیپ پڑ جاتی ہے۔

علاج ڈاکٹری:۔ جب جسم کا بہت زیادہ حصہ نہ جلا ہو تو تازہ سطحی زخموں اور آبلوں کو اگیری فلے وین ایک گرین، صاف پانی دواؤنس کے گھول سے صاف کر کے پینی سلین آسٹینٹ لگا دیں اور ۴۸ گھنٹے تک لگا رہنے دیں۔ یہ بنی بنائی بازار سے مل جاتی ہے درد کی شدت روکنے کے لئے سارڈین گولی یا پرکسی ون کیپ شولز دیں۔ اگر دل کمزور ہو تو کورامین کا عضلاتی انجکشن لگائیں جب مریض زیادہ جل جائے تو پینی سلین یا سٹرپٹو پینی سلین کے عضلاتی انجکشن کریں، علاوہ ازیں سلفا ڈایازین کا استعمال بھی مفید ہے۔ اگر گردوں کے فعل میں خرابی کا خطرہ ہو تو سلفا ڈایازین کا استعمال نہ کیا جائے۔

عام جلے ہوئے مقام کے لئے زنک اوکسائیڈ ایک تولہ، کیسٹرائیل چار تولہ میں گھول بنا کر مقام سوختہ پر لگائیں۔

مادرین ادویات:۔ ۱۔ برنول (Burnol) بوش ————— زخم پر لگائیں۔

۲۔ ٹینافیکس (Tanna fax) بروز و لیکیم ————— زخموں اور آبلوں پر لگائیں۔

۳۔ مائی بے سن (Mybacin) گلیکسو ————— زخم پر لگائیں۔

۴۔ لیوودرم (Livoderm) ٹی، سی، ایف ————— زخم پر دن بھر میں ایک بار لگائیں۔

۵۔ کرسٹوپین آسٹینٹ (Crystapenoint) گلیکسو ————— زخم پر کئی بار لگائیں۔

۶۔ سائیکلو فارم آسٹینٹ (Cycloformoint) بار ————— زخموں پر لگائیں۔

۷۔ نیوپرکینال آسٹینٹ (Nupercal nal) سب ————— زخم کو دھونے کے بعد خشک کر کے لگائیں۔

۸۔ پروپامیڈین کریم (Propamidine cream) مے اینڈ بیکر ————— تازہ مقام سوختہ پر لگانا مفید ہے۔

۹۔ ٹینا فلے دین جیلی (Tannaflavin jelly) بی، ڈی، ایچ ————— ٹینک ایڈ و اگیری فلے دین کا مرکب ہے زخموں پر لگائیں۔

۱۰۔ امرٹین (Amertan) بی ————— جلے ہوئے حصے کے چپا لے کاٹ کر زخم پر لگا کر پی کر دیں۔

زخم پر لگائیں۔

۱۱۔ ٹینی پیسٹ (Tani Paste) اپ جون _____ ٹینک الیڈ وایکری فلے وین سے تیار کی گئی ہے۔ سوختہ مقام کے لئے مفید ہے۔

۱۲۔ جلمار (Jalmar) سپلا _____ جلتے ہوئے زخموں اور کٹنے پر لگانے کے لئے از حد مفید ہے۔

۱۳۔ کرسٹاپن مرہم (CrystaPen) گلیکو _____ جلتے ہوئے زخموں اور کٹنے پر لگانے کے لئے از حد مفید ہے۔

نوٹ:۔ جب جسم کا زیادہ حصہ جل جائے اور مقام سوختہ میں پریپ پڑ گئی ہو تو مریض کو ہسپتال میں داخل کرانا چاہیے۔ کیونکہ اس کا تعلق سرجری سے ہے، وٹامن سی بھی زخموں کو جلد مندمل کرتی ہے۔

یونانی علاج:۔ جلی ہوئی جگہ سے کپڑے ہٹا کر مریض کو آرام سے لٹائیں، اگر کمزوری بہت ہو تو دواء المسک معتدل جواہر والی چار ماشہ ہمراہ عرق گاؤ زبان دیں اور مندرجہ ذیل مرہموں میں سے کسی ایک کا استعمال کریں۔

مفید مرہم:۔ لائم واٹر (چونے کا پانی) دس تولہ، تیلوں کا تیل تین تولہ، دونوں کو ملا کر کھل کر لیں، سفید مرہم بن جائے گی، جلتے ہوئے مقام پر لگانے کے لئے از حد مفید ہے۔

دیگر:۔ لائم واٹر پانچ تولہ، روغن زیتون پانچ تولہ، دونوں کو آپس میں ملا کر کھل کر لیں اور مرہم بن جانے پر زخموں پر لگائیں نہایت مفید ہے۔

دیگر:۔ بھوڑا سا کافور، سفیدی بیضہ مرغ ہر دو کو ملا کر جلتے ہوئے مقام پر لگائیں، گرم پانی، گرم تیل، بجلی اور آگ سے جلے زخموں کے لئے نہایت مفید ہے۔

مرہم آرام جان:۔ آگ یا بارود، کھولتے پانی یا تیل وغیرہ سے جل جائے، چمڑہ جل کر گوشت نکل آئے، خواہ کیسی ہی ردی حالت ہو، مریض کیسا ہی تڑپ رہا ہو۔ اس دوا کے لگاتے ہی فوراً ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔

رال سفید چار تولہ، تیل سرسوں تین تولہ، دانہ الاچھی خورد ایک ماشہ، سیندور چھ ماشہ، روغن کے سوا باقی اشیاء کو الگ الگ خوب پیس لیں، پھر ایک بڑے برتن میں رال ڈال کر انگلی سے زور زور سے ہلائیں، بعد ازاں ان میں ایک پاؤ پانی ڈال کر خوب ہلائیں،

رال بھول جائے گی۔ برتن اوندھا کر کے یہ پانی نکال دیں، جب تک رال بھولتی ہے، اسی طرح پانی بدلتے رہیں، دس پندرہ دفعہ پانی نکالنا پڑے گا۔ اب پانی اچھی طرح پھوڑ دیں اور سفوف الاچھی و سیندور ملا کر اچھی طرح حل کریں اور بطور مرہم کے لگائیں۔ اگر

زیادہ ردی حالت ہو تو بار یک کپڑے پر لگا کر آہستہ سے زخم پر چمٹا دیں، صبح و شام دونوں وقت لگائیں، نہایت آسان و مفید نسخہ۔

دیگر:۔ تیل ناریل میں چونے کا پانی بقدر ضرورت ملا کر پینٹیں اور کافور کی بھوڑی سی مقدار شامل کر کے خپنی کے پیالے میں رکھا دن میں دو بار زخم پر لگائیں، جلد آرام آ جائے گا۔

دیگر:۔ دھوپ سفید (رال) کو بار یک پیس کر سفوف کر کے گائے کے مکھن (تو بار پانی سے دھویا ہوا) میں ملا کر رکھیں، دو تین بار کا استعمال کافی ہے۔

دیگر:۔ سفیدی بیضہ مرغ (مرغ کے انڈے کی سفیدی)، تیل ناریل، سفیدہ کاشغری، ہر سہ کی مرہم بنا کر جلتے ہوئے مقام لگائیں، فوراً آرام ملے گا۔

دیگر:۔ جلتے ہوئے مقام پر فوراً ہی گھیکواری بوٹی کا گوردہ مل دیا جائے تو جلن اُسی وقت بند ہو جائے گی، چھالے وغیرہ پڑ زخم بننے کا خطرہ نہیں ہے گا۔

آیور ویدک علاج:۔ طب آیور وید میں آگ سے پیدا شدہ زخم چار قسم کے ہیں:۔

۱۔ پلشٹو، ۲۔ دُر دگدھ، ۳۔ سمیک دگدھ، ۴۔ اتی دگدھ۔

اگر آگ سے جلنے کے بعد جلد کا رنگ بدل جائے، جلن ہو، لیکن آبد نہ پڑے تو پلشٹو، اگر چھپا لے پڑ جائیں تو دُر دگدھ، اگر جلنے کے بعد رنگت تار کے پھلوں جیسی ہو تو سمیک دگدھ، اور اگر جلنے کے بعد گوشت جل کر ٹک جائے، بخار، جلن، بے ہوشی وغیرہ ہو تو اس کو اتی دگدھ کہتے ہیں۔

مندرجہ ذیل نسخے جل جانے کی ہر قسم میں نہایت مفید ہیں :-

- ۱۔ چُونے کا نمقرا ہوا پانی اور تیل ناریل برابر برابر ملا کر مرہم بنا کر زخموں پر لگائیں۔
 - ۲۔ کتھہ ایک تولہ، کافور چھ ماشہ، سیندور چھ ماشہ میں پانچ تولہ سو بار دھویا ہوا مکھن ملا لیں، آگ کے جلے ہوئے زخموں پر مضموری مقدار میں لگانے سے بہت جلد آرام آجائے گا۔
 - ۳۔ معمولی حالت میں کتھہ و حبت کو مکھن میں ملا کر لگائیں، آرام آجائے گا۔
 - ۴۔ جلی ہوئی جگہ پر شہد کا لپ کرنا یا آلو کو خوب باریک پس کر لپ کرنا یا تیل ناریل کا لگانا بھی مفید ہے۔
- ہومیوپیتھک علاج :-** اگر آبلے پڑ چکے ہوں، تو کینٹھرس نکچر ایک اونس پانی میں بیس قطرے ملا کر اور اس میں کپڑے کا ٹکڑا بھگو کر جلی ہوئی جگہ پر رکھیں یا کینٹھرس نکچر کی مرہم لگانی جائے، کھانے کے واسطے بھی کینٹھرس کا استعمال بلحاظ عمر کریں۔
- غذا و پرہیز :-** زود ہضم و مقوی غذا دیں، مریض کو آرام سے لٹائے رکھیں۔

انڈر لپٹ، گنج سَعْفہ، فِوُس، (Favos)

تعریف مرض :- یہ ایک چھوت دار بیماری ہے، جو بن تی مادے (فنگس) کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔
وجوہات :- غلاظت اور جسم کی صفائی نہ رکھنے سے یا گنج والے مریض کی چھوت لگنے یعنی گنج والے مریض کی پگڑی یا ٹوپی پہننے سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- جب یہ مرض پیدا ہوتا ہے تو کھرنڈ سے بننے شروع ہو جاتے ہیں اور بال جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ ان بالوں سے چوہوں کی سی بو آتی ہے، جلد بھوس کی طرح جھڑنے لگتی ہے، سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں۔

علاج ڈاکٹری :- اس مرض کا اصول علاج بطرز داد (رنگ ورم) ہے، بالوں کو قلعہ سے کاٹ کر تین یا چار بار نشاء کی پلش ندھیں تاکہ چھلکے دور ہو جائیں، اس کے بعد گندھک ایک ڈرام، ویزلین سفید یا زرد ہلکا اونس مرہم بنا کر لگائیں۔

یونانی علاج :- بالوں کو اکھاڑ کر اور مقام ماؤن کو خوب صاف کر کے یہ مرہم لگائیں، بیج پنوار، سہاگہ، گندھک، مرزارنگ، ات سفید ہر ایک تین ماشہ، رس کپور دورتی، سب ادویہ کو باریک پیسہ کر مرہم سادہ پُر ۲ تولہ میں ملا لیں اور لگائیں، خوراک کی طور پر مصفی خون ادویہ یا گندھک سار ایک ڈرام، ویزلین پُر اونس میں ملا کر مرہم بنا کر لگاتے رہیں۔ مندرجہ ذیل نسخے اس مرض کا موثر علاج ہیں :-

روغن بیضہ مرع :- انڈوں کو پانی میں جوش دے کر سخت شدہ زردی نکال کر کسی آمبی کر چھپی میں آگ پر خوب بریاں کریں اور تیل نہا لیں اور مقام ماؤن پر لگائیں، گنج کے سے مفید ہے۔

روغن کمیلہ :- سرسوں کا تیل ۲ تولہ کو آگ پر گرم کریں، پھر ٹنڈا ہونے پر ۲ تولہ کمیلہ شدہ ملا کر لکڑی سے بڑی اور لگائیں۔

زخموں اور گنج کے لئے مفید ہے۔
 آیور ویدک علاج :- پینے کے لئے کھدر ارشٹ ایک تولہ برابر پانی میں ملا کر صبح و شام کھانا کھانے کے بعد لیں، بیرونی طور پر مرہم
 گندھک کا استعمال مفید ہے۔
 ہومیوپیتھک علاج :- کھرنڈوں پر پلٹس باندھیں اور بار بار لگائیں تاکہ چھلکے دور ہو جائیں اور بطرز یونانی طریقہ کے علاج کریں۔
 غذا و پرہیز :- بطرز رنگ ورم (داد) کے کریں۔

نٹائک روگ، عرق مدنی، نازوا، گنی ورم (Gwnea worm)

تعریف مرض :- یہ ایک قسم کا پھوڑا ہے جو جسم پر پیدا ہوتا ہے اور جب وہ پھوڑا ہے تو اس میں سے دھاگے کی مانند ایک لمبا کیڑا نکلتا ہے۔

وجوہات :- جھیل یا جوہڑ کا گندہ پانی پینا، کچھڑ میں ننگے پاؤں پھرنا اس کا خاص سبب ہیں، جس کی وجہ سے ایک پتلا کرم پانی کے ساتھ جسم انسانی میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ کچھ عرصہ تک بدن میں رہ جاتا ہے، جب اس کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ بدن کے کسی مقام سے نکلنا شروع کر دیتے ہیں۔

علامات :- کیڑے سے پیدا شدہ زہر کے باعث تمام جسم پر سخت خارش ہوتی ہے، اس کے بعد جلد پر ایک بھنسی ظاہر ہوتی ہے اور وہ پھول کر آبلہ بن جاتی ہے، اس آبلہ میں سوراخ ہو جاتا ہے اور اس میں سے ایک چیز یا ایک دھاگا کی طرح سُرخ رنگ سیاہی مائل کیڑے کی طرح نکلی شروع ہوتی ہے اور تھوڑی تھوڑی نکلتی ہوئی اچھی لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ مرض عام طور پر پاؤں پر ظاہر ہوتا ہے کبھی ہاتھوں اور پاؤں پر بھی ظاہر ہوتا ہے، کبھی پشت اور عضو تناسل بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔

علاج ڈاکٹری :- جب کیڑا جلد سے باہر سر نکالے تو اس کو ریشمی دھاگا سے باندھ دیں، دھاگا کا دوسرا سر کسی پتلی لکڑی کے سرے سے بندھا ہو اور اس پر کیڑے کو روزانہ آمہنگی سے لپیٹتے جائیں، اگر بے احتیاطی کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو اس سے سو جن وغیرہ پیدا ہو جائے گی۔

ایسی صورت میں خوردنی طور پر سلفا گروپ اور انجکشن کے لئے پنی سلین کا استعمال کریں، شروع مرض میں اڈرینالین (ایک میں ایک ہزار) ایک سی سی کا زیر جلد انجکشن کرنے سے تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ایفے ڈرین ہا گرین کا استعمال بھی مفید رہتا ہے۔
 یونانی علاج :- جب ناروا کا شبہ ہو تو اس کو نشتر سے چیر کر ناروا کا سر باہر نکالیں اور اس کو موم کی باریک تپی پر رکھیں اور اسے پیٹتے رہیں، ٹوٹنے نہ پائے، اس کے بعد گندم کا آٹا ایک تولہ، زردی بنیہ مرغ ایک عدد، گل روغن ایک تولہ ملا کر اس کا لیرکے ہیں۔
 مندرجہ ذیل نسخے اس مرض کے لئے نہایت مفید ہیں :-

- ۱۔ ہینگ خالص تین ماشہ، گندم کا آٹا چھ ماشہ، اجوائن دسی تین ماشہ، سب کو ملا کر پیس کر ٹکیہ بنا کر ناروا کے اوپر باندھیں۔
- ۲۔ رال چودہ ماشہ، صابون ۲۸ ماشہ، انیون دس ماشہ، باریک پیس کر تلوں کا تیل چودہ تولہ، مرہم بنا کر اور پان کے پتے پر لگا کر ناروا پر باندھیں۔
- ۳۔ نمک خوردنی میں قد سے دودھ اک ملا کر ناروا پر باندھیں۔

۴۔ چربی بھڑڈیڑھ تولہ، لہسن پونہتی تین عدد، پیس کر زخم پر باندھیں، اس سے زخم کھلا ہو کر کھڑا آسانی نکل جائے گا۔
 آیور ویدک علاج :- مہنگ دورتی ہمراہ تازہ پانی دیں، بیرونی طور پر دھتورہ کے پتے گرم کر کے اور گھی سے چھڑ کر مقام ماؤن
 پر باندھیں یا برگ چولائی پانی میں پیس کر لیپ کریں یا کبوتر کی پیٹ اور گڑ دونوں ملا کر چند روز ناروا پر لگائیں۔
 ہومیو پیتھک علاج :- بطرز یونانی طریقہ علاج کے کریں۔
 غذا و پرہیز :- زود ہضم و مقوی غذا دیں، دیر ہضم چیزوں سے سخت پرہیز کرائیں۔

راج پھوڑا، شرب چراغ، کاربونکل، (Carbuncle)

تعریف مرض :- پنجابی میں اس کو کدو دانہ بھی کہتے ہیں، یہ پھوڑا عموماً ذیابیطس کے شکار مریضوں کو نکلتا ہے۔
 وجوہات :- اکثر یہ مرض پچاس سال سے زائد کمزور ذیابیطس کے مریضوں کو ہوتا ہے، گردن یا سر پر پیدا ہونا خطرناک علامت ہے۔
 علامات :- یہ سرخ رنگ کا پھوڑا ہوتا ہے، جو گردن، پشت یا سر پر نکلا کرتا ہے اکثر لاچار واپسی کرنے سے یہ عارضہ کافی
 بڑھ جاتا ہے۔

علاج ڈاکٹری :- مواد کو دن میں دو بار صاف کریں، خراب گوشت کو دور کریں، اگر پیشاب کے معائنہ کے بعد شکر معلوم ہو تو ذیابیطس
 مری کا علاج کریں، بیرونی کاربالک گلیسرین لگائیں، سلفا گروپ میں سے سلفا تھایازول یا سلفا ڈایازین یا سپیران کا خوردنی استعمال اور
 سیلین کے انجکشن نہایت مفید ہیں۔ پھوڑے میں میگ سلفاس پر اولس گلیسرین دو اولس، پیٹ بنا کر اس کی ڈرینج کرنا بھی
 ایت مفید ہے۔ ہائیڈروجن پراوکسائیڈ سے پھوڑے کا صاف کرنا بھی مفید ہے۔

یونانی علاج :- پھوڑے کو سینک کریں، جب پھوڑے کا درمیانی حصہ نرم ہو جائے تو سیسے کو ہری مکو کے پانی اور سرکہ میں
 س کر مقام ماؤن پر لگائیں۔

اورنگ زہی زخم، لاہور سور، اورنٹیل سور، (Orientalsore)

تعریف مرض :- یہ ایک جراثیمی مرض ہے، شروع میں پھپھی ہوتی ہے، کچھ عرصہ بعد زخم کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔
 وجوہات :- یہ مرض سینڈ فلای (گتھی) کے کاٹنے سے پھیلتا ہے اور اس کا زخم مدت تک رہتا ہے۔
 علامات :- یہ زخم عام جلد کی سطح سے اونچا نیچا ہوتا ہے، زخم آہستہ آہستہ پھیلتا اور بڑھتا جاتا ہے۔ بعض اوقات خود بخود دور
 جاتا ہے شروع میں یہ پھپھی اکثر چہرہ اور بازوؤں پر ہوتی ہے، کھرنڈ کے تپتے مواد جاری رہتا ہے، یہ زخم مدت تک رہتا ہے۔
 علاج :- کافور، سوم زرد اصلی، تیل زیتون، تینوں کو برابر کے گرم بنالیں اور مقام ماؤن کو سوڈا بائیکارب دس فیصدی کے
 دل سے صاف کر کے یہ مرہم لگائیں۔ پرمینگنیٹ پوٹاش کے ہلکے گھول سے زخم کا صاف رکھنا بھی مفید ہے۔
 کاربالک گلیسرین یا کاربالک آیل لگانا بھی مفید ہے۔ زیادہ تکلیف کی حالت میں پینی سلین کے عضلاتی انجکشن اور سلفا گروپ
 سپران گروپ کا استعمال مفید ہے۔

سیاہ داغ، کلاو آزما، (Chlosma) چھپ، پیٹری رائیس (Pityriasis)

چھائیاں، فریکلز (Freckles) مہاسے، اکنی، (Acne)

تعریف مرض :- جلدی امراض میں سیاہ داغ، چھپ، چھائیاں، مہاسے اور کیل وغیرہ اگرچہ بظاہر تکلیف دہ نہیں ہیں لیکن ان سے حسن کی آب و تاب نیست و نابود ہو جاتی ہے، کیسا ہی پری رومرد، عورت ہو، دیکھنے میں اچھا معلوم نہیں ہوتا اور اس تکلیف سے نہ صرف چہرے کا حسن و جمال خراب ہو جاتا ہے، بلکہ ان بدنما داغوں کی وجہ سے خوش نمائی، خوب صورتی اور دل رسانی بھی جاتی رہتی ہے۔

وجوہات :- تیز گرمی میں رہنا، دھوپ میں زیادہ چلنا پھرنا، لباس و بستر صاف نہ رکھنا، دیرینہ اور گلی سٹری غذاؤں کا استعمال، لڑکیوں میں ایام کی رکاوٹ، شادی شدہ عورتوں میں حمل کے دنوں میں یہ عارضہ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ زیادہ گوشت، شراب اور انڈہ وغیرہ کھانے سے یہ تکلیف ہو جاتی ہے۔

علامات :- گالوں اور ہاتھوں کی پشت پر چھوٹے چھوٹے داغ ہو جاتے ہیں کبھی ان میں خارش ہوتی ہے، بعض دفعہ برابر اور بہت دور تک جسم میں داغ و نشان پڑ جاتے ہیں اور اس پر بھوسی سی لگی ہوئی معلوم ہوتی ہے، طب جدید کے مطابق تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ اس کا خاص سبب ایک قسم کا جرثومہ ہے، چھائیوں میں بھورے یا سیاہی مائل داغ پیدا ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ چہرے پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جن میں پک کر کیل میں مقرر اس کا کچ لہو بھی نکلتا ہے، ان کو مہاسے کہتے ہیں۔

علاج ڈاکٹری :- ہائیڈروجن پراوکسائیڈ سب سے بڑھیا دوا ہے، اس میں کپڑا تر کر کے رکھیں یا ہائیڈروجن پراوکسائیڈ پر اونس عرق گلاب دواؤنس، گلیسرین پر اونس گھول بنالیں اور چہرہ پر ملیں۔ مہاسوں کی حالت میں روزانہ گرم پانی کی بھاپ سے مقام ماؤنٹ کو سینک کریں، اس کے بعد مہاسوں کو دبا میں، کیل نکال دیں، پٹیلے قسم میں لائیکر آر سیٹ کیس کی دو بوند کھانا کھانے کے بعد ہمراہ پانی دیں، یہ سنکھیا کا مرکب ہے، لہذا اسے با احتیاط استعمال کیا جائے، چھپ کے لئے ہائیڈرارج ایونیٹھا ۵ اگرین، ویزلین سفید ایک اونس مریم بنا کر لگانا مفید ہے پیٹنٹ ادویات میں نیو پرکینال مریم کا استعمال مفید ہے۔ علاوہ ازیں داد میں بیان کی گئی ادویات اس مرض میں بھی مفید ہیں، چھائیوں اور مہاسوں کے لئے مرکری کریم پانچ فیصدی کا بیرونی استعمال مؤثر علاج ہے۔

چہرہ کی خوبصورتی کے لئے کرمیوں کے سائنٹیفک نسخے

ولایتی کریم کا مقابلہ کرنے والی ونیشنگ کریم نا بہترین فارمولا :- اسٹریک ایڈ (ٹرپل پریڈ) چار اونس، کاسٹک پوٹاش دو ڈرام، پانی صاف ڈیڑھ پونڈ، گلیسرین چار ڈرام، روح گلاب ایک اونس، الکوحل چار ڈرام، خوشبو گلاب یا زنگس (بغیر کلر کے) دو ڈرام۔

ت ترکیب :- خوشبو اور الکوحل کے علاوہ اُبلتے ہوئے پانی میں چینی کی چمچی رکھ کر نصف حصہ پانی میں اسٹریک ایڈ کو ملا کر پانی کی حرارت سے اتنا گھلا میں اور اس قدر گرم ہو کہ انگلی نہ ٹھہر سکے اور باقی نصف پانی میں کاسٹک پوٹاش اور گلیسرین حل کریں اور آگ پر گرم کریں۔ اب گھلے ہوئے اسٹریک ایڈ میں کاسٹک پوٹاش والا محلول دھیرے دھیرے کر کے ڈالتے جائیں اور کتنی لمحہ سے ہلاتے

ہیں۔ آگ بالکل نرم ہونی چاہیے، جب پانی بالکل ختم ہو جائے تو روح گلاب ملا دیں اور آگ سے نیچے اتار کر خوب کھل کریں، لیکن کھل سلسل نہ کرنا چاہیے بلکہ ہتھوڑے ہتھوڑے وقفہ کے بعد تین چار دن تک یہ عمل جاری رکھیں، جب مصالحو سخت ہونے لگے تو خوشبو کو الکوحل میں حل کر کے مرکب مذکورہ میں ملا دیں، عمدہ فیس کریم تیار ہوگی۔

اگر اس میں ہیزلین لکود دو ڈرام آخر میں گھوٹ کر ملا دیں تو زیادہ عمدہ بنے گی، کریم جب تیار ہو جائے تو اسے شیشیوں میں بند کرنا چاہیے۔ جن کے کارک اچھے اور مضبوط ہوں، اگر کارک اچھا نہ ہو تو دمنگ کریم مٹی کم ہو جانے سے خشک ہو جائے گی۔
نوٹ:- کریم کی تیاری میں لوہے کی کوئی چیز استعمال نہ کریں، ورنہ کریم سیاہ پڑ جائے گی، اس کے علاوہ برتن میلا ہونے سے بھی کریم کا رنگ خراب ہو جائے گا۔

سنو کریم کا بہترین فارمولا:- اسٹریک ایڈ چار اونس، کاشک پوٹاش دو ڈرام، ہارڈ پیرافین دو ڈرام، گلیسرین ایک اونس، ق گلاب تازہ کشید کیا ہوا ایک پونڈ، الکوحل چار ڈرام، خوشبو گلاب (بغیر کلر) ایک ڈرام۔

ترکیب:- واٹر بافٹ پر اسٹریک ایڈ اور پیرافین ہارڈ کو گھٹا کر ۸۰ درجہ سینٹی گریڈ کی حرارت تک گرم کریں اور نصف عرق گلاب میں کاشک پوٹاش حل کر کے ۸۰ درجہ تک گرم کر لیں، اب کاشک والی لائی اسٹریک ایڈ میں ملا تے اور ہلاتے جائیں، بعد گلیسرین والا محلول بہتہ آہستہ ملا لیں اور پھر واٹر بافٹ سے اتار کر خوب زور سے دہی کی طرح بلوئیں، آخر میں الکوحل میں خوشبو ملا کر مرکب میں ملا لیں، اور ۲ گھنٹہ تک پڑا رہنے دیں، لیکن ہر روز دن میں ایک دو مرتبہ چند منٹ ہلا دیا کریں، سنو کریم تیار ہو جائے گی، اسے شیشیوں میں بھر کر فروخت میں لکھریں بھی استعمال کر سکتے ہیں، تجارتی طور پر تیار کرنی ہو تو لائسنس ضروری لینا ہوگا۔

کیل چھائیاں دور کرنے والی کریم:- لینولین ایک پونڈ، پیرافین لکود تین پونڈ، بوریکس (سہاگہ) ایک اونس، روح گلاب دس اونس، ہائیڈروجن پراوکسائیڈ چار اونس، خوشبو سنگترہ ایک اونس۔

بنانے کی ترکیب:- لینولین اور پیرافین لکود کو نرم آگ پر گھٹائیں اور آگ سے اتار لیں، دوسری طرف روح گلاب کو جوش دے کر بوریکس میں، پھر ہائیڈروجن پراوکسائیڈ ملا کر پیرافین لکود وغیرہ میں ملائیں اور ہلاتے جائیں، جب سیال گاڑھا ہو کر کریم بن جائے تو خوشبو ملا کر شیشیوں میں بھر لیں، ہر روز رات کو چہرہ پر لگایا کریں۔

نوٹ:- فیس کریم تیار کرتے وقت تام چینی کی حلیمیاں استعمال کریں، جس کی چینی کہیں سے اکھڑی ہوئی نہ ہو، کیونکہ کریم کی تیاری میں لوہے کی کوئی چیز چھونے سے کریم کا رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے، کریم کو ہلانے کے لئے لکڑی کا گول ڈنڈا استعمال کریں، کاشک پوٹاش کو بافٹ نہ لگائیں، ورنہ بافٹ مل جائے گا۔ کریم تیار کرتے وقت پھٹکیاں پڑ جائیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں بلوئیں سے پھٹکیاں تحلیل ہو جائیں گی، کاشک پوٹاش جب حل ہو جاتا ہے تو اس مرکب کو لائی کہتے ہیں خوشبو ہمیشہ کریم کے سرد ہو جانے پر ملائی جائے، پہلے جب بھی کریم بنائی جائے، ہتھوڑی سی مقدار میں بنائیں، جب تجربہ درست ہو جائے تو پھر زیادہ مقدار میں بنائی جائے۔

کولڈ کریم کا بہترین فارمولا:- پیرافین ہارڈ چار اونس، ویزلین سفید بڑھیا ایک اونس، زنک اوکسائیڈ ۳ اونس، بورک ایڈ ۳ اونس، پیرافین لکود ۳ پونڈ، خوشبو زنگس (بغیر کلر کے) ۳ اونس۔

ترکیب:- ہارڈ پیرافین اور ویزلین کو واٹر بافٹ پر یا نرم کونوں کی آگ پر گھٹائیں۔ پھر بورک ایڈ و زنک اوکسائیڈ کو یک جان کر کے ملا لیں اور باریک کپڑے سے چھان کر خوشبو ملا کر شیشیوں میں پکینگ کر لیں۔

کولڈ کریم کا دیگر فارمولا :- روغن بادام چھ چھٹانک، خالص مکھی کے چھتے کا موم ۹ تولہ، عرق گلاب بڑھیا دس تولہ، سہاگہ ولایتی (بورکیں) چھ ماشہ، خوشبو گلاب ۱۲ ماشہ۔

ت ترکیب :- موم اور روغن بادام کو آگ پر رکھ کر گھملائیں، بورکیں کو گلاب کے عرق میں گرم کر کے ملا لیں، دونوں مرکب کی حرارت یکساں ہو، اب بورکیں والے عرق کو بادام روغن والے سیال میں ملا کر آگ سے اتار کر خوب گھمٹیں، جب مرکب ٹھنڈا ہو کر مثل کریم بن جائے تو خوشبو ملا کر شیشیوں میں بھر لیں، یہ کریم رنگت کو نکھارتی ہے۔

کولڈ کریم کا بڑھیا فارمولا :- پیرافین ہارڈ چار اونس، ویزلین سفید ۱۲ پونڈ، روغن بادام اصلی چھ اونس، زنک اوکسائیڈ ۱۲ اونس، بورک ایڈ ایک اونس، خوشبو گلاب بڑھیا (بے رنگ) ۳۲ اونس۔

ترکیب مندرجہ بالا سے تیار کر لیں۔

عام بازاری کولڈ کریم کا پوشیدہ فارمولا :- آج کل عام طور پر یہی کولڈ کریم مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہے، جو صرف ویزلین کی تبد شدہ صورت ہے۔

ویزلین سفید آٹھ پونڈ، زنک اوکسائیڈ لائٹ (بی، پی) چھ اونس، خوشبو گلاب بڑھیا (بے رنگ) دو اونس۔

ت ترکیب :- ویزلین کو کسی شیشے کے ٹکڑے پر زنک اوکسائیڈ ڈال کر خوب پھینٹیں اور رگڑیں تاکہ دونوں اچھی طرح سے یک جان ہو جائیں، بعد میں خوشبو ملا کر خوبصورت شیشیوں میں بھر لیں، اگر زیادہ زود اثر بنانا ہو تو بورک ایڈ چھ اونس شامل کر لیں، کولڈ کریم تیار ہے، صفائی کا دھیان ضروری ہے، یہ کریم معمولی زخموں کے لئے بھی بہت مفید ہے، زنک اوکسائیڈ کو چھلنی سے چھان کر شامل کریں۔

یونانی علاج :- اصل سبب کو دور کریں، مقام مرض پر سورسالم کوڑھ گلی میں گل حکمت کر کے تنور میں جلایں اور بھڑکے دودھ میں ملا کر لپی کریں۔ مندرجہ ذیل نسخے ان امراض کے لئے نہایت مفید ہیں۔

۱۔ چھائیاں دور کرنے کے لئے سمندر جھاگ لمبوں کے رس میں گھس کر لگائیں یا حسن یوسف باریک پیس کر تیل چنبیلی میں ملا کر لگائیں۔
۲۔ ایک عدد لمبوں کا رس، گلیسرین ایک اونس، عرق گلاب چار اونس میں ملا کر گھول بنالیں اور چہرہ پر لگائیں۔ چھائیوں کے لئے نہایت مفید ہے۔

۳۔ سنگترہ کے چھلکے دو تولہ، تل کالے ایک تولہ، ہلدی زرد، صندل سفید، بال چھڑ، ناگر موم تھا، چھڑیلہ، مغز بادام ہر ایک چھ ماشہ، میدہ گندم دو تولہ، تیل چنبیلی ایک تولہ، باریک پیس کر پانی میں ملا کر رات کو چہرہ پر ملیں، صبح کسی انٹی سپٹک صابن سے منہ دھو لیا کریں۔

۴۔ سنبل الطیب، کالے تل، سرسوں، زیرہ سیاہ، لودھ پٹھانی، ناگر موم تھا، صندل سرخ، صندل سفید، ہلدی، مچھیلہ، کافور، مغز بادام ہر ایک ایک تولہ، سوڈا بائی کارب تین تولہ، زعفران خالص تین ماشہ، مکس سوپ پانچ تولہ، تمام چیزوں کو پیس کر گائے کے دودھ میں بھٹوڑا سا سفوف ملا کر چہرے پر آہستہ آہستہ ملیں اور ایک گھنٹہ بعد نیم گرم پانی سے دھو کر اور تولے سے رگڑ کر خشک کر کے روغن بادام مل لیا کریں، پندرہ دن تک چہرہ گلاب کے پھول کی طرح ہو جائے گا۔

۵۔ بیج مولی ایک تولہ، مغز تربوز ایک تولہ، باقلا کا آٹا، سرکہ انگوری عمدہ بقدر ضرورت میں پیس کر مغز چروخی چھ ماشہ، مغز بادام تلخ چھ ماشہ، قسط شیریں چھ ماشہ، اکلیل الملک چھ ماشہ، کیترا چھ ماشہ ملا کر اور پیس کر گولیاں بنالیں اور حسب ضرورت ایک سے دو گولی بھڑکے دودھ میں گھس کر مہاسوں پر لگائیں۔

۶۔ ترمس چھ ماشہ، تخم باقلا چھ ماشہ، بیج خشخاش چھ ماشہ، مغز بیج خربوزہ چھ ماشہ، مغز بادام چھ ماشہ، زعفران ایک ماشہ، سب کو

پیس کر اس میں سے محوڑا سا لے کر پانی میں ملا کر لپیپ کریں، دو گھنٹہ بعد مہندی اور مین سے منہ دھو کر تیل چینی چہرہ پر مل لیں۔
۷۔ نوشادر چھ ماشہ، پیاز کے رس میں قدرے پیس کر مقام مرض پر لپیپ کریں، چھپ (دہق) کے لئے بہت مفید ہے۔

اُبٹنوں کے سائنٹیفک نسخے

اُبٹنا بہار شباب: خشخاش، کچور، ناگر موہتا، انبہ ہلدی، صندل سُرخی، سب کو ہموزن ملا کر سفوف تیار کر لیں، اس میں نارنگی کے چھلکے سفوف ہم وزن ملا لیں تیار ہے، بوقت ضرورت جسم پر مالش کر کے غسل کر لیا کریں، جلد اور بدن نرم، ملائم، چمکیلا اور خوبصورت ہو جائے گا۔
شبو کی لہریں دماغ کو معطر کر دیں گی۔

اُبٹنا شباب افروز:۔ بابڑنگ، باجی خشخاش، انبہ ہلدی، کچور، ناگر موہتا، پانڑی، پورت ترخ، صندل سفید یا سُرخی، تمام اشیاء وزن سفوف کر لیں، اس میں حسب پسند خوشبویات ملا لیں، بوقت ضرورت جسم پر مالش کریں، شباب کی تشہیر کرے گا۔

گل اندامی:۔ برگ نیم، برگ انار شیریں، انبہ ہلدی، برگ جنا، ہر ایک ہموزن لے کر سفوف بنالیں، کر دے تیل میں ملا کر چہرہ اور جسم پر مالش کریں، ایک گھنٹہ کے بعد غسل کریں، جسم و چہرہ گلاب کے پھول کی مانند ہو جائیں گے۔

گلعداری:۔ آرد مسور، آرد باقلا، آرد جو، پوست سنگترہ، سوڈا بائیکارب ہر ایک ایک تولہ، مغز بادام ۲ تولہ، ادویات کو فنتی کو ٹچھان کر دوسری اشیاء میں ملا کر سفوف بنالیں، حسب ضرورت سفوف پانی میں ملا کر رات کو سوتے وقت چہرہ پر ملیں، صبح اٹھ کر گرم پانی سے چہرہ دھو ڈالیں، بعد ازاں کوئی خوشبو دار عمدہ تیل یا تیل ناریل ملیں، دیکھنے والے کو صنم قاتل کا دھوکا ہو گا۔

ریشک حور:۔ گل سرس، لودھ، صندل، ناگ کسیر، ہموزن کو ٹچھان کر سفوف بنالیں، ایک تولہ سفوف لے کر دہی میں ملا کر چہرہ و پر ملیں، کچھ دیر بعد دھو ڈالیں، چہرہ نہایت خوبصورت نکل آئے گا۔ دافع، چھائیاں وغیرہ دور ہو جائیں گے، جسم نرم اور ملائم ہو گا۔
گل روئی:۔ برگ نیم، بلبیلہ، ہلبیلہ، صندل سفید پوڈر، لودھ، کچور، گیہولہ ہموزن لے کر کوٹ چھان کر سفوف بنالیں، کر دے تیل میں حرب رت ملا کر چہرہ اور جسم پر ملیں، چمک دمک دو چند ہو جائے گی، چھائیاں وغیرہ دور ہو جاتی ہیں۔

ریشک قمر:۔ گٹھلی آم، چھلکا آم، ہرڑ ہر ایک ایک تولہ، چھلکا جامن، صندل سُرخی، جٹا بانسی، کچور، ناگر موہتا، انبہ ہلدی، چھلکا سنگترہ دو تولہ، جملہ اشیاء کو کوٹ پیس کر سفوف بنا کر عرق گلاب یا عرق کیوڑہ میں پیس کر ٹکیاں بنالیں، ضرورت کے وقت قدرے لے کر دہی میں ملا کر جسم اور چہرہ پر ملیں، ایک گھنٹہ کے بعد غسل کریں اور نرم کپڑے سے جسم کو پونچھیں اور قدرے تیل ناریل چہرہ پر ملیں، چہرہ بدر منیر چمک اٹھے گا۔ تجربہ شرط ہے۔

آیور ویدک و ہومیو پیتھک علاج بطر یونانی طریقہ سے کریں۔

غذا و پرہیز:۔ رُدی، بادی اور خون کو خراب کرنے والی ثقیل، میٹھی چیزیں، گڑ، تیل سے بنی ہوئی اشیاء، شراب خوری اور گوشت پرہیز ضروری ہے، نیز ایسے مریضوں کو دھوپ میں چلنا پھرنا مضر ہوتا ہے، زیادہ گرم اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے، غذا معمولی شوربا، چائے، ٹھنڈی ترکاریاں دیں۔

بوائی پھٹنا، چپیدہ ہینڈ (Chapped-Hands)

سر دی کے دنوں میں ہاتھ منہ دھو کر خشک نہ کرنا، ٹھنڈی ہوا، گرد و غبار سے ہاتھ پاؤں کی کوئی جگہ پھٹ کر سخت درد کا باعث ہوتی ہے

علاج :- زنک آکسائیڈ یا بورک آکسائیڈ لگائیں۔ مندرجہ ذیل پومیڈ ہائے اس عارضہ کے لئے نہایت مفید ہیں :-
 ویزلین پومیڈ کا بڑھیا نسخہ :- ویزلین سفید دس اونس، زنک اوکسائیڈ ۱/۲ اونس، خوشبو گلاب بڑھیا ۱/۲ اونس -
 ترکیب :- ویزلین سفید جو عام انگریزی دوا فروشوں سے مل جاتی ہے، کو نرم آگ پر گھلا کر زنک اوکسائیڈ ملا دیں اور کپڑے سے
 چھان کر خوشبو ملا کر شیشیوں میں بھر لیں۔ یہ ویزلین بہت عمدہ ہے۔ پاؤں کے تلوے، ماتھے، منہ، ہونٹ سردیوں میں بھٹ جاتے ہیں
 رات کو لگا دینا چاہیے۔ چونکہ اس نسخہ میں زنک اوکسائیڈ شامل ہے، اس لئے معمولی زخموں اور خارش وغیرہ کے لئے بھی مفید ہے۔
 ولایتی ویزلین پومیڈ کا فارمولا :- سفید ویزلین چار اونس، عطر کسم آٹھ بوند، عطر جنا چار بوند، زرد رنگ تین رتی، ویزلین کو گھلا کر رنگ
 ملا دیں۔ اس کے بعد خوشبو ملا کر چوڑے سنہ کی شیشیوں میں بھر دو، ولایتی پومیڈ کے برابر مال تیار ہوگا، خوبصورت لیل لگا کر بازار میں فروخت کریں۔
 بازاری سستی ویزلین پومیڈ کا فارمولا :- ویزلین زرد دو پونڈ، خوشبو سنگترہ (سٹرونیلا آیل) یا الہچی تین ڈرام۔
 ترکیب :- ویزلین کو گھلا کر نیم گرم حالت میں خوشبو ملا کر کھلے منہ والی شیشیوں میں بھر لیں۔

نوٹ :- ویزلین یا کولڈ کریم میں بالکل سفید یا ہلکی زرد رنگت کی خوشبو ملانی چاہیے، کئی خوشبویات اپنا رنگ دے جاتی ہیں۔
 اس لئے بڑھیا فارمولوں میں ہمیشہ بغیر رنگ کی خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے۔ انہیں تجارتی طور پر بنانا ہو تو لائسنس حاصل کرنا لازمی ہے۔
 یونانی علاج :- موسم اصلی ایک تول، تیل سرسوں یا تیلوں کا تیل چار تول، دونوں کو گرم کریں، جب ویزلین کی طرح ہو جائے تو پھٹی ہوئی بوائی اور جلد
 پر لگائیں، موسم سرما میں اگر گرم پانی کا استعمال کیا جائے تو یہ عارضہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔
 آپر ویدک اور ہومیو پیتھک علاج بطور یونانی طریقہ علاج کے کریں۔

ہت، پرکلی ہیٹ، (Prickly Heat)

یہ موسم گرما کا مرض ہے، تمام جسم پر چھوٹے چھوٹے باجرے کی طرح دانے نکل آتے ہیں، جو شدید جلن اور درد کرتے ہیں، اس وجہ سے
 انہیں پرکلی ہیٹ (Prickly Heat) کہتے ہیں۔
 ڈاکٹری علاج :- ڈیٹول، لائی سول وغیرہ انٹی سپٹک ادویات کو پانی میں ملا کر ان سے نہانا مفید ہے اور بازار میں مختلف قسم کے ٹالکم پوڈر
 (Talcum Powder) بکتے ہیں۔ ان کا جلد پر چھڑکنا مفید ہے۔

ٹالکم پوڈر کے مندرجہ ذیل فارمولے بھی ہت کے لئے نہایت مفید ہیں :-
 ۱۔ فریچ چاک (ٹالکم پوڈر) ۱/۲ پونڈ، اسٹارچ یا زاروٹ پوڈر تین اونس، زنک اوکسائیڈ (بی پی) ایک اونس، خوشبو زگس ۱/۲ اونس، میگنیشیم
 کاربونیٹ (لایٹ بلکا) ۲ اونس، بورک ایسڈ ایک اونس -
 ترکیب :- پہلے ٹالکم پوڈر، میگنیشیم کاربونیٹ، زنک اوکسائیڈ، اسٹارچ وغیرہ کو ملا کر خوب کھل کر کریں، پھر پھوڑے پھوڑے پوڈر میں خوشبو
 ملا کر کھل کریں اور باقی پوڈر ملا تے اور کھل کرتے جائیں، بعد میں باریک چھلنی سے پوڈر چھان کر خوبصورت ڈبوں میں پکنگ کر لیں، فیس پوڈر تیار ہے
 پکنگ کے لئے ڈبوں کا انتخاب مارکیٹ میں ملنے والے دوسری فرموں کے فیس پوڈرز کو دیکھ کر کریں۔
 ۲۔ ٹالکم پوڈر چھ پونڈ، کیلشیم کاربونیٹ دو پونڈ، میگنیشیم کاربونیٹ دو پونڈ، اسٹارچ دو پونڈ، بورک ایسڈ سات اونس، زنک اوکسائیڈ
 اونس، خوشبو گلاب یا جیبلی دوا اونس -

ترکیب مندرجہ بالا سے تیار کر لیں۔

۳۔ ٹلکم پوڈر ۲ پونڈ، سٹارج (نشاستہ) ۳/۴ اونس، بورک ایڈ چارڈرام، زنک اوکسائیڈ (بی پی) چارڈرام، کیلشیم کاربونیٹ چار اونس، خوشبو حبیبین دوڈرام۔

ترکیب مندرجہ بالا سے تیار کر لیں۔

۴۔ فریچ چاک (ٹلکم پوڈر) ۲ پونڈ، سٹارج ۲ پونڈ، بورک ایڈ ۲ اونس، زنک اوکسائیڈ ایک اونس، میگنیشیم کاربونیٹ دو اونس، خوشبو گلاب یا چنبیلی دوڈرام، مسک میکو دس قطرے۔

ترکیب مندرجہ سے تیار کر لیں۔

۵۔ ٹلکم پوڈر ۲ پونڈ، سٹارج (نشاستہ) ۳/۴ پونڈ، زنک اوکسائیڈ (بی پی) ۱/۲ پونڈ، خوشبو روز، حبیبین یا زنگس ۲ اونس۔

ترکیب مندرجہ بالا سے تیار کر لیں۔

۶۔ سٹارج دس پونڈ، ٹلکم پوڈر دس پونڈ، زنک اوکسائیڈ ۲ اونس، آٹو آف روز ۲ اونس، صندل آئیل اصلی میسوری چھ اونس۔

ترکیب مندرجہ بالا سے تیار کر لیں۔

گرمی دانوں کیلئے بہترین پوڈر:- کافور چھ رتی، زنک اوکسائیڈ ۲ اونس، سٹارج ۲ اونس، سب کو ملا کر استعمال کیا جائے۔

۷۔ بڑھیا ٹلکم پوڈر (اے سوپ سٹون یا سنگ جراثیم بھی کہتے ہیں) فیس پوڈروں میں استعمال ہونے والا سوپ سٹون بہت باریک اور سفید ہوتا ہے اور صابن میں استعمال ہونے والے سوپ سٹون سے بڑھیا ہوتا ہے، دس پونڈ لے کر اس میں چھ ڈرام خوشبو چنبیلی ملا کر ترکیب مندرجہ بالا سے تیار کر لیں، حجاموں کے نہایت سستا فارمولا ہے، اگر اسے زیادہ مفید بنانا ہو تو دو فیصدی بورک ایڈ اور پانچ فیصدی زنک اوکسائیڈ لایٹ ملا لیں۔

۸۔ بڑھیا سوپ سٹون دو پونڈ، سٹرونیلا آئیل ۲ اونس۔

ترکیب مندرجہ بالا سے تیار کر لیں۔

فٹ پوڈر:- پھٹکڑی چارڈرام، ٹلکم پوڈر ۲ اونس، بورک ایڈ ۲ اونس، زنک اوکسائیڈ ۲ اونس، سٹارج ایک اونس، سٹرونیلا آئیل ایک ڈرام۔

ترکیب مندرجہ بالا سے تیار کریں، یہ پوڈر پاؤں میں پسینہ آنے کو روکتا ہے۔ بوقت ضرورت اسے جوتوں اور جرابوں میں چھڑک لیا جاتا ہے۔ پاؤں میں پسینہ آنا بند ہو جائے گا۔

یونانی علاج:- صاف شدہ ملتانی مٹی کا بدن پر ملنا گرمیوں میں پت کے دانوں کا بہترین علاج ہے، لیکن ملتانی مٹی (گاچنی) مل کر جسم پر سوکھنے دیں، بطور دوا شربت عناب و عرق مصفی خون کا استعمال کریں، ٹھنڈی ترکاریاں و سبزیاں استعمال کریں اور گرم چیزوں سے پرہیز کریں۔ آرام آجائے گا۔

اس سلسلہ میں جلد کی سُرخ (Erythema) کے علاج کے لئے سُرخ جلد پر کیٹر آئیل یا گلیسرین یا روغن بادام ملیں، زیادہ تکلیف کی صورت میں سبیاکینی کی نیو پریکینال (Nu Percainal) مرہم لگائیں، زنک آسٹینٹ، بورک آسٹینٹ کا استعمال بھی مفید ہے۔

پچھلے صفحات میں کولڈ کریم اور ٹلکم پوڈر کے جو نسخے دیئے گئے ہیں، وہ اس مرض میں بھی مفید ہیں۔

اُپچی، کنٹھ مالا، خستازیر، سکروفولا، (Scrofula)

دیکھیں باب "گلا کے امراض" مندرجہ کتاب ہذا صفحہ نمبر ۱۱۹

شلیڈ، ہاتھی پاؤں، فیل پا، داء الفیل، فلیریا سیس فنٹائی سیس

(Fleahantiasis-Filariasis)

تعریف مرض :- اس مرض میں پاؤں معہ پنڈلی پھول کر ہاتھی کے پاؤں کی شکل کے ہو جاتے ہیں۔

وجوہات :- جب فیلیریا (ایک خاص قسم کے لمبے لمبے دھاگے کی طرح کے کیڑے) عروق لمفادیہ میں مرکز راستہ روک لیتے ہیں تو یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے، جب یہ کیڑا انسان کے خون میں داخل ہوتا ہے، تو مادہ ۳/۴ انچ لمبی ہو جاتی ہے اور نہ پرا انچ تک، زیادہ مادہ ایک دوسرے پر نل کھائے ہوئے ہوتے ہیں، فیلیریا کے انڈے بیمار کے رکت (خون) میں ۹ بجے رات سے لے کر چھ سات بجے صبح تک ہوتے ہیں اور صبح کو اعضائے رئیسہ میں چلے جاتے ہیں، اس لئے بیمار کو اگر رات کو مجھڑ کاٹے تو اس بیماری کو پھیلانے سبب بن سکتے ہیں۔

علامات :- مریض کے پاؤں معہ پنڈلی پھول کر ہاتھی کے پاؤں کی طرح ہو جاتے ہیں اور اکثر یہ مرض ٹانگ پر ظاہر ہوتا ہے اس لئے اس کو فیل پا کہتے ہیں، اس کے علاوہ فوطوں (فیلیریل ایل فنٹائی اے سیس آف دی سکرولم یعنی فوطوں کا داء الفیل یونی (یونی کافیل پا) اور ہاتھوں (ہاتھوں کافیل پا) پر بھی اس کا حملہ ہو سکتا ہے۔

حفظ مالمقدم علاج :- رات کے وقت کیونکس مجھڑ کے کاٹنے سے بچنے کے لئے مجھردانی کا استعمال کیا جائے اور جبہ شرونیلا آیل آدھا اونس، تلی کاتیل چار اونس، کافور آدھا اونس، ان سب کو ملا کر رکھ لیں، رات کو سوتے وقت چہرہ اور ہاتھ پاؤں ہلکا سا تیل مل لیں، مجھڑ نہیں کاٹیں گے۔ (کھل کے ذریعہ تلی کے تیل میں کافور حل کر لینے کے بعد شرونیلا آیل شا کیا جائے) یا شرونیلا آیل ایک اونس، یوکلپٹس آیل ایک اونس، تیل تارپین ایک اونس، تینوں کو ملا کر رکھ لیں، رات کو ہاتھ پاؤں اور منہ پر مل کر سو جائیں، مجھڑ قریب تک نہ آئیگا، یا ٹلکم پوڈر (سوپ سٹون) دو سیر، شرونیلا آیل دس تولہ، نشاستہ آدھ سیر، زنگ اڈک ۳ چھٹانک اور یوکلپٹس آیل ۲ تولہ بطریق معروف بنا کر چہرہ پر یہ پوڈر ملیں یا پیرافین ہارڈ دو اونس، ویزلین سفید چار پونڈ، آیل بارہ اونس، لیمن گراس آیل چار اونس۔

ویزلین اور پیرافین ہارڈ کو کسی قلعی دار صاف برتن میں واٹر ہاتھ پر گھٹلا لیں اور نیم گرم حالت میں باقی دونوں چیزوں کو ملا کر ایک ایک اونس کی کھٹکے منہ کی شیشیوں میں بھر لیں، رات کو سوتے ہوئے ہاتھ، منہ اور چہرہ پر یہ ویزلین مل لیں۔ مجھڑ نہیں آئیں گے۔

علاج ڈاکٹری :- مقام دم پر ریڈ آئیڈ آف مرکری آسٹیمٹ لگائیں اور مقام ماؤن کو اونچا رکھیں، اگر مریض کمزور نہ ہو تو ایک سرجن تمام بالیدگی بذریعہ آپریشن کاٹ سکتا ہے، فیلیریا کی پھوڑوں کے لئے سلفا ڈرگز یا سیپٹران اور پینی سیلین کا استعمال بھی مفید ہے۔ مریض

آب و ہوا کی تبدیلی کرائی جائے۔

یونانی علاج :- سونٹھ، بکھیرا، رائی برابر وزن کے کرگن موتر میں پیس کر مقام ماؤف پر لپیپ کریں، مرض کی پُرانی حالت میں محجون عشبہ یا محجون چوب صینی کا استعمال مفید ہے، اور بیرونی طور پر بکری کی مینگنی کی راکھ، لکڑی درخت انگور (جلی ہوئی) دونوں کو سرکہ میں ملا کر لپیپ کریں۔

آیور ویدک علاج :- ۱۔ پینزواہ، چھلکا ہڑ، چھلکا ہیڑہ، آملہ، پپلی برابر لے کر سفوف بنائیں۔ یہ سفوف ۹ ماشہ، دو تولہ ہند میں ملا کر روزانہ کھلائیں، فیل پا کے لئے مفید ہے۔

۲۔ سونٹھ، سرسوں، پینزواہ تینوں کو گائے کے پیشاب میں پیس کر گرم کر کے لپیپ کریں، ہاتھ پاؤں کے عارضہ کے لئے مفید ہے۔

۳۔ روزانہ ۲ تولہ تیل سرسوں (شدھ) پلائیں۔ ہاتھ پاؤں کے عارضہ کے لئے مفید ہے، علاوہ ازیں پلایدی چورن تین ماشہ کا ہمراہ پانی نیم گرم خورکی استعمال مفید ہے۔ بیرونی طور پر ڈرنگ آدی تیل کی ماش کی جائے۔

ہومیو پیتھک علاج :- ہائیڈروکوتائل، کلوتروپس، چال موگرا، گریفائیٹس، سیپیا، سلیشیا، آرسنک بہترین ادویات ہیں، انہیں بلحاظ عمرو مزاج استعمال کیا جائے۔

غذا و پرہیز :- زود ہضم و مقوی غذائیں دیں، دیر ہضم اور خون کو خراب کر کے والی اغذیہ سے سخت پرہیز کریں۔

چوٹ لگنا، ضرب و سقط، بزور، (Bruise)

تعریف مرض :- اس مرض میں چوٹ لگنے سے جلد کے نیچے خون جمع ہو جاتا ہے اور خون نہیں بہتا۔

وجوہات :- لاکھی وغیرہ کی چوٹ لگنے سے بغیر جلد پھٹے جلد کے نیچے خون جمع ہو جاتا ہے۔

علامات :- ہفتہ بھر میں مناسب علاج سے جمع شدہ خون جذب ہو کر چوٹ ٹھیک ہو جاتی ہے، کبھی ورم پیدا ہو کر پیپ بھی پڑ جاتی ہے۔ اگر چوٹ لگنے سے جلد کے نیچے بھورے رنگ کا جما ہوا خون نظر آئے تو اس کو فوراً شکاف نہ دیں، بہت ممکن ہے وہ جذب ہو جائے۔

علاج ڈاکٹری :- چوٹ پر ٹنچر آیوڈین یا سپرٹ میٹھی لیٹیڈ یا آیوڈکس یا بائی فلو جٹین لگائیں اور ٹکور کریں۔ دو چار روز میں آرام آجائے گا۔ یونانی علاج :- مقام ماؤف پر سنیک کریں، ہلدی، آٹا گندم، سہاگہ ملا کر پانی میں ملا کر آگ پر پکائیں، جب گاڑھا ہو جائے تو چوٹ کی جگہ پر نیم گرم باندھیں یا ہلدی دو تولہ، صابن ایک تولہ، ایک پاؤ پانی ڈال کر آگ پر رکھیں، جب پانی کا قوام گاڑھا ہو جائے تو مقام ماؤف پر ضماد کریں، معمولی چوٹ پر سرکہ پانی میں ملا کر لگانا بھی مفید ہے۔

دبسی ٹنچر آیوڈین :- شراب خالص ایک پونڈ، کھیلہ دس تولہ، کھیلہ کو شراب دبسی میں ڈال کر چار روز تک مضبوط کارک لگا کر بوتل کو دھوپ میں رکھیں، اس کے بعد کھدر کے کپڑے سے چھان کر محفوظ رکھیں، زرد رنگ کا سودشی ٹنچر آیوڈین تیار ہے، اگر شراب کی جگہ سپرٹ میٹھی لیٹیڈ ڈال دیں تو بھی پورا فائدہ ہوتا ہے۔

فوائد :- بھوڑے پھنیاں، چوٹ، تازہ زخم اور پرانے زخم پر لگائیں، زخم کا خون بند کرنے کے لئے ٹنچر سٹیل سے بھی زیادہ مریح الاشہ ہے۔ آیور ویدک علاج :- بھڑ زونانی طریقہ علاج کے کریں

ہومیو پیتھک علاج :- چوٹ لگنے کی صورت میں خارجی طور پر آرنیکا لوشن میں کپڑا تر کر کے چوٹ کے مقام پر رکھیں، ایک حصہ آرنیکا ٹنچر دس حصہ صاف پانی میں ملا لیا جائے، سوچ آنے کی حالت میں ہیمامیس کا گھول مندرجہ بالا طریقہ سے تیار کر کے لگائیں۔

غذا پر سہیز۔ زود سہم و مقوی غذا دیں، مریض کو بستر پر آرام سے لٹائے رکھیں۔

درگندھیکٹ، بدبودار پسینہ آنا، بڑوڈروسس، (Bromidrosis)

تعریف مرض :- اس مرض میں بدبودار پسینہ آتا ہے۔
وجوہات :- پسینہ پیدا کرنے والی گلیٹوں میں فتور پیدا ہو جاتا ہے۔ جسم کی صفائی نہ رکھنا اور میلے کچیلے رہنا وغیرہ سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- اس مرض میں مریض کو جس قدر پسینہ پیدا ہوتا ہے، وہ بدبودار ہوتا ہے، پسینہ میں اتنی گندی بو ہوتی ہے، کہ مریض کسی مجلس یا جلسے میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔

علاج :- کاربالک یا لائف بوائے سوپ اور گرم پانی سے جسم کو خوب صاف کر کے خشک کریں اور کچر آلوڈین لگائیں، اور (پرکلی ہیٹ) کے بیان میں لکھے گئے ٹانکم پوڈروں میں سے کسی اچھے پوڈر کا استعمال کریں۔ مریض کمزور ہو تو وٹامن سے بھرنا خوراک دیں۔

اگنی و سرب، سُرخ باؤ، اری سلپس، (Erysipelas)

تعریف مرض :- یہ جلد کا شدید انتہائی مرض ہے۔ اکثر چہرہ پر ہوتا ہے۔

وجوہات :- یہ ایک جلد پر نمودار ہونے والا خطرناک بخار ہے، جس سے پھیلنے والا ورم ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا باعث خوردبینی کٹراسٹریٹو کا کس ہے۔ اس مرض کی چھت مریض کے جسم یا لباس کے لگ جانے سے تندرست شخص کو بھی یہ عارضہ جاتا ہے۔ عام طور پر زخم سے یہ کٹراسٹریٹ کر کے مرض پیدا کر دیتا ہے۔

علامات :- چھت لگنے کے تین چار دن بعد سردی سے بخار ہو کر بخار ۱۰۵ درجہ فارن ہیٹ تک چڑھ جاتا ہے، سردی ہے، جی متلاتا ہے، پھر مقام ماؤف پر سُرخ، چمک اور سوجن ظاہر ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ سخت درد ہوتا ہے، جلد کے نیچے پھو بن جاتے ہیں، مرض کی شدت میں دماغی پردوں میں سوزش ہو کر سرسام ہو جاتا ہے، جب یہ مرض دور ہوتا ہے، تو سُرخ و ورم اور درد میں آہستہ کمی ہو جاتی ہے اور کئی روز تک جلد کے چھلکے اترتے رہتے ہیں۔

علاج ڈاکٹری :- اس مرض کے جرثومہ پر سلفا نے مائیڈ اور مینی سلین بہت اثر پذیر ہے۔ اس لئے عام طور پر تین چار روز کے اندر ہو جاتا ہے، اس مرض کے علاج میں سلفاڈایازین دو گولیاں ہر چار گھنٹے بعد سہرا سوڈا بائیکارب دیں، شدید حالت میں مینی سلین یا پروکین پیڈ کے عضلاتی انجکشن دیں۔ بے خوابی کی حالت میں ڈوڈرس پوڈر پانچ گرین کا استعمال کیا جائے، اس مرض میں سلفاڈایازین زیادہ موثر ہے اور مینی دوسرے درجے پر کام کرتی ہے۔

مقام ماؤف کی جگہ کے لئے جسم کو ٹھنڈے پانی سے پونچھیں۔

مادرین ادویات :- ۱۔ سلفاڈایازین یا سلفاٹرائیڈ، پہلی بار چار گولیاں، بعد میں دو گولیاں ہر چار گھنٹے بعد پانی سے دیں۔

- ۲۔ پینیسلین کی گولیاں اکیلی یا سلفا ادویات کے ساتھ مفید ہیں، جیسے پنٹید سلفا (Pentidsulpha) سارابھائی یا فینوسن ٹرائی سلفا (Fenocin) (trisulpha) ڈیو میکس، یعنی تین گھنٹے والی ادویات کے ساتھ پینیسلین وی (Penicillin v) with threesulphadruks) یا پینی ٹرائیڈ (Penitriad) ایم بی، یعنی تین گھنٹے والی ادویات کے ساتھ پینیسلین جی (Penicillin 'v' with threesolublesulpha) کی ایک سے دو گولیاں ہر چھ گھنٹہ بعد پانی سے استعمال کرائیں۔ آجکل مارکیٹ میں بنا سلفا کے پینیسلین گولیاں دستیاب ہیں وہ استعمال کی جاسکتی ہیں۔
- ۳۔ پروکین پینیسلین (Procain penicillin) چار لاکھ یونٹ (ایک ڈال) پانچ سی سی، ڈسٹلڈ واٹر میں حل کر کے عضلاتی انجکشن ہر ۲۴ گھنٹے بعد کریں۔ اسے فزیر، المبیک، گلیکو، کئی کمپنیاں اسے مختلف پیٹنٹ ناموں سے بناتی ہیں۔
- ۴۔ سٹریپٹومین پینیسلین یعنی ڈائی کرسٹی سین (Dicrysticin) سارابھائی یا سیکلومائی سین (Seclomycin) گلیکسو کا ہر روز ایک ڈال کا عضلاتی انجکشن مفید ہے۔ اس مرض میں پینیسلین دوسرے درجہ پر ہے، اگر کسی وجہ سے سلفا ٹرائیڈ یا سلفا ڈایازین کا استعمال نہ کیا جاسکے تو پینیسلین کا استعمال کیا جائے۔

۵۔ ٹرائی سین (ایم، ایس، ڈی) ۲۵ ملی گرام، ریڈوکسان (روش) ۵۰۰ ملی گرام، دونوں کو پانی کے ساتھ دن میں دو سے تین بار دیں۔ یہ انٹی بائیوٹک اور وٹامن سی کا مرکب ہے، بخار کم کرنے کے ساتھ ساتھ چھالوں کو بھی دبا دیتا ہے۔

- ۶۔ کلورومائی ٹین ڈرماٹولوجیکل آسنٹینٹ (مرہم جلد فنی کول) کا جلد پر لگانا مفید ہے۔ یہ مرہم دو فیصدی کسی اچھی کریم میں ملا کر لگائی جائے۔
- ۷۔ کھال کی سوجن روکنے کے لئے آج کل کسی مرہم یا شکر آؤڈین کا استعمال متروک ہو گیا ہے، البتہ درد اور ورم کو تسکین دینے کے لئے گرم سینک مفید ہے اور چھالے بننے کے بعد بیرونی جلد کے پھلکے اترنے لگیں تو مندرجہ ذیل مرہم فائدہ کرتا ہے:-
- آئیل آف کلوروز پانچ منم، آئیل آف یوکلپٹس ۲۵ منم، سافٹ پیرافین تا ایک اونس۔
- ۸۔ بے خوابی کی شکایت ہو تو سونی رائل (Soneryl) ایم بی، ایک گولی سوتے وقت دیں۔

یونانی علاج :- رسوت شدھ ایک تولہ، مغز بیج منولی (نیم) ایک تولہ، صندل سرخ، چرامیتہ، شاہترہ، مغز چاکسو، زکچور نیم کے پتے، بکائون کے پتے، نیم کے پھول، مہندی کے پتے، کتھ سفید، مرتج سیاہ، ہلدی ہر ایک تین تین ماش، سب کو باریک پس کر شہد خالص کے ساتھ غود کے برابر گولیاں بنائیں، ایک ایک گولی دن میں تین بار دیں۔ سرخ باد، فساد خون، پھوڑے پھنسی کے لئے نہایت مفید ہے۔

آیور ویدک علاج بطر یونانی طریقہ علاج کے کریں۔

ہومیو پیتھک علاج :- اگر متورم حصوں میں جلن پائی جائے، جلد سرخ ہو، سرد درد بے عینی پائی جائے تو بلیا ڈونادیں، جب سوزش زیادہ ہو اور نیش زنی کا سادرد ہو، لیکن یہ سوزش بلیا ڈوناسٹم کی نہ ہو بلکہ زیادہ ہو، بجائے چمڑہ سرخ ہونے کے سیاہی مائل ہو اور پھپھوے پیدا نہ ہوئے ہوں تو ایپس مفید ہے۔ پھپھوے دار سرخ باد خواہ منہ پر ہو خواہ کسی اور حصہ جسم پر رنگت چمکیلی سرخ ہو تو رٹاکس مفید ہے۔ درد کو کم کرنے کے لئے گرم پانی میں تین چار قطرے آرنیکا مدرنچر کے ملائیں اور کپڑا نر کر کے زخموں پر لگائیں۔

غذا و پرہیز :- سادہ پانی یا بارے واٹر یا آتش جو دیں، مریض کی حالت بہتر ہونے پر مقوی و زود ہضم غذا دیں، تیمار دار و معالج کو اس مرض کی چھوت سے بچنا چاہیے۔

کدر، اٹن گٹھ، کارنر، (Corns)

اس مرض میں تنگ بوٹ کے دباؤ یا رگڑ سے عام طور پر پاؤں کے انگوٹھے یا چھوٹی انگلی کے جوڑ کی جلد سخت ہو جاتی ہے جس سے

مریض کو چلنے میں سخت تکلیف ہوتی ہے۔
 علاج :- تنگ جوتا استعمال نہ کریں، گلیسرین سوپ سے پاؤں دھوئیں، روغن تارپین نیم گرم کی مالش کریں اور تنگ جوتا پہننا بالکل ترک کر دیں، نرم و ملائم جوتا پہنیں۔

ہشاکشہ، کوڑھ، جذام، لپروسی، (Leprosy)

تعریف مرض :- یہ مزمن متعدی مرض ہے، جس سے جسم پر دھبے نمودار ہو جاتے ہیں، جو بعد میں درمیان سے مدہم ہو کر پھلکوں کی طرح ہو جاتے ہیں، ہتھیلی یا پاؤں کی ہڈیاں نکل کر زخم آ جاتے ہیں۔
 وجوہات :- اس مرض کا باعث ایک خاص قسم کا کرم مائیکو بکٹیریم لپرائی (Mycobacterium Lepae) ہے، جسے پہلے پہل ناروے کے ایک سائنس دان نے معلوم کیا تھا۔ اس مرض کی چھت مریض سے تندرست شخص کو جلد یا غشائے مشاطی میں کسی چوٹ یا زخم یا رگڑ کے ذریعے لگ جاتی ہے، کوڑھ صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ حیوانوں کو بھی ہو جاتا ہے۔
 یہ مرض آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے، شروع میں کبھی کبھی بخار آ جاتا ہے، پھر جسم کے مختلف مقامات پر دھبے یا داغ پڑ جاتے ہیں۔ جو کچھ عرصہ بعد دور ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، چھت لگنے کے بعد یہ مرض تین سال سے پانچ سال کے اندر ہو جاتا ہے۔ یہ مرض کئی قسم کا ہوتا ہے۔ تین اقسام زیادہ مشہور ہیں :-

۱۔ بے جسی کا کوڑھ - (Neural leprosy)

۲۔ گٹھنی دار کوڑھ - (Lepromatous leprosy)

۳۔ مرکب کوڑھ - (Mixed Leprosy)

پہلی قسم گرم دیشوں میں پائی جاتی ہے، دوسری سرد دیشوں میں، خصوصاً یورپ میں زیادہ ہے، تیسری قسم ہر دیش میں ہوتی ہے۔
 علامات :- اس مرض کے زہر سے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں خصوصاً ان کے اگلے حصے اور ناخن جھڑ جاتے ہیں، ہتھیلی یا پاؤں کی ہڈیاں نکل کر زخم آ جاتا ہے اور ناک مٹی جاتی ہے، دوسری قسم میں جلد پر چھوٹی چھوٹی گٹھنیاں (Nodules) پیدا ہو جاتی ہیں، یہ گٹھنیاں چہرہ، کان کی کو، ہاتھ پاؤں اور گٹھنوں وغیرہ پر زیادہ ہوتی ہیں، پھر گٹھنیاں نرم ہو کر پھوٹ جاتی ہیں، اس کے ساتھ ہی کمزور بے چینی، گرانی اور معمولی بخار بھی ہو جاتا ہے۔ جلد پر سوجن اور جھری دار کھردری ہو جاتی ہے، جس سے مریض کا چہرہ خوفناک ہو جاتا ہے، جدید تحقیقات کے مطابق یہ مرض وراثتاً منتقل نہیں ہوتا، البتہ استعداد موجود ہوتی ہے۔

اس مرض کو چنبیل اور برص (پھلہری) سے تشخیص کرنا ضروری ہے، چنانچہ چنبیل کے دھبوں کی جلد بے حس نہیں ہوتی، اور نہ زیادہ ابھری ہوئی ہوتی ہے اور ہمیشہ خشک رہتی ہے، برص کے دھبے جذام کے دھبوں کی طرح بے حس نہیں ہوتے اور داغوں کے کنارے صاف ہوتے ہیں، ناک کی ریزش کی خوردبینی جانچ سے جذام کے جراثیم کا وجود ظاہر ہوتا ہے، یہ عارضہ دس برس سے پندرہ برس تک رہتا ہے اور اس مرض کا انجام اکثر خراب رہتا ہے۔

علاج ڈاکٹری :- جذام کے مریض کو بالکل علیحدہ رکھیں، ہر روز نیم کے صابن سے غسل دیں اور صاف کپڑے پہنائیں۔
 مرض کی سب سے بڑی دوا چال موگرا تیل ہے اور یہ پانچ بوند کیپ شول میں ڈال کر دین میں تین بار دیں اور آہستہ آہستہ خوراک

بڑھا کر دس ہونڈ تک دے سکتے ہیں، مقامی طور پر چال موگرا اور خالص تیل نیم برابر وزن ملا کر داغوں اور زخموں پر لگائیں۔
جدید تحقیقات کے مطابق اب چال موگرا تیل کے مرکبات کی جگہ ایک نئی دوا سلفیٹرون (Sulphetron) بطور شافی علاج بکثرت استعمال ہو رہی ہے، اس سلسلہ میں بی، ڈبلیو کمپنی کی ساختہ سلفون (Sulphone) خوردنی طور پر خوراک ۱۰ گرام سے شروع کر کے ایک گرام تک اور ہفتہ میں تین بار دی جائے اور تین دن کا وقفہ دیا جائے۔ آہستہ آہستہ اسے بڑھا کر دو گرام تک دے سکتے ہیں۔
زخموں و زیادہ سوجن کی حالت میں سٹریپٹومائی سین کے عضلاتی انجکشن دے سکتے ہیں، لیکن لمبے عرصہ تک استعمال نہ کی جائے کیونکہ اس کے خلاف ہٹ پیدا ہو جاتی ہے، آرسینک (سنگھیا)، پوٹاسیم آیوڈائیڈ وغیرہ بھی مفید ہیں، علاوہ ازیں نیو سالورسن اور سلفارسی نول کے انجکشن بلحاظ عمر و مزاج مفید ہیں۔

یونانی علاج :- جذام کا امولی علاج بطور علاج آتشک ہے، ایسے مریضوں کو آبادی سے دور رکھیں، اس کے زخموں پر ٹی بانڈھ دیں۔ تاکہ مواد جسم کے دوسرے حصوں پر نہ لگنے پائے۔

بطور دوا مندرجہ ذیل نسخہ جات میں سے کسی ایک کا استعمال کرائیں :-

- ۱۔ برہم ڈنڈی تازہ ایک تولہ، مرج سیاہ سات دانہ پانی میں پیس کر کچھ عرصہ پلائیں۔
 - ۲۔ ہڑ سیاہ ایک تولہ ہفتہ میں ایک بار چالیس دن تک کھلائیں، جذام کے شروع میں مفید ہے۔
 - ۳۔ چھلکا ہڑ کا بی، چھلکا بہیرہ، چھلکا آملہ، سر پھوکہ، مجیٹھ، برادہ شیشم، صندل سُرُخ، صندل سفید ہر ایک دو تولہ، کوٹ کر رکھ دیں اور اس میں سے دو تولہ جوش دے کر صاف کریں اور شہد خالص دو تولہ ملا کر پلائیں۔
- جوہر رسپیٹور :- مسیح الملک حکیم اجل خان صاحب کے تجربات میں سے ہے اور اب تک کئی دوا خانے فروخت کر رہے ہیں۔ جذام اور آتشک کے لئے جب ہڈیاں تک گلنے لگی ہوں، نہایت مفید ہے :-

سم الفار، رسپیٹور، دار چکنا ہر ایک ایک تولہ، شراب برانڈی خالص میں خوب کھل کر کے بطریق معروف جوہر پلائیں، خوراک آدھے سے ایک چاول کیپ شولز میں یا منقی (گٹھلی نکال کر) میں ملا کر بغیر چبائے کھلائیں، خالص گھی کا خوب استعمال کیا جائے گندم کی روٹی کی چوری گھی میں ڈال کر لی جائے، ترش اور بادی چیزوں کا پرہیز کیا جائے، ہر ہفتہ استعمال کے بعد دو دن بند رکھیں، ضروری ہے۔ نصد کرنا اور جلاب دے کر بدن کا تنقیہ کرنا بھی قدیم یونانی علاج میں مروج ہے۔

علاوہ ازیں چال موگرا کا روغن نہایت مفید دوا ہے، پہلے ایک ماش کی مقدار میں شروع کر کے آہستہ آہستہ بڑھایا جاسکتا ہے۔
آیور ویدک علاج :- طب آیور وید میں سات مہا کشتھ اور گیارہ کشتھ رکھل اٹھارہ قسم کے کوڑھ آیور وید شاستروں میں بیان کئے گئے ہیں، بڑے کوڑھوں کے نام حسب ذیل ہیں :-

- ۱۔ کپال کشتھ، ۲۔ اودمبر کشتھ، ۳۔ منڈل کشتھ، ۴۔ سدھم کشتھ، ۵۔ کاکن کشتھ، ۶۔ پنڈ ایک کشتھ، ۷۔ رکش کشتھ۔
- یہ ساتوں کوڑھ، ساتوں دھاتوؤں میں ہوتے ہیں، آیور وید کے مشہور گرنتھ سمرت سدھم کوڑھ کو بڑے کوڑھوں میں شمار نہیں کیا گیا۔ مگر چرک منی نے سدھم کو بھی بڑے کوڑھوں میں ہی شمار کیا ہے۔

کشتھ کوڑھوں کے نام یہ ہیں :-

- ۱۔ ایک کشتھ، ۲۔ گنج چرم، ۳۔ چر دل، ۴۔ وچر چکا، ۵۔ وپادکا، ۶۔ پاما، ۷۔ کچھو، ۸۔ وورو، ۹۔ وس پھوٹک، ۱۰۔ کٹھ، ۱۱۔ الک، ۱۲۔ ستاور۔

کوڑھ کے لئے مستند آیورویدک نسخے درج ذیل ہیں:-
 ورہت منجھٹا آدی کو اٹھ، مجھیٹھ، ناگر موٹھا، کوڑسک، گلو، کنڈیاری، سونٹھ، کٹھ، بھنگی، نیم کی چھال، ہلدی، دار ہلدی، کشکی، ہڑ، بہیرہ، آملہ، پٹول پتر، موورا، بابڑنگ، دجے سار، اندر جو، چترک مول، ستا در، ترانمان، پیل، برگ بانس، بھنگرہ، دیو دار، پاٹھا، کھدر، چھال، لال چندن، سنوت، چھال برنا، چرایتہ، باجی مصفی، گودہ الملتاس، چھال سوہیرہ، چھال کرنجوہ، چھال بکائن، آئیس، نیتر بالا، جڑ اندرائن، دھمانہ، انت مول، پت پاڑھ - ہمد برابر وزن جو کو ب کریں، خوراک ایک تا دو تولہ، جوشاندہ بنا کر پلائیں۔

فوائد:- اٹھارہ قسم کے کوڑھ، فساد خون، آتشک، اعصار کے جسم کی بے حسی، دات کے لئے مفید ہے، زبردست مصفی خون ہے۔
 پنج تنکت گھرت:- نیم چھال، پردل، کنڈیاری، برگ بانس ہر ایک پانچ تولہ، جو کو ب کر کے دوسیر پانی میں جوش دیں، آدھا ہنے پر خوب مل چھان کر اس میں آدھ سیر گھی خالص اور آدھ سیر تر پھلا کو پانی میں پیس کر تیار کردہ نغذہ کچا قلعی دار برتن میں نرم نرم آگ پر پکائیں، جب صرف گھی رہ جائے تو نتھار لیں، یہ گھی ایک تولہ سے دو تولہ روزانہ کھلانے سے اٹھارہ قسم کے کوڑھ اور تمام اقسام کی امراض دات پت کف بھی دور ہوتے ہیں۔

گندھک رسائن:- گندھک آملہ سار شدھ (دودھ کے ساتھ) پانچ تولہ، جوشاندہ چترجات (الاجی خورد، تیز پلت، دار چینی، ناگ کیس) رس، بھنگرہ، رس گلو سبز، جوشاندہ چھلکا ہڑ زرد، جوشاندہ چھلکا بہیرہ، جوشاندہ آملہ (گٹھلی خارج کردہ) اور رس ادک کی آٹھ آٹھ بھاونا دے کر خشک کر لیں، خوراک دورتی سے چار رتی تک دن میں دو بار صری ملا کر دودھ کے ساتھ دیں، خرابی خون، امراض داد، چنبل اور کوڑھ کے لئے مفید ہے۔ نئے تجربہ میں سرطان، کینسر کے لئے مفید ہے۔

بیرونی طور پر بہت مرچ آدی تیل یا لکھو مرچ آدی تیل یا سوم راجی تیل یا مہا سند در آدی تیل یا کنڈرپ سار تیل کا لگانا مفید ہے۔
 نیم کے تیل کو کوڑھ پر لگانا و سر پھوکے کا عرق پلانا بھی ہر قسم کے کوڑھ کو دور کرتا ہے یا اگر ہر روز ایک تولہ نیم کے پتے سردائی کی طرح گھوٹ کر پئے جائیں تو کوڑھ شانت ہو جاتا ہے۔

ہومیو پیتھک علاج:- ہائیڈرو کوٹائل مدرنچر (Q) کا استعمال مفید ہے، یہ دوائی برہمی بوٹی سے حاصل کی جاتی ہے۔ آیوروید گرنتھوں میں بھی کوڑھ کے لئے یہ اعلیٰ دوائی لکھی ہے، بلحاظ عمر دس قطرے اس دوائی کو آدھ چھٹانک پانی میں ڈال کر پلانا چاہیئے، اور اگر کا استعمال کافی عرصہ تک جاری رکھنا چاہیئے۔

غذا و پرہیز:- تمام کوڑھیوں کو آبادی سے دور کوڑھی خانوں میں رکھنا چاہیئے۔ ان کے میل جول سے دوسروں میں یہ مرض نہ آجائے اور کوڑھیوں کو وہاں کھانے پینے پہننے کے لئے سب اشیاء مہیا کی جائیں تاکہ مانگنے کے لئے ان کو شہروں اور قصبوں میں نہ جانا پڑے۔

غذا مفتوی و زرد ہنم دیں، خون کو خراب کرنے والی غذا یہ نہ دیں۔





اُنسیواں باب

بال اور ناخن کی بیماریاں

اندر لپٹ - بال گرنا - ایلوپے سیا بالڈنیس

(Alopeciabaldness)

تعریف مرض :- اس مرض میں سزا بر واور داڑھی کے بال گر جاتے ہیں۔
وجوہات :- دل، دق اور پرانی بیماریوں کے باعث بالوں کی غذا کا کم ہو جانا یا بوڑھے آدمیوں میں خشکی کے سبب یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔
لی جلدی امراض کے باعث بھی بال گر جاتے ہیں۔

بالوں کی بڑھوتری اور صحت صرف تین چیزوں پر منحصر ہے، اول خون کی بہرسانی کافی ہو، دوم گرمیوں کی رطوبت بال کو قدرتی چکنائی مہیا کرتی ہے، تیسرے بال کی جڑ اپنے کیسے سے مضبوطی کے ساتھ پیوست ہو۔ پیدائش کے بعد ہی سر کے بال بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب بچے شباب میں قدم رکھتے ہیں تو چہرے، بغلوں اور اعضائے مخصوصہ پر بھی بال نکل آتے ہیں، عورتوں میں بھی سن بلوغ میں بال زیادہ بڑھتے ہیں، عمر بھر بال ہمیشہ گرتے رہتے ہیں اور ان کی جگہ نئے بال پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔ بالوں کا زیادہ موٹا، سیاہ اور گھونگر والا ہونا گرمی و خشکی پر دلالت کرتا ہے۔ برخلاف اس کے بالوں کی کمی، باریکی اور سُرخ و سفیدی سردی و تری کی دلیل ہے۔

علامات :- جلد کے بال اچھی طرح گر جاتے ہیں اور اس جگہ بھوسا جھڑتی رہتی ہے، جب پیدائشی طور پر یہ مرض ہو تو آہستہ آہستہ شروع ہو کر برسوں کے بعد بال گر جاتے ہیں، بڑھاپے میں جب یہ مرض ہوتا ہے تو پہلے کنپٹی اور چنڈیا کے بال گر جاتے ہیں اور اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔

علاج :- ۱۔ جس جگہ بال نہ ہوں، روغن زردی بیضہ مرغ لگایا کریں، بال پیدا ہو جائیں گے۔

۲۔ آملہ کو ایک دن پہلے بھگو دینا چاہیے، جب نرم ہو جائیں تو پھر ان کو ہاتھ سے مل کر ان کی گٹھلیاں نکال دی جائیں اور پانی کام میں لائیں، اور بالوں کو اس پانی سے دھوئیں، گرم پانی میں بال گرنے لگتے ہیں۔ اس لئے آملہ کو جوش دے کر استعمال نہ کریں۔

۳۔ آملہ کو ہی آملہ کے رس سے پیس کر بالوں پر لپیٹ کریں، مفید ہے یا مندرجہ ذیل ہیئر آئیل میں سے کسی ایک کا استعمال کریں:-
آملہ ہیئر آئیل مرکب:- آملہ خشک بغیر گٹھلی دس تولہ، برہمی دس تولہ، ناگر موٹھا ڈیڑھ تولہ، بال چھڑ ڈیڑھ تولہ، دھنیاں خشک دس تولہ، مہندی کے پتے دس تولہ، پانڑی دس تولہ، پان کی جڑ دس تولہ، خس پانچ تولہ، بھنگرہ سیاہ دس تولہ، برادہ صندل سفید دس تولہ۔

ایک رات دن ایسے پڑا رہنے دیں، دوسرے دن اس میں خالص دھلی تلی کا صاف شدہ تیل پانچ سیر ملا کر کسی بڑے برتن میں آگ پر رکھ دیں۔ آگ دھیمی دیں، ورنہ تیل اُبال کھا کر باہر آجائے گا، جب پانی بخارات بن کر اُڑ جائے تو تیل کو آگ سے اتار لیں اور چھان کر رنگ کر لیں اور اس میں حسب پسند تیلوں میں حل ہونے والے رنگ ملا کر چھان کر شامل کریں۔ نہایت اعلیٰ درجہ کا تیل تیار ہوگا۔

آملہ ہیئر آئیل:- آملہ ایک سیر کو دوسیر پانی میں پکائیں، جب آدھ سیر پانی رہ جائے تو خوب مل چھان کر پانی علیحدہ کر لیں اور اس پانی کو چار سیر تیل (صاف شدہ) میں ملا کر آگ پر رکھیں، یہاں تک کہ پانی جل جائے، پھر اسے اتار کر سرد کر لیں اور چھان لیں، اس میں معمولی خوشبو آملہ ملا دینے سے مزید خوشبو آجاتی ہے۔

آملہ ہیئر آئیل پیشل:- دس یا بارہ سیر تازہ (سہرا) آملہ خرید کر کو لہو یا کسی ادویات کوٹنے کے برتن میں ڈال کر رس حاصل کریں، اس کو دس سیر سفید تلی کے تیل میں ملا کر آگ پر گرم کریں، آگ دھیمی ہونی چاہیے، جب تمام رس تیل میں ختم ہو جائے تو اتار کر چھان لیں، اور ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں، دوسرے دن خوشبو آملہ تین اونس، بنزائیل ایسی ٹیٹ تین اونس ملا کر آئیل کلر سبز سے تمام تیل کو حسب منشاء رنگین کر لیں، بس عمدہ کوالٹی کا ہیئر آئیل تیار ہے، جو بالوں کو گرنے سے روکنے کے لئے نہایت مفید ہے۔

برہمی آملہ ہیئر آئیل:- ہرے آملوں کا پانی آدھ سیر، سبز دھنیاں کا پانی ایک پاؤ، بھنگرہ سیاہ کا پانی ایک پاؤ، خس عمدہ ایک پاؤ، گلاب کے تازہ پھول ایک پاؤ، پانڑی ایک پاؤ، برادہ صندل سفید ایک پاؤ، بال چھڑ پانچ تولہ، برہمی بوٹی آدھ سیر۔

ترکیب تیاری:- ان تمام چیزوں کو سوائے پانیوں کے رات کے وقت دس سیر پانی میں بھگو دیں، صبح جوش دیں، جب پانی آدھا رہ جائے تو چھان لیں۔ اور اس مذکورہ بالا پانی اور دھوئی ہوئی تلی کا تیل پانچ سیر ملا کر ملکی آگ پر پکائیں، یہاں تک کہ صرف تیل رہ جائے۔ اب اس تیل کو ایک صاف گنتریں ڈالیں، عطر حنا، عطر گلاب، عطر موتیا ہر ایک تین تین ماشہ کا اضافہ کر کے منہ بند کر کے رکھ دیں، ہفتہ کے بعد استعمال کریں۔ بہترین برہمی آملہ ہیئر آئیل تیار ہے، اگر رنگ دینا ہو تو آئیل کلر دے دیں، بال گرنے و سیاہی قائم رکھنے کے لئے نہایت مفید ہے۔

مقوی دماغ شاہی تیل:- روغن ناریل (ریفائن) ایک پونڈ، روغن بادام ایک اونس، روغن کدو آدھا اونس، روغن سفید تلی ایک اونس، خوشبو چنبیلی آدھا اونس، خوشبو صندل (میو سرکار) ایک ڈرام، خوشبو گلاب ایک ڈرام، خوشبو کیوڑہ آدھا ڈرام۔

ترکیب:- تمام چیزوں کو ملا لیں۔ تین ہفتہ بعد قابل استعمال ہے۔ دماغ کو شکست دینے کا بہت بڑھیا شاہی تیل تیار ہے۔ رنگین بنانا ہو تو آئیل کلر سے رنگ دے لیں۔

پرفیوڈ کو کونٹ ہیئر آئیل:- روغن ناریل کی بدبو دور کر کے یعنی ریفائن کر کے اس میں خوشبو ملا کر سر میں لگایا جاتا ہے۔ سب گھرانوں میں آج کل کبیرت استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تیل بالوں کو لمبا، چمک دار اور ملائم رکھنے کے لئے بہترین ہے۔

دماغ کو تقویت دیتا ہے، ہندوستان کے ہر گھرانے میں بکثرت استعمال ہوتا ہے۔

تیل ناریل (ریفائن) پہا سیر، بنزائیل ایسی ٹریٹ دو تولہ، خوشبو گلاب یا چنبیلی ایک تولہ۔

ترکیب :- تیل میں پہلے بنزائیل ایسی ٹریٹ ملا کر دو دن پڑا رہنے دیں، بعد خوشبو ملا کر شیشیوں میں پیک کر لیں۔

بازار میں مشہور کمپنیوں کے جو پرفیوڈ کو کونٹ ہیئر آئل بکتے ہیں وہ عام طور پر بغیر کلر کے سفید ہوتے ہیں۔ اس لئے کو کونٹ ہیئر آئل میں رنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالوں کو گرنے سے روکنے کے لئے نہایت مفید ہے۔

بڑھیا خوشبو دار تیل :- تیل تلی (ریفائن) ایک سیر، تیل ناریل (ریفائن) ایک سیر، روغن زیتون چار چھٹانک، خوشبو گلاب چار تولہ، روغن بادام دس تولہ، روغن صندل (میسور گورنمنٹ) پہا چھٹانک، رنگ سرخ آئل کلر (نیل میں حل شدہ) حسب ضرورت۔

ترکیب :- پہلے چاروں تیل ملا لیں، پھر روغن صندل ملا کر چند بار بوتل کو ہلائیں، تین دن پڑا رہنے دیں، پھر خوشبو گلاب ملا کر استعمال کریں، گرتے بالوں کو روکنے کے لئے بہتر اور نہایت مقوی دماغ تیل ہے۔

بالوں کو گرنے سے روکنے کے لئے وٹامن بی کمپلیکس کا استعمال مفید ہے، اس سلسلہ میں بی جی فاس (B. G. Phos) کا استعمال بھی مفید ہے۔ ایک دو چمچ بعد از غذا دیں۔

گرتے بالوں کے لئے نیلوں کے دیگر فارموں کے لئے روزگار میں ملاحظہ فرمائیں۔ یہ نرالا جوگی پبلیکیشنز (بس سٹینڈ کے پیچھے) پانی پت برائین سے منگائی جاسکتی ہے۔

غذا و پرہیز :- وٹامنز سے بھرپور غذا دیں، زیادہ دماغی و جسمانی محنت سے پرہیز کریں۔

بھوسی جھڑنا - بفا - ڈین ڈرف (Dandruff)

تعریف مرض :- یہ جلد کے پتلے اجزاء ہوتے ہیں جو سر کی جلد سے جھڑتے ہیں۔

وجوہات :- جنرل کمزوری، کمی خون، بدن کی خشکی، خون کا بگڑ جانا، چکنائی پیدا کرنے والی گرختیوں کی زیادتی رطوبت اس کے خاص سبب ہیں۔

علامات :- سر اور بالوں کی جڑوں سے سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے چھلکے جھڑتے ہیں، بالوں میں سفید سفید چھلکے نظر آتے ہیں۔ لنگھی کرنے سے جدا ہو جاتے ہیں۔

علاج :- مریض کے بدن اور لباس کو صاف ستھرا رکھیں، اگر بیماری معمولی ہو تو صرف بیرونی علاج سے ہی آرام آجاتا ہے، ڈاکٹری علاج میں لہذا پرسی پیڈ ۲، گرین، ٹانکم پوڈر پہا ۱، اولسن مقام ماؤف پر لگائیں یا سلفر پرسی پیڈ پہا ڈرام، سلی سلک ایڈ پہا ڈرام، ویزلین سفید پہا ۲، یہ مرہم بنا کر بالوں کی جڑ میں لگائیں۔

وہیسی علاج میں سر کو گلیسرین سوپ سے دھو کر روغن بنفشہ یا روغن کدوسر پر طیں، کاربانک آئل لگائیں، صرف روغن ناریل کا سر بلنا بھی مفید ہے، وٹامن اے کا کھلانا نہایت فائدہ مند ہے۔ وٹامن اے سے بھرپور غذا کا استعمال کرنا اس مرض میں مدد دیتا ہے۔

غذا و پرہیز :- زود ہضم اور مقوی غذائیں استعمال کریں۔ دیر ہضم غذا کا استعمال نہ کریں۔

بال چر۔ ایلوپے سیاری ایٹا

تعریف مرض :- اس مرض میں سر اور بدن کے بال چر جاتے ہیں اور کمزور ہو جاتے ہیں۔

وجوہات :- مزاج کی خشکی، گرم و خشک اغذیہ کا استعمال، دھوپ میں زیادہ پھرتے رہنا وغیرہ سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- بدن کے بال سخت اور بے رونق ہو جاتے ہیں، ان کے سرے چر جاتے ہیں، خشکی کی تمام علامات ظاہر ہوتی ہیں۔

علاج :- بالوں کو نرم کرنے والے معتدل روغنیات مثلاً روغن بنفشہ، روغن بادام شیریں، لیس دار لعابات، لعاب خطمی، لعاب السی،

لعاب ایسغول استعمال کریں، روغن بنفشہ کی سرسپ مالش کریں، جہاں سے بال بالکل اڑ گئے ہوں، وہاں روغن زردی بمیضہ مرغ کا استعمال کریں۔

غذا و پرہیز :- زود ہضم و مقوی اغذیہ دیں۔ دیر ہضم اغذیہ اور خشک غذاؤں سے سخت پرہیز کریں۔

پلت روگ، سفید بال آنا، ہوڑی نس (Hoariness)

تعریف مرض :- اس مرض میں بال قبل از وقت سفید ہو جاتے ہیں۔ جس سے آدمی باوجود نوجوان ہونے کے بوڑھا معلوم ہوتا ہے۔

وجوہات :- دائمی نزلہ و زکام، حرارت غریزی کا کمزور ہو جانا، بلغمی رطوبت کی زیادتی، فکر و تردد زیادہ، دماغی محنت، خوف و غم

ترش و مرطوب غذاؤں کا بکثرت استعمال، بعض دفعہ دیرینہ امراض کے اثر سے بھی بال گہرتے اور سفید ہو جاتے ہیں۔

علامات :- چالیس سال کی عمر سے پہلے اگر بال سفید ہو جائیں تو اسے مرض سمجھنا چاہیے، لیکن اس عمر کے بعد بالوں کا سفید ہونا مرض

نہیں بلکہ ایک طبعی علامت ہے۔

علاج :- اگر بال طبعی طور پر عمر کے مطابق سفید ہو جائیں تو اس کے علاج کی خاص ضرورت نہیں ہوتی، مگر بعض لوگ عارضی طور پر بظاہر شباب کا

قائم رکھنے کے لئے مختلف قسم کے خضاب لگاتے ہیں۔ جن سے بال کا لے ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ روز بعد کھونٹی نکل آتی ہے، جو اس راز

کو فاش کر دیتی ہے۔ اس طرح خضاب لگانے کی متواتر ضرورت ہوتی ہے۔

سفید بال جب غیر طبعی طور پر سفید ہو جائیں تو بدن و دماغ کا تنفیہ کریں تاکہ بلغمی مادہ خارج ہو، اطریفیل صغیر و کبیر، ہرڑ مرہ کا استعمال کیا

جائے، بالوں کو آملہ، مٹہ (انڈرائن) کے پانی سے دھویا جائے۔ سفید بالوں کو دور کرنے کیلئے مندرجہ ذیل مجربات نہایت مفید ہیں۔ اگر ان پر عمل

کیا جائے تو بال دیر سے سفید ہوتے ہیں۔ اگر وہ قبل از وقت سفید ہو گئے ہوں تو ان پر عمل کرنے سے دوبارہ سیاہ ہو جاتے ہیں۔

مرہ ہرڑ :- ہر صبح ایک عدد مرہ ہرڑ پانی سے دھو کر منہ میں رکھنے اور زبان میں پھیرتے رہنے اور لعاب نگلنے سے (ہرڑ دانت

لگائے و بغیر چبائے حل ہو جائے تو گٹھلی پھینک دی جائے) اور ایک سال متواتر استعمال کرنے سے سفید بال سیاہ ہو جاتے ہیں

مشہور طبیب گیلانی نے اس نسخہ کی بہت تعریف کی ہے اور لکھا ہے کہ اس نسخہ کو استعمال کرنے والے میں نے ایسے اصحاب دیکھے ہیں

جن کی عمر نوے سال تک پہنچ چکی ہے اور ان کی سر اور داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا۔

اسطخود و س :- اگر اسطخود و س ہمراہ شہد خالص کچھ عرصہ استعمال کیا جائے تو بال سفید نہیں ہوتے۔

معجون بال سیاہ :- سوئٹہ ۲ ماشہ، ہڑ سیاہ چودہ ماشہ، اجوائن تین تولہ، باریک پیس کر ادویہ سے دو گنا شہد ملا کر معجون بنائیں، خوراک ایک سے دو تولہ۔

بال کلا ساگ :- ایک من بلادر (بھلانہ) کو باریک کوٹ کر آدھا بکچہ زمین میں ملائیں۔ اس زمین کے کنارے اونچے کر دیں اور ساون بھا دوں میں اس میں ہل چلاتے رہیں تاکہ بلادر اچھی طرح زمین کے ساتھ مل کر کھاد بن جائے، ماہ کا رنگ کو اس زمین میں میٹھی بو دیں، جب ساگ کھانے کے قابل ہو تو اس کا ساگ گوشت کے ساتھ پکا کر خالص گیہوں کی روٹی کے ساتھ بغیر نمک کھائیں، خالص گھی زیادہ کھائیں، سفید بال سیاہ ہوں گے۔

جوارش جالینوس :- کشتہ خبث الحدید پر رتی، جوارش جالینوس چھ ماشہ میں ملا کر دن میں دو بار کھلائیں، چالیس دن کھلانے سے بالوں کی سیاہی کو قائم رکھتا ہے۔

اندرائن بوٹی :- اندرائن بوٹی کی جڑ کا سفوف پر ماشہ، ہمراہ دودھ گائے متواتر کھلاتے رہنے سے بال سیاہ ہو جاتے ہیں۔

بالوں کو سیاہ کرنے والے تیلوں کے مجرب نسخے

بالوں کو سیاہ بنانا :- ایک بڑے اندرائن میں سوراخ کر کے دانے نکال کر اس میں سیلے کے پھولوں کا تیل بھر دیں اور سوراخ کو اس ٹکڑے سے بند کر دیں اور گوندھا ہوا آٹا لگا کر آگ سے پکائیں، جب کئی جوش آجائیں اور اندرائن کی رطوبت خشک ہو جائے تو اس تیل کو جدا کر لیں اور شیشی میں رکھیں۔ اس کو بالوں پر لگاتے رہیں، بال سیاہ ہو جائیں گے۔

دیگر :- اندرائن کے بیجوں کا تیل نکال کر روزانہ سفید بالوں پر لگانے سے بال سیاہ ہو جاتے ہیں۔

دیگر :- ناریل کے تیل کی ایک بوتل میں ایک تولہ چھڑیلہ ڈال کر رکھیں۔ اس تیل سے بال آہستہ آہستہ سیاہ ہو جاتے ہیں۔

تیل بھنگرہ :- بھنگرہ سیاہ کا پانی، آملہ کا پانی، تیلوں کا تیل ہر ایک ۲ تولہ، ملا کر کڑا ہی میں نرم آگ پر رکھیں، جب پانی خشک ہو جائے تو تیل صاف کر کے رکھ لیں، جو بال قبل از وقت سفید ہو گئے ہوں، انہیں پھر سے سیاہ کرنے کے لئے یہ تیل رات کو سونے سے پہلے ان میں لگائیں اور ساتھ ہی ذیل کار و عن بطور خوردنی استعمال کریں، تین ماہ کے استعمال سے بال سیاہ ہو جاتے ہیں، مجرب ہے، کھانے والا نسخہ درج ذیل ہے :-

گھی گائے خالص ایک سیر کڑا ہی میں ڈال کر نرم آگ پر رکھیں اور اس میں بھنگرہ سیاہ کا پانی پانچ سیر بھٹورا بھٹورا ڈال کر جذب کریں، جب تمام پانی خشک ہو جائے تو روغن چھان لیں اور یہ روغن ایک تولہ سے دو تولہ تک دودھ گائے میں تولہ میں ملا کر ہر روز استعمال کریں، دوران استعمال ترشی اور ملاپ سے سخت پرہیز کریں۔

بھنگرہ سیاہ سے بال کالا کرنے کے کامیاب نسخے

بھنگرہ سیاہ کے پانچ انگ (جڑ، شاخ پتے، بھول اور بیج) غرض سالم پودے کر سایہ میں خشک کر لیں (اگر بھنگرہ سیاہ مل جائے تو زیادہ اچھا ہے ورنہ بھنگرہ سفید کو ہی کام میں لاویں) اور ہاون دستہ میں کوٹ کر لوہے کی چھلنی میں چھان کر چھنی کے پیالہ میں رکھیں، اس پر بھنگرہ کا پانی اتنا ڈالیں کہ چار اونٹنل ادبچا ہے۔ سایہ میں رکھ دیں، جب خشک ہو جائے تو اسی قدر بھنگرہ کا پانی اور ڈال کر خشک کریں، اس طرح کم از کم اور زیادہ سے زیادہ ۲۱ مرتبہ یہ عمل کریں۔ اب یہ سفوف آٹھ تولہ، سفوف آملہ چار تولہ، سفوف بہڑہ دو تولہ، سفوف ہڑ زرد ایک تولہ، سفوف

ہر رسیاہ ایک تولہ سب کو ملا کر روغن بادام شیریں سے اچھی طرح چرب کر کے برابر وزن چینی ملا کر رکھ دیں، جس شخص کے بال قبل از وقت سفید ہو گئے ہوں، وہ یہ سفوف چھ ماشہ ہمراہ دودھ بھیر بوقت صبح و شام استعمال کریں، ایک ہفتہ بعد سفوف کی خوراک ۹ ماشہ کر دیں، چالیس دن میں بال زبرد ہوں سیاہ ہو جائیں گے۔

دیگر:۔ بھنگرہ سیاہ کے پتے سایہ میں خشک کر کے برابر سفوف تر پھلا دھر رسیاہ ملا کر روغن بادام سے چرب کریں، پھر اس سے نصف چینی ملا کر بقدر چھ ماشہ صبح کو بھیر کے دودھ کے ساتھ ۴۱ دن استعمال کریں، بادی اور ترشی سے پرہیز کریں، جو بال دقت سے پہلے سفید ہو گئے ہوں پھر سیاہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔

دیگر:۔ بھنگرہ سیاہ کے پانی میں ہر رسیاہ تین عدد بھگو کر خشک کر لیں، پھر روغن بادام سے چرب کر کے رات کو سوتے وقت ایک عدد ہر روز نگل لیا کریں، ضعف معدہ، امراض چشم، قبض، بواسیر اور دوسرے نئے سفید ہونے کے علاوہ بال سیاہ ہو جاتے ہیں۔

دیگر:۔ صرف بھنگرہ سیاہ کے پتوں کو پیس کر بالوں پر لگانے سے بال ہمیشہ کے لئے کالے ہو جاتے ہیں۔

سائنٹیفک خضابات

پوڈر کی شکل میں خضاب کی مارکیٹ میں بھاری مانگ ہے، اس کو شیشیوں میں بھر کر ملک میں فروخت کیا جاسکتا ہے، خضاب کی ۹ ماشہ کی شیشی دو روپے میں فروخت ہو رہی ہے، تیار کر کے فائدہ اٹھائیں، خضاب کی تجارتی طور پر تیاری کے لئے لائسنس لینا ضروری ہے۔

پیرافین لین ڈائن (Parapheny-Lsnediamine) پانچ تولہ، بیریم پراوکسائیڈ (Barim Peroxide) دس تولہ، ٹارٹرک ایسڈ پوڈر پانچ تولہ، تینوں اشیاء کو ایک جگہ ملا کر نیلے رنگ کی شیشیوں میں بھر کر کارک لگا دیں اور اوپر لاکھ وغیرہ لگا کر محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال:۔ بالوں کو صابن سے دھو کر خشک کر لیں، ضرورت کے مطابق پوڈر رے کر پانی میں گھول کر بالوں کی جڑوں تک لگائیں۔ آتشکی مزاج والوں کے لئے اس کا استعمال منع ہے۔

ہیئر برائٹ کے مقابلہ کا فارمولا:۔ پیرافین لین ڈائن دو تولہ، ٹارٹری چار تولہ، بیریم پراوکسائیڈ دو تولہ۔

ترکیب تیاری:۔ تمام اجزاء کو علیحدہ علیحدہ پیس کر ملا دیں اور نیلے رنگ کی شیشیوں میں بھر کر کارک لگا دیں۔ اور اوپر سے لاکھ لگا کر بند کر دیں، جن شیشیوں میں یہ خضاب بھرا جائے بالکل خشک ہوں اور مٹی سے محفوظ ہوں، آخر میں شیشیوں کو کارڈ بورڈ کے جکسوں میں بند کر کے خوب پکنگ کر لیں۔

بوقت ضرورت ایک دو گرام پوڈر رے کر دس یا بارہ سی سی نیم گرم پانی میں گھول کر بالوں پر لگائیں، بال خشک ہونے پر دھو ڈالیں، بال کالے ہو جائیں گے۔

نوٹ:۔ ۱۔ خضاب لگانے سے پہلے بالوں کو اچھی طرح دھو کر چکنا ہٹ دھو کر لیں۔

۲۔ جلدی امراض کے مریض خضاب استعمال نہ کریں۔

دیگر:۔ دسمہ ایک حصہ، مہندی سرخ ۱/۲ حصہ، دونوں کو پیس کر آملہ کے ساتھ خیساندہ پانی سے خمیر کریں اور دو گھنٹے دھوپ میں رکھ دیں، اس کے بعد بالوں کو لگائیں۔

دیگر:۔ مازو پانچ تولہ، ہر زرد پانچ تولہ، چھلکا آملہ پانچ تولہ، سب کو بریاں کر کے باریک کریں۔ سنگ راسخ (کشتہ تانبہ) کچھ سفید، لونگ بریاں ہر ایک دو تولہ، منگ لاہوری ایک تولہ، نیلا بھوتھا چھ ماشہ۔

سب کو کوٹ پیس کر ملا لیں، بوقت ضرورت آب آملہ یا آب حنا میں ملا کر بالوں پر لگائیں، اوپر سے کپڑا باندھ دیں، دو یا تین گھنٹہ بعد کھول دیں۔ بالوں کو سیاہ کر تلے۔

دیگر:- سنگ راسخ ایک تولہ، مازو سبز بریاں دو تولہ، نمک لاہوری چار ماشہ، نیلا بھٹو تھوٹھا چار ماشہ، قلمی نوشادر آٹھ ماشہ، ان پانچوں اجزاء کو باریک پیس کر بوتل میں رکھیں، جب خضاب لگانا ہو تو چند کالی ہرڑیں دو گھنٹہ پہلے بھگو دیں۔ پھر سفوف بقدر ضرورت لوہے کی کڑاہی میں ڈال کر ہرڑ کا پانی بھٹوڑا بھٹوڑا ڈالیں اور خوب پیس، جب تک جان ہو جائے تو اسے لگائیں، اوپر ارند کا پتہ باندھیں، دو گھنٹہ بعد گرم پانی سے دھو ڈالیں، بال سیاہ ہو جائیں گے۔

دیگر:- لونگ، مہندی، مساوی وزن پانی میں پیس کر بالوں پر لگائیں، آہستہ آہستہ بال سیاہ ہو جائیں گے۔
دیگر:- مازو سبز بریاں چار عدد، سنگ راسخ چار رتی ————— ہون دستہ آہنی میں کوٹ کر آب آملہ تازہ میں بقدر ضرورت لھول کر بالوں پر لگائیں۔

دیگر:- مازو سبز اس طرح بھونیں کہ نہ تو کچے رہیں اور نہ ہی جل جائیں۔ ایک پاؤ، برادہ تانبہ چھ تولہ آٹھ ماشہ، کیس چھ ماشہ، کالی ہرڑ تین تولہ چار ماشہ، طوطیا چھ ماشہ، نوشادر ایک تولہ آٹھ ماشہ، کوٹ کر رات کو آنولوں کے پانی میں تر کر کے رکھیں، صبح کو چھان کر دلیاں بنائیں، بوقت ضرورت گولی کو آنولہ کے پانی میں لوہے کے برتن میں بھگو کر بالوں پر لگائیں، بال سیاہ ہوں گے، مجرب ہے، ایک دن ناغہ کر کے پہلے تین بار لگائیں یعنی ایک دن چھوڑ دیں، پھر لگائیں، یعنی ایک دن کا ناغہ کر کے لگائیں۔

نوٹ:- خضاب سازی کے لئے لائسنس لینا ضروری ہے۔
غذا و پرہیز:- ترش و مرطوب غذاؤں کا استعمال نہ کریں اور اعتدال کی زندگی بسر کریں، غذا زود ہضم اور مقوی استعمال کریں۔

بالوں کی اُتھتی کو روکنا، بالوں کی پیدائش کو روکنا

بعض مقامات پر بالوں کی پیدائش کو روکنا نہایت ضروری ہوتا ہے، اس مقصد کے لئے ایسی ادویہ کا استعمال کیا جاتا ہے جو بالوں کی پیدائش کو روک دیں، اس قسم کی ادویہ کے استعمال کے لئے ضروری ہے کہ بالوں کو اکھاڑ کر یا بال صفا پوڈر کے ذریعے در کر کے استعمال کریں، بالوں کی پیدائش کو روکنے کے لئے نسخہ جات درج ذیل ہیں:-

- ۱۔ بالوں کو صاف کر کے سورنجاں باریک سفوف کر کے لگانا مفید ہے۔
- ۲۔ جونک کو نمک سادہ میں لت پت کر کے خشک کر کے پیس کر بال اکھاڑ کر لگانے سے بال پیدا نہیں ہوں گے۔
- ۳۔ سمندر جھاگ، افیون، اجوائن خراسانی برابر وزن سرکہ میں پیس کر لگانا مفید ہے۔
- ۴۔ چیونٹی کے اندھے باریک پیس کر لگائیں، بال پیدا نہیں ہوں گے۔
- ۵۔ انجیر کے پتوں کا رس، چیونٹی کے اندھے، سمندر جھاگ، ترنج (بٹرن) کا پانی برابر ملائیں، بالوں کو اکھاڑ کر دو یا تین بار لگائیں، بال ہرگز پیدا نہیں ہوں گے۔

۶۔ پنجاب و ہریانہ میں جانڈ (جنڈ) یا جانڈی (جنڈی) نام کا درخت ہوتا ہے، جو عام طور پر ہر جگہ پایا جاتا ہے، بساکھ، صبیٹھ میں اس کو خوب پھل آتا ہے، کچے کو سانگر کہتے ہیں، جب یہ پک جاتا ہے تو اسے جھینجھ کہتے ہیں۔ یہ حد درجہ قابض ہوتا ہے۔ جس

جگہ کے بال عمر بھر کے لئے ناپید کرنے ہوں پہلے اس جگہ کو اُسترے سے خوب صاف کریں، پھر جانڈی کے پھیل (سانگر) کا صفا کر دیں۔ تین دن تک یہ عمل کریں، بال عمر بھر نمودار نہیں ہوں گے۔

۷۔ الکوحل ۲ گرام، آلوڈین ۵۰ گرام، کلوڈین ۲۵ گرام، روغن تارپین اصلی ۵ گرام، کیسٹر آیل ۲ گرام۔
ترکیب :- ان سب کو حل کر کے شیخیوں میں بھر کر رکھ دیں۔ تیار ہے ایک ہفتہ کے قابل استعمال ہوگا۔ بازار میں ایک نئی چیز ہوگی۔ جہاں کے بال اڑانے ہوں، وہاں دن میں تین چار بار لگائیں، بال ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں گے۔
۸۔ بیج قرطم (پولیاں) لے کر ان کے مغز نکال لیں اور کو لہو یا مشین میں ان کا تیل نکال لیں، جہاں کے بال اڑانے ہوں پہلے بال صاف کر کے وہاں اس تیل کو دن میں روزانہ دو یا تین بار لگائیں، بال ہمیشہ کے لئے اڑ جائیں گے۔

بالوں کو گھونگر والا بنانا، تجعید شعر

اس مقصد کے لئے قابض ادویہ کا استعمال کیا جاتا ہے، بالوں کو گھونگر والا بنانے کا فارمولا درج ذیل ہے :-

سولہ گہ ۵ حصہ، گرم پانی ۳۰ حصہ، گوند کیکر ۲ حصہ۔

تینوں کو آپس میں ملائیں، بالوں کو تر کریں۔ گھونگر والے ہو جائیں گے۔

بالوں کو جمائے رکھنے (ہیرنکسر) کے فارمولا :- نئے فیشن کے مطابق آج کل لڑکے لڑکیاں بالوں کو جمائے رکھنے کے لئے ہیرنکسر استعمال کرتے ہیں۔ اس سے بال عرصہ تک جمے رہتے ہیں۔ خصوصاً کچھ بھائی اسے بہت استعمال کرتے ہیں۔ داڑھی اور مونچھ پر لگانے سے بال منتشر نہیں ہوتے۔ مارکیٹ میں اس کی بھاری مانگ ہے۔

۱۔ ویزلین سفید دس پونڈ، موم سفید خالص ایک پونڈ، پیرافین لکوڈ دو پونڈ، خوشبو گلاب یا زنگس یا چنبیلی دو اونس، رنگ سبز (آیل کلر) حسب ضرورت۔

ترکیب :- موم گرم کر کے پیرافین لکوڈ ملائیں۔ لیکن پیرافین میں پہلے رنگ کو خوب حل کر لیں، پھر ویزلین شامل کر کے یک جان کر کے ملا لیں۔ مرکب ٹھنڈا ہونے پر خوشبو شامل کریں۔ موسم کے لحاظ سے موم اور پیرافین لکوڈ میں کمی بیشی کی جاسکتی ہے۔

۲۔ سپر میٹی ۲ تولہ، موم سفید پانچ تولہ، پیرافین لکوڈ ۲۸ تولہ، خوشبو چنبیلی یا زنگس چھ ماشہ۔

تینوں کو داڑی ہاتھ پر گھملا لیں، اس میں پانی سات تولہ اور سہاگہ باریک چھ ماشہ ملا دیں اور خوب گھوٹ لیں۔ اس کے بعد خوشبو ملا لیں، اسے گاڑھ یا پتلا بنانے کے لئے لکوڈ پیرافین کو حسب ضرورت بڑھایا یا کم کیا جاسکتا ہے۔

۳۔ سپر میٹی پانچ تولہ، موم مکھی شدہ ۲۰ تولہ، گوند کیکر پانچ تولہ، کشید شدہ پانی ۵ تولہ، خوشبو گلاب ۲ تولہ، رنگ سبز (آیل کلر) حسب ضرورت، صابن خالص (ہنائے والا) دس تولہ، گلیسرین پانچ تولہ۔

ترکیب تیاری :- گوند کو پیس کر اور صابن کو تراش کر بعد میں آدھے پانی میں ملا کر گھوٹ کر لی سی بنالیں۔ باقی پانی میں گوند حل کر کے اور سپر میٹی کو داڑی ہاتھ پر گھملا کر اس میں صابن کے گھول و گوند کے گھول کو ملا کر گلیسرین ملا دیں اور خوب گھوٹ لیں۔ اس میں بھٹورے پانی میں رنگ حل کر کے ملا لیں اور ٹھنڈی صورت میں خوشبو ملا لیں۔ استعمال کریں یا پیکنگ کر کے مارکیٹ میں فروخت کریں۔

مزید فارمولوں کے لئے ”نئے روزگار“ مینجر نرالا جوگی پبلیکیشنز پانی پت (ہریانہ) سے منگائیں!

جُوئیں پڑنا، پیدہ کیلوسس (Pediculosis)

تعریف مرض :- یہ بالکل چھوٹی اور باریک جُوئیں ہوتی ہیں، جو مسامات کو چمٹی ہوئی بالوں کی جڑ کی طرح معلوم ہوتی ہیں۔ یہ ہندی میں جم جُوئیں کہلاتی ہیں۔

وجوہات :- صاف ستھرا نہ رہنا، بدن کو میل کچیل سے صاف نہ کرنا، خراب غذاؤں کا استعمال، کپڑوں کا نہ بدلنا، بعض دفعہ جوؤں والے شخص کے کپڑے پہننے سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

جب جُوئیں زیادہ پیدا ہوں اور ان کو دور نہ کیا جائے تو مریض کی رنگت زرد، بھوک کم اور جسم کمزور ہو جاتا ہے۔

علامات :- بالوں کی جڑوں کے پاس جُوئیں چمٹی ہوئی صاف نظر آتی ہیں، سر میں کھجلی ہوتی ہے اور مریض کمزور ہو جاتا ہے۔

ڈاکٹری علاج :- بالوں کو کاربانک سوپ سے دھوئیں، ڈی، ڈی، ٹی (D.D.T.) ایک حصہ، ٹائلیم پوڈر ۸۰ حصہ، دونوں کو ملا لیں اور بالوں میں لگائیں، کچھ دیر بعد سر کو دھوئیں یا ڈی، ڈی، ٹی دو فیصدی کا امیلسن اس قدر لگائیں کہ بال خوب تر ہو جائیں، صرف ایک بار لگانے سے آرام آ جاتا ہے، اس کے بعد نیم گرم پانی دلائف بولائے سوپ سے ہنا کر تیل سروس لگالینا چاہیے یا بنزینیل بنزویٹ امیلسن یا ایس کے بی اول ہلکی طاقت میں گھول بنا کر بالوں کو خوب تر کرنے سے اور بعد میں صابن دپانی سے دھو لینے سے جُوئیں مر جاتی ہیں۔ سائی بان یا لائی سل بھی مفید ہے۔

یونانی علاج :- بدن کو پاک و صاف رکھیں، کپڑے سفید اور نئے پہنیں، غسل کریں۔ طب یونانی کے نظریہ کے مطابق ریشمی کپڑوں کا استعمال جوؤں کو دور کرنے کے لئے مجرب ہے، فینائل کی گولیاں (جو کپڑوں میں رکھنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں) باریک کر کے تیل سروس میں ملا کر لگائیں اور گرم پانی میں نہالیں، مناسب مقدار میں پارہ کو اُپلے کی راکھ میں ملا کر اور تیل سروس میں حل کر کے سر پر ملیں، اس سے سر کی جُوئیں مر جاتی ہیں۔

نوٹ :- بعض دفعہ پارہ کا بیرونی استعمال بھی زہر ملا اثر پیدا کرتا ہے، اس کے استعمال کے بعد فوراً سر کو دھو دینا چاہیے۔

آیور ویدک علاج :- جُوں مار بُوٹی سفوف بنا کر اور تیل میں ملا کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں، اس سے جُوئیں مر جائیں گی۔

ہومیو پیتھک علاج :- ٹانی سگریا Q ایکٹ چھ چھ اونس پانی میں ملا کر اس سے سر یا جسم کے دیگر بالوں والے حصے جہاں جُوئیں ہوں تر کریں۔ چند بار ایسا کرنے سے جُوئیں مر جائیں گی، یہ ایک نہایت ہی مجرب علاج ہے۔

غذا اور مزہ :- غذا و دھنم و مقوی دیں، روزانہ لائف بولائے یا کاربانک یا مری سوپ سے بالوں کو دھوئیں، اگر کپڑوں میں جُوئیں پڑ گئی ہوں تو کپڑوں کو اُبلتے پانی میں ڈال دیں، جُوئیں مر جائیں گی۔

بدبودار پسینہ آنا، برومڈروسیس (Bromid-Rosis)

تعریف مرض :- اس مرض میں پسینہ پیدا کرنے والی گلیٹیوں میں فرق واقع ہو جانے سے بدبودار پسینہ آیا کرتا ہے۔

وجوہات :- بینگ، میبٹی، لہسن، پیاز کا بکثرت استعمال، اخلاط کا متعفن ہو کر جلد کی طرف مائل ہونا، کافی غصہ تک نہ نہانا، پسینہ پیدا کرنے والی گرمیوں میں نقص ہو جانا وغیرہ اس کے خاص اسباب ہوتے ہیں۔

علامات :- تمام بدن خصوصاً بغل، کنج ران اور اندکوشوں کے پیچھے بدبو دار پسینہ آتا ہے۔ اور ایک ایسی ناغوش گوار بو آتی ہے کہ آدمی کسی سو سائی میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔

علاج :- بورک ایسڈ چار تولہ، زنک اوکسائیڈ دو تولہ، ٹالمک پوڈر چھ ماشہ، پشکری سفید دو تولہ، باریک چھلنی سے چھان کر سٹرونیلا آیل تین ماشہ شامل کر کے چھان کر بند ڈبے میں رکھیں اور بوقت ضرورت استعمال کریں۔

دیگر :- زنک اوکسائیڈ ایک تولہ، بورک ایسڈ دو تولہ، فریچ چاک دس تولہ، اسٹارچ تین تولہ، سٹرونیلا آیل تین ماشہ، ترکیب مندرجہ بالا سے بنا کر استعمال کریں۔

دیگر :- پشکری چار ڈرام، ٹالمک پوڈر آدھا اونس، بورک ایسڈ آدھا اونس، زنک اوکسائیڈ آدھا اونس، اسٹارچ ایک اونس، سٹرونیلا آیل ایک ڈرام۔

ترکیب مندرجہ بالا سے تیار کریں، یہ پوڈر پسینہ آنے کو روکتا ہے، اگر پاؤں میں پسینہ آتا ہو تو جوتوں اور جرابوں میں چھڑک لیا جاتا ہے۔ اگر زیادہ پسینہ آنے سے مریض کمزور ہو جائے تو ڈٹا منر سے بھر پور اغذیہ دیں، جسم کو درخت جامن کے پھلکا کے پانی سے دھونا یا پوٹاسیم پرمنگنیٹ کے پانچ گرین نیم گرم پانی ایک بالٹی میں ڈال کر کاربالک سوپ سے نہانا بھی مفید ہے۔

غذا و پرہیز :- بدبو دار پسینہ لانے والی اغذیہ نہ دیں اور غذا زود ہضم و مقوی دیں۔

پسینہ آنا بند ہو جانا

تعریف مرض :- اس مرض میں پسینہ آنا بند ہو جاتا ہے۔

وجوہات :- رطوبات بدن کے کم ہو جانے یا ان کے غلیظ ہو جانے سے مسامات جسم تنگ ہو جاتے ہیں، زیادہ سردی و گرمی سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- پسینہ نہیں آتا، جس سے گندہ مواد خارج نہیں ہو سکتا، جسم کمزور ہو جاتا ہے۔

علاج :- ۱۔ گرمی کے موسم میں زیادہ ٹھنڈا پانی پلانے سے بھی پسینہ آ جاتا ہے۔

۲۔ پودینہ کو بند گچی میں جوش دیں اور مریض کے نزدیک ڈھکنا کھولیں، اس سے پسینہ آ جائے گا۔

۳۔ انیسوں کو جوش دے کر پینا اور جسم پر لگانا بھی مجرب ہے۔

۴۔ روغن بابونہ میں مناسب مقدار پورا ارمنی ملا کر مالش کریں۔ مفید ہے۔

غذا و پرہیز :- غذا زود ہضم و مقوی دیں اور قواعد حفظانِ صحت کی پابندی کریں۔

رکت مکیت پسینہ آنا، خونی پسینہ آنا

تعریف مرض :- اس مرض میں خونی پسینہ آتا ہے۔

وجوہات :- خون پتلا ہونا، صفراوی غلط کی زیادتی، کمزوری وغیرہ اس کے خاص سبب ہیں۔

علامات :- کبھی پسینہ کی بجائے خون خارج ہوتا ہے اور کبھی پسینہ کے ساتھ خون مل کر آیا کرتا ہے۔
 علاج :- خون کا جوش بٹھانے والی ادویہ دیں، شیرہ غناب سات ماشہ، لعاب بی دانہ تین ماشہ، شربت نیلوفر دو تولہ ملا کر پلائیں، بیرونی طور پر پشکڑی گھول سے جسم کو دھویں۔
 غذا و پرہیز :- بطور غذا شوربہ، اٹی یا زرشک یا انار دانہ دیں، پالک کا استعمال کریں یا کاسنی سبز دیں، گائے کی چھاچھ کے ساتھ روٹی کا استعمال مفید ہے، غناب تازہ، آلو بخارا تازہ اور آلوچہ تازہ کا استعمال نہایت مفید ہے۔

ناخن کے امراض

ہاتھوں کی خوب سورتی میں ناخنوں کو بڑا دخل ہے، میلے اور بے ڈول ناخن ظاہر کرتے ہیں، کہ یہ شخص بے ڈھنگا اور ناشائستہ ہے، مغربی ممالک میں یہ صاف بھترے اور چپکے رکھے جاتے ہیں، ناخنوں کی خوبصورتی کے لئے فارموئے توئے روزگار کتاب میں دیئے گئے ہیں، یہاں صرف ناخنوں کے عام امراض اور ان کا علاج تحریر کیا جاتا ہے۔

ناخن کا پشلا پڑ جانا، (onych atrophia)

تعریف مرض :- اس مرض میں ناخن پتلے ہو جاتے ہیں اور آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔
 وجوہات :- پھٹوں کی کمزوری، دار، چنبل، خارش کی تکلیف، جسم میں وٹامن ہائے کی کمی اور جسم میں کیلشیم کے جزو بدن نہ بننے سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- ناخن ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں یا پتلے ہو کر بالکل بھدے ہو جاتے ہیں۔
 علاج :- اگر خارش، چنبل یا داد کی وجہ سے یہ عارضہ ہو تو اس کے مطابق علاج کریں، اگر کیلشیم کی کمی سے ہو تو کیلشیم مع وٹامن ڈی آکسٹو کیلیم (Osto calcium) مناسب مقدار میں دیں یا کیلسی نول (Calcinol) و وٹامن ڈی دیں یا کیلیم و کونیرٹ و کیلسی فیروول (Calci gluco with calciferol) ساختہ بروز ویکم دیں یا کیلسی ما (calcima) ساختہ سپلا پینی کا استعمال بھی مفید ہے۔

اگر یہ عارضہ وٹامن کی کمی سے ہو تو وٹامن اے، وٹامن ڈی یا ملٹی وٹامنز (Multi vitamins) کا استعمال کیا جائے۔
 یونانی علاج :- اگر کیلشیم کی کمی سے یہ عارضہ ہو تو کشتہ موتی سیپ (صدف مرواریدی) ایک رتی ہمراہ شہد یا مکھن دیں۔ یہ عارضہ غریبانہ مفید کیلیم ہے، اور ناخنوں کے علاوہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، امیر مرصیوں کو کشتہ موتی (مروارید) آدھی رتی ہمراہ شہد مکھن یا بالائی یا مرہ آملہ دیں، یہ نہایت اعلیٰ درجہ کا نفیس کیلیم ہے۔ جو ناخنوں کی کمزوری کے علاوہ دل کی تقویت کے لئے بھی مفید ہے۔

ایورویڈک علاج :- کشتہ پروال (مونگا، مرجان) ایک رتی ہمراہ مکھن دیں، نہایت اعلیٰ درجہ کا کیلیم ہے، ناخنوں کی کمزوری کے علاوہ دل و دماغ کی تقویت کے لئے بھی مفید ہے۔

قدرتی علاج :- مرہ آملہ کا استعمال اس مرض کے لئے نہایت مفید ہے ۔
غذا و پرہیز :- زود ہضم و مقوی غذائیں دیں ، دیر ہضم اغذیہ سے پرہیز کریں ۔

ناخنوں کا موٹا ہو جانا ، (onychauxis)

اس مرض میں ناخن بہت موٹے و بد صورت ہو جاتے ہیں ، یہ عارضہ عام طور پر آشک ، جذام ، داد ، چنبل وغیرہ کے عارضہ سے ہوتا ہے بعض دفعہ ان میں سوجن بھی ہو جاتی ہے ۔
علاج :- اصل سبب کے مطابق علاج کریں ، بطور دوا ایڈسلی سلک ایک ڈرام ، ویزلین سفید آدھا اونس ، مرہم بنائیں اور کھوڑی سی مرہم لگا کر پٹی کر دیں ، چند دنوں کے استعمال سے ناخن نرم پڑ جائے گا ۔ علاوہ ازیں ناخنوں کی صفائی کی طرف خاص دھیان دیا جانا ضروری ہے ۔

انگل و ہٹیرھا ، ہٹہری ، (onychia)

تعریف مرض :- یہ مرض ایک قسم کا گرم ورم ہے جو ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے ناخن کی جڑ میں پیدا ہو کر سخت تکلیف کا موجب ہوتا ہے ۔
وجوہات :- چوٹ لگنے یا غلیظ خون کے جمع ہو جانے سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے ، بعض دفعہ چنبل ، داد ، آشک ، جذام وغیرہ سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے ۔

علامات :- ناخن کی جڑ میں سوجن ہوتی ہے ۔ ورم کی رنگت لال ہوتی ہے ، اس میں سوزش و درد ہوتا ہے ، جس میں ٹیس پائی جاتی ہیں ۔
جو بغل اور کنج ران تک پہنچتی ہیں ۔ کبھی اس کی وجہ سے ناخن گر پڑتے ہیں ، کبھی شدت درد سے بخار بھی ہو جاتا ہے ، اگر مناسب علاج کیا جائے تو ورم تحلیل ہو جاتا ہے ، ورنہ پیپ پڑ کر ناخن انگلی سے اکھڑ جاتا ہے ، اگر علاج میں تاخیر رہی کی جائے تو تمام انگلی گل جاتی ہے ۔

علاج ڈاکٹری :- شروع مرض میں ٹنگر آئیوڈین لگائیں یا آئیوڈکس (Iodex) مل کر سنیک کریں یا انٹی فلو جیسین یا بلاڈونا پلاسٹر لگائیں ، اگر بخار تو سفادایازین یا سیپٹران وغیرہ مناسب مقدار میں دیں ، اپنی سلین یا پردکین پینی سلین یا سٹرپٹو پینی سلین کے عضلاتی انجکشن بھی مفید ہیں ، جب ناخن کے نیچے پیپ پڑ جائے تو بذریعہ آپریشن الگ کر کے کچھ دن پٹی کرنے سے آرام آ جاتا ہے ، ناخن کو نرم کرنے کے لئے سلی سلک ایڈ کا استعمال بھی مفید ہے ۔
یونانی علاج :- شروع مرض میں انگلی کو ٹھنڈے پانی میں رکھیں ، اسی کے زج کوٹ کر سرکہ میں پکائیں اور جو کا آٹا و زردی بمیضہ مرغ شال کر کے اچھی طرح پلٹس بنائیں ، درد کو دور کرنے اور ورم کو تحلیل کرنے کے لئے نہایت مفید ہے ۔

آئیور ویدک و ہومیوپیتک علاج بطور یونانی طریقہ علاج کے کریں ۔
غذا و پرہیز :- بخار کی حالت میں زود ہضم مقوی غذا دیں ، دیر ہضم اغذیہ سے سخت پرہیز کریں ۔

ناخنوں کا سفید پڑ جانا

تعریف مرض :- اس مرض میں ناخن ابرک کی طرح سفید ہو جاتے ہیں ۔

وجوہات :- کمزوری جگر، خون کا جسم میں کم ہونا، اچھی غذا کا نہ ملنا، سخت گرمی سے رطوبات کا خشک ہو جانا، کیلیسیم کی کمی اس کے خاص اسباب ہیں۔

علامات :- ناخن سفید ہو جاتے ہیں اور معمولی وجہ سے ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔

علاج :- بطر ناخن کے پتلا پڑ جانا (onychatrophia) کے کریں اور مغز بادام تلخ ایک تولہ، مغز اخروٹ ایک تولہ پس کر چربی بھر کر تین تولہ، موم ڈیڑھ تولہ گلا کر اس میں ملائیں اور ناخنوں پر صفا د کریں اور دٹامن سے بھر پور اغذیہ وادویہ دیں۔ اگر کمزوری جگر سے یہ عارضہ ہو، تو فولاد کے مرکبات دیں یا دٹامن بی ۱۲ کے عضلاتی انجکشن بھی مفید ہیں۔

تشخیص مرض کیلئے مریض کا طبی معائنہ

مریض سے تمام علامات تفصیل سے دریافت کرنی چاہئیں۔ مرض کیسے شروع ہوا؟ اب تک کیا کیا علاج کیا گیا ہے؟ اور کس کس دوا سے فائدہ ہوا ہے؟ مرض نے کون سے اعضاء پر حملہ کیا ہے؟ اس اعضاء کا معائنہ کرنا چاہیئے اور ایسا کرنے کے ساتھ ہی مریض کی تمام جسمانی حالت، چہرہ کی رنگت اور سر سے پاؤں تک مریض کے سارے جسم کا جائزہ لینا چاہیئے۔

بعض مریض بہت دبلے پتلے ہوتے ہیں۔ قد میں لمبے بعض مضبوط اور موٹے تازے ہوتے ہیں، قد میں متوسط بعض سُرخ چہرے والے تو مند ہوتے ہیں اور بعض بہت حد سے زیادہ موٹے ہوتے ہیں۔ ان حالات میں بڑھوتری کو نوٹ کرنا، اوسط آدمی کے ساتھ بلحاظ عمر موازنہ کرنا ضروری ہے۔ دق، ذیابیطس، کالا آزار، یرقان، جگر کی کمزوری اور جراثیمی امراض میں وزن کا نوٹ کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد دیکھا جاسکتا ہے کہ علاج میں کس قدر کامیابی ہوئی ہے۔ جلد و ہر اور موٹاپا میں وزن کم ہونے کو علاج کی کامیابی کہا جاسکتا ہے، اور کمزوری، دق، ذیابیطس اور جراثیمی بخاروں و جگر کی کمزوری میں وزن کا بڑھنا کامیابی کہی جاسکتی ہے۔


عام طور پر جوان آدمی کا قد ۵ فٹ ۶ انچ اور وزن ۱۲۰ پونڈ ہوتا ہے اور مختلف قد کے لئے مندرجہ ذیل فارمولا ذہن نشین کر لینا چاہیئے :-

ہر فٹ قد کے لئے نارمل وزن ۲۰ پونڈ۔ اس کے بعد ہر ایک انچ کے لئے ۳ پونڈ۔ اس حساب سے ایک نارمل نوجوان آدمی جس کا قد ۵ فٹ ۸ انچ ہو۔ اس کا وزن $20 \times 8 + 100 = 260$ پونڈ ہونا چاہیئے۔

اس کے علاوہ عمر کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ ۳۰ سال سے بعد کی عمر میں انسان میں موٹاپا آنا شروع ہو جاتا ہے اور عورتوں کو حمل ٹھہرنے کی حالت میں بھیج کی پیدائش تک موٹاپا ضروری اور لازمی ہے۔ چھاتی کی پیمائش بھی ضروری ہے اور معدہ کے مقام پر گولائی اگر چھاتی کی پیمائش سے پیٹ کی پیمائش زیادہ ہو تو موٹاپا سمجھے۔

علاوہ ازیں مریض کی رنگت یعنی زرد چہرہ، یرقان اور کمی خون کی علامت ہے، سُرخ چہرہ بلڈ پریشر کی دلالت ہے، ہونٹ کھلے اور بھنویں تنی ہوئی ہوں تو ہسٹیریا، تشنچ یا کچلہ وغیرہ کے زہریلے اثرات ظاہر ہوں گے۔ چہرہ کی بدلی ہوئی غیر طبعی حالت شراب کا نشہ، لغو، دماغی خرابی، نالج وغیرہ کی علامت ہے۔

اسی طرح موروثی آتشک، وغیرہ بہت سے امراض کی تشخیص طبی معائنہ کے ذریعے بخوبی کی جاسکتی ہے۔



بیسواں باب

بخاروں کا بیان

بدن جسمانی کی اس حالت کو بخار کہتے ہیں جس میں بدن کی حرارت درجہ اعتدال سے بڑھ کر کچھ عرصہ کے لئے غیر طبعی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ بخار کی حالت کو سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ پہلے جسمانی حالت کو سمجھا جائے، یہ کیونکر پیدا ہوتی ہے، کیسے اعتدال پر رہتی ہے اور کس طرح زیادتی یا کمی واقع ہوتی ہے۔

جسم کی حرارت کے سلسلہ میں اطباء قدیم جالینوس و رازی کا خیال ہے کہ جسم کی حرارت ایک عنصری حرارت ہے، جو عناصر میں بالطبع موجود ہوتی ہے، لیکن شیخ الرئیس کا خیال ہے کہ حرارت غریزیہ ایک آسمانی حرارت ہے یعنی انسان کے وجود پذیر ہونے کے ساتھ ہی قدرت کی طرف سے یہ عطیہ بھی مل جاتا ہے اور یہ حرارت دل کے ذریعہ شرائن اور تمام جسم میں پھیلتی رہتی ہے۔

انسانی جسم کے اندر بے شمار پیچیدہ افعال انجام پاتے ہیں، غذا و ہوا وغیرہ کی صورت میں جو عنصری مواد انسانی جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں، ان میں تغیرات کے باعث مختلف قسم کے مواد مصالحہ و فاسدہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اعمال جس طرح آلات جسم میں وقوع پذیر ہوتے ہیں، ٹھیک جگر، رگوں اور تمام جسم کی بنا و میں بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں اور اس طرح انسانی جسم کے اندر تغیرات و تبدل کا زبردست سلسلہ جاری رہتا ہے، طبی نقطہ نظر سے جہاں کہیں کیمیائی تبدیلیاں رونما ہوں گی، وہاں حرارت کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بدن کے ہر حصے میں مواد و اخلاط کے تغیر و تبدل سے حرارت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اور اس حرارت کے ذریعے ہمارے تمام اندرونی اور بیرونی اعضاء گرم رہتے ہیں، جب حرارت اعتدال پر رہتی ہے تو جسم کے لئے مفید ثابت ہوتی ہے یونانی طبیب، اس حرارت کو حرارت غریزیہ کہتے ہیں۔ جب بھی اس حرارت میں فرق پڑ جاتا ہے تو جسم کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

حرارت کے خرچ کو بڑھانے اور گھٹانے کے لئے طبی قدرت نے حکیمانہ انتظام کیا ہوا ہے۔ اور اس سلسلہ میں طبیعت پٹھوں کی ڈوریوں سے کام لیتی ہے اس لئے اعصاب کو طبیعت کی باگ کہا جاتا ہے، نہ صرف حرارت کو اعصاب کے ذریعہ سے خرچ کیا جاتا ہے

بلکہ جسم کے ہر ایک حصے میں حرارت کی کمی یا زیادتی کے لئے طبیعت اسی باگ کے اشارے سے کام لیتی ہے۔

چونکہ آگ کے لئے ایندھن اور ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہمارے جسم کے اندر کی حرارت بھی غذا اور ہوا (سانس) کی محتاج ہے۔ جالبینوس کی رائے میں ہوا کو روح کہا جاتا ہے۔ بدن کے اندر غذائی مواد اگر ایندھن کی طرح جلتے ہیں تو یہ مخصوص ہوائی اجزاء (روح) اس کو جلاتے ہیں۔ غذا چونکہ حرارت کی پیدائش کے لئے ایندھن کا کام دیتی ہے اور موسم سرما میں بیرونی ہوائی خشکی کی وجہ سے جسم کو حرارت کی پیدائش کے لئے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے طبیعت سردی کے موسم میں غذاؤں کو تیزی کے ساتھ ہضم کرتی ہے، اس سلسلہ میں اگر خوراک کم و گی تو جسمانی حرارت آخر کار اس قدر کم ہو جائے گی کہ حرارت غریزی کی کمی سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہو کہ حرارت کی پیدائش کے لئے غذا ضروری ہے اور جب جسم کو غذا نہیں ملتی تو حرارت کی کمی سے موت واقع ہو جاتی ہے اور جب حرارت حد اعتدال سے زیادہ انسانی جسم میں ہو جاتی ہے تو یہ حرارت دل کے ذریعہ تمام جسم میں پھیل جاتی ہے اور جسے طبی اصطلاح میں بخار کہتے ہیں، اور اس طرح بعض حکیموں نے تپ (بخار) کی بھی دو اقسام بیان کی ہیں، حمی عرض اور حمی مرض، یعنی اگر بخار کسی عضو یا بناوٹ کے صدمہ پہنچنے یا سوجن وغیرہ سے ہوگا تو اسے حمی عرض کہتے ہیں مثلاً ذات الریہ وغیرہ امراض میں بخار بطور عرض ہوتا ہے۔ بخلاف اس کے اگر کسی جراثیم کے عث ہوتا ہے تو اسے حمی مرض کہتے ہیں۔

جدید تحقیقات کے مطابق صحت کی حالت میں ایک جوان آدمی کی حرارت جسم کا درجہ اوسط ۹۸.۶۴ درجہ فارن ہیرٹ ہوتا ہے، اس آدمی کے جسم کی حرارت ۹۷.۶۳ درجہ سے کم یا ۹۹.۶۵ درجہ سے زیادہ ہو، تو سمجھ لیں کہ اس کی صحت ٹھیک نہیں، بلکہ وہ بیمار ہو چکا ہے۔

مذکورہ بالا مقدار حرارت کے معیار میں عمر و وقت، حالت اور موسم کے لحاظ سے کسی قدر کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ رات کے دو بجے سے صبح چھ بجے تک حرارت ایک یا دو درجہ کم ہوتی ہے اور شام کے پانچ بجے سے رات کے آٹھ بجے تک حرارت کا درجہ بڑھنے آخری درجہ تک پہنچ جاتا ہے، بچوں کی حرارت میں کمی بیشی معمولی سبب سے بھی ہو جاتی ہے مثلاً معمولی خرابی معدہ سے بھی کئی بچوں کو بخار ہو جاتا ہے، سرد ممالک اور سرد موسم اور زیادہ دماغی محنت سے بھی جسم کی حرارت کسی قدر کم ہو جاتی ہے اس کے بخلاف گرم ممالک، گرم موسم، گرم غسل اور ورزش وغیرہ سے بھی حرارت بڑھ جاتی ہے۔

جب کسی آدمی کے جسم کی حرارت ۹۶.۴ درجہ سے کم ہو جائے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ طبیعت میں شدید کمزوری آگئی ہے، جب حرارت زیادہ کم ہو کر ۹۵ درجہ تک پہنچ جائے تو اس وقت ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اس موثرہ پر اگر مریض مقوی دل ادویات نہ دی جائیں تو حرارت اور کم ہو کر مریض کمزوری کے باعث تلف ہو جاتا ہے۔

جب جسم کی حرارت درجہ صحت سے ترقی کر کے ۱۰۱ درجہ تک ہو جائے تو اسے معمولی بخار سمجھا جاتا ہے، اگر اس سے بڑھ کر ۱۰۲ یا ۱۰۳ درجہ تک ہو تو یہ تیز بخار ہوتا ہے، ۱۰۴ یا ۱۰۵ درجہ پر بہت تیز بخار خیال کیا جاتا ہے، جس کے ہمراہ دماغی فعل اور اس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر حرارت ۱۰۶ سے ۱۰۷ تک ترقی کر جائے تو مریض کی حالت خطرناک تصور کی جاتی ہے، ۱۱۰ درجہ کی حرارت پر مریض کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔

تھرمامیٹر دیکھنے کا طریقہ:۔ تھرمامیٹر کی تصویر ساتھ کے صفحہ پر دی گئی ہے، اسے غور سے دیکھیے، اس میں ۹۵ سے ۱۱۰ درجہ تک دکھایا گیا ہے اور پارہ چڑھ کر ۹۸.۶۴ درجہ پر دکھلایا گیا ہے۔ آپ ایک دو بار کی مشق سے تھرمامیٹر دیکھنے میں دو ماہر ہو سکتے ہیں۔

تھرماسٹر (مقیاس الحرارة) عام طور پر مریض کے منہ یا بغل میں لگایا جاتا ہے۔ لیکن بچوں کو کنج ران کے اندر لگانا کافی سمجھا جاتا ہے، بعض حالتوں میں گدا (مقعد) اور عورت کی اندام نہانی (بھینس) وگائے کا میٹر پھر دیکھنے کے لئے گائے بھینس کی یونی میں تھرماسٹر لگاتے ہیں) کے اندر بھی لگاتے ہیں۔ لیکن بغل میں لگانا سب سے بہتر ہے، بغل کی حرارت منہ کی حرارت سے لگ بھگ نصف درجہ کم ہوتی ہے۔

تھرماسٹر کسی وقت بھی لگایا جاسکتا ہے، لیکن عام قاعدہ کے مطابق صبح آٹھ بجے اور شام پانچ بجے لگانے کا ہے، تھرماسٹر لگاتے وقت مندرجہ ذیل باتوں پر خاص توجہ دینی ضروری ہے:-

۱۔ تھرماسٹر لگانے سے پہلے اسے دھو کر صاف کر لیں، بہتر ہے سپرٹ میٹھی لیسٹڈ میں ڈبو کر پھر پانی سے دھو کر کام میں لاویں، گرم پانی سے تھرماسٹر کے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔

۲۔ تھرماسٹر کو لگانے سے پہلے مضبوطی سے پکڑ کر پارہ والے حصے کو نیچے کر کے زور سے جھٹکیں تاکہ اس کا پارہ ۹۵ درجہ سے نیچے اتر جائے، بعض دفعہ گرمیوں میں جھٹکا دینے سے نہیں اترتا، ایسی حالت میں ٹھنڈا پانی ڈال کر جھٹکنے سے پارہ فوراً نیچے اتر جاتا ہے، جب پارہ نیچے اتر جائے تو مریض کو لگائیں۔

۳۔ اگر مریض کے منہ میں لگانا ہو تو اس کے پارہ والا سر زبان کے نیچے رکھ کر مریض کو کہیں کہ وہ آہستہ آہستہ ہونٹوں کو بند کرے، اور تھرماسٹر کی نلی منہ کے حصہ سے باہر نکلی ہے۔

۴۔ اگر بغل میں لگانا ہو تو پہلے اس جگہ کا پسینہ کپڑے سے صاف کر کے تھرماسٹر کے پارہ والا حصہ بغل کے درمیان رکھ کر مریض کو ہدایت دیں کہ وہ بازو کو بغل کے ساتھ لگائے، اگر مریض کمزور ہو تو دوسرا شخص بازو کو سہارا دے کر بغل کے ساتھ لگائے رکھے۔

۵۔ اگر گدا یا یونی میں تھرماسٹر لگانا ہو تو اس کے پارہ والے سرے کو اس مقام میں داخل کر کے باہر سے پکڑے رکھیں۔

۶۔ تھرماسٹر کو ایک منٹ تک مقام مطلوب میں رکھ کر باہر نکال کر درجہ حرارت معلوم کریں، پھر اس کو پانی سے دھو کر اس کے غلاف میں رکھ دیں۔ اگر مریض کسی متعدی بخار میں مبتلا ہے تو اس کو سپرٹ یا دوسری قاتل جراثیم ادویہ سے صاف کر کے رکھنا چاہیے۔

اب بخاروں کا بالتفصیل بیان درج کیا جا رہا ہے، لیکن بعض دفعہ بخاروں کی ظاہری علامات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، ایسی حالت میں خوردبینی انکسیرے معاینہ سے مریض کی تشخیص کرنی ضروری ہے۔ کیونکہ اس سے مرض کی ٹھیک جانچ سے علاج میں سہولیت پیدا ہو جاتی ہے۔

آنٹرک جوڑ، تپ مخرقہ، مائیفائیڈ فیور (typhoid fever)

تعریف مرض:- یہ ایک قسم کا متعدی بخار ہے، اس کا باعث ایک خاص قسم کا جراثیم یعنی *Bacillus-Typhoses* ہوتا ہے، جو مریض کے پاخانہ و پیشاب میں پایا جاتا ہے، طب یونانی کی رو سے مخرقہ صفراوی میں مادہ صفرا بدن کی تمام رگوں میں پھیل جاتا ہے۔ خاص طور پر دل یا فم معدہ کے ارد گرد و مگر میں یہ تعفن مادہ زیادہ ہوتا ہے، اور مخرقہ بلغمی، بلغمی شور سے پیدا ہوتا ہے، جس کا سبب بلغم کی مائیت کا کا سفر اتیز کے ساتھ مل جاتا ہے، بوڑھے آدمیوں کو یہ بخار بہت کم ہوتا ہے۔ اگر ان کو یہ مرض عارض ہو جائے، تو خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے۔

وجوہات:- یہ مرض عام طور پر موسم خزاں میں زیادہ پھیلتا ہے، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر میں اس کا زیادہ زور ہوتا ہے، لاہور،



بہسی، کلکتہ، دہلی، جیسے گنجان شہروں اور گندی بستیوں میں یہ بخار سب اور دق کی طرح سارا سال رہتا ہے۔ جیسا کہ ہم لکھ آئے ہیں کہ یہ متعدی مرض ہے اور ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ جاتا ہے، اس کے جرثومہ کے جسم پر روئیں ہوتے ہیں۔ اور وہ متحرک ہوتا ہے، یہ کھولنے پانی میں جلد ہلاک ہو جاتا ہے، لیکن برف میں مدت تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اس لئے اگر گندے پانی سے برف بنائی جائے تو اس برف کی موجودگی میں ان جرثیم کا امکان ہو سکتا ہے اور جو شخص اس برف کو استعمال کرتا ہے وہ تپ محرقہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ملائی کی برف جو گندے اور غلیظ لوگ برتنوں میں گلی کوچوں میں بیچتے پھرتے ہیں قابل استعمال نہیں ہوتی، اس میں بھی اس مرض کے جرثیم ہوتے ہیں۔

جو لوگ جوہڑوں اور تالابوں کا گندہ پانی پیتے ہیں، وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کچا دودھ اور کچے دودھ سے نکالا مکھن بھی اس مرض کی ایک بڑی وجہ ہے، اس لئے دودھ کو اچھی طرح سے اُبال کر استعمال کیا جائے۔

ٹائیفائیڈ ہونے کی مدت دس سے چودہ دن تک ہوتی ہے، یعنی چھوت لگنے کے دس سے چودہ دن کے اندر انسان اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر مریض کمزور ہو تو پانچویں دن بھی بخار ہو سکتا ہے، اور اگر اس میں مقابلہ کی طاقت زیادہ ہو تو مرض کی مدت ۲۱ دن بھی ہو سکتی ہے، لیکن جیسے جیسے خون میں مرض کی سمیت بڑھتی جاتی ہے۔ اس مرض کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں، مثلاً مریض سست اور کابل ہو جاتا ہے، تمام جسم مقوڑا مقوڑا درد محسوس کرتا ہے، خیالات پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی پیٹ میں درد ہوتا ہے، کبھی پتلے دست آنے لگتے ہیں، آخر مریض بخار میں مبتلا ہو کر بستر پر لیٹ جاتا ہے۔

علامات :- ٹائیفائیڈ معیادی بخار ہے، اگر اس کے دوران کوئی پیچیدگی پیدا نہ ہو جائے تو ایک مقررہ مدت کے بعد خود ہی اُتر جاتا ہے۔ بلکہ اب تو انسٹی بایاٹک ادویات کی ایجاد سے اس کا کورس بالکل مختصر ہو کر رہ گیا ہے۔ اور کئی حالتوں میں پانچویں روز ہی ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ کبھی آٹھ دس روز میں اُتر جاتا ہے۔ یونانی نقطہ نظر سے اس کی معیاد عام طور پر ۲۱ دن ہو کر رہتی ہے، کبھی ۲۲ روز تک بھی رہتا ہے، اگر کوئی پیچیدگی پیدا ہو جائے تو دو دو تین تین ماہ تک پیچھا نہیں چھوڑتا، بخار کے لمبے ہونے کی وجہ عام طور پر بد پرہیزی ہوتی ہے، جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بخار اُتر کر یا اُترنے کے قریب ہو کر پھر تیز ہو جاتا ہے۔ ایسا اکثر ملک بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ مریض پہلے حملے کی وجہ سے بہت کمزور ہوتا ہے اور دوسرے حملے کی تاب نہیں لاسکتا، لیکن اگر با احتیاط علاج کیا جائے تو مریض کے صحت یاب ہونے کا بہت امکان ہوتا ہے، علاوہ ازیں پیراٹائیفائیڈ (Paratyphoid) جو کہ اس کی ایک قسم ہے، تمام علامات محرقہ کی طرح ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جلد کنٹرول میں آ جاتا ہے اور بالکل مختصر عرصہ میں اُتر جاتا ہے، اس مرض میں عام طور پر گردن، چھاتی اور پیٹ پر خشکاش کی طرح دانے نکل آتے ہیں۔ جس کو مبارکی کہتے ہیں، اس بخار میں خاص طور پر انٹریاں مبتلائے مرض ہوتی ہیں، بخار آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے، مثلاً پہلے دن صبح کو ۹۹ ڈگری اور شام کو ۱۰۰، پھر دوسرے دن ۹۹ اور شام کو ۱۰۱، اس طرح چار یا پانچ دن میں حرارت ۱۰۳ اور ۱۰۴ درجہ تک پہنچ جاتی ہے، دوسرے ہفتہ کے آخر تک اس طرح صبح کی نسبت شام کو بخار ایک یا دو ڈیڑھ درجہ تیز ہو جاتا ہے، شروع بخار میں درد سر، نکسیر بھوٹنا، معمولی کھانسی، زبان میلی، پیٹ درد اور بعض دفعہ اسہال ہوتے ہیں، پہلے ہفتہ کے آخر میں مریض رات کو بڑا بڑا ہوتا ہے اور ہذیبانی حالت ہوتی ہے، کئی مریضوں کے جسم پر، سینہ، پشت اور پیٹ پر چھوٹے چھوٹے سرخ نشان بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔

دوسرے ہفتہ میں تمام علامات زیادہ تیز ہوتی ہیں، خون کے دست بھی آسکتے ہیں، نبض کی رفتار درجہ حرارت کی نسبت زیادہ سست ہوتی ہے، علامات کی شدت نہ ہو تو ۱۴ روز کے بعد بخار اُتر جاتا ہے۔ ورنہ تیسرے اور چوتھے ہفتہ میں آہستہ آہستہ آرام

اگر مریض تندرست ہو جاتا ہے۔

تشخیصی علامات :- بخار کا لگاتار رہنا، حرارت کا تیز ہونا، رفتار نبض میں کمی، جلد پر گلابی رنگ کے سُرخ نشان ظاہر ہونا وغیرہ خاص تشخیصی علامات ہیں۔

اس بخار کو منویہ، تپِ دق اور موسمی بخار سے تشخیص کرنا ضروری ہے، اگر دماغ یا پیچھے مٹے مبتلائے مرض ہوں، انٹریوں سے خون جاری ہو جائے، دانے اچھی طرح نہ نکلیں، کمزوری شدید ہو یا ناک منہ سے خون آئے تو یہ مرض کی خراب علامات ہیں۔
حفظِ مآلِ قدم علاج :- کوئی کچی غذا نہ کھائی جائے، دودھ اور پانی اُبال کر پئے جائیں، کھانے پینے والی چیزوں کو مکھیوں سے محفوظ رکھا جائے مکھیوں کو مارنے کے لئے ڈی، ڈی، ڈی، ڈی چھڑکا جائے، ٹی، ٹی، بی ویکسین کا حفاظتی ٹیکہ لگوا یا جائے، پہلے بمقدار آدھا سی سی اور دوسری بار سے دس دن کے بعد ایک سی سی کا انجکشن کیا جائے، اس کا اثر بنائے رکھنے کے لئے ہر ڈیڑھ سال بعد آدھا سی سی کا عضلاتی انجکشن کر لینا کافی ہے، لیکن زیاطہ شکر، سل ریوی اور حمل کے آخری دنوں میں یہ ویکسین استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

ایلوپیتھیک علاج :- اس مرض کا جدید انٹی بائیوٹک علاج کلورومائیٹین (Chloromycetin) یا سنٹھومائیٹین (Syntho-My-Setin) خاص دوا ہیں اور ان انٹی بائیوٹک ادویات نے حیرت انگیز مسیحائی اثرات دکھا کر اس مرض کی ہدیت اور وحشت کو یکسر ختم کر دیا ہے۔ اور ان کی بدولت آج یہ مرض زیادہ سہل العلاج سمجھی جانے لگی ہے۔ اچھی صحت والے مریض کے لئے دو کیپ شول ہر چھ گھنٹہ بعد ہمراہ پانی پیئے جاویں، یہاں تک کہ درجہ حرارت زائل ہو جائے، غام طور پر ۸ گھنٹہ کے اندر ہی درجہ حرارت نارمل ہو جاتا ہے، بعد میں بخار کم ہونے پر دوا میں کمی کر دی جائے اور صرف ایک کیپ شول ہر آٹھ گھنٹہ بعد چار یا پانچ دن تک دیا جائے، بچوں کے لئے کلورومائیٹین یا سنٹھومائیٹین پالمی ٹیٹ کا استعمال کرایا جائے، ایک چائے کا چمچ دن بھر میں تین بار کافی ہے، یہ دوا ٹائیفائیڈ، پیراٹائیفائیڈ اور محرقہ ہذیانی کے لئے مفید ہے، بعض دفعہ بخار اترتے ہی درجہ حرارت ایک دم ۹۵ ڈگری تک کم ہو جاتا ہے، ایسی حالت میں کورائین کا ایک سی سی کا عضلاتی ٹیکہ کیا جائے یا خوردنی کورائین کے دس قطرے ہر تین گھنٹہ بعد پانی میں ملا کر پلائیں یہ دوا دل کی کمزوری اور سانس کی تنگی دور کرتی ہے اور درجہ حرارت کو بڑھا کر درست کر دیتی ہے۔

بخار کم کرنے کے لئے فارما کو پیاسپتال ہائے سرکاری جدید کا یہ نسخہ ڈایا فورٹیک مسچر نہایت مفید ہے :-
ڈایا فورٹیک مسچر (بخار ہلکا کرنے کے لئے) :- سوڈا سیلیٹ ۲۰ گرین، سوڈا بائیکارب ۲۰ گرین، ایکسٹریکٹ گلابی سرزہ ۱۵۰ گرام، اکوالیٹر ایک اونس، کمزور مریضوں کو اس نسخہ کی دو خوراکیں بنا کر دیں یا یہ نسخہ دیں :-
الکلائن ڈایورٹیک مسچر :- پوٹاشیم سائٹریٹ ۲۰ گرین، پنچر ہا یوسم ۳۰ گرام، وائٹل بڈ ایک اونس، بخار کو ہلکا کرنے کے علاوہ عمدہ پیشاب آور ہے، کمزور مریضوں کو نصف مقدار میں دیں بے خوابی کے لئے اسی فارما کو پیاسی یہ مسچر دیں :-
پیرالڈی ہائیڈرکس مسچر :- پیرالڈی ہائیڈ ایک ڈرام، شربت آرنج ایک ڈرام، اکوالیٹر دو اونس، کمزور مریضوں کو نصف مقدار میں دیں، دستوں کے لئے اس فارما کو پیاسی یہ مسچر دیں :-

بسمتھ و چاک مسچر :- بدھنی و دستوں کے لئے مفید ہے، بسمتھ کارب ۲۰ گرین، کیلشیم کارب ۲۰ گرین، گم ٹرا کا کفنتھ دو گرین، کلوروفارم وائٹ ایک اونس، اگر ضرورت ہو تو ۳ قطرے پنچر کیٹی کو یا پنچر اوپیم ۵ قطرے شامل کر سکتے ہیں۔ کمزور مریضوں کو نصف مقدار میں دیں۔

اس بخار میں آریو مائی سین بھی اکثر حالتوں میں ڈرامائی نتائج پیدا کرتی ہے، خصوصاً بچوں کے معیادی بخار میں بے حد مفید ہے۔

علاوہ ازیں نمونیہ وکالی کھانسی کے لئے مفید ہے۔

علاوہ ازیں مینی سلین یا پروکین مینی سلین اور سلفاگر وپ کا استعمال بھی مفید ہے، ٹیرامائی سین بھی اکثر حالتوں میں مفید ثابت ہوتی ہے بخار کی شدت کو کم کرنے کے لئے اسفنج آبی کا استعمال کیا جائے، یعنی سرد پانی کا پندرہ یا بیس منٹ تک اسفنج کرنا مفید ہے، اسہال کے لئے کیسٹرائیل، میلشن کا استعمال بھی مفید ہے۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ کلورومائی ٹین (Chloromycetin) پارک ڈیوس کا ایک یا دو کیپ شول ہر چار گھنٹے بعد بچوں کے لئے کلورومائی ٹین پالمی ٹریٹ (Chloromycetin Palmitate) یہ شربت کی حالت میں ملتا ہے، ایک یا دو چمچے ہر چار یا چھ گھنٹے بعد دیں، بخار کم ہو جانے پر مقدار خوراک کم کر دی جائے، دوران علاج آنتوں کو کبھی کبھی انیما سے صاف کر لینا چاہیئے۔

۲۔ رینی فینی کول (Ranphenicol) رن بکیسی، ایک یا دو کیپ شول ہر چار یا چھ گھنٹے بعد بچوں کو رینی فینی کول پالمی ٹریٹ (Ranphe nicol Palmitate) دیا جاسکتا ہے۔

۳۔ کلورومیکس، ساختہ ڈیو میکس - ایک یا دو کیپ شول ہر چار یا چھ گھنٹے بعد دیں۔

۴۔ سنٹھومائی ٹین (Synthomycetin) ساختہ لیٹیٹ - ایک یا دو کیپ شول ہر چار یا چھ گھنٹے بعد دیں۔

۵۔ انٹر وائی ٹین (Enteromycetin) ساختہ ڈیز - ایک یا دو کیپ شول ہر چار یا چھ گھنٹے بعد دیں۔ بچوں کے لئے انٹر وائی ٹین پالمی ٹریٹ (Enteromycetin Palmitate oral) ملتا ہے۔

۶۔ کلورم فائی سین (Chloramphycin) ساختہ بوہرنگر کمپنی - ایک یا دو ٹکیہ ہر چار یا چھ گھنٹے بعد بچوں کے لئے اس کا شربت ملتا ہے۔ اس لئے بچوں کو اس کا سیرپ استعمال کرایا جائے۔

۷۔ ری کلور (Rechlor) ساختہ سارا بھائی - یہ کلورومائی ٹین کا عمدہ بدل ہے، ٹائی فائیڈ کے بہت سے حالات میں بڑی موثر ہے۔ خصوصاً آنتوں کے بخار کو دور کرتی ہے، طریقہ استعمال کلورومائی ٹین کی طرح ہے۔

۸۔ امبے ٹین (Embacetin) مے اینڈ بیکر، کلورومائی ٹین کی طرح استعمال کریں۔ جب کلورومائی ٹین کے مرکبات فائدہ نہ کریں، تو

ایمپی سلین (Ampicillin) کا استعمال کریں، ۲۵۰ ایم جی طاقت کی آتی ہے، اس سلسلہ میں سنٹھوسیلین (Synthocillin) پنی سی آئی

یا روسیلین (Rosicillin) رن بکیسی یا ایسکے سلین (Eskycillin) ایس کے ایف یا البرسلین (Albercillin) ہکیٹ یا کمپی سلین

(Campicillin) کیڈلا، ایک دو کیپ شول عمر کے مطابق دیں۔ وٹامن بی کپلیکس کا استعمال بھی ساتھ جاری رکھیں۔ ایمپی سلین کے ٹیکے بھی

آتے ہیں و بچوں کے لئے شربت و ڈرائس بھی اوپر لکھے ناموں سے ملتے ہیں۔ مرض کی شدید حالت میں ۵۰۰ ایم جی طاقت کے کیپ شولز

بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔ مرض کی تیز حالت میں نئی انٹی بائیوٹک دوا ڈیوروکسلین (Duroxiline) پنی سی آئی یا وائیو سائی کلین

(Vivocycline) آئی ڈی پنی ایل کا استعمال کریں۔

نوٹ :- ۱۔ مندرجہ بالا ادویات میں سے کوئی بھی دوا استعمال کرائیں، اس کے ساتھ وٹامن بی کپلیکس کا استعمال لازمی ہے تاکہ

کوئی برا اثر پیدا نہ ہو۔

۲۔ الٹی میں لارگیٹل (Largactil) ساختہ ایم بی - ایک ٹکیہ ضرورت کے مطابق پانی سے دیں۔ یہ دوا دن میں دو یا تین بار دے

سکتے ہیں۔ جب تک الٹی بند نہ ہو جائے کوئی غذا انہیں دینی چاہیئے۔ اگر الٹی نہ رکے تو پھر کلورومائی ٹین انٹر اسکولر ایڈوائس

کی صورت میں آتی ہے) کا عضلاتی انجکشن دینا چاہیئے۔

یونانی علاج :- موز منقہ دانہ، عذاب پانچ دانہ، انجیر زرد دودانہ، خاکسی سات ماشہ، رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو جوش دے کر مل چھان کر دو تولہ چینی (کھانڈ) ملا کر پلا دیا کریں، گھبرہٹ و بے چینی میں عرق گاؤ زبان پلائیں، دست آنے لگیں تو حب آلاس سات ماشہ، سماق چھ ماشہ پوست خنشاں چار ماشہ جوش دے کر پلائیں، جلاب بالکل نہ دیں، جب دانے نکل آئیں تو خمیرہ مروارید دیں۔

دوائے تپ محرقہ :- منقہ پانچ عدد، انجیر ولایتی دو عدد، خوب کلاں چھ ماشہ، عذاب سات دانے، پرسیا و شاں تین ماشہ، گاؤ زبان چار ماشہ، پانی ایک سیر، تمام چیزوں کو پانی میں جوش دیں، آدھا رہنے پر اتار لیں، خوب مل چھان کر صاف کر کے اس کو دن میں تین بار مہری ملا کر پلائیں۔
آیور ویدک علاج :- دشمل آدی کواٹھ، سنپات جور (تپ محرقہ) کے لئے نہایت مفید ہے، اس سے ہر نہر خلطیں اعتدال پر آجاتی ہیں۔ علاوہ ازیں گڑچی آدی کواٹھ جس کا نسخہ درج ذیل ہے، مفید ہے :-

گڑچی آدی کواٹھ :- گلوبنز، صندل، سرخ، پدماکھ، سونٹھ، اندر جو، برگ بانسہ، پوست ہرڑ، گودہ المٹاس، خس، پاڈھا، دھنیا، ناگرموتھا، بکلی۔ جملہ ادویات حسب طاقت مریض دو سے چار تولہ جوشاندہ تیار کریں، اور اس میں سفوف فلفل دراز دوتا چار رتی ملا کر مریض کو پلانے سے سنپات جور خصوصاً جس میں قبض، بے ہوشی، غنودگی، کاہلی، سستی، غلبہ کف، پت بلغم و صفرا ہو، جملہ عوارض اس سے رفع ہو جاتے ہیں۔ ایسے بخار میں بہت فائدہ کرتا ہے۔

تریوشن آدی کواٹھ :- ترکٹا (فلفل دراز، مریح سیاہ، سونٹھ، ان کو ترکٹا کہتے ہیں)، شال پرنی، پرسٹ پرنی، پاڈھل، ارنی، شوناک، پوست یخ بیل، گوکھرو، کنہاری، کنڈیاری خورد، کنڈیاری کلاں، بھارنگی، گلوبنز، جملہ ادویات دو سے چار تولہ جو کو ب کر کے جوشاندہ تیار کریں۔

اس کے استعمال سے ہر قسم کا تپ محرقہ رفع ہو جاتا ہے، خصوصاً غلبہ سودا میں یہ جوشاندہ بہت فائدہ کرتا ہے۔
مرتبجہ رس (رسیندر سار) :- شڈھ میٹھا تیلیہ، مریح کالی، پپی، گندھک شڈھ، سہاگہ ہر ایک ایک تولہ، شنگرف شڈھ دو تولہ، سب کو پانی کے ساتھ چار روز تک خوب کھل کر کے دانہ مونگ کے برابر گولیاں بنائیں اور ایک سے دو گولی ہمراہ شہد یا پانی یا عرق گاؤ زبان دیں۔

فوائد :- یہ ہر قسم کے بخار میں مفید ہے، چڑھے ہوئے بخار کو کم کرتا ہے، پسینہ آدر ہے، اترے ہوئے بخار میں دینے سے بخار کو روکتا ہے، یہ رس سب بخاروں کے لئے تریاق سے کم نہیں ہے۔

جب تپ محرقہ کے مریض کا ٹیپر بچ کر ہونے لگے یا دل ڈوبنے لگے تو کستوری بھیرورس برہت (بھیشج رتنا دلی) ایک گولی ہمراہ شہد یا دودھ دیں۔

آیور ویدک کلورومائیٹین :- موتی بھسم (بغیر آگ) ایک ماشہ، کستوری خالص دو ماشہ، کیسر اصلی تین ماشہ، جائفل چار ماشہ، جاوتری پانچ ماشہ، لونگ چھ ماشہ، رس برگ تلخی تازہ سات ماشہ، ابرک سیاہ بھسم آٹھ ماشہ۔

ترکیب تیاری :- کیسر کو ادک کر رس میں کھل کر کے پھر تلخی کے پتوں کے رس میں اس قدر کھل کریں کہ باریک ہو جائے پھر باقی ادویات کا سفوف ملا کر ادک کر رس کے ساتھ چار دن کھل کر کے سایہ میں خشک کر لیں۔ ایک رتی یہ دوا کیپ شول میں ڈال دیں اور ایک سے دو کیپ شول تک دن میں تین بار یا چار گھنٹے کے وقفہ سے پانی سے دیں۔ یہ کیپ شولز معیادی بخار کے لئے مفید ہیں۔ اگر شروع سے استعمال کرایا جائے تو معیادی بخار کے دانے وقت پر نکل کر ڈھل جاتے ہیں، بخار وقت پر اتر جاتا ہے، کلورومائیٹین میں جو نقائص ہیں وہ اس میں نہیں ہیں۔ موتی بھسم بغیر آگ کا طریقہ یہ ہے کہ اصلی موتیوں کو کسی

بجٹہ کھل میں روح گلاب یا عرق گلاب کی مدد سے تین دن کھل کریں اور خشک کر لیں، بغیر آگ کے موتی بھسم تیار ہے۔
 ہو میوینٹیک علاج :- ڈاکٹر "نیش" اپنی کتاب "ٹائیفائڈ" میں لکھتے ہیں کہ برائی ادویا، رسٹاکس، جیلیسی میم اور بیپ ٹیشیا کو اگر اس
 مرض میں بروقت استعمال میں لایا جائے تو مریض میں کسی قسم کا "کاپیلی کیشن" کے پیدا ہونے کا امکان ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور بخار اکیس روز
 سے پہلے ہی اتر جاتا ہے۔ ڈاکٹر "نیش" پہلے ہفتہ میں ان چاروں دواؤں کو حسب علامات دیا کرتے تھے۔
 مریض کو جب دست آئیں تو برائی ادویا مفید نہیں ہو سکتی، رسٹاکس اور برائی ادویا میں فرق یہ ہے کہ رسٹاکس عموماً اسہال میں کام آتی
 ہے اور برائی ادویا قبض میں، خوراک ۳۰ یا ۳۵ ہر ایک یا دو گھنٹے بعد دیں۔

جب پہلے ہفتہ میں علامات خطرناک صورت اختیار کر جائیں اور خون میں عفونت پیدا ہو جائے تو اس دوا کا استعمال معجزہ نما اثر دکھاتا
 ہے۔ ڈاکٹر "نیش" کہتے ہیں کہ مریضوں کے پھپھوں اور اعصاب کے اندر انتہائی کمزوری پائی جائے، عضلات قابو سے باہر ہو جائیں، کمزوری
 ہو، عضلات کانپیں جیلیسی میم کو بیپ ٹیشیا سے پہلے دینا چاہیے۔ ڈاکٹر جوہن ہمیشہ بیپ ٹیشیا کے مقابلہ میں جیلیسی میم کو ترجیح دیا کرتے
 تھے۔ آپ ہمیشہ ۶۰ استعمال کرنے کی سفارش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نیش کا قول ہے کہ بیپ ٹیشیا اس وقت منظر ہوتی ہے جب تمام جسم دکھتا
 اور جیلیسی میم جب مریض کو تھکاوٹ ہو، خوراک ۳۰ یا ۳۵ ہر گھنٹے بعد دیں۔ بیپ ٹیشیا تپ محرقہ اسہالی کے لئے مفید ہے۔ اس لئے
 بیپ ٹیشیا کو تمام دواؤں کا سرتاج کہا جاتا ہے، علاوہ ازیں آرسنیکم البم کا استعمال بھی مفید ہے۔

ہدایات :- تپ محرقہ کے مریض کا کمرہ ایسا ہو، جس میں ہوا اور روشنی کا خاطر خواہ انتظام ہو، کمرے سے فالتو سامان ہٹا دیا جائے
 بہتر ہے، مریض کا بستر اور کپڑے وغیرہ روزانہ بدلنے چاہئیں، مریض کے کمرے میں چرخ و پیکار بالکل نہ ہو، بلکہ سکون و خاموشی رہنی
 چاہئے، مریض کو جس کروٹ لیٹنے میں آرام ملتا ہو لیٹے رہنا چاہئے، ارد گرد کسی قسم کا کوڑا کرکٹ یا گندگی وغیرہ موجود نہ ہو، صفائی
 خاص دھیان رکھا جائے۔

غذا و پرہیز :- بخار میں چونکہ رطوبات کم ہو جاتی ہیں اور پانی کی خواہش مریض کو زیادہ ہوتی ہے، اس لئے مریض کو سرد پانی جو شس دیا
 دیں یا عرق گاؤ زبان دیں، دودھ بہترین غذا ہے، گرم کیا ہوا سرد کر کے دیں، اگر نفخ ہو جائے تو اس میں سوڈا و اٹر ملا کر دیں۔
 پتلا آش جو، مونگ کی دال وغیرہ دیں، بخار دور ہونے کے بعد زود صہنم غذا آہستہ آہستہ دیں، سخت غذا سے پرہیز کریں۔

وشم جوڑ، موسمی بخار، ملیریا (Malaria)

تعریف مرض :- جدید تحقیقات کے مطابق اس مرض کا باعث ایک خاص قسم کے جراثیم ہیں، جو انسانی خون میں داخل ہو کر
 بیماری کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اس زہریلے جراثیم کو انسانی خون میں شامل کرنے کا ذریعہ ایک خاص قسم کا مچھر ہے۔
 اگر ایسے مریض کے خون کا ایک قطرہ لے کر اس کو خوردبین کے نیچے ایک خاص طریقہ سے دیکھا جائے تو خون کے سرخ دانوں کے اندر
 یاہ رنگ کے چھوٹے چھوٹے خال نظر آتے ہیں، جن کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، بعض ہلالی اور بعض دانہ دار صورت کے ہوتے ہیں، اور
 دراصل ملیریا کے جراثیم ہوتے ہیں، یہ مختلف حالات میں خون کے ساتھ مختلف تعلقات رکھتے ہیں، چنانچہ بخار کی نوبت کے وقت یہ
 کے دانوں کے عین درمیان میں موجود ہوتے ہیں اور وقفہ کی حالت میں یہ خون سے باہر ہوتے ہیں۔

وجوہات :- زہر ملیریا کو قبول کرنے کی استعداد کو زیادہ کرنے والے مقامات گرم و نشیبی ہیں۔ سرد ممالک و اونچے پہاڑوں پر

اس کا اثر کم ہوتا ہے، کیونکہ ایسے مقامات پر جراثیم ملیریا جلد تباہ ہو جاتے ہیں، مرطوب زمین اور جس جگہ گندہ پانی جمع ہو، ملیریا کی ترقی خاص سبب ہیں، موسم برسات میں ملیریائی جراثیم پھیلنے کا بہترین وقت ہے۔

اطباء قدیم نے ملیریائی بخاروں کی چار اقسام چار خطوں کی مناسبت سے بیان کی ہیں۔ دمی ملیریا، صفراوی ملیریا، بلغمی ملیریا اور سوداوی ملیریا۔ لیکن ڈاکٹروں نے ملیریائی بخار کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک نوبتی، دوسرے لازمی بخار۔ پھر نوبتی کی کئی قسمیں ہیں اول روزانہ بخار، جس کا دورہ ہر روز ہوتا ہے، اور ایک باری سے، دوسری باری تک ۲۴ گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، دوم تجارتی بخار جسے غب دائرہ کہتے ہیں، اس کا دورہ تیسرے روز ہوتا ہے۔ اس بخار میں ایک باری سے دوسری باری تک ۴۸ گھنٹے کا وقفہ ہے۔ سوم چوتھیا جسے ربع دائرہ کہتے ہیں، اس کا دورہ چوتھے روز ہوتا ہے اور ایک باری سے دوسری باری تک ۷۲ گھنٹے کا دورہ ہوتا ہے۔ لازمی بخار کو غب لازمہ کہتے ہیں۔ یہ برابر چڑھتا رہتا ہے اور اس میں وقفہ نہیں ہوتا۔

علامات :- اس بخار میں بخار چڑھنے سے پہلے مریض سست ہو جاتا ہے۔ انگڑائیاں اور جمائیاں آتی ہیں، سانس جلد جلد چلتا ہے، متلاتا ہے اور کبھی تھکے آتی ہے، پیشاب کی رنگت ہلکی زرد یا سفید ہو جاتی ہے۔ پیشاب بار بار آتا ہے۔ تمام بدن میں درد ہے، زبان پیلی اور خشک رہتی ہے، سرد در در رہتا اور نبض سریع اور متلی ہوتی ہے۔ اس بخار میں دورہ کے وقت مریض کو کمر اور بے چینی بڑھ جاتی ہے اور شدت مرض میں ہدیان ہونے لگتا ہے۔ یہ حالت چار پانچ گھنٹے رہتی ہے، اس کے بعد پیشانی پر آجاتا ہے اور بخار کی تیزی کم ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں مریض سید کمزور ہو جاتا ہے، یہ جڑے سے بھی اور باری سے بھی آتا ہے۔ دورہ کی مدت چار سے آٹھ گھنٹے، ڈاکٹری علاج :- ملیریائی بخاروں کے لئے کونین ثانی علاج ہے۔ اس لئے بطور حفظ مالتقدم تندرست آدمیوں کو استمنا چاہیئے، چنانچہ ہر ہفتہ میں دو یا تین روز اس کا استعمال ملیریا سے محفوظ رکھنے کا موجب ہے۔ اگر کسی جگہ مجھروں کے انڈے ہنسنے ہو تو پانی کی ہر سو مربع فٹ سطح پر ایک تولہ مٹی کا تیل چھڑک دیں۔ اس سے پھر کے انڈے ہلاک ہو جائیں گے، چونکہ مجھرا کثر بڑے کے کناروں کے قریب انڈے دیتے ہیں۔ اس لئے کناروں کے قریب مٹی کا تیل چھڑکنا کافی ہو سکتا ہے۔

کونین عام طور پر بڑے آدمی کو ۲۴ گھنٹے میں ۳۰ گرین (۱۵ ارتی) تک دینی چاہیئے اور بچے پانچ گرین کی مقدار میں تین بار کیا جاتا ہے۔ یہ گولی، کیپ شول یا کمپچر کی صورت میں دی جاسکتی ہے۔ لیکن نہار منہ استعمال نہ کرنا چاہیئے۔ کونین کا انجکشن یا دس گرین کی مقدار میں خاص ضرورت کی صورت میں گہرا عضلاتی دینا چاہیئے۔ آرام آنے کی صورت میں کونین کی مقدار کم کر دینی آج کل کونین کی جگہ ایٹے برین (Atebrin) یا کاماکوئین (Coma Quine) یا نواکوئین (Niva Quine) یا پالوڈر (Resochin) اور دوسری جدید سپیڈٹ ادویات زیادہ استعمال کی جاتی ہیں۔

بطور حفظ مالتقدم پالوڈرین ایک گولی ہفتہ میں ایک بار استعمال کرنا مفید ہے، ایٹے برین یا میپا کرین یا کوئنا کرین کی ٹیبلٹ میں ایک ایک گولی دن میں تین بار دی جانی چاہئیں، اس سے بخار اتر جاتا ہے، اور چار پانچ روز کے بعد اس کی مقدار کم کر دینی پالوڈرین ایک گولی روزانہ دی جائے، نواکوئین یا ریشوچین تین گولی ایک دم استعمال کرانی مفید ہیں، حاملہ عورتوں کو چونکہ کونین نہیں ہوتی۔ اس لئے انہیں پالوڈرین یا کاماکوئین ساختہ پارک ڈیوس کمپنی دی جانی چاہیئے۔ ان میں سے کچھ دوائیں مبنی بند ہیں۔ اس لئے دے دی ہیں کہ شاید پھر مارکیٹ میں آجائیں۔

جدید سپیڈٹ ادویات میں مندرجہ ذیل ادویات اس مرض کا موثر علاج ہیں :-
ایسوفل (Esanofele) :- اس میں کونین سلفیٹ، آرسنک، آرن اور سٹرکنین شامل ہیں۔ یہ دوا ملیریائی بخار

بہت مفید ہے، ایک سے دو گولی بعد از غذا دیں۔

قینار سول (Qinarsol) :- کونین اور سنکھیا کا مرکب ہے۔ جب مرض پرانا ہو تو اس کا استعمال مفید ہے۔ ایک امپول کا عضلاتی انجکشن کریں یا اس کا خوردنی استعمال کیا جائے۔

ہیموجن (Hemogen) :- یہ سرخ خون بڑھانے والا شربت ہو گلوبین اور فولاد سے مرکب ہے، میریائی بخاروں کے بعد کی کمزوری بھس، یرقان کے لئے از حد مفید ہے، یہی دو امیو گلوبین، ہوفیزین وغیرہ ناموں سے بھی مارکیٹ میں ملتی ہے، میریا کے بعد کی کمزوری کے لئے ایٹن سیرپ اور فیلوز سیرپ کا استعمال بھی مفید ہے۔

یوکونین (Euquinine) :- ایک سے چار گرین تک چھوٹے بچوں کے میریائی بخاروں کے لئے از حد مفید ہے۔
کونین مکسچر برائے میریا :- کونین سلفیٹ دس گرین، ڈائیلوٹ سلفیورک ایڈ دس منم، میگنیشیا سلفاس ۳۰ گرین، کلوروفارم واٹر بقدر ایک اونس، کمزور مریضوں کو اس کی دو خوراکیں بنا کر دیں۔ فارماکو پیا ہسپتال ہائے سرکاری جدید (مشرقی پنجاب) کا نسخہ ہے۔
آئرن اینڈ کونین مکسچر :- کونین سلفاس پانچ گرین، فرانی سلفاس پانچ گرین، ڈائیلوٹ سلفیورک ایڈ پانچ منم، میگنیشیا سلفاس ۳۰ گرین، ایکوا بقدر ایک اونس، فارماکو پیا ہائے سرکاری جدید (مشرقی پنجاب) کا نسخہ ہے، جو میریا، کمزوری جگر اور ورم طحال کیلئے مفید ہے۔

کونین مکسچر برائے میریا :- کونین سلفاس دس گرین، ڈائیلوٹ سلفیورک ایڈ دس منم، صاف پانی ایک اونس، کمزور مریضوں کو نصف مقدار دیں، اسے نہار منہ استعمال نہ کیا جائے، دن میں تین بار دیں، فارماکو پیا ہسپتال ہائے سرکاری قدیم (مشرقی پنجاب) کا نسخہ ہے۔
بخار ہلکا کرنے کے لئے مکسچر :- سپرٹ ایٹھ گرام، لائیکر امیونیا ایسی ٹاس دو ڈرام، پوٹاسی ایسی ٹاس ۲۰ منم، لائیکر امیونیا ایسی ٹاس دو ڈرام، پوٹاسی ایسی ٹاس ۲۰ گرین، صاف پانی دو اونس، خوراک آدھ سے ایک اونس ہر چار گھنٹہ بعد دیں، بخار کم ہونے پر بند کر دیں، فارماکو پیا ہسپتال ہائے سرکاری قدیم کا مجرب نسخہ ہے۔

دیگر :- سوڈا سلی سلاس دس گرین، لائیکر امیونیا ایسی ٹاس دو ڈرام، پوٹاسی ایسی ٹاس دس گرین، صاف پانی ایک اونس۔
کمزور مریضوں کو نصف خوراک دیں۔ دن میں دو بار استعمال کراویں۔ یہ فارماکو پیا ہسپتال ہائے سرکاری قدیم کا نسخہ ہے، جب بخار کے ساتھ بھٹوں میں سخت درد ہو تو یہ نسخہ مجرب ہے۔

نوٹ :- ۱۔ کونین کی خشکی کو دور کرنے کے لئے اس کے ہمراہ دودھ کا استعمال ضروری ہے یا دوران استعمال، نگرے، لیموں، آلو بخارا وغیرہ کا استعمال کریں۔ یہ پھل کونین کی اصلاح کے علاوہ بخار کے لئے بھی مفید ہیں۔

۲۔ چڑھے ہوئے زور کے بخار میں کونین کا استعمال نہ کریں۔

۳۔ کونین کے استعمال سے پہلے کوئی ملین دوا ضرور کھلائیں۔ تاکہ پیٹ صاف ہو جائے۔ ورنہ کونین کا اثر خاطر خواہ نہ ہوگا۔

۴۔ ضرورت سے زیادہ بے احتیاطی سے کونین استعمال کرنے سے بعض اوقات ہڈیاں ہو کر مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، کبھی دل کے بہت کمزور ہونے کی وجہ سے سانس بند ہو کر مریض رہی ملک عدم ہو جاتا ہے۔ اس لئے اسے با احتیاط استعمال کیا جائے۔

۵۔ کونین کو ہمیشہ کچھ کھانے کے بعد استعمال کرانا چاہیئے، نہار منہ استعمال مضر ہوتا ہے۔

۶۔ بخار دور ہونے کے بعد بھی چند روز کونین کا استعمال جاری رکھیں، تاکہ جراثیم میریا بالکل ختم ہو جائیں، اور پھر بخار کے واپس آنے کا خطرہ نہ ہے۔

۷۔ بعض مزاجوں میں کونین ناموافق ہوتی ہے، خصوصاً نازک مزاج امیر شہری عورتیں اس کو برداشت نہیں کر سکتیں، کونین کے کھانے سے کانوں میں سنسناہٹ، ہاتھ پاؤں کا پینا، دل دھڑکنا، بے خوابی، بے چینی کی علامات پیدا ہو جائیں، تو کونین کا استعمال فوراً بند کر دینا چاہیے اور اس کی بجائے دیگر ادویہ کو کام میں لانا چاہیے۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ کونین سلفیٹ (Quini nesulphate) پانچ گرین کی ٹکیہ روزانہ دن میں تین بار ہمراہ دودھ نیم گرم استعمال کرائیں۔

۲۔ نواکوین (Nivaquine) ساختہ ایم بی۔ ایک گولی ہمراہ پانی دن میں تین بار دیں۔ بچوں کیلئے نواکوین سیرپ دیں۔

۳۔ ڈراپریم (Daraprim) ایک گولی صبح و ایک گولی شام ہمراہ تازہ پانی دیں، خاص حالت میں چار گولی تک دے سکتے ہیں۔
۴۔ پیلوڈرین (Paludrine) آئی، سی، آئی۔ کی ٹکیہ دن میں ایک یا دو بار تازہ پانی سے دیں۔ بعض دفعہ اس سے اٹلیاں آنے لگتی ہیں۔ اس لئے اس کو احتیاط سے استعمال کریں۔

۵۔ میپاکرین (Mepcrine)۔ یہ تین ٹکیاں ہر روز پانی یا دودھ سے دیں۔ اس سے کبھی کبھی آنکھیں اور جسم پیلا پڑ جاتا ہے۔ ایسی علامات ظاہر ہونے پر اسے فوراً بند کر دیں۔

۶۔ ایٹے برین (Atebrin) :- ایک ٹکیہ ہمراہ نیم گرم دودھ دن میں تین بار دیں۔

۷۔ کلوروکوئین (Chloroquine) :- ایک سے دو گولی نیم گرم دودھ سے دیں۔ بچوں کیلئے کلوروکوئین سیرپ دیں۔

۸۔ کیمو کوئین (Camoquine) ساختہ پارک ڈیوس۔ ایک ایک ٹکیہ دن میں دو تین بار ہمراہ نیم گرم دودھ یا پانی سے دیں۔
مندرجہ بالا ادویات میں ڈراپریم موسمی بخار کے بچاؤ کے لئے استعمال کرائی جاتی ہے۔ بخار اُتارنے کے لئے اتنی مفید نہیں ہے یہی حال پیلوڈرین کا ہے، بچوں کا بخار اُتارنے کے لئے بے ذائقہ کونین ملتی ہے جسے یو کونین کہتے ہیں۔ یہ طاقت میں اصل کونین سے ذرا کم ہوتی ہے۔ اس لئے اس کا استعمال صرف دودھ پیتے بچوں کے لئے مناسب ہے۔ بخار کے بعد خون کی کمی دور کرنے کے لئے فولاد کا استعمال اچھا رہتا ہے، اس مقصد کے لئے ایسٹنر سیرپ مفید ہے، بعض اوقات مریض بے ہوش ہوتا ہے یا قے بار بار آتی ہے، ایسی حالت میں کونین کا عضلاتی انجکشن سرین کے عضلات میں بڑی احتیاط سے کافی گہرا اور صاف ستھری اُبلی ہوئی پچکاری سے لگانا چاہیے، کیونکہ کونین کے ٹیکے سے اکثر پھوڑے بنتے دیکھے گئے ہیں۔ جو کافی عرصہ بعد ٹھیک ہوتے ہیں۔ اس لئے کونین کا انجکشن احتیاط سے لگایا جائے، بعض اوقات بار میریا کے دوروں سے تلی بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایسی حالت میں تلی کو گھٹانے کے لئے نسخہ جات استعمال کرائے جائیں۔

یونانی علاج :- مندرجہ ذیل ادویات طب یونانی میں میریائی بخاروں کے لئے مخصوص ہیں۔ جن کے فوائد کو طب جدید نے بھی تسلیم کیا ہے۔

معزز کرنجوہ :- یہ طب قدیم میں کثیر استعمال ہے باری کے بخار میں یہ دوا بہت مفید پائی گئی ہے۔ اس کو مرچ سیاہ کے ساتھ ملا کر دیں
خوراک ۵ گرین (پُرے رتی) سے ۳۰ گرین (پندرہ رتی) تک۔

اتیس :- خاص کر باری کے بخاروں کے لئے زیادہ استعمال ہوتا ہے اور عام طور پر کونین کے مقابلہ کا فائدہ حاصل ہوتا ہے خوراک پانچ گرین سے دس گرین تک دن میں دو سے تین بار دیں۔

چرا بیت :- یہ جاڑے کے بخار باری کے بخار اور میادی بخاروں میں بھی مفید ہے۔ ترکیب یہ ہے :-

ایک اونس چرا بیت کو موٹا موٹا کوٹ کر گرم پانی دو اونس میں چھ گھنٹہ بھگو رکھیں، پھر چھان لیں، خوراک دو سے تین اونس تک دن میں

بار۔ اگر اس میں ایک ڈرام پسپی ہوئی لونگ یا دار چینی ملا دیں تو اس کا ذائقہ واثر بڑھ جاتا ہے۔

گلو :- نہایت مقوی دوا ہے۔ باری کے بخاروں میں اس کے استعمال سے بڑا فائدہ دیکھا گیا ہے۔ اس کی ایک اونس کی کچلی ہوئی شاخوں کو دس اونس سرد پانی میں بھگو کر چھان لیں۔ اس کی خوراک ڈیڑھ سے تین اونس تک دن میں دو سے تین بار دیں۔ طیریائی بخاروں کے لئے نہایت موثر علاج ہے۔

کشتہ سنکھیا :- طیریائی بخاروں میں سنکھیا سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ مانع مرض اور شافی مرض دونوں فوائد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کا فائدہ کونین سے کم ہے۔ مگر بعض پرانے طیریائی امراض میں جب کونین موافق نہ ہو، سنکھیا سے بہت فائدہ ہوتا ہے، بقدر مزاج مناسب مقدار میں استعمال کر کے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

کشتہ ابرک :- ابرک سفید ہو یا سیاہ، اس کا کشتہ اقسام بخار کے لئے طب قدیم میں کثیر استعمال ہے۔ بلکہ بل و دق میں بھی مفید ہے، خوراک ایک سے دو رتی تک۔

کشتہ گنودنتی :- یہ بالکل سہل الحصول اور بے ضرر دوائی ہے، بنگالی کمیٹوں نے طیریائی بخاروں کے متعلق اس کی تصدیق کی ہے۔ بعض کارخانہ دار اے میٹھی کونین کے نام سے فروخت کر رہے ہیں اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، خوراک دو رتی تک۔

پھٹکڑی کی کھیل :- سیاہ مرج کے ساتھ اس کا سفوف طیریائی بخاروں میں بکثرت مستعمل ہے، چھوٹے طبیب جو کونین کے استعمال سے ناواقف ہیں، اس کو اپنے مطب میں نہایت فخر کے ساتھ دیتے ہیں، مرکب سفوف کی مقدار آدھے سے ایک ماشہ تک ہے، بعض اوقات ہیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے۔

نیم کی چھال :- باری کے بخاروں میں ایک بیش قیمت دوا ہے۔ جب بخار لرزہ کا حملہ ہونے والا ہو، اسے پہلے دو دو گھنٹہ کے وقفہ سے اس کا جو شانہ پلانا مناسب ہے، طریقہ مندرجہ ذیل ہے :-

نیم کی چھال کا اندرونی حصہ دو اونس کوٹ کر تیس اونس پانی میں آدھا گھنٹہ تک ہوش دیں۔ جب سرد ہو تو دو اونس یا تین اونس پلائیں۔ دوائے طیریائی :- رت گلو، کونین ہر ایک ایک تولہ، گوند کیکر، طباشیر ہر ایک دو تولہ، سب کو پس کر مونگ کے برابر گولیاں بنالیں، ایک رلی صبح دایک شام ہمراہ دودھ دیں، اگر نوبت سے پہلے دیں تو بخار نہیں ہوگا۔

دیگر :- چھلکا جڑ آک (سایہ میں خشک کردہ) ایک تولہ، مرج سیاہ ایک ماشہ، گائے کے دودھ میں چھ گھنٹہ تک کھل کر دیں۔ اور چنے کے برابر گولیاں بنائیں، بخار چڑھنے سے ایک گھنٹہ پہلے ایک گولی ہمراہ پانی یا دودھ دیں۔ مانع بخار ہے۔

دیگر :- ہڑتال گنودنتی پانچ تولہ کو گلو سبز بیس تولہ کے پانی میں کھل کر کے ٹکیاں بنائیں اور گلو کے نغہ میں رکھ کر پانچ سیر پلوں کی ل دیں، کشتہ سفید رنگ کا تیار ہوگا۔ بخار کی باری آنے سے پہلے دو سے تین رتی ہمراہ شربت نیلوفر و نغہ دیں، بخار نہ ہوگا۔

دیگر :- مخز کر نجوہ ایک ماشہ، مرج سیاہ سات عدد پانی میں پس کر گولیاں چنے کے برابر بنائیں، ایک گولی صبح، ایک گولی دوپہر اور ایک گولی شام کو دیں۔

آٹھ پہری اجوائن :- اجوائن دیسی ایک تولہ کو کورے کوزے میں پراچھٹانک پانی میں بھگو دیں، گھوٹ چھان کر قد سے نک ملا کر پلائیں۔ دزانہ ایک بار پلانے سے پرانے سے پرانا موسمی بخار دور ہو جائے گا۔ کمزور مریضوں کو نصف خوراک دیں۔

پرانہ بخار :- چرا تہ شیریں ۹ ماشہ، گلو سبز کچلی ہوئی ۹ ماشہ، خاکسی ۹ ماشہ۔ رات کو پانی میں بھگو کر کپڑے سے ڈھانپ دیں اور شبہم میں رکھیں، صبح مختار کر پلائیں، کئی طبیب اس میں مسٹھی چھلی ہوئی چھ ماشہ کا اضافہ کر کے بھی پلاتے ہیں، پرانے بخاروں کے لئے

از حد مفید ہے۔

دوائے ملیریا :- ست گلو، طباشیر، دانہ الاچھی خورد، زہر مہرہ خطائی ہر ایک ایک تولہ، کافور تین ماشہ، کونین تین ماشہ، سب کو باریک پیس کر لعاب ایسبغول کے ہمراہ خود کے برابر گولیاں بنائیں اور سایہ میں خشک کر لیں۔ ایک ایک گولی دن میں تین بار شربت نیلوفر بنفشہ و عرق گاؤ زبان دیں۔ آرام آجائے گا۔

حب بخار جدید :- کونین سلفاس ایک تولہ، فناٹین، دانہ الاچھی خورد، ست گلو ہر ایک چھ ماشہ، طباشیر دو تولہ، سب کو عرق لیموں ایک پاؤ میں کھل کر کے چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ ایک ایک گولی دن میں تین بار دیں۔ موسمی و نوبتی بخاروں کے لئے مفید ہے۔

آیور ویدک علاج :- مغزینج کر بخوہ و مرج سیاہ دونوں برابر سفوف بنا کر دود و ماشہ کی خوراک دیں، بخار کو آرام ملے گا، حاملہ عورتوں کو اس کا استعمال منع ہے یا تیس سفوف بنا کر ایک ماشہ دن میں تین بار ہمراہ تازہ پانی دیں، بخار کو یقیناً آرام ملے گا یا تلخی سیاہ کے پتے چار عدد، کیکر کے پتے چار عدد، اجوائن دیسی ایک ماشہ پانی میں جوش دیں، سو اتولہ رہنے پر چھان کر پلائیں۔ بڑی عمر کے بچوں کے ملیریا بخار کے لئے مفید ہے۔

مندرجہ ذیل تجربات طب آیور وید میں ملیریا بخاروں کے لئے از حد مفید ہیں :-

سُدرشن چُورن (شارنگدھر) :- ایک ماشہ سے تین ماشہ تک ہمراہ تازہ پانی دن میں دو بار دیں۔ ہر قسم کے بخار خصوصاً ملیریا بخاروں کے لئے از حد مفید ہے، بخار کے حملہ سے ایک گھنٹہ پہلے سُدرشن چُورن کی ایک خوراک دینے سے بخار رُک جاتا ہے

سرو جواہر لوه (رسیندر سار سنگرہ) :- چترک، ہرڑ، بہڑہ، آملہ، سونٹھ، ملٹھی، مرج سیاہ، گمھاں، ناگر موتھا، باڑنگ، خس، گچ پیل، پلا مول، دیو دار، چراتیہ، پاٹھا، کٹکی، کنڈیاری، تخم سولہ بخنہ، کچ کی چھال ہر ایک ایک تولہ، کشتہ فولاد دو تولہ، سب کو کوٹ پیس کر چھان لیں اور ملا لیں اور سادہ پانی سے کھل کر کے دو دورتی کی گولیاں بنائیں، خوراک ایک گولی ہمراہ دودھ پانی یا شہد دیں۔

فوائد :- ہر قسم کے بخاروں کے لئے لا جواب ہے، سردی، لرزہ، پیاس کی زیادتی، سرچکرانا، پسینہ آنا، دست، کف، پت، جگر و تلی کا بڑھنا، یرقان، سنگرمہنی وغیرہ کے لئے بھی مفید ہے۔

مرتبجے رس (رسیندر سار) :- اس کا نسخہ تب محرقہ کے بیان میں دیا جا چکا ہے۔ ایک سے دو گولی ہمراہ شہد یا پانی یا عرق گاؤ زبان یا سولف دیں۔

ابرک سفید بھسم :- ایک رتی سے دورتی ہمراہ عرق گاؤ زبان شربت نیلوفر دیں، ملیریا و صفراوی بخاروں کے لئے مفید ہے۔

بخار ہر قسم :- یہ نسخہ ملیریا بخار کے علاوہ ہر قسم کے بخاروں میں مفید ہے، کچھ عرصہ پہلے تو الفلوئیز میں بھی اس نے حیرت انگیز کام کیا۔ بہت زیادہ مریض صحت یاب ہوئے، پت کی زیادتی میں کشتہ مرجان ذرا زیادہ اور کشتہ ابرک سیاہ کم کر دیں۔

ترجہون کیرتی رس ایک گولی، کشتہ ابرک سیاہ ایک رتی، کشتہ مرجان ڈیڑھ رتی، رس سیندھور پہ رتی ہمراہ گرم پانی دیں، دن میں ایسی چار خوراک دیں۔ مریض کو صرف موسمی کارس، ابال کر ٹھنڈا ہوا پانی دیں۔ باقی سب پرہیز کرائیں، قبض ہو تو گلیسرین بتی یا گلیسرین کا انیما کریں۔ عام بخار تو آدھے دن میں دور ہوتے ہیں، معیادی بخار بلا کسی عوارض کے اپنی معیاد پر اتر جاتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تب کی زیادتی میں کشتہ ابرک آدھی رتی، مرجان دورتی کر دیں۔ دانے نکلنے کی صورت میں خوب کلاں منقہ، عذاب، ملٹھی چھلی ہوئی، گاؤ زبان کے جوشاندہ سے دیا کریں، خشک کھانسی کی صورت میں ستوپلا دی چُورن لے کر بادام ردغن سے چرب کر کے چار گنا شہد ملا کر آہستہ آہستہ چٹوائیں۔ ہر موسم و ہر عمر والے کو بلحاظ عمر کم و بیش کر کے ملیریا میں دیں اور حاملہ مستورات کے علاوہ سب کو دے سکتے ہیں۔

ملیریا کی بخاروں کا بخڑی بوٹیوں سے علاج

- ۱۔ چرچہ بوٹی کے پتے، کالی مرچ، لہسن ہوزن پس کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں، یہ گولیاں ملیریا کی بخاروں کے لئے مفید ہیں۔ تین سے چار گولی باری سے پہلے کھلائیں۔
- ۲۔ یہ ایک عام دستور ہے کہ اکثر پنڈت و جوگی ملیریا بخار کو دور کرنے کے لئے پیل کے پتے پر تعویذ لکھ کر مریض کو چٹاتے ہیں، اس سلسلہ میں تعویذ کا اثر ہونہ ہو، پیل کا پتہ چاٹ لینے سے ہی بخار کو آرام آ جاتا ہے۔
- ۳۔ بیج تلسی، پٹھکنڈا کے پتے ہر ایک چھ ماشہ، سیاہ مرچ تین ماشہ، ان تینوں کو کھل کر کے جنگلی بیر سے ذرا کم گولیاں بنائیں، خوراک ایک ایک گولی صبح و شام تازہ پانی سے دیں، ہر قسم کے موسمی بخاروں کے لئے از حد مفید ہے۔
- ۴۔ تلسی کے پتے، لیکر (بول) کے پتے، مرچ سیاہ، پپی، مغز کرنبوہ، کشتہ ہڑتال گودنتی ہوزن کوٹ چھان کر پانی کے ساتھ نخود کے برابر گولیاں بنالیں، ہر قسم کے موسمی بخار (ملیریا) کے لئے ایک گولی ہمراہ عرق سولف یا عرق گاؤزبان یا نیم گرم پانی دن میں دو بار دیں۔
- ۵۔ موسم برسات میں ہر صبح چار یا چھ پتے تازہ تلسی کے کھائیں تو یقیناً ملیریا بخار سے محفوظ رکھتے ہیں۔
- ۶۔ بلغھی بخار یا ملیریا میں تلسی بوٹی کے چھ ماشہ سبز پتے خوب اُبال کر چھان لیں اور قد سے چھنی ملا کر گرم گرم چائے کی طرح پلائیں، پسینہ لا کر بخار اتارنے میں بیسیوں قسم کی انگریزی ادویہ سے بدرجہا بہتر ہوگی۔
- ۷۔ گودنتی کو کسی برتن میں رکھ بہت سے اُپلوں کی آگ سے شگفتہ کر لیں، پھر اس کو پیس کر دھما سے بوٹی کے رس میں تین دن کھل کھلتے رہیں اور ٹکیاں بنا کر خشک کر لیں، اس کے بعد اسے دھما سے بوٹی کے ایک پاؤ نغہ میں گل حکمت کر کے بیس سیر اُپلوں کی آگ دیں، یہ عمل تین بار کریں، گودنتی کا بڑھیا کشتہ تیار ہوگا، پس کر رکھ لیں، موسمی بخاروں کے لئے خاص طور سے مفید ہے، خوراک ایک رتی سے دو رتی تک نوبت سے قبل دیں، بخار کی حالت میں بھی دے سکتے ہیں۔
- ۸۔ ستیاناسی کی جڑ دو تولہ، کالی مرچ ایک تولہ، الگ الگ کوٹ کر ستیاناسی کے پتوں کے رس میں کھل کر کے چنے کے برابر گولیاں بنالیں۔ ایک گولی پانی کے ساتھ کھلائیں، اگر بخار تیز ہو تو دو گولیاں دیں۔ تین روز کے استعمال سے ہر قسم کا بخار دور ہو جاتا ہے۔
- ۹۔ نیم کے پتے چھ تولہ میں مغز کرنبوہ تین تولہ، مرچ سیاہ ایک تولہ ملا کر کھل کر کے گولیاں نخودی بنائیں، خوراک ایک گولی سے دو گولی۔ ملیریا کی بخاروں کے لئے از حد مفید ہے۔
- ۱۰۔ ہو میو پیتھک علاج :- ۱۔ چائنا (تجاری یعنی تیز کے بخار میں خاص طور پر مفید ہے) اور اگر لرزہ، پیاس اور پسینہ تینوں حالتیں ہوں تو موثر ہے۔ علامتوں کو سمجھنے بغیر ہر شخص کو ملیریا بخار میں چائنا استعمال کرانا بعض دفعہ نقصان بھی پہنچاتا ہے، مدرن پچر کے دو تین قطرے یا ۱/۲ چار قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔
- ۲۔ چینی نم سلف (سردی، گرمی، پسینہ تینوں حالتوں میں مفید ہے) خوراک ۱/۲ (سفوف) ہر ایک یا دو گھنٹہ بعد دیں۔
- ۳۔ آرسینک (ملیریا کی مشہور دوا ہے) یہ چائنا اور چینی نم سلف کے بعد سب سے زیادہ مستعمل ہے، نبض باریک و تیز بخار کے شدید حملوں میں اکثر زبان صاف ہو تو اس کا استعمال مفید ہے، پُرانے ملیریا بخار میں یہ اول درجہ کی دوا ہے۔ اس سے کونین کے

بد اثرات دور کرنے میں مدد ملتی ہے، بخار کے سبب مریض کمزور ہو گیا ہو، بخار کا حملہ بعد دوپہر ہو، گرم پانی پینے سے سکون ہو اور سردی کا احساس زیادہ نہ ہو تو آرسینکیم نہایت مفید ہے، خوراک $3 \times$ دن میں دو یا تین بار دیں۔

۴۔ نکس و امیکا :- جب بخار میں معدی اور صفراوی علاماتیں زیادہ پائی جاتی ہوں، تو یہ خوب کام کرتی ہے، سردی روزانہ شام کو لگے، سردی کی وجہ سے انگلیوں کی انگلیوں کے ناخن نیلے پڑ جائیں، اعضاء میں درد سر میں چکر پیاس ندر د، آبکائیوں اور جمائیوں کا آنا، یہ تمام نکس و امیکا کی خاص علامات ہیں، بخار کی حالت میں مریض کئی چیزیں اور صنا پسند کرتا ہے، خوراک $2 \times$ ہر دو گھنٹے بعد دیں۔

یالو کیمیک علاج :- نیٹرم سلف (شدید بخار کی حالت میں)، نیٹرم میور (باری کے بخار میں)، کالی فاس (پرانے لیرائی بخاروں میں)، سالی لیتھ (پسینہ کے ساتھ بخار کی حالت میں)، کلکیر یا سلف (پرانے لیرائی بخاروں کی صورت میں) مفید ادویات ہیں۔

سرور د اور ہذیانی حالت میں بخار کی حرارت کو کم کرنے کے لئے سر اور پیشانی پر برف کی تھیلی رکھنی چاہیے یا برف کے پانی میں کپڑے کا ٹکڑا بٹھا کر رکھیں، جب حرارت 102 درجہ سے کم ہو جائے تو یہ عمل بند کر دیا جائے۔

حفظ ماقدم علاج :- لیریا کے موسم میں بخار سے بچنے کے لئے کونین کا استعمال لیکن تھوڑی مقدار میں مفید مانا گیا ہے، اس سلسلہ میں چینی نم سلف (کونین) کا مناسب مقدار میں استعمال مفید ہے۔ اگر کونین موافق نہ آتی ہو تو آرسینکیم $3 \times$ کا استعمال بھی مرض سے بچاؤ رکھتا ہے۔

مچھروں سے بچاؤ کے لئے مچھروں کی اور مہری کے اندر سونا چاہیے۔

غذا و پرہیز :- کھانے کو نرم غذا دیں، لیموں، انار، انگور، سنگترہ وغیرہ دیں، دھوپ میں نہ چلنے دیں اور میلے کپڑے نہ پہننے دیں۔

شیتلا - جذری - چیچک - شمال پاکس (Samal Pox)

تعریف مرض :- یہ ایک شدید متعدی مرض ہے۔ اس کا باعث ایک قسم کا غیر مری (وائرس) جرثومہ ہے۔ اس میں یکایک لرزے سے بخار ہو جاتا ہے۔

وجوہات :- جب خون میں بطور عفونت غلیان پیدا ہو جاتا ہے تو اس مرض کا حملہ ہوتا ہے۔ عام طور پر وہ لوگ چیچک میں مبتلا ہوئے ہیں، جن کا مزاج گرم و تر ہوتا ہے۔ خصوصاً جب کہ بدن میں مکدر رطوبت ہو، جذری ایک قسم کے بحران کا نام ہے اور یہ مرض عام طور پر بچوں کو بہت زیادہ، جوانوں کو بچوں کی نسبت کم اور بوڑھوں کو بہت کم عارض ہوتا ہے۔ اس طرح چیچک مرطوب بدنوں میں خشک بدنوں کی نسبت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔

چیچک صرف جلد میں اور بدن کے ظاہری حصوں ناک، منہ وغیرہ ہی میں نہیں نکلتی، یہاں تک کہ جھیلیوں اور سپٹوں میں بھی نکلتی ہے۔ علامات :- جب چیچک نکلنے لگتی ہے تو پہلے بدن میں خارش پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر باجرے کے دانوں کی نوک کا مانند ابھار ظاہر ہوتے ہیں، پھر چیچک نکل آتی ہے اور پیپ سے بھر جاتی ہے، اس کے بعد پیپ خشک ہو جاتی ہے اور مختلف رنگوں کے کھرنڈ پیدا ہوجاتے ہیں۔ آخر میں یہ کھرنڈ بھی خشک ہو کر جھڑ جاتے ہیں اور مریض اچھا ہو جاتا ہے۔

سزاؤ و نفشی رنگ کی چیچک ردی ہوتی ہے، اور یہ جس قدر زیادہ سیاہی مائل ہو، اسی قدر ردی ہوتی ہے، سب سے بہتر چیچک وہ ہوتی ہے، جس کے چند دانے بڑے بڑے اور تھوڑی سی چینی کے بعد نکل آئیں، بخار ہلکا اور چیچک نکلنے ہی اتر جائے دانوں کا رنگ سفید ہو۔

سفید چھپک جس کے دانے چھوٹے چھوٹے سخت اور ایک دوسرے کے قریب ہوں اور مشکل سے نکلنے ہوں تو ایسی چھپک کے مریض کی حالت خراب ہو جانے کا خوف ہوتا ہے۔ اس طرح وہ چھپک بھی مہلک ہوتی ہے جس کے دانے گوشت سے چپٹے ہوئے ہوں اور جو کمزوری کے باعث جلد میں نہ ابھریں اور جس میں عضو کا رنگ سبز یا سیاہ ہو جائے۔

اس بیماری میں آنکھوں میں ککڑے اور زخم ہو جانے کا سخت خطرہ ہوتا ہے۔ اور ہوا کی نالی میں بھی سوزش ہوتی ہے، کھانسی، برانکو، نمونیہ اور پلوریسی کا بھی بھاری خطرہ ہوتا ہے۔ اس لئے جب مریض چھپک کی سانس اور آواز ٹھیک ہوتی ہے تو مریض کے لئے سلامتی کی علامت ہے۔ اس طرح اگر پیاس شدید ہو جائے، بے چینی بڑھ جائے، ظاہر بدن ٹھنڈا پڑ جائے، چھپک کے دانوں کی رنگت سبز پڑ جائے تو یہ سخت ردی علامت ہے۔ اسی طرح مریض کو جب خونی پیشاب، سیاہ پیشاب، سبز پیشاب آئے اور خونی دست آئیں تو یہ حالت خطرناک ہے۔

علاج ڈاکٹری :- جس علاقہ میں یہ بیماری وبا کی صورت میں ظاہر ہو، دہل بچوں اور بڑوں کو چھپک کا ٹیکہ لگوانا چاہیے اور علاقہ کی میونسپل کمیٹی یا پنچایت کو اطلاع دینی چاہیے تاکہ بیماری کے پھیلنے کی موثر طریقہ سے روک تھام ہو سکے۔ خاص طور پر جس گھر میں مریض ہو ان کو فوراً ٹیکہ لگوانا چاہیے۔ مریض کو علیحدہ کمرے میں لٹائیں، صبح و شام آنکھوں کو نیم گرم بورک لوشن سے صاف کریں اور پنی سلین یا آریو مائی سین یا ٹیرامائی سین آئی آئنٹمنٹ ڈالنی چاہیے تاکہ آنکھیں زخم ہونے سے محفوظ رہیں، گلے و منہ کی سوجن کے لئے بورک گلیسرین کا استعمال کریں، منہ کو صاف رکھنے کے لئے سوڈیم کلورائیڈ ایک ڈرام، سوڈیم بائیکارب آدھا ڈرام، پانی سولہ اونس میں ملا کر اس سے دن میں چند بار غرغزے کرائیں۔

جب چھپک کے دانے خشک ہو کر کھرنڈ آجائیں تو زیتون کے تیل سے انہیں چھڑ دینا چاہیے۔ اگر سوجن بہت زیادہ ہو تو سلفا ڈایازین کا استعمال بہت مفید ہے، بچوں کو بلحاظ عمر دیں۔ مرض کی کمزوری دور کرنے کے لئے ایسٹن سیرپ، فیلوز سیرپ کا استعمال مفید ہے۔ ٹیکے سے علاج :- چھپک میں جب نمونیہ وغیرہ کی علامات پیدا ہوں یا زیادہ تکلیف ہو تو پنی سلین شدت میں کمی کر دیتی ہے۔ اس غرض کے لئے پنی سلین یا پروکین پنی سلین کا عضلاتی انجکشن بلحاظ عمر کیا جائے۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ آریو مائی سین (Aureomycin) یا ایکرو مائی سین (Achromycin) یا کلورڈامائی سین (Chloro-mycetin) کا کیپ، شول استعمال کرائیں۔ کمزوری کے لئے گلوکوز دیتے ہیں۔

۲۔ سلفا گروپ میں سے سلفا ڈایازین پہلی خوراک دو گرام کھلائیں۔ اس کے بعد ہر چار گھنٹہ بعد ایک گرام دیں۔

۳۔ آنکھوں کو تندرست رکھنے کے لئے پنی سلین یا آریو مائی سین یا ٹیرامائی سین آئی آئنٹمنٹ ڈالیں۔

۴۔ دانوں کو پوٹاسیم پرمینگنیٹ کے ہلکے گھول سے صاف کرنا مفید ہے۔ منہ صاف رکھنے کے لئے نمک خوردنی گرم پانی میں گھول کر غرغزے کرائیں، دانوں پر جب زخم بننے لگیں تو لگانے کے لئے نیبا سلف مرہم (Nebasulf ointment) ڈیو میکس لگائیں یا پوڈر چھڑکیں۔

۵۔ پنی سلین کا انجکشن سات آٹھ روز بعد لگا سکتے ہیں۔ اس کا استعمال دانوں میں پانی آنے کے بعد کرنا چاہیے۔ اس سے دیگر جھپوت دار امراض سے حفاظت ہو جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ اس سے ٹیسرہ سحر ایک دم نیچے گر جاتا ہے۔ اس لئے اسے احتیاط سے اور سوائے اشد ضرورت کے نہیں لگانا چاہیے۔ اس مرض کی کوئی خاص دوا نہیں ہے۔

پونانی علاج :- عذاب چار دانہ، موہن متقی پانچ دانہ، انجیر زرد تین دانہ، خاکسی تین ماش، چینی ایک تولہ۔ پانی میں جوش دے کر صاف کر کے پلائیں، اگر کمزوری زیادہ ہو تو خمیرہ مرورید تین ماش اس نسخہ کے ساتھ کھلایا کریں۔ مریض کے بستر پر خاکسی چھڑک دیں اور پانی پیسنے کے برتن میں بھی خاکسی ایک تولہ پوٹی میں باندھ کر ڈال دیں۔

بیرونی طور پر آبلوں پر کاربانک گلیسرین کا استعمال کریں۔ مریض کو سردی سے بچائیں، چیچک کے آرام آنے پر چیچک کے داغوں کو دور کرنے کے لئے پپیتہ (ارنڈ خربوزہ) کے بچوں کو تلوں کے تیل میں جلا لیں۔ اور چھان کر رات کو سوتے وقت یہ تیل مل دیا کریں، چند روز میں داغ مدھم پڑ جاتے ہیں یا بانس کی خشک جڑ، باقلا کا آٹا، تخم خربوزہ، چاول، اندے کی سفیدی، مردار سنگ، ناشتہ، بادام شیریں، بادام تلخ وغیرہ کا بیرونی طور پر استعمال کیا جائے۔

آیور ویدک علاج :- مرتبہ رس (رسیندر سار) ایک گولی ہمراہ شہد یا عرق یا پانی دیں۔ جب گھبراہٹ و بے چینی زیادہ ہو تو بسنت مالتی رس (بیشچ رتناولی) آدھی سے ایک گولی ہمراہ شہد دیں، کھرنڈ خشک ہونے پر ان پر لاکشادی تیل (شارنگدھر) کا استعمال کریں۔

جنگلی کیلے کے بیج :- مرض چیچک سے محفوظ رہنے کے لئے چیچک کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ ماڈرن آیور ویدک ریسرچ کے مطابق جنگلی کیلے کے بچوں کو اس مرض کی روک تھام کے لئے مفید پایا گیا ہے، بلکہ آیور ویدک میں اسے ٹیکہ سے بھی ترجیح دی گئی ہے، میونسپل ہسپتال بمبئی میں ہزاروں مریضوں پر اس کی آزمائش کی جا چکی ہے اور اسے موثر پایا گیا ہے، چیچک سے بچے رہنے کے لئے اسے اس طرح سے استعمال کرنا چاہیئے :-

۱۔ ایک سال سے چھوٹے بچے کو	ایک عدد	۴۔ گیارہ سال سے پندرہ سال سے زائد عمر تک	چار عدد
۲۔ ایک سال سے پانچ سال تک	دو عدد	۵۔ اس سے زیادہ عمر تک	آٹھ عدد
۳۔ دس سال سے زائد	تین عدد	تعداد سے زیادہ ہرگز نہ دینا چاہیئے۔	

آٹھ عدد بچوں کو پیس کر کپڑ چھان کرنے سے پانچ رتی کے قریب سفید رنگ کا سفوف بنتا ہے، جو کہ دودھ کے ساتھ دینا چاہیئے۔

۱۔ ایک سال سے کم عمر کے لئے	۱/۲ اگرین	۴۔ پندرہ سال تک	۵ اگرین
۲۔ ایک سال سے پانچ سال تک	۱/۲ اگرین	۵۔ اس سے زیادہ عمر کے لئے	۱۰ اگرین
۳۔ دس سال سے زائد عمر تک	۲/۲ اگرین	دن میں صرف ایک بار دودھ یا شہد سے استعمال کرائیں۔	

مرگباشی ڈاکٹر براس ڈی آسا کے تجربہ کے مطابق اگر سال میں ایک بار ان بچوں کا سفوف شہد کے ساتھ دیں تو ایک سال تک بچہ چیچک سے محفوظ رہتا ہے۔

مرگباشی وید شری شنکر جی اپنی تصنیف "آریہ بھشک" میں بھی مندرجہ بالا بچوں کی تعریف کرتے ہیں۔ اور انہوں نے تو چیچک نکل آنے پر بھی اس کے استعمال کی سفارش کی ہے، لکھا ہے کہ مندرجہ بالا مقدار میں دن میں تین بار دودھ سے دی جائے تو اس سے تین سے سات دن کے اندر آرام آ جاتا ہے۔

ملٹھی :- چیچک و خسرہ کے علاج میں ملٹھی کامیاب علاج ہے، دودھ گھنٹہ کے وقت سے چھلی ہوئی ملٹھی کے سفوف کی چند خوراکیں دینے سے خطرناک بخار کو بھی ایک دو دن میں آرام آ جاتا ہے، ملٹھی عام چیز ہے، جسے اکثر وید حکیم کھانسی و نزلہ کے لئے روزانہ استعمال کرتے ہیں۔

ہومیو پیتھک علاج :- چائنا (ابتدائی حالت میں)، انیم ٹارٹ (آٹھ، ناک و گلے کی سوجن میں)، سلفر، بیٹیا اور مرک سال بیماری کی شدید حالت میں مفید ادویات ہیں۔

بالو کیمک علاج :- ابتداء میں فیرم فاس، بعد میں کالی میور اور کلکیر یا سلف اور مرض کی پرانی حالت میں سیلشیا بہترین ادویات ہیں۔

کھرنڈ اترتے وقت سلفر کا استعمال ضروری ہے۔ گرم پانی سے چیچکوں کو دھونا اور صاف رکھنا نیز آرنیکا گھول سے دھونا مرض کو آرام دیتا ہے، جب کھجلاہٹ بہت ہو تو ایک حصہ آرنیکا مدرنچر اور ۹ حصہ صاف پانی گھول بنا کر چیچک کے دانوں کو دھوئیں۔

چیچک کا ٹیکہ (Vaccination) :- پیدائش سے ۷ کر تین ماہ کے اندر بچہ کو ٹیکہ کرا دینا چاہیئے، مرض سے محفوظ رہنے کے لئے

عمر بھر میں تین بار ٹیکہ کرانا چاہیئے۔ ایک بار بچپن یعنی تین یا چار ماہ کی عمر میں، دوسری بار دس یا بارہ سال کی عمر میں اور تیسری بار جوانی میں ٹیکہ کرانا چاہیئے۔ ٹیکہ کے بعد اول تو چیچک ہوتی ہی نہیں۔ اگر ہوتی ہے تو بالکل معمولی رہتی ہے۔ یہ ٹیکہ عام طور پر بازو کے بالائی حصہ میں لگایا جاتا ہے۔ اس جگہ کو صابن سے صاف کر کے اور صاف پانی سے دھو کر خشک کر لیں۔ پھر وہاں ایک ایک انچ کے فاصلہ پر تین چار مقامات پر ذرا سی ویکسین لفٹ لگا دیں۔ پھر نشتر کی نوک سے ہر مقام پر گوڈ کر جلد پر تین یا چار خطوط "۱۱۱۱" اس طرح بنائیں کہ خون نہ نکلنے پائے اور لفٹ کو نشتر کی نوک سے مل دیتے ہیں۔ یہ عمل نہایت صفائی سے کیا جاتا ہے، استعمال سے پہلے نشتر کو سپرٹ لیمپ کے شعلے پر گرم کر کے پاک و صاف کر لیا جائے۔ اگر چیچک کی چھوٹ لگنے سے تین چار دن کے اندر بھی ویکسین کر لیا جائے تو پھر بھی مرض کے حملہ سے بچاؤ رہتا ہے، جب بچہ کی صحت خراب ہو۔ پیش دست، کھانسی، بخار یا خارش میں مبتلا ہو تو ٹیکہ نہیں لگوانا چاہیئے۔

ٹیکہ کرانے کے بعد بھی بچے کی صحت کا خیال رکھنا چاہیئے، ٹیکہ شدہ مقام کو رگڑ، میل کچیل اور سردی و گرمی سے محفوظ رکھنا چاہیئے۔
نوٹ:- چیچک کے مشابہ مرض دانہ شیتلا (چکن پاکس) بھی ہوتی ہے۔ جس میں چھوٹے بچے مبتلا ہوتے ہیں۔
اس کا علاج بھی بطور چیچک کیا جائے۔

غذا و پرہیز:- دودھ اور دیگر نرم غذائی چیزیں چاہیئے۔ دیرینہم غذیہ سے سخت پرہیز کیا جائے۔

وات شلشکم جوڑ، حمی نزلہ و باریہ، انفلوئنزا، (Influenza)

تعریف مرض:- یہ ایک قسم کا وبائی زکام ہے، جس کے ساتھ دردمند اور بخار ضروری ہوتا ہے، مریض بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ مرض وبا کی صورت میں پھیلتا ہے۔ اور چالیس سال سے کم عمر کے آدمی زیادہ نشانہ بنتے ہیں، چھوٹے بچے اور بوڑھے کم مبتلا ہوتے ہیں۔

وجوہات:- یہ مرض عام طور پر موسم سرما میں وبائی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا جرثومہ بسی نس انفلوئنزا (Bacillus Influenza) ہوتا ہے جو کہ سلاخوں کی صورت میں ہوتا ہے اور مریض کے نچوڑک و بلغم میں پایا جاتا ہے۔

علامات:- اس کا حملہ یکا یک ہوتا ہے، پیشانی اور کمر میں سخت درد ہوتا ہے اور آنکھیں جسم کے عضلات درد کرنے لگتے ہیں، بخار و باہیل جاتا ہے، جب مریض کو بخار ہو جاتا ہے تو نبض تیز چلتی ہے، پیاس لگتی ہے اور پیشاب کا رنگ لال ہو جاتا ہے، جلد گرم اور خشک ہوتی ہے، سر میں درد اور دوران ہوتا ہے، ناک بہتی ہے اور منہ کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ گلا درد کرتا ہے اور آواز بیٹھ جاتی ہے، خشک کھانسی اٹھتی ہے اور سانس پھول جاتا ہے۔ سینہ پر تناؤ اور بوجھ معلوم ہوتا ہے، بھوک نہیں لگتی۔ مریض بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر مرض کا حملہ شدید ہو تو مونیہ بھی ہو جاتا ہے۔

حفظ مالمقدم:- تندرست آدمیوں کو چاہیئے کہ وہ کھلی ہوا میں رہائش رکھیں، یوکلپٹس آیل رومال پر ڈال کر سونگھتے رہیں، وبا کے دنوں میں تلسی کے پتے و دار چینی چائے میں ڈال کر پیئیں، برف والی آیل کی، ترش اور مٹھائیوں سے سخت پرہیز کرائیں۔

علاج ڈاکٹری:- مریض کو لیٹر پر آرام سے لٹائیں۔ اور آرام آجانے کے باوجود بھی دو چار دن لیٹے رہنا چاہیئے۔ چونکہ اس مرض میں بے چینی کافی ہوتی ہے، اس لئے دردوں کے لئے سارڈیان یا اناسین وغیرہ دیں۔ اسپرین، فنانٹین، کیفین کا پوڈر بھی مفید ہے، کوڈوپارین کا استعمال فوری آرام دیتا ہے۔ کر دین، پیرا شامول بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

جدید ترین ڈاکٹری علاج میں پنیسلین بذریعہ انجکشن اور سلفا ڈایازین خوراک کی طور پر فوراً شروع کر دیں، سلفا ڈایازین خوراک کی طور پر کچھ گولی تک روزانہ دے سکتے ہیں، ہمارے تجربات کے مطابق پنیسلین کی جگہ سٹرپٹومنیسلین مؤثر علاج ہے اور اس کے دو انجکشنوں سے ہی بخار وغیرہ دور ہو جاتا ہے۔ نئی پیٹنٹ ادویات میں سنٹھومائیٹین بھی تمام انفلوئنزائی عوارضات کے لئے نہایت مفید ہے۔

انفلوئنزائے لندن فارما کو پیپا کا نسخہ بھی مفید ہے، خصوصاً دروں کی حالت میں فوری آرام ملتا ہے۔

اسپرین دس گرین، ڈوڈرس پوڈرس دس گرین، ایسی ایک پڑیہ ہر چھ گھنٹہ بعد دیں، کمزور مریضوں کو نصف خوراک دیں۔

دروں کے لئے مکسچر سوڈا سلی سلاس (کرسچن میڈیکل کالج میں معمول) دیں، نسخہ درج ذیل ہے:-

سوڈا سلی سلاس دس گرین، سوڈا یائی کارب دس گرین، سپرٹ ایونیا ایرومیکٹک، پندرہ نم، اکوا کلور فارم پلاؤنس کمزور مریضوں کو نصف خوراک دیں، ناک سے مواد زیادہ خارج ہو رہا ہو تو یو کلیٹس آئیل سونگھائیں یا بنزڈرین انہیلز دو بار سختوں میں سونگھنے کی ہدایت دیں۔

ناک کی شدید سوجن کے لئے انڈرین یا مسٹول ڈراپر کے ذریعہ ناک میں ڈالیں، انفلوئنزائے مابعد کھانسی کی تکلیف کے لئے کھانسی کے بیان میں دی گئی ادویات استعمال کریں، وٹامن سی چھوٹ دار امراض کے خلاف مدافعت پیدا کرتی ہے۔ اس عرض کے لئے وٹامن سی کا استعمال مفید ہے۔

ماڈرن ادویات:- ۱۔ سٹرپٹومنیسلین کا مناسب مقدار میں عضلاتی انجکشن لگائیں، دو انجکشنوں سے ہی بخار دور ہو جاتا ہے۔ اس مرض میں بستر پر آرام سے لیٹنا لازمی ہے۔

۲۔ ٹیرامائی سین یا ٹیرامائی سین ایس ایف (Terramycin S. F.) یا سزمامی سین (Synermycin) یا لیڈرمائی سین (Ledermycin) یا ایکرومائی سین (Achromycin) یا سبامائی سین (Suba mycin) یا ایلیمائیکلین (Alcycline) کا ایک ایک کیپ شول ہر چھ گھنٹے بعد دیتے رہیں۔ یہ انفلوئنزائے کے ساتھ دیگر بیماریوں کا جو حملہ ہوتا ہے، ان کو بھی ختم کر کے تکلیف و بخار دور کرتی ہیں۔ اور اس کا کافی اثر انفلوئنزائے کے دائرس پر ہوتا ہے۔

۳۔ اسپرو یا اناسین یا کوڈوپارین یا اویدن یا لے پی، سی یا نوو جین یا ساریڈان یا کیپراہین وغیرہ کی ایک گولی چائے سے دیں درد اور بخار کو تسکین دیتی ہیں۔

۴۔ کلورومائی ٹین (Chloromycetin) یا انٹرومائی ٹین (Enteromycetin) یا سنٹھومائی ٹین (Synthomycetin) یا کلوروفینی کول (Chloraphenicol) کے ایک یا دو کیپ شولز ہر چھ گھنٹہ بعد دیں۔ اس کا کچھ اثر انفلوئنزائے کے دائرس پر بھی ہوتا ہے۔

۵۔ کھانسی کے لئے مینڈرل ایکسیکٹورنٹ (Benadryal Expectorant) ایک سے دو چمچے دن میں تین یا چار بار دیں۔

۶۔ انڈرین (Endrine) یا اوٹرلین (Otrivin) یا کیمفیڈرین (Camphedrine) یا نیسول (Nasol) وغیرہ ناک میں ایک دو بوند ڈالنے سے ناک بہنا اور بیماری پن دور ہو جاتا ہے۔

۷۔ کلورومائی ٹین (پی، ڈی، ۲۵۰ ملی گرام، سلفا ڈایازین (ایم، بی، ۵۰۰ ملی گرام، دونوں کو ایک ساتھ پانی کے ساتھ دیں۔ یہ علاج انفلوئنزائے کے سرسام میں مفید ہے اور ہر چھ گھنٹے بعد دیا جاسکتا ہے، اگر ضرورت ہو تو سٹرپٹومنیسلین کا عضلاتی انجکشن بھی دے سکتے ہیں، شدید عوارضات کے لئے مفید ہے۔

۸۔ ریڈوکسان ۵۰۰ ملی گرام + بیناڈرل ۲۵ ملی گرام کا مشترکہ استعمال براہِ دہن زکام کے ابتدائی درجہ میں مفید ہے۔ یہ مرکب علاجِ زکام کے لئے از حد مفید ہے۔ یہ مرکب علاجِ زکام کی حساسیت کو کنٹرول کرتا ہے اور زیادہ چیمینکس آنے و ناک کے بہنے کو از حد مفید ہے۔ اگر سرایت زیادہ ہو تو ٹرائی سین کیپ شولز براہِ دہن دیا جاسکتا ہے۔

۹۔ اکرومائی سین (لیڈرے) ایک کیپ شول، پیری ٹن (گلیکسو) ایک ٹیکہ، کرو سین (کروکس) ایک ٹیکہ، تینوں کو ایک ساتھ ملا کر پانی کے ساتھ دن میں دو بار دیں۔ یہ انٹی بائیوٹک + انٹی ہٹامین + دافع درد مرکب ہے، جو انفلوئنزا کی سرایتوں میں از حد مفید ہے۔ یہ علاج بخار اتارنے، پھٹوں کے درد کو دور کرنے اور سرایت کے خاتمہ کے لئے از حد مفید ہے۔

۱۰۔ کیپر امین (گلیکسو) ایک ٹیکہ، ڈامی ٹس (روش) ایک ٹیکہ، دونوں کو یکے بعد دیگرے پانی کے ہمراہ دن میں دو بار دیں۔ یہ مرکب دو انفلوئنزا کے سیلان انف (Rhinoirhea) کے لئے مفید ہے اور معمولی انفلوئنزا میں مفید ہے۔

۱۱۔ ڈامین سی چھوت دار امراض کے خلاف مدافعت پیدا کرتی ہے۔ اس غرض کے لئے ریڈاکسون (Redakson) یا سی لین (Celin) ۲۵ سے ۱۰۰ ملی گرام روزانہ دیں، ڈامین سی سنگترہ، لیموں، سبز ترکاریوں، گوہی، ٹماٹر، مولی، سلغم، آلو، گاجر، لوبیا، چقندر، گوشت اور آمہ میں بھی بکثرت پائی جاتی ہے۔

۱۲۔ ڈامین اے بھی نزلہ، زکام، سرمائی کھانسی اور انفلوئنزا کے لئے بطور حفظہ مقدم بہت مفید ہے۔ یہ مختلف کمپنیوں کی جیسے گلیکسو پی پریالین (Prepalin)، روش کمپنی ایرووٹ (Arovit) ناموں سے مارکیٹ میں ملتی ہے۔

خوراک ایک سے دو گولی یا کیپ شولز دن میں دو سے تین بار دیں۔

یونانی علاج :- بی دانہ تین ماشہ، عناب پانچ دانہ، سوڑیاں ۹ دانہ، شربت بنفشہ دو تولہ، دونوں کو جوش دے کر صاف کر کے شربت ملا کر پلائیں۔ اگر بخار تیز ہو تو خاکسی پانچ ماشہ کا اضافہ کریں۔ اگر ناک بکثرت بہتی ہو تو گوند کیکر، گوند کتیرا، ست لمبھی، شکر تیغال ہر ایک ایک ماشہ پیس کر خمیرہ خشخاش ایک تولہ میں ملا کر پیسے کھلائیں، اوپر سے بیج خطمی، بیج خبازی، گل بنفشہ ہر ایک چھ ماشہ، گاؤ زبان تین ماشہ، گل کاؤ زبان تین ماشہ، جوش دے کر صاف کر کے شربت بنفشہ دو تولہ ملا کر دیں۔

آیور ویدک علاج :- مندرجہ ذیل آیور ویدک مجربات اس مرض کا موثر علاج ہیں :-

تر بھون کیرنی رس (لوگ رتنا کر) :- شنگرف شدہ، میٹھا تیلیہ شدہ، سہاگہ، پپلا مول، سب برابر کر کے کر رس تلسی، رس ادرک اور رس برگ دھتورہ میں تین تین بھادنا دیں اور ایک ایک رتی کی گولیاں بنائیں۔

خوراک :- ایک سے دو گولی ہمراہ رس پان یا شہد دن میں تین بار دیں۔

فوائد :- انفلوئنزا اور نمونیا کے لئے مفید ہے، بادی، بلغمی بخار، سنپات (تینوں خلیطوں سے مرکب) بخار کے لئے مفید ہے، جب مریض کا جسم ٹھنڈا ہونے لگے تو یہ رس دوبارہ زندگی دیتا ہے۔

کھانسی کے لئے "مرح آدی گٹکا" کا استعمال مفید ہے، حسب ضرورت گولیاں منہ میں رکھ کر چوسیں۔

کف کیتورس (بھیشج رتنا ولی) :- میٹھا تیلیہ شدہ، سہاگہ، گمھاں، کشتہ منکھ، سب برابر برابر رس ادرک میں کھل کر کے ایک ایک رتی کی گولیاں بنائیں، خوراک ایک ایک گولی ہمراہ شہد یا سادہ پانی دن میں دو بار دیں، گلے کی خخری، ناک میں جلن، ناک سے پتلی رطوبت بہنا، زکام اور انفلوئنزا کے لئے مفید ہے۔

انفلوئنزا کے لئے مرتبہ رس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، جس کا نسخہ ملیریا کے بیان میں لکھ آئے ہیں۔ وہاں ملاحظہ فرمادیں۔

ہومیوپیتھک علاج :- اکونائٹ ۳x ابتدائی حالت میں یہ بڑی کارآمد دوائی ہے۔ جب ٹھنڈے سرد اور خشک ہوا کے جھونکے یا پسینہ کا دب جانا اس بیماری کے اسباب ہوں، تو یہ دوائی نہایت مفید ہے۔ اس دوائی کی تین یا چار خوراکیں دینے سے ہی تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے۔

یالو کیمک علاج :- کالی فاس، کالی میور، نیٹرم میور، کالی سلف مفید ادویات ہیں۔
غذا و پرہیز :- شوربا، تری، مونگ کی دال، کدو، شلغم، پتلی کھجڑی وغیرہ کا استعمال مفید ہے۔ تیل کی ترش اور بلغم پیدا کرنے والی اغذیہ سے سخت پرہیز ضروری ہے۔

رومانٹیکا خسرہ - میزلز - (Measles)

تعریف مرض :- خسرہ صفراوی چیچک کے مانند ہوتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ خسرہ صفراوی ہوتا ہے۔ اور اس کے دانے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف چیچک کے دانے شروع میں نکلتے اور ابھر کر بلند ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ چیچک کے دانوں سے تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں اور چیچک کی نسبت آنکھوں میں کم نکلتے ہیں اور یہ ایک مستعدی بخار ہے۔

وجوہات :- چیچک کی طرح جب خون میں بطور عفونت غلیان پیدا ہو جاتا ہے، تو اس مرض کا حملہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایک کو خسرہ ہونے پر دوسرے کو بھی ہو جاتا ہے۔

علامات :- اس مرض میں نزلہ و زکام کے ساتھ تیسرے دو چوتھے روز چہرے اور جسم پر سرخ دانوں کے خوشے نمودار ہو کر چھوٹے یا ساتویں روز زمر جھا جاتے ہیں۔ عام طور پر بخار آٹھ دن کے بعد اتر جاتا ہے۔ اس وقت جسم پر بہت خارش ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں دانوں پر سے بھوسی کی مانند باریک باریک پھسلے جھڑتے ہیں، شروع میں سردی سے بخار، مانتھے میں درد، آنکھوں میں جلن و سرخی، چھینکوں کی زیادتی، کھانسی و زکام وغیرہ علامات ہوتی ہیں۔

ڈاکٹری علاج :- تمام ہدایات علاج چیچک پر عمل کریں، مریض کو سردی سے بچائیں، ورنہ سرسام و مونیہ کا خطرہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹری طریقہ علاج میں اس مرض کا کوئی خاص علاج دریافت نہیں ہوا، صرف علامات و عوارض کا علاج کیا جاتا ہے۔ مریض کو ایک غلیجہ ہوادار کمرے میں لٹائے رکھیں اور سردی سے محفوظ رکھیں، منہ اور ناک کو سوڈا بائی کارب کا رب کا گھول (سوڈا بائی کارب ۲۰ گریں، صاف پانی ایک پائینٹ) سے صاف کرتے رہیں، گلے میں بورک گلیسرین لگائیں اور آنکھوں کو بھی ۵ گریں فی اونس دے بورک لوشن سے صبح و شام دھویا کریں، اگر قبض ہو تو کوئی تیز جلاب نہ دیں بلکہ ملک آف میگنیشیا بلحاظ عمر مناسب مقدار میں دیں، بطور دوا لندن فارما کو پیا کا یہ نسخہ دیں :-

سوڈا سٹراس دس گریں، پنچراپی کاک پانچ منم، سیرپ ٹو لو پندرہ منم، گلیسرین پندرہ منم، پانی تاساٹھ منم، ایک ایک چھوٹا چمچ دن بھر میں تین بار دیں۔ اگر برا نکو مونیہ (عام طور پر خسرہ کے بعد مونیہ ہو جاتا ہے) ہو تو سلفا فٹا بازل یا سلفا ڈایازین استعمال کریں، شدید حالتوں میں پینی سلین کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، آنکھیں دیکھنے لگیں تو پروٹار گول لوشن دس گریں فی اونس والا ایک دو قطرے صبح و شام آنکھوں میں ڈالیں۔ یا ٹیرامائی سین آئی مرہم استعمال کریں، بے خوابی ہو تو اناسین یا سارٹیان یا کوڈوپائیرین کا استعمال کیا جائے۔

کمزوری زیادہ ہو تو برانڈی یا دہکی دس سے بیس بوند قدرے دودھ ملا کر دیں۔
ماڈرن ادویات :- ۱۔ اکیرومائی سین (Achro mycin) لیڈرے کا کیپ شولز ۲۵ ملی گرام دیں۔ یہ ٹیٹراسائیکلین کا دوسرا نام

ہے، بچوں کو بصورت ڈراپس یعنی تین یا چار ڈراپس دن میں تین یا چار بار دیں۔

۲۔ لیڈر مائی سین (لیڈرے) ایک کیپ شول، پیری ٹن (گلیکسو) چار ملی گرام، کرو سین (کروکس) آدھی ٹیکہ، تینوں کو باہم ملا کر پانی کے ساتھ دیں۔ یہ مرکب طریقہ علاج خسرہ کے ابتدائی درجہ میں نزلہ، زکام، بخار کے لئے مفید ہے۔

۳۔ کھانسی شدید کے لئے زلیفروڈل کف سیرپ دیں۔

۴۔ جسم کے دردوں کے لئے ایسپرین + وٹامن سی ہلکی مقدار میں دیں۔

۵۔ خارش و سوزش کے لئے منٹاڈل کریم (Mantadil) (بروزدلیکم) دن میں چار بار جسم پر لگائیں۔ جلد کے متاثرہ حصہ کو بے حس کر کے درد کو فوراً آرام دیتی ہے۔

۶۔ ٹرائی سین (Trycin) مرکب شارپ ڈویم۔ یہ ٹیڑا سائیکلین، ایڈروکلورائیڈ ہے۔ بچوں کو بلحاظ عمر دیں۔ یہ سرایت اور بخارہ کو فوراً کم کر دیتی ہے۔

۷۔ کھانسی کے لئے فین سیڈل شربت (Phensedyl) سے اینڈبیکز یا ٹکسی لکس شربت (Taxilix) یا کوریکس شربت (Corex) فزیر یا کف کیور شربت (Cofcure) یونیکم دن میں دو سے تین بار مناسب مقدار میں دیں، عام طور پر اس کا علاج نہیں کرتے، لیکن ممنوعہ وغیرہ ہو جانے پر فوراً مندرجہ بالا علاج معالجہ کیا جاتا ہے۔

یونانی علاج :- پانچ سال کے بچے کو یہ نسخہ دیں۔

عذاب تین دانے، مویز منقہ تین دانے، ملٹھی چھلی ہوئی دو ماشہ، لسوڑیاں دو ماشہ، خوب کلاں دو ماشہ، انجیر ایک عدد۔ ایک پاؤ پانی میں جوش دے کر جب نصف رہ جائے تو شربت عذاب ایک تولہ یا مصری شامل کر کے پلائیں۔ بڑے آدمی کو اس نسخہ کی دگنی مقدار دیں۔ اس نسخہ میں گاؤ زبان کا اضافہ بھی کیا جاسکتا ہے، کمزوری دل کی حالت میں خیرہ مروارید تین ماشہ چٹائیں۔ اگر دانے اچانک نکلنے بند ہو جائیں تو گرم پانی سے نہلا لیں یا ورق سونا ایک عدد، کیسر اصلی آدھی رنی، کستوری اصلی آدھی رتی، مروارید اصلی دورتی، عرق گاؤ زبان سات تولہ، عرق کیوڑہ تین تولہ میں گھول کر چھچھ بھر ہر آدھا گھنٹہ بعد پلائیں۔ اس مرض میں اگر دست آنے لگیں تو بی دانہ، السبغول ہر ایک تین ماشہ کا لعاب لے کر شربت صندل ایک تولہ یا شربت عذاب ایک تولہ ملا کر صبح و شام پلائیں۔ آرام ہونے کے بعد مریض کو کسی قسم کی بد پرہیزی نہ کرنے دیں۔ دانوں کو باہر نکالنے کے لئے انجیر بہت عمدہ دوا ہے۔

اگر دانے سیاہ برآمد ہوں تو مریض کو عذاب دو دانہ، مویز منقہ تین دانہ، گاؤ شانہ، خاکسی ایک ماشہ چھڑک کر پلائیں۔

آیور ویدک علاج بطرز چیمپک کے کریں۔

ہومیوپیتھک علاج :- ڈاکٹر گانڈی کا خیال ہے کہ مرض خسرہ میں آر سینکم دوائی نہایت مفید ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا اثر جادو نما ہوا کرتا ہے۔ مرض کی روک تھام اور اس کی پیچیدگیوں کو دور کرنے میں آر سینکم دوائی نہایت موثر ثابت ہوئی ہے۔ اگر مرض پیدا ہونے کی علامات یعنی نزلہ و کھانسی وغیرہ موجود ہوں تو پلٹلا دوائی دینے سے مرض بڑھنے نہیں پاتا۔ اگر بخار موجود ہو تو ایکنائٹ دی جاسکتی ہے۔ یہ بخار کو کم کر دیتی ہے اور بے چینی کو تسکین دیتی ہے، کھانسی کم ہو جاتی ہے اور دانے نکل کر مرض اپنا دورہ کم کر دیتا ہے۔

مریض کے آرام اور صفائی کا خاص خیال رکھیں، کسی قسم کی بد پرہیزی نہ ہونے دیں۔

غذا و پرہیزی :- سرد چیزوں سے سخت پرہیز کرائیں، بطور غذا دودھ وغیرہ دیں۔

کشمش پندرہ بیس عدد پانی سے دھو کر مریض کو دینا مفید ہے۔

راج یکھشتا۔ سل ووق۔ ٹیوبرکیولوسس (Tuberculosis)

ٹیوبرکیولوسس پرائیو پیٹیک، آیور ویدک، یونانی، ہومیو پیٹیک اور بالوکیک (پانچ پیٹینوں) کی بالتفصیل معلومات کے لئے ساتواں باب (سینے کی بیماریاں) دیکھیں صفحہ ۱۳۸

پاشان گردھب، گلسوئے، کن پیرے، میٹس (Mumps)

اسباب، علامات اور ڈاکٹری، یونانی و آیور ویدک علاج کے لئے دیکھیں کتاب ہذا چھٹا باب — "حلق کی بیماریاں" صفحہ ۱۱۸

روہنی۔ خناق و بانی۔ ڈفٹھریا، (Diphtheria)

دیکھیں کتاب ہذا کا چھٹا باب "حلق کی بیماریاں" صفحہ ۱۱۶

گردن تور بخار، سرسام بارد، سیری بڑو سیائل فیور

(Cerebro-Spinal-Fever)

دیکھیں کتاب ہذا کا پہلا باب "دماغ کی بیماریاں" صفحہ ۲۶

لال جور، سُرخ بخار، سکارلیٹ فیور (Scarlet-Fever)

تعریف مرض :- یہ ایک قسم کا سخت متعدی بخار ہے، جس میں مریض کا گلا متورم ہو جاتا ہے، اور بخار کے دو دن بعد جسم پر سُرخ سُرخ دھبے نکل آتے ہیں
وجوہات :- یہ مرض خون کے جوش سے پیدا ہوتا ہے، جس کا سبب ایک خاص قسم کا جرثومہ ہے، جو مریض کی جلد کی بھوسی، اس کے منہ لعاب یا سانس کے ذریعے تندرست آدمیوں میں سرایت کر جاتا ہے۔ مریض کے فرش، بستر اور کھانے پینے کے سامان وغیرہ سے بھی اس مرض کی چھوت لگ جاتی ہے۔

یہ مرض عام طور پر امریکہ و انگلستان میں ہوتا ہے، ہندوستان و پاکستان میں شاذ و نادر ہوتا ہے۔

علامات :- مرض کی چھوت لگنے سے تین دن سے آٹھ دن تک مرض چھپا رہتا ہے۔ پھر شدید بخار چڑھ جاتا ہے، سر میں سخت درد ہوتا ہے، اللہیاں آتی ہیں اور گلا دکھنے لگتا ہے۔ بخار دور ہونے کے بعد جلد پر سے بھوسی بھرٹنے لگتی ہے۔
ڈاکٹری علاج :- گلے کی سوجن کے لئے پوٹاسی کلورائیڈ پانچ گرین فی اونس پانی میں ملا کر غرضے کرائیں اور بورک گلیسرین یا سینڈل وڈ

روئی کی پھریری سے گلے میں لگائیں، احتیاطی طور پر سکارلیٹ فیورائی ٹاکسک سیرم تین ہزار تا چھ ہزار یونٹ کا عضلات کے اندر ٹیکہ کرائیں اور حملہ مرض کی حالت میں یہی سیرم بارہ تا تیس ہزار یونٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر نمونہ یا کھانسی ہو جائے تو مینی سلین کا استعمال کیا جائے، سلفا ڈرگز مثلاً پیپٹران یا سلفا ڈایازین وغیرہ کا مناسب مقدار میں استعمال کرنا نہایت مفید ہے۔

یونانی علاج :- مریض کو علیحدہ ایک صاف دھوا دار کمرے میں رکھیں، بطور دوا لعاب بی دانہ والی بھول ہر ایک تین ماشہ عرق مکو، عرق شاہترہ، عرق بید سادہ، عرق نیلوفر ہر ایک پانچ تولہ، شربت عناب، شربت شہتوت ہر ایک دو تولہ ملا کر پلائیں، اگر قبض ہو تو خمیرہ بنفشہ تین تولہ رات کو سوتے وقت کھلائیں۔

دل کی کمزوری کے لئے زہر مہرہ خطائی ایک ماشہ عرق گلاب میں گھس کر طباشیر سفید ایک ماشہ ہر ایک پس کر دونوں دواؤں کو شربت سیب دو تولہ میں ملا کر چلائیں۔ اگر گردن زیادہ متورم ہو تو اسے خوب سینک کر کے اوپر گرم روئی باندھ دیں، جب بخار دور ہو کر مریض کے جسم سے بھوسی اترنے لگے تو صبح و شام اس کے جسم پر روغن گل کی مالش کرتے رہیں۔

آیور ویدک علاج بطور یونانی علاج کے کریں۔

ہومیوپیتھک علاج :- ڈاکٹر ہنمین نے سرخ بخار کی روک تھام کے لئے سیلا ڈونا کو ہی اول درجہ کی دوا قرار دیا ہے، خنازیری مزاج کے مریضوں کو جب سرخ بخار کی شکایت ہو تو انہیں سلفر بڑا فائدہ کرتی ہے۔

برائی اونیا :- زبان سفید سر میں سخت درد اور جسم پر صاف طور پر دھبے نہ نکلتے ہوں یا نکل کر غائب ہو گئے ہوں، بخار کی شدت سے ہڈیاں ہو گیا ہو، سینے میں چھین والادرد ہو، بلغمی یا صفراوی قے ہو تو برائی اونیا مفید ہے۔ خوراک ۳ یا ۳۰ ہر دو گھنٹے بعد دیں۔ علاوہ ازیں جلیسی میم، رسٹاکس، کلکیر یا کارب، لیک سس، ایپس بھی مفید ادویات ہیں۔

ابتداءً مرض میں جب گلا متورم ہو جائے، جس کی وجہ سے مریض کو کسی چیز کے کھانے پینے میں تکلیف ہوتی ہو۔ اس کے لئے ایک گلاس پانی میں محوڑا سا عام کھانے والا نمک یا پشکڑی ڈال کر گرم کریں۔ پھر اس گھول سے صبح و شام غرارے دیں۔ بیرونی طور پر ٹیکور کرنا بھی مفید ہے۔

غذا پر سہیز :- آتش جو، کھچڑی، دال مونگ سادہ، شوربا۔ مگر کمزوری کی حالت میں غذا اور دوا مقوی دیں۔

اگنی رومنی، طاعون، پلگ (Plague)

تعریف مرض :- یہ مرض وبائی قسم کے کیڑوں سے پیدا ہوتا ہے، جس کا نام پلگ سبیلانی ہے، پلگ دراصل چوہوں کی وبا ہے، جو انسان کو طاعون زدہ چوہوں کے کاٹنے سے ہو جاتی ہے۔

وجوہات :- وبائی صورت اختیار کرنے سے پہلے یہ مرض چوہوں میں پھیلتا ہے، اور چوہے اس بیماری سے جب مرتے ہیں تو ان پسوؤں کے کاٹنے سے یہ مرض انسانوں میں پھیلتی ہے۔ اس مرض کا جرثومہ چھوٹا سا ہوتا ہے۔ یہ مرض چھوٹ لگنے سے تین سے پانچ روز کے اندر ظاہر ہو جاتا ہے۔

علامات :- خفیف طاعون میں بخار نہیں ہوتا، گردن یا بغل یا کنج ران کی گلیاں پھول جاتی ہیں، کبھی کبھی ان میں پیپ بھی پڑ جاتی ہے اور خفیف بخار بھی ہوتا ہے۔ شدید حملہ مرض میں سر کمزور اور جوڑوں میں زور کا درد ہوتا ہے، لرزہ کے ساتھ بخار بھی ہو جاتا ہے۔

پھر یا تو اس روز یا تین یا چار روز تک گردن، کنج ران یا بغل میں بدیں نکل آتی ہیں۔ ان میں زور کا درد رہتا ہے۔ بخار ۱۰۲ سے ۱۰۴ درجہ کے درمیان میں رہتا ہے بعض دفعہ بخار کی زیادتی سے ناک، منہ اور گدا اور پیشاب کے راستے سے خون آنے لگتا ہے۔ اس کو خونی طاعون کہتے ہیں۔ طاعون کی ایک اور قسم جس میں گلٹی وغیرہ نہیں ہوتی، اسے منویہ والا پلگ کہتے ہیں، اور اس کا اثر مریض کے پیچھے پر ہوتا ہے۔ اس میں پیچھے میں سوزش اور کھانسی پائی جاتی ہے۔ منویہ دے پلگ میں اس مرض کی تشخیص بذریعہ خوردبین مھوک سے ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ علاج ڈاکٹری۔ اگر پلگ پھیل جائے تو پلگ ویکسین کا ٹیکہ دوسری سی پھپھوں میں لگایا جائے، چوبوں کو مارنے کے بعد جلا دیا جائے، پلگ کے مریضوں کو دوسرے لوگوں سے علیحدہ رکھا جائے اور ان کی بلغم، خون، مھوک سب جلا دیا جائے، کپڑے وغیرہ بھی گرم پانی میں اُباے جائیں تاکہ مرض کی چھوٹ سے دوسرے افراد محفوظ رہ سکیں۔

جدید تحقیقات کے مطابق اس مرض میں پلگ کا سیرم دینا نہایت مفید ہے اور انٹی بائیٹک ادویات میں سے سٹریپٹومائی سین ایک گرم روزانہ مفید ہے۔ کھانے کے لئے سلفا تھایازول نہایت مفید ہے۔ دو گولیاں ہر چار گھنٹہ بعد دینی مفید ہیں۔ پانی زیادہ مقدار میں دیں اور ہر خوراک کے ساتھ مناسب مقدار میں سوڈا بیکارب ملا لیا جائے، سلفا تھایازول کے علاوہ سلفا ڈایازین بھی بہترین دوا ہے، بخار زیادہ ہو تو سر پر برف کی ٹوپی رکھیں، جسم کو نیم گرم پانی سے ہر گھنٹہ بعد اسفنج کریں، گلیٹیوں پر آیوڈکس (Iodex) یا ٹینکچر آیوڈین لگائیں، بائی فلوجسین کا پلاسٹر لگانا بھی مفید ہے۔ دل کمزور ہو تو بچوٹری یا کارڈیازول یا کورامین کا ٹیکہ کریں۔

چوبوں کو گھر سے بھگانے کے لئے آٹھ حصہ تار کول میں تیزاب گندھک ایک حصہ ملا کر چوبوں کے بلوں میں ڈالیں۔ چوبے اس کی گیس سے بھاگ جائیں گے۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ سلفا ڈایازین یا سلفا ٹرائیڈ ————— دو گولیاں ہر چار گھنٹہ بعد دیں۔

۲۔ سٹریپٹومائی سین سلفیٹ ایمبی سٹریٹن "ایس" (Ambistryn) سارا بھائی ————— سٹریپٹونیکس (Streptonex) ڈو میکس —————

میسٹریپٹون (Mystrepton) ایم ایس ڈی ————— سٹریپٹوڈوسن (Strepto Duocion) المبیک —————

سٹریپٹوڈی سین (Streptodicyn) ہندوستان انٹی بائیوٹک ————— کومائی سین (Comycin) گلیکو وغیرہ میں سے کوئی ایک دو گرام لے کر ڈسٹلڈ واٹر ۵ سی سی میں حل کر کے عضلاتی انجکشن دیں۔

۳۔ ٹیرامائی سین ایس ایف (Terramycin S.F.) فزریالیدر مائی سین (Ldermycin) لیڈرے ————— سو بامائی سین

(Subamycin) ڈیز ————— ریسٹیکلین (Resteclin) سارا بھائی وغیرہ میں سے کوئی ایک ٹریٹریسائیکلین کے دو کیپ شولر

ہر چھ گھنٹہ بعد دیں۔

۴۔ ٹرائی سین (مرکب شارپ ڈویم) ایک کیپ شولر، اسٹریپٹوٹریڈ (ایم بی) ایک ٹیکہ، دونوں کو ایک ساتھ پانی کے ہمراہ ہر دوسرے گھنٹہ بعد دیں۔ یہ مرکب دو اتمینوں قسم کے طاعون، گلٹی دار، عفونی، ذات ایلوئی کے لئے مفید ہے۔ اس سے گلٹیاں دور ہو کر بخار کم ہو جاتا ہے۔

یونانی علاج :- دبا کے دنوں میں پیتا دلائی چار رتی پانی میں گیس کر صبح کو پی لیا کریں، گلیٹیوں کو تحلیل کرنے کے لئے مغز املتاس ایک تولہ، جدوار چھ ماشہ، کالی زیری چھ ماشہ، ہری کو نقد حاجت پانی میں پیس کر نیم گرم صفا کریں، اگر گلٹی تحلیل نہ ہو تو پلٹس باندھیں۔

ٹینکچر جل دھنیا :- جل دھنیا ایک حصہ، ریکیٹ فائیڈ سپرٹ دس حصہ، دونوں کو ملا کر ایک شیشی میں ڈال دیں اور مضبوطی سے بند کر دیں تین روز کے بعد فلٹر کر کے چھان لیں۔

فوائد :- طاعون کے بخار میں اس منچر کی پانچ سے دس بوندیں ایک اونس پانی میں ملا کر گھنٹہ گھنٹہ کے وقفہ سے دینے سے طاعون کا بخار اُتر جاتا ہے۔

آیور ویدک علاج :- سارلیوادی آسو (بھیشج رتنا دلی) ایک تا دو تولہ برابر پانی میں ملا کر بعد از غذا دیں یا کیشور گوگل دودو گولی صبح و شام ہمراہ گرم پانی یا گلو کے کاڑھے سے دیں، بیرونی طور پر جاتیادی تیل یا نرگندی تیل کا استعمال کیا جائے۔

ہومیوپیتھک علاج :- بلاڈونا ۳ (مشرع مرض میں) ہیرسلفر ۳۰ اور مرکری ۶ (جب گلیٹوں کے اندر پیپ پڑ گئی ہو اور بخار شدید ہو) بیپٹیشیا ۶ اور آرسنک اہم ۶ اور سلفر مرض کہنہ کی حالت میں مفید ہیں۔ خارجی طور پر آرنیکا کا استعمال کیا جائے۔

بالوکیٹک علاج :- فیرم فاس (مشرع میں) کالی میور (مشرع میں اور درمیانی حالت میں) کلکیریا فاس (بے چینی و غنودگی مع بخار ہو) کلکیریا سلف (گلیٹوں میں مواد ہو) مفید ہیں۔

غذا و پرہیز :- غذا مقوی و زود مضغ دیں۔ دیر مضغ و گرم اغذیہ سے سخت پرہیز کریں۔

پرسوت جور۔ پرسوت کا بخار، پیورپرل فیور (Puerperal Fever)

دیکھیں کتاب ہذا چودھواں باب _____ امراض زنانہ اعضائے صفحہ ۳۶۹

اگنی و سترپ۔ سترخ باد۔ اری پلس (Erysipelas)

دیکھیں کتاب ہذا اٹھارواں باب _____ جلد کی بیماریاں، صفحہ ۴۹۶

لوٹ آنے والا بخار۔ قحط کا بخار۔ ری لیپ سنگ فیور

(Relapsing Fever)

تعریف مرض :- یہ ایک وبائی چھوت دار بخار ہے، جو لگاتار سات دن کے وقفہ کے بعد دوبارہ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ بار بار لوٹ آتا ہے۔ اس کا باعث مخصوص بیج دار جراثیم سپائیروکیٹس (Spirochetes) ہوتے ہیں اور چھوت کا ذریعہ جوئیں ہوتی ہیں یعنی جب جوئیں اس بخار کے مریض کا خون چوس لیں، تو یہ جراثیم تندرست انسان کے جسم میں پہنچا دیتی ہیں۔

وجوہات :- بخار کے زمانہ میں جوئیں مریض کا خون چوستی ہیں۔ تو یہ بیج دار جراثیم بھی ان کے جسم میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب یہ جراثیم پروار جو کسی تندرست انسان کے جسم میں رنگ کر پہنچ جاتی ہے۔ تو اس کے رنگنے سے انسان کھجلی محسوس کرتا ہے۔ اور کھجلائے سے جوں کو جلد پر کھل دیتا ہے۔ جس کے نتیجے میں یہ بیج دار جراثیم جلد کے اندر راہ پا لیتے ہیں، جب آلودہ انگلی سے آنکھوں کو ملا جائے تو یہ جراثیم آنکھ کے راستے سے بھی خون میں جا پہنچتے ہیں۔

علامات مرض :- مرض کی چھوت لگنے اور علامات ظاہر ہونے میں اوسط وقفہ سات روز کا ہوتا ہے، چنانچہ یکایک سردی سے بخار

ہو جاتا ہے۔ متلی اُتے اور اعضاء شکنی، جوڑوں میں درد و کمزوری ہوتی ہے۔ اکثر ساتویں دن بخار اُتر جاتا ہے۔ لٹے دنوں کے وقفہ کے بعد پھر مرض عود کر آتا ہے۔ اس مرض کے جراثیم خوردبینی معائنہ سے بخوبی دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس بخار کو ملیریا، ہڈی توڑ بخار، زرد بخار اور تپ محرقہ سے تشخیص کرنا چاہیے۔

علاج ڈاکٹری :- مریض کو علیحدہ کمرے میں رکھیں، بخار کی شدت کو کم کرنے کے لئے ٹھنڈے پانی سے اسفنج کریں اور فارماکوپیا ہسپتال ہائے سرکاری قدیم کا یہ نسخہ دیں :-
سپرٹ ایفٹر ٹائٹرو سالی ۲۰ منم، لیکرامیونیا ایسی ٹاس دو ڈرام، پوٹاسی ایسی ٹاس ۲۰ گرین، اکوا دو اونس، خوراک ایک اونس ہر چار گھنٹے کے بعد دیں۔

بخار کم ہونے پر کونین کا مناسب مقدار میں استعمال کیا جائے اور اس کا علاج بطر ملیریا ہے۔

سنکھیا کے مرکبات بھی اس مرض میں خاص طور پر مفید ہیں، سالورن یا نیو سالورن (این اے بی) مناسب مقدار میں بذریعہ وریڈی انجکشن دیں، جب کسی وجہ سے سنکھیا کے مرکبات کا انجکشن ممکن نہ ہو تو سٹوورسول (Stovarsol) دو ٹیکیاں دن میں تین بار براہ دہن کھلانا بھی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ علاج کا مناسب ترین وقت بخار کا ابتدائی دور ہوتا ہے، بعض دفعہ پینسیلین کے عضلاتی انجکشن بھی مفید ثابت ہوتے ہیں اور اس کی موجودگی میں سنکھیا کے مرکبات کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ اس مرض میں جدید انٹی بائیٹک ادویات آریو مائی سین اور ٹیرامائی سین بھی مؤثر ثابت ہوئی ہیں، فارماکوپیا ہسپتال ہائے سرکاری جدید کا یہ نسخہ "کونین کچر" بھی قحط کے بخار و عام ملیریائی بخاروں کے لئے نہایت مفید ہے۔

کونین کچر :- کونین سلفیٹ دس گرین، میگنیشیا سلفاس ۳۰ گرین، کلوروفارم واٹر ایک اونس، اسے ہمار منہ نہ دیں۔
دیگر :- کونین سلفاس دس گرین، ڈائیلوٹ سلفیورک ایسڈ دس منم، اکوا (پانی) تازہ ایک اونس۔ ایسی خوراک دن میں تین بار دیں۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ ٹرائی سین (ایم ایس ڈی) ۲۵۰ ملی گرام، ریڈوکسان (روش) ۵۰۰ ملی گرام، کیفی اسپرین (بائٹر) ۱۰۰ ملی گرام تینوں کو ایک ساتھ پانی کے ساتھ دن میں دو بار دیں۔ یہ دافع جراثیم ہونے کے علاوہ درد سر و ٹپھوں کے درد کو مفید ہے۔
کے لئے خاص دوا ہے۔

۲۔ میڈری بون (روش) ایک گولی، بنزوا ایک گولی، ریڈوکسان ایک گولی۔ تینوں کو پیس لیں۔ ایسی ایک خوراک صبح و ایک خوراک شام سمراہ تازہ پانی دیں۔

یونانی علاج :- حسب سم الفار یا جوہر سم الفار مناسب مقدار میں استعمال کریں۔ قرص طباشیری کا فوری کا استعمال بھی مفید ہے۔ کمزوری کے لئے خمیرہ مروارید یا خمیرہ گاؤ زبان عنبری ۵ ماشہ کا استعمال کریں، علاوہ ازیں ملیریائی بخاروں میں دی جانے والی تمام ادویات اس مرض میں مفید ہیں۔

آیور ویدک علاج :- مرتنچورس (رسیندر سار) ایک سے دو گولی ہمراہ شہد یا پانی یا عرق گاؤ زبان و عرق سولف دیں۔

ہومیو پیتھک علاج :- چائنا، رسٹاکس، برائی اونیا، برپ ٹیشیا، ایپیس، آرسنک الیم، مرکیورس کار مفید ادویات ہیں۔

حسب موقعہ استعمال کریں۔

بالو کیمک علاج :- فیرم فاس، کالی فاس اور کلکیریا فاس بہترین ادویات ہیں۔

مریض کی جسمانی صفائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کپڑے صاف سمقرے پہنائیں۔ ہر دوسرے دن تبدیل کر دیں، کیونکہ یہ بخار مختلف دوروں کی شکل میں آتا ہے۔ اس لئے بخار اتر جانے کے درمیانی وقفہ میں کڑی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خصوصاً کھانے پینے میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔

غذائلی و طاقت ور مثلاً دودھ، دودھ سوڈا، شوربہ و چائے وغیرہ کھانے کو دیں۔

ڈنڈک فیور، ڈی ٹور بخار، ڈنگو فیور (Dengue Fever)

تعریف مرض :- یہ ایک شدید متعدی وبائی بخار ہے جس میں ہڈیوں اور جوڑوں میں سخت درد ہوتا ہے۔ یہ بخار عام طور پر گرم علاقوں میں مخصوص پچھڑ کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔

وجوہات :- اس کا سبب ایک چھوٹا سا کرم ہے، جو کہ پچھڑ کے کاٹنے سے انسان کے خون میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ پچھڑ عام طور پر ان میں کاٹتے ہیں۔ یہ بخار عام طور پر مہلک ثابت نہیں ہوتا۔

علامات :- بخار میں پہلے سرد درد و آنکھوں اور کمر میں درد ہوتا ہے، مریض کمزور اور بے چین ہو جاتا ہے۔ تیسرے روز ہاتھ، ٹانگوں وغیرہ پر چھپاکی کی قسم کے سرخ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ بخار نیز ہو جاتا ہے۔ یہ حالت ایک دو روزہ کر دھبے ہٹ جاتے ہیں۔ ہفتہ کے اندر تمام علامت دور ہو جاتی ہیں۔

علاج ڈاکٹری :- اس بخار کا علاج عام ملیرمائی بخاروں کی طرح کیا جاتا ہے، بطور حفظہ مقدم مسہری لگا کر سونے کی ہدایت دیں، بھروسہ کو تباہ کر دیں۔ درد دور کرنے کے لئے سارپڈان، اناسین یا اسپروکا استعمال کریں یا کوڈوپارین دیں، ارگاپارین بھی اس مرض کے لئے مفید دوا ہے۔ بیرونی طور پر لینی مرٹ ٹرین ٹائٹن کی مالش کریں اور ملیریا بخار میں دی گئی ادویات و ہدایات پر عمل کریں۔ یونانی علاج :- تسکین حرارت کے لئے پیلہ تبرید دیں :-

مترہندی (املی) تین تولہ، آلو بخارا سات دانہ، رات کو پاؤ بھر پانی میں بھگوئیں، صبح کو اس کا نتھار لیں اور عرق کو "عرق بید سادہ" رقیق شاہترہ ہر ایک پانچ تولہ میں بیج کاسنی، مغز کدو ہر ایک چھ ماشہ کاشیرہ نکال کر لعاب بی دانہ تین ماشہ، شربت بنفشہ دو تولہ ملا کر پلائیں۔ تین روز تک یہ تبرید پلا کر پانچ روز تک منفع دیں۔

گل بنفشہ، گل نیلوفر، بھول گلاب، گاؤ زبان ہر ایک چھ ماشہ، اصل السوس، جڑ کاسنی، عنب الثعلب، شاہترہ ہر ایک پانچ تولہ، عنب دانہ، مترہندی دو تولہ، سب ادویہ کورات کو ڈیڑھ پاؤ پانی میں بھگو رکھیں، صبح مل چھان کر دو تولہ گل قند ملا کر پلائیں۔ سات روز کے بعد بخار اتر جانے پر اسی نسخہ میں سنار کی ایک تولہ، معزالمتاس پانچ تولہ، روغن بادام چھ ماشہ اضافہ کر کے جلاب دیں، بعد جلاب ایسی ادویہ دیں جو بخار کے زہریلے اثرات کو دور کرنے والی ہوں یا جب بخار میں کمی ہو تو یہ نسخہ دیں۔

زہر مہرہ، طباشیر، دانہ الاچھی خورد، ست گلو ہر ایک چھ ماشہ، کونین ڈیڑھ ماشہ، لعاب ایسبغول کے ہمراہ گولیاں بقدر بخود بنائیں۔ ایک ایک گولی دن میں تین بار دیں۔

آلیور ویدک علاج :- آئند بھیرورس (رسیندرسار) ایک رتی ہمراہ عرق گاؤ زبان یا شہد دیں، بیرونی طور پر نارائن تیل یا بانارائن تیل کی نیم گرم مالش کریں۔

ہومیوپیتھک علاج :- اکونائٹ نرپ (شروع مرض میں)، بیلاڈونا (سخت دردوں میں)، ایڈفاس (زیادہ تکلیف میں)، ارنگ البم، (خطرناک نقاہت کے ہمراہ جب شدید بے چینی اور گھبراہٹ ہو)، برائی ادنیا (پُرانی حالت میں)، مفید ادویات ہیں۔
 بالوکیک علاج :- نیرم سلف، نیرم میور، کالی سلف، فیرم فاس، کالی میور اور سیلشیا مفید علاج ہیں۔
 غذا و پرہیز :- مریض کی غذا کا خاص خیال رکھیں، غذا لطیف اور نرم استعمال کریں، دودھ، ساگودانہ، آتش جو اور چنے کا شوربا دے سکتے ہیں۔

شوشنگ بخور، ذات الریہ، پھیپھڑوں کا ورم، نمونیا، (Pnenmonia)

دیکھیں کتاب ہذا ساتواں باب ————— سینے کی بیماریاں صفحہ ۱۳۰
 کالا بخور، حمی اسود، کالا بخار، کالا آزار، لیشن مینی اے سش
 (Kalaazar-Leishmaniasis)

تعریف مرض :- یہ گرم ممالک کا مسعدی اور لمبا بخار ہے، جس میں مریض کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے اور اس کا رنگ مٹیالا یا کالا ہو جاتا ہے۔ اس لئے اسے کالا آزار کہتے ہیں۔
 وجوہات :- پہلے اس مرض کو پرانی قسم کا ملیریا بخار سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اب انڈین کالا آزار کمیشن نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دراصل یہ مرض ایک خاص قسم کے کھٹکوں کے ذریعہ پھیلتا ہے، جو مریض کا خون چوسنے کے بعد تندرست انسان کو کاٹتے ہیں اور کالا آزار کے کبرموں کو مریض کے خون سے لے کر تندرست اشخاص کے خون میں داخل کر دیتے ہیں۔
 علامات :- سردی سے بخار چڑھتا ہے، بخار کے دوران میں جگر اور تہی بڑھ کر پیٹ پھول جاتا ہے، مریض کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اس کی جلد پر سیاہی (کالک) پیدا ہو جاتی ہے۔ مرض کی زیادتی کی حالت میں ناک، منہ سے جریان خون ہوتا ہے اور پاؤں و ٹخنوں پر ماس آجاتا ہے۔

علاج ڈاکٹری :- اس مرض میں انٹی مونی کے مرکبات از حد مفید ثابت ہوتے ہیں، اس سلسلہ میں انٹی مونی ٹارٹریٹ ایک گرین، ایڈ ٹینک تین گرین، سوڈا بائی کارب چار گرین ————— ایسی پڑیہ روزانہ صبح دیں، یہ علاج عرصہ تک جاری رکھنا ضروری ہے، غذا لطیف، زود ہضم اور مقوی ہونی چاہیے۔ نیز کلیجی کھائیں، علاوہ ازیں انٹی مونی پوٹاسی ٹارٹریٹ اور انٹی مونی سوڈیم ٹارٹریٹ کے وریدی انجکشن بھی کئے جاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں نیوسٹائی بوسان، سالوسٹائی بوسان، سٹیلٹا مائی ڈین وغیرہ کئی ایک پیٹنٹ انٹی مونی مرکبات استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا وریدی انجکشن نہایت احتیاط سے کیا جانا چاہیے، کیونکہ کوئی قطرہ اگر ورید سے باہر رہ جائے تو سخت درد و سوزش کے علاوہ جلد مڑا ہو جاتی ہے۔ اس دوا سے کبھی خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اور کبھی پچیش و اسہال لگ جاتے ہیں۔ اس لئے اس علاج کو ایک ماہر ڈاکٹر کو ہی کرنا چاہیے۔

یونانی علاج :- اس کا علاج سودا کے متنبج و مسہل کے ذریعہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک لمبی مدت والا بخار ہے، اس لئے تیز جلاب سے پرہیز کرنا چاہیے، اصل مادہ مرض کو دور کرنے کے لئے یہ دوا از حد مفید ہے۔

بھسم سم الفار ایک رتی، کونین، نوشادر، مرچ سیاہ، مغز بیج کرنبوہ ہر ایک تین ماشہ، سب ادویہ کو پیس کر لمبوں کے رس سے کھل کر گولیاں
قدر پر رتی بنائیں، خوراک ایک سے دو گولی صبح و شام ہمراہ شربت بنفشہ و عرق گلاب دیں۔
آیور ویدک علاج بطر یونانی علاج کے کریں۔

ہومیوپیتھک علاج :- جب بخار رات دن میں دوبار ضرورتاً تیز ہو جائے تو آرسینک ایلیم، سہ پہر کو تیز ہو جائے تو ایپس، بھوک لگے
ور غذا کو دل نہ چاہے تو نکس و امیکا، نبض کانپتی ہو، دل میں دھڑکن، کھانسی خشک یا تر ہو تو کلکیریا کارب، بخار ہر وقت چڑھتا رہے
نہ سے بدبو آئے تو کیپیکم، مریض ڈبلا پتلا اور کمزور ہو تو نیٹرم میور (اسے کچھ عرصہ استعمال کے بعد کبھی کبھی بند کر دینا چاہیئے۔ بڑھی ہوئی تلی
رکم کرنے کے لئے نیٹرم میور بے حد مفید ہے)، جب معدے کی شکایت بڑھ رہی ہو تو نیٹرم سلف، جگر، طحال متورم ہوں، جسم سیاہ پڑ
ئے تو کالی میور بہترین دوا ہے۔

غذا و پرہیز :- ثقیل و دیرینہم غذاؤں سے پرہیز ضروری ہے، جہاں تک ہو سکے، مریض کو ہلکی و زود ہضم غذا دیں۔

بالو مکھشا جور ریت کی مکھی کا بخار، سینڈ فلائی فیور (Sand-Fly-Fever)

تعریف مرض :- اس بخار کو تین دن یا پانچ دن کا بخار بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ بخار ایک چھوٹی مکھی کے کاٹنے سے شروع ہوتا ہے، اس
اے سینڈ فلائی فیور اور اردو میں ریت کی مکھی کا بخار کہتے ہیں۔

وجوہات :- یہ خاکی رنگ کی چھوٹی سی مکھی اکثر رات کے وقت اندھیرے میں خاص کر ناک آنکھ یا کان پر کاٹ لیتی ہے، یہ مرض پنجاب،
سرگرم، انڈیا، ایران، عراق اور عرب وغیرہ میں اکثر پایا جاتا ہے، یہ بخار تین روز یا پانچ روز یا سات روز رہتا ہے، موسم خزاں میں ستمبر
کے نو مہر تک یہ وبائی صورت اختیار کرتا ہے، موسم بہار میں اپریل سے لے کر جون تک اس کا زور نسبتاً کم ہوتا ہے۔

علامات :- سردی سے بخار نہیں چڑھتا، البتہ بعض اوقات معمولی سردی سی محسوس ہوتی ہے، سردی شدید ہوتا ہے، تمام جسم میں بھی
ہوتے ہیں، حرارت ۱۰۳ سے ۱۰۴ درجہ فارن ہائیٹ تک بڑھ جاتی ہے، چونکہ یہ بخار بھی ملیریا کے موسم میں ہوتا ہے، اس لئے
مخالطہ لگ جاتا ہے۔ لیکن یہ بخار ایک آسان طریقہ سے پہچانا جاسکتا ہے، کیونکہ ملیریا بخار کی نسبت اس میں نبض تیز نہیں ہوتی۔
حفظ مالتقدم :- مریض اور تندرست آدمیوں کو اس مکھی سے بچانے کے لئے باریک ململ کی مچھردانی لگوائیں، کیونکہ عام جالیوں سے
ی اندر چلی جاتی ہے، گھر میں اندھیرا نہ ہونے دیں، مچھڑا سا کافور پاس رکھیں، مکھی کو نکلنے کے لئے عطر قرحاکی دھونی دیں۔
سٹر و نیل آیل سے مرکب کسی تیل کو شنگے، ہاتھ پاؤں پر مل کر سوئیں، مکانوں کے اندر فلت اور ڈی، ڈی، ٹی چھڑکیں۔

علاج ڈاکٹری :- شدید درد کی حالت میں ایسپی پائرین (Esgipyrin) کی گولیاں دیں یا ڈوڈرس پوڈر مناسرہ، مقدار میں دیں،
رض میں انٹی ملیریا ادویات بیکار ہیں، نبض دور کریں۔ اس مرض میں علامات کا بھی علاج کیا جاتا ہے۔

یونانی علاج :- مریض کو آرام سے بستر پر لٹائیں اور قبض دور کرنے کے لئے خمیرہ بنفشہ دو تولہ، ہمراہ عرق گلاب دس تولہ کھلائیں
کے بعد یہ نسخہ دیں :-

مغز تخم کدو، مغز تخم خیارین، بیج کاسنی ہر ایک ۹ ماشہ، ان سب ادویہ کا عرق نیلوفر، عرق کاسنی، عرق بید مشک، عرق کیوڑہ ہر ایک
تولہ میں شیرہ نکال کر اس میں شربت لمبوں دو تولہ ملا کر پلائیں یا نار جیل دریائی ایک ماشہ، زہر مہرہ خطائی ایک ماشہ، گلاب اور بید مشک

میں گھس کر اس میں شربت انارین دو تولہ ملا کر مریض کو پلاتے رہیں، مکھی کاٹنے والی جگہ کو سرکہ سے دھوئیں اور کانور کو سرکہ میں حل کر کے اس جگہ پر لگائیں۔

آیور ویدک، ہومیو پیتھک و بالوکیک علاج بطور گنٹھیا کے بخار کے کریں۔
غذا و پرہیز: غذا لطیف اور زود ہضم مثلاً آش جو سادہ یا ترش، پتلی کھجڑی، ساگودانہ، شور با سادہ وغیرہ استعمال کرائیں، قابض اور ثقیل اشیاء سے پرہیز کرائیں۔

چوہے کاٹے کا بخار، رائٹ بائٹ فیور (Ratbite Fever)

تعریف مرض :- یہ ایک قسم کا شدید بخار ہے جو چوہے یا چھپھوند کے کاٹنے سے پیدا ہوتا ہے، قدیم طبی کتب شست اور اکیر اعظم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔

وجوہات :- یہ پُرانی قسم کا بار بار لوٹ آنے والا بخار ہے جو چوہے کے کاٹنے سے ایک جرثومہ سپیری ہائی نس (Spirill) سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ بیماری جاپان، لنکا، انگلستان، اٹلی اور امریکہ میں پائی جاتی ہے۔

علامات :- چوہے کے کاٹنے سے تین ہفتہ بعد یہ بخار ظاہر ہوتا ہے۔ اس عرصہ میں زخم اچھا ہو جاتا ہے اور زخم کے مقام پر درد ہونے لگتا ہے اور مقام مرض پر سوجن ہو کر آبلے پڑ جاتے ہیں، پھر آبلے ٹوٹ کر زخم بن جاتے ہیں، مریض کے سر میں درد ہوتا ہے، بخار کی حرارت ۱۰۴ درجہ تک ہوتی ہے، جسم پر لال رنگ کے دورے پڑ جاتے ہیں، کبھی بغل اور جنگا سہ کے غدود پھول جاتے ہیں، اور جسم میں درد ہونے لگتا ہے۔ عام حالتوں میں بخار ایک سے چار دن تک یا بارہ دنوں تک چڑھتا رہتا ہے، اس کے بعد اتر کر سات آٹھ دن کا وقفہ دے کر پھر دوبارہ چڑھ جاتا ہے۔ اس طرح کئی ہفتے بلکہ کئی مہینے تک اس کے دورے ہوتے رہتے ہیں۔

علاج ڈاکٹری :- جس جگہ چوہے نے کاٹا ہو، اس جگہ کو کاسٹک لوشن سے جلادیں، جدید ادویات میں مینی سلین اس مرض کا مؤثر علاج ہے، پانچ لاکھ چھ گھنٹہ بعد یا پردکین مینی سلین چار لاکھ ۲۴ گھنٹہ کے بعد دیں۔

کھانے کے لئے سلفا ڈایازین یا سلفا تھایازول چار سے چھ گولی تک روزانہ دیں یا سپٹران گولیاں دیں، بیرونی مقام مرض پر مینی سلین مریم یا آریو مائی سین لگائیں۔

ٹیکے سے علاج :- نیو سالورسن، سلفا رسی نول یا این، اے بی کے انجکشن اس بیماری کے لئے خاص طور پر مفید ہیں۔
یونانی علاج :- جس جگہ چوہے نے کاٹا ہو، اس مقام پر سینگیاں کھجوائیں، پھر سرکہ کے گھول سے دھو دیں، کھانے کے لئے لہسن پیاز کا استعمال کریں، سم الفار کے مرکبات اس مرض میں نہایت مفید ہیں۔ شدید بخار کو دور کرنے کے لئے قرص کانور تین ماشہ، شربت انارین ایک تولہ میں ملا کر کھلائیں، اوپر سے آب کاسنی تازہ مردق ہر ایک سات تولہ، سکجین سادہ تین تولہ میں ملا کر پلائیں اور کشتہ سم الف ہر چارول مویر منقی میں رکھ کر کھلائیں۔

آیور ویدک علاج :- سنکھیا بھسم کے مرکبات دیں۔
ہومیو پیتھک علاج :- نیٹرم میور (سر میں سخت درد ہو، بخار بچھا نہ چھوڑتا ہو)، آر سینکم البم (بخار کا عرصہ بہت لمبا ہو جائے، کمزور بے حد بڑھ جائے)، نیٹرم سلف (شدید درد سر بخار بہت تیز، صفراوی تئیں آرہی ہوں)، سپائی جیلیا (نبض ٹھہری ہوئی چلے، خشک کھال

ہو، گلے میں درد ہو، مفید ادویات ہیں۔

غذا و پرہیز۔ غذا لطیف اور سریع الهضم دیں، دیرینہ غذا سے سخت پرہیز کریں۔

مالٹا جور، لہر دار بخار، حمی متموجہ، مالٹا فیور (Malta Fever)

حمی جبالیہ، ماؤنٹن فیور، اینڈیولنٹ فیور (undulant fever)

تعریف مرض :- یہ ایک نسیم کا مسلسل بخار ہے جو کسی خاص قاعدہ کا پابند نہیں، یہ غیر منضبط طور پر بار بار حملہ کرتا ہے اور عام طور پر دو دو تین تین مہینہ میں اور کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ عرصہ تک اس کے دورے ہوتے رہتے ہیں، جسم پر گرمی دانے نکل آتے ہیں، جوڑوں میں درد ہوتا ہے اور تلی بڑھ جاتی ہے، چونکہ اس میں حرارت لہر دار ہوتی ہے، یعنی شام کو تیز اور صبح کو کم، اس کو لہر دار بخار بھی کہتے ہیں۔

وجوہات :- یہ بخار اکثر بکریوں کا کچا دودھ پینے سے ہی ہوا کرتا ہے۔ دودھ دوہنے والوں کو ایسی بیماریاں یا ان کے دودھ کو چھوتے رہنے سے بھی مالٹا فیور ہو جاتا ہے، بکری کے علاوہ مالٹا فیور کے جراثیم گائے میں بھی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عورت اس مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس کے شفا یاب ہونے کے بعد بھی لمبے عرصے تک اعضائے تناسل میں اس بخار کے جراثیم موجود رہتے ہیں اور ایسی عورت سے علاج کرنے کی حالت میں مرد کو بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔

علامات :- جب اس مرض کے جراثیم کسی تندرست جسم میں داخل ہوتے ہیں تو وہ مہفتہ کے اندر ہی اندر برصے رہتے ہیں، دو مہفتہ کے بعد عام طور پر بخارات کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، ہر روز شام کو بخار کی حالت تیز اور صبح کے وقت کم ہوتی ہے، چوتھے یا پانچویں روز بخار کا درجہ ۳۰ تک پہنچ جاتا ہے، نبض تیز چلتی ہے، سر اور تمام جسم میں درد ہوتے ہیں، زبان پر سفید رنگ کا میل جم جاتا ہے، بھوک نہیں لگتی، قبض ہوتی ہے، تلی بڑھ جاتی ہے، تمام جسم خاص طور پر پیٹ پر باجرے کی طرح دلنے نکل آتے ہیں، اس لئے بعض طبیب موتی جھرہ مبارکی سے غلطی کھاتے ہیں۔

علاج ڈاکٹری :- درد دور کرنے کے لئے فینٹین اور کیفین مناسب مقدار میں دیں۔ اسٹریپٹومائی سین انجکشن اور سلفا ڈیازین کے خوردنی استعمال سے بخار کو آرام آ جاتا ہے، جدید تحقیقات کے مطابق آریو مائی سین بھی اس مرض کا موثر علاج ہے۔ اسے خالی پیٹ استعمال کریں۔ اس کی جگہ ٹیرامائی سین بھی استعمال کر سکتے ہیں، بخار کی تیزی کو کم کرنے کے لئے پانی سے اسفنج کیا جائے، ماؤنٹن جوروں پر سنیک کیا جاتا ہے۔

یونانی علاج :- مرورید ۲۰ عدد، مویر منقی ۲ عدد، جادتری ۳ ماشہ، پیس کر گولیاں بقدر سخود بنائیں اور اوپر ورق سونا چڑھائیں، ہر بار گھنٹہ بعد ایک گولی کھلا کر اوپر سے یہ مطبوخ پلائیں :-

مویر منقی ۵ عدد، لسوڑیاں ۷ عدد، طمعی چھلی ہوئی ۶ ماشہ، خوب کلاں شدہ ۵ ماشہ، گل گاؤ زبان ۳ ماشہ، عناب ۵ دانہ، انجیر ایک دانہ جوش دے کر پلائیں۔ یا

خمیرہ مرورید ۵ ماشہ کھلا کر اوپر سے عناب و لاجبی ۷ عدد، مویر منقی ۵ عدد، انجیر ایک عدد، گل گاؤ زبان ۶ ماشہ، گل گاؤ زبان ۳ ماشہ،

تخم خیار بن ۶ ماشہ، خاکسی ۵ ماشہ، سب ادویہ کو ایک پاؤ پانی میں جوش دے کر صاف کر کے مصری ملا کر پلائیں۔
اگر مریض کو تھے زیادہ آتی ہو تو برف کے ٹکڑے چسوائیں یا زہر مہرہ تین ماشہ، نار جیل دریائی تین ماشہ، عرق گلاب اور عرق بید مشک سے
پس کر بار بار پلائیں۔

آیور ویدک علاج بطر یونانی طریقہ علاج کے کریں۔
ہومیو پیتھک علاج :- رسٹاکس مالٹانیور کی لاثانی دوا ہے سر میں شدید درد ہو۔ گھبراہٹ دے چینی پانی جائے، کمر اور دیگر
اعضار میں درد کی شکایت موجود ہو، قبض اور پیٹ میں نفخ رہے، زبان کی رنگت بھوری پڑ گئی ہو تو مفید ہے، خوراک ۳۰ یا ۲۵
ہر ایک یاد رکھنے بعد دیں۔

نوٹ :- بخار کے شروع ہوتے ہی مریض کو بستر پر لٹائے رکھیں، اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کی ممانعت کر
دیں۔ اس طرح مکمل آرام ملنے سے مدت مرض کم ہو جاتی ہے۔
غذا و پیرہیز :- شروع میں مونگ جو کہ پانی میں پکا کر اس کی آتش بنا کر پلائیں۔ اگر بخار تیز ہو تو آتش جو اور آتش مونگ ملا
کر پلائیں یا گیسوں کی چپاتی یا مونگ یا موٹھ کی دال دیتے رہیں۔
اس مرض میں جلد فائدہ کے لئے آرام ضروری ہے۔

پریت جور، زرد بخار، یلوفیور (Yellow Fever)

تعریف مرض :- یہ ایک مسم کا شدید بخار ہوتا ہے جو جنوبی جزائر غرب الہند اور مغربی افریقہ میں عام پایا جاتا ہے۔ علاوہ ان
دوسرے گرم ملکوں میں بھی یہ پایا جاتا ہے۔ اس میں اکثر یرقان اور البیومی نوری کی تکلیف بھی ہو جاتی ہے۔
وجوہات :- اگر شروع بخار سے تین دن تک مریض کو ایک خاص مسم کا پھر جس کو ایڈس (Aedes) یعنی زرد بخار کا پھر کہتے ہیں
کاٹے تو پھر قریباً اس روز کے بعد اس بخار کا دائرس (غیر مری جراثیم) تندرست اشخاص کے خون میں پہنچا دیتا ہے، جس سے وہ
اس بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ بخار اگر کسی کو ہو جائے تو پھر دوبارہ یہ بخار نہیں ہوتا۔
علامات :- اچانک سردی سے بخار ہو جاتا ہے، آبکائیاں اور قہیں آتی ہیں، فے میں ایک خاص مسم کا زرد رنگ کا گرد پانی نکلا
ہے، نبض تیز چلنے لگتی ہے، اکثر حرارت ۱۰۱ سے ۱۰۵ درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ پیشانی، کمر اور معدہ کے منہ پر سخت درد ہوتا ہے
تیسرے چوتھے دن قے کی رنگت عام طور پر کالی ہو جاتی ہے، اس دوران میں مریض کو یرقان کی تکلیف ہو جاتی ہے، پیشاب میں البیومی
زیادہ مقدار میں خارج ہونے لگتا ہے، پانچویں چھٹے دن بخار اتر جاتا ہے یا دوبارہ پھر چڑھ جاتا ہے۔ دوبارہ بخار ہونے کی حالت
یرقان خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے۔ مریض کے ناک، منہ، مقعد (گڈا) سے خون بہنے لگتا ہے، مریض بے ہوش ہو جاتا ہے یا پھر
تشنگ پیدا ہو کر مریض کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔

علاج ڈاکٹری :- مریض کو مسہری میں پھروں سے محفوظ رکھیں، بستر پر لٹائے رکھیں، قبض، درد کرنے کے لئے ہلکا نمکین جلد
دیں یا اینا کریں۔ اگر بخار ۱۰۳ یا ۱۰۴ درجہ پر ہو تو ٹھنڈے پانی سے اسفنج کریں، پیشاب بند ہو جائے تو گردن پر سینک کریں۔ شدید کمزوری
کی حالت میں سپرٹ ایونیا، ایرومیتک، سمسم ایک گھونٹ پانی میں ملا کر دیں یا کورامین کا انجکشن دیں، گلوکوز استعمال نہ کریں۔ اگر جریان خود

ہو تو ہیمولین دس سی سی کا ٹیکہ خوردنی طور پر دودھ یا پانی میں ملا کر دیں اور اس بخار میں صرف علامات کا علاج کیا جاتا ہے، کیونکہ اس بخار کا کوئی شافی علاج نہیں ہے۔

یونانی علاج :- جب سیاہ رنگ کی قے بکثرت آنے لگے تو نارجیل دریائی ایک تولہ، زہر مہرہ خطائی ایک تولہ، طباشیر ایک تولہ، عرق کیوڑہ میں کھل کر کے شربت لیموں ایک تولہ ملا کر قدے قدے پلائیں، پیشاب بند ہو جائے تو چوہے کی سنگنی چھ ماشہ، شورہ قلمی چھ ماشہ پانی میں پیس کر پیڑو پر لپیپ کر لیں، بے خوابی کو دور کر کے روغن کدو یا روغن خشخاش کی سر پر مالش کریں۔

اگر بخار شدید ہو تو قرص طباشیری کا نوری تین ماشہ، شربت انارین یا شربت لیموں ڈیڑھ تولہ ملا کر چٹائیں اور اوپر سے تخم کاسنی، تخم کاہو، تخم ہندوانہ، زرشک ہر ایک چھ ماشہ کا شیرہ، عرق بید سادہ، عرق بید مشک، عرق کیوڑہ، عرق مکو، عرق نیو فر ہر ایک چار تولہ، میں نکال کر اس میں سکنجین بزدری دو تولہ ملا کر پلائیں۔ دل کی کمزوری کے لئے دوا المسک بار دلفندرا ایک ایک ماشہ صبح و شام ہمراہ عرق گاوزبان و بید مشک ہر ایک پانچ تولہ دیں۔

آیور ویدک علاج :- اگر جریان خون ہو تو اشیر آسو (شارنگدھر) آدھاتا دو تولہ برابر تازہ پانی ملا کر بعد از غذا دیں یا چندن آدی چورن اپار چار ماشہ صبح و شام ہمراہ شربت انجبار دیں، سخت کمزوری کی حالت میں کستوری بھروس برہت (بھیشج رتناولی) ایک رتی ہمراہ شہدیا دودھ دیں۔

ہومیوپیتھک علاج :- اکونائٹ نرپ (شروع مرض میں)، بلاڈونا و آرسینک ایلپ (زیادہ تکلیف میں)، برائی اونیا و کمیومیل (رانی حالت میں)، استعمال کی جاتی ہیں۔

بالوکیماک علاج :- شروع مرض میں نیٹرم سلف، شدت بخار میں فرم فاس مفید ادویات ہیں۔ غذا اوپر سہیز :- زرد بخار میں عام طور پر آبکائیاں اور قسین زیادہ آیا کرتی ہیں۔ اس لئے ایسی حالت میں مالٹا، سنگڑہ اور انار وغیرہ کا دس نمک اور کالی مرتح ملا کر پلا دینا چاہیے، اگر آبکائیاں بند ہو جائیں پھر دودھ، چائے، ٹبل روٹی شے سکتے ہیں، بخار کم ہو جائے تو بطور غذا شوربا، دلیہ پاتی، مونگ کی دال اور مکی سبزیاں دیں، تازہ پھلوں کا استعمال بھی ٹیند ہے۔ دیرینہ غذیہ سے سخت پرہیز کریں۔

رکت دوشی جوڑ عفونی بخار سیپٹک فینور (Septic Fever) سیپٹی میا

(Septi Caemia)

تعریف مرض :- یہ ایسا بخار ہے جو خون (رکت) میں بکتر یا داخل ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔
وجوہات :- عام طور پر سٹریپٹوککس، سٹفلوککس، نیوموککس، منیگوککس، انفلوئنزا وغیرہ اقسام کے ہونے میں، یہ جراثیم یا کسی جوڑے یا زخم یا منہ کے راستے سے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، کئی بار بچہ پیدا ہونے کے بعد زچہ کی بچہ دانی پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں، کئی بار کسی نفس کو چیر پھاڑ کرتے وقت انگلی پر زخم لگ جانے سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے عفونی بخار اور پیپ کے بخار چونکہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، اس لئے دونوں امراض کا کامیاب علاج ایک جیسا ہی ہے۔

علامات :- یہ بخار بہت زور کا ہوتا ہے، نبض تیز ہوتی ہے، سانس تیز تیز چلتا ہے، سخت بے چینی ہوتی ہے۔ عام طور پر چودہ دن کے اندر بخار کم ہو جاتا ہے۔

علاج ڈاکٹری :- مینی سلین یا پروکین مینی سلین کا استعمال موثر علاج ہے، کھانے کے لئے سلفا ڈایازین یا سلفا تھایازول وغیرہ کا استعمال کریں۔ مریض کو آرام سے لٹائیں اور اصل سبب مرض کو معلوم کر کے اس کے مطابق علاج کریں۔

یونانی علاج :- خلطوں کی اصلاح کریں، یعنی خون، بلغم، سودا، صفرا، جس خلط کا غلبہ ہے، اس کے مطابق علاج کیا جائے اور اس مرض میں مصفی خون ادویہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لئے تصفیہ خون کی ادویہ جو مریض کے موافق ہوں، استعمال کی جائیں۔ یہ عرق بہت مصفی خون ہے شامترہ، چرایتہ، سر بیچو کہ، صندل سرخ، صندل سفید، منڈی، ہرڑ سیاہ ہر ایک تین تولہ، چھلکا جڑ کچنال، چھلکا اندرونی درخت نیم، نیم، چھلکا مولسری، جوانسہ، دودھی کلاں، برادہ شیشم سرخ، انیتوں، چھلکا بہیڑہ، چھلکا ہرڑ، چھلکا بکائون ہر ایک چھ تولہ، پانی پندرہ سیر میں بھگو کر چھ سیر عرق نکالیں۔ چھ تولہ صبح و شام دیں۔

آیور ویدک علاج :- مرتنجر رس (رسیندر سار) ایک سے دو گولی ہمراہ عرق گاؤ زبان دیں یا ابرک بھسم کا استعمال کریں۔

ہومیوپیتھک علاج :- اکونائٹ (شرع مرض میں)، پلسٹا (بیماری کی پُرانی صورت میں) استعمال کرنا مفید ہے۔

بالوکیٹک علاج :- فیرم فاس اور کالی فاس مروج ہیں۔

غذا و پرہیز :- زود ہضم و مقوی غذا دیں، ثقیل غذاؤں سے پرہیز کریں، زخم کو کسی انٹی سپٹک گھول سے دھوئیں، آتش جو، آتش بونگ، شورباتے بچہ مرع جو زرشک یا انار دانہ سے ترش کیا ہوا ہو دیں۔

رکت مُوتَر جُور، خونی پیشاب سے آنی والا بخار، بلیک واٹر فیور

(Black-Water-Fever)

تعریف مرض :- اس بخار میں خون کے سرخ دانے شکستہ ہو کر سیاہ ہو جاتے ہیں اور پھر پیشاب کے ساتھ خارج ہوتے ہیں۔

وجوہات :- بلیک واٹر فیور وبائی طور پر پھیلا کرتا ہے، جب مسافر دوسرے ممالک سے ایسے وبائی مقام پر پہنچیں، جہاں یہ بخار پھیلا ہو ہو تو فوراً مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مشرقی و مغربی افریقہ، برما، فلسطین اور آسام میں یہ بخار کثرت پایا جاتا ہے، یہ بخار، تھکاوٹ، کمی غذا، شدید دماغ و جسمانی محنت، کونین کے زیادہ استعمال، طیرانی زہر سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اس بخار میں کونین کی کم مقدار بھی زہریلا اثر پیدا کرتی ہے۔

علامات :- معمولی سردی لگ کر زور کا بخار چڑھ جاتا ہے، پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، لیکن اس سے بخار نہیں اترتا، صفراوی قہیر آتی ہیں۔ سر، کمر، جگر اور تلی کے مقام پر سخت درد ہوتا ہے، پیشاب گاڑھا اور کالے رنگ کا آتا ہے اور آخر میں بند ہو جاتا ہے۔ اس مرض میں پیشاب کے ساتھ زیادہ مقدار میں خون کا آنا، یرقان اور سچکی آنا اس مرض کی خاص تشخیصی علامات ہیں، مرض کی کثرت میں خونی قے یا پیشاب ہر سمیت پیدا ہو کر مریض تلف ہو جاتا ہے۔

علاج ڈاکٹری :- جب بھی بلیک واٹر فیور کا شبہ ہو، اسی وقت کونین اور اس سے متعلقہ تمام ادویات بند کر دی جائیں، بارے واٹر

گلوکوز یا دودھ اور سوڈا بار دیتے رہیں یا سوڈا بائیکارب، ۱۰ گریں، گلوکوز ۱۲ ڈرام ایک پائینٹ پانی میں ملا کر بھٹور اٹھوڑا پلاتے رہیں۔

جدید ترین ادویات میں گارڈی نل (Gardenal) ۱۰ گریں دن میں تین بار یا میوئی نال کا استعمال کیا جائے، جب پیشاب کی رنگت

صاف ہو جائے تو اس کا استعمال بند کر دیا جائے، اگر پیشاب بند ہو جانے کا خطرہ ہو تو پٹیوٹ یا اٹ این ایک سی سی کا عضلاتی انجکشن دیں۔ اس مرض میں جسم پر سرد پانی کا استنجن غیر مفید ہے اور تمام پسینہ آور ادویہ یعنی اسپرین اور انٹی پائیرین کے مرکبات مضر ثابت ہوتے ہیں۔

یونانی علاج :- سوڈا بائیکارب، ۳ گریں، اگلو کو زچھ ڈرام کو آدھا پائینٹ پانی میں گھول کر چھپچھپلائیں، آتش جو دودھ ملا کر دیں۔
 ڈاواٹر کا استعمال بھی مفید ہے مریض کو آرام سے لٹائیں اور پائینٹی کی طرف سے چار پائی کو اوپچا رکھیں۔ اس مرض میں کھاری ادویات
 بایت مفید ہیں۔

آیور ویدک علاج بطر یونانی طریقہ علاج کے کریں۔

ہومیوپیتھک علاج :- بلیک وائٹ فیور کے لئے آرنیکا مروج ہے۔ سر میں شدید درد اور تمام جسم دکھتا ہو، مریض نرم
 لہ کی تلاش میں بستر پر کروٹیں بدلتا ہو، پافانہ بے اختیار آئے، پیشاب میں خون ملا ہو ہو۔ جسم پر خون کے سے سرخ نشان پڑ گئے
 ۳ ہر ایک یا دو گھنٹے بعد دیں، علاوہ ازیں کاربو و سچ، جیلیسی سیم، میڈرو نیم، مرکبوس کار کا استعمال بھی حسب موقع
 مفید ہے۔

غذا پر مہر :- آتش جو وغیرہ سیال غذا دیں۔ دیرینہم اغذیہ سے سخت پرہیز کرائیں۔

آورن پروا، درد پہلو، ذات الجنب، پلیوریسی (Pleurisy)

دیکھیں کتاب ہذا، ساتواں باب ————— سینے کی بیماریاں صفحہ ۱۳۴

ایک دن کا جور، ایک روزہ بخار، فیبری کیولا، (Febricula)

تعریف مرض :- اس مرض میں رنج و غم، فکر، تھکان، سخت محنت اور زیادہ خوشی سے ایک دن کا بخار ہو جاتا ہے۔
 وجوہات :- ایک دن کے بخار کی کئی قسمیں اور وجوہات ہیں، ۱۔ غم کا بخار، ۲۔ اہتمام کا بخار، ۳۔ فکر کا بخار، ۴۔ غصہ کا
 ۵۔ جاگنے کا بخار، ۶۔ نیند اور آرام کا بخار، ۷۔ خوشی کا بخار، ۸۔ خوف (ڈر) کا بخار، ۹۔ تھکاوٹ کا بخار، ۱۰۔ قے، اسہال یا
 مد کے سبب سے بخار، ۱۱۔ درد کا بخار، ۱۲۔ غشی کا بخار، ۱۳۔ بھوک کا بخار، ۱۴۔ گرمی کا بخار، ۱۵۔ پیاس کا بخار، ۱۶۔ بد ہضمی کا بخار،
 ۱۷۔ سوجن کا بخار، ۱۸۔ جلد کی خشکی کا بخار، ۱۹۔ سہلے کا بخار، ۲۰۔ سرد پانی کے کثرت استعمال اور سردی سے بخار، ۲۱۔ شراب کے زیادہ
 استعمال سے بخار، ۲۲۔ گرم غذا و دوا کے زیادہ استعمال سے بخار، ۲۳۔ نزلہ و زکام سے بخار، ۲۴۔ سچیش کا بخار وغیرہ وغیرہ۔
 علامات :- اوپر والے سبب کے مطابق علامات ظاہر ہوتی ہیں، یہ بخار عام طور پر ایک روزہ کرتا جاتا ہے، اس کی حرارت برابر
 ہے۔ عام طور پر مریض کو آرام سے لٹائے رکھنے سے شام کو بخار اتر کر صبح مریض تندرست ہو جاتا ہے۔

علاج :- اصل سبب مرض کو معلوم کر کے اس کے مطابق علاج کریں، چونکہ یہ بخار دوسرے روز ہی اتر جاتا ہے۔ اس لئے کسی
 ص علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی مریض کو آرام سے لٹانا مفید ہے، اگر غم، فکر، ڈر، خوشی سے یہ عارضہ ہے تو اسے دور کیا جائے
 ار کی شدت کو کم کرنے کے لئے اناسین، یا ساریڈان یا کوڈوپائیرین یا لے پی، سی پوڈر دیں۔ اگر سچیش نہ ہو تو بخار اترنے پر ایک گولی
 مین سلفاس کی دیں۔

یونانی علاج :- غم کی شدت سے ہو تو مختلف طریقوں سے غم کو زائل کریں، خوش کن نغمے اور دلچسپ کہانیاں سنائیں، رقص و سرود دیں

رکھیں، عرق بید مشک، عرق کیوڑہ، عرق گلاب، عرق گاؤ زبان، عرق نیلوفر، شربت انار، شربت سیب، شربت نیلوفر کے ساتھ پلا میں، خوشی کی وجہ سے ہو تو مریض کو نیم گرم پانی سے غسل دیں اور مریض کی توجہ کسی حیرت انگیز قصے، کہانی یا کھیل کی طرف کرائیں، خون کی وجہ سے ہو تو مریض کو تسلی دیں اور خوف دور کریں۔ خوش کن اخبارات سنائیں، موسم کے مطابق شربت صندل وغیرہ دیں، تکان ہو تو سارے جسم پر خصوصاً جوڑوں پر روغن بنفشہ کی مالش کریں، اور نرم و ملائم بستر پر سنائیں، تازہ میوے مثلاً انار، سیب، ناشپاتی، سنگترہ وغیرہ دیں۔ اور سبب کے مطابق علاج کریں، بخار اتر جانے پر بلیریا بخار میں لکھی گئی ادویات میں سے کسی ایک دوا کا استعمال کرائیں۔

آیور ویدک علاج :- بطریقی نانی طریقہ علاج کے کریں۔ ابرک بھسم ادھی رتی کا شہد کے ہمراہ استعمال کرائیں۔
ہومیوپیتھک علاج :- اکونائٹ کا استعمال مفید ہے، بالوکیک طریقہ علاج میں فیرم فاس کا استعمال کیا جاتا ہے۔
غذا و پرہیز :- جب بخار میں آفاقہ ہو تو سرخ الہضم اور لطیف غذا دیں۔ دیر بھسم اغذیہ سے سخت پرہیز ضروری ہے۔

آم واث - گنٹھے کا بخار - رومے ٹک فیور (Rheumatic Fever)

تعریف مرض :- یہ ایک تکلیف دہ مرض ہے، جس میں تیز بخار ہوتا ہے، جوڑوں میں درد آجاتا ہے نیز اندرونی اور بیرونی حجاب القلب متورم ہو جاتا ہے۔

وجوہات :- جدید تحقیقات کے مطابق اس کا سبب ایک خاص قسم کا جرثومہ ہے جس کو ڈاکٹری اصطلاح میں سٹریپٹوککس، ہیملوٹیسٹیکس یعنی خون پاش سٹریپٹوککس کہتے ہیں، یہ خوردبینی اجسام (مائیکرو آرگزم) گلے اور لوز میں کے ذریعے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ مردوں کی نسبت عورتوں میں یہ مرض کسی قدر زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ ایک شدید اور دوسری پُرانی۔ شدید حالت میں بخار ہو کر جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ معمولی ورم ہوتا ہے، پُرانی قسم میں جوڑوں میں سوجن ہو کر موٹے ہو جاتے ہیں اور اکثر دغہ جڑ جاتے ہیں اور لگ بھگ جسم کے ہر جوڑ کو مبتلا کرے مرض کر دیتا ہے، بارش میں بھگینے، ہاضمہ کی خرابی، سخت جسمانی محنت، بندش ایام اور زہریلے زخم اور پیشاب کی نالی کے زخموں کی وجہ سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- شروع میں یکایک سردی سے تیز بخار چڑھ جاتا ہے، حرارت جسم ۱۰۲ سے ۱۰۴ درجے تک پہنچ جاتی ہے اور ماؤف جوڑوں میں سوجن اور سُرخ پیدا ہو جانے سے سخت درد ہوتا ہے۔ مریض چھوٹا تک برداشت نہیں کر سکتا اور نہ ہی اعضاء کو ہلانا جلانا پسند کرتا ہے، گنٹھیا کے بخار میں پسینہ بدبودار، پیشاب سُرخ مائل لیکن کم مقدار میں آتا ہے، ہاضمہ خراب اور بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاس زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ رات کو تکلیف کی وجہ سے مریض کو نیند تک نہیں آتی، نبض کی رفتار ۹۰ سے ۱۲۰ مرتبہ فی منٹ ہوتی ہے، زبان پر زردی مائل سفیدی سی جمی ہوئی ہوتی ہے گنٹھے کے شدید بخار میں بزیان یا سر میں درد نہیں ہوتا، جو تشخیص کی سب سے بڑی علامت ہے، جب مرض جوڑوں سے پردہ دل میں چلا جاتا ہے۔ تب مرض کا شدید حملہ ہوتا ہے، جب وجع القلب (درد دل) ہو تو مریض کا چہرہ ڈراؤنا اور گھبراہٹا ہوتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور کبھی دل کے نغص میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔

رومے ٹک فیور کی تشخیص کے لئے خاص آلات سے جانچ کرنے کا عمل موجود نہیں، صرف مذکورہ علامات سے مرض کی جانچ کی جاتی ہے۔ اگر چار یا پانچ روز تک بخار اور دیگر علامات میں نمایاں کمی نہ ہو تو پھر نفرس، سُرخ بادہ، ایسٹومائی لائی ٹس وغیرہ کا شک کرنا چاہیئے۔
علاج ڈاکٹری :- سوڈا سیلی سلاس اس مرض کی خاص دوا ہے۔ اس سلسلہ میں سوڈا سیلی سلاس دس گرین، سوڈا بائی کارب دس گرین دن میں

تین بار دیں، اگر مریض کمزور ہو تو اس کی دد خوراک بنا کر دیں، بیرونی طور پر میٹھل سلی سیٹ کی مالش کی جائے اور اس کے اوپر روئی رکھ کر باندھ دیں، مندرجہ ذیل نسخہ جات اس مرض کا مؤثر علاج ہیں:-

- ۱۔ سوڈا سیلی سلاس دس گرین، سوڈا بائی کارب ۲۰ گرین، اکو-پرا اولس، ایک بڑا چمچہ دن میں تین بار دیں، بیرونی طور پر میٹھل سلی سلاس اور روغن زیتون ہوزن ملا کر خارجی طور پر مالش کریں، لندن فارما کوپیا کا یہ نسخہ گنٹھیا بخار کے لئے مفید ہے۔
 - ۲۔ کمفر ۴۰ گرین، آئیل سنالپس (رائی کاتیل) ۳۸ گرین۔ درد، سوزش گنٹھیا کے لئے بیرونی استعمال کی مفید مالش ہے۔
 - ۳۔ میٹھل سلی سلاس ۴۰، منم، تلی کاتیل ایک اولس، گنٹھیا، درد جوڑ، نفرس اور منویہ کے لئے بیرونی استعمال کے لئے نہایت مفید ہے۔
 - ۴۔ مکچر سوڈا سیلی سلاس:- سوڈا سیلی سلاس دس گرین، سوڈا بائی کارب دس گرین، سپرٹ ایونیا ایرومیک پندرہ منم، اکو کلوروفارم پرا اولس، مکچر بنائیں، گنٹھیا کے دردوں کے لئے نہایت مفید ہے۔
 - ۵۔ سوڈا سیلی سلاس بمبے سیلاڈونا مکچر:- سوڈا سیلی سلاس دس گرین، سوڈا بائی کارب دس گرین، سپرٹ ایونیا ایرومیک ۵، منم، مکچر سیلاڈونا ۵ منم، اکو کلوروفارم آدھا اولس، گنٹھیا، نفرس اور جوڑوں کے درد کے لئے از حد مفید ہے۔
- نوٹ:- نسخہ ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳

کھانے کے بعد دیں۔

۷۔ پریڈنی سولون (Predni solone) ————— والی سولون (Wysolone) واسٹھ ————— ملی کارٹن (Milli- corten) سببا ————— ڈیکاڈرون (Decadron) ایم ایس ڈی ————— ڈیلٹاکارٹیل (Deltacortil)

فزر ————— یہ سب پریڈنی سولون کی ٹکیاں ہیں، انجکشن بھی ملتے ہیں ————— شروع مرض کے مطابق آٹھ ٹکیاں تک ہر روز دے سکتے ہیں۔ فائدہ ہونے پر آہستہ آہستہ کم کرتے جانا چاہیئے، معدہ کے زخم اور نفسیاتی امراض میں نہ دیں۔

۸۔ ڈیلٹابوٹازولیدین (Delta butazolidin) فزر ————— گیگی ایسجی پائرن کی طرح استعمال کریں۔

۹۔ الگی کارٹ (Algicort) واسٹھ ————— یہ پریڈنی سولون اور ایسٹیلی سڈک الیڈ پر بنی یہ دو آمیزہ دردناک حالات میں جہاں کورٹی کوسٹرائیڈ درکار ہوں، ورم اور درد کو آرام دیتی ہے۔ آئیو میک آرٹھرائیٹس، شیاٹیکا میں مفید ہے۔ ایک سے دو گولی دن میں تین بار دیں۔ آرام آنے پر مقدار کم کر دیں۔ ذیابیطس کے مریضوں کو نہ دیں۔

۱۰۔ ڈیکسا بوٹارین (Dexa butarin) مختیس ————— گنٹھیا، جوڑوں کے پرانے درد، عرق النسا و کمزور دے لئے مفید ہے، اس میں ڈیکسا میٹھازون اور ڈٹامن سی بھی شامل ہیں۔ شدید درد میں جب نیا علاج کر رہے ہوں۔ ایک ایک ٹکیہ دن میں تین بار دیں۔

۱۱۔ انڈوسید (Indocid) مرک شارپ ڈویم ————— گنٹھیا، نفرس، جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ ایک ایک کیپ شول دن میں تین بار دیں۔

۱۲۔ اینورن (Aneurin) کروکس ————— جوڑوں کے درد اور گنٹھیا میں جب ڈٹامن بی اے علاج کرنا ہو تو از حد مفید ہے۔

۱۳۔ بنروا (Benerva) روش ————— یہ ڈٹامن بی اے ہے۔ گنٹھیا و جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ ایک سے دو گولی دن میں دو سے تین بار تازہ پانی سے دیں۔

۱۴۔ پریڈاسن (Predasin) گلیکسو ————— ایک ٹکیہ کھانا کھانے کے بعد تازہ پانی سے دن میں تین بار دیں، یہ پریڈنی سولون و اسپرین کا مرکب ہے۔ درد، ورم، گنٹھیا، جوڑوں کے درد، شیاٹیکا میں مفید ہے۔

۱۵۔ ڈیکاجے سک (Deca gesis) مرک شارپ ڈویم ————— ورم، گنٹھیا، سوزش و درد میں مفید ہے، مخالف اثرات بھی کم ہیں۔ ایک ایک ٹکیہ دن میں تین بار دیں۔

۱۶۔ لیڈرکورت (لیڈرے) ایک ملی گرام، اسپرین (بوٹس) ۳۰۰ ملی گرام، سی بن (گلیکسو) ۱۰۰ ملی گرام۔ تینوں کو ایک ساتھ پانی کے ساتھ دن میں دو بار دیں گنٹھیا کی بخار کے لئے مفید ہے۔

کھانسی و منویہ کے لئے لیڈر مائی سین کیپ شولز ہر چھ گھنٹہ بعد ایک دیں۔

۱۷۔ شدید گنٹھیاں دردوں کے لئے کوڈوپائرن (گلیکسو) ایک ٹکیہ، ریڈوکسان (روش) ۵۰۰ ملی گرام، دونوں کو باہم پیس کر ایک پڑیہ بنا کر دن میں دو بار چائے سے دیں۔

۱۸۔ درد کی جگہ الگی پان کریم (واسٹھ) یا (Relaxul) یا آیوڈیکس کی مالش کریں۔

۱۹۔ بیکوزائم سی فورٹ (روش) ایک ٹکیہ، پرے ڈاسین (گلیکسو) ایک ٹکیہ، دونوں کو پانی کے ساتھ بخار سے پہلے روزانہ دن میں دو بار دیں۔ یہ ڈٹامن سی، اسپرین اور پریڈنی سولون (اسٹرائیڈ) مرکب ہے جو گنٹھیا کے بخار میں مفید ہے۔

۲۰۔ کرو سین (کروکس) ایک ٹکیہ، بیرن (گلیکسو) ۵۰۰ ملی گرام، ریڈوکسان (روش) ۵۰۰ ملی گرام کی ایک ٹکیہ ————— تینوں کو پیس کر دو خوراک

بنائیں۔ ایک خوراک صبح و ایک خوراک شام کو چائے یا دودھ سے دیں۔ درد بخار کو فوراً آرام ملتا ہے۔

۲۱۔ یوٹا ذولیدین (گیبی) ایک ٹکیہ، کر، سین (کرکوس) ایک ٹکیہ — یکے بعد دیگرے تھوڑے وقفہ میں پانی کے ساتھ دیں، گنٹھیا کے درد اور بخار میں مفید ہے یا یوٹا کارٹ یا سیننی پائرن فورٹ یا فیناڈرین ایک گولی صبح ایک شام تازہ پانی سے دیں۔
یونانی علاج :- بیرونی طور پر سورنجاں ایک تولہ آب کشیز سبز میں پیس کر جوڑوں پر لپیٹ کریں یا رسونت تین ماشہ، صندل سرخ دو ماشہ، سورنجاں ایک ماشہ، سب کو پیس کر روغن گل دو تولہ ملا کر ضماد کریں۔

مندرجہ ذیل نسخہ جات اس مرض میں خاص طور پر مفید ہیں :-

۱۔ صبر سقوطی (مصر شدہ) چھلکا ہڑ زرد، سورنجاں شیریں ہر ایک چار تولہ، کوٹ چھان کر گولیاں بنائیں، خوراک دو ماشہ ہمراہ تازہ پانی دیں، گنٹھیا و عرق النسا کے لئے مفید ہیں۔

۲۔ زعفران دو چاول، سورنجاں شیریں ہر ایک چار تولہ، سولف ایک ماشہ، سفوف بنالیں۔ یہ ایک خوراک ہے، ایسی چودہ خوراکیں بنالیں، ایک خوراک صبح اور ایک شام کو کھانا کھانے کے بعد دیں۔

۳۔ مصر شدہ ایک تولہ، سورنجاں شیریں ایک تولہ، چھلکا ہڑ زرد ایک تولہ، برگ سنار کی ایک تولہ، مصطکی رومی اصلی ایک تولہ، روغن بادام اصلی ایک تولہ، تمام ادویات کو کوٹ کر روغن بادام سے چرب کر کے مونگ کے دانے کے برابر گولیاں بنائیں، کھانا کھانے کے چار گھنٹہ بعد رات کو پہلے دن چھ ماشہ کھلائیں۔ بعد چار سے پانچ ماشہ گرم پانی سے دیں، صحت ہوگی۔

۴۔ صبر زرد، چھلکا ہڑ زرد، سورنجاں شیریں، مساوی الوزن لے کر یکو سبز کے پانی میں گوندھ کر چنے برابر گولیاں بنائیں، خوراک تین گولیاں رات کو سوتے وقت پانی سے دیں۔ اگر اجابت زیادہ ہو تو گولیاں کم کر دیں، دمج المفاصل اور عرق النسا کے لئے بے حد مفید ہیں۔

۵۔ سونٹھ، جائفل، لونگ، عقرقرھا، حرمل ہر ایک ایک تولہ، کوٹ کر رات کو پانی میں بھگو رکھیں، صبح جوش دے کر چھان لیں، اس میں تلی کا تیل دس تولہ ملا کر دوبارہ آگ پر پکائیں، جب پانی خشک ہو جائے تو آگ سے اتار کر بھوڑا سارتن جوت کا رنگ ملا دیں اور مقام ماؤن پر نیم گرم ماشہ کریں، جوڑوں کے درد کے لئے از حد مفید ہے۔

۶۔ معجون سورنجاں :- بلغمی امراض، نفرس، گنٹھیا اور عرق النسا کے لئے مفید ہے۔ اسارون، سونٹھ، زیرہ کالا، دارفلفل ہر ایک سات ماشہ، سنار کی ڈیڑھ ماشہ، سورنجاں شیریں تین تولہ، کوٹ چھان کر شہد ایک پاؤ کے قوام میں ملا کر معجون بنا دیں، خوراک پانچ ماشہ ہمراہ عرق سولف بارہ تولہ دیں۔ بعض اظہار اس میں تربدسات ماشہ بھی شامل کرتے ہیں۔

آیور ویدک علاج :- ۱۔ سونٹھ، گلو، دونوں کا سفوف بنا کر بقدر دو ماشہ ہمراہ گرم پانی کھلانے سے بھوڑے دہنوں میں ہی آرام آ جاتا ہے۔

۲۔ پھول منڈی، سونٹھ، دونوں کو خوب باریک پیس کر چھان لیں، تین ماشہ یا چھ ماشہ روزانہ گرم پانی سے کھلانے سے چند روز میں گنٹھیا دور ہو جاتا ہے۔

مندرجہ ذیل آیور ویدک تجربات اس مرض کا موثر علاج ہیں :-

مہاراسنا آدی کو اتھ :- راسنا دو حصہ، دھمانسہ کھرینی، جڑارند، کچور، دیودار، ورج، بانسہ، ہڑ، چبک، ناگر موٹھا، اٹ برٹ، لو، بدھارا، سولف، گوکھرو، اسکندھ، اتیس، گودا امتاس، سنادر، گھیاں، دھنیاں، پیابانسہ، کنڈیاری خور دو کلاں برابر وزن۔
خوراک :- دو تولہ سے چار تولہ کا جو شانہ بنا کر دیں۔ گنٹھیا، رمینگن، لغوہ، رعشہ، ادھرنگ، فالج اور اولاد کی آرزو کے لئے مفید

کوائف ہے۔

اس کے علاوہ پیلا دی چورن تین ماشہ صبح دتین ماشہ شام کو ہمراہ گرم پانی کھلانا بھی مفید ہے۔

ہنگوادی چورن، پنر نواہ آدی چورن، امرت آدی چورن، مہا یوگراج گوگل کا استعمال بھی مفید ہے۔ بیرونی طور پر مہا نارائن تیل یا نارائن تیل

کی نیم گرم ماشہ مفید ہے۔

ہومیوپیتھک علاج :- اکونائٹ نیپ ۳x (شرع مرض میں) برائی اونیا (شدید اور پرانی قسم کے گنٹھیا میں) اور مرض کی پرانی حالت میں

سلفر کا استعمال مفید ہے۔

بالوکیک علاج :- فیرم فاس (درد و سوجن میں) میگ فاس (زیادہ دوروں میں) کلکیریا فلور (پرانے آم و ات میں) مفید ادویات ہیں۔

آم و ات کا جڑی بوٹیوں سے علاج

آک بوٹی :- تیل سرسوں، سیراک کا دودھ پانچ تولہ، منک سانہر ایک تولہ، تینوں کو خوب کھل کر کے یک جان کر لیں۔ دوا تیار ہے گنٹھیا

کا درد چاہے کتنا ہی پرانا ہو، بخورے سے تیل کی مالش کی جائے۔ درد پر مالش کرنے سے مرض بالکل دور ہو جاتا ہے، جہاں اور کوئی دوا کامیاب نہ ہوتی ہو۔ اس دوا کا استعمال کر کے فائدہ اٹھائیں۔

اندرائن بوٹی :- اندرائن کے پانی کو برابر تلوں کے تیل میں پکائیں اور چھان لیں۔ جوڑوں کے درد کے لئے یہ تیل فائدہ مند ہے

نیم گرم ماشہ کریں۔

آک بوٹی :- آک کے پتوں کو کوٹ کر ایک پاؤس نکال کر کڑا ہی میں ڈالیں اور اتنا ہی سرسوں کا تیل ڈال دیں۔ جب پانی جل جائے،

صرف تیل باقی ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ ایک بوند زمین پر ڈالو، اگر نہ پھیلے تو ٹھیک ہے، تیل اتار کر کاغذ پر عمدہ ایک تولہ ڈال دیں، تیار ہے گنٹھیا، نفرس، کمر درد، فالج اور لقوہ کو مفید ہے۔

بدھار بوٹی :- بدھار بوٹی کو سفوف بنا کر تین ماشہ کی مقدار میں استعمال کرنا گنٹھیا کے لئے مفید ہے۔

روغن ہفت برگ :- ہفت برگ کے پتے، دستورہ کے پتے، ارند کے پتے، آک کے پتے، بکائ کے پتے، سنبھاؤ کے پتے، مہانج

کے پتے ہر ایک ایک تولہ دو ماشہ، کوٹ کر ایک سیرتلوں کے تیل میں جلائیں اور چھان کر محفوظ رکھیں، بخورے ساتل گرم کر کے عضو ماؤف پر ملیں

اور اوپر سے روئی نیم گرم باندھ دیں، گنٹھیا، فالج اور لقوہ کے لئے بہت مفید ہے۔

ستیانا سی بوٹی :- روغن ستیانا سی بوٹی اور روغن بادام تلخ ہم وزن ملا کر مالش کرنے سے گنٹھیا کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔

مرض کے شروع میں ماؤف جوڑوں پر کھور کی جائے، مریض کے آرام کا خاص خیال رکھا جائے، اگر مرض کا اثر دل تک پہنچ جائے تو مریض کو چلنے

پھرنے اور دوڑنے سے منع کر دیں، متورم مقام پر پوست کے جو شانہ کی دن میں دوبار آدھ آدھ گھنٹہ تک ٹھکڑ کرنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔

غذا پر مہیز :- دودھ چائے، آش جو، شور بادیں، بادی، ثقیل اور ٹھنڈی غذا سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔

دگدھ جور، دودھ کا بخار، ملک فیور (Milk Fever)

دیکھیں کتاب ہذا، چودہواں باب ————— امراض زنانہ صفحہ نمبر ۳۷۱

حمزہ، انگارہ، انتھریکس، (Anthrax)

تعریف مرض :- دراصل یہ مرض مویشیوں کا ہے، لیکن بیمار مویشی کی لپٹم یا بالوں کو چھونے سے یہ عارضہ انسان کو بھی ہو جاتا ہے۔
وجوہات :- کھالوں، اُون اور چمڑے کی تجارت کرنے والے اکثر اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مریض کو حیوان کے بالوں سے بنے ہوئے شیونگ برش سے داڑھی مونڈنے پر بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔

علامات :- جلد کے جس مقام پر اس مرض کا حملہ ہوتا ہے، وہاں چند گھنٹوں کے اندر ہی خارش اور بے چینی ہو کر لال رنگ کی پھنسی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے ارد گرد تمام جگہ گہری سرخ اور متورم ہو جاتی ہے۔ شروع میں بخار شدید ہوتا ہے۔ شدید حالت میں مقام مائوف کا گوشت پوست گل سڑ کر تین سے پانچ دن تک موت ہو جاتی ہے۔

ڈاکٹری علاج :- شروع میں اینٹی انتھریکس سیرم (Antianthrax-Serum) دس سے پچاس سی سی حسب حالات مریض غصلاقی طور پر بصورت انجکشن دیا جائے۔ شدید حالات میں انٹرا وینس (وریدی) میکہ کی صورت میں دی جائے۔ بعض دفعہ اس سیرم کا زبردست رد عمل ہوتا ہے۔ اس لئے احتیاطاً ایڈرینالین ایک سی سی اپنے پاس رکھ لیں۔ تاکہ اگر مخالف اثر پیدا ہو تو اسے دیا دیا جائے۔ بطور حفظ ماقدم صرف دس سی سی اینٹی انتھریکس سیرم مرض کو روکنے کے لئے نہایت مفید ہے۔


آج کل اس مرض میں نیو سالورسن ۰.۶۱۵، ۰.۶۶۰، ۰.۶۹۰ نمبر دینا مفید ہے۔ اس کی بجائے این لے بی اور سلفارسی نول وغیرہ کا استعمال بھی کیا جاسکتا ہے۔

پینیسلین اس مرض میں نہایت مفید ہے، پانچ لاکھ ہر چھ گھنٹہ بعد یا پروکین پینیسلین چار لاکھ ہر چوبیس گھنٹہ بعد دیں، بیرونی طور پر زخم کو کسی انٹی سپٹک لوشن سے صاف کر کے آریو مائی سین یا پینیسلین مرہم کی پٹی کی جائے۔ انٹی بائیوٹک ادویات میں سے آریو مائی سین کا استعمال نہایت مفید ہے۔

آیور ویدک و یونانی علاج :- سوزش دور کرنے کے لئے مکھن کو سو بار دھو کر کا فور مناسب مقدار میں ملا کر لگائیں، سم الفار بھسم کا خوردنی استعمال بلحاظ عمر نہایت مفید ہے اور وہ تمام مصفی خون نسخے جو پھوڑوں کے بیان میں لکھے گئے ہیں۔ اس مرض میں نہایت مفید ہیں۔

ہومیوپیتھک و بائیو کیمک علاج بھی بطرز "پھوڑوں کے علاج" کے کریں۔
غذا و پرہیز :- زود ہضم و مقوی غذا دیں، گو بھی، آلو، بیکن، کرلیا اور دوسری غیر ہضم افذیہ سے سخت پرہیز کریں۔





ایک سوالی باب

بہ چھوت والی بیماریاں

اُپڈنش، یاد فرنگ، آتشک، سفلس (SYPHILIS)

تعریف مرض :- یہ ایک متعدی مرض ہے، جو عام طور پر بُرے کاموں کے نتیجے میں اعضائے تناسل پر ہوا کرتا ہے۔
 وجوہات :- اس کا باعث ایک خوردبینی کیڑا "سپائروکیٹا پیلڈ" ہے۔ جو اعضائے تناسل کی رطوبات کے علاوہ ناک کی رطوبت، ٹھوک، چھاتی کے دودھ اور اس مرض کی تمام پھنسیوں، چھالوں اور زخموں کی رطوبات میں موجود ہوتا ہے۔ یہ سوزاک سے بھی زیادہ زہریلا زخم ہے جو مرد و عورت کے پوشیدہ اعضاء کے قریب ظاہر ہوتا ہے، چنانچہ مردوں میں غلفہ یعنی سپاری یا عضو تناسل کے کسی اور حصہ پر نائزہ یعنی پیشاب کی نالی میں اور عورتوں میں لب ہائے اندام نہانی کے اندر کی طرف یا فم رحم میں ہو جاتا ہے لیکن لبوں، چوچی کی ٹھنڈی، انگلی یا جسم پر جہاں کہ مواد یا مرض کا زہر سرایت کرے ایسا زخم ہو جاتا ہے اور یہ مواد کے جسم میں داخل ہونے خواہ یہ چھوت آتشک زدہ بازاری عورت کے ملاپ کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے اور یہ موروٹی بھی ہو سکتا ہے جو کہ حمل ٹھہرتے وقت یہ مرض بذریعہ لطفہ والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے ہو جاتا ہے، حمل ٹھہرنے کے بعد یہ مرض والدہ کو ہو جائے تو اس سے بذریعہ اول جنین کو ہو جاتا ہے نیز مریض آتشک کا بوسہ لینے یا اس کا جو ٹھٹھا حقہ یا یا پانی پینے، اس کے ساتھ کھانا کھانے، اس کا جو ٹھٹھا کھانا کھانے، اس کے جوٹے برتنوں میں کھانا کھانے، اس کے ساتھ سونے یا اس کا لباس پہننے سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر یا جراح کو بھی ایسے مریض پر کسی قسم کی جراحی کرنے وقت اور دایہ کو ایسی مریضہ کا بچہ جناتے وقت انگلی وغیرہ

پر مواد لگ جانے سے بھی یہ مرض ہو جایا کرتا ہے۔

علامات :- آتشک کے تین درجے ہیں اور ہر ایک درجہ کی علامات بھی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ پہلے درجہ میں مرض کی چھوت لگنے کے اکثر تین ہفتہ بعد اس مقام پر پہلے ایک سخت ابھار یا ایک سرخ پھنسی پیدا ہوتی ہے جس کی جڑ سخت ہو جاتی ہے۔ اور یہ آہستہ آہستہ بڑھ کر پھیٹ جاتی ہے اور ایک زخم بن جاتا ہے جو کہ بعد میں پھیلتا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد گرد و نواح جلد پر پھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرے درجہ میں یہ جلد کے علاوہ تھلی پر بھی نمودار ہوتا ہے اور مرض کی تیسری حالت میں تو بڑی بڑی گانٹھیں نمودار ہو جاتی ہیں اور نازک مقامات پر مثلاً مفصل کے ارد گرد، خضیوں کے نزدیک اور ان کے اوپر پھیل کر اور اندام نہانی پر جہاں مقام نازک ہونے کی وجہ سے پھیل کر چھٹ بن جاتے ہیں۔ مرض کی شدید حالت میں تاؤ وغیرہ میں زخم ہو کر وہ گل جاتا ہے، کبھی ناک کا حصہ گل کر ناک مٹیٹھ جاتی ہے۔ مریض لاغر ہو جاتا ہے۔

ڈاکٹری علاج :- آتشک کے علاج کے لئے پارہ کے مرکبات و سنکھیا کے مرکبات استعمال کئے جاتے ہیں۔ سنکھیا کے مرکبات مثلاً سالورسن، نیو سالورسن، سلفارسی نول، این لے بی وغیرہ استعمال کئے جاتے ہیں۔ اور اگر ان کے استعمال کے دوران غشی، پٹی اچھلنا، یرقان، پیشاب میں المیہ من کا اخراج، بھوک نہ لگنا وغیرہ عوارضات پیدا ہوں تو کچھ عرصہ کے لئے ان ادویات کا استعمال بند کر دینا چاہیئے۔

انٹی بائیٹک علاج میں مینی سلین یا سٹریپٹومین سلین اس مرض کا کامیاب علاج ہے اور اب بہت کم نیو سالورسن، سلفارسی نول یا این لے بی استعمال کی جاتی ہے، مینی سلین پانچ لاکھ کی مقدار میں یا پردکین مینی سلین چار لاکھ کی مقدار میں ہر ۲۴ گھنٹہ بعد دی جاتے، موروٹی آتشک کی صورت میں مناسب مقدار میں بچے کو بھی مینی سلین کے انجکشن دیئے جاسکتے ہیں، (مینی سلین ٹیکے ٹیسٹ کے بعد ہی دیں)۔

بطور حفظ یا تقدم آتشک کی چھوت لگنے ہی مقام مرض کو ۱ : ۲۰۰۰ مرمری پوٹاسیم آیوڈائیڈ کے گھول سے صاف کرنا چاہیئے یا اس کی جگہ ۲۳ فیصدی کی المیہ آکسائیڈ لگانی چاہیئے، پیمنٹ ادویات مندرجہ ذیل مروج ہیں :-

۱۔ ایٹارسون (Acetarson) :- یہ سنکھیا سے مرکب گولیاں ہیں، ان کو مے اینڈ بیکر مینی سٹوورسول (Stovarsol) اور بوٹس کینی ایسی مارسل کے نام سے بناتی ہے۔ آتشک، خرابی خون کے لئے مفید ہیں۔ چونکہ یہ سنکھیا سے مرکب ہیں، لہذا انہیں با احتیاط استعمال کرنا چاہیئے۔ خوراک ایک گولی دن میں ایک یا دو بار دیں۔

۲۔ ایسے ٹائی لارسن (Acetylarsen) :- ساختہ مے اینڈ بیکر۔ آتشک میں استعمال کئے جاتے ہیں۔ دو سے تین سی سی عضلاتی انجکشن دیں۔

۳۔ سٹوورسول (Stovarsol) :- یہ سنکھیا سے مرکب دان آتشک و طیر یا دمکی خون دوا ہے۔ ایک گولی دن میں دو بار دیں اور ہر تین روز بعد ناعزہ کر کے استعمال کی جاسکتی ہے۔

علاوہ ازیں انرسان، انٹوڈان، نیو آرسینیفینا مین، نیو سالورسن، سار سپرٹا اور سنکھیا و پارہ وغیرہ کے مرکبات استعمال کئے جاتے ہیں۔

ماڈرن ادویات :- پروکین مینی سلین (Procainpenicillin) چار یا آٹھ لاکھ کی مقدار میں ڈسٹلڈ واٹر میں حل کر کے عضلاتی انجکشن ہر ۲۴ گھنٹہ بعد کریں۔ اس سلسلہ میں کرس ۸ (Crys-8) سارامبائی یا پروناپن (Pronapen) فزر — یا سیکومائی سین (گلیکسو) ہوسٹا سلین (Hostacillin) بیکٹ — یا لیڈرسلین (Lederacillin) لیڈرے وغیرہ میں سے کسی ایک کا انجکشن لگا سکتے ہیں۔

۲۔ بینا پین فوریٹ فائیڈ (گلیکسو) کا انجکشن دو دن کا ناعزہ کر کے عضلاتی لگایا جاتا ہے۔

۳۔ پام ڈیو میکس یا بیکٹ کا مناسب مقدار میں عضلاتی انجکشن ایک ہفتہ لگانے کے بعد ہفتہ میں ایک بار لگانا چاہیئے۔

۴۔ ایسے ٹائی لارسن (Acetylarsen) ایم بی — دو سے تین سی سی کا ایمپولز بذریعہ عضلاتی انجکشن ہفتہ میں دو بار دیں۔

۵۔ ٹیرامائی سین ایف (Taramycin S.F.) یا اکر دوائی سین (Achromycin) دو دو کپ ٹولز ہر چھ گھنٹہ بعد دیں — اے دودھ

یا پھلوں کے رس سے استعمال کرائیں یا ٹرائی سین (Trycin) ایم ایس ڈی دیں۔

۶۔ انٹی بائیوٹک علاج میں اب مینی سلین ہی اس مرض کا کامیاب علاج ہے اور اب بہت کم نیو سالورسن، سلفا رسی نول یا این اے، بی کا استعمال کیا جاتا ہے۔

۷۔ سبز مائی سین (Synermycin) ہر چھ گھنٹے بعد ایک کیپ ٹولز دیں، اسے دودھ یا پھلوں کے رس سے دیں، اور ڈامن بی کیلیکس بھی ساتھ ساتھ دیتے رہیں۔

۸۔ بسمتھ (Bismuth) یہ ایک دھاتو ہے، اس کا گھول مانس پیشی میں ٹیکہ کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ اس کے لئے بسمو سٹیپ (Bismostab) اسے ایک سی سی کا عضلاتی ٹیکہ کیا جاتا ہے۔ یہ دوائی زہریلے اثرات سے باہر نہیں۔ اس لئے اسے با احتیاط استعمال کیا جائے۔

۹۔ ڈائی کرسٹاسین (سارامبائی) کا انجکشن بلحاظ عمر دیں۔ ری ایکشن سے محتاط رہیں۔

۱۰۔ نئے امراض میں کلورومائی ٹین (Chloromycetin) کے دو کیپ ٹولز دن میں دو بار دینے سے مرض کافی کم ہو جاتا ہے۔

۱۱۔ مرض ہونے پر ملاپ کرنے پر زود دھ (ایف ایل) ضرور چڑھالیں، دوسری صورت میں مرض عورت کو بھی ہو جائے گا۔

۱۲۔ بکٹیریم (Bactrim-Tab) (ردش) دو گولی دن میں دو سے تین بار دیں۔

یونانی علاج :- آتشک کا مواد غلیظ اور زیادہ ہو تو منقہ و مہل ضروری ہے، شہترہ چھ ماشہ، چرایہ چھ ماشہ، سر پھوکہ، منڈی، ہرڑ سیاہ، صندل سفید موسم گرما میں ورنہ عشبہ مغربی ہر ایک سات ماشہ، عناب پانچ دانہ، رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح مل چھان کر ۲۱ روز تک پلائیں، اس کے بعد مطبوخ ہفت روزہ کا مہل سات روز دیں، بعد ازاں شربت صندل دو تولہ، شربت عناب چار تولہ، عرق مصفی خون دس تولہ میں ملا کر بطور تبرید صبح و شام پلائیں، آتشک کے علاج میں کشتہ سنکھیا یا کشتہ پارہ یا کشتہ شنگرف کا استعمال بھی مفید ہے۔

مندرجہ ذیل مجربات آتشک کے لئے نہایت مفید ہیں :-

جوہر منقہ (جوہر رسپیور) :- مسیح الملک حکیم اجل خاں صاحب کے معمولات میں سے ہے۔ آتشک، جذام، بھگند، گنٹھیا، بواسیر کے لئے نہایت مفید ہے۔ آتشک کے لئے ایسے بیماروں کو بھی اس دوا سے آرام ہو جاتا ہے، جن کی ہڈیاں تک گلنی شروع ہو گئی ہوں، سم الفار، رسپیور، دارچینا ہر ایک پانچ تولہ، شراب برانڈی قسم اول میں خوب کھل کر کے بطریق معروف جوہر ڈرائیں، خوراک آدھ سے ایک چاول۔ یہ جوہر منقہ کی گٹھلی کی بجائے رکھ کر گولی سی بنالیں اور دودھ کے ساتھ بغیر چبائے نگل جائیں تاکہ دوا دانتوں کو نہ لگے۔ بارش سے بھگنے سے بچیں، گندم کی روٹی کی چوری اور گھی خوب استعمال کرائیں۔ ترش و بادی اشیا سے پرہیز کریں۔ ہر ہفتہ استعمال کے بعد دودن دوا بند رکھیں۔

دیگر :- رسپیور، دارچینا، پارہ، سنکھیا، شنگرف ہوزن، شراب دو چند میں ادویہ کھل کر کے جوہر ڈرائیں۔ از حد مفید ہے، خوراک ۱/۲ سے ایک چاول، موہر منقہ میں رکھ کر نگلا لیں، بعد تنقیہ و تصفیہ از حد مفید ہے۔

دوائے آتشک :- ریٹھا کو کولوں میں رکھ دیں، جب جل جائے تو آہستگی سے نکال کر کسی برتن میں بند کر دیں، جیسا کہ عموماً کولوں کو دم کیا جاتا ہے، جب سرد ہو جائے تو نکال کر باریک کر کے رکھ لیں، مریض کو تین رتی پہلے دن مکھن میں رکھ کر کھلائیں، غذا میں نمک نہ دیں، دوسرے دن چار رتی علیٰ ہذا ایک رتی روزانہ بڑھاتے جائیں۔ ایک ماشہ پر پہنچ کر دو ٹام کر دیں۔ آتشک تو چند روز میں ہی دور ہوگا۔ مگر خون کی اصلاح کے لئے کم از کم دو چار روز اسی طرح دے چھوڑیں۔ ناعذ کے دنوں میں کسی دوا سے تنقیہ ضرور کرا لیا کریں۔ صرف چھلکا کو کام میں لائیں۔

دیگر :- چھلکا ریٹھا کو دھوپ میں خشک کریں اور سفوف بنالیں، ہر روز ایک رتی مکھن میں دیں، ایک ہفتہ میں آتشک کو فائدہ ہوگا، اصلکار خون کے لئے مفید ہے۔

مرہم آتشک :- اس مرہم کے لگاتے ہی آتشک و جلن اور خارش وغیرہ دور ہو جاتی ہے اور چند بار لگانے سے زخم بھی دور ہو جاتے ہیں۔ کتھہ گلابی، رال سفید ایک ایک تولہ، بار یک پیس کر پانچ تولہ مکھن گائے میں جو ایک تولہ بار دھلا ہوا ہو۔ مرہم تیار کر لیں۔ اور دونوں وقت زخموں پر لگائیں۔

ستیاناسی بوٹی سے علاج :- چھلکا ستیاناسی بوٹی یعنی ستیاناسی بوٹی کا چھلکا ایک تولہ، مرچ کالی پانچ عدد، آدھ سیر پانی میں بطور سردائی گھوٹ چھان لیں اور چار تولہ شہد خالص ملا کر پلا یا کریں، انشاء اللہ چند دنوں میں ہی بیماری جڑ سے دور ہو جائے گی، علاوہ انہیں یہ نسخہ زبردست مصفی خون ہے۔

نوٹ :- یہ بوٹی ہر جگہ دستیاب ہے، ناظرین ملکٹ محصول ڈاک کے لئے منیجر ٹیکہ ملتان دو خانہ (رجسٹرڈ) پانی پت کے پتہ پر بھیج کر بوٹی منگو کر دیکھ لیں، اور اپنے علاقہ سے حاصل کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہندوستان کی جڑی بوٹیاں میں اس بوٹی کا پورا بیان مع تصویر درج ہے۔ اور منیجر بڑا لا جوگی پبلیکیشنز پانی پت کے پتہ سے منگائی جاسکتی ہے۔

عرق دافع آتشک :- عشبہ مغربی ۳ تولہ، برادہ چوب چینی، برادہ چوب شیشم ہر ایک ۲ تولہ، گل نیو فر، گل بنفشہ، گاؤ زبان گل نیم، گل سرخ، شاہترہ، چرایہ، منڈی، سر بیجوک، خار خشک، صندلین ہر ایک دس تولہ، چھلکا ہرڑ زرد، چھلکا بہترہ، چھلکا ہرڑ کابی، برگ سنار، برگ ہندی ہر ایک پانچ تولہ۔ سب ادویہ کو پندرہ گھنٹے تک پانی میں رات کو تر کر کے گل پانی کا دو تہائی عرق نکالیں، خوراک سات تولہ عرق میں شربت عشبہ تین تولہ ملا کر صبح و شام پلائیں۔

عرق مطبوخ ہفت روزہ :- آتشک، پھوڑے، پھنسیوں، فساد خون اور گنٹھیا کے لئے طب یونانی کی مشہور دوا ہے۔ چھلکا درخت نیم، چھلکا درخت کچنال، جڑ حنظل، بھلی بول (کیکر)، کٹائی خورد معہ پتے، چھلکا و جڑ، قند سیاہ کہنہ (پرائی) ہر ایک دس تولے لے کر تین سیر پانی میں جوش دیں، جب ایک سیر رہ جائے تو چھان لیں۔ یہ سات خوراک ہیں۔

خوراک :- ایک خوراک روزانہ صبح کو پیش، تیسرے پر مونگ کی کھجڑی کھائیں، اسی طرح سات دن تک پیتے رہیں۔ روٹی اور گوشت نہ کھائیں، صرف شوربا پی سکتے ہیں اور کھجڑی کھا سکتے ہیں۔

نوٹ :- بردست کے بعد عرق سولف، عرق مکو حقوڑا، حقوڑا نیم گرم پینا چاہیئے، اگر چیش ہو جائے تو اس عرق کا استعمال بند کر دیں۔ اور لعاب بی دانہ تین ماش، لعاب ریشہ خطمی چار ماش، شیرہ سولف پانچ ماش پانی میں نکال کر چینی دو تولہ ملا کر سینول سالم سات ماش چھوڑ کر پی لیں، جب چیش دور ہو جائے تو اس عرق کو دوبارہ شروع کریں۔ یہ عرق دس دن تازہ رہتا ہے اس کے بعد خراب ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ جو شانہ ہے عرق نہیں ہے اس لئے تازہ بنالینا چاہیئے۔

سفوف عشبہ :- آتشک و ہر قسم کے زخموں کے لئے مفید ہے، چھلکا ہرڑ زرد، صندل، سرخ، سنار، کی ہر ایک ایک تولہ، پیس کر سفوف بنائیں اور سات سے نو ماش تک ہمراہ تازہ پانی یا عرق مناسب دیں۔

دیگر :- عشبہ دو تولہ، سنار، کی ایک تولہ، شکر تری ایک تولہ، سفوف بنالیں اور بقدر ۹ ماش نیم گرم پانی سے کھائیں۔

مرہم آتشک :- کتھہ، رال، ایک ایک تولہ، بار یک پیس کر پانچ تولہ مکھن گائے میں جو ایک تولہ مرتبہ پانی میں دھلا ہوا ہو، مرہم تیار کر لیں اور زخموں پر دونوں وقت لگائیں۔

آیور ویدک علاج :- مل سندور، مکھڑس، اپدیش، کٹھار رس، غبر رس، چوب چینی آدی چورن، ستیاناسی کھار عشبہ اولیہ

بہترین ادویات ہیں، سارپوادی آسو (بھیشج رتناولی) ایک تا دو تولہ برابر پانی ملا کر بعد از غذا دینا آتشک و خرابی خون کے لئے نہایت مفید ہے۔
کھدر آرٹھٹ (شارنگدھر) ایک تا دو تولہ برابر وزن پانی ملا کر بعد از غذا دیں، زبردست مصفی خون ہے اور آتشک کے لئے مفید ہے۔

آتشک کا جڑی بوٹیوں سے علاج

- ۱۔ آگ کے زرد پتے آگ سے اتار کر سایہ میں خشک کر لیں اور سفوف بنالیں، ہر قسم کے زخموں پر چھڑکنے سے زخم بھر جاتے ہیں، آتشک کے زخموں کا بھی موثر علاج ہے۔
 - ۲۔ گودہ حنظل ایک تولہ، امر بیل ایک تولہ، ہڑکالی ایک تولہ، شہد تین تولہ، گولیاں بخود کے برابر بنالیں، مریض کو پہلے دلیہ یا کھجڑی کھلا میں دو گھنٹہ بعد میں گولی ہمراہ پانی دیں۔ پاخانہ آنے کے بعد چاول ہمراہ شور با مرغ دیں اور لا جنتی بوٹی کی جڑ کا چھلکا حقہ میں ڈال کر ادھر پر کھیر کی آگ رکھ کر حقہ پلائیں، حلیم ختم ہونے سے پہلے آتشک ختم ہو گا۔ تجربہ میں کامیاب ثابت ہو گا۔
 - ۳۔ ”ور بہت منجھٹا آدی کو اتھ“ ایک تا دو تولہ کا جو شانڈہ بنا کر پلائیں، گودا المتاس کا مرکب ہے۔ اٹھارہ قسم کے کوڑھ اور آتشک میں مفید ہے۔
 - ۴۔ چھلکا جڑ بانہ سایہ میں خشک شدہ ایک ماش، عناب دلائی ۹ عدد، چوب حبشی نیم کوفتہ پانچ ماش، رات کو پانی میں بھگو کر جوش دے کر چھان کر پلائیں، آتشک کے لئے مفید ہے۔
 - ۵۔ بھنگرہ سیاہ کے رس سے آتشک کے زخم دھوئے سے زخم جلدی خشک ہو جاتے ہیں۔
- ہومیوپیتھک علاج :- نائٹریک ایسڈ (مرض کی ابتداء میں)، مرکری (شدید حالت میں)، آرم میکولیٹیم (پُرانی حالت میں) مفید ادویات ہیں۔
بالو کیمک علاج :- ابتداء مرض میں کلکیر یا فلور، شدید حالت میں کالی فاس اور پُرانی حالت میں سلیشیا بہترین ادویات ہیں۔
غذا و پرہیز :- دال مونگ، دال ارہر، خرفہ، کدو، پالک، ٹینڈا اور توری، خالص گھی دیں، گڑ، تیل، اچار، پیاز، آلو، مینگن، دال مسور وغیرہ سے سخت پرہیز کرائیں۔

بھربھوشن وائٹ، سوزاک، گنوریا، (GONORRHOEA)

تعریف مرض :- یہ ایک متعدی مرض ہے، جو گونو کاکل بکٹیریا (گونوریا جراثیم) کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جس سے پیشاب کی نالی میں زخم ہو کر پیپ آنے لگتی ہے۔
وجوہات :- عام طور پر بُری حرکتوں اور زنا کاری سے ہوتا ہے۔ بھارت میں بازاری عورتوں سے متعلق قانون پاس ہو جانے کے بعد بدکاری کو خلاف قانون قرار دیا گیا ہے، جس سے اس مرض میں کافی حد تک کمی ہو گئی ہے، لیکن پاکستان اور دیگر ممالک میں جہاں بدکاری جرم نہیں ہے، یہ مرض ترقی پر ہے، چنانچہ سوزاک زدہ عورتوں سے ملاپ کرنے یا حائضہ عورتوں سے ملاپ کرنے سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے، علاوہ ازین شراب، کباب کے زیادہ استعمال اور سُرخ مرچ و گرم مصالحوں سے بھی پیشاب کی نالی میں سخت سوجن ہو کر پیپ آنے لگتی ہے۔ معالجین کے لئے یہ تعجب کا باعث ہو گا کہ یہ مرض انسانوں کے سوا کسی حیوان کو کیوں نہیں ہوتا۔ یہ جراثیم جسم میں داخل ہونے سے دو سے دس روز کے بعد علامات مرض پیدا کر دیتا ہے۔

علامات :- مرض کی چھوت لگنے کے دوسرے تیسرے دن پیشاب کی نالی میں سخت سوجن اور لالی ہو جاتی ہے اور خراش و جلن اس قدر ہوتی

ہے کہ مریض بے تاب ہو جاتا ہے، پیشاب جل کر اور سخت درد سے آنے لگ جاتا ہے۔ پیشاب کے سوراخ سے نیلے رنگ کی پتلی پیپ (مواد) بہنے لگتا ہے۔ تین چار روز کے بعد علامات مرض میں ترقی ہو جاتی ہے اور پیشاب کی جلن اور درد میں بڑھوتری ہو کر گاڑھی پیپ آنے لگتی ہے، کمر اور گولہوں میں درد ہونے لگتا ہے، بھوک کم ہو کر قبض ہو جاتی ہے، پیشاب میں روکاؤٹ ہوتی ہے، کئی مریضوں میں پیشاب کے ساتھ خون بھی آنے لگتا ہے۔ عضلات میں اس قدر سوجن ہوتی ہے کہ معمولی کپڑا پہننے سے بھی درد ہونے لگتا ہے، اس مرض کی سب سے تشخیصی علامت یہ ہے کہ مریض پاؤں پھیل کر چلتا ہے۔ ایک دو ہفتہ کے بعد علامات مرض میں کمی ہو کر آرام آنے لگتا ہے۔ اگر مرض کا علاج توجہ سے نہ کیا جائے تو قرحہ پیدا ہو جاتا ہے، جو سالوں تک رہتا ہے۔

علاج ڈاکٹری :- طب جدید نے سوزاک کے علاج میں اس قدر ترقی کی ہے کہ اگر مریض وقت پر آجائے تو بیماری چند گھنٹوں کے اندر دور ہو جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں مینی سلین اس مرض کا مؤثر علاج ہے، پر دین مینی سلین چار لاکھ یونٹ ہر چوبیس گھنٹہ بعد یا عام مینی سلین پانچ سے دس لاکھ یونٹ ہر چھ گھنٹہ بعد دیا جاتا ہے۔

جدید علاج میں گونوریا ویکسین بھی کافی فائدہ کرتی ہے۔ لیکن اب ٹوائٹ بائیوٹک علاج میں مینی سلین کا عضلاتی ٹیکہ اس مرض کو نوری طور پر دبانے کے لئے مؤثر علاج ہے، خوراک کی طور پر سلفا ڈایازین چار سے چھ گولی تک تازہ پانی سے دینا بھی مفید ہے۔ سلفا گروپ میں سے سلفا تھایا زول اور سلفا ڈایازین سوزاک کے لئے بہترین تسیم کی گئی ہے یا بیکٹیریم دو گولی دن میں دو سے تین بار دیں۔ اگر مینی سلین سے یا سلفا گروپ سے علاج کیا جائے تو عورتوں میں پچکاری سوزاک کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن مردوں میں پوٹاسیم پر مینگنیٹ ایک میں دس ہزار کی طاقت کے نیم گرم گھول سے پچکاری کی جائے تو اس سے پیپ کافی کم ہو جاتی ہے۔ اگر اس علاج میں چار پانچ دن میں آرام نہ ہو تو دوسرا کورس شروع کرنے سے پہلے ایک ہفتہ کا وقفہ دینا ضروری ہے۔

نوٹ :- پچکاری سوزاک ہمیشہ اس وقت استعمال کریں، جب علامات مرض میں کمی ہو اور پیپ کم آرہی ہو، ورنہ پیپ

بند ہو کر ورم خصیہ کی شکایت ہو جاتی ہے۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ سلفا ڈایازین یا سلفا ٹرائیڈ یا ایم بی ۶۹۳ یا الکو سین (Elk osin) ہر چار گھنٹہ بعد دیں، ساتھ میں کافی پانی پلائیں۔ اگر ہر خوراک کے ساتھ مناسب مقدار میں سوڈا بائیکارب ملا دیا جائے تو سلفا ڈرگز کا کوئی بُرا اثر پیدا نہیں ہوتا، یا سپٹران (Septran) گولیاں استعمال کرائیں۔

۲۔ مینی سلین کا استعمال از حد مفید ہے، لیکن مینی سلین کے اتنے مرکبات بازار میں دستیاب ہوتے ہیں کہ ایک نیا ڈاکٹر انتخاب کرنے میں حیرت زدہ ہو سکتا ہے۔ اس لئے ملک میں عام طور پر دین مینی سلین (کرس-۴ Crys-4 سارا بھائی) زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔

۳۔ ڈائی کرسٹی سین (Dicrysticin) سارا بھائی (سٹریٹو مینی سلین) کا عضلاتی انجکشن ہر چوبیس گھنٹہ بعد کریں۔ عام طور پر ایک ہی انجکشن سے مرض کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔

۴۔ زیادہ تکلیف کی حالت میں ایکرومائی سین (Achromycin) لیڈر سے یا ٹیرامائی سین ایس، ایف (Terramycin S. F.) فزرا ایک دو کیپ شولز ہر چھ گھنٹہ بعد تازہ پانی سے دیں۔

۵۔ ٹیرامائی سین (Terramycin) یا دیگر کسی ٹیراسائیکلین کے دو کیپ شولز یا کلورومائی سین (Chloromycetin) یا کلوروفینی کال (Chlorophenicol) کے دو کیپ شولز ایک ساتھ تازہ پانی سے دیں۔ ایک دو خوراک میں نیا مرض ایک ہی دن میں دور ہو جاتا ہے۔

۶۔ پیشاب لانے کے لئے سٹراکا (Sitarka) پارک ڈیوس — دو بڑے چمچے دن میں چار بار دیں۔
 ۷۔ ٹیرامائی سین (ایم۔ ایس۔ ڈی) ایک کیپ شولز، کلورومائی ٹین (پارک ڈیوس) ایک کیپ شولز، لبریم (روش) ایک گولی تینوں ایک ساتھ پانی سے دن میں تین بار دیں۔ مہترانی سوچن دور کرنے و درد کے لئے مفید ہے، اگر مرض زیادہ نہ ہو تو صرف ٹیرامائی سین کا استعمال بھی مفید ہے۔ لبریم روش کی نہ ملے تو کسی اور کمپنی کی استعمال کریں۔

۸۔ سیزمائی سین (Synermycin) ایک کیپ شولز ہر چھ گھنٹہ بعد تازہ پانی سے دیں۔ اس دوا کے ساتھ کوئی اچھا سا ڈامن بی کمپلیکس بھی دیتے رہنا چاہیے۔ تاکہ کوئی خراب اثر نہ ہو۔

یونانی علاج :- شروع مرض میں تخم خیارین، تخم خرپڑہ، خار خشک تین ماشہ پانی میں پیس کر شیرہ نکال کر شربت بزوری چار تولہ شامل کر کے پلائیں۔ پست فالسہ شگری ایک تولہ رات کو پانی میں بھگو رکھیں، صبح چار تولہ شربت بزوری ملا کر پلائیں۔ بیرونی طور پر چھلکا ہر روز چھلکا بہیڑہ، آملہ خشک ہر ایک چھ ماشہ، رات کو پانی میں بھگو رکھیں، صبح کو چھان کر نیم گرم کر کے سچکاری کریں۔
 مندرجہ ذیل مجربات سوزاک (گنوریا) کے لئے کامیاب ہیں، حسب موقعہ بنا کر فائدہ اٹھائیں :-

۱۔ طباشیر چھ ماشہ، لالچی خورد چھ ماشہ، ست بروزہ چھ ماشہ، کباب چینی چھ ماشہ، چینی تین تولہ، سفوف تیار کریں اور تیل صندل (میسوری) سے چرب کر کے ایک سے دو ماشہ صبح و شام ہمراہ دودھ گائے دیں۔ نئے اور پرانے سوزاک کے لئے مفید ہے۔

۲۔ پرانے سوزاک کے لئے شامترہ، چرایہ، سر پھوکہ، منڈی، ہرڑ سیاہ، غشبیہ مغربی ہر ایک سات ماشہ، عنباب پانچ دانہ، رات کو گرم پانی میں بھگو کر مل چھان کر شربت بزوری چار تولہ ملا کر صبح پلائیں۔

۳۔ شورہ قلمی، جو کھار، ریوند چینی، سولف ہر ایک دو تولہ، چینی سفید آٹھ تولہ، کوٹ چھان کر مناسب مقدار میں پلائیں۔
 ۴۔ آملہ دو تولہ، ہلدی دو تولہ، مصری چار تولہ، کوٹ چھان کر سفوف بنائیں۔ اس میں سے چھ ماشہ سفوف کھلا کر اوپر سے چار تولہ شربت بزوری ملا کر پلائیں۔

۵۔ سر و چینی، چوب چینی، دانہ لالچی خورد، ریوند چینی، پھلی کیکر خام، لکڑی صندل سفید، دھنیائے چادل، رت بروزہ، قلمی شورہ جو کھار ہر ایک ایک تولہ، کوٹ چھان کر روغن صندل اصلی دو تولہ ملا کر خوراک دو سے تین ماشہ ہمراہ دودھ گائے تازہ صبح کو کھلائیں۔ اور

گودہ کنوار گندل کا سالن بنا کر کھلاتے رہیں۔ سوزاک کے ہر درجہ کے لئے مفید ہے۔ پینی سلین فیل ہو سکتی ہے، لیکن یہ بیکار نہیں جاسکتا ہے۔

۶۔ شورہ قلمی، جو کھار، برگ ہندی، دانہ لالچی کلاں، ریوند چینی ہر ایک دس ماشہ، دھنیاں خشک چھ ماشہ، سفوف کر کے اٹھارہ پڑیاں بنائیں۔ ایک پڑیہ روزانہ دیں۔

دوائے سرخ :- سوزاک اور پیشاب کی جلن کے لئے مفید ہے۔ گیرو ایک تولہ، پٹکڑی سفید ایک تولہ، شکر خام دو تولہ، سفوف بنائیں۔ خوراک تین ماشہ، مناسب بد رفتہ سے کھلائیں۔

سفوف سوزاک :- لالچی خورد، سنگ جراثیم، جو کھار ہر ایک ایک تولہ، سفوف بنائیں اور چھ سے نو ماشہ بکری کے دودھ کی کچی لسی کے ساتھ کھلائیں۔

شربت کا کنج :- انیسوں، تخم کرنس ہر ایک سات ماشہ، پرسیا و شاں، گل بفسہ، گاؤ زبان ڈیڑھ تولہ، خار خشک دو تولہ، کا کنج تین تولہ، مغز تخم خیارین پانچ تولہ، سب دواؤں کو ایک سیر پانی میں بھگو میں، صبح کو اس قدر جوش دیں کہ آدھ سیر پانی رہ جائے، پھر

اس میں شکر سفید آدھ سیر ملا کر شربت تیار کریں۔ خوراک تین سے چار تولہ پانی ملا کر پیئیں۔ گردہ و مثانہ کی آلائش کو صاف کرتا ہے اور سوزاک میں بھی مفید ہے۔

عرق سوزاک: حکیم غلام کبریا خاں صاحب عرف بھورے میاں کا نسخہ ہے، سوزاک کے لئے از حد مفید ہے۔ اس سے پیشاب کی جلن، خون یا پیپ آنے کی شکایات رفع ہو جاتی ہیں۔

ہرے دھنیاں کے پتوں کا پانی دس تولہ (سبز دھنیاں نہ ملے تو خشک دھنیاں پانچ تولہ رات کو ایک پاؤ پانی میں بھگوئیں، صبح جوش دے کر چھان لیں) بعد اس میں برانڈی دو تولہ روغن خالص میسوری چھ ماشہ ملا کر محفوظ رکھیں۔
خوراک ۹ ماشہ سے ایک تولہ صبح و شام سات دن دیں۔ اس کو تازہ بنا کر دیں۔

آیور ویدک علاج: جلن کو دور کرنے کے لئے ہلکی دسکن ادویہ استعمال کرائیں۔ اس سلسلہ میں سرد چینی، چوب چینی، ریوند چینی، ملی ثورہ، زیرہ سفید، الاچی خورد ہر ایک چھ ماشہ، سب کو کوٹ چھان کر سب کے نصف کو زہ مصری ملائیں اور اس کی تین پڑیاں تیار کریں اور دن میں دو یا تین بار دودھ بکری کی لسی سے دیں۔ اندری جلاب کا بہترین نسخہ ہے۔ اس کے بعد مرض کو دور کرنے کے لئے مندرجہ ذیل تجربات اس سے کسی ایک کا استعمال کریں۔

۱۔ ست بروزہ، دانہ الاچی خورد، سرد چینی ہر ایک پانچ تولہ، روغن سندل ۲ تولہ، جملہ ادویات کو باریک پیس کر اس میں روغن سندل ملا لیں، خوراک تین ماشہ صبح و تین ماشہ شام کو دودھ کی لسی کے ساتھ دیں۔ اس کے صرف ایک ہفتہ کے استعمال سے سوزاک دور ہو جاتا ہے۔

۲۔ چندن آسو (بھیشج رتناولی) :- ایک تا دو تولہ بعد از غذا دیں، سوزاک، پیشاب کی جلن، درد پیشاب اور پیپ پیشاب کے گدلاپن کے لئے مفید ہے، سوزاک کا مؤثر علاج ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: :- مرض کے شروع میں جلیسی میم، قرصہ کی حالت میں کینا بس، پیپ زیادہ مقدار میں آرہی ہو تو سی پیا کا استعمال مفید ہے۔ شدید درد کی حالت میں یعنی پیشاب کی تمام نالی میں جلن ہو، پیشاب کی حاجت بار بار اور زبردست درد ہو تو کنٹھرس کا استعمال مفید ہے۔ جب نائزہ سے مقدار کثیر پانی جیسی پیپ خارج ہوتی ہو اور خاص کر اس وقت جب سسے نکل آئیں، تو بھنوجا کا استعمال مفید ہے۔

بالو کیمیک علاج: :- کلکیریا فاس (پتلا مواد ہوتا)، نیٹرم میور (پرانے سوزاک کی حالت میں)، کالی سلف (زردی مائل سبز مواد خارج ہوتا)، کالی میور (سوزاک کی شروع و درمیانی حالت میں)، سلیشیا (پرانے سوزاک میں) مفید ادویات ہیں۔

پچکاری کرنے کا طریقہ: :- پچکاری کا سرالبا ہو تو اس کے دوسرے سرے پر بلب یعنی گانٹھ ہو، اس کے لمبے سرے کو نوزل کہتے ہیں۔ پیشاب کی نالی میں بخوبی داخل کر کے پچکاری کر لی جائے اور اندر داخل کردہ دوائی کو دو یا تین منٹ تک روکے رکھنا چاہیئے۔ یہ اس طرح سے دے سکتا ہے کہ عضو تناسل کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان دبائے رکھیں اور پچکاری کو دائیں ہاتھ سے باہر نکال لینا چاہیئے۔ شروع میں ہر رات پچکاری کرنی چاہیئے اور اگر حالات موافق ہوں تو حسب ضرورت اس کو کرتے رہنا چاہیئے۔ ٹھنڈے پانی میں کپڑا بھگو کر عضو کے رد لپیٹ دینا بھی مفید ہے۔

غذا و پرہیز: :- لطیف، زود ہضم غذا مثلاً ڈبل روٹی، دودھ، چاول، جو کا دلیہ، مونگ کی نرم کھجڑی، دال، چپاتی، ٹھنڈی سبز ترکاریاں، رو، خرق، تری، ٹینڈا وغیرہ دیں اور گرم و خراش دار چیزیں، لال مرچ، تیز مصالحہ دار غذا، ترشی، اچار، چٹنی، گوشت اور اند سے

سے پرہیز کریں۔ شراب نہ پی جائے۔ اور زیادہ چلنے پھرنے سے سخت پرہیز کریں۔

وہنروآت، جسم کا اکڑ جانا، تھوکر از، ٹے ٹے نس، (TETNUS)

اس مرض کے جراثیم حیوانات کی لپید اور گوبر میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ گوبر سے کسی زخم یا درم یا ضرب و خراش کے ذریعے جسم میں پہنچ کر مرض پیدا کر دیتے ہیں۔

دیکھیں کتاب ہذا دوسرا باب _____ اعصاب کی بیماریاں صفحہ نمبر ۳۹

منجراں، خنازیر، کنٹھ مالا، سکروفولا، (SCROFULA)

تحقیقات جدید سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ایک جرثومی مرض ہے۔

دیکھیں کتاب ہذا چھٹا باب _____ حلق کی بیماریاں صفحہ نمبر ۱۱۹

پرواہکا، پچش، زخیر، ڈسینٹری، (DYSENTRY)

جدید تحقیقات کے مطابق اسے ایک جراثیمی مرض قرار دیا گیا ہے اور اس کے مطابق یہ ایک متعدی یعنی چھت کی بیماری ہے، جو ایک مریض سے دوسرے مریض کو ہو جاتی ہے۔

دیکھیں کتاب ہذا نواں باب _____ معدہ اور آنتوں کی بیماریاں صفحہ نمبر ۱۹۰

ہیفنہ، وسوچکا، کالرا، (CHOLERA)

دیکھیں کتاب ہذا نواں باب _____ صفحہ نمبر ۲۰۳

ششک کاس، کالی کھانسی، ہوونگ کف، (WHOOPIING COUGH)

تعریف مرض :- یہ ایک خاص قسم کے جرثومہ سے پیدا ہوتی ہے، اس کھانسی کے ساتھ ایک لمبی ہو کی آواز سیٹی کی طرح بھیجی ہے۔

وجوہات :- اس کا جرثومہ چھوٹا سا بیضوی شکل کا ہوتا ہے، جو مریض کی ناک اور منہ کی رطوبت میں پایا جاتا ہے، اس مرض کی چھت بیمار کے سانس یا کپڑوں وغیرہ سے تندرست بچوں میں لگ جاتی ہے۔

علامات :- چھت لگنے کے بعد معمولی بخار اور زکام کی شکایت ہو جاتی ہے۔ آنکھیں سوج جاتی ہیں۔ ہلکی سی خشک کھانسی ہوتی ہے۔

معمولی حالت میں کھانسی کے دورے ۲۴ گھنٹہ میں ۲۰ یا ۲۵ بار اور مرض کی شدت میں ۱۵۰ کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ دورہ کے آخر میں سانس کے ساتھ ایک آواز ہونے کی طرح نکلتی ہے۔ اکثر بچے کو تھکے بھی آجاتی ہے، اور کبھی بلا ارادہ پیشاب و پاخانہ نکل جاتا ہے۔ اس لئے اس مرض کا با احتیاط علاج کیا جائے۔

ڈاکٹری علاج :- مریض کو دوسروں سے الگ رکھنا ضروری ہے، بلکہ ساتھی بچوں کو پروٹوسنز و کیسین یعنی کالی کھانسی کا ٹیکہ بطور حفظہ ماقدم لگا دینا چاہیے، جس وقت ہو کی آواز پیدا ہونے لگے، تو اس وقت ہوائی نالیوں کو تسکین دینے والی ادویہ دیں۔ اس سلسلہ میں پنچر بلا ڈونا تین بوند، پوٹاسیم برومائڈ دو گرین، اکو کمفر آدھا اونس، ایسی ایک ایک خوراک دن میں تین یا چار بار بلحاظ عمر دیں۔ برانکو نمونیا ہو جائے، تو سلفا ڈایازین یا سلفا تھایازول دیں یا پینیسلین یا سٹریپٹو پینیسلین کے عضلاتی انجکشن بلحاظ مزاج و عمر دیں۔ کالی کھانسی و دیگر عوارضات کے لئے کلورومائیٹین بہترین دوا ہے۔ اس کے استعمال سے دوروں کے وقت اور وقفہ میں نمایاں طور پر کمی ہو جاتی ہے، چھوٹے بچوں کے لئے کلورومائیٹین پلیمی ٹریٹ کا استعمال کیا جائے۔ مریض کو سردی سے بچایا جائے۔

جیسا کہ ہم لکھ آئے ہیں کہ جدید طریقہ علاج میں کلورومائیٹین اس مرض کا موثر علاج ہے، جو کہ بڑوں کے لئے ایک کیپ شول دن میں چار بار دیں یا سنٹھومائیٹین کا استعمال کریں، چھوٹے بچوں کے لئے کلورومائیٹین پلیمی ٹریٹ یا سنٹھومائیٹین کا استعمال کریں، چھوٹے بچوں کے لئے کلورومائیٹین پلیمی ٹریٹ یا سنٹھومائیٹین شربت ہم سے ایک چھوٹا چمچہ دن میں چار بار بلحاظ عمر دیں۔ اس سلسلہ میں ریومائیٹین استعمال بھی مفید ہے۔

ایفڈرین یا اس سے تیار شدہ شربت زلیفرول کا استعمال بھی کرایا جاتا ہے، پیٹنٹ ادویات میں شربت وسا کا، گلائیکوڈین، الکسر لیرین بروم، زلیفرول وغیرہ کا سب موقعہ استعمال مفید ہے۔ بیماری کے بعد کی کمزوری کے لئے کیلسیم اور کاڈ بور آئیل کے مرکبات کا استعمال کیا جائے تاکہ مرض کا دوبارہ حملہ نہ ہو۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ کلورومائیٹین (Chloromycetin) بشکل پالیمی ٹریٹ ملتا ہے۔ تحقیقات جدید سے ثابت ہوا ہے کہ اس دوا سے کالی کھانسی کی نوبتوں یا دوروں کی تعداد مدت عوارض کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے، چھوٹے بچوں کے لئے کلورومائیٹین پالیمی ٹریٹ موزوں ہے، ایکٹ چمچہ خوردن میں تین چار بار دیں۔ یہ دوا وٹامنز کے ساتھ بھی ملتی ہے۔ وٹامنز ملی دوائی بڑا اثر پیدا نہیں کرتی۔

۲۔ ایکرومائیٹین (Achromycin) لیڈر ہے۔ یہ ٹیٹراسائیکلین کا دوسرا نام ہے، کالی کھانسی، ٹائفلوئیس، منونیا، سرسام، دماغ کی سوزش کے لئے مفید ہے۔ بڑوں کو دن بھر میں دو سے چار کیپ شولز دیں۔ بچوں کو تین چار ڈراپس دن میں چار بار دیں۔

۳۔ انٹرو سائیکلین (Enterocyclin) ڈیز۔ خسرہ، چیچک، کالی کھانسی، خناق، منونیا، جراثیمی پچھل و سردی لگنے لگنے کے دم کے لئے مفید ہے، جہاں دیگر انٹی بائیوٹکس فیل ہو جائیں۔ وہاں یہ کامیاب نتائج دیتی ہے۔ یہ کلورم فینی کال اور ٹیٹراسائیکلین کا مرکب ہے۔ ایک کیپ شول چھ گھنٹہ کے وقفہ سے، بچوں کو شربت نصف تا ایکٹ چمچہ ہر چھ گھنٹہ بعد دیں، بچوں کے لئے انٹرو سائیکلین سی کیپ شول ملتا ہے۔

۴۔ ٹرائی سین (ایم ایس ڈی) ۲۵ ملی گرام، ریڈوکسان (روش) ۵۰۰ ملی گرام۔ دونوں کو ایک ساتھ پیس کر دو پڑیاں بنائیں۔ ایک پڑی صبح و ایک شام پانی سے دیں۔ بچوں کو بلحاظ عمر دیں۔

۵۔ اگر کوئی بچہ کالی کھالی میں مبتلا ہو جائے تو گرد و پیش کے سب بچوں کو اس چھوت سے محفوظ رکھنے کے لئے ایم پرسی پیڈ (Alumprecipita) ساختہ گلیکو، آدھی سی سی کا عضلاتی انجکشن دینا چاہئے اور چار ہفتہ بعد دوسری بار ایک سی سی کا عضلاتی انجکشن دیں۔ اس ویکسین کا زیر جلد ٹیکہ نہ کریں۔

۶۔ ٹاکسی لکس (Tixilix) سیرپ یا ٹوسانول سیرپ یا بی آئی کف سیرپ یا زلیفرول سیرپ میں سے کوئی ایک لے کر ایکٹ چھ دن میں دو سے تین بار دیں۔

یونانی علاج :- کیلا کے پتوں کی راکھ کا شہد میں ملا کر چٹا نامفید ہے، یا پشکڑی سفید ایک تولہ کیلے کے پتوں کا رس دس تولہ پشکڑی کو توڑے پر رکھ کر آگ جلا میں اور کھوڑا کھوڑا کیلے کے پتوں کا رس ڈالتے رہیں، جب تمام عرق جذب ہو جائے تو پشکڑی کو پیس لیں اور چوتھائی سے آدھی رتی تک شہد میں ملا کر دن میں دو سے تین بار دیں۔

دوائے کالی کھانسی :- بچوں کی کالی کھانسی کے لئے از حد مفید ہے، آلیس، کاکڑا سینگ، فلفل دراز، ہوزن پیس کر شہد میں ملا کر محفوظ رکھیں۔ دن میں چار بار معمولی مقدار میں چٹائیں۔

کف ہرن (کالی کھانسی کے لئے از حد مفید ہے) :- اجوائن دیسی حسب ضرورت لے کر توڑے پر رکھ کر تینچے آگ جلا دیں اور ہلا کر راکھ بنالیں۔ اور برابر شہد ملا لیں۔ ایک ماشہ سے تین ماشہ تک بلحاظ عمر دیں۔ دو چار دن میں دورے کم ہو جاتے ہیں اور کچھ عرصہ متواتر استعمال کرنے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔

چرچٹہ کا نمک :- ایک رتی سے دو رتی ہمراہ شہد دن میں دو تین بار چٹانے سے کالی کھانسی کو آرام آ جاتا ہے یا چرچٹہ بوٹی کی جڑ کی راکھ کو شہد میں ملا کر استعمال کرنے سے بھی یہی فائدہ ہوتا ہے۔

آیور ویدک علاج :- خالص دودھ گائے آدھ پاؤ، خالص گھی گائے ۹ ماشہ، پانی آدھ پاؤ۔ تینوں کو جوش دیں، جب پانی جل جائے اور صرف دودھ باقی رہ جائے تو دو تولہ مصری ملا کر پلائیں، کھانسی کے لئے از حد مفید ہے۔

۲۔ سیاہ بکری کا تازہ دودھ جس کی قدرتی حرارت موجود ہو، مصری ملا کر دن میں تین بار پلانے سے کالی کھانسی کو آرام آ جاتا ہے۔

۳۔ کچا امرود آگ میں بھون کر کھلانے سے کالی کھانسی کو آرام آ جاتا ہے۔

ہومیو پیتھک علاج :- اپی کاک (کھانسی کے ساتھ قے ہوتی ہو)، آیو ڈیم (بلغم کی تنگی سے کھانسی ہو)، اکوناٹ (کھانسی کے ساتھ سردی و زکام ہو)، امونیا کارب (کھانسی پرانی حالت میں ہو) یہ مفید ادویات ہیں۔

بایو کیمک علاج :- شروع مرض میں کالی میور اور پرانی حالت میں کالی فاس دیں۔ درمیانی حالت میں میگ فاس کا استعمال از حد مفید ثابت ہوتا ہے۔

غذا و پرہیز :- غذا میں دودھ، انڈہ نیم برشت، ساگودانہ، مرغ کا شوربا اور بخنی دیں۔ گو بھی، آلو، بھنڈی اور مینگن وغیرہ سے سخت پرہیز کرائیں۔

مہاکشٹھ، جذام، کوڑھ، پیرسی، (LEPROSY)

دیکھیں کتاب ہذا اٹھارواں باب — جلد کی بیماریاں صفحہ نمبر ۴۹۸

الزک و ش، ہلکاؤ، سگ گزیدہ کا جنون، بیزہ (RABIES)

تعریف مرض :- یہ ایک متعدی بیماری ہے جو دودھ پلانے والے جانوروں کو جیسے کتا، بومڑی، بھیریا اور گیدڑ کو ہوتی ہے اور مرض کا زہریلا مادہ (وائرس) بیمار جانور کی رال میں ہوتا ہے جو مرکزی نظامِ عصبی کے ذریعہ سرایت کر جاتا ہے۔

وجوہات :- یہ مرض عام طور پر باؤسے کتے کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ اگر کتا دس روز کے اندر مر جائے تو اس کے باؤسے ہونے کی علامت ہے۔ جانور کے کاٹنے کے بعد علامات مرض فوراً ظاہر نہیں ہوتے، عام طور پر چالیس روز بعد یا آٹھ ماہ بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ اس سلسلہ میں کاٹنے کا مقام جس قدر دماغ کے قریب ہو ۱۰ اس قدر جلد مرض ظاہر ہوتا ہے۔

علامات :- اس مرض کو ٹے ٹے نس (کزاز) سے تشخیص کرنا ضروری ہے، چنانچہ مرض کزاز میں پتھوں کی اینٹھیں متواتر رہتی ہیں، لیکن اس مرض میں مسلسل نہیں ہوتی، اس مرض کا فوراً علاج کرنا چاہیے، ورنہ خدا نخواستہ علامات ظاہر ہو جائیں، تو اکثر علاج ثابت ہوتا ہے اس مرض میں شراب کا استعمال سخت مضر ہے۔

حفظِ مالِ مقدم :- گرمی کے موسم میں پالتو کتوں کے منہ پر جالی باندھ دینی چاہیے اور آوارہ کتوں کو مروادینا چاہیے۔

مقامی علاج :- زخم کے اُپر مضبوط پٹی باندھ دیں۔ یہ پٹی آدھا گھنٹہ سے زیادہ نہ بندھی جائے۔ زخم کو پانی و صابن سے دھو کر خشک کریں۔ پھر آدھا گھنٹہ کے اندر اندر زخم کو نشتر سے کاٹ کر خون بہنے دیں اور اس میں پوٹاسیم پرمینگنیٹ یا سلفا نے مائیڈ کا پوڈر بھر دیں یا کاربالک ایسڈ سے جلادیں اور جس قدر جلد ہو سکے مریض کو ہسپتال یا انسٹی ٹیوٹ میں داخل کرادیں۔ وہاں باؤسے خرگوش کے حرام مغزی یا دماغ سے تیار شدہ انسٹریک ویکسین کی مریض کے پیٹ کے جانی عضلات میں ہر چوتھے دن جلدی سچکاری کیا کرتے ہیں۔ مکمل علاج کے لئے چودہ درجہ وار ٹیکے لگوانے ضروری ہیں۔ مریض کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب ہلکاؤ شروع ہو جائے تو علاج ہے۔

قطر شعاعی، پھپھوند کزنی، سل کا ذب، اکٹی نو مائی کو سز

(ACTINOMY COSIS)

تعریف مرض :- اس مرض کا باعث پھپھوندی کا جراثیم ہے جو چہرہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہ مرض انسانوں و حیوانوں کے دونوں میں ہوتا ہے اور کھانے پینے و سانس کے ذریعے اس مرض کی چھت لگتی ہے۔

وجوہات :- یہ مرض گھاس کے تنکے منہ میں چبانے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس مرض کے جراثیم گہیوں وغیرہ میں پائے جاتے ہیں، اس لئے گہیوں کو پھٹکنے و صاف کرنے والے لوگ اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ حیوانوں پر اس مرض کا حملہ ہو تو ان کی زبان سخت ہو کر چھوٹے چھوٹے اُبھار پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب انسانوں پر حملہ ہو تو جبرے پر ایک رسولی نما درم ہو جاتا ہے اور چند روز بعد ڈنبل بن کر پھوٹ جاتا ہے۔

علامات :- اس مرض کا جراثیم منہ، انٹریلوں، سانس، جلد اور کئی بار یونی (ویجائنا) کے اندر داخل ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں جبرے پر پھوٹے یا رسولیاں ہو جاتی ہیں، جو بعد میں پھٹ جاتی ہیں، جس سے براکونوینا، بخار، کھانسی، کمزوری، انٹریلوں کی

سوجن، جگر کا پھوڑا وغیرہ عوارضات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جراثیم آنتوں میں چلے جائیں تو دُرم زائدہ عوارض (اینڈس سائٹس) ہو جاتے ہیں۔
 ڈاکٹری علاج :- پوٹاسیم آیوڈائیڈ دس گرین پانی میں حل کر کے صبح و شام دیں، علاوہ ازیں پینی سلین یا پروکین پینی سلین کے عضلاتی
 انکشن مفید ہیں۔ کھانے کے لئے آریو مائی سین یا کلورو مائی ٹین یا ٹیرامائی سین کا استعمال مفید ہے۔ زیادہ تکلیف کی حالت میں مریض
 کو ہسپتال لے جانا چاہیئے، کیونکہ اس مرض کا آپریشن ہی مؤثر علاج ہے۔
 یونانی علاج میں معجون چوب صینی ۹ ماشہ دیں اور دیگر علامات کا حسب دستور علاج کریں۔
 غذا و پرہیز :- زود ہضم و مقوی غذا دیں، تیل کی ترش چیزوں سے سخت پرہیز کرائیں۔

تاج الحکمت

(پریکٹس آف میڈیسن)

از قدامت طب حکیم سید وارث علی وارث احسنی ٹونک


جناب وارث علی وارث احسنی صاحب
 ودیگر مہربان میری تصانیف کی تو تعریف کر
 سکتے ہیں، کیونکہ یہ تمام طبی طبقہ کی ہیں اور
 میں دوستوں کی رہنمائی سے ہی انہیں ترتیب
 دیتا ہوں، لیکن میری ذاتی تعریف نہیں کی جانی
 چاہیئے۔ امید ہے کہ تمام دوست آئندہ خیال
 فرماویں گے!

بندہ ہری چند ملتان



اے طبیب روح و امراض و علی صفا || تیرے دم سے شعبہ حکمت کو ہے ابتک ثبات
 فیض بخش درد منداں راحت افزا تیری ذات || محرم تولید حکمت واقف سرنیبات
 تو ہے اسرار حیات جاوداں کا رازدار
 تیرے سر پر منعکس ہے رحمت پروردگار
 بوعلی سینا و لقمان و ارسطو بالکمال || فیثا غورث رومی اسکندر ذکر یا بسمثال
 سر جس و نظروس و بقراط ہر عالی مقام || سب کی خوبی تجھ میں پاتے ہیں بلطف و الجلال
 اتنا کہہ سکتے ہیں تیرے واسطے اہل مزاج
 ہے ہری چند تیرے سر پر آج کی حکمت کا تاج
 اے پرستار گلستاں اے فدائے رنگ و بو || ذوق تیرا خوش مزاجی غمگساری تیری خو
 تیرا چرچا ہر زباں پر ترا شہرہ چارو || دورِ حاضر کا حکیم و ڈاکٹر نباض تو
 تو نے بخشا ہے سکونِ دل، دل بیمار کو
 کر دیا تو نے جدا بیمار سے آزار کو
 ہے شرف تجھ کو کہ تو پانی پت کا باشندہ ہے || شہر پانی بیت سینکڑوں انوار سے خندہ ہے
 بزرگوں سے فیض جو تجھ کو ملا پائندہ ہے || آسمان پر اس لئے کوکب ترا تابندہ ہے
 بن گئی ہے ذات تیری قابل صدا احترام
 احسنی وارث بھی تجھ کو پیش کرتا ہے سلام
 ہے کتاب زندگی زریں تری تخیل کی || ہر سطر میں جیسے جولانی ہو رود نیل کی
 کاوشیں اس میں ہیں پوشیدہ تری تکمیل کی || جس طرح شامل ہوا ہوشہ پر جبریل کی
 بادۂ عنصر کی روح، ضو بار تیرے خم میں ہے
 گوہر صادق کی ارزانی تیرے قلزم میں ہے
 میرے ملک ہند کا ہے صاحب اعزاز تو || ہند جس پر کر رہا ہے وہ سراپا ناز تو
 ہر مرض کا ہر طریقہ سے ہے چارہ ساز تو || بربط ہستی کی ہر اک تار کی آواز تو
 سر سے پاتک رب دریدوں کا تجھے احساس ہے
 یونان سے نکلی معنی جو حکمت وہ تیرے پاس ہے

لے تاج الحکمت (پریکٹس آف میڈیسن)



بائیسواں باب

امراض عامہ

گردھرسی، عرق النسا، ریشکن باؤ، سیاٹیکا، (SEIATICA)

دیکھیں کتاب ہذا دوسرا باب _____ اعصاب کی بیماریاں صفحہ نمبر ۴۶

آم وات، کنٹھیا، وجع المفصل، روماتزم، (RHUMATISM)

دیکھیں کتاب ہذا، آم وات جور، بایسواں باب _____ بخاروں کا بیان صفحہ نمبر ۵۵

جورون کا پتھراجانا، تخر المفصل، آرٹھرائٹس، (ARTHRITIS)

تعریف مرض :- اس مرض میں بجائے جوروں کی جھلیوں کے ہڈیاں بننے لگتی ہیں اور جوروں کی کیریاں اور ہڈیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔
وجوہات :- یہ عارضہ سوزاک، نمونیا، گردن توڑ بخار اور بعض قسم کے مستعدی بخاروں کے زہریلے اثرات سے اور عورتوں میں سن یاس کے عوارضات یا بچہ دانی کی بعض بیماریوں سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے، بعض دفعہ دق و سوزاک کے جراثیم سے یہ تکلیف ہو جاتی ہے۔

علامات :- جب اس مرض کا شدید حملہ ہو تو بہت سے جوڑا ایک ہی بار مرض میں جکڑے جاتے ہیں، بخار ہوتا ہے، اکثر اس مرض کی ابتدا دونوں ہاتھوں کی درمیانی دو انگلیوں کے جوڑوں سے ہوا کرتی ہے، ایک جوڑے میں سوجن ہو کر چند دنوں میں آرام آجاتا ہے، پھر دوسرا جوڑا سوج جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد اسی جوڑے میں دوبارہ مرض عود کر آتا ہے، چند بار ایسا ہونے سے جوڑا خراب ہو جاتا ہے۔ اس طرح تمام جوڑے کا یہ ہو کر بالآخر گردن کے جوڑے بھی بے کار ہو جاتے ہیں، گنٹھیا جوڑوں کا پتھر اجانا میں تشخیص یہ ہے کہ جوڑے کی بناوٹ میں گنٹھیا کی نسبت زیادہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور بخار کے ساتھ پسینہ کم آتا ہے اور گنٹھیا میں بڑے بڑے جوڑے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

ڈاکٹری علاج :- جدید تحقیق کے مطابق نوذکین اس مرض کا موثر علاج ہے اور اس کا دو فیصدی گھول کا دوسری سی کی مقدار میں عضلاتی انجکشن ہفتہ میں دوبار دینا مفید ہے۔ یہ علاج لمبے عرصہ تک جاری رکھنا چاہیے۔ اس سے پھرائے ہوئے جوڑے پلنے جلنے لگ جاتے ہیں۔

اس مرض میں سونے کے مرکبات مایو کرائی سین وغیرہ کا استعمال مفید ہے، سب سے زیادہ مستعمل لائی کیلسائن و ڈیگولڈ (Licalcin With Gold) مفید ہے، جو کہ مرض کو ہٹانے اور کمزوری کے لئے مفید ہے۔ اس مرض میں پینی سلین اور سلفا گروپ اور دوسری انٹی بائیوٹک ادویات کوئی اثر نہیں کرتیں، نئی ادویات کو رٹی سون کو نفع بخش بتایا جاتا ہے، لیکن اس کا استعمال بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔

رفع درد کے لئے ایسپرین ۵ گرین یا نوو بچین یا کوڈوپارین کا استعمال کریں۔ ماؤف جوڑوں پر پتھل سلی سیٹ لینی منٹ لگائیں اور روزانہ ماؤف جوڑوں کو سورج کی روشنی میں دس پندرہ منٹ تک ننگا رکھیں، سردی سے بچائیں، فلائین کے گرم کپڑے پہنیں۔

مایو کرائی سین (Myocrisin) کے مرکبات بعض اوقات مضر ثابت ہوتے ہیں، اس لئے دوران علاج میں کاربوہائیڈرائٹس اور وٹامن سی والی اغذیہ جاری رکھیں، مریض کو تیز دھوپ سے بچائیں تاکہ بد اثرات پیدا نہ ہوں۔

ایسکا پائرین (Esgipyrin) بھی اس مرض کا موثر علاج ہے، یہ دوا دافع درد و مسکن الم ہے، عرق النساء، گنٹھیا، وجع المفاصل کے لئے مفید ہے۔ مقدار خوراک ایک ٹمیکہ دن میں تین بار ہمراہ پانی دیں اور شدت مرض میں ہر تیسرے دن ایک امپول کا گہرا عضلاتی انجکشن با احتیاط لگائیں مریض انجکشن لگانے کے بعد بھی چند منٹ لیٹا ہے، کمزور مریضوں میں یہ انجکشن چوڑے کے بیرونی اور بالائی گوشہ میں گہرا لگایا جاتا ہے اور دوا آہستہ آہستہ داخل کی جائے، موٹے آدمیوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ مریض کو لٹا کر انجکشن کیا جائے۔ ایسکا پائرین کا پُرانا نام ارگا پائرین (Irgapyrin) ہے۔

ماؤرن ادویات :- ۱۔ الگی کارٹ (Algicort) واسٹہ — گنٹھیا، آرٹھرائٹس کے لئے مفید ہے۔ ایک سے دو گولی دن میں تین بار دیں۔ آرام ہونے پر مقدار دوا کم کرتے جائیں۔ مریض ان ذیابیطس کو نہ دیں، پریڈنی سولون اور ایسے سلی سلک ایڈ پر مشتمل یہ دوا درم اور درد کو آرام دیتی ہے۔

۲۔ وائی سولون (Wysolone) واسٹہ — گنٹھیا، آرٹھرائٹس، گنٹھیا، بخار میں مفید ہے۔ یہ دوا پریڈنی سولون سے بنتی ہے اور دافع درم ہے۔ اور حساسیت کو بھی رفع کرتی ہے، اس کمپنی کی وائی سے سون (Wymesone) کو رٹی سٹرائیڈ مادہ ڈیکسا میتھاسون سے مرکب ہے اور گنٹھیا، آرٹھرائٹس کے لئے مفید ہے۔ اسے عام کی طرح استعمال کریں۔

۳۔ ڈیکسا بوتارین (Dexa-butarin) تقسیم — فینائل بوتازون گروپ کی تمام دواؤں میں ڈیکسا بوتارین ایک اہم اور بلند تر مقام رکھتی ہے، کیونکہ اس میں ڈیکسا میتھاسون اور وٹامن سی شامل ہونے سے اس کی تاثیر بڑھ گئی ہے اور دوسرے فینائل بوتازون سے ہونے والے نقصان وٹامن سی ملا دینے سے کم ہو گئے ہیں۔ شدید درد میں جب عام طور پر نیا علاج کرے ہوں تو ایک ایک ٹمیکہ دن میں تین سے چار بار دیں — اگر پرانے کیس میں اسے زیادہ دنوں تک دینا ہو تو ایک صبح اور ایک شام یعنی دن میں

دو بار دیں۔

۴۔ ایکواپریڈ (Equapred) دوائے _____ گنٹھائی آرٹھرائٹس۔ پشت کے نچلے حصہ میں درد میں مفید ہے، ایک دو ٹیکہ دن میں تین سے چار بار دیں۔ ذیابیطس، معدے کے پھوڑے میں نہ دیں، دیگر احتیاطیں مطابق عام کارٹی کو سٹرائیڈ تھیراپی کے ہیں۔

۵۔ کارلن (Corlin) یہ پریڈنیسولون کی مانند ہے، دوائے پیروں، جوڑوں، کمر وغیرہ کی آئیو میٹک سوزش والی ریکٹ سوزش میں مفید ہے، ایک ایک ٹیکہ دن میں تین بار دیں۔

۶۔ ارگاپائرن (Irgapyrin) گیلی _____ ایک ایک ٹیکہ دن میں تین بار دیں یا ایک ایمپول کا ہر تیسرے دن گہرا عضلاتی انجکشن لگائیں۔ مریض انجکشن لگانے کے بعد بھی لیٹا ہے، کمزور مریضوں میں یہ انجکشن با احتیاط لگائیں، کیونکہ بعض مریضوں کو اس کی برداشت نہیں ہوتی، نیا نام اسکا پائرن ہے۔

۷۔ بیوٹا ذولی ڈین (Butazolidin) گیلی _____ شدت درد میں چار سے آٹھ ٹیکیاں روزانہ دیں، معدہ میں زخم ہو یا دل جلر یا گردے ماؤف ہوں تو اسے نہ دیں۔

۸۔ ڈیلٹاکورٹریل (Deltacortril) فزیر _____ ایک ایک ٹیکہ دن میں تین بار دیں، سل و بقی اور زخم معدہ میں نہ دیں۔ یہ زہریلی دوا مستند ڈاکٹر کی زیر نگرانی استعمال کی جائے۔

۹۔ کورٹریل (Cortril) فزیر _____ یہ ہائیڈروکارٹی سون کا تجارتی نام ہے، شروع میں ۲۵ ملی گرام صبح و شام دیں، جب خاطر خواہ آفاقہ ہو جائے تو ہر پانچویں دن ۵ ملی گرام کم کرتے جائیں۔

۱۰۔ لیڈرکورت (Lederkort) لیڈرے _____ یہ بہت کم مخالف اثر رکھتی ہے اور کم خرچ بالائین اور طویل المدت معالج کے لئے موزوں ہے۔ یہ ایسے حالات میں تجویز کی جاتی ہے، جن میں کارٹی زون کی ضرورت ہے۔

۱۱۔ پینے ڈول (Panadol) بائر _____ یہ آرٹھرائٹس میں مفید ہے، دو ٹیکیاں ہر چار گھنٹے بعد دیں۔

۱۲۔ ڈیلٹا بیوٹا ذالی ڈین (Delta butazolidin)۔ آرٹھرائٹس وغیرہ میں بے حد مفید ہے۔ یہ بیوٹا ذالی ڈین اور پریڈنیسولون کا مرکب ہونے سے ورم کو دور کر کے درد کو جلد سکون دیتا ہے، وجہ المفاصل، ہیوٹائٹڈ آرٹھرائٹس، عضلاتی ورم، اعصابی ورم میں مفید ہے، پہلے درجہ میں چار ٹیکیاں روزانہ، درجہ دوم میں دو سے چھ ٹیکیاں دن میں تین بار دی جاتی ہیں اور جب علامات مرض پر قابو پا لیا جائے تو صرف دو ٹیکیاں دن میں دو بار یا ایک گولی دن میں تین بار کافی ہے۔

۱۳۔ ڈیکادرون (Decadron) مرک شارپ ڈوم _____ یہ دراصل ایک ماڈرن مصنوعی اسٹرائیڈ ڈیگرمیٹھاسون ہے، جو ایک دافع التهاب، دافع گنٹھیا و دافع حساسیت دوا ہے۔ یہ دوا ڈیکاکورٹی سل اور اورے ڈیکسون تجارتی ناموں سے بک رہی ہے۔ یہ پانچ ملی گرام ٹیکہ کی شکل میں براہ دہن مرض کی ماہیت اور شدت کے مطابق استعمال کی جاتی ہے۔

یونانی علاج :- اصل سبب کا علاج کریں، مریض کو گرم بستر پر لیٹائیں، مقام ماؤف کو گرم پانی میں نمک ملا کر یا جو شانڈہ پوست سے ٹکور دیں، خوراک کی طور پر جب سورشخاں اور بیرونی روغن سورخاں یا روغن گل آک کی مالش کریں، درد کو رفع کرنے والی ادویہ جو گنٹھیا کے بیان میں لکھی گئی ہیں کا استعمال کریں۔

روغن گل آک :- گل آک، برگ بھنگ، سورخاں تلخ، سونٹھ ہر ایک ایک تولہ، تلوں کا تیل دس تولہ میں جوش دے کر چھان لیں، اور مقام درد پر نیم گرم مالش کر کے اوپر پیرانی روئی باندھ دیں، جوڑوں کے درد، کمزپنڈلیوں کے درد کے لئے بہت مفید ہے۔

روغن سُرخ :- سونٹھ، جالفل، لونگ، عقرقرچا، حرمل (اسپند سوختنی) ہر ایک ایک تولہ، کوٹ کر رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح جوش دے کر چھان لیں۔ اس میں تلوں کا تیل دس تولہ ملا کر دوبارہ پکائیں، جب پانی خشک ہو جائے تو آگ سے اتار کر تھوڑا سا رتن جوت کا رنگ ملا دیں۔ تیل کو چھان کر محفوظ رکھیں، مقامِ ماؤف پر نیم گرم مالش کریں، جوڑوں کے درد، نفرس، عرق النساء اور کوہوں کے دردوں کے لئے مفید ہے۔
طب یونانی اور آیور وید میں کشتہ سونا ایک چاول کا مناسب بدرقہ سے استعمال مفید ہے، معجون سوربجاں و حب سوربجاں بھی مؤثر علاج ہے، نسخہ جات گنٹھیا کے بیان میں دیکھیں۔ ہومیوپیتھک، آیور ویدک و یونانی علاج بطرز گنٹھیا ہے۔ وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

وَاتُ لَکْتُ، چھوٹے جوڑوں کا درد، نفرس، گاؤٹ (GOUT)

تعریف مرض :- اس مرض میں پیروں اور ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ ماؤف اور سوج جاتے ہیں۔ اکثر یہ مرض پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں سے شروع ہوتا ہے، اس مرض کا دورہ ۷۵ دن تک رہتا ہے۔ علامات کے لحاظ سے (ایکیوٹ) اور مزمن (کرائنگ) دو قسمیں ہوتی ہیں۔

وجوہات :- یہ مرض خون میں تیزابی مادہ (یورک ایسڈ) (Uric Acid) کی زیادتی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اس میں تیزابی مادہ کے کرسٹل جوڑوں کے اندر جم جاتے ہیں۔ یہ مرض اکثر سوروٹی ہوتا ہے اور ادھیڑ عمر میں زیادہ تر امیر لوگ مبتلا ہوا کرتے ہیں، جو کہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ پرانی صورت میں زہر سیہ اس مرض کی وجہ ہو سکتی ہے، چنانچہ سیہ کے کارخانوں میں کام کرنے والے یارنگ ساز یا ٹائپ بنانے والے کاریگر اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس مرض میں یورک ایسڈ زیادہ مقدار میں بنتا ہے اور گروہ اس کو پوزی طرح خارج نہیں کر سکتے، اس طرح خون میں کافی مقدار میں یورک ایسڈ ہو جانے سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- اکثر دائیں پاؤں کے انگوٹھے کے جوڑ میں آدھی رات کے وقت اس زور کا درد ہوتا ہے کہ مریض بے چین ہو جاتا ہے، معمولی سردی سے بخار ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد پسینہ آکر بخار کم ہو جاتا ہے، صبح کے وقت جوڑ سوجے ہوئے سُرخ مائل ہوتے ہیں اور درد کے مارے انہیں چھوا نہیں جاسکتا۔ اس مرض کا حملہ پانچ سے آٹھ دن تک رہتا ہے اور یہ مرض جسم کے دوسرے جوڑوں میں بھی پھیل جاتا ہے، جوڑ بد وضع ہو جاتے ہیں اور ان پر کانٹھیں ہو جاتی ہیں، کبھی ان کا چمڑہ پھٹنے سے زخم ہو جاتے ہیں، جو آسانی سے اچھے نہیں ہوتے۔

تشخیص مرض :- اس مرض کو شدید گنٹھیا، جوڑوں کا پتھر اجانا سے تشخیص کرنا ضروری ہے۔ جوڑوں کے پتھر اجانے کا مرض اکثر بیس سے چالیس برس کی عمر میں ہوا کرتا ہے اور اکثر عورتیں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں۔ شدید گنٹھیا میں بخار شدید ہوتا ہے اور صرف بڑے بڑے جوڑ مبتلا ہوتے ہیں۔ شاذ و نادر انگوٹھے میں ہوتا ہے۔ ماؤف جوڑ میں کوئی بد صورتی پیدا نہیں ہوتی، لیکن نفرس (گاؤٹ) عورتوں کی نسبت مردوں کو زیادہ ہوتا ہے، مرض کا پہلا حملہ دائیں پاؤں والے انگوٹھے کے جوڑ میں اُسی جگہ تک محدود ہوتا ہے۔ مرض کے بار بار حملے سے ہی ناک کی کریوں، کان کی لومیں یورک ایسڈ جمع ہو جانے سے گٹھلیاں یا آبھار پیدا ہو جاتے ہیں، جو چمڑا پھٹ جانے سے سفید کھڑ یا مٹی کی طرح نکل آتے ہیں، جوڑوں میں سختی ہوتی ہے اور حرکت سے سخت درد ہوتا ہے، کلائیائیں، ٹخنے، کہنیاں اور گٹھنے تک مبتلائے مرض ہو جاتے ہیں۔ مندرجہ بالا علامات کو سامنے رکھ کر اس مرض کی تشخیص کی جاسکتی ہے۔

ڈاکٹری علاج :- عضو ماؤف کو مکمل آرام دیں اور متھیل سلی سلاس یا سلو بنیزلنی منٹ یا بام یا آیوڈ کیس کم متھیل سلی سلاس مرہم لگا

کرکٹ میں پیٹ کر سینگ کرنا چاہیے۔ شدید نقرس میں مندرجہ ذیل نسخہ جات مفید ہیں :-

۱۔ پوٹاسیم بائی کارب	۲۰ گرین	دیں۔ کمزور مریضوں کو نصف خوراک دیں۔
پوٹاسیم سٹریٹ	۲۰ گرین	
ٹینکچر آف کالچی کم	۱۵ منم	
سپرٹ آف کلوروفارم	۱۵ منم	
ایسی ایک ایک خوراک پانی میں ملا کر دن میں تین بار دیں شدت		
مرض میں مفید ہے۔ کمزور مریضوں کو نصف مقدار میں دیں۔		
۲۔ سوڈا سلی سلاس	۲۰ گرین	
پوٹاسیم بائی کارب	۲۰ گرین	
ٹینکچر کالچی سائی	۱۵ منم	
ایکو اکلوروفارم	۱/۲ اونس	
ایسی ایک ایک خوراک قدرے پانی میں ملا کر دن میں تین بار		
مندرجہ ذیل پیٹنٹ ادویات بھی اس مرض میں استعمال کی جاتی ہیں۔ جو درد رفع کرنے کے لئے نہایت مفید ہیں :-		
سکوفین (Cincho Fen) :- ایک گولی دن میں تین بار دیں۔ شیرنگ کمپنی اسے ایٹوفین (Atofen) کے نام سے تیار کرتی ہے۔		
سبیا کمپنی اسے ایٹو کوائنل (Atoquinol) کے نام سے بناتی ہے۔ گنٹھیا، درد جوڑ اور گاؤٹ کے لئے مفید ہے۔		
وقفہ کے زمانہ میں کبھی کبھار ایسپرین ۵ گرین دن میں تین بار کھلاتے رہیں۔ اس سے شدید دورہ پڑنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، جدید کیمیاوی دوا		
سکوفین بھی یہی اثر رکھتی ہے، ہر دفعہ میں صرف تین دن کھلائیں۔ اس کو زیادہ عرصہ تک کھلانے سے درم جگر بھی کے پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، خالی معدہ		
نہ کھائیں۔ یہ دوا خون میں یورک ایسڈ کی مقدار بھی کم کر دیتی ہے، اور مٹھاپ کے راستہ کافی مقدار میں خارج کرتی ہے، لیکن جب بھی زہریلی علامات		
ظاہر ہوں، فوراً بند کر دیا جائے۔		
اس مرض کے علاج کے لئے وقفہ کی حالت میں ایٹوفینیل (Atophanyl) ایک امپول کا ہر دوسرے روز اندرون عضلات ٹیکہ مفید ہے۔		
وہ غذائیں جن میں پورین زیادہ ہوں، حتیٰ الوسع نہ کھلائیں، یاد رکھیں تلی، دل، جگر، گردوں، بلبہ، چائے، کافی، کوکو، مینگن میں پورین زیادہ		
ہوتے ہیں اور دودھ، پنیر، مکھن، کھانڈ، شہد، جام اور پھل پورین سے مبرا ہیں۔ بیڑ اور شراب سخت مضر ہیں۔ پانی زیادہ مقدار میں پلایا جائے۔		
ماڈرن ادویات :- روماتزم میں لکھے گئے نسخے اس مرض میں بھی مفید ہیں۔		
۱۔ انڈوسٹ (Indocid) مرکب شارپ ڈوم ————— ایک دوکیپ شولز دن میں تین بار دیں۔		
۲۔ لیڈر کوٹ (لیڈرے) ۵ ملی گرام، ایسپرین (بوٹس) ۳۲۵ ملی گرام، سی لین (گلیکو) ۱۰۰ ملی گرام، تینوں کو پانی کے ساتھ دن میں دو بار دیں۔		
۳۔ کوڈو پائیرین (گلیکو) ایک ٹیکہ، ریڈوکسان (روش) ۵۰۰ ملی گرام۔ دونوں کو باریک پیس کر ایک پڑا بنائیں اور چائے کے ساتھ دن میں		
دو بار دیں، سخت درد میں مفید ہے۔		
۴۔ ڈیکلادرون انجکشن (ایم، ایس، ڈی) ایک سی سی عضلاتی لگائیں، جوڑوں کا درد بہت زیادہ ہو تو مفید ہے۔		
۵۔ سونلجین (Sonalgin) سے اینڈیکر ————— یہ مسکن اور منوم نکلیاں بوٹوفین اور کوڈین سے تیار کی گئی ہیں۔ ایک یا دو کیے دن		

میں تین بار کھلائیں۔

۶۔ نولجین (Novalgin) بارے ————— ایک تین دن میں تین بار دیں، زیادہ درد کی حالت میں ایک ایمپول (دوسری سی) کا عضلاتی انجکشن کریں۔

۷۔ کول بینیڈ (Colbenimid) مرک شارپ ڈوم ————— حملہ مرض کے بعد ایک ٹکیہ روزانہ دیں۔ آج کل گاؤٹ کے مریضوں کے لئے یہ دوا لازمی قرار دی گئی ہے، کیونکہ یہ نفرس کے بدنما ابھاروں سے یورک ایسڈ خارج کرتی ہے۔ مریض کو ہرن کا گوشت، بھیڑ، بکری کے گردے، جگر، تلی کا استعمال نہیں کرنا چاہیئے۔

۸۔ کالچی سین (Colchicine) اس سے ایک ملی گرام کی ٹکیہ کا استعمال بھی مفید ہے۔

۹۔ ایوڈکس کم میقل سلی سلاس کی مالش سے ماؤف جوڑوں کی سوجن اتر جاتی ہے اور درد میں تخفیف ہو جاتی ہے۔

۱۰۔ انجمیک بام (پارک ڈیوس) یا بیل آیل (اینگلو فریچ کپنی) کی مالش بھی مفید ہے۔

یونانی علاج :- گنٹھیا (رومازم) میں لکھے گئے نسخے اس مرض میں مفید ہیں، عارضی طور پر درد کو تسکین دینے کے لئے معجون پر شش چار رتی کھلائیں، بیرونی طور پر روغن مستطیا یا روغن سرخ کی مالش کریں، جن کے نسخے پچھلے صفحات میں دیئے جا چکے ہیں۔ مندرجہ ذیل نسخجات اس مرض میں نہایت مفید علاج ہیں :-

سفوف سورنجاں :- سورنجاں تلخ ایک تولہ، سوخٹہ ایک تولہ، ہر زرد دو تولہ، بھول گلاب دو تولہ، سولف دو تولہ، سب کا سفوف بنا کر چھ ماشہ روزانہ پانی سے کھلائیں۔ وقفہ کے دوران میں یوگراج گوگل کا استعمال کریں۔ جن کے نسخے پچھلے صفحات میں دیئے جا چکے ہیں۔

حب انگوزہ، حب سورنجاں جن کے نسخجات گنٹھیا میں دیئے گئے ہیں۔ اس مرض کے لئے نہایت مفید ہیں۔

ایورودیک علاج :- بیرونی طور پر مہا نارائن تیل یا ارک تیل کی نیم گرم مالش کریں اور جو نسخجات گنٹھیا کے بیان میں لکھے گئے ہیں، ان کا استعمال اس مرض میں بھی مفید ہے۔

ہومیوپیتھک علاج :- شدید درد کی صورت میں کالچی کم، مرض کی پرانی حالت میں سلفرا اور سوجن کی حالت میں برائی اونیٹا کا استعمال مفید ہے۔

بالو کیمک علاج میں درد و سوجن کے لئے فیرم فاس، شدید درد میں میگ فاس اور جوڑوں کے بد وضع ہونے کی حالت میں کلکیر یا فلور کا استعمال کرایا جاتا ہے۔

غذا و پرہیز :- غذاء و دھم دیں، دودھ، باسے واسٹو وغیرہ کا استعمال کرائیں۔ دورہ مرض ختم ہونے کے لئے اناج، اندھے کی زردی، ساگ، پالک، مونگ کی دال، لیموں، نارنگی، انار، فالسہ، جامن وغیرہ دے سکتے ہیں۔ بینگن، گو بھی، چاول، گوشت، بلبہ، گردہ، کلیجی سے سخت پرہیز کرائیں۔

میدروگ، موٹاپا، سمن مفرط، فرہی، ابلسی ٹی، (OBESITY)

تعریف مرض :- جلد کے نیچے اور تمام بدن میں چربی کی مقدار بڑھ کر حرکات بدنی میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے اور جسم بے ڈول ہو

جاتا ہے جس سے انسان کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔

وجوہات :- انگوڑ، آم کا زیادہ کھانا، موروثی اثرات، ایام یاس، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا، شراب پینا، ورزش نہ کرنا، گردوں کی پرانی سوزش وغیرہ، جدید تحقیقات کے مطابق یہ مرض پانی کے زیادہ استعمال سے بھی پیدا ہو جاتا ہے۔

علامات :- جسم بے ڈول و چہرہ بھر بھرا ہوتا ہے، توند بڑھ جاتی ہے، مٹا پانصاف نظر آتا ہے، مریض کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے، عام طور پر موٹے آدمی خرابیوں کی سختی اور بڈ پریشر کی زیادتی کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔

ڈاکٹری علاج :- سب سے بہتر علاج غذا میں باقاعدگی لانا ہے اور ورزش موٹا پاروکنے کا بڑھیا علاج ہے، غذا کم کر دیں، مرغی نشاۃ دار خذیہ سے پرہیز کیا جائے، دودھ، گھی، مکھن، سمٹائی، آلو وغیرہ سے پرہیز کر لیں، نمک کم کھائیں، جہاں تک ہو سکے پانی کم پیئیں، صبح و شام پیدل راخوری کریں، موٹے آدمی کو زیادہ سونا نہیں چاہیے، اگر موٹا پانصاف خرابی کی وجہ سے تو ایکسٹریکٹ ہٹا کر ایڈہم کریں دن میں دو بار صبح، دوپہر اور شام کھلاتے رہیں اور آہستہ آہستہ اس کی مقدار تین گریں تک دن میں تین بار تک بے جائیں، اگر مریض کی نفی دوران استعمال میں ۸ مرتبہ سے زیادہ جائے تو اس دوا کی مقدار خوراک کم کر دیں، اور دل دھڑکنے لگے تو اس کا استعمال فوراً بند کر دیں، جب عورتوں کی خرابی غدد تناسلی کی خرابی سے یہ مرض ہو جائے تو زنانہ ہارمون کا استعمال کیا جائے، جن کا ذکر زنانہ امراض کے باب میں کیا جا چکا ہے، اگر دشمن سالٹ کیب ڈرام صبح اٹھتے ہی ایک اونس پانی میں حل کر کے پی لیں۔ اس سے بھی موٹا پاکم ہو جاتا ہے۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ آیوڈو بے سین (Iodob esin) اینگلو فرینچ دوا گولی روزانہ تازہ پانی سے دیں۔

۲۔ لمی کل (Limical) سارا بھائی یہ دوا بسکٹ کی صورت میں ملتی ہے اور بصورت بسکٹ استعمال کر سکتے ہیں۔

۳۔ پری ٹوڈن (Preludin) بوہرنگر ایک ٹکیہ صبح، ایک ٹکیہ دوپہر ناشتے سے پہلے پی لیں۔

۴۔ میٹھے ڈرین (Methedrin) باروز ویکم یہ میٹھل ایم فیٹامین ہائیڈروکلور کا تجارتی نام ہے، یہ بھوک کو کم کرنے اور موٹاپے کے علاج میں مستعمل ہے۔

۲۴ ملی گرام صبح اٹھتے وقت اور ۲۴ ملی گرام دوپہر کے کھانے سے پہلے گھنٹہ پہلے دیں۔

۵۔ سیپا ڈیسی کول (Hepa Deci Cal) پارک ڈیوس ایک سے دو کیپ شول دن میں تین بار بعد از غذا دیں۔

یونانی علاج :- ۱۔ ہرٹر سیاہ گھوٹ کر چار ماشہ کی مقدار میں استعمال کرنا بھی موٹاپے کو کم کرتا ہے۔

۲۔ جب کبد نوشادری جس کا نسخہ حرب ذیل ہے، موٹا پارو کرنے کے لئے نہایت مفید ہے۔ نوشاد، نمک طعام، نمک سیاہ، سہاگہ بریاں، نمک لاہوری، نر کچور، چھلکا ہرٹر کاہلی، ہرٹر سیاہ، باؤ بڑنگ، مروج سیاہ، سوٹھ ہر ایک برابر وزن کوٹ چھان کر عرق گلاب میں ملا کر لقمہ رخود گولیاں بنائیں۔

خوراک :- دو سے چار گولی کھانا کھانے کے بعد عرق سولف یا پانی سے استعمال کریں۔

آیور ویدک و ہومیو پیتھک علاج بطور یونانی علاج کے کریں، یا مسکھا ایک نشتانی دوا خانہ (جسٹرڈ) پانی پت کا پیٹ کم کرنے کا علاج بھی مفید ہے۔ غذا اوپر بھیڑ :- چربی بڑھانے والی اغذیہ سے سخت پرہیز کریں۔ غذا کم اور زود ہضم استعمال کریں۔

پیتلا ہوتا، دبلا پن، لین نیس، (LEAN—NESS)

تعریف مرض :- اس مرض میں مریض حد سے زیادہ دبلا پتلا نظر آتا ہے۔

وجوہات :- بھڑکی یا ناقص غذا کا استعمال، ترک ریاضت، مٹی کھانے کی عادت، غم و غصہ، فکر و تردد، کثرت ملاپ، پیٹ کے کپڑے جسم میں خون کا پیدا نہ ہونا وغیرہ سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- ہر ایک سبب کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔

ڈاکٹری علاج :- اصل سبب کے مطابق علاج کریں۔ اگر وٹامن کی کمی سے یہ عارضہ ہے تو وٹامن بی کمپلیکس کا استعمال کرایا جائے، مٹی وٹامن کی ٹیبلٹ بھی مفید ہیں۔ یہ وٹامن ہر قسم کی کمزوری کو دور کرنے کے لئے مجرب ہیں۔ تمام ایسی حالتوں میں دیئے جاتے ہیں، جہاں ان وٹامن ہائے کے دینے کی ضرورت ہو۔ بی، ڈی، ایچ اسے مٹی وائیٹ (Multi-vite)، انڈوفارماسے مٹی وٹیا منڈان (Multi-Vitamin Don) کے ناموں سے تیار کرتی ہیں، کا ڈیور آئیٹل خالص کا استعمال بھی مفید ہے، اگر معدہ یا جگر کی خرابی سے یہ عارضہ ہو تو اس کے مطابق علاج کریں۔ اس سلسلہ میں ایٹن سیرپ یا نیلوز سیرپ کا استعمال بھی مفید ہے۔ دہلاپن دور کرنے کے لئے تازہ سبزیاں اور فروٹ بھی نہایت مفید ہیں۔

یونانی علاج :- ۱۔ اسکندھ، موصلی سفید برابر کوٹ کر چینی ملائیں اور قدر سے ادراک کا اضافہ کر کے ہر روز دو تولہ کھا کر اُد پر سے دودھ پیا کریں۔

۲۔ مغز بادام، نشاستہ، کیترا، چینی برابر لے کر سفوف بنائیں اور بقدر ایک تولہ کھلا کر اُد پر سے دودھ گائے پی لیا کریں۔

۳۔ بخود ساڑھے چار تولہ ایک دن رات دودھ میں ترکیبیں اور خشک کر لیں، چاول، گندم، جو (سب صاف ہوں) ہر ایک چار تولہ مغز بادام چھلے ہوئے، تخم خشخاش، میدہ ہر ایک ساڑھے چار تولہ، چینی تین پاؤ پیس کر ملائیں اور ہر روز سات تولہ تازہ دودھ میں ملا کر نوش کریں۔

۴۔ چیکو یا پختہ کیدا کا استعمال بھی مفید ہے۔

آیور ویدک و ہومیو پیتھک علاج بطور یونانی علاج کے کریں۔

غذا و پرہیز :- ترشی والی اغذیہ استعمال نہ کریں، تازہ پھل، سبزیاں، خالص گھی دودھ خوب استعمال کریں۔

رکت سرائو، رکت الدم، ہیموفیلیا، (HEMO-PHILIA)

تعریف مرض :- اس مرض میں جسم کے کسی اعضاء سے بلا وجہ خون بہنے لگتا ہے۔

وجوہات :- اس مرض میں جسم میں خون کے دباؤ کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور خون میں ذرات خون اور سفید ذرات میں کمی ہو جاتی ہے بعض دفعہ خاندانی مرض بھی بن جاتا ہے، معمولی خراش، معمولی چوٹ، دانت نکلوانے معمولی آپریشن سے اس قدر خون نکلتا ہے، کہ مریض کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔

علامات :- ناک، بچہ دانی، مقعد وغیرہ یا چوٹ لگنے سے اس قدر شدت سے خون جاری ہو جاتا ہے کہ بے قابو ہو جاتا ہے اور شدید جریان خون سے مریض کی زندگی خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔

بعض دفعہ بچے کے پیٹ سے زلیفیت میں مبتلا پیدا ہوتے ہیں اور آنول نال کے ذریعہ خون جاری ہو کر فوراً ہلاک ہو جاتے ہیں جدید تحقیقات کے مطابق اس مرض کا باعث وٹامن کی کمی، خصوصاً وٹامن کے (Vitamin-K) کی عدم موجودگی یا کمی اس کا بڑا سبب ہے اور وٹامن کے وغیرہ ہی اس مرض میں استعمال کی جاتی ہیں جن کے بہترین نتائج نکلتے ہیں۔

ڈاکٹری علاج :- اس مرض کا جدید ترین علاج وٹامن کے کا استعمال ہے۔ وٹامن کے کو بذریعہ دہن یا انجکشن کے استعمال کریں

یہ وٹامن جریان خون کو فوراً روکتی ہے، یہ گاجر، پالک، ٹماٹر، سیم کے بیج، گندم، سویا بین میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ اسے گلیکسو کمپنی کی پی لان (Kaplan) 'بی' ایچ، ڈی کمپنی پروکے وٹ (Prokavit) 'بار کمپنی کیاکن (Kapakan) 'روچی کمپنی سنکاوٹ (Synkavit) کے نام سے تیار کرتی ہے، مقدار خوراک ایک سے دو گولی دن میں دو سے تین بار دیں۔

علاوہ ازیں کیلیم کلکیٹ ۵ اگرین دن میں تین سے چار بار دیں۔ اور بلڈ پریشر زیادہ نہ ہونے دیں، مقامی طور پر جریان خون روکنے کے لئے اڈرینالین ایک ہزار میں ایک طاقت کا کھول بنا کر استعمال کریں۔ اگر مریض کی حالت خطرناک ہو تو انتقال الدم کا عمل جاری کیا جائے، اور مریض کو فوراً کسی اچھے ہسپتال میں داخل کیا جائے۔ اس مرض میں وٹامن کے اور وٹامن پی براستہ دہن یا انجکشن استعمال مؤثر علاج ہے۔ یونانی علاج :- مقام ماؤف پر پیکڑی سفید باریک سفوف بنا کر چھڑکیں یا پنچر ٹیل کا پھایہ لگائیں، جریان خون کے مقام پر مضبوط پٹی باندھیں۔ زخم پر برف کی ڈلی رکھیں، سردی پہنچائیں تاکہ خون جم جائے، گل ارمنی، دم الاغواں، کہربائے شمعی، سنگ جراثیم، لبد سوختہ، صدف مروارید سوختہ ہر ایک ایک ماشہ، شربت انجبار چار تولہ میں ملا کر چھ ماشہ دن میں تین یا چار بار چٹائیں، حیاتین ک اور پ، شافی علاج ہیں۔

آیور ویدک دلیونانی علاج بطرزیونانی طریقہ علاج کے کریں۔ غذا پر سبزی۔ غذا میں کیلیم والی خوراک دیں۔ دودھ، انڈہ اور گو بھی، نازنگی، مالٹا، انگور لیموں، سنگترہ وغیرہ دیں۔

مرض ہاجکین، ہاجکینز ڈیزیز (HOGKINS DISEASE)

لمفہ دنیوما، لمفہ ڈنیوما (LYMPHADENOMA)

تعریف مرض :- یہ ایک غدودی مہلک مرض ہے جس سے تمام غدود لمفاوی اور اندرونی لمفاوی حصے سوج جاتے ہیں۔ وجوہات :- اس مرض کے مختلف اسباب بیان کئے جاتے ہیں، لیکن تا حال تحقیقاتی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ علامات :- اس کی خاص علامات شدید انیمیا ہے۔ اس مرض میں گردن کے غدود سب سے پہلے ماؤف ہو جاتے ہیں اور مقدار میں کافی بڑھ جاتے ہیں۔ نہ ان کے اوپر جلد دکھتی ہے نہ ہی خنازیر کی طرح ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں اور نہ ہی ان میں کسی قسم کا مواد پیدا ہوتا ہے، پھر سپٹ کے غدود بڑھ کر صحت کا ستیاناس کر دیتے ہیں۔ سانس کی تنگی اور جگر پر اثر پڑتا ہے، اور یرقان پیدا ہو کر مریض آہستہ آہستہ ہلاک ہو جاتا ہے۔

علاج :- اس مرض کا علاج بطرزیونانی کی ریاچ، خون سفید ہو جانا، لیوکیمیا (Leukemia) کی طرح ہے اور شکم یا تمام پیٹھ میں مروج ہے، ایسی علاج میں کشتہ سم الفار اور ڈاکٹری علاج میں آرسنک کا استعمال بلحاظ عمر و مزاج مفید ہے کشتہ سم الفار آدھا چاول موہنی یا بالائی میں رکھ کر دیں، اکیرے کی شعاؤں سے بھی اس مرض کو فائدہ پہنچتا ہے۔

تلی کی ریاچ (خون سفید ہو جانا) :- آیور ویدک یونیورسٹی جام نگر نے کافی ریسرچ کے بعد اس مرض کا شافی علاج (بلدی) قرار دیا ہے۔ بلدی کا سفوف چار ماشہ کی مقدار میں دن میں تین بار پانی کے ساتھ دینے سے دوڑھائی ماہ تک مریض کو آرام آجاتا ہے۔ اس سے کم مقدار میں بلدی کا استعمال کوئی فائدہ نہیں کرتا۔

یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق پہلے مہینہ میں خون کے سفید دلوں کی تعداد چھ یا سات فیصدی کم ہو جاتی ہے اور مریض کو آرام محسوس

ہوتا ہے، لیکن دوسرے ہفتے میں یہ تعداد پھر بڑھ جاتی ہے اور مریض کو پہلے سے بھی بے چینی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ بڑھوتری عارضی ہوتی ہے، تیسرے ہفتے میں خون کے سفید دالوں کی تعداد پھر گھٹ جاتی ہے اور علاماتِ مرض میں کمی ہونے لگتی ہے، پھر آہستہ آہستہ آرام آ جاتا ہے۔

کَفَجِ اَدِصَکَتَا، غَلَبَہٗ بَلْغَمٌ، لِمَفَاظُزْمٌ، (Lymphatism)

اس مرض میں غلبہٗ بلغم سے لمفادی غدود بڑھ کر سُوج جاتے ہیں اور سب سے زیادہ تھائیمس غدود بڑھ جاتا ہے، مریض اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ سوکھا روگ میں مبتلا نظر آتا ہے، کمی خون اس مرض کی خاص علامت ہے، گلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس مرض میں اچانک موت ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔

علاج :- اس مرض میں تھائی رائیڈ غدود کا ایکسٹریکٹ مناسب مقدار میں دینا مفید ہے۔ سنکھیا کا استعمال بھی مفید ہے اور علاج بطرزیو کیمیا ہے۔

پیشاب میں ہموگلوبین کا اخراج، ہیموگلوبینی نیوریا، (Hemo-Globin Uria)

اس مرض میں خون کے سُرخ ذرات پیشاب کے راستے خارج ہوتے ہیں۔ یہ عارضہ آتشک والے مریضوں کو زیادہ ہوتا ہے بھوک بند ہو جاتی ہے۔ اکثر یرقان ہو جاتا ہے، بعض دفعہ بخار بھی ہو جاتا ہے، پیشاب کی رنگت سیاہی مائل اور بالکل خون کی طرح ہوتا ہے۔ اس مرض کا دورہ چند گھنٹے سے لے کر چند روز تک رہتا ہے۔

علاج :- سالورسن، نیوسالورسن، سفارسی نول۔ این اے بی (N. A. B.) وغیرہ سنکھیا سے مرکب ادویات دیں۔ ان کے مکمل فوائد کے لئے آتشک کا بیان دیکھیں، آئوریدیک، ہومیوپیتھک علاج بطرزیو آتشک کریں۔ ہومیوپیتھی میں سنکھیا کا استعمال مؤثر علاج ہے۔

خون میں سُرخ ذرات کی زیادتی، پالی سن تھینیا، (Polyeynthenia)

اس مرض میں انسان کے جسم میں خون (رکت) میں سُرخ ذرات کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ یہ عارضہ شریانوں کی خرابی سے ہوتا ہے۔ اس مرض میں تلی بڑھ جاتی ہے، خون کے ذرات ۸ سے ۱۴ ملین فی سی سی بنتے جاتی ہیں، لیکن یہ سائیزم چھوٹے ہوتے ہیں۔ ہموگلوبین کا تناسب بھی ۱۳۰ سے ۲۰۰ فیصد تک ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ذرات کی تعداد پلازما سے زیادہ ہوتی ہے، خون گاڑھا ہو جاتا ہے، اعصابی کمزوری کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں، بلڈ پریشر کی زیادتی ہوتی ہے، جلد کی رنگت سُرخ انیٹوں کی طرح گرمی میں اور شیلی رنگت سردیوں میں ہو جاتی ہے، بعض مریضوں کو پیشاب میں البیومن کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔

علاج :- فصد یا پھینے لگا کر اور گلاس لگا کر خون نکال دیں، جب سُرخ ذرات مناسب حد پر ہوں تو ادویات سے ان کو قدرتی حالت پر رکھا جائے۔ اس کے لئے فینیل ہائیڈرازائن ڈیڑھ گرین کی مقدار میں ہر دوسرے روز دیں۔ جب ذرات خون کی مقدار معمول پر آجائے تو دو گرین ہر

ہفتہ بعد دی جائے۔

ایورڈیک، یونانی یا ہومیو پیتھک علاج میں سنکھیا کے مرکبات ہی اس مرض کا موثر علاج ہیں۔

خون کے سفید ذرات کا زوال، اگرینو لوسائی ٹوسس (Agranu Locy Tosis)

اس مرض میں خون کے سفید ذرات میں بھاری کمی ہو جاتی ہے۔ یہ عارضہ جسم میں ایسے فاسد مادہ سے پیدا ہوتا ہے جو سفید ذرات خون کو ختم کر دیتا ہے، زہریلی ادویات یا جرثومہ سے یہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ منہ میں سوزش اس مرض کی خاص علامت ہے۔
علاج :- سنکھیا، سونا، بسمتھ وغیرہ مرکبات دیئے جاتے ہیں تو انہیں فوراً بند کر دینا چاہیے، زہریلے اثرات کو دور کرنے کیلئے پینیسلین اس مرض کا موثر علاج ہے، جو کہ چھ ہزار یونٹ ہر تین گھنٹہ بعد دی جائے۔ منہ میں پچھنے کے لئے پینیسلین پوزنجری جابیں، وٹامن بی ۱۲ کا استعمال مفید ہے، سٹریپٹو پینیسلین کا استعمال بھی مفید ہے۔ منہ کے تھالوں پر پورک گلیسرین لگائیں اور وٹامن بی ۱۲ کا استعمال بھی فائدہ مند ہے۔

فرفورا، پریپیورا، (PURPURA)

اس مرض میں خون کی نالیوں سے خون جسم کے کسی حصہ میں جم جاتا ہے، جس سے جلد پر سُرخ یا نیلے نشانات بن جاتے ہیں جو کہ دبانے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کی مندرجہ ذیل قسمیں ہیں :-
۱۔ جرثومی فرفورا (بخاروں میں پیدا ہوتا ہے) ۲۔ پُرانا فرفورا (آتشک، ذیابیطس وغیرہ سے پیدا ہوتا ہے) ۳۔ فرفورا سمی (زہری کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے) ۴۔ فرفورا عصبی (عصبی امراض کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے) ۵۔ فرفورا اطفال (بچوں میں پیدا ہوتا ہے) ۶۔ فرفورا ریا ق (بلغمی امراض سے پیدا ہوتا ہے)۔
علاج :- اصل مرض کے مطابق علاج کریں۔ عام جسمانی صحت کو بحال کیا جائے۔ اس مرض کا تمام مپیختیوں میں علاج فولادو سنکھیا کے مرکبات ہیں، جن کا بیان پیشتر ازیں کر آئے ہیں۔

ہومیو پیتھک علاج میں آرسینک ایلب اور بالوکیٹک علاج میں فیرم فاس کا استعمال کرایا جاتا ہے۔

یونانی علاج میں عناب ۵ دانے، موز منقہ ۴ دانے، سولف ۶ ماش، مکوشک ۶ ماش، عرق مکو، عرق شاہترہ ہر ایک چھ تولہ میں جوش دے کر شربت عناب چار تولہ ملا کر پلائیں، قبض رفع کرنے کے لئے المٹاس کی گری چار تولہ پانی یا عرق گلاب میں حل کر کے فیرہ بنفشہ چار تولہ ملا کر پلائیں، جب خونی دھبے موقوف ہو جائیں تو فولادو جسم ایک سے دو چاول بالائی میں بعد از غذا دیں۔

بال گرہ، سولکھا، کشاح، ریکٹس (RICKETS)

اس مرض میں بچوں کی ہڈیاں اور دانت کمزور ہو جاتے ہیں اور بعض حالتوں میں ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ اس مرض میں کاڈ اور آسٹیل کے مرکبات مناسب مقدار میں دینے فائدہ مند ہیں، ڈیجیولین لیکوڈ (Adexolin-Liqived) دو سے پانچ قطرے کا استعمال مفید ہے فاس

دودھ، گھی، مکھن، بالائی، انڈے کا استعمال مفید ہے۔ اس مرض کے علاج میں "موگا سوکڑا علاج" مشہور ہے اور عام طور پر بنگال، ایونئی کی بور کی گولیاں (Liver-Ex Tract) کے کرپس کر شوگر آف ملک ملا کر مناسب مقدار میں دی جاتی ہیں یا بکرے کا جگر (Liver) سے کر اُسے توڑے پر ڈال کر نرم آگ پر خشک کر لیا جاتا ہے، اس سلسلہ میں یہ دھیان رکھا جاتا ہے کہ جلنے نہ پائے اور پاؤ ڈر بن جائے، اس کے لئے بسکٹوں کی بھٹی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، کلیجی پاؤ ڈر سے متعلق نسخے و مفصل علاج امراض اطفال کے باب بال شوش (سوکھا مسان) کے بیان میں دیکھیں۔

مادرین ادویات :- ۱۔ ایب ڈیک ڈراپس (Abdec Drops) پارک ڈیوس ————— ملٹی وٹا پیکس ڈراپس (Multi vita plex drops) اور وہ ملٹی وٹامن ڈراپس، جن میں وٹامن ڈی کافی شامل ہو۔ پانچ سے دس بوند صبح و شام دیں۔

۲۔ آسٹو کیلیم بی ۱۲ سیرپ (Osto Calcium B-12 Syrup) گلیکو ————— کوکویل ڈی لیکوڈ (Collocal-D Liquid) کروکس ————— مینولڈ (Minolad) ٹی، سی، ایف ————— ہر سے ایک چمچ دن میں دو بار دیں۔

۳۔ ایڈال (Abidol) پارک ڈیوس ————— ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں مفید ہے، ایک ایک کپ شولز دن میں تین بار دیں۔ بچوں کو بلحاظ عمر دیں۔

۴۔ کیلسی آسٹولین (Calci Ostelin) گلیکو ————— یاکیلوکیل ڈی (Collocal-D) کروکس ————— یا اسٹولین فورٹ (Ostelin Fort) گلیکو ————— کا عضلاتی انجکشن مناسب مقدار میں ہر دوسرے دن مرض کے مطابق کریں۔

۵۔ کاڈو آیل (Codliver Oil) یا شارک لور آیل (Sharak liver Oil) یا شارکو وٹ (Sharkovit) وغیرہ کی روزانہ مالش کی جائے۔

۶۔ ایراڈول (Irradol) پارک ڈیوس ————— یہ مرکب وٹامن ڈی ہے۔ کمزوری، سوکھا، دانتوں، ہڈیوں کی کمزوری میں مفید ہے۔ آٹھ بوند روزانہ دیں۔

۷۔ ہالڈیال (Haldiol) بنگال کیمیکل ————— پانچ سے دس بوند دن میں دو بار دیں۔

۸۔ ہالی کیلسائن (Haly calcine) کروکس ————— ایک سے دو کپ شول دن میں تین بار دیں۔ ہڈیوں اور دانتوں کی کمزوری میں مفید ہے۔

۹۔ زوی ڈراپس (Zuvi drops) زینڈو ————— تمام فوائد بطرز انڈیکسولین ہیں۔

۱۰۔ کیلسی ما اے ڈی سی (Calcima-A. C. D.) سپلا ————— کیلیم وٹامنوں کا یہ مرکب بچوں کی بڑھوتری، سوکھا و عام کمزوری میں مفید ہے، خشک، انجکشن، شربت کی صورت میں دستیاب ہوتا ہے۔ بچوں کو بلحاظ عمر ایک چمچ سے دو چمچ شربت دیں۔

۱۱۔ کیلسی آسٹولین و وٹامن بی ۱۲ (گلیکو) ۱/۴ سے ۲ سی سی تک بلحاظ عمر ایک دن چھوڑ کر عضلاتی انجکشن لگائیں۔

۱۲۔ بیکا ڈیکس انجکشن (گلیکو) ایک سی سی کی مقدار میں عضلاتی دینے سے غذائی کمزوری یعنی ماں کا دودھ نہ ملنے سے سوکھا پن کے لئے مفید ہے۔ دست رُک جاتے ہیں اور غذا جزد بدن بنتی ہے۔ یہ انجکشن دس سی سی کے ربڑ کے ڈھکن دار وائل میں ملتا ہے۔

کال جوڑ، بیرئی بیرئی، (Beri—Beri)

تعریف مرض :- جدید تحقیقات کے مطابق یہ بیماری وٹامن بی کی کمی سے پیدا ہوتی ہے۔ اور زیادہ تر چاول کھانے والے

لوگوں کو ہوتی ہے۔

وجوہات :- جن لوگوں کی خوراک سفید پالشی چاول ہیں وہی اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ بیماری لنکا، جاپان، فلپائن، ملائیا، اور چین میں عام پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ اکثر سفید چمک دار پالشی چاول کھاتے ہیں، پہلے اس مرض کو جرثومی بیماری کہا جاتا تھا۔ لیکن اب وٹامنز کی دریافت سے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ مرض وٹامن بی کی کمی سے پیدا ہوتا ہے اور وٹامن بی کی دریافت سے یہ مرض اب خطرناک نہیں رہا، اور عام طور پر مریض کو آرام آ جاتا ہے۔

علامات :- بدن لاغر و کمزور ہو جاتا ہے، خصوصاً دل اور ٹانگوں کے پٹھے ماؤف ہو جاتے ہیں، ٹانگوں میں دُرم و حذر پیدا ہو جاتے ہیں، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، بخار نہیں بڑھتا۔ پیشاب میں البیومن نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی رکت (خون) میں تبدیلی پائی جاتی ہے۔ لیکن جب سانس میں تنگی پیدا ہو جائے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ دل کے ریشے بھی مبتلائے مرض ہو گئے ہیں۔ ان حالات میں دل کی حرکت بند ہو کر مریض کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، بعض مریضوں کے جسم میں سوجن ہو جاتی ہے یا فالج میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ جسم میں سونیاں چھبٹی محسوس ہوتی ہیں۔

علاج ڈاکٹری :- اس مرض میں غذا کی اصلاح کرنی ضروری ہے، ایسی اغذیہ دی جائیں، جن میں وٹامن بی کافی مقدار میں موجود ہو، سانس کی تنگی کی حالت میں ایمائل نائٹریٹ سنگھامیں، اگر استسقا کی شکایت ہو تو اس کے مطابق علاج کریں، وٹامن بی ۱۰۰ ملی گرام ایک سی سی عضلاتی انجکشن دیں یا وٹامن بی کیپسکس دوسری سی سی عضلاتی انجکشن لگایا جائے۔ دل کی تقویت کے لئے سٹرکینا اور ڈجی ٹالس کے مرکبات دیں، اگر دل کے فیل ہونے کا خطرہ ہو تو کورامین دوسری سی عضلاتی انجکشن دیں اور کورامین لکوڈ پینے کو دیں۔

وٹامن بی ۱ :- یہ اعصابی امراض، بیری بیری، گنٹھیا، نقرس اور رسوں و پھٹوں کی کمزوری و دردوں کے لئے نہایت مفید ہے، خون کے سُرخ ذرات کو بڑھا کر انیمیا کو دور کرتی ہے، جنرل کمزوری کے لئے نہایت مفید ہے۔ اسے گلیکوسکپینی بیرین (Berin) 'ردچی کمپنی بنزوا، ملی کمپنی بیٹالین، سپلا کمپنی بیٹامائیڈ، مرک کمپنی بیٹابین کے نام سے تیار کرتی ہے۔

یہ گولیوں کی صورت میں بھی استعمال ہوتی ہے، گولیوں کی طاقت ۵ ملی گرام سے ۵۰ ملی گرام تک ہوتی ہے، مقدار خوراک ۵ سے ۱۰۰ ملی گرام دن میں دو سے تین بار دیں، مقدار انجکشن ۵ سے ۱۰۰ ملی گرام بلحاظ عمر عضلاتی انجکشن دیں۔

بعض لوگوں میں وٹامن بی کی برداشت نہیں ہوتی اور اس کے انجکشن سے سخت ردِ عمل بلکہ موت کے واقعات ہو چکے ہیں، جب کہ زیادہ مقدار میں اندھا دھند استعمال کی گئی تھی۔ اس لئے اسے بلحاظ مزاج اور عمر استعمال کیا جائے۔

ماڈرن ادویات :- ۱۔ وٹامن بی ۱۰۰ ملی گرام کی مقدار میں ہر روز عضلاتی انجکشن دینا چاہیئے یا اس کی ٹکیاں ہر روز دن میں دو بار دیں۔

۲۔ بی پیکس فورٹ (Beplex-forte) اے ایف ڈی یونی بی پیکس فورٹ (Uni-b-complexfort) یونیکم —————
یاد گیر کوئی بڑھیا بی پیکس کا انجکشن جس میں وٹامن بی ۱۰۰ کافی مقدار میں ہو، ہر روز عضلاتی انجکشن کریں۔

۳۔ دن ۱۲ (One-12) اے ایف ڈی ————— ہر روز یا دوسرے دن مرض کے مطابق ایک ایمپول کا عضلاتی انجکشن دیں۔

۴۔ میکرا بیرین فریز ڈرائیڈ (Macrabrin freeze dried) گلیکو ————— ٹرائی ریڈی سول ایچ (Tri rebisol-h)

مرک شارپ ڈوہم ————— بیرا پیکس (Bara plex) اے ایف ڈی ————— بیوی ڈاکس (Bividox) ایبٹ —————

نیوروبیون (Neurobione) مرک ————— کا مناسب مقدار میں مرض کے مطابق عضلاتی انجکشن دیں۔

سکڑبوط، سکڑومی، (Scurvy)

۳۔ اسکاربک ایسڈ (Ascorbic-Acid) وٹامن سی۔ اے، ایف، ڈی وغیرہ کئی کمپنیاں بناتی ہیں۔ ایک سے دس ٹمکیاں روزانہ

تازہ پانی سے دیں۔

- ۴۔ چیوسسی (Chewcee) لیڈرے ————— ڈامن سی کی چبانے کے لئے ذائقہ دار ٹکیاں ہیں۔ ہر روز ایک ٹکیہ دیں۔
- ۵۔ سوی نل (Civinal) المبیک ————— ایک سے دس ٹکیاں تک دیں۔
- ۶۔ کیلیم سینڈوز "۵۰۰" (CALCIUM SANDOZ 500) ایک سے دو انجکشن ہر روز وریدی کریں۔ اسے ایک مستند ڈاکٹر ہی لگا سکتا ہے۔

- ۷۔ کیلیم ماسی (Calcima-c) سپلا ————— کی طرح استعمال کریں۔
 - ۸۔ کیلیم مالے سی ڈی (Calcima-A-C-D) سپلا ————— تین سے بارہ ٹکیاں روزانہ دیں۔
 - ۹۔ وٹامی (Vitmin-c) اے ایف ڈی ————— ۵۰۰ ملی گرام کی ایک ٹکیہ کھانے کے لئے دیں۔
 - ۱۰۔ سکان ڈراپ (Secon Drop) ایبٹ ————— پانچ دس بوند بچوں کو دن میں دو سے تین بار دیں۔
- یونانی علاج :- لمیوں، سنگترہ، انارکارس، انناس کارس پھوڑ کر پلا میں، سیب، گاجر، ٹماٹر، مولی، شلغم، چقندر، پالک، بھرتوری، گدو، کرلیے وغیرہ کھلائیں۔ دانتوں پر لکھے گئے نسخہ جات میں سے کوئی ایک بنا کر لگائیں۔
- آیور ویدک و ہومیوپیتھک علاج بطر یونانی علاج کے کریں۔
- غذا پر ہیز :- سنگترے کارس، نازنگی، انار، آلوچے، ٹماٹر، بھرتوری، بھرتوری، گوجر، گوشت، مچھلی اور باسی و خراب غذا سے پرہیز کریں۔

کبرالاطراف، ایگرومیگلی، (Agromegly)

دیوین، عفرتیت، میکروسومیا، (Mecrosomia)

- تعریف مرض :- اس مرض میں انسانی ڈھانچہ غیر معمولی طور پر بڑھ جاتا ہے اور مریض کا جسم بھدا ہو جاتا ہے۔
- وجوہات :- اس مرض کا باعث غدہ نخامیہ کے مقدم حصہ کا بڑا ہونا ہے۔ اس میں خاص قسم کی غدی رسولی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مرض پندرہ سال کی عمر سے لے کر تیس سال کی عمر تک زیادہ پایا جاتا ہے اور بچوں، عورتوں، مردوں سب کو ہوتا ہے۔
- علامات :- کینٹیوں میں شدید درد، جنسی انخال کا معدوم ہونا، کمزوری جسم اس قدر بڑھتی ہے کہ کچھ دنوں میں پہلے کا لباس چھوٹا ہو جاتا ہے کہ آدمی چند روز میں پہچانا مشکل ہو جاتا ہے، ناک چوڑی اور بھدی ہو جاتی ہے، نظر میں نقص ہو کر جلد بھر بھری ہو جاتی ہے، اگر چھوٹے بچے کو یہ عارضہ ہو تو دو سال کے بچے کا قد ۹ سال کے برابر لگتا ہے۔
- ڈاکٹری علاج :- مختار ڈگلینڈ ٹیلٹ کا استعمال حسب ہدایت استعمال کریں، بعض حالات میں اکیں ریز کی شاعیں غدہ نخامیہ پر ڈالنے سے بھی آرام آ جاتا ہے۔ شدید حالات میں آپریشن کے ذریعے رسولی کا اخراج کرانا ہی مفید ہے، جو کہ ایک مستند ڈاکٹر سرانجام لے سکتا ہے۔
- یونانی علاج :- تندرست بکری کا غدہ درقیہ لے کر اس کو چھری سے صاف کریں۔ پھر باریک کوٹ کر ہلکی آ پنج پر خشک کریں، لیکن جلنے

نہ پائے۔ اس کو تین گھنٹے شہد خالص میں ملا کر رکھیں، روزانہ ایک ماشہ کی مقدار میں دیں، مٹی سے محفوظ رکھیں، یہی دوائی موٹاپا دور کرنے کے لئے بھی مفید ہے۔

غذا پر ہیز۔ زود صبح و مقوی غذا دیں اور مریض کو آرام سے لٹائیں۔

گل گنڈ، گھیکھا، ضخامت غدہ ورقیہ، گائٹر، (Goitre)

تعریف مرض :- اس مرض میں گلے کے اوپر غیر طبعی گوشت بڑھ جاتا ہے اور گلا پھول جاتا ہے۔ زیادہ تر عورتوں کو یہ مرض ہوتا ہے۔ وجوہات :- پہاڑی مقامات خصوصاً کشمیر میں جہاں زمین میں آیوڈین کی کمی ہوتی ہے، وہاں گلہڑ کا مرض بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ انسانی جسم کو ۵۰۰۰ ملی گرام آیوڈین کی روزانہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے جہاں آیوڈین کی کمی ہوتی ہے۔ وہاں یہ مرض شروع ہو جاتا ہے۔ علامات :- گلا پھول جاتا ہے اور گوشت غیر طبعی طور پر بڑھا ہوا نظر آتا ہے، چھوٹے گلہڑ سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب وہ بڑا ہو کر لٹک جاتا ہے، تو زخروں پر دباؤ پڑنے سے سانس لینے میں تکلیف ہو کر پڑتی ہے۔

ڈاکٹری علاج :- بطور حفظہ ماقدم پانی اُبال کر پیئیں۔ سال میں دو بار سوڈیم آیوڈائیڈ دو گرین روزانہ دس دن تک لیں، اس کے استعمال سے مرض میں بچاؤ رہتا ہے۔

جب گلہڑ ہو جائے تو بیرونی طور پر ٹینکچر آیوڈین روزانہ لگائیں یا ریڈ آیوڈائیڈ آف مرکری تین گرین، ویزلین ایک انس مرہم بنائیں، اور پھوڑی سی مرہم (بالکل ہلکی مقدار میں) گلہڑ پر مل دیا کریں۔ دن میں دو بار لگانے سے معمولی گلہڑ کو فوراً آرام آ جاتا ہے۔ نوٹ :- یہ مرہم زیادہ مقدار میں لگانے سے سوجن پیدا کرتی ہے، اس لئے اگر آبلے پیدا ہو جائیں تو کچھ دن کے لئے مرہم لگانا بند کر دیا جائے۔


پینے کے لئے سیرپ فرائی آیوڈائیڈ کا استعمال کرایا جائے۔ اگر مندرجہ بالا ریڈ آسینٹ سے حل ہونے لگے، تو زنک آسینٹ کو لگایا جائے، یہ دوا سادہ گلہڑ کے لئے ہے، رسولی دار گلہڑ کا کوئی دوائی علاج نہیں ہے۔ یونانی علاج :- ہلدی، داربلدر، سہاگہ، باریک پس کر گھیکوار کے پیٹھے پر چھڑک کر نیم گرم کر کے گلہڑ پر باندھیں، گلہڑ کو تحلیل کرتا ہے۔

پینے کے لئے عرق مصفی خون پانچ تولہ ہمراہ شربت عناب دو تولہ دیں۔

شربت مصفی :- عناب ۵ گرام، برادہ صندل سفید، برادہ صندل سرخ، سر بھوکہ ہندی کے پتے، شاہترہ، پھول نیلوفر، کو خشک، بیج کاسنی، برادہ شیشم، پھول منڈی ہر ایک ۵ گرام۔

سب دواؤں کو آٹھ گنا پانی میں بھگو دیں، صبح کو جوش دیں۔ جب تہائی پانی رہ جائے تو تین گنا چینی ملا کر شربت کا قوام بنالیں۔ خوراک ۲۰ گرام صبح اور ۲۰ گرام شام کو دیں۔

ہومیوپیتھک علاج :- نیرم ناس کا استعمال بہت مفید ہے بہت سے ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ یہ دوا گلہڑ کو ختم کر دیتی ہے۔ غذا پر ہیز :- تازہ ترکاریاں، میوہ جات اور دودھ دیں۔ خراب پانی، خراب غذا، بند گو بھی، پھول گو بھی وغیرہ سے پرہیز کرائیں۔



تیسواں باب

منشیات، زہریں اور ان کے تریاق

زہر خوردہ مریض کا علاج شروع کرنے سے پہلے ایک رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنرز کو مقامی پولیس کو اطلاع دینی ضروری ہے اور خطرناک صورت حالات میں تو مریض کو سرکاری ہسپتال میں ہی بھجوانا ضروری ہے۔

جب آپ کو زہر خوردہ شخص کی امداد یا اس کے علاج کا موقع ملے تو تشخیص مرض کے لئے مندرجہ ذیل باتوں کا دھیان رکھیں :-

- ۱۔ زہر خوردہ کے ارد گرد کوئی زہری شیشی یا پڑیا پڑی ہے یا نہیں۔
- ۲۔ زہر خوردہ کے جسم اور کپڑوں پر کوئی نشان ہے یا نہیں، کیونکہ تیزابی و کیمیادی زہروں کے کھانے سے عام طور پر کپڑوں وغیرہ پر داغ لگ جاتے ہیں۔

- ۳۔ زہر خوردہ کے سانس کا معائنہ کیا جائے، کیونکہ امیون، شراب یا کاربالک ایسڈ کی بو سے زہری تشخیص آسانی ہو جاتی ہے۔
- ۴۔ آنکھوں کی پتلیاں پھیلی ہوئی ہیں یا سکڑی ہوئی ہیں، کیونکہ سکڑی ہوئی پتلیاں امیون کے زہر کو اور پھیلی ہوئی پتلیاں دھتورے کے زہری کی علامات کو ظاہر کرتی ہیں۔

- ۵۔ اگر منہ اور گلے میں کوئی داغ نہ ہو تو فوراً تھے کرادیں یا معدے کو دھو کر صاف کر دیں، معدے کو دھونے کے لئے ٹمبو کا استعمال کیا جاتا ہے۔

- ۶۔ علامات جس سے زہر کا شک ہو، اس زہر کا تریاق دیں۔ تاکہ زہر بے اثر ہو جائے، اس سلسلہ میں ذرا بھی غفلت نہ کی جائے۔
- ۷۔ اگر زہر خوردہ کا دم گھٹنے لگے، تو مصنوعی سانس جاری کرنے کے لئے سویٹر صاحب کا طریق (Syluester Method) پر عمل کیا جائے۔
- ۸۔ مریض کے سر ہانے کی طرف مبیٹھ کر کہنیوں کے عین اوپر مریض کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر سر کے ہر دو طرف اٹھا کر دو تین سینڈ تک کھینچے رکھیں، اس طرح سینہ کشادہ ہو کر تازہ ہوا پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے۔ پھر ملبدی سے ان کو تپنے کی طرف لاکر سینہ کے

دونوں طرف پسلیوں پر رکھ کر آہستگی سے دو سیکنڈ دبا کر رکھیں تاکہ پسلیاں دب جا کر خراب ہو ابھی پھڑپھڑوں سے نکل جائے۔ ایسا عمل ۱۵ یا ۲۰ بار فی منٹ کیا جاتا ہے، جب تک کہ زہر خوردہ سانس لینے لگے۔ اس عمل کے دوران میں دوسرے امدادی شخص کو چاہیئے کہ مریض کی زبان کو رد مال سے پکڑ کر باہر کی طرف ذرا کھینچے، اگر ایسا نہ کیا جائے گا تو زبان کے پیچھے گرنے سے سانس رُک جانے کا خطرہ ہوتا ہے، دم گھٹنے سے روکنے کے لئے آکسیجن کا استعمال بھی مفید ہے۔

۸۔ اگر زہر خوردہ شخص کا جسم ٹھنڈا ہو، گرم پانی کی بوتلیں اس کے تلوؤں، رانوں اور غلوں میں رکھیں اور اسے کبیل ڈھانپ دیں، مریض کی خراب حالت میں اسے فوراً کسی اچھے ہسپتال میں لے جانا چاہیئے۔

سٹامک ٹیوب استعمال کرنے کا طریقہ

یہ ایک ربڑ کی لمبی نالی ہوتی ہے، جس کے ذریعہ معدہ کو صاف کیا جاتا ہے، مکمل طور پر زہر کھلانے یا کھانے کے حادثات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگوں کو خوراک دینے میں کام آتی ہے، جو غذا منہ کے راستے نہ کھائیں اور بھوک ہڑتال کر لیں۔ ایسی حالت میں لکڑی کا ٹکڑا منہ میں رکھ کر اس ٹیوب کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔

اس کے استعمال کا طریقہ نہایت آسان ہے، سٹامک ٹیوب کو گلیسرین وغیرہ سے چکنا کر لیا جائے، اگر معدہ کی سوجن کی شکایت ہو اور معدہ کو دھونا ہے تو ٹیوب کو ابال کر صاف کر لیں اور ردغن زیتون یا نارجیل سے چکنا کریں، ٹیوب کو ہوشیاری سے حنجرہ کو بچا کر حلق کی پشت کی طرف گزارا جائے، اس موقع پر مریض کا سر نرمی کے ساتھ پیچھے کی طرف کر دیا جائے، جب یہ معلوم ہو کہ ٹیوب کا سرا بال صوم کی پشت تک پہنچ رہا ہے سر آگے کی طرف کر دیں۔

اگر ٹیوب کو داخل کرتے وقت اس کے سرے کو مناسب طریقہ سے موڑتے ہوئے اور اسے ٹھیک خط و سطانی میں رکھتے ہوئے داخل کیا جائے تو کوئی تکلیف پیش نہیں آتی۔

جب ٹیوب معدہ میں پہنچ جائے تو بذریعہ قیف سیال ڈالیں، گاہے کچھ رطوبت یا غذا برآمد ہوتی ہے، زہر خوردہ کی حالت میں اس رطوبت کو کیمیائی جانچ کے لئے محفوظ رکھنا چاہیئے۔

جب سیال معدہ میں پہنچ جائے اور ابھی سیال قیف کے زیریں حصہ میں اترتا ہوا نظر آئے تو نلکی کو چٹکی سے دبا کر اس کے آزاد سرے کو اوپر کی طرف لایا جائے تاکہ یہ معدہ سے نیچے ہو جائے، اس وقت نلکی کا دباؤ ہٹا دیں، سیال دھار باندھ کر نکل جائے گا، اس عمل کو اس وقت تک کیا جائے جب تک کہ سیال بالکل صاف اور بے بو نہ ہو جائے، اس طریقہ پر عمل کرنے سے پہلے کسی مستند ڈاکٹر سے عملی طور پر سیکھ لیا جائے تو بہتر ہے۔ زہروں کی علامات و تریاق درج ذیل ہیں :-

شکھیا، ہڑتال، مثل، چوہے مار گولیاں، مکھی مار کاغذ، کو بالٹ سالتس وغیرہ

علامات :- خونی تے، خونی دست، پیٹ میں مردڑ، دم گھٹنا، پیاس کی شدت، حلق میں سوزش، تشنچ وغیرہ ہوتا ہے۔

علاج :- سٹامک ٹیوب سے معدہ کو دھوئیں یا نیم گرم پانی میں قد سے نکل خور دنی ملا کر پلائیں اور تے کرائیں یا وانیم اپی کاک چارڈرام گرم پانی میں ملا کر اچھی طرح تے کرا دیں یا اپو مارفین کا زیر جلد انجکشن کریں، پھر لاسیکو اور فیرانی پر کلورائیڈ دو ڈرام، لاسیکو اور ایونیا دو ڈرام کی خوراک میں نصف نصف گھنٹہ بعد پلائیں۔ اگر دست آئے ہوں تو میگنیشیا سلفاس دو ڈرام پانی میں گھول کر پلائیں، دودھ

ی، چاول کی بچھ، کچے انڈے کی سفیدی اور آتش جو کا استعمال مفید ہے، پیٹ پر ٹکڑوں کی جائے۔

سرکہ، لیموں وغیرہ ترش اشیاء سخت نقصان دہ ہیں، لہذا ان کا استعمال مضر صحت ہے۔

تریاق سنکھیا :- ناری گھاس جس کو نیزبالا بھی کہتے ہیں جو تالاب میں ہوتی ہے ایک چھٹانک قد کے کہنے اور ایک مرتج سیاہ گھوٹ پلائی، سنکھیا بذریعہ قے نکلے گا، جب قے بند ہو جائے تو سمجھیں کہ سنکھیا کا زہر خارج ہو گیا ہے۔

دیگر :- مٹی کا رس پانچ تولہ، شہد خالص دو تولہ ملا کر پلائیے۔ پرانی سمیت کا مفید علاج ہے۔

دیگر :- مغز تخم بنولہ پانچ تولہ بطور سردائی گھوٹ کر پلانے سے سنکھیا کا زہر دور ہو جاتا ہے۔

دیگر :- سبز کرلیوں کو کوٹ کر اس کا رس بقدر دس تولہ نکال کر پلانے سے قے ہو کر سنکھیا کا زہر شانت ہو جاتا ہے۔

دیگر :- برگ نیم کا رس پلانے سے بھی سنکھیا کا زہر شانت ہو جاتا ہے۔

دیگر :- خالص گھی اور دودھ پلانے سے ہر طرح کے زہر نشٹ ہو جاتے ہیں۔

پارہ، رسپیور، دارچینا، شنگرف (پریکلورائیڈ آف مرکزی) وغیرہ

علامات :- جسم ٹھنڈا، زبان سفید، خونی قے و درت، اینٹھن، معدنی ذائقہ وغیرہ علامات ہوتی ہیں۔

علاج :- دو تین انڈوں کی سفیدی نیم گرم پانی یا دودھ میں پھینٹ کر پلائیے اور قے کرائیں یا روغن زیتون دیں۔ اس زہر کا بہترین علاج

کا انڈہ ہے، اگر پیشاب بند ہو جائے تو گردوں پر خشک گلاس لگائیے۔ چولائی پانی میں پکا کر اس کے نیم گرم پانی سے نہلانا بھی مفید ہے، کرلیا

کاری بکثرت کھانے سے بھی پارہ جوڑوں سے دور ہو جاتا ہے۔

تریاق پارہ :- جوانہ دو تولہ بطور سردائی گھوٹ کر اس میں پانی ملا کر چھان لیں۔ اس کے چند روز پینے سے پارے کی خرابیاں دور

تی ہیں۔

دیگر :- کیٹر آئیل شدہ چار تولہ دودھ گائے دس تولہ میں ملا کر پینا بھی مفید ہے۔

اسراب (سیسہ)، مروارنگ، سیندور، سفیدہ وغیرہ

علامات :- ٹھنڈا پسینہ، پیاس کی زیادتی، خشکی حلق، پیٹ میں سخت درد، پیشاب و پاخانہ سیاہ رنگ کا آتا ہے۔

علاج :- پیٹ درد کے لئے پیٹ پر سینک کریں اور اٹروپین سلفاس پیراگرین کا جلدی انجکشن کریں۔ زنک سلفاس ۳۰ گریں، چارونس

ب ملا کر پلا کر قے کرائیں، بعد میں میگنیشیا سلفاس چار ڈرام آٹھ اونس پانی میں حل کر کے چار چار گھنٹہ بعد دیں، اس میں سلفیورک الیڈ ڈائیوٹ

د کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ پرانی حالت میں نوشادر پھلی آٹھ رتی پانی میں گھول کر دن میں تین بار دیں، مفید ہے۔

تانہ، توشیا، زنگار وغیرہ

علامات :- منہ میں تانہ کا ذائقہ، زیادتی بھوک، گلا بند ہو جانا، پیٹ میں سخت مروڑ و درد، سبز و نیلے رنگ کی اُلٹیاں، ہڈیاں، اینٹھن

یز، یرقان وغیرہ کا ہونا، پیشاب کا پھلا ہونا۔ بند ہو جانا بے ہوشی وغیرہ علامات ہوتی ہیں۔

علاج :- پہلے دودھ میں انڈے پھینٹ کر پلائیے، پھر معدہ کو اسٹامک ٹیوب سے دھو دیں یا رانی چھ ماشہ یا سفوف اپی کا ک

۲۔ گرین دے کرتے کرائیں، بعد میں آتش جو یا اسی کا جوشاندہ وغیرہ پلائیں، آتش جو کا بکثرت استعمال نہایت مفید ہے، اگر مریض کی حالت خطرناک ہو تو نزدیک کے ہسپتال میں لے جانے کی ہدایت کریں۔

فاسفورس، دیاسلانی وغیرہ

علامات :- پریٹ میں درد، جلن اور سوجن، پیاس کی شدت، مادہ قے میں لہسن کی بدبو اور خون، خطرناک مرض میں مریض کا اندھے میں فاسفورس کی طرح چمکنا، اس حالت میں مریض کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔
علاج :- اسٹامک ٹیوب سے معدہ کو دھوئیں یا قے لانے والی ادویہ دیں۔ کا پرسلفاس (توتیا) دو گرین سے تین گرین تک چار اونس پانی میں گھول کر دیں، قے آنے کے بعد لعاب والی اشیاء مثلاً آتش جو، انڈوں کی سفیدی دودھ میں پھینٹ کر دیں۔ ہر قسم کا تیل منع ہے دودھ اسی کا جوشاندہ یا آتش جو بکثرت دیں، پیشاب بند ہو تو کمیٹھی ٹر سے کھول دیں۔

زنک سلفیٹ کلورائیڈ اور جبت کے دوسرے مرکبات

علامات :- ہونٹ اور منہ جل جاتے ہیں۔ گلے اور معدہ میں سخت جلن ہوتی ہے، کوئی چیز نگلنے میں سخت تکلیف ہوتی ہے اور سانس تیز ہوتا ہے، انٹیٹھن، فاج یا غشی وغیرہ کی علامات پائی جاتی ہیں۔
علاج :- اس کے علاج میں قے کی دوائیں دینا مفید نہیں۔ انڈوں کی سفیدی دودھ میں پھینٹ کر کثرت سے پلائیں یا ٹینک الیڈ ۲۰ گریں پانی میں گھول کر دیں، کیکر کی چھال تین تولہ کو آدھے پونڈ پانی میں جوش دے کر پلائیں، چائے کا استعمال مفید ہے، اسی کا جوشاندہ یا آتش جو دیں، درد دور کرنے کے لئے آدھی رقی افیون کا استعمال کریں۔

تیزاب منک، گندھک، شورہ وغیرہ تیزابی زہریں

علامات :- منک کے تیزاب سے ہونٹوں اور منہ پر سفید داغ پڑ جاتے ہیں، شورہ سے زرد اور گندھک سے کالے پڑ جاتے ہیں، معدہ اور جگر میں سخت جلن ہوتی ہے، غشی قے آتی ہے، پیشاب بند ہو جاتا ہے، قے کا مادہ زمین پر گرنے سے جوش مارتا ہے، آواز بند ہو جاتا ہے، ہچکلی آتی ہے اور مریض کمزور ہو کر تشنچ یا دم بند ہونے کے ساتھ دو تین روز میں ہلاک ہو جاتا ہے۔
علاج :- قے لانے والی دوائیں بالکل نہ دیں بلکہ تیزابی اثر دور کرنے کے لئے سوڈا بائیکارب اکیٹ چھ پانی میں ملا کر پلائیں یا چاک مٹی، دیوار کا لائم پستھر کھرج کر پڑا تولہ یا کوئلہ کی ٹکڑی کی راکھ ایک تولہ پانی میں ملا کر پلائیں، اس کے بعد روغن بادام یا تلی کا تیل یا اسی کا تیل اڑھائی چھٹانک گلاس پانی میں ملا کر پلائیں یا چار پانچ انڈوں کی سفیدی دودھ میں پھینٹ کر دیں۔

کاربالک الیڈ (فینائل)

علامات :- لب اور منہ جل جاتے ہیں، منہ سے فینول کی بدبو آتی ہے، جسم ٹھنڈا، آنکھوں کی پتلیاں سکڑی ہوئی، پیشاب سبزی، زنگ کا نکلتا ہے یا پیشاب بند ہو جاتا ہے، دماغی شکتی ختم ہو جاتی ہے۔
علاج :- اسٹامک ٹیوب سے معدہ کو صاف کریں، اس قدر صاف کیا جائے کہ کاربالک کی بو ختم ہو جائے، اس کے بعد میگنیشیم سلف

ھاؤنس ایک پائیزٹ پانی میں ملا کر دیں، روغن زیتون یا روغن السی یا روغن بادام دس تولہ دس چھٹانک پانی میں ملا کر پلائیں، کمزوری کی حالت اسٹرکین کا انجکشن دیں۔ سانس بند ہونے لگے تو مصنوعی سانس جاری کریں۔ بگلوں میں گرم پانی کی بوتلیں رکھیں۔

ہائڈروسیانک ایسڈ — پوٹاسیم سایانائیڈ

علامات :- سرچکراتا ہے، ٹانگیں کانپتی ہیں، زہر خوردہ بے ہوش ہو جاتا ہے جسم ٹھنڈا اور سانس سے کڑھے بادام کی بو آتی ہے، یہ کڑھے باداموں میں بھی ہوتا ہے، اس زہر کے کھانے سے موت ہو جاتی ہے، نہایت خطرناک زہر ہے۔

علاج :- سٹامک ٹیوب سے معدہ کو دھوئیں یا قے لانے والی ادویہ دیں، یہ ایک خطرناک زہر ہے، اگر فوری علاج نہ کیا جائے تو مرخص ہو جاتا ہے۔ اس لئے فوراً مصنوعی سانس جاری کریں۔ دوسری ادویہ نالیوں کا فوری انجکشن دیں۔ معدہ کو پوٹاسیم پرنیگنیٹ کے مناسب حل سے فوراً دھویا جائے، ٹھنڈا پانی گرمیوں میں دھار باندھ کر سر پر ڈالیں، فرائی سلفاس ۵ اگرین، پنچ فرائی پرکلورائیڈ ۲۰ منم، ایک پاؤ پانی میں حل کر دیں۔ اس میں دو ڈرام میگ کارب کو پہلے پانی میں حل کر کے اس میں ملا دیں، فوراً کسی اچھے ہسپتال میں لے جانے کا مشورہ دیں۔

آیوڈین، آیوڈائیڈ، آیوڈوفارم وغیرہ

علامات :- گلے اور معدہ میں سخت جلن اور درد ہوتا ہے، پیلے اور نیلے رنگ کی قلیں آتی ہیں۔ شدید پیاس بے چینی بے ہوشی، انیٹھن ہوتی ہے۔ زور کی پیاس ہوتی ہے۔

علاج :- معدہ کو اسٹامک ٹیوب (سٹامک پمپ) سے دھوئیں یا ادویات سے قے کرائیں، ناشتہ یا میدہ وغیرہ لعاب دار اشیا میں گھول کر پلائیں، ایمائل نائٹریٹ سونگھائیں، اگر آیوڈوفارم زخم سے جذب ہو رہا ہو تو زخم کو سوڈا بائیکارب کے گھول یا گرم پانی سے دھوئیں، اگر خوردنی طور پر کھایا ہو تو سوڈا بائیکارب پانی میں ملا کر تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیں۔ پوٹاسیم آیوڈائیڈ یا آیوڈوفارم کے استعمال سے یہ نہ ہو تو سٹامک پمپ سے ۵ فیصدی سوڈا کھپائیو سلفیٹ کے گھول سے معدہ کو دھوئیں۔

کاسٹک پوٹاش، پوٹاش بائیکارب، سوڈا بائیکارب، ایمونیا، جوکھار وغیرہ

علامات :- زبان، منہ، سینے اور معدہ میں سوزش ہوتی ہے، سانس تنگی سے آتا ہے خون کی اٹلیاں آتی ہیں، آواز بیٹھ جاتی ہے۔ علاج :- اس کے علاج میں اسٹامک ٹیوب کا استعمال منع ہے اور نہ ہی اٹلیاں لانے والی ادویات دیں، بلکہ کھار کا اثر زائل کرنے کی ادویات دیں، مثلاً ست لیموں (سائٹرک ایسڈ) یا ست اہلی (ٹارٹرک ایسڈ) آدھا گرام پانی میں گھول کر دیں یا لیموں کا رس پھونک کر پلائیں، اگر انگریزی تین تو لے، پانچ تو لے پانی میں ملا کر دس یا پندرہ منٹ کے وقفہ سے دیتے رہیں، اس کے بعد دودھ یا روغن زیتون دس یا انڈول کی سفیدی پانچ عدد پھینٹ کر پلائیں۔

اکونائٹ (میٹھائیلیہ)

علامات :- جی متلاتا ہے، آبکائیاں آتی ہیں، ہونٹ و چہرہ سرخ ہوتا ہے، منہ میں بدبو ہوتی ہے۔ خیالات منتشر ہوتے ہیں، مرض بدلتی کی حالت میں بے ہوشی اور سانس خراٹے سے آتے ہیں۔ منہ میں میٹھائیلیہ کا ذائقہ ہوتا ہے، متلی قے اور دست آتے ہیں، نبض

بے قاعدہ و کمزور ہوتی ہے، جسم ٹھنڈا، سر میں چکر اور خیالات میں فساد پیدا ہوتے ہیں۔

علاج :- بڈیوں کے کوئلہ (انیل چارکول) ایک ٹیبل سپون کے گھول سے معدہ کو دھوئیں، مصنوعی سانس جاری کریں، برانڈی یا دسکی نیم گرم پانی میں ملا کر دیں، رانوں اور نعلوں میں گرم پانی کی بوتلیں رکھیں، مریض کا سر پاؤں کی نسبت اونچا رکھیں، پنچر ڈیجیٹلس ۵ ابوند پانی ایک گھونٹ میں ڈال کر پلائیں۔ سپرٹ ایمنیا ایرومٹیک کا استعمال بھی مفید ہے، مقوی قلب انجکشن ڈیجیٹلس یا کورامین دیں۔

یونانی طریقہ علاج میں جودار (نرہسی) کو اس کا فادہ زہر بیان کیا گیا ہے، دو ماشہ نرہسی سفوف بنا کر خالص دودھ میں ملا کر ہر گھنٹہ کے بعد تین یا چار بار دیں۔

افیون، مارفین، کلوروڈین، کوڈین، ڈائیونین، ڈوڈرس پاؤڈر وغیرہ

علامات :- درد سر، تکان، نیند، آنکھوں کی پٹلیاں سفید ہونا، بے ہوشی، غفلت، ٹھنڈا پسینہ، چہرہ زرد و سفید ہونا، سانس سے افیون کی بو آنا، نبض کمزور، کبھی کبھی دست و پائی کا عارضہ ہوتا ہے بعض مریضوں کو اینکھن ہوتی ہے اور فاج ہو جاتا ہے۔

علاج :- فوراً ٹاکم ٹوب سے معدہ کو دھوئیں اس سلسلہ میں پوٹاسیم پرمینگنیٹ کے ہلکے گھول سے آدھ آدھ گھنٹہ کے وقفہ سے معدہ کو دو یا تین بار دھونا سفید ہے یا پنچر بیلڈونا ۵۰ منٹھوڑے سے پانی میں پلائیں، ہر سپرہ منٹ کے بعد دو یا تین بار پلائیں، منہ پر پانی کے چھینٹے دیں، رانوں اور نعلوں میں گرم پانی کی بوتلیں رکھیں، ایمنیا سنگھائیں، گرم تیز قہوہ یا چائے پلائیں لیکن شراب ہرگز نہ دیں، دل کی طاقت کے لئے لائیو آرٹھرکٹین یا کورامین کا انجکشن دیں۔ مریض کو بالکل سونے نہ دیں بلکہ نہلاتے رہیں، اگر دودھ پیتے پچے کو افیون دی گئی ہو تو جتنی افیون دی گئی ہو، اتنی سینگ خالص دودھ یا پانی میں گھول کر پلانے سے افیون کا زہر ہلکا اثر دور ہو جاتا ہے۔

آیور ویدک علاج :- ۱۔ مخز تخم بنولہ چار تولہ بطور سردائی گھوٹ کر مسموم کو پلانے سے افیون کا زہر دور ہو جاتا ہے۔

۲۔ اخروٹ کی گری دس تولہ کھلانے سے افیون کا معمولی زہر دور ہو جاتا ہے۔

۳۔ بار بار خالص گھی پلانے سے بھی زہر دور ہو جاتا ہے۔

اب افیون خوری (اوپیئم ہیٹ) (Opiumhabit) کے علاج پر نسخہ جات تحریر کئے جاتے ہیں۔ کیونکہ بعض لوگ افیون کو روزانہ عادتاً استعمال کرتے ہیں، جس سے افیون خور کو سرور اور قوت سی محسوس ہوتی ہے اور جب اس کا اثر زائل ہو جائے یا کھائی نہ جائے تو طبیعت میں کسمندی، سستی، جمائی آنا، دست اور پچھٹوں کے عوارض شروع ہو جاتے ہیں، افیون چھوڑنے کے علاج میں مضبوط قوت ارادی ضرورت ہے، مریض کو اس کی صحت کی طرف توجہ دلا کر اس کے نقصانات سے آگاہ کرنا چاہیئے۔

محررات ترک افیون

- ۱۔ میٹھی نرہسی بقدر افیون کے استعمال کریں اور روزانہ مناسب مقدار گھٹاتے ہوئے ایک ماہ میں ترک کر دیں۔
- ۲۔ کچلہ شدہ بقدر مزاج مناسب کھلائیں اور روزانہ مناسب مقدار میں افیون گھٹاتے ہوئے ایک ماہ میں چھوڑ دیں۔
- ۳۔ معجون برشعشا بھی انیم کی مقدار کے مطابق کھلائیں اور آہستہ آہستہ انیم ترک کر دیں۔
- ۴۔ افیون ۱۲ ماہ، تخم دھتورہ ۱۲ ماہ، ریوند چینی ۱۲ ماہ، گل سرخ، زنجبیل، گل ارمنی ہر ایک ۱۵ ارتی، زعفران ۱۵ پیس کر شیر خشت ۶ ماہ کے محلول میں گوندھ کر گولیاں بقدر بخود بنا لیں، خوراک ایک سے دو گولی مزاج کے مطابق کھلاتے رہیں۔

افیون بتدریج بند کر دیں۔

۵۔ کچلہ مدبر بہ شیر، تخم دھتورہ مدبر، اسپند، جاوتری، ہر ایک ایک تولہ، اجوائن خراسانی، قاقلہ صغار ہر ایک سات ماشہ، جائفل دو ماشہ، لے کر ہر سہ اجزاء کو گائے کے شدھ گھی میں بریاں کریں، بعدہ باقی اجزاء کو شہد کے قوام میں ملا کر گولیاں بقدر خود بنائیں اور ایک سے دو گولیاں روزانہ کھلاتے رہیں اور بتدریج افیون کم کرتے رہیں۔

۶۔ طباشیر مصطکی رومی، جدوار، جاوتری، دارچینی قلمی، ثعلب مصری، شقائق مصری، بہمن سرخ، بہمن سفید، درونج ہر ایک چار چار ماشہ، ماہی رو بیاں ۳ ماشہ، پوست بریاں ۴ رتی، نشاستہ، جند بیدستر، مغز چلغوزہ، سونٹھ ہر ایک چار رتی، مغز بادام کشمیری زعفران، مشک غنبر ہر ایک دو رتی، افیون خالص ۴ ۱/۲ رتی، ورق چاندی سات عدد، ورق سونا چار عدد، ادویہ بالا کو گھوٹ کر افیون کو پانی میں حل کر کے ملا دیں، اور خوب کھل کر بریاں تیار کر لیں، یہ گولیاں نہ صرف معمول مطب میں بلکہ یہ سینہ کا وہ راز ہے جو آج تک ناظرین سے پوشیدہ تھا۔ یہ گولیاں افیون توڑ کے علاوہ جریان، احتلام، اور سرعت وغیرہ کے لئے از حد لایفہ دانیک ہیں، خوراک ایک سے دو گولی ہمراہ شیر گاؤ نیم گرم دیں۔

۷۔ جدوار خطائی، کچلہ مدبر، تخم دھتورہ شدھ، زعفران ہر ایک تین ماشہ، مرج سیاہ، سونٹھ، مصطکی رومی ہر ایک چھ ماشہ، ورق سونا غنبر شہب ہر ایک ایک ماشہ، رب کو باریک پیس کر برگ پان سبز ۲۵ عدد کے رس میں گھوٹ کر گولیاں بقدر مرج سیاہ بنالیں، خوراک ایک گولی صبح، ایک شام کو ہمراہ شیر گاؤ، غذا میں دودھ گھی بکثرت استعمال کریں۔

۸۔ تخم دھتورہ شدھ ۴ ۱/۲ ماشہ، سونٹھ ۹ ماشہ، ریوند چینی ایک تولہ، مصطکی رومی اصلی ۴ ۱/۲ ماشہ، مصری ۹ تولہ، ان رب کو باریک پیس کر گولیاں بقدر خود تیار کر لیں، ایک یا دو گولی جس قدر افیون کھاتا ہو، حسب مقدار گولیاں استعمال کر کے انیم ترک کرنے جائیں۔

۹۔ گائے دھتورے کے بیج شدھ تین تولہ، سونٹھ بے ریشہ دو تولہ، سب کو باریک پیس کر سفوف بنالیں، پھر بول کا گوند ایک تولہ اس قدر پانی میں حل کر لیں کہ سفوف ملنے سے گولی بنانے کے قابل ہو جائے اور گولی بقدر کالی مرج بنالیں۔ افیون کھانے کے وقت ایک گولی کھایا کریں، چند روز میں افیون کی عادت نہ رہے گی۔ اس نسخہ کے استعمال سے افیون خوری چھوٹ جاتی ہے اور کوئی نقصان نہیں ہوتا۔

ترک افیون بلا دوا :- ایک ماہ میں جتنی افیون کھاتا ہو، اتنی افیون لیں اور ایک مصفی برتن میں ڈال کر اس میں اگر دن میں ایک وقت لاتا ہے تو ۲۰ چمچے اور اگر دو وقت کھاتا ہے تو ۴۰ چمچے پانی ڈالیں اور بھٹوڑا سا پانی ڈال دیں اور آگ پر رکھیں، چند جوش آنے پر جتنا پانی لایا ہے باقی رہ جائے، اب اسے اتار کر بوتل میں بھر لیں اور اس کی خوشبو کو بد بننے کے لئے روح کیوڑہ ڈال دیں۔ دوا تیار ہے، طریقہ یہ ہے کہ جب افیون کھانے کا وقت ہو، بوتل کو ہلا کر ایک چمچ نکال کر پلائیں اور ایک چمچ سادہ پانی ڈالتے جائیں۔ کچھ عرصہ کے بعد افیون ترک جائے گی اور بوتل میں سادہ پانی نظر آئے گا۔ مجرب ہے۔

بیلادونا، اٹروپین، دھتورہ، اجوائن خراسانی وغیرہ

علامات :- منہ، جھلی، جلد خشک، پیشاب کا پیدا نہ ہونا، چہرہ سرخ، شدید پیاس، سانس سست، نبض تیز، پٹلیوں کا پھیل جانا، دست بندیان کے عوارض اس زہر کی خاص علامات ہیں، پٹلی میں ایک کے دودھ نظر آتے ہیں۔

علاج :- معدہ کو دھوئیں یا تے کروائیں، پائیلوکارپین، پلرگرمین کی زیر حیلہ بچکاری کریں، اس کا خاص فائدہ ہر ہے، جسم سرد ہو تو گرمی پہنچائیں

یعنی رانوں اور بگلوں میں گرم گرم پانی کی بوتلیں رکھیں، سانس بند ہونے لگے تو مصنوعی سانس جاری رکھیں، گرم گرم قہوہ پلائیں، کورائین کا بصورت انجکشن یا خوردنی استعمال مفید ہے۔

بھنگ، گانجا، چرس

علامات :- پہلے نشاط انگیز دلوے پیدا ہوتے ہیں، مریض نشے کی حالت میں ہنستا، روتا یا بکواس کرتا ہے، پھر حواس باطل ہو کر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔
علاج :- قے کرائیں یا اشامک ٹیوب سے معدہ کو دھوئیں، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دیں، رس لمیوں یا لمیوں کا آچار، ادراک کا رس یا ادراک کا آچار، سرکہ دیں، گردن کی پشت پر چھالا اٹھائیں اور علاج بطرز زہرانیون کریں، مریض کو سونے نہ دیں اور ٹھلا تے رہنا چاہیے۔
یونانی و آیور ویدک علاج میں :- ۱۔ چوننا و نوشارد دونوں کو ملا کر شیشی میں بند کر دیں اور اس کو کھول کر تھوڑی تھوڑی دیر بعد سونگھائیں۔

- ۲۔ سونٹھ ایک تولہ، خالص گھی پانچ تولہ میں ملا کر کھلانے سے بھنگ کا نشہ اتر جاتا ہے۔
- ۳۔ دو تولہ مغز بنولہ دودھ کے ہمراہ گھوٹ کر مصری ملا کر پلانے سے بھنگ کا نشہ اتر جاتا ہے۔
- ۴۔ دہی کا مسٹھا زیادہ مقدار میں پلانے سے بھی بھنگ کا نشہ اتر جاتا ہے۔

کچلہ، پیپتیا، سٹرکینین وغیرہ

علامات :- منہ کا ذائقہ سخت کڑوا ہوتا ہے، دم گھٹتا ہے، چہرہ نیلا ہونا، تشنچ تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہوتا ہے، پیٹوں و پرٹ میں سخت درد ہوتا ہے، دیکھنے، سُننے کی شکتی تیز ہو جاتی ہے، مریض آنکھوں سے ٹمٹکی لگا کر دیکھتا ہے، تھوڑے وقفے سے تشنچ ہوتا ہے۔

علاج :- پرمینگنیٹ آف پوٹاش دس گرین، پانی مناسب مقدار میں ملا کر معدہ کو دھو ڈالیں یا ہڈیوں کا کوئلہ یا ٹینک ایسڈ دست بازو پانی میں ملا کر اس سے معدہ کو دھوئیں، اس کے بعد کلورل ہائیڈریٹ ۲ گرین، پوٹاشیم برومائڈ ۳ گرین ایک ادس پانی میں گھول کر دیں۔ یہ ایکہ خوراک ہے، جب تک تشنچ موجود ہو دیں، مصنوعی سانس جاری کریں، آکسیجن دیں، قے کرا دیں، سخت تشنچ کو روکنے کے لئے کلوروفارم سونگھائیں۔ اگر پیشاب بند ہو تو کیبھی ٹر سے پیشاب جاری کریں۔

- آیور ویدک و یونانی علاج میں :- ۱۔ دودھ، گھی حسب ضرورت مصری ملا کر پلانے سے کچلہ کا زہر دور ہو جاتا ہے۔
- ۲۔ ناریل دریائی پانی میں پس کر پلانے سے کچلہ کا زہر شانت ہو جاتا ہے۔
- ۳۔ مغز تخم بنولہ چار تولہ بھور سردائی گھوٹ کر اس میں دس تولہ یانی ڈال دیں اور چار تولہ گھی ملا کر دیگی میں خوب گرم کر کے مصری ملا کر پلائیں۔

مغرب ہے۔

کافور (CAMPHOR)

علامات :- سر ہلکانا، سردرد، ہڈیان، غشی، سانس کی تنگی، معدے سے کافور کی بو، جسم ٹھنڈا، ہڈیان وغیرہ علامات ہوتی ہیں۔

علاج :- رائی کاسٹون ایکٹ جمچہ ایک پاؤ پانی میں ملا کر اس سے تپ کر لیں، پھر میگنیشیا سلفاس آدھا اونس ایک گلاس پانی میں گھول کر پلائیں، جسم کو گرمی پہنچانے کے لئے رانوں و بطنوں میں گرم پانی کی بوتلیں رکھیں، شراب یا سپرٹ ہر گز نہ دیں، ورنہ کانور شراب میں گھل کر زہریلا اثر پیدا کر دے گا۔ محرک ادویات دیں۔

متباکو، نکوٹین یا لو بیلیا وغیرہ

علامات :- نبض کمزور، پسینہ ٹھنڈا، نظر دھندلی، تپ و متلی ہوتی ہے اور یہ ایک عام استعمال کی چیز ہے۔ جو ساری دنیا میں استعمال کی جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ زیادہ استعمال کرنے سے زہریلا اثر پیدا کر دیتی ہے۔

علاج :- فوراً تپ کر کے چائے یا کافی پلائیں، گرم دودھ اور روغن بادام ناک میں ٹپکانا مفید ہے۔ ٹینک الیڈہ اگرین دس تولہ پانی میں ملا کر پلائیں، اگر حقہ پینے کی وجہ سے کسی شخص کو غشی ہو تو فوراً سرکہ کاشربت پلائیں اور محرک ادویات کا استعمال کیا جائے اور گرم بوتلوں کی ٹکڑیاں کریں۔

کوکنین اور اس کے مرکبات

علامات :- اس کے زیادہ استعمال سے جسم میں بے ہوشی پیدا ہو جاتی ہے، سر ہلکا رہتا ہے، جسم سرد، جلد خشک اور کبھی کبھی تشنچ شروع ہو جاتا ہے۔

علاج :- معدہ کو صاف کریں بے ہوشی کی حالت میں امیونیا کارب یا ایمائل نائٹریٹ سونگھائیں، کمزوری دل کی حالت میں کورائین بذریعہ انجکشن دیں۔ سانس بند ہونے کی حالت میں مصنوعی سانس جاری کریں۔ برانڈی، دھکی یا تیز چائے پلائیں، محرک قلب ادویات ڈیجیٹلس یا اگرین بذریعہ انجکشن زیر جلد دیں۔

روغن تارپین (ٹرپن ٹائن) یوکلپٹس آئل

علامات :- منہ سے تارپین کی بو آتی ہے، سانس خراٹے سے آتا ہے، پٹلیاں سکڑ جاتی ہیں۔ اینٹھن ہوتی ہے، پیشاب سے نفثہ کی طرح بو آتی ہے بے ہوشی ہوتی ہے۔

علاج :- واسٹم اپی کاک چار ڈرام پانی میں ملا کر تپ کر لیں، پھر آدھ اونس سے ایک اونس میگنیشیا سلفاس پانی میں ملا کر دیں، بعد میں لیس دار چیزیں مثلاً آتش جیا اسی کی چائے یا دودھ پلائیں، انڈے کی سفیدی کا دینا بھی مفید ہے۔

مٹی کاتیل، کیرو سین آئل، پٹرولیم پیرافین

علامات :- منہ اور معدہ میں سوزش ہو جاتی ہے، درد تپ و پیاس ہوتی ہے، نبض بے قاعدہ ہو جاتی ہے، سانس گہرا، جسم سرد، چہرہ زرد، تپ میں تیل وغیرہ کا اثر اور بو اور بعض دفعہ بے ہوشی بھی ہو جاتی ہے۔

علاج :- سٹامک ٹیوب سے معدہ کو دھوئیں اور تپ آور ادویہ سے معدہ کو خالی کر دیں، محرکات دیں، شکرینین یا اگرین کا جلدی ٹیکہ لگائیں، جسم پر مالش کریں، کچلہ شدہ آدھی رتی دن میں دو سے تین بار دیں۔

کینٹھریڈس، تیلنی مکھی اور پنچر کینٹھریڈس

علامات :- گلے اور معدہ میں سخت جلن و سوزش ہوتی ہے، غنی تھے اور دست آتے ہیں، نبض تیز، غنی پیشاب و البیوس والا پیشاب آتا ہے، رال بہتی ہے۔ آلات تناسل پر سوزش ہوتی ہے، سر درد اور غشی ہوتی ہے۔
علاج :- اگر حلق میں چھالے یا سوزش نہ ہو تو معدہ کو سٹامک پمپ سے دھو دیں۔ اگر گلے اور معدہ میں سوزش ہو تو اپومارفین ۱/۴ کا جلدی ٹیکہ کریں، اس کے بعد سفیدی بیضہ مرغ یا دودھ یا پانی لعاب گوند کیکر یا لعاب السیغول پلائیں، اس زہر کے روگی کو تیل یا چربی والی کوئی چیز نہ دیں، کمزوری دور کرنے کے لئے محرک قلب ادویات کو رابین دوسری سی کا عضلاتی کریں۔

خراب گوشت اور مچھلی کا زہر

علامات :- بعض قسم کی مچھلیاں زہریلی ہوتی ہیں، کبھی خشک یا باسی گوشت یا کسی بیمار جانور کا گوشت کھانے سے بھی زہریلی علامات پیدا ہو جاتی ہیں، زبان میلی ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، تھے اور دست آتے ہیں، جسمانی حرارت بڑھ جاتی ہے۔
علاج :- اسٹامک پیوے یا تھے اور دوا سے معدہ کو صاف کریں، پھر دواؤں کیسٹرائیل دے کر معدہ اور آنتوں کو صاف کریں، دست زیادہ آئیں تو پنچر اوپیم ہلوند پانی میں ڈال کر دیں یا کالور وڈین یا کیمفور وڈین پانچ سے دس ہلوند بلجناظ عمر و طاقت دیں، کمزوری زیادہ ہو تو محرکات قلب ادویہ کو رابین وغیرہ دیں۔
بعض دفعہ زہریلی کھمب (کھم) کھالینے سے بھی یہ عارضہ دور ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں تھے کرائیں اور بعد میں کیسٹرائیل ایک اولس دیں۔ بطور فاذر ہر پنچر سیلاڈونا دس ہلوند پانی میں ملا کر آدھ آدھ گھنٹہ بعد دیں، جسم کو گرم رکھیں۔

کلورل یا کلوروفارم

علامات :- بے ہوشی، سانس کی رکاوٹ، نبض کمزور، حرارت جسمانی کا کم ہو جانا، چہرہ کا نیلا ہونا، آنکھوں کی پتلیوں کا سکڑ جانا، عضلاتی کمزوری وغیرہ علامات ہوتی ہیں۔
علاج :- زبان کو باہر کھینچیں، مریض کے سر کو دھڑ سے نیچا کر دیں، نائٹریٹ آف ایمائل سنگھائی، رائوں و بخلوں میں گرم پانی کی بوتلی رکھیں، مصنوعی سانس جاری کریں، آکسیجن سونگھائیں، سٹرکینین ۱/۴ گرمین کا جلدی ٹیکہ لگائیں اور جائفل گرم گھی میں ملا کر مالش کریں۔

نائٹریٹ و گلیسرین

علامات :- شدید درد سر ہوتا ہے، نیند آتی ہے، بعض اوقات تھے و دست شروع ہو جاتے ہیں۔
علاج :- مریض کو لٹائے رکھیں، سرد پانی جسم پر ڈالیں، اٹروپین ۱/۴ گرمین کا زیر جلد انجکشن کریں۔

شراب - الکوہل (Alcohol)

علامات :- یہ ایک عام نشہ آور استعمال کی چیز ہے، جو جوانوں کے لئے ۲ اولس سے لے کر ۵ اولس تک مہلک ثابت ہو

ہے، مریض کا چہرہ سُرخ ہوتا ہے۔ منہ سے شراب کی بو آتی ہے، خیالات پریشان، جوش و ہڈیاں کے ساتھ چال میں لڑکھڑاہٹ اور بے ہودہ گفتگو ہوتی ہے۔ جی متلاتا ہے، قیئیں آتی ہیں، شدید حالات مرض میں چہرہ زرد یا نیلا، جلد ٹھنڈی، غنودگی اور سانس گھٹنے کی حالت ہو جاتی ہے۔ اگر علامات شدید ہوں، تو سانس کی روکاؤٹ کی وجہ سے دل کی حرکت بند ہو کر موت ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ زیادہ شراب پی لینے سے مریض کو دماغی دھکا پہنچتا ہے اور وہ پاگل ہو جاتا ہے۔

علاج :- شامک ٹیوب یا تھے اور ادویہ سے معدہ کو فوراً دھوئیں، گرم چائے اور کافی پلائیں، قلب کو تحریک دینے والی ادویات سٹرکینین ۱/۴ گرین جلدی انجکشن یا ڈی جی ٹیس ۱/۴ گرین زیر جلد انجکشن یا کورامین دوسری عضلاتی انجکشن دیں، مصنوعی سانس جاری کریں، اگر سر کی سطح گرم ہو اور موسم بھی گرم ہو تو چہرہ پر سرد پانی ڈالیں۔

شدید صورت میں بروما بیٹھ ۵ اگرین پانی میں ملا کر دینا مفید ہے، کلورل ہائیڈریٹ بھی فائدہ مند ہے۔
آیور ویدک علاج میں :-

- ۱۔ لکڑی کھانے سے شراب کا نشہ دور ہو جاتا ہے۔
 - ۲۔ اہلی کو پانی میں گھول کر اس میں چینی ملا کر پینے سے شراب کا نشہ دور ہو جاتا ہے۔
 - ۳۔ گھی خالص گرم گرم پلانے سے نشہ دور ہو جاتا ہے۔
 - ۴۔ دھنیا خشک ایک تولہ سفوف بنا کر برابر چینی ملا لیں، اس میں سے بھوڑا بھوڑا استعمال کرنے سے نشہ دور ہو جاتا ہے۔
- شراب چھوڑنے کا علاج :- اگر مریض کی شراب پینے کی عادت نہ چھوڑ سکے تو شراب چھوڑنے والی دوا کرونی ٹال (Cronetal) ساختہ آئی، سی، آئی ایک گولی صبح و شام دیں، اس سے شراب کی عادت دور ہو جاتی ہے۔ اگر یہ نہ ملے تو ہر ادس شراب میں ایک ڈرام وائٹم اپی کاک ملا دیں، لیکن مریض کو معلوم نہ ہو سکے۔ اس طرح شراب پیتے ہی اُسے تے ہو جائے گی۔ اور بار بار ایسا ہونے سے مریض سمجھے گا کہ شراب اُسے موافق نہیں ہے اور وہ چھوڑ دے گا۔ اس کے علاوہ وائٹم اپی کاک کا ذائقہ شراب کی طرح ہوتا ہے، جب مریض کو شراب سے نفرت ہو جائے اور وہ اسے چھوڑ دے تو اس کی اعصابی طاقت کو بحال کرنے کے لئے ایٹن سیرپ، فیلوز سیرپ وغیرہ کچلہ کے مرکبات دیں، بعض دفعہ مریض صرف شراب کے نقصانات بتانے پر ہی اُسے چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔

باربی ٹون، لومی نل، میڈی نل، الونل اور دوسرے باربی ٹون مرکبات

علامات :- بے ہوشی طاری ہونے سے پہلے مسموم کو ذہنی اختلال، سر جھکانا، دو نظری اور ہڈیاں کی شکایت ہوتی ہے، نبض اور سانس کی حرکت سُست ہو جاتی ہے، خون کا دباؤ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے، پیشاب بند ہو جاتا ہے اور چہرہ سفید ہوتا ہے۔

علاج :- شامک ٹیوب سے معدہ کو خالی کریں اور ٹیوب کے ذریعے ایک پمپٹ کافی اور ایک ادس کدیرٹرائیل داخل کریں۔ مریض کی بخلوں اور رالوں میں گرم پانی کی بوتلیں رکھ کر جسم کو گرم کریں، نارمل سیلائن یا گلوکوز زوریڈی دیا جائے، مصنوعی سانس جاری کریں، پیشاب بند ہو تو کبیتھی ٹرے نکالیں، شدید حالت مرض میں آکسیجن دی جائے، براہکونونہ ہو جائے تو پمپٹ سیلین کا عضلاتی انجکشن کریں۔

جَمال گوٹھ (کروٹن آئیل)

علامات :- معدہ و آنتوں میں شدید درد ہوتا ہے، تھے و دست ہوتے ہیں، مریض کی زیادتی کی حالت میں غولی تھے و دست آتے ہیں، غشی

ہوتی ہے، نبض کمزور ہوتی ہے، کبھی پیشاب بند ہوتا ہے اور ہڈیاں کی علامات ہوتی ہیں۔
 علاج :- سٹامک ٹیوب سے معدہ کو دھوئیں یا گرم پانی میں نمک ملا کر قیئیں کرائیں، شکم بیلٹا ڈونا دو بوند سے پانچ بوند ایک گھونٹ پانی میں ملا کر پلائیں یا گوند کثیر اسفوف بنا کر دہی میں ملا کر دیں، رفع درد کے لئے مارنیا کا انجکشن دیں، محرک قلب ادویات دوسی سی کورامین کا عضلاتی انجکشن بھی مفید ہے۔
 آریورویڈک و یونانی علاج :- دہی کی چھچھ ڈیڑھ پاؤ، دھنیاں تین ماشہ، مصری دو تولہ، یہ ایک خوراک ہے، اسی طرح چند بار پلانے سے مریض کو چین ہو کر جمال گوڑے کا زہر دور ہو جاتا ہے۔ آزمودہ ہے۔

ڈی، ڈی، ٹی (ڈیکولین)

علامات :- جی متلاتا ہے، میجان کی علامات ہو کر طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، نبض کمزور، سانس کی رکاوٹ، اس کی سمیت کی تمام علامات کاربن ڈی آکسائیڈ کی سمیت سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔
 علاج :- سٹامک ٹیوب سے معدہ کو دھوئیں، نمکین جلاب دیں، دل ڈوب رہا ہو تو محرک قلب ادویات کا استعمال کریں۔

سینٹونین اور اس کے مرکبات

علامات :- تھکے، دست، پٹلی پھیلی ہوئی اور سب چیزیں زرد رنگ کی نظر آتی ہیں۔
 علاج :- تھکے کرائیں یا معدہ کو دھوئیں، اگر تشنچ ہو تو کلورل و پوٹاشیم برومائیڈ دیں، انہیں دور ہونے پر محرک قلب ادویات یا کورامین دوسی سی کا عضلاتی انجکشن دیں۔

بلاڈر (بھلاؤہ)

بھلاؤہ ایک مشہور چیز ہے، طب یونانی و آریورویڈ میں خوب کام آتا ہے، اسے بغیر شدہ کئے استعمال کرنے سے زہر ہو جاتا ہے اس میں سے ایک قسم کا تیل نکلتا ہے، اگر غلطی سے کہیں لگ جائے تو سوجن پیدا کر دیتا ہے، لہذا اس کو شدہ کرتے وقت بھی نہایت احتیاط سے کام لیں اور کسی قابل دیکھ یا علم کے مشورہ کے بغیر نہ تو اسے شدہ کریں اور نہ استعمال کریں، کھانے کے علاوہ اس کا تیل لگنے یا اس کا دھواں بھی زہر بھلا اثر پیدا کرتا ہے۔

علامات :- جسم پر سوجن ہو جاتی ہے۔ سخت خارش ہوتی ہے اور کبھی تمام چہرہ سوج جاتا ہے، سخت بے چینی ہوتی ہے۔
 علاج :- مغز اخروٹ کو دودھ یا پانی میں پیس کر سوجن پر لگائیں اور مغز اخروٹ دودھ کے ساتھ کھائیں یا اٹلی کے سبز پتے ایک تولہ پانی میں پیس کر چھان کر پلائیں۔

مندرجہ ذیل مجربات اس کا زہر دور کرنے کے لئے مجرب ہیں :-

۱۔ مغز اخروٹ و تل سیاہ دودھ میں گھوٹ پیس کر سوجن و زخم پر لگائیں آرام آجائے گا۔

۲۔ کسوندی بوٹی کے پتے گھوٹ کر لپیپ کرنے سے بھلاؤہ سے پیدا شدہ سوجن کو آرام آ جاتا ہے۔

۳۔ تل، اخروٹ، مغز چروخی، ناریل کی گبری دودھ میں پیس کر سوجن والی جگہ پر لپیپ کریں، تین گھنٹے بعد لپیپ اتار کر اس مقام کو دہی کی

- گٹھ لیسی سے دھوئیں اور اسی طرح لیپ نہ لگا کر پھر کئی بار دہی کی لسی سے دھوئیں، فوراً آرام آجائے گا۔
۴۔ چولائی سبز کے رس میں مکھن ملا کر مقام سوجن پر لگانے سے فوراً آرام آجاتا ہے۔
۵۔ بیرونی طور پر روغن اخروٹ اور کھانے کے لئے اخروٹ کی گری دیں، تمام بُری علامات فوراً دور ہو جاتی ہیں۔

سُرمہ (انٹی موئی) کے مرکبات

- علامات :- منہ میں دھاتی ذائقہ ہوتا ہے، لگاتار قے آتی ہے، بعد میں دست شروع ہو جاتے ہیں، پیاس بڑے زور کی ہوتی ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے، پاؤں میں اینٹھن، نبض کمزور، آخر میں حرکت قلب بند ہو جانے سے موت ہو جاتی ہے۔
علاج :- سٹامک پیپ سے معدہ کو صاف کر دیں یا قے کراویں، ٹینک ایسڈ ایک ڈرام پانی میں ملا کر بطور تریاق استعمال کریں، اگر یہ نہ ملے تو نیز چائے یا کافی پلا دیں، قے بند ہونے پر دودھ، انڈے کی سفیدی اور روغن زیتون کا استعمال کریں۔

سلور ٹائیٹریٹ و اس کے مرکبات

- علامات :- گلے اور معدہ میں سخت درد ہوتا ہے، تشنچ اور غشی ہوتی ہے۔
علاج :- اس کا تریاق منک خوردنی ہے۔ اس سلسلہ میں منک آدھا اونس کی ایک خوراک دو گھنٹہ پانی میں گھول کر دینا چاہیے۔
دے کرتے کراویں، انڈے کی سفیدی کا استعمال بھی مفید ہے۔

دُجی ٹیلیس (Digitlis)

- علامات :- دست، معدہ میں سخت درد، سر درد، غفلت، غشی، اینٹھن وغیرہ علامات پائی جاتی ہیں، دل کو طاقت دینے کے لئے یہ عام دوا ہے، لیکن زیادہ مقدار میں دینے سے زہریلی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔
علاج :- گرم پانی سے معدہ کو دھوئیں یا قے اور ادویات دیں یا ایپومارین، اگر گرین کاٹیکہ کریں، ٹینک ایسڈ، ۳ گرین دس تولہ پانی میں ملا کر پلائیں، چائے یا کافی کا تیز جوشانہ پلائیں، محرک ادویات کا استعمال کریں۔

کولہ کی گئیس - کاربن ڈائی آکسائیڈ، کاربن مونو آکسائیڈ

- علامات :- کاربن مونو آکسائیڈ ایک خطرناک زہر ہے، اس سے جسم میں سُستی، کانوں کا بجنا، نبض اور سانس تیز، پٹلیاں پھیلی ہوئی، غشی، سانس کی تنگی وغیرہ علامات پائی جاتی ہیں۔
علاج :- مریض کو کھلی ہوا میں رکھیں، مصنوعی سانس جاری کریں، سینے اور چہرے پر ٹنڈے پانی کے چھینٹے ماریں، آکسیجن سنگھائیں، جسم کو گرم کریں اور محرک قلب ادویات دیں۔

نیپتھالیٹن (نیٹائل کی گولی)

- علامات :- تھیں آتی ہیں، تشنچ، سر درد، جسم میں درد، نبض کمزور اور سانس تنگی سے آتا ہے، زیادہ مقدار میں کھانے سے

بے ہوشی ہو جاتی ہے۔

علامات :- سٹامک ٹیوب یا قے آور ادویات سے معدہ کو خالی کریں، میگ سلف کا جلاب دیں، لعاب دارا شیار دیں، نیل والی چیزیں نہ دیں۔ اگر ضرورت ہو تو بلڈ یا پلازما کی ٹرانسفیوژن دی جائے۔

ایسپرین، انٹی پارین وغیرہ

ایسپرین، انٹی پارین، فنسٹین، انٹی فبرین، سارڈان، اناسین، کوڈو پارین، اسپرو، پیرٹامول وغیرہ ایسی ادویہ ہیں جو عام طور پر تیز بخاروں اور پٹوں کے دردوں کے لئے استعمال کی جاتی ہیں، جب ان کو بہت زیادہ مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے تو زہریلا اثر پیدا کرتی ہیں۔
علامات :- ان کے استعمال سے پسینہ اس قدر زیادہ آتا ہے کہ جسم تر ہو جاتا ہے، نبض کمزور اور بے قاعدہ ہوتی ہے، مریض بے حد کمزور ہو جاتا ہے، قے آتی ہے، چہرے کی رنگت نیلی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ خسرہ کی مانند دانے نکل آتے ہیں۔
علاج :- مریض کو آرام سے لٹائیں اور فوراً محرکات کا استعمال کریں، کورامین بذریعہ انجکشن یا منہ استعمال کریں، سپرٹامونیا ایرومیٹک، ۳ قطرے ایک گھونٹ پانی میں ملا کر پلائیں۔ ہاتھ، پاؤں کو گرم رکھیں۔ سانس رکنے کی حالت میں مصنوعی سانس جاری کریں۔
یونانی علاج :- دواء المسک معتدل جواہروالی چار ماشہ ہمراہ دودھ دیں۔

نوٹ :- موجودہ اشتہار بازی "گولی لیجے" اور درد غائب کی مہربانی سے نا تجربہ کار عوام انہیں زیادہ مقدار میں استعمال کر لیتے ہیں، جس سے یہ زہریلے اثرات پیدا کرتی ہیں۔

چاندنی (سلور) کے مرکبات

علامات :- خراش پیدا کرنے والی زہروں جیسی علامات ہوتی ہیں، گلے اور معدہ میں سخت درد ہوتا ہے، سفیدی مائل لیس دار قے آتی ہے، جو روشنی میں سیاہ ہو جاتی ہے۔

علاج :- سوڈیم کلورائیڈ (کھانے والا نمک) چار ماشہ پانی میں گھول کر پلائیں اور قے آور ادویات کا استعمال کریں، بعد میں سفید بیضہ مرغ کا گھول پلائیں، شدت درد میں مسکن درد ادویات دیں۔

نوٹ :- ہمارے تجربات کے مطابق اکثر زہروں کا مجرب علاج خالص دودھ اور گھی ہے۔

زہریلے جانوروں کا ڈسنا

سانپ کا ڈسنا

ہندوستان و پڑوسی ملک میں ہزاروں آدمی سانپ کے ڈسنے سے ہر سال مرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں اگر مندرجہ ذیل تدابیر پر عمل کیا جائے تو سانپ کے کاٹنے سے بچاؤ رہتا ہے۔

۱۔ جن علاقوں میں سانپ یا بچھو زیادہ ہوتے ہیں، وہاں بغیر جوتا نہیں چلنا چاہیے۔

۲۔ لاپرواہی سے گھنے درختوں، جھاڑیوں اور زمین یا چٹانوں کی دراڑوں سے نہ گزریے۔

۳۔ کپڑے یا جوڑے پہننے سے پہلے با احتیاط دیکھ لیجئے۔

۴۔ بستر کے پاس ٹارچ رکھیے تاکہ پلنگ سے اترنے سے پہلے فرش کو دیکھ لیا جائے۔

۵۔ سانپ نے کاٹ لیا ہو تو اس کے ڈسنے کا نشان (۰۰) یہ ہے اور فوراً اس نشان سے اوپر کسی مضبوط کپڑے یا پگڑی سے کس کر باندھ دیں۔ تاکہ زہر پلّا خون دل کی طرف نہ جائے اور جسم کے دوسرے خون میں شامل ہو کر زہر نہ پھیلے۔

۶۔ کاٹے ہوئے مقام پر گہرا شکاف، تیز گرم لوہے یا سلور نائٹریٹ یا نائٹرک ایسڈ سے جلادیں اور بعد ازاں پوٹاسیم پرمینگنیٹ کے تیز لوشن سے دھولیں۔

۷۔ سانپ کاٹے مریض کو دہکی یا برانڈی نہ دیں، کیونکہ دوران خون تیز ہو جانے سے زہر جسم میں فوراً جذب ہو جائے گا۔

۸۔ سٹرکینین، اگر گرین کا انجکشن زہرائفی (سانپ کی نہایت زہریلی قسم ہے) میں مفید ثابت ہوتا ہے۔

۹۔ کاٹے ہوئے مقام پر X نشان کے مطابق دو گہرے پچھلے گہرے دیئے جائیں، اگر میسر آ سکے تو زخم پر سینگلی لگوا دیں اور چیرے ہوئے مقام پر دو ماشہ پوٹاسیم پرمینگنیٹ ڈال دیں، جو لوگ جنگلات میں رہتے ہیں، ان کو سینک باٹ لین ایڈجسٹ میں پوٹاسیم پرمینگنیٹ بھرا ہوتا ہے۔ (یہ ایک چاقو ہوتا ہے) پاس رکھا جائے یا کم سے کم پوٹاش اور نشتر ضرور اپنے پاس رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ دو فوری طور پر استعمال کرنے سے سانپ کے زہر کا تریاق ہے۔

۱۰۔ انٹی وین پولی ملیٹ (تریاق زہر مار) ۱۰۰ سی سی کی وریدی پچکاری کرنے سے تمام زہر کا اثر ترک جاتا ہے، بچوں کو بلحاظ عمر نصف مقدار کافی ہے۔ یہ مرکب انٹی وی نہیں کئی قسم کے سانپوں کا زہر مگر کسولی کے انٹی ٹوٹ میں تیار ہو رہا ہے، ایک مستند ڈاکٹر اسے بخوبی استعمال کر سکتا ہے اور یہ ہر قسم کے زہر کے لئے کام دے سکتا ہے۔

۱۱۔ مریض کو فوراً کسی سرکاری ہسپتال میں پہنچایا جائے، کیونکہ پولی ملیٹ سیرم ہر وقت ہسپتالوں میں دستیاب ہو سکتی ہے۔

۱۲۔ اگر کسی آدمی کے منہ میں کوئی زخم نہ ہو تو زہر کو چوسا بھی جاسکتا ہے، لیکن یہ ایک خطرناک عمل ہے، کیونکہ اگر ماسخورہ وغیرہ ہو تو تندرست شخص کو بھی اس زہر کا اثر ہو سکتا ہے۔

۱۳۔ چھلکار پیٹھا چھ ماشہ پانی ایک پاؤ میں شیرہ نکال کر مقوڑا مقوڑا پانچ چھ بار پلانا سفید ہے، جب شیرہ کڑوا لگے تو سمجھیں کہ زہر اتر چکا ہے، جب تک کڑوا نہ لگے، پلاتے رہنا چاہیے۔ اس سے الٹیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور مریض پتہ جاتا ہے۔ جب زہر دور ہو چکے، تو دودھ اور گھی پلانا چاہیے۔

تریاق زہر سانپ :- زہر مہرہ خطائی ایک تولہ، روح کیوڑہ خالص پانچ تولہ، دونوں کو اچھی طرح کھل کر کے بالکل خشک کریں اور سفوف لیں، بوقت ضرورت چار رتی سے ایک ماشہ پانی سے مریض کو کھلا دیں، اگر مریض بے ہوش ہو گیا ہو تو بھی منہ کھول کر اس کے منہ میں ڈال دیں۔ یہ دوا سانپ کے زہر کا تریاق ہے۔

دیگر :- درخت پیل کے پتے ایک پاؤ پانی میں گھوٹ کر مریض کو پلا دیں، اگر مریض کو دست تھے اور خون بھی جاری ہو تو کسی نہ کسی طرح یہ پانی حدہ میں پہنچا دیں۔ اس سے سانپ کا زہر اتر جاتا ہے۔

ریٹھا سے سانپ کاٹے کا علاج :- ہم نے اپنی تصنیف ”ہندوستان کی جڑی بوٹیاں“ حصہ اول میں ریٹھا کے باب میں سانپ کاٹے کا اکیڑی علاج ریٹھا کے عنوان سے ایک مضمون لکھا تھا۔ لگ بھگ چھ ماہ بعد دسید کرم چند ہوشیار پور ہما سے پاس تشریف لائے، انہوں نے بیان کیا کہ

آپ کی "ہندوستان کی جڑی بوٹیاں" واقعی ایک اہم کتاب ہے، اس کا ایک ایک نسخہ لاکھوں روپے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ آپ نے ہمارے استفسار پر بتایا کہ ایک زمیندار کو ایک نہایت زہریلے سانپ نے ڈس لیا، گھر والوں نے زہر رفع کرنے کے لئے ستر جنتر وغیرہ سب تدابیر اختیار کر لیں، مگر کچھ اثر نہ ہوا، آخر ان کا آدمی میرے پاس آیا اور بڑی منت سماجت کی کہ کسی طرح زمیندار کو بچایا جائے۔

میں نے دیکھا کہ زہر سائے جسم میں سرایت کر چکا ہے اور زمیندار بے ہوش پڑا ہے۔ میں نے چونکہ اسی روز کتاب "ہندوستان کی جڑی بوٹیاں" میں "سانپ کاٹے کا کسیری علاج" ریٹھا "پڑھا تھا، اسی وقت دکان سے چالیس پچاس ریٹھے لے گیا اور پانچ چھ ریٹھوں کے چھلکوں کی سردائی رگڑوائی شروع کر دی اور تیار ہونے پر مارگزیدہ کی ناک بند کر کے اس کے منہ میں ڈالنی شروع کر دی، سردائی ختم ہو گئی مگر مارگزیدہ بدستور پڑا رہا اور کوئی اثر نہ ہوا، پھر ہم نے دوبارہ دوبارہ وہی عمل کیا، جس سے مارگزیدہ کو قدرے ہوش آیا اور وہ ادھر ادھر جھانکنے لگا۔ چند منٹ کے بعد اس کو خوب زور کے تے اور دست جاری ہو گئے، ہم نے کتاب میں دی گئی ہدایت کے مطابق سردائی پلانے کا عمل جاری رکھا حتیٰ کہ مارگزیدہ نے سردائی کو کڑوی کہہ کر پینے سے انکار کر دیا اور ہم نے سمجھ لیا کہ اب اس کی جان بچ گئی ہے، زہر اتر چکا ہے، بعد ازاں اس کو خوب دودھ بھی پلایا۔

اب وہ زمیندار بھلا چکا ہے اور آپ کے اور میرے جان مال کو دعائیں دیتا ہوا نہیں تھکتا اور طب یونانی و آیوروید پر اس قدر وثقا رکھتا ہے کہ اس کے گھر میں کسی کو کوئی تکلیف ہو۔ آیورویدک یا یونانی علاج کو ترجیح دیتا ہے۔

سانپ کاٹے کا مجرب علاج :- مارگزیدہ کے نالو اور پیشانی کے درمیان سر کے اوپر پچھنے لگا کر دیکھیں، اگر خون نہ نکلے، تو جان لیں کہ مر چکا ہے، بعض آدمیوں کو ششماہی یا سالانہ ایک خاص موسم میں سانپنی کاٹتی ہے، ان کو قبل آغاز موسم دو ہفتہ پہلے ایک ماشہ سفوف چھلکا ریٹھا استعمال کر لیں، جس سے وہ بوئے مرست زائل ہو جائے گی، جس کے سبب سے سانپنی کاٹا کرتی ہے، اگر کسی گھر میں سانپ ہو یا آمد و رفت ہو تو ڈیڑھ تولہ سفوف ریٹھا پانی میں گھول کر جا بجا سانپ کے آنے کی جگہ پر چھڑک دیں۔ مارگزیدہ مولشیوں کو دس تولہ سفوف ریٹھا پانی میں گھول کر بذریعہ نال پلائیں تو وہ فوراً ہوش میں آجاتے ہیں اور چند خوراک سے ہی زہر زائل ہو جاتا ہے، مجرب اور آزمودہ ہے۔

بقدر چھ ماشہ چھلکا ریٹھا سفوف بنا کر دس تولہ پانی میں سردائی کی طرح گھوٹ کر مارگزیدہ آدمی کو پلائیں، اس طرح دو گھنٹہ بعد دیتے ہیں، اس سے بعض مریضوں کو دست ہو کر آرام آ جاتا ہے، ایک شخص کو ایسے زہریلے سانپ نے کاٹا کہ بدن بالکل پھٹ گیا، اس کو زہر کا اثر دور ہونے کے بعد اٹھارہ روز تک سفوف ریٹھا بقدر ایک ماشہ صبح و شام دیا گیا، سب زخم خود بخود دھو گئے اور مریض اچھا ہو گیا۔ اگر آپ سفر میں ہوں تو سفوف ریٹھا ضرور اپنے پاس رکھیں، جو سانپ کاٹے کا آسان و آزمودہ علاج ہے۔

مارگزیدہ کے مردہ یا بے ہوش ہونے کی شناخت :- اکثر زہریلے سانپ کاٹنے سے آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے کہ کہ دیکھنے والے کو یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ مارگزیدہ مر چکا ہے یا زندہ بے ہوش پڑا ہے، کیونکہ تیز زہر کے باعث نبض کی حرکت اور سانس کی رفتار قریب قریب بند ہوتی ہے، اس لئے ایسی حالت میں ناواقف لوگ اکثر مارگزیدہ کو مردہ سمجھ کر جلا یا دفن کر دیتے ہیں۔ یہاں چند ایسی علامات لکھی جاتی ہیں، جن سے بے ہوش یا مردہ کی آسانی سے شناخت ہو سکتی ہے :-

۱۔ دن کا وقت ہو تو روشن جگہ پر مارگزیدہ کو لٹا کر اس کی آنکھ کھول کر دیکھیں، اگر مارگزیدہ کی آنکھ کے ڈیلے میں آپ کا عکس یعنی تصویر دکھائی دے تو مارگزیدہ زندہ ہے۔

۲۔ اگر رات کا وقت ہو تو مارگزیدہ کو اندھیرے کمرے میں لٹائیں اور آنکھ کھول کر سامنے جلتے ہوئے دیپ کی شعاں مارگزیدہ کے ڈیلے پر ڈالیں، اگر شعاں ڈیلے پر نظر آئے تو سمجھ لیں کہ وہ ابھی زندہ ہے۔

۳۔ مکی جستی کٹوری میں پانی ڈال کر مار گزیدہ کی چھاتی پر رکھیں، اگر سانس باقی ہے تو پانی حرکت کرے گا، اگر مردہ ہے تو حرکت نہیں کریگا۔
گھروں کو سانپ سے محفوظ رکھنے کی تدبیریں :- ذیل میں چند ایسی دوائیں اور تدبیریں لکھی جا رہی ہیں، جو گھروں سے سانپ کو بھگانے اور محفوظ رکھنے کے لئے بارہا مفید اور کامیاب ثابت ہو چکی ہیں۔ جس وقت بھی گھر میں سانپ ہونے کا شک ہو فوراً جو چیز چاہیں استعمال میں لائیں :-

- ۱۔ موی کے پانی میں نوشادر حل کر کے سانپ کے سوراخ میں ڈال دیں، سانپ وہیں ٹھنڈا ہو جائے گا۔
- ۲۔ خالی نوشادر ہی زمین پر چھڑک دیں تو بھی سانپ گھر چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔
- ۳۔ رائی سانپ کی قاتل ہے، جہاں سانپ ہو اس کی دھونی دیں، سانپ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔
- ۴۔ جس گھر میں مور رہتا ہو۔ وہاں سانپ نہیں ہوتا۔
- ۵۔ نوشادر اور رائی برابر پانی میں پیس کر سانپ کے سوراخ میں ڈال دیں۔ سانپ مر جائے گا۔
- ۶۔ جہاں پر ریٹھایا پایا ہوگا۔ سانپ نہیں آئے گا۔
- ۷۔ چھلکار ریٹھا کو پانی میں پیس کر چھڑک دیں، سانپ اس کی بو سے دور بھاگتا ہے۔
- ۸۔ جس گھر میں سانپ ہو، بارہا شگے کا سینگ جلا دیں، سانپ گھر چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔

بچھو کاٹنے کا علاج

علامات :- بچھو کے ڈنک مارنے سے مقام نیش پر سخت درد ہوتا ہے اور لہری سی اٹھتی ہیں، جس کا اثر سارے جسم پر ہوتا ہے اور بعض دفعہ درد سے دل گھٹنے لگ جاتا ہے۔

علاج :- کمزوری ہو تو محرکات دیں، سپرٹ ایونیٹ اور مینک ۳۰ سم ایک گھونٹ پانی میں ملا کر پلائیں اور مقام نیش کو دبا کر نشتر سے خون نکال دینا چاہیے، اس سے زہر کم ہو جاتا ہے یا فوراً ہی پوٹاسیم پرمینگنیٹ اور ست لیموں علیحدہ علیحدہ پیس لیں، پہلے ایک چمکی پوٹاسیم پرمینگنیٹ کی ڈال کر اوپر سے چمکی ست لیموں کی ڈال دیں اور ایک بوند پانی ڈال دیں۔ شعلہ سا پیدا ہوگا اور مقام نیش جل جائے گا، جس سے بچھو کاٹے کو فوراً آرام ملے گا۔

مندرجہ ذیل ادویات بچھو کاٹے کے لئے نہایت مفید ہیں :-

- ۱۔ اہلی کایج لے کر پتھر پر پانی سے گھس کر جولی سی نکلے، وہ مقام نیش پر اور آدھا پنچاں دگر د لگائیں، فوراً آرام ہوگا۔
- ۲۔ جب آمول کے بور کا موسم ہو، ہاتھوں پر یہ بور اچھی طرح مسل لیا جائے اور اس دن ہاتھ نہ دھوئے جائیں، چھ ماہ کے اندر جب بھی بچھو کاٹے، دو چار بار ہاتھ پھیرنے سے بچھو کا زہر دور ہو جاتا ہے۔ اگر بچھو یا بھڑاس ہتھیلی پر کاٹ بھی لے تو اثر نہیں ہوتا۔

- ۳۔ کاربونیٹ آف سوڈا (سجی کھار) یا امونیا کارب کا گھول لگانے یا لائیو ار امونیا فورٹس مقام نیش پر لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔
- ۴۔ روغن تارمین یا شجر آوڈین یا امرت دھارا (ست پودینہ، ست اجوائن، کافور، ہوزن گھول بنا لیں) مقام نیش پر لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔
- ۵۔ جڑ مار گھس کر لگانے سے بچھو کاٹے کو آرام ملتا ہے۔

- ۶۔ چوننا اور شہد ملا کر جہاں بچھو کاٹے، لگا دیں، فوراً آرام ملے گا۔
- ۷۔ گندھک اور نوشادر سرکہ میں گھول کر بچھو کاٹے کی جگہ پر لگائیں، نہ درد رہے گا نہ تکلیف۔
- ۸۔ جسے بچھو کاٹے پیاز کا عرق چار سے چھ تولہ ملا دیں، فوراً آرام ہوگا۔
- ۹۔ چرچہ بوٹی کی جڑ بچھو کے کاٹنے کی جگہ پر لگا دیں، تکلیف سے نجات ملے گی۔
- ۱۰۔ عرق مولیٰ میں جمال گوطہ گھس کر جہاں بچھو نے کاٹا ہو لگائیں، فوراً آرام ملے گا۔
- ۱۱۔ چند بچھو پکڑ کر شراب یا سپرٹ میں ڈال دیں اور حفاظت سے رکھیں۔ جب بھی ضرورت ہو، پھریری اس شراب یا سپرٹ کی مقام ڈنک پر لگائیں، مجرب ہے۔
- ۱۲۔ کلورل ہائیڈریٹ اور کافور برابر ملا لیں، پھریری سے بچھو کاٹے کے مقام پر لگائیں، فوراً آرام ملے گا۔
- ۱۳۔ ہینگ باریک پیس کر ڈنک کی جگہ پر پانی کے ساتھ لیپ کریں، فوراً آرام ہوگا۔
- ۱۴۔ جہاں بچھو نے کاٹا ہو، آک کا دودھ مل دیں، فوراً آرام ہوگا۔
- ۱۵۔ لیموں کو کاٹ کر ڈنک والی جگہ پر مل دیں، درد سے آرام ملے گا۔

کنکھجورے کا کاٹنا

- علامات :- اس کیڑے کے ۴۴ پاؤں ہوتے ہیں، ہر طرف بائیں بائیں، اس کے کاٹنے سے درد شدید ہوتا ہے، اُوربے ہوشی سی ہو جاتی ہے۔ کنکھجورے کے کاٹنے سے بعض دندہ میٹھی چیزیں کھانے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔
- علاج :- ۱۔ اگر کنکھجور بدن پر چپک جائے تو پیپتہ کو پانی میں پیس کر لگائیں یا نمک سرکہ میں خل کر کے لگائیں، زہر اثر نہ کرے گا۔
- ۲۔ گھی اور سرکہ ملا کر لیپ کریں آرام ملے گا یا پیپتہ پانی میں پیس کر لیپ کریں۔
- ۳۔ چراغ بجھاتیل لگائیں، زہر اثر نہ کرے گا۔

زہر ملی مچھلیوں کا کاٹنا

- علامات :- کاٹے ہوئے مقام پر سخت درد ہوتا ہے، جلن اور سوجن ہونے کی وجہ سے تیز بخار ہو جاتا ہے۔
- علاج :- محرک ادویات سپرٹ امونیا ایرومیتک ۳۰ نمم ایک گھونٹ پانی دیں یا دواء المسک محتدل جواہر والی دیں۔ کاٹے ہوئے مقام پر نمک خوردنی مل دیں یا پیاز کی پلٹس باندھیں۔ اگر درم کے بعد پیپ پڑ جائے تو عام زخم کی طرح علاج کریں۔

بھڑیا شہد کی مکھی کا کاٹنا

- علامات :- مقام ڈنک پر سخت درد ہوتا ہے اور سوجن ہو جاتی ہے۔
- علاج :- ۱۔ مقام نیش کو دبا کر ڈنک کو خارج کر دیں۔ اس کے علاج میں بچھو کاٹے کی تمام ادویات مجرب ہیں۔
- ۱۔ مقام درد پر امرت دھارا یا مٹی کا تیل لگانا مفید ہے۔
- ۲۔ شہد کھلائیں اور شہد گرم پانی میں ملا کے لگائیں، فوراً آرام ہوگا۔

۳۔ نارجل دریائی مقام ڈنک پر لگائیں، درد و جلن کو فوراً آرام ملے گا۔

۴۔ آگ کا دودھ لگائیں فوراً آرام ہو جائے گا۔

۵۔ منک اور سرکہ لگائیں، مجرب ہے یا جس جگہ کاٹے، گائے کے گوبر کا پانی لگائیں۔

۶۔ مکو کو سرکہ میں پیس کر لگائیں، آرام ہوگا۔

۷۔ ٹنکیر آلو ڈین یا ردغن لونگ یا روغن دارچینی لگائیں آرام آجائے گا۔

یہی ادویات جیونیٹ کے کاٹے پر اور پھٹو کاٹے کی تمام ادویات مکڑی کے زہر کے علاج کے لئے مجرب ہیں، حرب موقتہ استعمال کر کے
آدھ اٹھائیں، دیوانے کئے، بھڑیے یا لومڑی وغیرہ کے کاٹے پر ہلکاؤ کا بیان دیکھیں۔

کھٹل، چھپڑی، مچھر وغیرہ کا کاٹنا

ڈنک کی جگہ پر منک پانی میں گھول کر لگائیں یا پشکڑی یا جست یا پیاز یا سرکہ لگائیں۔ کمروں میں ڈی، ڈی، ٹی یا فیلٹ کا چھڑکاؤ کریں۔


کان میں کیڑا چلا جائے تو نکلنے کا آسان علاج

کیڑا جیسے ہی کان میں گھستا ہے، ویسے ہی ہمارا عمل یہ ہوتا ہے کہ کان، کپٹی کو انگلی سے ہلا کر کیڑا باہر نکال دیں یا پھر کان میں
ٹی ڈال کر اسے باہر نکال دیں۔ لیکن ایسا کبھی نہ کریں۔ کیونکہ اس طرح سے تو کیڑا اور اندر چلا جائے گا اور انگلی کی پہنچ سے باہر
جائے گا۔ اسے پن یا تنکے کی مدد سے کرید کر باہر نکالنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ بلکہ کمرے کی بتیاں فوراً بجھا کر کان کے پاس مارچ
اکر رکھ دیں اور آرام سے بیٹھ جائیں۔ کیڑا روشنی کے پاس پہنچنے کے لئے اپنے آپ باہر نکل آئے گا۔ بشرطیکہ آپ نے پہلے ہی کان
سے اسے اندر نہ دھکیل دیا ہو۔ اگر اس طرح کیڑا نہ نکلے تو مسروں کا تیل گرم کر کے کچھ بوندیں کان میں ڈالیں۔ کیڑا تیل میں وکان میں
پکنا جزو ہوتا ہے، اس میں پٹ کر مر جائے گا۔ اس کو تنکے یا پن کی مدد سے کرید کر نکالنے کی کوشش نہ کریں۔

جانوروں کے کاٹے کا آسان علاج

جس جگہ کاٹے، چوہے کی راکھ پانی میں گھول کر لیپ کر دیں۔
جس جگہ کاٹے، نوشادر پانی میں گھول کر زخم پر لگائیں۔
جس جگہ کاٹے، پیاز پانی میں پیس کر لیپ کر دیں۔
جس جگہ کاٹے، کالے تل پانی میں پیس کر لیپ لگائیں۔
جس جگہ کاٹے، لہسن سرکہ میں پیس کر زخم پر لیپ کریں یا لال مرچ کے نیچہ آگ کی چھال شہد میں حل کر کے لیپ کریں۔
جس جگہ کاٹے، مردار رنگ و منک پانی میں پیس کر لیپ کر دیں۔
جس جگہ کاٹے، فوراً پیاز پیس کر پانی کے ساتھ لیپ کر دیں۔
جس جگہ جسم سے گزر جائے رسونت روغن گل میں حل کر کے لگا دیں۔
جس جگہ کاٹے، سوکھی ادک پانی میں پیس کر لیپ کر دیں۔

چھپکلی
گرگٹ
لومڑی
بلی
کتا
بندر
نیولا
مکڑی
چوہا



عربی

اردو

فارسی

English

Grafix: SOHAIB HA KHAN

eBook

چوبیسواں باب

الفائی حادثات اور ان کا فوری علاج

گلے میں کچھ پھنس جانا، چوکنگ (Choking)

بعض دفعہ سخت لقمہ یا بڈی یا سکہ یا پن پا کوئی اور چیز گلے میں پھنس جاتی ہے جس سے سخت کھانسی دسلی آتی ہے، اگر کوئی بڑی چیز پھنس جائے تو سانس رُک جانے کا سخت خطرہ ہوتا ہے۔

علاج :- فوراً حلق میں انگلی ڈال کر اور پھنسی ہوئی چیز کو ٹیڑھا کر کے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ نکلے تو اسے کھانسنے کی ہدایت کریں بعض دفعہ کھانسنے سے وہ چیز باہر نکل آتی ہے۔ زیادہ زور سے کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا یا بڈی پھنسی ہو تو رگ پکڑنے کی چوٹی سے پکڑ کر کھینچ لینا چاہیے۔ ایسا کرتے وقت جمحے سے زبان کو دبائے رکھنا چاہیے۔ اگر زیادہ تکلیف ہو تو مریض کو ہسپتال لے جانے کا مشورہ دیں، سانس کی تنگی ہو تو مصنوعی سانس جاری کریں۔

آگ سے جلنا، بزن (Burn)

دیکھیں آگ یا گرم پانی سے جلنا، اٹھارہواں باب جلد کی بیماریاں ————— صفحہ نمبر ۴۸۳

بجلی کا صدمہ، الیکٹرک سٹروک (Electric Stroke)

بجلی کے آلات چھو جانے کے خطرات سے اب عام لوگ واقف ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی حادثات ہوتے ہیں، اس سے سخت صدمہ

بے ہوشی اور موت ہو سکتی ہے۔

علاج :- سب سے ضروری یہ ہے کہ بجلی کی رو کو بند کر دیں، یعنی مین سوئچ بند کیا جائے۔ اگر اس سے دیری کا امکان ہو تو مددگار کو چاہیے، ربڑ کی بنی ہوئی چیز، خشک لکڑی، خشک گھاس، خشک کپڑے وغیرہ سے مریض کو تار سے علیحدہ کر دے، عام دھاتوں کو، تانبہ پیتل، گیلی لکڑی وغیرہ سے برقی رو نہایت آسانی سے گزر جاتی ہے۔ اور ٹھپڑانے والا خود لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اس لئے حادثہ کے وقت اپنے اوسان قائم رکھتے ہوئے مریض کو تار سے ان چیزوں سے ہی ٹھپڑانا چاہیے۔ جن میں بجلی کی رو اثر نہ کر سکتی ہو اور مددگار کو خشک چیز پر ہی کھڑے ہو کر اُسے بچانا چاہیے تاکہ اس کے اوپر بجلی کا اثر نہ پڑے، مذکورہ بالا طریق سے مریض کو بچا کر پھر بے ہوشی کا معمولی علاج کرنا چاہیے، اگر سانس رُک گیا ہو تو مصنوعی سانس جاری کریں اور جلد ہوئے مقامات پر ٹپی لگانی چاہیے۔

ہردیہ تشاد، ڈوبنا، ڈوب جانا، ڈروننگ (Drowning)

غرقی کو فوراً پیٹ کے بل ایک گدی یا تکیہ یا پتھر یا مٹی کے ڈلے پر لٹائیں اور پیٹھ پر دباؤ دیں تاکہ معدہ میں جو پانی ہے وہ خارج ہو کر ڈایا فرام پر سے دباؤ دور ہو جائے، منہ کھول کر کچھ دغیرہ صاف کر دیں اور زبان کو باہر کھینچیں تاکہ حنجرہ پر دباؤ نہ پڑے، جسم کو خشک کریں۔ مصنوعی حرارت پہنچائیں، یعنی بخلوں و رانوں میں گرم پانی کی بوتلیں رکھیں، فم معدہ کو گرمی پہنچانا بھی مفید ہے، امیونیا کارب ٹونگھائیں۔ مصنوعی سانس جاری کریں، جس کا ذکر تیسواں باب میں منشیات، زہریں اور اُن کے تریاق کے بارے میں دیا گیا ہے۔

زندگی بحال ہونے پر ذرا گرم چائے، برانڈی یا وِسکی بخورے گرم پانی میں ملا کر پیئیں، غرقی کے علاج میں دس یا بارہ گھنٹہ تک مصنوعی سانس جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ چند گھنٹوں کی ظاہری موت کے بعد ان کی زندگی واپس آ جاتی ہے، ہوش آنے پر علامات کے مطابق علاج کیا جائے۔

صدمہ، بے ہوشی، شاک (Shock)

دیکھیں کتاب ہذا آٹھواں باب، دل کی بیماریاں ————— مورچہ دار دگ، غشی۔

پالامارنا، فراسٹ بائیٹ (Frost-Bite)

سردی کھانا، جل بلینسرز (Chilblains)

علامات :- بچوں، بوڑھوں اور کمزور اشخاص میں سردی لگنے سے انگوٹھے، انگلیاں، ناک، کان وغیرہ سرخ اور سوج جاتے ہیں، کبھی کبھی مقام ماؤف میں سخت سوزش ہو کر دہاں کی جلد میں آبلے یا زخم پڑ جاتے ہیں۔

علاج :- سردی لگے عضو کو آہستہ آہستہ گرمی پہنچائی جائے، اگر اچانک گرمی پہنچائی جائے تو عضو ماؤف کے مردار پڑ جانے کا ڈر ہوتا

ہے سردی لگے عضو پر تیل تارپین کی نیم گرم مالش کریں۔ مریض کو تھوڑے وقفے سے چائے یا شوربہ پلائیں، سوئٹھ بار میک کر کے پانی کے ساتھ مناسب مقدار میں دیں، شہد چٹائیں، اگر مقام ماؤف پر آبلے یا زخم پڑ جائیں تو زینک آکسائیڈ یا بورک آکسائیڈ لگائیں۔

بجلی گزنا، لائٹ ننگ سٹروک (Lightning stroke)

جسم انسانی پر بجلی کا اثر مختلف ہوتا ہے، کبھی بجلی گرنے سے فوراً ہلاک ہو جاتا ہے، کبھی جسم پر داغ بھی نہیں پڑتا اور کبھی جلد و بال وغیرہ جل جاتے ہیں اور جلد پر چھالے پڑ جاتے ہیں اور کبھی مریض کے ہوش دھواں میں فرق آ جاتا ہے، بعض اشخاص محض بجلی کی زوردار کڑک اور چمک سے ڈر کر بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں اور کمزور حاملہ عورتوں کا حمل گر جاتا ہے۔

علاج :- بطور حفظ مآل قدم جب بجلی چمکتی ہو تو کسی اونچے مکان پر نہ چڑھیں اور نہ ہی اونچے درخت پر چڑھیں، لوہے کی کوئی شے مثلاً چاقو، چابیاں یا چھاتہ وغیرہ پاس نہ رکھیں، بجلی سے مکان کی حفاظت کے لئے ان میں لوہے وغیرہ کی میخ لگا دیتے ہیں، جس کے ذریعے بجلی زمین میں چلی جاتی ہے، اگر بجلی گرنے سے جسم جل جائے یا جسم جل بھن گیا ہو تو کوئی علاج نہیں۔ ہاں اگر زندگی کے آثار موجود ہوں، تو صحت ہو جاتی ہے، جلے ہوئے مقام پر آگ سے جلنا (برن) کے مطابق علاج کریں، مریض بے ہوش ہو تو مصنوعی سانس جاری کریں اور محرکات دیں۔

کچلا جانا، کن ٹیوژن

تعریف مرض :- اس قسم کی چوٹ میں جلد عام طور پر زخمی نہیں ہوا کرتی، بلکہ اس کے نیچے خون جمع ہو جاتا ہے۔

وجوہات :- لکڑی کی ضرب، دروازے وغیرہ میں ہاتھ پھنسا جانا، پاؤں یا ٹانگ کا گاڑی وغیرہ کے نیچے آ جانا یا کسی حصہ جسم کا کسی

اور طرح سے دب جانا وغیرہ۔

علامات :- چوٹ والی جگہ پر معمولی درد ہوتا ہے، اگر جائے مضروب کی جلد کے نیچے خون جمع ہو جائے تو جلد کی رنگت پہلے خاکستری

پھر نیلی اور آخر میں زرد ہو جاتی ہے، آٹھ دس دن بعد خون جذب ہو کر مقام مضروب اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے۔

علاج :- جب کسی شخص کو چوٹ لگے تو آرام سے بستر پر لٹا دینا چاہیے۔ اگر سر پر چوٹ لگی ہو اور موسم گرمی کا ہو تو بال اتار داکر

اس پر برف رکھنی چاہیے یا برف کے پانی سے رومال تر کر کے رکھنا چاہیے، موسم سرما ہو تو گرم کپل میں پیٹنا چاہیے اور اس کی بنیاد

اور رانوں میں گرم پانی کی بوتلیں رکھنی چاہئیں۔ اگر سینے پر چوٹ لگے تو مضروب کو ماؤف پہلو پر لٹائیں۔ تاکہ اس طرف کی حرکات رک جائیں

اور دوسری طرف کا پیچھے آسانی سے کام کر سکے۔

جب پیٹ پر چوٹ لگے تو مریض کو چٹ لٹانا چاہیے اور اس کے گھٹنوں کے نیچے تکیے رکھ کر اس کی رانوں کو پیٹ کی طرف جھکا دے

چاہیے۔ اس طرح پیٹ کے عضلات ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور مریض کو آرام پہنچتا ہے، مریض کو سیال غذا دینی چاہیے، اگر ہاتھ یا کلاں

پر چوٹ لگے تو کلائی وغیرہ کو رومال کے ذریعہ باندھ کر گردن میں ڈال لینا چاہیے۔ اگر پاؤں یا ٹانگ مضروب ہو، تو اس کے نیچے تکیے

وغیرہ رکھ کر اس کو سر کے برابر یا اس سے بھی اونچا رکھنا چاہیے۔ تاکہ وہاں پر زیادہ خون اکٹھا ہو کر سوجن یا ورم نہ ہو جائے۔

مقام ضرب پر سردی پہنچائیں، سرد پانی یا سرکہ ملا کر ان میں سے کسی ایک میں کپڑا تر کر کے مقام ضرب

پر لپیٹ دیں، اگر مواد پڑ جائے تو پھوڑے کی طرح علاج کریں۔ روغن زیتون میں قدسے منک ملا کر کچلے ہوئے مقام پر لگانا مفید ہے، پھوڑے ہوئے مقام کو جہاں خون اکٹھا ہو، چیرا ہرگز نہ دینا چاہیے بلکہ اکثر علاج سے خون جذب ہو جاتا ہے، اگر بڑی وغیرہ ٹوٹ جائے تو اس کے مطابق علاج کرنا چاہیے اور مریض کو کسی اچھے ہسپتال میں داخل کرانا چاہیے۔ اگر گھاؤ یا پھوڑا بن جائے تو اس کے مطابق علاج کریں، دیکھیں کتاب ہذا ۱۸ واں باب، جلد کی بیماریاں (گھاؤ، زخم کا بیان)۔

سوئی یا آئیل پن کا اندر چلے جانا

سوئی یا آئیل پن یا کیل اندر چلے جانے کی صورت میں تین چار کیلے کھلائیں۔ اس طرح پاخانہ میں کیل یا سوئی نکل جائے گی، مریض کو پانی یا چائے نہ دیں، پنا آپریشن آزمودہ علاج ہے۔

پریکٹس کنسلٹے ادویات کی تیاری کے سلسلہ میں مفید ہدایات

- ۱۔ جہاں ادویات سفوف کرنی ہوں۔ باریک سفوف کی جائیں اور ململ کے کپڑے سے چھان لیں یا باریک عالی کی چھلنی سے چھان لیں۔ اگر سفوف موٹا رکھنے کی ہدایت ہو تو نہ تو اسے ململ کے کپڑے سے چھانیں اور نہ ہی عالی کی چھلنی سے چھانیں۔ دوائیں نسخہ کی ہدایات کے مطابق ہی تیار کی جائیں۔
- ۲۔ اگر ادویات کو پانی میں بھگو کر جوش لینے کی ہدایت ہو تو جیسے ہی اُبال آئے برتن کو آگ پر سے اتار لیں۔ دس منٹ رکھ کر چھان لیں اور ادھ گرم ہی استعمال کرائیں۔ اگر ادویات کو پانی میں جوش دے کر ادھ باقی رہنے کی ہدایت ہو تو برتن کو درمیانہ درجہ کی آگ پر رکھیں۔ اتنی آگ دیں کہ باقی نصف پانی رہ جائے اور بقیہ پانی خشک ہو جائے۔
- ۳۔ اگر ادویات سفوف بنانی ہوں اور ان میں چینی ملائی ہو تو پہلے سفوف کر کے پھر چینی ملائی جائے۔ اگر شکر ملائی ہو تو اس کی جگہ چینی ملائی جائے کیونکہ چینی بدرجہا بہتر ہے۔
- ۴۔ کئی ادویات ۱۲ گھنٹے (رات بھر) تر رکھنی ہوتی ہیں۔ اگر فوری ضرورت ہو تو موسم گرمی میں ۴ گھنٹے اور موسم سرما میں ۶ گھنٹے بھگونے کے بعد استعمال میں لانی چاہئیں۔
- ۵۔ ادویات اگر برابر وزن یعنی ہوں تو ترازو یا کانٹے پر برابر برابر وزن تول کر استعمال میں لانی جائیں۔
- ۶۔ اگر ادویات گرم جوشاندہ کی صورت میں پی ہوں تو اوپر سے ٹھنڈا پانی یا برف لگی سوڈا کی بوتل استعمال میں نہیں لانی چاہیے۔
- ۷۔ اگر ادویات جوشاندہ ہیں تو ہر خوراک کے لئے تازہ جوشاندہ تیار کریں۔ دوائیں دھوپ میں یا گرم جگہ پر نہ رکھیں۔ تاکہ پورا فائدہ حاصل ہو سکے۔
- ۸۔ ادویات ڈھکن والے برتن میں رکھیں، اگر سفوف ہے تو اسے مٹی سے محفوظ رکھیں۔
- ۹۔ اگر ادویات باہر کے استعمال کے لئے ہیں تو ان پر صاف لکھا ہو کہ "بیرونی استعمال کے لئے" تاکہ غلطی کا امکان نہ رہے۔



پچھیسواں باب

استعمال آلات ڈاکٹری برائے معاینہ علاج الامراض

تشخیص مرض کے لئے موجودہ وقت کے آلات سے ہر طبیب و وید کا دائق ہونا نہایت ہی ضروری ہے ذیل میں ان طبی و ڈاکٹری آلات کا بیان دیا گیا ہے جو موجودہ وقت میں تشخیص مرض کے لئے کام میں لائے جا رہے ہیں:-

- | | |
|--|---|
| ۱۔ بلڈ پریشر معلوم کرنے کا طریقہ ————— دیکھیں آکھواں باب | ۶۔ بلغم کی خوردبینی جانچ کا طریقہ ————— دیکھیں ساتواں باب |
| ۲۔ انیما یعنی حقنہ کرنے کا طریقہ ————— دیکھیں نواں باب | ۷۔ مقررہ میٹر دیکھنے کا طریقہ ————— دیکھیں بیسواں باب |
| ۳۔ کیسٹھی ٹر کا استعمال ————— دیکھیں بارہواں باب | ۸۔ ٹامک ٹیوب استعمال کرنے کا طریقہ ————— دیکھیں تیسواں باب |
| ۴۔ سوزاک میں پچکاری کا طریقہ ————— دیکھیں اکیسواں باب | ۹۔ ویرج کا خوردبین سے امتحان ————— دیکھیں تیرہواں باب |
| ۵۔ ویجائیل ڈوش کرنے کا طریقہ ————— دیکھیں سولہواں باب | ۱۰۔ فیسیلی پلاننگ آلات استعمال کرنے کے طریقے ————— دیکھیں سولہواں باب |

مُخَشک گلاس لگانا

بعض اوقات درد گردہ، نمونیہ اور کمردرد کے لئے سینے یا کمر یا پیٹ پر خشک گلاس لگانا فوری فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اس سلسلہ میں مختلف سائز کے گلاس مارکیٹ میں پختے ہیں جنہیں کیپنگ گلاس کہتے ہیں جو عام طور پر تین سائز کے ہوتے ہیں اگر کیپنگ گلاس نہ ملے تو عام گلاس سے بھی کام نکالا جاسکتا ہے، لیکن اس کے کنارے موٹے ہوں، ورنہ گلاس کے پھٹنے یا زخم ہو جانے کا خطرہ ہے۔

گلاس لگانے کی ترکیب یہ ہے :-

مقام ماؤف کو گرم پانی اور صابن سے دھو کر خشک کر لیں، پھر کسی باریک لکڑی کے سرے پر مقوڑی سی روئی پٹیٹ کر اسے پیچھی لیٹیہ پٹ سے بھگو کر اور استعمال سے پہلے گلاس کے اندر پٹ مل کر پھیری کو آگ لگا کر گلاس میں رکھیں۔ پٹ ملی ہونے کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے اب اسے اٹھا کر کے مقام ماؤف پر رکھیں، اس کے سر ہوتے ہی گلاس کے کنارے اور جلد کے درمیان انگلی کا ناخن داخل کر کے گلاس کو دھبلا کر کے اتار لیں۔ گلاس اتارنے کے بعد ابھرے مقام پر ویزلین لگا دیں، مقوڑی دیر بعد یہ مقام اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا۔

دیہاتوں میں اب بھی سینگیاں اور کوزے لٹائے جانے کا رواج ہے۔ کوزے لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مٹی کے کوزے میں بان ڈال کر جلایا جاتا ہے۔ جس سے مریض کے بل جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور سینگیاں منہ سے ہوا کیسیخ کر لگائی جاتی ہیں۔

اُسے تھکوپ کے استعمال کرنیکا طریقہ

یہ دل و پیپھڑوں وغیرہ کے دیکھنے کا آلہ ہوتا ہے اور فی زمانہ ہر حکیم و میڈیڈاکٹر اسے استعمال میں لاتا ہے، اس کے استعمال سے پہلے انسانی اعضا کی بناوٹ کا پورا علم ہونا ضروری ہے۔

ہر تندرست انسان کو سانس ایک منٹ میں اٹھارہ بار آتا ہے۔ اور پیپھڑے کے پھیلنے و سکڑنے کی علامت ہوتی ہے اور اسٹیتسکو سے سینہ کی بیماریوں کا بخوبی علم ہو سکتا ہے، کیونکہ صحت کی حالت میں یہ آوازیں بالکل صاف ہوتی ہیں۔ پیپھڑوں کی بل (راج یکھشما) میں اس کے لگنے سے کانوں میں ٹوٹے ہوئے گھڑے کی آوازیں آتی ہیں۔ ہوا کی نالیاں پھیلی ہوں تو آواز تیز اور بھاری ہوتی ہے۔ اگر پیپھڑوں میں بھگم کافی مقدار میں ہو تو ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے کسی ٹیوب میں پکنا ہٹ ہو اور اس میں پھونک ماری جائے۔

منویہ کی حالت میں پیپھڑے کے درم کی وجہ سے ایک خاص قسم کی بھاری آواز چنگھاہٹ کے ساتھ سنائی دیتی ہے جیسے تنگ مانی میں پھونک مارنے سے آواز آتی ہے اور پیپھڑوں کے درم کی وجہ سے بھاری آواز آتی ہے، مرض کے شروع میں چرچراہٹ کی آواز آتی ہے اگر پیپھڑے میں پانی بھر گیا ہو تو پیپھڑے تنگی کی وجہ سے سکڑ جاتا ہے اور سینہ کو کھٹو کئے سے آواز سنائی دیتی ہے اور اس آلہ سے معمولی آواز سنائی دیتی ہے۔ اگر پیپھڑے ہوا بھرنے سے پھیل گیا ہو تو سانس نکالنے کی حالت میں یا سانس لینے کی حالت کے مقابلہ میں زیادہ سنائی دیتی ہے۔

دل کی حالت جانچ کرنے کے لئے معالج کو چاہیے کہ پہلے تندرست مریض کے دل کی آوازوں کو بخوبی ذہن نشین کرے کیونکہ مرض کی حالت میں بعض دفعہ دل کی آوازیں دگنی ہو جاتی ہیں۔ اگر دل کی کواڑیوں میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو ایک خاص قسم کی آواز آتی ہے جسے کارڈیک مرمر کہتے ہیں۔ اسی طرح سوجن والی جگہ کا پتہ بھی لگایا جاسکتا ہے، تندرست دل کی آواز کے ساتھ بیمار دل کی آواز کا مقابلہ کرنے سے بخوبی دل کی تیزی یا آہستگی معلوم کی جاسکتی ہے۔

سقموگراف

یہ آلہ نبض کی حرکت کا گراف بنا دیتا ہے، یعنی کاغذ پر کھد دیتا ہے۔ یہ آلہ نبض پر لگایا جاتا ہے اور کاغذ پر نبض کی رفتار کا خاکہ بن جاتا

ہے۔ اس سے دل کی بیماریوں کے معلوم کرنے میں مدد ملتی ہے۔

ایکسرے X-RAY

یہ زمانہ جدید کی ایجاد ہے۔ ایکسرے فوٹو اندرونی بیماریوں اور ہڈیوں کے ٹوٹنے پھوٹنے کی حالت میں تشخیص میں معاون ہے۔ علاوہ ازیں کوئی بچہ سوئی یا پن یا سکہ نگل جائے تو اس کی موجودگی معلوم کرنے کے لئے ایکسرے کی مدد سے جانچ کی جاسکتی ہے۔

جلدی، عضلاتی اور وزیدی انجکشن

بعض حالتوں میں زیر جلد یا زیر عضلات یا وزیدی کے اندر دوائی پہنچائی جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں ہائپوڈرمک سرنج شیشہ کا بنا ہوا سب سے اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔ سوئی کی نوک تیز ہونی چاہیے تاکہ لگاتے وقت مریض کو درد معلوم نہ ہو، ٹیکہ لگانے سے پہلے پچکاری کو اگر شیشہ کی بوتل سے گرد روئی لپیٹ کر پانی میں ڈبو کر سپرٹ لمپ پر جوش دینا چاہیے، جب اچھی طرح صاف ہو جائے اور چھوت کا خطرہ نہ ہے، تو جلدی پچکاری ایسے مقام پر کی جائے جہاں گوشت ہو اور حس کم ہو، سب سے بہتر جگہ بازو کے درمیان میں باہر کی طرف ہے اس جگہ کو صابن سے دھو کر وہاں پر روئی کے پھایہ سے سپرٹ رکھی فائیڈ یا سپرٹ میٹھی لیٹیڈ رکڑ دیں، پھر بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیوں اور انگوٹھے سے جلد کو کچڑ کر قدرے اونچا رکھیں اور سوئی کی نوک سطح جلد کے متوازی ادھا پنچ کے قریب اندر داخل کریں اور سیال دوا کو آہستگی کے ساتھ داخل کریں، ٹیکہ کر چکنے کے بعد سوئی نکال کر سپرٹ کا پھایہ رکھ کر ذرا دبا دیں اور پھر ذرا سا مسل دیں، پچکاری کرتے وقت دھیان رکھیں، کہ سوئی کسی شریان میں نہ چلی جائے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ٹیکہ لگاتے وقت ذرا پیچھے کھینچ لیں، اگر شریان میں ہوگا تو خون آجائے گا، ورنہ نہیں اگر خون آجائے تو پھر دوسری جگہ داخل کرنا چاہیے۔

عضلاتی انجکشن :- اگر دوا کی مقدار زیادہ ہو تو سرین کے بیرونی اور بالائی حصہ میں چوڑے کے درمیانی عضو کے اُس مقام پر انجکشن کیا جاتا ہے، جہاں بڑا عضلہ ہوتا ہے، یہ جگہ انٹر اسکولر انجکشن کے لئے نہایت بہترین جگہ ہے۔ اگر صحیح مقام پر سرین کے بڑے عضلے میں ٹیکہ بجائے زیریں اور اندرونی ربع میں سوئی داخل کی جائے تو در کی عصب زخمی ہو سکتا ہے، صحیح جگہ سے اعصاب کو کبھی نقصان نہیں پہنچتا۔

وزیدی انجکشن :- بعض خراش کرنے والی ادویہ جیسے نلکھیا، پارہ کے مرکبات بذریعہ وزیدی انجکشن دیئے جاتے ہیں، کیونکہ یہ دوائیں جلد میں سو جن یا پھوڑے پھنسی پیدا کر دیتی ہیں، وزیدی انجکشن کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ زیادہ مقدار میں ادویات داخل کر سکتے ہیں وزیدی انجکشن ایک مستند ڈاکٹری کر سکتا ہے جسے عملی تجربہ ہو، ورنہ یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اس لئے اسے عملی طور پر پوری تربیت حاصل کئے بغیر نہ لگانا چاہیے، تفصیل کے لئے دیکھیں کتاب انجکشن ایکٹ مصنفہ ڈاکٹر بری چند ملتان۔

یورینومیٹر (URINO-METER)

اس کے ذریعہ پیشاب کا وزن مخصوص یعنی گرام فی سی سی اور پتلا پن معلوم کیا جاسکتا ہے، اس کے لئے پیشاب نلی کے اندر ڈال دیا جاتا

ہے۔ اس کے بعد اس کو آہستہ سے اس میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب پیشاب کی سطح پر آلہ کا نشان دیکھ لیا جاتا ہے، جو نشان ہو، وہی قارورہ کا وزن ہے۔

پیشاب کا قدرتی وزن عموماً ۱۰۱۵ سے ۱۰۲۵ اٹک ہوتا ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کا وزن ۱۰۴۰ سے ۱۰۴۵ اٹک، اور خاص حالتوں میں ۱۰۷۵ اٹک چلا جاتا ہے اور ایسا پیشاب میں شکر کی زیادتی یا کمی پر منحصر ہے۔ یہ آلہ ہر ایک سرجیکل سٹور سے مل جاتا ہے۔

پیشاب کی جانچ: تشخیص امراض میں پیشاب کے امتحان کو جو فوقیت حاصل ہے وہ بیان نہیں کی جاسکتی، امتحان کے لئے عام طور پر وہ پیشاب لینا چاہیئے جو رات بھر مثانہ میں جمع رہا ہو۔ وقتی معاینہ کے لئے کسی وقت کے پیشاب کا معاینہ کیا جاسکتا ہے۔

پیشاب کا امتحان تین طرح سے کیا جاتا ہے:-

۱۔ نظری امتحان، ۲۔ کیمیائی امتحان، ۳۔ خوردبینی امتحان۔

۱۔ **نظری امتحان (Physicalexamination):** اس امتحان کے دوران میں پیشاب کا مندرجہ ذیل باتوں کا پتہ لگایا جاتا ہے:-

(A) رنگ:- پیشاب کے مختلف رنگ مختلف علامات کو ظاہر کرتے ہیں، مثال کے طور پر:-

پیشاب کی زردی:- غلبہ حرارت و صفرا، یرقان، بخار، پھتری گردہ و مثانہ ظاہر کرتی ہے۔

پیشاب کی سرخی:- خونی پیشاب، قوئج، جگر کی بیماریاں، فالج وغیرہ ظاہر کرتی ہے۔

پیشاب کی سفیدی:- خرابی ہضم، پیپ، مثانہ کے زخم، غلبہ برودت و بلغم ظاہر کرتی ہے۔

پیشاب کی سیاہی:- یرقان (اسود)، خونی پیشاب، بخار، امراض خونی اور تلی کے امراض کو ظاہر کرتی ہے۔

تندرستی کی حالت میں پیشاب کی حالت ہلکی زرد ہوتی ہے۔ اور ایک تندرست شخص کو ۴۰ سے ۶۰ اونس تک پیشاب آتا ہے۔


عورتوں میں اس سے کسی قدر کم، کم کھانے کم پینے، سردی لگنے سے کسی قدر مقدار بڑھ جاتی ہے، ورزش کرنے و زیادہ پسینہ کی حالت میں پیشاب کی مقدار کم ہو جاتی ہے، اسی طرح بعض امراض میں پیشاب کم اور بعض میں زیادہ آتا ہے۔

(B) بو:- تندرستی کی حالت میں پیشاب میں ایک خاص قسم کی بو پائی جاتی ہے، لیکن کچھ عرصہ تک پیشاب پڑا ہے تو اس میں نوشادر جیسی بو پیدا ہو جاتی ہے۔ قارورہ میں نوشادر جیسی بو پیشاب کی نالی کے امراض اور دم مثانہ پر دلالت کرتی ہے اور پھل جیسی خوشبو ایسی ٹون کی موجودگی بتلاتی ہے۔

(C) ظاہری حالت:- صحت کی حالت میں پیشاب صاف، شفاف ہوتا ہے، لیکن حالات مرض میں کسی قدر گدلاہٹ ہوتی ہے۔

(D) وزن:- تندرستی کی حالت میں پیشاب کا وزن ۱۰۱۵ سے ۱۰۲۵ اٹک ہوتا ہے۔ اگر وزن مخصوص ۱۰۳۰ سے زائد ہو تو ذیابیطس کا شبہ ہوتا ہے، جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔

(E) رسوب:- تندرستی کی حالت میں عام طور پر کسی قسم کی پلیمینٹ نہیں ہوتی، لیکن جگر یا گردہ کے فعل میں خرابی ہو تو مختلف قسم کے رسوب تشکیل ہو جاتے ہیں۔ بھورے رنگ کے رسوب قارورہ میں یورٹیس کی موجودگی بتاتے ہیں۔ سفید رنگ کے تیرتے ہوئے رسوب فاسفیٹ یا کسی قدر سیاہ رسوب آگزیٹ کو ظاہر کرتے ہیں، سرخ رنگ کی پلیمینٹ یورک ایسڈ پر دلالت کرتی ہے۔



۲۔ پیشاب کا کیمیائی امتحان :- پیشاب کی جانچ میں مندرجہ ذیل باتوں کو سامنے رکھیں :-

(A) رد عمل (Re-Action) :- اگر پیشاب میں سُرخ لٹمس پیپر (Litmus Paper) ڈالا جائے اور وہ نیلا ہو جائے۔ تو اس کا رد عمل کھارا (الکلائن) ہے، جو مثلاً نہ کی سو جن ظاہر کرتا ہے، اگر نیلا لٹمس پیپر ڈالا جائے اور وہ سُرخ ہو جائے تو پیشاب کا رد عمل ترش (ایسڈ) ہے، جو جوڑوں کے درد، ہاضمہ کی خرابی اور بخاروں کو ظاہر کرتا ہے۔ قدرتی حالت میں پیشاب کا رد عمل ۲۴ گھنٹہ تک ہلکا ترش ہوتا ہے، اگر زیادہ دیر کھلا پڑا رہے تو کھاری اور گدلا ہو جاتا ہے اور اس میں نوشادر جیسی بو آنے لگتی ہے۔

(B) یوریک اس (Urates) :- اگر پیشاب کی گدلاہٹ امتحانی نلی (ٹیسٹ ٹیوب) میں گرم کرنے سے دور ہو جائے تو اس سے ظاہر ہوگا کہ اس میں یوریک اس موجود ہیں اور اگر اس طریقہ سے گدلاہٹ نہ ہو تو اس سے ظاہر ہے کہ پیشاب میں آگزیلیٹ یا فاسفیٹ موجود ہے۔

(C) فاسفیٹس (Phosphates) :- امتحانی نلی میں تقریباً ایک انچ پیشاب لے کر اس میں چند قطرے تیزاب مرکب (ایسٹک ایسڈ) کے ڈال دیں۔ اگر گدلاہٹ دور ہو جائے تو فاسفیٹ موجود ہیں جو آنتوں کے امراض اور حاملہ کی قے پر دلالت کریں گے، لیکن اگر تیزاب کے قطرے حل ہوتے وقت سوڈا وائپر کی طرح جوش پیدا ہو تو پیشاب میں کاربونیٹ موجود ہیں۔

(D) ایلبیومن (Albumin) :- ایک ٹیسٹ ٹیوب میں نائٹریک ایسڈ دوسری سی ڈال دیں۔ اب اس ٹیوب کو ٹیڑھا پکڑ کر آہستگی سے دو انچ تک پیشاب ڈال دیں کہ وہ ٹیسٹ ٹیوب سے گزرتا ہوا نائٹریک ایسڈ کے اوپر تیرنے لگے، اگر تیزاب اور پیشاب کے ملنے کے مقام پر ایک سفید رنگ کا غیر شفاف چھلکا دکھائی دے تو ایلبیومن موجود ہے۔ جو خونی پیشاب، ورم جگر پُرانا، جوڑوں کے درد اور متعدی بخاروں اور بعض سمیات پر دلالت کرتا ہے۔

(E) شکر کا امتحان :- شکر کی جانچ کے دو طریقے درج ذیل ہیں :-

۱۔ بینی ڈکٹ ٹیسٹ (Bene Diet Test) :- ایک ٹیسٹ ٹیوب میں لگ بھگ دوسری بینی ڈکٹ گھول لے کر سپرٹ لیمپ پر گرم کر کے چند قطرے پیشاب کے ڈال دیں۔ اگر پیشاب کا رنگ گہری طرح سُرخ ہو جائے تو شوگر ہے ورنہ نہیں۔

۲۔ فہلنگ ٹیسٹ (Fehling Test) :- ٹیسٹ ٹیوب میں فہلنگ لٹمس نمبر ۱ و نمبر ۲ برابر لے کر ایک انچ تک بھر دیں اور سپرٹ لیمپ پر مقوی دیر کے لئے گرم کریں، پھر مقوڑا سا پیشاب ڈال کر پھر گرم کریں۔ اگر شکر ہوگی تو سُرخ یا نارنجی رنگ کا مادہ نیچے بیٹھ جائے گا۔ پیشاب میں شکر کی موجودگی زیادہ تر شکر کی علامت ہے۔ نیا طریقہ "یوری ٹیکس" سے جانچ ہے صبح کے پیشاب میں ایک قلم ڈال کر شوگر کی دو منٹ میں مکمل جانچ کی جاسکتی ہے۔

ایسی ٹون (Acetone) :- ٹیسٹ ٹیوب میں دس سی سی پیشاب لے کر اس میں امیونیم کلورائیڈ (قلبی شورہ) اس قدر ڈالیں کہ مزید حل نہ ہو سکے۔ اس میں دس فیصدی طاقت کے نائٹرو پروسائیڈ گھول کے چند قطرے ڈالیں۔ پھر دوسری سی لائیکوار امیونیا سٹرنگ ٹیسٹ ٹیوب کی دیوار سے گزرتا ہوا ملائیں۔ اگر ملنے کے مقام پر سفیدی رنگ کا گھیرا بن جائے تو ایسی ٹون موجود ہے، جو ذیابیطس، کلوروفارم کے زہر زچہ کی امینٹن اور بعض قسم کے بخارات پر دلالت کرتے ہیں۔

بایل (صفرا) :- پیشاب صفرا کی موجودگی کی حالت میں اس کا رنگ سبزی مائل گہرا زرد ہوتا ہے اور اس میں کسی قدر غلاظت ہوتی ہے یہ یرقان، جگر کی خرابی، ملیریا اور تیز بخاروں پر دلالت کرتا ہے۔

انڈی کن (Indican) :- ٹیسٹ ٹیوب میں پیشاب، ہائیڈروکلورک ایسڈ برابر اور مقوڑا سا پوٹاسیم کلورائیڈ ڈال دیں، پھر کسی قدر کلوروفارم ملائیں اور علی کو ہلا دیں، کلوروفارم کا رنگ بھنشی ہو جائے گا، جو آنتوں کے سڈہ، پُرانی قبض، جگر کے امراض، ورم معدہ اور گردہ کو ظاہر کرتا ہے۔


خون :- پیشاب میں خون کی ملاوٹ۔ درد گردہ، پتھری گردہ، شدید ورم گردہ، بلیک واٹر بخار، شدید متعدی بخار، سوزاک، تاربین اور کنٹھریڈیز و نو کے زہروں پر دلالت کرتا ہے۔

پریپ :- پیشاب میں پریپ کی موجودگی اس کے رنگ کو گدلا دیتی ہے، علاوہ ازیں پیشاب میں پریپ سے یہ لیس دار اور غلیظ ہو جاتا ہے، اگر پریپ زیادہ ہو تو سریش کی طرح نیچے جم جاتا ہے، خوردبین سے پریپ کے ذرات بخوبی دیکھے جاسکتے ہیں، پیشاب میں پریپ کی موجودگی، مثانہ کے ورم، پیشاب کی نالی کا ورم اور سوزاک وغیرہ پر دلالت کرتی ہے۔

۳۔ پیشاب کی خوردبینی جانچ :- خوردبینی جانچ سے پیشاب میں یورک ایسڈ اور دیگر پیشاب کے نمکیات کی قلیں، خون کے پکسے، روغنی ذرات، جراثیم وغیرہ دیکھے جاسکتے ہیں، تفصیل کے لئے دیکھیں کتاب "لیبارٹری میٹھیڈز" مصنف حکیم ڈاکٹر ہری چند ملتان۔

تاج الحکمت (پریکٹس آف میڈسین) کے مصنف حکیم و ڈاکٹر ہری چند ملتان پانی پت کو

سونے کے تمغے و خطاب دیئے گئے



۱۔ ۱۹۵۲ء میں پنجاب پرانت طبی کانگریس جالندھر کے سالانہ جلسہ میں لیاقت اور طبی خدمات کے صلہ میں آنریبل ڈاکٹر ستیہ پال صاحب سپیکر پنجاب اسمبلی کے دست مبارک سے سونے کا تمغہ دیا گیا۔

۲۔ ۱۹۵۲ء میں سیٹھو طبی کانفرنس پٹیالہ کے سالانہ جلسہ میں یونانی، یور ویدک علاج کی ریسرچ و خدمات کے صلہ میں پرنسپل حکیم عبدالحسین صاحب کے دست مبارک سے "استاد الاطباء" کا اعزازی خطاب دیا گیا۔

۳۔ ۱۹۶۳ء میں پنجاب پرانت میڈیکل ایڈیٹرز کانفرنس لدھیانہ کے سالانہ جلسہ میں امراض نسوان کے علاج پر سب سے بہتر آرٹیکل لکھنے پر لیاقت و میڈیکل خدمات کے صلہ میں کانفرنس کے پریزیڈنٹ حکیم بہاری لال خاں کے دست مبارک سے "میڈیکل رائٹر گولڈ میڈل" دیا گیا۔

۴۔ ۱۹۶۳ء میں آل انڈیا اردو سماں نیوز پیپرز ایڈیٹرز کانسل نیو دہلی کی طرف سے اردو زبان کی خدمات کے صلہ میں آنریبل آپ راشٹری ہندوستان شری جی ایس پانٹھک کے دست مبارک سے آپ راشٹری بھون میں "فخر اردو" اعزاز سے عزت افزائی کی گئی۔

آپ کئی طبی، صحتی و جنسی کتب لکھ چکے ہیں اور مشہور اردو طبی ماہنامہ نرالا جوگی پانی پت اور ہندی ایور ویدک ماسک نرالا جوگی پانی پت کے چیف ایڈیٹر ہیں، آپ کی لکھی گئی طبی کتب ہندوستان کے مشہور ایور ویدک یونانی کالجوں میں لگی ہوئی ہیں اور میڈیکل کالجوں کے طالب علم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔



چھ سو سال باب

گورنمنٹ ہسپتالوں میں مروج فارماکوپیا

ہر باب میں ہر بیماری کے علاج میں ہندوستان و انگلستان کے مختلف سرکاری ہسپتالوں میں مروج فارماکوپیا کے ساتھ نسخہ جات دیئے گئے ہیں۔ پھر بھی ناظرین کی معلومات کے لئے پنجاب و ہریانہ کے سرکاری ہسپتالوں میں مروج مکمل فارماکوپیا درج ذیل ہے۔ ان میں مقدار خوراک جو دی گئی ہے۔ یہ جوان آدمی کے لئے ہے بچوں کو بلحاظ عمر استعمال کرائی جائے! ملتان

(پہلا حصہ) مکسچر ہائے

ایک اونس تک
واٹر
مچھلی کے تیل کا امیلسن ہے جنرل طاقت بڑھانے، ریل
دق اور سینہ کی بیماریوں کے لئے مفید ہے۔

۲۔ کاڈلور آئیل امیشن وڈ آرن

۱۔ کاڈلور آئیل امیشن

۱ ڈرام
۳ منم
۱۵ گرین

کاڈلور آئیل
آئیل سناسوم
پاؤڈر ایشیا

موسمی بخار (ملیریا) ورم طحال اور کمزوری جگر کے لئے ازمد
مفید ہے۔

۶۔ آئرن مکسچر

فرائی ایٹ امونیا سائٹراس ۳۰ گریں
شربت سادہ ۱ ڈرام
پیرپرنٹ وائر (عرق پودینہ) تا ایک اونس
کمی خون کے لئے نہایت مفید ہے۔ عمدہ سرخ خون پیدا
ہوتا ہے۔ بازاری شربت فولاد کی نسبت بدرجہا بہتر ہے۔

۷۔ فیرس سلف مکسچر

فیرس سلف ۵ گریں
شربت سادہ ۱ ڈرام
پیرپرنٹ وائر (عرق پودینہ) تا ایک اونس
کمی خون کے لئے نہایت فائدہ مند ہے۔

۸۔ ڈایا فورٹیک مکسچر

پوٹاسیم سائٹریٹ ۲۰ گریں
سپرٹ ابھتر نائٹروسائی ۲۰ منم
ڈائیلوٹ سالیوشن
امونیا ایسیٹاس ۱ ڈرام
پانی تا ایک اونس
بخاروں کو ہلکا کرنے کے لئے مکسچر ہے، کمزور مریضوں کو
نصف خوراک دیں۔

۹۔ سوڈا سلیٹ مکسچر

سوڈا سلیٹ ۲۰ گریں
سوڈا بائیکارب ۲۰ گریں
لکویڈ ایکسٹریکٹ لکورس ۱۵ منم

کاڈور آئیل
آئیل سنا موم
فرائی ایٹ امونیا سائٹراس
پوڈراکیشیا
پانی
ایک اونس تک

یہ بھی کاڈور آئیل امیشن کی طرح جنرل کمزوری میں مفید
ہے، کمی خون کے لئے فائدہ مند ہے۔

۳۔ ٹیٹراکلورائیٹھالین امیشن

ٹیٹراکلورائیٹھالین ۴۵ منم
فرائی سلفاس ۵ گریں
ڈائیلوٹ سلفیورک ایڈ ۵ منم
میگنیشیا سلفاس ۱ ڈرام
پانی
ایک اونس تک
پیٹ سے ورم نکالنے کے لئے مفید ہے۔

۴۔ کونین مکسچر

کونین سلفاس
ڈائیلوٹ سلفیورک ایڈ
میگنیشیا سلفاس
کلوروفارم وائر
ملیرائی بخاروں کے لئے مفید مکسچر ہے۔

۵۔ آئرن کونین مکسچر

کونین سلفیٹ
فرائی سلفیٹ
میگ سلفیٹ
ڈائیلوٹ سلفیورک ایڈ
پانی
۵ گریں
۵ گریں
۱ ڈرام
۵ منم
ایک اونس تک

پانی
گنٹھیا وجوڑوں کے دردوں کے لئے مفید ہے کمزور مریضوں
کو نصف مقدار میں دیں۔

۱۰۔ بستمہ و چاک مکسچر

بستمہ کرب ۳۰ گرین
کیلیم کرب ۳۰ گرین
ٹراکالکانتھ ۴ گرین

کلوروفارم وارٹر ۳۰ ایک اونس

(نوٹ) ۱۔ ضرورت کے مطابق ٹینکچر اوپیم
۵ منم ڈینکچر کیٹی کو ۳۰ منم شامل کر لیں۔

دستوں کا مجرب علاج ہے۔ دن میں تین سے چار بار
استعمال کرائیں۔

۱۱۔ سیلان مکسچر

میگنیشیا سلفیٹ ۲۴ گرین

کلوروفارم وارٹر ۳۰ ایک اونس

یکسچر جلاب لاتی ہے۔ اس میں ایک سے آٹھ گنا تک پانی
ملا کر استعمال کریں۔

۱۲۔ الکلائن آرمی نیو مکسچر

سوڈا بائیکارب ۲۰ گرین

سپرٹ امونیا ایرومیک ۱۵ منم

کپونڈ ٹینکچر کارڈ کو ۳۰ منم

کلوروفارم وارٹر ۳۰ ایک اونس

اگر پیٹ میں درد دروازہ ہوں تو ٹینکچر بیلادونا دس منم کا
اضافہ کر سکتے ہیں۔

بدبھنی پیٹ درد و معدہ میں تیزاب کی زیادتی کے لئے
مجبرب ہے۔

۱۳۔ الیڈ مکسچر

ڈائیلوٹ ہائیڈروکلورک الیڈ ۳۰ منم

کلوروفارم وارٹر ۳۰ ایک اونس

(نوٹ) ۱۔ ایک اونس دوا آدھ گلاس پانی میں

ملا کر ذائقہ کے مطابق چینی ملا کر کھانا کھانے کے بعد

دیں۔ اگر دوا دانتوں کو ترشش لگے تو کاغذ کی ٹیوب

سے پیا جائے۔ جس سے سوڈا وارٹر استعمال کیا

جاتا ہے۔

تیزاب کی کمی، کمزوری معدہ کی وجہ سے بدبھنی ہو تو مفید
ہے کمزور مریضوں کو نصف مقدار میں دیں۔

۱۴۔ سیلان ایکسپکٹورنٹ

سوڈا بائیکارب ۲۰ گرین

سوڈا کلورائیڈ ۵ گرین

ٹینکچر اپی کاک ۱۰ منم

لکود ایکسپکٹ لکورس ۲۰ منم

ایلیسی وارٹر ۳۰ ایک اونس

بلغم نکالنے و کھانسی کے لئے مفید ہے۔

۱۵۔ سٹولنٹ ایکسپکٹورنٹ

ٹینکچر سلا ۱۰ منم

ایمونیا کرب ۵ گرین

ٹینکچر اپی کاک ۱۰ منم

کلوروفارم وارٹر ۳۰ ایک اونس

بلغم نکالنے اور کھانسی کے لئے مفید ہے۔

۱۶۔ انٹی الیستھما مکسچر

پوٹاشیم آیوڈائیڈ ۵ گرین

ٹنکچر بولبیا ایٹرس ۱۰ منم
ٹنکچر سٹرا مونیم ۱۰ منم
سیرپ ٹولو ۱ ڈرام

واٹر
تا ایک اونس
بمہ کے دورہ کو روکنے کے لئے مفید مکچر ہے۔

۱۷۔ برومائیڈ کلورل مکچر

پوٹاسی برومائیڈ ۲۰ گرین
کلورل ہائیڈریٹ ۱۰ گرین
شربت سادہ ۱ ڈرام
کلوروفارم واٹر تا ایک اونس

نمیند لانے اور تسکین دینے والا مکچر ہے کمزور مریضوں کو نصف مقدار دیں۔

۱۸۔ برومائیڈ ولومی نیل مکچر

پوٹاسیم برومائیڈ ۱۵ گرین
فینوباربیٹون سوڈیم ۲۱ گرین
پانی تا ایک اونس
یہ بھی نمیند لانے والا اور تسکین دینے والا مکچر ہے۔

۱۹۔ الکلائن ڈایورٹیک مکچر

پوٹاسیم سٹراس ۳۰ گرین
سوڈیم بائی کارب ۳۰ گرین
واٹر تا ایک اونس

یہ پیشاب آور مکچر ہے۔ بندش بول وغیرہ میں نہایت مفید ہے۔

۲۰۔ الکلائن ڈایورٹیک وانٹی سپازوڈک مکچر

پوٹاسیم سائیٹریٹ ۳۰ گرین

سوڈا بائی کارب ۳۰ گرین
ٹنکچر آف ہالوسم ۳۰ منم
پانی تا ایک اونس

یہ پیشاب لانے والی مکچر ہے جو درد گردہ و مثانہ کے درد کے لئے مفید ہے، اگر پیشاب لگ کر (جلن سے) آ رہا ہو، تو بھی مفید ہے۔

۲۱۔ آیوڈائیڈ و مرکری مکچر

پوٹاسیم آیوڈائیڈ {
سالیوشن (گھول) ۱۰ گرین
مرکری پر کلورائیڈ ۳۰ منم
واٹر تا ایک اونس

خرابی خون اور آشک کے لئے مفید ہے۔ یہ دوا کھانا کھانے کے بعد دینی چاہیئے اور اسے با احتیاط استعمال کرنا چاہیئے۔

۲۲۔ لنک ٹس

کوڈین فاسفاس ۲۱ گرین
سیرپ ٹولو ۱ ڈرام
سیرپ پرونی سیروٹینا ۱ ڈرام

دو چمچ گرم پانی میں ملا کر حسب ضرورت دیں۔ کھانسی کے لئے عمدہ دوا ہے۔

۲۳۔ گینسر لنک ٹس

ٹنکچر کفر کو
آکزی مل سلا {
سیرپ ٹولو
ہر سہ برابر وزن لیں

ایک چمچ گرم پانی میں ملا کر ضرورت کے مطابق دیں کھانسی کے لئے مفید ہے۔

(دوسرا حصہ) پاؤڈر ہائے

یہ پاؤڈر سپٹ سے نرم اور چمکنے وغیرہ نکالنے کیلئے مفید ہے۔

۲۹۔ پلو کرٹیا ایرومیتھک

چاک ۲۵۰ گرام
سنا موم پاؤڈر (دار چینی) ۱۰۰ گرام
نٹ میگ پاؤڈر (جائفل) ۸۰ گرام
کلوز پاؤڈر (لونگ) ۴۰ گرام
تخم الاسحی سبز تازہ ۳۰ گرام
کھانڈ پاؤڈر ۵۰۰ گرام
خوراک ۱۰ سے ۶۰ گرین تک، دستوں کے لئے عمدہ پاؤڈر ہے۔

۳۰۔ پلو کرٹیا ایرومیتھک کم اوپیم

ایرو میتھک چاک پاؤڈر ۹۷۵ گرام
پوڈر اوپیم ۲۵ گرین
مقدار خوراک ۱۰ سے ۶۰ گرین، دستوں کے لئے مفید ہے، کمزور مریضوں کو با احتیاط دیں۔

۳۱۔ پلو ایفرولینز کو

سوڈا مارٹریٹا ۷۶۵ گرام
سوڈا بائیکارب ۲۶۵ گرام
(نیلے کاغذ میں پڑیا باندھ لی جائے)
مارٹریٹک ایسڈ ۲۶۰۵ گرام
(پیس کر سفید کاغذ میں پڑیا باندھ لی جائے) سیڈلز
پاؤڈر تیار ہے۔
ت ترکیب استعمال :- پہلے نیلے کاغذ والی پڑیہ آدھ اونس

۲۸۔ انٹی ایڈ پاؤڈر

میگنٹیم سلیکیٹ ۳۰ گرین
یہ پاؤڈر دن میں تین بار دیں، معدہ میں تیزاب کی زیادتی (ترشی) بد ہضمی و ترش ڈکاروں کے لئے لاجواب ہے۔

۲۵۔ اے پی سی پاؤڈر

ایسپرین ۵ گرین
فنٹین ۳ گرین
کیفین ۲ گرین
سر درد اور دوسرے دردوں کے لئے مفید ہے۔ پانی یا چائے سے دیں، کمزور مریضوں کو نصف مقدار میں دیں۔

۲۶۔ ڈجی ٹیلیس پاؤڈر

پوڈجی ٹیلیس ۱/۴ گرین
ایک پڑیہ ہر آٹھ گھنٹہ بعد دیں اور کمزور مریضوں کو نصف مقدار دیں۔

۲۷۔ کمپونڈ گلابی سرزہ پاؤڈر

کمپونڈ پوڈر آف لکورس (بی پی) ۹۰ گرین
بڑھیا قبض کشا پاؤڈر ہے۔ بوا سیر کے لئے بھی مفید ہے۔

۲۸۔ سنٹونین پاؤڈر

کیوبل ۱/۴ گرین
سنٹونین ۳ گرین
شوگر ۵ گرین

دن میں تین بار دیں۔

۳۹۔ فینو باربی ٹون ٹکیاں

پہاگرین کی گولی رات کو سوتے وقت دیں، نیند لانے کے لئے مفید ہیں۔

۴۰۔ کار با سون ٹکیاں

لگ بھگ چار گرین مقدار میں ایک گولی دن میں تین بار دس روز کے لئے دیں۔ پیچیش، انٹریوں کی سوجن، دست اور خرابی خون کے لئے سم الفار سے تیار کردہ گولیاں ہیں۔

۴۱۔ ای می ٹین بسمتھ آیو ڈائیڈ

ای می ٹین بسمتھ آیو ڈائیڈ تین گرین رات کو الگ الگ کیپ شلوں میں ڈال کر ایک گرین دی جائے اور اس کے ساتھ ایک گرین فینو باربی ٹون دیا جائے، مکمل کورس دس دن کا ہے، پیچیش اور انٹریوں کی سوجن کے لئے یہ ایک کامیاب علاج ہے۔

۴۲۔ انٹرو والیو فارم ٹکیاں

انٹرو والیو فارم چار گرین کی ایک گولی دن میں تین بار دس روز کے لئے دیں، پیچیش کا مجرب علاج ہے۔

۴۳۔ ڈجاکسن ٹکیاں

ڈجاکسن چار گرین کی ایک گولی ہر چھ گھنٹہ بعد دی جائے، محرک و دل کو طاقت دینے کے لئے مفید ہے، لیکن یہ زہریلا اثر پیدا کرتی ہے۔

اس گولی کو باضیاط استعمال کیا جائے اور نبض پر نظر رکھی جائے۔

۴۴۔ فولک ایسڈ ٹکیاں

فول وائیٹ یا کوئی اور سٹینڈرڈ برانڈ پانچ ملی گرام، ایک گولی دن میں تین بار دیں۔ نیا سرخ خون پیدا کرنے کے لئے مجرب ہے، سنگرہنی، کمی خون، انیمیا وغیرہ کے لئے مفید ہے۔

۴۵۔ ایسپرین فنسٹین ٹکیاں

ایسپرین ۲۲۶۶۸ گرام
فنسٹین ۱۶۲۶۰ گرام

اس کی تقسیم کر کے ایک ہزار گولیاں بنالیں، مقدار خوراک ایک سے دو گولی روزانہ لیں، یہ ٹکیاں پوڈر کی حالت میں بھی لے سکتے ہیں، بخار کو ہلکا کرنے، زکام، سر درد، کان درد، کمزور د اور دوسرے دردوں کے لئے مفید ہے۔

۴۶۔ ایسٹھائی نائل ایسٹریا ڈول ٹکیاں

۶۰ سے ۱۰۰ گرام روزانہ بچہ دانی کی تقویت، کمی خون، بے قاعدگی ایام اور رحم کے امراض کے لئے مفید ہے۔

۴۷۔ ایسٹروٹون ٹکیاں

۲۵ سے ۱۰۰ ملی گرام کی مقدار میں روزانہ دیں۔ اولاد کی آرزو کے لئے مفید ہے، عام طور پر ۲۵ ملی گرام کی مقدار کافی ہے۔

۴۸۔ باربی ٹون ٹکیاں

پانچ سے دس گرین کی مقدار میں رات کو سوتے وقت دینا نیند آور ہے۔

۴۹۔ باربی ٹون سوڈیم ٹکیاں

ایک سے تین گرین کی مقدار میں دیں، کمی خون کے لئے بہت ہی مفید گولیاں ہیں۔ بازار میں فرسولیت کے نام سے مل سکتی ہیں۔

۵۶۔ مرکبوس کلورائیڈ (کیلومل) ٹکیاں

۱/۲ سے ایک گرین کی مقدار میں دیں، قبض کشا ہے، جگر سے صفرائے کے لئے مفید ہے۔

۵۷۔ اپنی کاک اینڈ اوپیم ڈوڈرس کلورائیڈ ٹکیاں

پانچ گرین کی مقدار میں دیں، زکام، ہیچس اور دستوں کے لئے مفید ہے۔

۵۸۔ پیسٹی ڈین ہائیڈروکلورائیڈ ٹکیاں

افیون سے تیار شدہ ہیں، فوائد مارفیا کی طرح ہیں۔ ۲۵ ملی گرام کی مقدار میں دیں۔ درد دور کرنے اور نیند لانے کے لئے مفید ہیں۔

۵۹۔ فینو لفتھلین ٹکیاں

دو گرین کی مقدار میں دیں، گولیاں کھانے سے پہلے چبا لیں، کسٹولین، کیسٹوفین کے نام سے یہ گولیاں بکیتی ہیں قبض کشا ہیں۔

۶۰۔ پوٹاسیم برومائیڈ ٹکیاں

پانچ گرین کی مقدار میں دیں، استعمال سے پہلے پانی میں گھول لی جاویں، بے خوابی، لائی ہڈ پریش، دردوں کو دور کرنے کے لئے مفید ہیں۔

۶۱۔ کونین بائی سلفیٹ ٹکیاں

پانچ گرین کی مقدار میں دودھ سے دیں۔ پیریا اور زکام

پانچ سے دس گرین کی مقدار میں رات کو سوتے وقت دیں نیند آور ہے۔

۵۰۔ کیلیم لکٹ ٹکیاں

۱۵ سے ۶۰ گرین کی مقدار میں دیں، تمام ایسے امراض میں مفید ہیں، جہاں کیلیم کی ضرورت ہو۔

۵۱۔ کمپونڈ ٹکیاں آف کوڈین

ایسپرین ۲۵۹۶۲ گرام
فنٹین ۲۵۹۶۲ گرام
کوڈین فاسفیٹ ۸۶۱ گرام

ایک ہزار گولیوں میں تقسیم کر لیں، ایک سے دو گولی چائے سے دیں۔ زکام، سرور و اور نزلہ میں مفید ہیں، یہی گولیاں کوڈو پائیرین وغیرہ ناموں سے دستیاب ہیں۔

۵۲۔ ٹکیاں کوڈین فاسفیٹ

۱/۴ سے ۱/۲ گرین کی مقدار میں دیں، کھانسی، زکام، ذیابیطس کے لئے مفید ہے۔

۵۳۔ ڈانی سینٹرول ٹکیاں

۶۵ سے ایک ملی گرام کی مقدار میں دیں، بچہ دانی کی تقویت کے لئے مفید ہیں، بے قاعدگی ایام میں بھی لاجبہ دایک ہیں، فوائد بطرز ہارمون خصیۃ الرحم ہیں۔

۵۴۔ ایفیڈرین ہائیڈروکلور ٹکیاں

۱/۴ سے ۱/۲ گرین دیں، کھانسی، زکام، دمہ، کالی کھانسی، اور کمزوری قلب کے لئے مفید ہیں۔

۵۵۔ ایکسی کیٹیڈ فرس سلف ٹکیاں

اول خوراک تین گرام، بعد میں ایک سے ڈیڑھ گرام، فوائد بطرز سلفا ڈرگز ہیں۔

۶۶۔ سلفا نیلا مائیڈ ٹکیاں

اول خوراک تین گرام، بعد میں ہر خوراک ایک سے ڈیڑھ گرام ہر چار گھنٹہ بعد دیں۔
فوائد بطرز سلفا ڈرگز کے ہیں۔

۶۷۔ امائی نو فائی لین ٹکیاں

ڈیڑھ گرین کی مقدار میں لیں۔ دہہ دہائی بلڈ پریشر کے لئے نہایت مفید ہیں۔

۶۸۔ تھائی رائیڈ ٹکیاں

اس کی خوراک مریض کو آدھ گرین کی مقدار میں استعمال کر لیں، فوائد پچھلے ابواب میں درج ہیں۔

کے لئے مفید ہیں۔

۶۲۔ کمپاؤنڈ ٹیبلٹ سوڈا بائیکارب

۳۲۴ ملی گرام

سوڈا بائیکارب

۴ ملی لیٹر

پیرمنٹ آئیل

ایک ہزار گولیاں بنالیں، خوراک دو سے چھ گولی تک استعمال کریں۔

۶۳۔ سوڈا سٹراس ٹکیاں

دو گرین کی مقدار میں دیں۔ پانی یا دودھ میں حل کر کے دیں، چھوٹے بچوں کی بدھنی کو مفید ہیں۔

۶۴۔ سکسی نائل سلفا تھایازول

۳ سے ۶ گرام استعمال کریں، فوائد بطرز سلفا ڈرگز ہیں۔

۶۵۔ سلفا ڈایامی ڈائن

پتھو تھاجسٹ، ٹیکے

۷۱۔ کروڈلور ایکسٹریکٹ

۱ یو، اسی پی یونٹ دوسری سی عضلاتی طور پر ہر دوسرے روز یا ہفتہ میں دوبار دیں۔ یرقان، کمی خون اور سنگرمی کے لئے مفید ہے۔

۷۲۔ وٹامن بی کمپلیکس

مختلف کمپنیوں کی مارکیٹ میں ملتی ہیں، مقدار خوراک دوسری سی عضلاتی طور پر ہر دوسرے روز دیں، نسوں کی سوزش و کمزوری، درد گھٹھیا، جوڑ۔ وجع المفاصل، بدھنی

۶۹۔ ایمی ٹین ہائیڈروکلورائیڈ

ایک گرین کا ایک سی سی ڈسٹلڈ واٹر میں حل شدہ عضلاتی ٹیکہ لگایا جاتا ہے، ایک ٹیکہ روزانہ دس دن کے لئے دیں۔ پیش کے لئے مفید ہے۔

۷۰۔ پینی سلین سوڈیم

پینی سلین سوڈیم ۲/۱ لاکھ یونٹ ہر چار گھنٹہ بعد دس لاکھ کی ٹیوب دس سی سی ڈسٹلڈ واٹر میں گھول لیں اور ہر چار حصہ کا ٹیکہ ہر چار گھنٹہ بعد لگادیں۔

۷۷۔ مرسلاتیل انجکشن

ایک سے دو سی سی عضلاتی انجکشن ہفتہ میں ایک یا دو بار دیں، سوچن والی جگہ پر انجکشن منع ہے۔ جلودھر (ڈراپس) کے لئے مجرب ہے۔ مارکیٹ میں یہ انجکشن سلرگان و ہسپال کے ناموں سے بکتے ہیں۔

۷۸۔ ٹے ٹے انس انٹی ٹاکسن

بطور حفظ ماقدم ... ۵ یونٹ بطور امونٹی ... ۵ یونٹ عضلاتی دیں، تشنچ، اینٹیگن کے لئے مفید ہے۔

۷۹۔ ٹے ٹے انس ٹاکسائیڈ

برائے امونٹی از مرض اینٹیگن (بطور حفظ ماقدم) ایک سی سی کے دو ٹیکے چھ ہفتہ کے وقفہ کے بعد دیں۔

۸۰۔ ٹے ٹے انس انٹی ٹاکسین

ایک لاکھ سے بیس لاکھ یونٹ عضلاتی یا وریدی برائے علاج تشنچ (اینٹیگن) دیں۔

۸۱۔ ڈیفٹییریا لے، پی، ٹی

بطور حفظ ماقدم ۰.۵ سی سی کے دو انجکشن عضلاتی طور پر تین ہفتہ کے وقفہ کے بعد دیں۔ مرض خناق (ڈیفٹییریا) سے بچاؤ رہتا ہے۔

۸۲۔ ڈیفٹییریا ٹی، ایف

بطور حفظ ماقدم خناق کے لئے ایک سی سی کے تین انجکشن تین ہفتہ کے وقفہ سے دیئے جائیں۔
نوٹ :-

انجکشن میں تین ہفتہ کا وقفہ رکھنا ضروری ہے۔

کمزوری، امراض جلد اور زچہ و حاملہ کی کمزوری کے لئے از حد مفید ہے۔

۷۳۔ تھایامین بائیڈروکلورائیڈ (وٹامن بی ۱)

نسوں و پھٹوں کے درد اور کمزوری کے لئے مفید ہے۔ مرض بیری بیری کو دور کرنے کا کامیاب علاج ہے، درد شقیقہ، جوڑوں کے درد، کمزوری معدہ، حاملہ عورتوں کی تفتے اور بد ہضمی کے لئے مفید ہے، یہ ہنزوا، بیرین اور بی فورٹس وغیرہ ناموں سے مارکیٹ میں بکتی ہے، اسے ۲۰ سے ۵۰ ملی گرام کی مقدار میں بذریعہ عضلاتی انجکشن روزانہ یا ہر دوسرے روز دیا جاسکتا ہے۔

۷۴۔ نیو آرسینفنا مین (بی، پی)

یہ نیو سالورسن کے انجکشن ہیں، مرض آتشک، خرابی خون، پھیوڑا پھنسی، داد، چنبل، خارش وغیرہ کے لئے مفید ہیں۔ اس کی ۶۳ گرام بذریعہ وریدی انجکشن، یہ پہلی خوراک ہے، بعد میں ہر ہفتہ خوراک بڑھاتے جائیں۔ یہ ہفتہ میں ایک بار لگایا جاسکتا ہے۔

۷۵۔ میفر سائیڈ انجکشن

میفر سائیڈ ۴.۶ گرام بذریعہ وریدی انجکشن پھر ہر ہفتہ مقدار بڑھاتے جائیں اور خوراک ۶.۶ کر دی جائے، آتشک کے لئے مجرب ہے۔

۷۶۔ بسمتھ انجکشن

ایک سی سی عضلاتی طور پر ہفتہ، اسے عام طور پر ۷۴ یا ۷۵ نمبر کے ساتھ کیے بعد دیگرے استعمال کیا جاتا ہے،
نوٹ :-
ہر ٹیکے کے درمیان ایک ہفتہ کا وقفہ دیا جاتا ہے۔

۸۳۔ ڈیفٹیہ یا انٹی ٹاکسن

خناق کے علاج میں ۲۰ ہزار یونٹ سے ایک لاکھ یونٹ عضلاتی انجکشن مریض کے حالات کے مطابق دیا جائے۔

۸۴۔ ٹی، اے، بی ویکسین

تپ محرقہ سے بچاؤ کے لئے پہلی خوراک پراسی سی عضلاتی اور دوسری ایک سی سی عضلاتی انجکشن کی صورت میں دی جائے ایک ہفتہ کا وقفہ دونوں خوراکیوں کے درمیان ہونا لازمی ہے اتنا وقفہ ہر حالت میں دیا جائے۔

۸۵۔ انٹی کالرا ویکسین

پہلی خوراک پراسی سی عضلاتی اور دوسری خوراک ایک سی سی عضلاتی دیں۔ دونوں خوراکیوں کے درمیان ایک ہفتہ کا وقفہ ضرور دیا جائے۔

۸۶۔ اڈرینالین انجکشن

دو سے آٹھ منم جلدی انجکشن دیں بنے بنائے امپولز بھی مارکیٹ سے ملتے ہیں۔ اس کا ٹیکہ مقوی دل ہے۔ اور خون کے دباؤ کو تیز کرتا ہے۔

دوسرے، کالی کھانسی اور خون کے اخراج کو بند کرنے کے لئے مفید ہے۔ محرقہ بخار اور سچیش میں جب انٹریوں سے کافی خون نکل رہا ہو۔ اس کا ٹیکہ لگانے سے فوری طور پر فائدہ ہوتا ہے۔

۸۷۔ اینورین ہائیڈروکلورائیڈ انجکشن

۲۰ سے ۵۰ ملی گرام عضلاتی یا زیر جلد انجکشن دیں۔ اس کے فوائد وٹامن بی ۱ کے انجکشن کے فوائد کی طرح ہیں۔

۸۸۔ انٹی موونی پوٹاسی ٹارٹرائٹ انجکشن

۱/۲ سے ایک گرین بصورت ٹیکہ دیں، کالا آزار کے لئے مفید ہے، دکھیں بیان کالا آزار۔

۸۹۔ انٹی موونی سوڈیم ٹارٹریٹ انجکشن

۱/۲ سے ایک دو گرین بذریعہ وریدی انجکشن دیں، کالا آزار کے لئے مفید ہے۔

۹۰۔ اپومارفلین

۱/۲ سے ۱/۸ گرین عضلاتی یا زیر جلد ٹیکہ دیں، زبردست تھکے اور ہے۔ یہ ٹیکہ زہروں کے علاج میں مستعمل ہے۔

۹۱۔ لیسیتھ سوڈیم ٹارٹریٹ انجکشن

ایک سے تین گرین عضلاتی انجکشن دیں، آتشک کے لئے مفید ہے، فوائد بطرز نسخہ نمبر ۷۶۔

۹۲۔ کیلیم گلوکونیٹ انجکشن

دس سے بیس سی سی جس میں دو گرام کیلیم گلوکونیٹ ہو، بذریعہ وریدی یا عضلاتی انجکشن، ہڈیوں کی کمزوری، ٹیڑھا پن اور دانتوں کی کمزوری کے لئے مفید ہے۔

۹۳۔ ڈی آکسی کارٹون ایسی ٹریٹ انجکشن

یہ کارٹی سون کے انجکشن ہیں، جو جوڑوں کے درد اور درگنٹھیا میں مفید ہیں۔ بصورت انجکشن دو سے پانچ ملی گرام روزانہ دیں۔

۹۴۔ ڈیکس ٹروز انجکشن

یہ گلوکوز سالیوشن انجکشن ہے، مقدار خوراک حسب

۱۰۱۔ ہائیوسین ہائیڈروبروم انجکشن

۱/۲ سے ۱/۱ اگرین جلدی انجکشن دیں، نیند آدر ہے اور تسکین دیتا ہے، اجوائن خراسانی کے انجکشن ہیں۔

۱۰۲۔ انسولین انجکشن

دیکھیں بیان ذیابیطس۔ حسب حالات مریض انجکشن دیا جاتا ہے۔

۱۰۳۔ پروٹامین زنک انسولین

انجکشن زیر جلد دیں۔ ذیابیطس کے لئے مجرب ہے مقدار خوراک حسب حالات مریض رکھیں۔

۱۰۴۔ لیٹازول انجکشن

۱/۲ سے ایک سی سی انجکشن دیں۔ یہی انجکشن کارڈیازول کے نام سے مارکیٹ میں ملتا ہے، مقوی قلب ہے۔

۱۰۵۔ مارفین اٹروپین انجکشن

۱/۲ سے ایک سی سی انجکشن جلدی یا عضلاتی دیں مارفین اور اٹروپین کا مرکب ہے، نیند لانے و ہر قسم کے دردوں کے لئے مفید ہے، کمزور مریضوں کو با احتیاط دیں۔

۱۰۶۔ مارفین سلفیٹ انجکشن

۱/۸ سے ۱/۴ اگرین جلدی یا عضلاتی انجکشن دیں، دافع درد ہے۔ کمزور مریضوں کو با احتیاط دیں۔

۱۰۷۔ نیوٹگیمن ملٹیقل سلفیٹ انجکشن

۰.۶۵ سے ۲ ملی گرام جلدی یا عضلاتی انجکشن حسب حالات مریض دیں۔ انٹریٹوں اور مشانہ کے سچٹوں کی کمزوری میں مفید

حالات مریض ۵ سے ۵ فی صدی کا گھول وریدی طور پر یا بذریعہ ٹرانسفیوژن استعمال کیا جاتا ہے، اگر نسخہ پر طاقت دوانہ لکھی ہو تو عام طور پر ۵ فی صدی کا گھول دیا جاتا ہے۔

۹۵۔ ڈجاکسین انجکشن

دس سے بیس ملی لیٹر بذریعہ وریدی ٹیکہ جس میں ایک ملی گرام بیس ملی لیٹر میں ڈجاکسین ہوتی ہے۔ مقوی و محرک قلب ہے۔

۹۶۔ ڈائی ہائیڈرو سٹریٹومائی سین انجکشن

ایک ملی گرام کا ٹیکہ ایک یا دو دفعہ تقسیم کر کے دن بھر میں عضلاتی دیں۔ تپ دق اور بل کے لئے مفید ہے۔

۹۷۔ ارگو میٹرین میلی ایٹ

یہ ارگٹ کا جوہر لطیف ہے، ۰.۲۵ سے ایک ملی گرام عضلاتی دیں اور ۰.۶۱۲۵ سے ۰.۵ ملی گرام وریدی دیا جاتا ہے۔

۹۸۔ ہیاپارین انجکشن

چھ سے بارہ ہزار یونٹ عضلاتی یا وریدی انجکشن کیا جاتا ہے، خون کے انجماد کو روکتی ہے، شریانوں میں انجماد خون کی حالت میں مفید ہے۔

۹۹۔ میگز و باربی ٹون انجکشن

۰.۲ سے ایک گرام وریدی انجکشن دیں نشہ لاتی ہے اور باربی ٹون مرکب ہے اس کو آپریشنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔

۱۰۰۔ ہٹامین الیڈ فاسفیٹ

زیر جلد انجکشن ۰.۶۵ سے ایک ملی گرام

ہیں، پٹوں کی کمزوری کے لئے بھی لایفہ دایک ہے۔

۱۰۸۔ آکزی ٹوسین انجکشن

جلدی یا عضلاتی انجکشن ۳ سے ۸ منٹ دیں۔ تمام فوائد پچوڑ
انجکشن کی طرح ہیں۔

۱۰۹۔ فینوباربیٹون انجکشن

عضلاتی یا وریدی طور پر ایک سے تین گرین دیں۔ ایک انجکشن
کافی ہے، نیند آور اور دماغ درد دوا ہے۔

۱۱۰۔ پیکروٹاکسین انجکشن

۶۶۔ ۶ سے ۶ ملی گرام عضلاتی یا وریدی انجکشن دیں، یہ دوا
باربیٹون کے زہریلے اثرات کا مجرب علاج ہے، اس کا ٹیکہ
ہر دس منٹ بعد دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ آنکھ کی کالکی کی جس نارمل
ہو جائے۔ باربیٹون کے زہر کو دور کرنے کے لئے لاجواب
انجکشن ہے۔

۱۱۱۔ پروکین واڈرینالین انجکشن

زیر جلد جگہ کو سن کرنے کے لئے ۵ اگرین تک خاگی، یہ
دو سے چار فیصدی کے سالیوشن میں استعمال ہوتا ہے۔

۱۱۲۔ پروجیسٹرون انجکشن

۵ سے ۲۰ ملی گرام بذریعہ عضلاتی انجکشن دیں۔ اسقاط
حمل کے لئے نہایت مفید ہے۔

۱۱۳۔ سوڈاکلورائیڈ انجکشن (نارمل سیلان)

یہ وریدی یا ٹرانسفیوژن کے ذریعے خون اور جسم میں
سیال کی مقدار بڑھانے کے لئے دیا جاتا ہے، مقدار خوراک
حالات مریض کے مطابق دی جائے۔

۱۱۴۔ سٹریٹومائی سین ہائیڈروکلورائیڈ انجکشن

بذریعہ عضلاتی ایک گرام روزانہ انجکشن یا ایک گرام کو
دو خوراکوں میں تقسیم کر کے دیا جاتا ہے۔ سل وڈق کے لئے
از حد مفید ہے۔

۱۱۵۔ سٹریٹومائی سین سلفیٹ انجکشن

نسخہ نمبر ۱۱۴ کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اور فوائد بھی
بظریہ نسخہ ہذا کے ہیں۔

۱۱۶۔ سلفار سفینا مین انجکشن

یہ سلفارسی نول کے نام سے بھی فروخت ہوتا ہے۔
سنکھیا سے مرکب انجکشن ہے، جو آتشک و خرابی خون
اور امراض جلد کے لئے مفید ہے، ۶۱۔ ۶۶ سے ۶۶ گرام بذریعہ
وریدی یا عضلاتی انجکشن دیا جاتا ہے۔

۱۱۷۔ سوڈاکلورائیڈ انجکشن

نسخہ نمبر ۱۱۳ کے مطابق استعمال کریں۔

۱۱۸۔ سلفا تھا یا زول سوڈیم انجکشن

ایک سے دو گرام بذریعہ وریدی ٹیکہ استعمال کریں، سلفا
ڈرگز کی طرح فوائد ہیں۔

۱۱۹۔ ٹیسٹا سٹرون انجکشن

۵ سے ۲۵ ملی گرام عضلاتی ٹیکے کریں، یہ خُصیوں کی ہارمون ہے
جو کمزوری کیلئے مفید ہے، دیکھیں بیان کمزوری۔

۱۲۰۔ امانوفانی لین انجکشن

ڈیڑھ سے آٹھ گرین بذریعہ وریدی یا عضلاتی انجکشن دیں

۱۲۵۔ مایو کراسین انجکشن

یہ آرو تھا یو سلفیٹ کا ۵۰ فی صدی کا آبی گھول ہے اسے ایم بی کمپنی بناتی ہے۔ جوڑوں کی سوجن میں ہر سفتہ ایک انجکشن بارہ ہفتوں کے لئے دیا جاتا ہے، پہلے تین انجکشن ۱۰ اور ۲۵ اور ۵۰ ملی گرام کے ہوتے ہیں اور آخری ۹۰۰ ملی گرام کے ہوتے ہیں، اور اس طرح کل ایک گرام کے قریب دوا بارہ ٹیکوں میں دی جاتی ہے۔ تپ دق کے لئے بھی یہ ٹیکے مفید ہیں۔

۱۲۶۔ پچوٹرین انجکشن

یہ خون کے دباؤ کو زیادہ کرتا ہے۔ کمزوری دل کے لئے مفید ہے، دمر میں اس کا انجکشن سادہ یا اڈرینالین کے ساتھ مرکب کر کے دیا جاتا ہے، بچہ دانی کو سکڑنے کے لئے اور بچہ دانی کا منہ کھل جانے کے بعد اس کا ٹیکہ زیر جلد کرنا چاہیئے، بروز ویکم کمپنی اسے انفنڈین کے نام سے تیار کرتی ہے۔ تین سے آٹھ منیم کی مقدار میں عضلاتی یا جلدی انجکشن کئے جاتے ہیں۔

۱۲۷۔ سٹرکنین انجکشن

جلدی ٹیکہ کیا جاتا ہے، ۰.۵ سے ایک سی سی کی مقدار میں۔ یہ مقوی و محرک دل ہے۔ یہ ٹیکے شدہ کچلہ سے تیار کئے جاتے ہیں۔

دور کے لئے مفید ہے اور دل کو طاقت دیتی ہے۔

۱۲۱۔ ٹرائپ آرسامائیڈ

ایک سے دو گرام بذریعہ عضلاتی ٹیکہ دیں، تفصیل کے لئے "انجکشن بک ملتان" دیکھیں۔

۱۲۲۔ ریسوپرلین انجکشن

۰.۶۲۵ سے ۰.۷۵ (۴ سے ۱۲ منیم) جلدی یا عضلاتی انجکشن دیں۔ تفصیل کے لئے "انجکشن بک ملتان" دیکھیں۔

۱۲۳۔ نئے تھا مائیڈ (کورامین) انجکشن

دوسری عضلاتی انجکشن دیں، دل کی کمزوری اور دل ڈوبنے کے لئے مفید ہے۔

۱۲۴۔ ہیرین انجکشن

اگر کسی درید میں خون کا لوتھڑا بن گیا ہو تو یہ انجکشن وریدی ۱۲۵۰۰ انٹرنیشنل یونٹ دینا چاہیئے اور دس ہزار یونٹ ہر گھنٹہ بعد دو دن کے لئے دینا چاہیئے۔ اس کے بعد دس ہزار یونٹ صبح کو اور ۱۲۵۰۰ شام کو دینا چاہیئے، یہاں تک کہ مریض تندرست ہو جائے۔

نوٹ:- ایسے مریضوں کے انجماد خون پر پوری نظر رکھنی چاہیئے، اگر زہریلے اثرات ظاہر ہوں، تو ۵ سے ۱۰ ملی لیٹر ایک فیصدی کا گھول پورٹانین سلفیٹ دینا چاہیئے۔

(پانچواں حصہ) لینی منٹ ہائے

۵۰ گرام کفر
۹۵۰ گرام تیل تارپین خالص
کشید شدہ پانی اتنا ملائیں کہ کل ایک ہزار گرام ہو جائے۔



۱۲۸۔ لینی منٹ تارپین (بنی پنی)
۵۰ گرام سافٹ سوپ

بیرونی استعمال کے لئے سفید رنگ کی مالش تیار ہے، جو منو نیہ، جوڑوں کے درد، درد کمر، گنٹھیا وغیرہ کے لئے مفید ہے۔

۱۲۹۔ امونی اینڈ لینی منٹ آف کمفر (بی پی)

کافور ۱۲۵ گرام

لونڈر آئیل ۵ ملی لیٹر

سٹرانگ گھول اسونیا ۲۵۰ ملی لیٹر

الکوحل (۹۰ فی صدی) اتنا ملائیں کہ کل دو ہزار ملی لیٹر ہو جائے، بیرونی استعمال کے لئے مفید ہے، دافع درد، مقابل خراش پیدا کرتی ہے۔

۱۳۰۔ کلامینا لینی منٹ

کلامینا پرپرٹا ۲ ڈرام

آلو آئیل ۱ اونس

لائم وارٹر ۱ اونس

ایگزیمیا کے لئے مفید ہے۔ جلد کو تسکین دینے کے لئے بیرونی طور پر استعمال کی جاتی ہے۔

۱۳۱۔ کلامینا گھول

کلامینا پرپرٹا ۲ ڈرام

(چھٹا حصہ) مرہم ہائے

ڈائی ہقزانول ۱ گریں

پیرافین آسینٹ ۱ اونس

چینل واد کے لئے مفید ہے

۱۳۶۔ سٹرانگ ڈائی ہقزانول آسینٹ (بی پی)

ڈائی ہقزانول ۱ گرام

۱۳۴۔ بورک آسینٹ (بی پی)

بورک ایڈ ۱۰۰ گرام

پیرافین آسینٹ ۹۰۰ گرام

۱۳۵۔ ڈائی ہقزانول آسینٹ

لینولین ۵۰ گرام
ویز لین زرد ۲۰ گرام
جلدی امراض کے لئے مفید ہے۔

۱۲۲۔ مرکری آسینٹمنٹ (مریم پارہ)

مرکری ۲۰۰ گرام
اولی ایڈ مرکری ۱۵ گرام
لینولین ۲۳۰ گرام
موم سفید ۷۰ گرام
ویز لین سفید ۱۸۵ گرام
آتشک کے لئے نہایت مفید ہے۔

۱۲۳۔ ڈائیلوٹ آسینٹمنٹ آف مرکری

آسینٹمنٹ آف مرکری ۲۳۳۶۳ گرام
سپیل آسینٹمنٹ ۶۶۷۶۷ گرام
بچوں کے جلدی امراض کے لئے ماش کی جاتی ہے۔

۱۲۴۔ سٹرانگ آسینٹمنٹ آف مرکیورک نائٹریٹ

پلو مرکیورک آکسائیڈ ۷۵۶۵ گرام
نائٹریک ایڈ (تیزاب خورہ) ۷۰ گرام
لینولین ۲۵ گرام
موم سفید ۵۰ گرام
ویز لین سفید ۲۶۵ گرام
ڈسٹلڈ واٹر ۳۰۴۶۵ گرام

جلدی امراض، خارش، چنبل، داد وغیرہ کے لئے مفید ہے۔

۱۲۵۔ ڈائیلوٹ آسینٹمنٹ آف مرکیورک نائٹریٹ

سٹرانگ آسینٹمنٹ آف مرکیورک نائٹریٹ ۲۰۰ گرام
ویز لین زرد ۸۰۰ گرام

ویز لین زرد ۹۹۰ گرام

داد، چنبل اور خارش کے لئے

مفید ہے۔

۱۳۷۔ امونی ایڈ مرکری آسینٹمنٹ

امونی ایڈ مرکری ۵۰ گرام
سپیل آسینٹمنٹ (سادہ مریم) ۹۵۰ گرام
داد و جلدی امراض کے لئے مفید ہے۔

۱۳۸۔ سلفر آسینٹمنٹ

سلفر سب لایم ۱۰۰ گرام
سپیل آسینٹمنٹ (سادہ مریم) ۹۰۰ گرام
جلدی امراض و خارش اور چم جوؤں کے لئے مفید ہے۔

۱۳۹۔ زنک اوکسائیڈ آسینٹمنٹ

زنک اوکسائیڈ ۱۵۰ گرام
سپیل آسینٹمنٹ (سادہ مریم) ۸۵۰ گرام
زخموں کو بھرنے والی مریم جت تیار ہے، جلد کو تسکین

دیتی ہے۔

۱۴۰۔ سلی سلک ایڈ آسینٹمنٹ

سلی سلک ایڈ ۲۰ گرام
لینولین آسینٹمنٹ ۹۸۰ گرام
جلدی امراض، داد، چنبل، خارش وغیرہ کے لئے
مفید ہے۔

۱۴۱۔ آسینٹمنٹ آف ہامیلز

نکوڈ ایکٹریٹ ہامیلز ۱۰ بی لٹر

خراب زخموں کے لئے مفید ہے۔

۱۴۶۔ وٹ فیلڈ آسینٹمنٹ

بنزدیک ایڈ ۵۰ گرام
سلی سلک ایڈ ۳۰ گرام
سفید ویزلین ۲۵۶ گرام
روغن ناریل ۶۴۴ گرام
لوکل سورا اور جلدی امراض کے لئے مفید ہے۔

۱۴۷۔ لاسر زپیٹ

زنک اوکسائیڈ ۲ ڈرام
سٹارچ ۲ ڈرام
لینولین ۲ ڈرام
ویزلین ۱ تا ایک ادنس
اگر ضرورت سمجھیں تو اس میں سلی سلک ایڈ بھی شامل کر لیں۔
امراض جلد کے لئے مفید ہے۔

۱۴۸۔ اناز پیٹ

زنک اوکسائیڈ ۱۵۰ گرام
جیلٹن ۱۵۰ گرام
گلیسرین ۳۵۰ گرام
ڈسٹلڈ واٹر ۳۵۰ ملی لیٹر

یا حسب ضرورت ملا لیں۔

جلدی امراض کے لئے مفید ہے۔

۱۴۹۔ آرجی رول ڈرائپس

آرجی رول ۴۵ گرام
کشید شدہ پانی ایک ادنس
سوزش چشم کے لئے مفید ہے۔

۱۵۰۔ مرکبورو کروم ڈرائپس

مرکبورو کروم ۱۸ گرام
بورک ایڈ ۴ گرام
کشید شدہ پانی ایک ادنس
جراثیم کش روشن ہے۔

۱۵۱۔ اگری فلیوین ڈرائپس

اگری فلیوین ۱۸ گرام
کشید شدہ پانی ایک ادنس
جراثیم کش روشن برائے امراض چشم تیار ہے۔

۱۵۲۔ سلور نائٹریٹ ڈراپ

سلور نائٹریٹ ۲ گرام
کشید شدہ پانی ایک ادنس
آنکھ کے لکڑوں و گلے کی سوزش کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

۱۵۳۔ سلور نائٹریٹ پیسٹ

سلور نائٹریٹ ۱۰ گرام
کشید شدہ پانی ایک ادنس
بیرونی کاٹک کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔

۱۵۴۔ اٹروپین ڈراپ

اٹروپین سلفیٹ ۴ گرام
کشید شدہ پانی ایک ادنس
آنکھ کی پتلی پھیلا نے اور آشوب چشم کے لئے مجرب ہے۔

۱۵۵۔ اسیرین ڈراپ

۱۶۰۔ ایگری فلیوین سپرٹ ڈراپ

ایگری فلیوین
سپرٹ ریگٹی فائیڈ
کان کی سوزش اور زخم کے لئے از حد مفید ہے۔
۲ گرین
ایک اونس

۱۶۱۔ کار بالک گلیسرین ڈراپ

کار بالک ایڈ
گلیسرین
کان کی سوزش کے لئے مجرب ہے۔
۱۵ گرین
ایک اونس

۱۶۲۔ سفوف برائے کان

آیوڈین بلی میٹ
بورک ایڈ
سلفا تھیا زول
کان کی سوزش میں کان میں ڈالنے سے کان کو آرام آ جاتا ہے۔
ایک گرین
۵۰ گرین
۵۰ گرین

۱۶۳۔ ناک کے لئے افڈرین ڈراپ

افڈرین سلفیٹ
یوکلپٹول
نکوڈ پیرافین
نزلہ، زکام اور ناک کی سوجن میں ڈراپ سے استعمال کیا جائے۔
۴ گرین
۵ مم
ایک اونس

۱۶۴۔ گلے کے لئے گارگل

سوڈا کلورائیڈ
سوڈا بائیکارب
پانی اس قدر ملائیں کہ ۲۰ اونس کھج جائے۔
ایک ڈرام
ایک ڈرام

ایسیرین ڈراپ
کشید شدہ پانی
آنکھ کی پٹی سیکڑنے کے لئے مفید ہے۔
۲ گرین
ایک اونس

۱۵۶۔ پرو فلیوین ڈراپ (بی، پی، سی)

پرو فلیوین بھی سلفیٹ
سوڈیم کلورائیڈ
کشید شدہ پانی اتنا ملائیں کہ ایک ملی لیٹر ہو جائے۔
ایگری فلیوین ڈراپ (نسخہ نمبر ۱۵۱) کی طرح استعمال کریں۔
۳۰۰ گرام
۹۱ گرام

۱۵۷۔ کیلومل بورک ایڈ پوڈر

کیلومل
بورک ایڈ
آنکھوں میں ڈسٹنگ کرنے کے لئے برائے بیاض چشم
مفید ہے۔
ایک ڈرام
ایک ڈرام

۱۵۸۔ ملیو آکسائیڈ

ملیو آکسائیڈ آن مری
لینولین
ویز لین سفید
سرخی و سوزش چشم کے لئے مجرب ہے۔
۴ گرین
۲ ڈرام
ایک اونس

۱۵۹۔ زنک بورک ایر ڈراپ

زنک سلفیٹ
بورک ایڈ
ریگٹی فائیڈ سپرٹ
کشید شدہ پانی اتنا ملائیں کہ سب ایک اونس ہو جائے کان کی سوزش کے لئے مفید ہے۔
۲ گرین
۸ گرین
۲ ڈرام

سوزش کے لئے مجرب ہے۔

۱۶۶۔ سلور نائٹریٹ پیٹ

سلور نائٹریٹ ۲۰ گرین
کشیڈ شدہ پانی ایک اونس
گلے کی سوجن کے لئے اسے بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیئے۔

۱۶۵۔ مینڈل پیٹ

آیوڈین پوٹاشیم آیوڈائیڈ پانی پیپرمنٹ آیل
۵ گرین ۱۵ گرین ۱۵ منم ۲ گرین
گلیسرین اتنی ملائیں کہ کل ایک اونس ہو جائے، گلے کی

(سالتوال حصہ) جلدی امراض کیلئے ادویات

۱۶۹۔ گھول پوٹاسی سلفر میٹاکم زنک پینی ٹرس

پوٹاسی سلفر میٹاکم ۱۰ گرین
زنک سلفاس ۱۰ گرین
پروپائی لین گلائی کول ۶۰ منم
امیسی فائی انک وکیس ۱۵ گرین
کاربو وکیس ۵۰ گرین
پانی اتنا ملائیں کہ کل ایک اونس ہو جائے۔ جلدی امراض خصوصاً خارش کے لئے مفید ہے۔

۱۷۰۔ گھول (لوشن) ہائے

۱۔ گھول سلور نائٹریٹ (آبی) ۶۲۵ فیصدی
۲۔ گھول الوسینم ایسی ٹریٹ ۱ فیصدی
۳۔ گھول جنشن وائیٹ ۱ فیصدی
۴۔ گھول پوٹاشیم پرینگنیٹ ۱۰۰ فیصدی
۵۔ گھول یوسال ۵ فیصدی
۶۔ گھول البیا ۲۰ گرین
پوٹاش سلفر میٹاکم ۱۰ گرین
زنک سلفاس

۱۷۱۔ گھول ایڈسلی سلک ایٹ ہائیڈ راج پرکلورائیڈ

مرکیورک کلورائیڈ ۱/۲ گرین
سلی سلک ایڈسلی ۱۰ گرین
کیٹر آیل ۵ منم
ایسی ٹون ایک ڈرام
سپرٹ میٹھی لیٹید ایک اونس
خارجی استعمال کے لئے بہترین دوا ہے۔ داد، چنبل، خارش کے لئے مجرب ہے۔

۱۷۸۔ گھول کلامینا، امولینٹ، ٹائیٹانیم ڈائی اکسائیڈ

کلامینا ۱۰ گرین
زنک اکسائیڈ ۵ گرین
ٹائیٹانیم ڈائی اکسائیڈ ۵ گرین
بنوٹائیٹ ۵ گرین
گلیسرین ۵ گرین
کشیڈ شدہ پانی ۱۰۰ سی سی
جلدی امراض کے لئے مجرب ہے۔ جلد کو نرم بناتی ہے۔

۱۷۴۔ گھول کلومینا آلی اوسا

گھول کلومینا ۱ ڈرام
آلو آئیل ۲ ڈرام
فوائد :- اگر یا اور جلدی امراض کے لئے مفید ہے۔

۱۷۵۔ گھول اکتھولین

اکتھول ۵ گرین
نکریلمبی سب ایسی ٹاس ۱ ڈرام
گلیرین امائی لم ۱ ڈرام
چونے کا پانی اتنا ملائیں کہ کل ایک ادس ہو جائے، اگر یا اور جلدی امراض کے لئے مفید ہے۔

۱۷۶۔ اپلی کیشن ہائے

بنزلی بنزویٹ ایک ادس
امسی فانی انگ وکیں ۳۵ گرین
پانی اس قدر ملائیں کہ کل ۴ ادس ہو جائے۔
فوائد :- چم جوڑوں اور خارش کے لئے مفید ہے۔

۱۷۷۔ دیگر

میٹھل ہائیڈروآکسی بنزویٹ ۲ گرین
امسی فانی انگ وکیں ۵۲ گرین
ویزلین زرد ۲۵ گرین
روغن مونگ پھلی ۱/۴ ڈرام
پانی اتنا ملائیں کہ کل ایک ادس ہو جائے۔
فوائد :- چم جوڑوں اور خارش کے لئے از حد مفید ہے۔

۱۷۸۔ دیگر

ڈرائی کوئین ۱۷/۴ گرین

سپرٹ ریجٹی فائیڈ ۳ ڈرام
کمفر وارٹنا ملائیں کہ کل ایک ادس ہو جائے۔

۱۷۹۔ گھول نوٹری الوبور

زنک سلفاس ۴ گرین
کاپر سلفیٹ ۴ گرین
سپرٹ ریجٹی فائیڈ ایک ڈرام
کمفر وارٹنا ملائیں کہ کل ایک ادس ہو جائے۔

۱۸۰۔ گھول تھائیو سلفیٹ و ودلی سلک الیڈ

الیڈ بنز ویک ۱۵ گرین
الیڈ سی سلک ۱۵ گرین
سپرٹ ریجٹی فائیڈ ۲ ڈرام
گھول سوڈا تھائیو سلفیٹ ۲۵ فیصدی اس قدر ملائیں کہ کل ایک ادس ہو جائے۔
فوائد :- دار، چنبل، خارش و دوسری جلدی امراض کے لئے مجرب ہے۔

۱۸۱۔ کلامینا گھول

کلامینا پر پریٹا ۱ ڈرام
زنک اوکسائیڈ ۱ ڈرام
نکریلمبی سب ایسی ٹاس ڈل ۱ ڈرام
گلیرین ۱ ڈرام
لام وارٹنا ملائیں کہ کل ایک ادس ہو جائے۔
نوٹ :-

۱۔ کاربالک ایڈ ضرورت ہو تو شامل کر سکتے ہیں۔
۲۔ جنشن وائیٹ ۵ گرین۔ اگر ضرورت ہو تو ملایا جاسکتا ہے۔
فوائد :- اگر یا اور جلدی امراض کے لئے مفید ہے۔

۱۸۲۔ ایلسی فائی انگ وکیس

سیٹوسٹی رائیل الکوحل ۹۰ گرام
سوڈا لارائیل سلفیٹ ۱۰ گرام
کشید شدہ پانی ۴ سی سی
امشن ہائے کی تیاری کے لئے۔

۱۸۳۔ کولاڈین

ایڈسلی سلک ۱۳ گرین
ایسی ٹون ۳۴ منم
ایسی ٹون کولاڈین اتنا ملائیں کہ کل دو ڈرام ہو جائے
بھوریاں و داعنوں کے لئے مجرب ہے۔

۱۸۴۔ ڈسٹنگ پوڈر

زنک اوکسائیڈ ۶ ڈرام
سٹارچ ۶ ڈرام
ٹانکم پوڈر ۶ ڈرام
بورک ایڈ ۶ ڈرام

۱۸۵۔ کریم ایڈسلی سلک کو

ایڈسلی سلک ۱۰ گرین
سلفر پرسی پیڈ ۱۵ گرین
پروپائی لین گلائی کول ۳۰ منم
ایلسی فائی انگ وکیس ۴۰ گرین
ویز لین زرد ۴۰ گرین
کاربو وکیس ۴۰۰۰ ۲۴۰ گرین

پانی اتنا ملائیں کہ کل ایک اونس ہو جائے !
فوائد :- اگر بیا، چنبل، داد، خارش اور دوسری جلدی امرا
کے لئے مجرب ہے۔

ایلسی فائی انگ وکیس ۳۵ گرین
کرسائی لین ۱۴۵ منم
سٹرونیلا آئیل ۵ منم
پانی اتنا ملائیں کہ کل بارہ اونس ہو جائے۔
فوائد :- مندرجہ بالا۔

۱۸۹۔ دیگر

لی تقین ۳۸۴ پشیل ایک اونس
وائٹ ہنزل آئیل ایک اونس
خارش و چم جوڑوں کے لئے مفید ہے۔

۱۸۰۔ وٹامن کیپ شولز

وٹامن اے ۲۵۰۰ یونٹ
وٹامن بی نمبر ۱ ۰۶۵ ملی گرام
وٹامن سی ۱۵ ملی گرام
وٹامن ڈی ۳۰۰ یونٹ
وٹامن بی نمبر ۲ ۰۶۵ ملی گرام
خوراک دو سے تین کیپ شولز روزانہ۔

یہ "ملٹی وٹامن" کے نام سے مارکیٹ میں بکثرت دستیاب
ہیں اور جنرل کمزوری کے لئے مفید ہیں۔

۱۸۱۔ پولیسٹس

بورک ایڈ ۶۰ گرین
سٹارچ ایک اونس
ٹھنڈا پانی دو اونس
سخت گرم پانی ایک پیٹ

زخموں اور بھوڑوں کے لئے عمدہ پولیسٹس ہے۔ پکانے
اور پھاڑنے یا تحلیل کرنے کے لئے مفید ہے۔

۱۸۶۔ کرمیور الیڈ سلی سلک ایٹ بنزائیک

الیڈ سلی سلک ۲۰ گرین
الیڈ بنزائیک ۲۵ گرین
املسی فائی انگ وکیس ۱۳۰ گرین
گلیرین ۲۰ منم

پانی اتنا ملائیں کہ کُل ایک ادس ہو جائے۔

فوائد:- داد، چنبل، خارشش، جلدی امراض وغیرہ کے لئے مجرب ہے۔

۱۸۷۔ کرمیور زنگائی

زنگ ادکسائیڈ ۱۲۰ گرین
وول فیٹ ۲۰ گرین
املسی فائی انگ وکیس ۲۰ گرین
اراجیز آریل ۴۸۰ گرین

کشید شدہ پانی اس قدر ملائیں کہ کُل دو ادس ہو جائے۔
فوائد:- جلدی امراض کے لئے مجرب ہے۔

۱۸۸۔ اری گینگ فلوئیڈز

لیکلک ایڈ ۶۰ گرین
صاف پانی ایک ادس
ڈوش کے لئے استعمال کیا جائے۔

۱۸۹۔ دیگر

کلور و آکسائی لی نول ۲ ڈرام
صاف پانی ایک پائینٹ

ڈوش وزخموں کو دھونے کے لئے استعمال کیا جائے، نہایت اعلیٰ اور مفید چیز ہے۔ زخموں کو اس سے صاف کرنے سے جلد آرام ملتا ہے۔

۱۹۰۔ دیگر

ہائیڈ راج آکسی سائینٹ ۵ گرین
صاف پانی ایک پائینٹ
ڈوش کے لئے اور زخم دھونے کے لئے نہایت مفید ہے۔

۱۹۱۔ دیگر

کلور امین "ٹی" ۵ گرین
صاف پانی ایک پائینٹ
ڈوش کے لئے اور زخموں کو دھونے کے لئے از حد مفید ہے۔

۱۹۲۔ لائیکوار ہائے

پوٹاسی پرمینگنیٹ ۵ گرین
صاف پانی ایک پائینٹ

۱۹۳۔ بروز گھول

الومین سلفیٹ ۱/۴ ادس
ایٹک ایڈ ۲/۴ گرین
کیلیم کارب ۱/۴ گرین
پانی اتنا ملائیں کہ کُل ۱۷ ادس ہو جائے۔
خشک کرنے والا لوشن ہے۔

۱۹۴۔ لائیکوار بوراکس ایٹ فارمالڈی ہائیڈ

بوراکس ۴۸ گرین
گھول فارمالڈی ہائیڈ ۹۵ منم
فینول ۱۵ گرین
کشید شدہ پانی ۸ ادس

خشک کرنے والا بہترین انٹی سپٹک گھول ہے۔

۱۹۵۔ لائیکوار سیٹری مائیڈ ڈی ٹر جرنز

سیٹری مائیڈ ۴۰ گرین
صاف پانی ۸ اونس
زبردست جراثیم کش گھول ہے۔

۱۹۶۔ لائیکوار سپولنس ایٹفرس

اولی اک ایڈ ۳۵ ملی لیٹر
پوٹاسیم ہائیڈرو آکسائیڈ بقدر ضرورت
صاف پانی بقدر ضرورت
الکوحل ۹۰ فی صدی ۱۵۰ ملی لیٹر
لونڈر آئیل ۲ ملی لیٹر
سائونٹ ایٹفر اتنا ملائیں کہ ۱۰۰۰ ملی لیٹر ہو جائے۔

۱۹۷۔ پیٹ لاسرز

زنک اوکسائیڈ ۱۱۵ گرین
سٹارج ۱۱۵ گرین
سلی سلک ایڈ ۱۰ گرین
ویز لین سفید ۱/۲ اونس
نوٹ :- اس میں لکڑی کے کارٹ لیو آکسائیڈ
آف مرکری، اکتھول یا برلینٹ گرین بھی شامل
کر سکتے ہیں!

۱۹۸۔ پیٹ ایڈ سلی سلک کم ڈائی ٹھرانول

ڈائی ٹھرانول ۱/۲ گرین
لاسز پیٹ ایک اونس
داد، چنبل، خارش، رنگ ورم اور دھوبی خارش کے
لئے مفید ہے۔

۱۹۹۔ پیٹ پکس میٹس

لائیکوار پکس کارب ۱۵ منم
زنک اوکسائیڈ ۲۰ گرین
بورک ایڈ ۲۰ گرین
سٹارج ۱۲۰ گرین
اسی فانی انگ ویکس اتنا ملائیں کہ کل ایک اونس
ہو جائے۔

۲۰۰۔ پیٹ ٹائی ٹانیم ڈائی آکسائیڈ

ٹائی ٹانیم ڈائی آکسائیڈ ۲۰ فیصدی
زنک اوکسائیڈ ۲۵ فیصدی
کے اولین ۱۰ فیصدی
فرانی آکسائیڈ ۲ فیصدی
گلیسرین ۱۵ فیصدی
کلورو کریازول ۶۱ فیصدی
پانی اتنا ملائیں کہ کل ۱۰۰۰
سی سی ہو جائے۔

۲۰۱۔ پچھنم کلورڈیسی کمپاؤنڈ

کلورل ہائیڈریٹ ۲۰ گرین
فینول ۲۰ گرین
کمفر ۱۲۰ گرین
منٹھول ۲۰ گرین
دردوں کے لئے بیرونی استعمال کے لئے مفید ہے۔

۲۰۲۔ پچھنم میگنیٹا

بیک فینوشین ۲ گرین
فینول ۱۸ گرین

پانی اتنا ملائیں کہ کل ایک اونس ہو جائے۔

۲۰۷۔ انگنٹم الکوحل لینا (مرہم لینولین)

۴ حصہ ۱۰۰ حصہ ۲۲ حصہ ۱۰ حصہ ۴۰

دول الکوحل
پیرافین ہارڈ
پیرافین ویزلین
پیرافین لکوڈ

جلدی امراض کے لئے مجرب دوا ہے۔

۲۰۸۔ انگنٹم اکودسم

۵۰ حصہ ۵۰ حصہ

انگنٹم الکوحل لینا
کشید شدہ پانی

جلدی امراض کے لئے مفید ہے۔

۲۰۹۔ انگنٹم املسی فی کنسز

۲۰ حصہ ۲۰ حصہ ۲۰ حصہ

لنٹ وکیس
لکوڈ پیرافین
پیرافین سافٹ ویزلین

جلدی امراض کے لئے مفید ہے۔

۲۱۰۔ انگنٹم ہائیڈرارج امونی ایٹا

ایک حصہ ۹۹ حصہ

مرکری امونی ایٹا
سادہ مرہم

جلدی امراض کے لئے مجرب ہے۔

۲۱۱۔ انگنٹم سلفر (مرہم گندھک)

۱۰ حصہ ۵ حصہ ۲۰ حصہ

پرسی پیڈ سلفر
مرکری امونی ایٹا
لینولین

۲۱/۴ گرین ۲۵ گرین ۲۰ منم ۲۰ منم

بورک ایڈ
ریزاسی نول
ایسی ٹون

سپرٹ میٹی لیٹڈ
ڈسٹلڈ واٹر اتنا ملائیں کہ کل ایک اونس ہو جائے۔
اگزیم، جلدی امراض اور پھوڑا پھنسی کے لئے از حد مفید ہے۔

۲۰۳۔ پگنٹم فینول ایٹ کمفر

۲۰ گرین ۹۰ گرین

فینول
کمفر

داد، چنبل، خارش اور جلدی امراض کے لئے مفید ہے۔

۲۰۴۔ پگنٹم پوڈوفانی لائی

ایک ڈرام ۲ ڈرام

ریزن پوڈوفانکٹم
میٹی لیٹڈ سپرٹ

جلدی امراض کو خشک بنانے کے لئے مفید ہے۔

۲۰۵۔ پگنٹم پکس کارب

۲۰ گرین ۲۰ منم

کولٹار
گلیسرین

ایسی ٹون اتنا ملائیں کہ کل ایک اونس ہو جائے۔
اگزیم اور جلدی امراض کے لئے مفید ہے۔

۲۰۶۔ پگنٹم وائیلا کرسٹالائی ناکو

ایک گرین ایک گرین ۱/۲ گرین

برلینٹ گرین
کرسٹل وائیٹ
پروفلوین ہمی سلفیٹ

ویز لین اتنی ملائیں کہ کل ۱۰ حصہ ہو جائے۔
جلدی امراض وچم جوؤں کے لئے مفید ہے۔

۲۱۲۔ انگنٹم سلی سلائیٹ ٹار

مرکری امونی ایٹا ۵ گرین
ایڈ سلی سلک ۱۰ گرین
لکریکس کارب ۱ ڈرام
آئیل آف کیڈ ۱ ڈرام
لینولین ۲ ڈرام
انگنٹم ایلسی فی کنز نمبر ۷۰ اتنی مقدار میں ملائیں کہ

۲۱۳۔ مرہم سادہ


لینولین ۸ حصہ
پیرافین ہارڈ ۱۰ حصہ
ویز لین سفید ۸۵ حصہ
مرہموں کی تیاری میں استعمال کی جاتی ہے۔

نوٹ :- فارما کوپیاء میں انیم بسنکھیا، پارہ وغیرہ کے مرکبات
باحتیاط استعمال کرائیں، اور مریض کے مزاج و عمر کے مطابق دیں!



صحت کی حفاظت کیلئے مفید باتیں

- ۱۔ سورج نکلنے کے وقت مت سوتے رہو۔ جمائی کے وقت منہ پر ہاتھ رکھو۔ لوگوں کے سامنے انگریزی نہیں لینی چاہیے۔
- ۲۔ صحت کی حفاظت کے متعلق سستی نہیں کرنی چاہیے۔ کھانے پینے میں اعتدال سے کام لینا چاہیے۔
- ۳۔ لائق طبیب کی پہچان یہ ہے کہ اُسے غور نہ ہو اور جو امور درمیش آئیں ان میں استقلال کو ہاتھ سے نہ دیں۔ کوئی شخص بُرا کہے غصہ نہ آئے۔ اگر کوئی تعریف کرے تو کھنڈ نہ آئے تو سمجھ دیجئے کہ اس میں حکمت نے اپنی خوبی پیدا کر دی ہے۔
- ۴۔ علم خدا (پر ماتما) کی بڑی بخشش ہے۔ حکمت خدا (پر ماتما) کا عطیہ ہے جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے۔ فنِ حکمت زندگی کی رُوح ہے اور تمام علوم اور ادب کا سردار ہے۔
- ۵۔ تازہ دودھ کا اپنی ہمت اور برداشت کے مطابق روزانہ استعمال جسم کی بنیادی رطوبتوں کی حفاظت، ادویہ سے نجات، قیامِ صحت کی دائمی ضمانت ہے۔
- ۶۔ گائے کا دودھ انسان کو قبل از وقت بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔
- ۷۔ دودھ کے ساتھ اور چیزوں کے استعمال سے برص (پھلہری) اور کوڑھ کا اندیشہ ہے۔
- ۸۔ دہی کے ساتھ مٹولی یا گوشت مرغی یا چوزہ کھانا مضر صحت ہے۔
- ۹۔ چکنی اور شیریں چیزیں کھا کر فوراً پانی پینا بہت ہی نقصان دہ ہے۔ کیونکہ اس سے کھانسی و دق ہو جانے کا خطرہ ہے۔
- ۱۰۔ دورانِ غذا کم پانی پینے سے کھانا خوب ہضم ہوتا ہے۔
- ۱۱۔ صبح و شام کی پیدل سیر صحت کے لئے از حد مفید ہے۔



ستائیسواں باب

آج کی ادویات (TO DAY'S DRUGS)

”ساج الحکمت اپریٹس آڈن میڈسین“ میں ہر بیماری کے ساتھ نئے نئے ماڈرن ڈاکٹری علاج درج ہیں۔ پھر بھی ہر ادویات اور نئی مارکیٹ میں آئی ہیں اور وہ مفید ثابت ہو رہی ہیں۔ اُن کی تفصیل درج ہے۔ مرلین کی عمر مزاج و مرض کے مطابق دیں۔ اور بچوں کو بلحاظ عمر دیں۔

دوسرے: کالپول (Calpol) یا فبریکس (Febrex) یا میٹاسن (Metacin) یا پیری جیک (Pyrigesic) بلحاظ عمر سے ایک گولی پانی یا چائے سے دیں۔ بچوں کے لئے اس کا سیرپ دیں۔ یہ بخار کو بھی اتارتی ہیں یا مائیکرو پیرین (Micropyrin) دیں۔ درد و نیند لانے کے لئے پارون (Parvon) ایک کیپ ٹولز دیں یا کول پیرین (Colsprin) استعمال میں لائیں۔

آدھے سر کا درد: سیٹیل (Stemetil) آدھے سر کا درد دقت، متلی و دماغی الجھن میں مفید ہے۔ ایک گولی کھانا کھانے کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد دیں۔

بے خوابی: اس مرض کے لئے ڈایازی پام سے بنی ہوئی ادویات استعمال کی جاتی ہیں۔ اس سلسلہ میں لوپالم (Lopalm) کالمپوز (Calmpose) یا ولیم ۵ (Valium-5) ایک گولی پانی سے دیں۔ بے خوابی، بے چینی، گھبراہٹ، اختناق، گرم و امنیٹھ کے لئے مفید ہیں۔

ورم دماغ: سرسام: آکسی ٹیٹراسائیکلین (Oxytetra Cycline) یا ہوٹا سائیکلین، ایکرو مائی سین یا لوپی سائیکلین

۲۵۰ ملی گرام کیپ شولز ہر چھ گھنٹہ بعد کھانا کھانے کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد پانی سے دیں۔

آج کی ادویات میں ایپی سلین یا کمبی سلین (Combicillin) یا روسلین (Roscillin) یا البرسلین (Albercillin) ۲۵۰ ملی گرام کیپ شولز ہر چھ گھنٹہ بعد دیں، ۵۰۰ ملی گرام سے دست لگ جاتے ہیں۔ اس لئے ۲۵۰ ملی گرام خوراک ہی کافی ہے۔ یہ سرسام کے علاوہ ہر قسم کے ورم و انفیکشن میں مفید ہیں۔ بچوں کو بلحاظ عمر شربت دیں۔ پینی سلین کی طرح یہ بھی ری ایکشن کرتی ہیں۔ اس لئے قے، متلی، آبکالی یا چھپا کی ہونے پر ان کا استعمال بند کر دیں۔

ال تھرو سین (Althrocin) یا ارانی تھرو سین (Erythrocin) یا تھرو مائی (Thromycin) کا استعمال بھی کرایا جاتا ہے۔ ایک گولی ہر ۶ گھنٹہ بعد دیں۔ بچوں کے لئے شربت دن میں دو بار دیں۔ اگر اس سے جی متلانے لگے یا دست لگ جائیں تو فوراً بند کر دیں۔ اس سلسلے میں راکسی مول (Roximol) یا راکسڈ (Roxid) یا راکسی رول (Roxyrol) ۱۵۰ ملی گرام ہر ۶ گھنٹہ بعد دیں، بارہ سال سے اوپر کے بچوں کو ۵۰۰ ملی گرام دیں یا رو واما ئی سین (Rovamycin) کی گولی یا شربت بلحاظ عمر دیں۔

نسیان۔ مھول جانا۔ نروی ٹون (Nervitone) یا بی نیوروفاس (B-Neurophos) یا بیٹون (Betonin) یا کینی ٹون (Kinetone) ایک ایک تھچہ دن میں تین بار کھانا کھانے کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد دیں۔

مرگی۔ میزٹی ڈل (Mazetol) یا مائی سولین (Mysoline) بلحاظ عمر ۱/۲ سے ایک گولی پانی سے رات کو سوتے وقت دیں۔
ریجی درد۔ میڈی کریم (Medicreme) یا ملٹی جیک (Multigesic) آسٹینٹ کی مالش کریں۔ کھانے کیلئے کبھی فلیم (Combiflam) یا کرو سین آئبو (Crocine Ibu) یا کالپول پلس (Calpol-Plus) ایک گولی صبح و شام کھانا کھانے کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد پانی سے دیں۔ یہ عصبی درد، کمزور دانتوں کے درد میں مفید ہے۔

کمزور۔ پیرن (Parafon) یا ریلیکس گولیاں (Relaxyl Tab) ایک گولی صبح، دوپہر اور شام کو بلحاظ مرض دیں۔ زیادہ تکلیف میں میفتال فورٹ (Meftal Forte) ایک کیپ شولز درد کی حالت میں دیں، فلیمر کریم (Flamer Cream) یا پائرس جیل (Piroxgel) یا سیسٹا فلیم جیل (Systaflam) کی مالش کریں۔

آنکھ دکھنا۔ پیری مون (Pyrimon) آئی ڈرائپس یا کلیرین (Clearine) آئی ڈرائپس یا سبران (Cebiran) آئی ڈرائپس یا سپلاکس (Ciplox) آئی ڈرائپس یا انساما ئی سین (Ensamycin) آنکھوں سے پانی بہنے، سرخی و جلن کے لئے مفید ہے۔
سوزش چشم کی حالت میں جیرامائی سین (Garamycin) یا جنٹی سین (Genticyn) یا الفلاکس آئی ڈرائپس (Alflox - Eye Drops) استعمال کریں۔

رتوندا۔ رات کو اندھیرے میں کچھ نظر نہ آئے تو ایکواسول (Aquasol A) ایک کیپ شولز روزانہ کھانا کھانے کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد پانی سے دیں۔

_____ نظر کی کمزوری، رات کو نظر نہ آئے یا اچانک نظر جاتے رہنے سے بسکپرا (پیزواہ) بوٹی کا استعمال بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔ اس بوٹی کا بیان "تاج العقاقیر ہندوستان کی جڑی بوٹیاں" (بال تصویر) مصنف حکیم ڈاکٹر ہری چند ملتانی پانی پت میں دیکھیں۔ جلد ۸ میں اس بوٹی کا بیان درج ہے۔ یہ کتاب جلد ۸ تا ۸ یکجا مجلد یا صرف جلد ہشتم "نزالا جوگی پبلی کیشنز پانی پت (انڈیا)" سے منگاسکتے ہیں۔

کان کا درد۔ شدید درد میں کاربوٹائل (Corbutyl) یا ڈیکو وون (Dexovon) یا سدھینول (Sudhinol) یا نارمیک

(Norgesic) ایک گولی پانی سے دیں۔ حاملہ و بچوں کو با احتیاط دیں۔ کان میں سوجن ہو تو اینٹی بائیوٹک ادویات کا استعمال کریں۔
 نکحیر:- کیڈی سپر سسی (Cadisper-C) ایک گولی صبح، دوپہر و شام پانی سے دیں۔ یا سٹیلان (Styplon) ایک گولی صبح اور شام پانی سے دیں۔ یہ نہ صرف نکحیر بلکہ کہیں سے بھی خون جاری ہو، روکنے میں مفید ہے۔

زیادہ چھینکیں آنا:- زیٹ (Zeet) ایک گولی پانی سے دیں۔ یہ اینٹی الرجک ہے۔
 نزلہ و زکام:- ایکٹی فڈ (Actifed) یا اسکولڈ (Eskold) یا مبرائل (Mebryl) ایک گولی صبح و شام پانی سے دیں۔
 یا کونٹک سی سی (Contac C-C) ایک ایک گولی صبح و شام پانی سے دیں یا سیزل (Cinaryl) ایک سے دو چھپے ہر چھ گھنٹے بعد دیں یا اسکولڈ (Eskold) ایک کیپ شولز صبح و شام پانی سے دیں۔ اس کا شربت بھی دستیاب ہے۔

مسورھوں کی سوجن:- ڈینٹون (Dentone) یا ذیتی (Zytee) دن میں تین چار بار پھر بری سے مسورھوں پر لگائیں۔
 گلے پڑنا:- ڈاکسی سائیکلین (Doxycycline) یا ٹیٹرا ڈاکس (Tetradox) یا وی ووسائیکلین (Vivocycline) ۱۰۰ ملی گرام کیپ شولز دن میں دو بار پانی سے دیں۔

کن پیرے:- اوماکسی پن (Amoxipen) یا فلیموکسین (Flemoxin) یا نوواموکس (Novamox) ۲۵۰ ملی گرام کیپ شولز بلحاظ عمر و مرض دن میں ۲ سے ۳ بار دیں۔ اس کا شربت بھی دستیاب ہے۔

کھانسی:- ایول ایکسپیکٹورنٹ (Avil Expectorant) ایک ایکٹ چھپے دن میں دو سے تین بار دیں۔ الرجی والی کھانسی کے لئے مفید ہے، یا لپی ہسٹ (Lupihist) یا کوسوم (Cosome) ایک سے دو چھپے دن میں دو سے تین بار دیں۔ بچوں کو بلحاظ عمر استعمال کرائیں۔

دُمہ:- وینٹارلین (Ventorlin) ایک ایکٹ چھپے دن میں تین بار دیں یا اس کے کیپ شولز استعمال کرائیں یا اسٹھالین (Asthalin) دو ملی گرام کی گولی دن میں ۲ سے ۳ بار پانی سے دیں یا اسٹھالین ایکسپیکٹورنٹ ایک ایکٹ چھپے ہر چھ گھنٹے بعد دیں یا بریکانی (Bricany) ایک ایک گولی دن میں ۲ سے ۳ بار پانی سے دیں۔

خون تھوکنہ:- جو ادویات اوپر نکحیر کے بیان میں آچکی ہیں۔ وہی ادویات اس مرض میں بھی مفید ہیں۔
 دردِ دل:- ڈل کانٹن (Dilcontin) ۶۰ ملی گرام گولی میں سے پُر گولی صبح و پُر گولی شام کو پانی سے دیں اور ۱۰۰ ملی گرام کول سپرین (Colsprin) پُر گولی روزانہ لیں۔ تناؤ و مایوسی سے بچیں۔ گھی مکھن تیل چھوڑ دیں۔ دودھ بالائی اتار کر لیں۔ سگریٹ شراب، گوشت بھی نہ لیں۔ اور روزانہ پُر گھنٹہ شو پر ماتما (خدا) و اگورو کی یاد میں بیٹھیں، تو بائی پاس سرجری سے بھی بچ جائیں گے۔

خون کے دباؤ میں کمی:- سینٹی وینی (Santevini) یا بارٹانک (Bayer's Tonic) یا نیور ونا سفیٹ (Neuro Phosphates) دو دو چھپے برابر پانی ملا کر کھانا کھانے کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد دیں۔ یا شارکو فیرول (Sharko - Ferrol) بڑوں کو دو چھپے دن میں ۲ سے ۳ بار دیں۔ بچوں کو بلحاظ عمر ایک ایکٹ چھپے دن میں ۲ سے ۳ بار دیں یا کو باڈیکس فورٹ (Cobadex Forte) یا سکسن (Cebexin) ایک گولی روزانہ پانی سے دیں۔ مریض کو تناؤ و فکر سے بچنا چاہیے۔ نمک کا استعمال کرنا چاہیے، نمک بولڈ پریشر کا بناؤ علاج ہے۔ دہی، یستی، جوس نہ دیں۔ یہ بولڈ پریشر کے لئے نقصان دہ ہیں۔

خون کے دباؤ کی زیادتی:- سپلار (Ciplar) یا پٹاکارڈ (Betacard) مرض کے مطابق ۵۰ ملی گرام صبح اور شام دیں، یا کیلیسی گارڈ (Calci Gard) ایک ایک کیپ شولز صبح و شام پانی سے دیں یا ڈیپن (Depin) یا انواس (Envas)

یافنڈین (Nefedine) ایک ایک گولی صبح و شام کھانا کھانے کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد پانی سے دیں۔ پریشانی و تناؤ سے بچیں۔ منک بالکل چھوڑ دیں۔ وہی کا استعمال کریں۔ ادر خدا (شو پر ماتا)، واگور و کو صبح و شام کم از کم ہر گھنٹہ یاد کریں۔ اس سے بنا دوا آرام آجائے گا۔ پیرٹ درو۔ ٹرائی گان (Trigan) یا سپازمین ڈان (Spasminon) یا سائیکلوپام (Cyclopam) ایک گولی شدید درد کی صورت میں دیں۔ یہ نیند لاتی ہے۔ کمزور مریضوں کو احتیاط سے دیں۔ شدید پیٹ درد میں پارون پاس (Parvonspas) یا میفل سپاس (Meftal Spas) ایک ایک کیپ ٹولز پانی سے دیں۔

بدھنمی:- میری زائم الیگز (Merizyme Elixir) یا لپی زائم (Lupizyme) یا مول زائم (Molzyme) دو دو چمچ صبح و شام برابر پانی ملا کر کھانا کھانے کے بعد دیں۔ یا ڈائی جین جیل (Digene Gel) یا جیلوسل (Gelusil) دو دو چمچ کھانا کھانے کے بعد دیں یا اسی نام سے ملنے والی گولیاں چوبیس یا ڈائیو جیل (Disogel) یا سلکوجن (Siloxogene) دو دو چمچ برابر پانی ملا کر کھانا کھانے کے ہر گھنٹہ کے بعد صبح و شام دیں۔

قے، متلی:- پیری نورم (Perinorm) یا ریگلان (Reglan) یا ڈومسٹل (Domstal) ایک گولی پانی سے دیں۔ بچوں کو اس کا سیرپ بلحاظ عمر دیں۔

خونی قے:- جو ادویات نکسیر کے بیان میں آچکی ہیں۔ وہی استعمال کرائیں۔

اسہال:- انٹروکونال (Entero-Quinol) یا لوموفن (Lomofen) ایک ایک گولی دن میں تین بار پانی سے دیں۔ دودھ چائے سے پرہیز ضروری ہے۔ خوراک میں کھچڑی دیں۔ یا ڈپنڈل ایم (Dependal-M) یا فلیجیل ایف (Flagyl) ایک ایک گولی دن میں تین بار پانی سے دیں۔ بچوں کو بلحاظ عمر اس کا سیرپ دیں فورکسن (Furoxone) ایک ایک گولی دن میں تین بار دیں۔ بچوں کو سیرپ دیں۔ دستوں کی زیادہ تکلیف میں امودیم (Imodium) دو ملی گرام ہر گھنٹہ بعد پانی سے دیں۔ ساتھ ہی الیکٹرال پوڈر پانی گرم کر کے ٹھنڈا کر کے اس میں دو دو چمچ گھول کر پلاتے رہیں یا ایوسک، ایف (Imosec-F) پرانی انفیکشن والے دستوں میں ہر گھنٹہ بعد ایک کیپ ٹولز دیں۔ بچوں کو اس کا شربت بلحاظ عمر دیں یا بیکٹومٹ (Bactomet) یا نیگادیکس ایم (Negadix-M) ایک ایک گولی صبح و شام پانی سے دیں۔ بچوں کے لئے بلحاظ عمر اس کا سپینشن دیر۔ اسہال اطفال کے لئے کیلیٹن ورنیو مائی سین (Kaltin With Neomycin) یا پیکٹو کیب سپینشن یا دالامائی سین سپینشن (Walamycin Susp.) ۱/۲ سے ایک چمچ بلحاظ عمر دیں۔ یہ ادویات اسہال خونی کے لئے بھی مفید ہیں۔


قبض:- شدید قبض میں ڈکولکس سپوسٹریس (Dulcolax Suppo sitores) کا غذا تار کر مقلد میں ڈالیں یا پریکٹو کیلیس (Practo lyse Anema) کا استعمال کریں۔

انہما

— یہ نئی تحقیقات ہے۔ اس میں ایک سیال بھرا ہوتا ہے۔ ایک نلی اور ٹیوب بھی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ نلی کو لیٹے ہوئے مریض کی مقعد میں داخل کر کے ٹیوب کو دبا کر مقعد کے راستے سے مکمل سیال داخل کیا جاتا ہے۔ جس سے آسانی سے پاخانہ خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ماڈرن انہما نہایت آسان ہے۔ معالجین اسے کہیں بھی لے جاسکتے ہیں۔ اس میں صابن، نیم کرم پانی و کیسٹرائیل کا سیال بنانے کا جھنجھٹ نہیں ہے۔

حکیم ڈاکٹر ہری چند ملتانی، پانی پت (انڈیا)

پیٹ کے کیڑے:- می بیکس (Mebex) یا وارمن (Wormin) یا منڈازول (Mendhazole) کھانا کھانے



کے پراگھنٹہ بعد ایک گولی صبح و شام تین دن تک دیں۔ بچوں کے لئے اس کا شربت بلحاظ عمر ایک چمچ صبح اور ایک شام تین دن تک دیں یا ڈی ورس ۱۵۰ (Dewormis-150) ایک گولی رات کو دیں۔ بچوں کو بلحاظ عمر ڈی ورس ۵۰ ایک گولی رات کو پانی سے دیں۔

ہم اسے تجربات کے مطابق پریت کے کیڑوں کی کوئی دوائی کھلانے سے پراگھنٹہ پہلے گڑ یا چینی کھلا دیں۔ اس سے کیڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور دوائی سے آسانی سے خارج ہو جاتے ہیں۔
حکیم ڈاکٹر سری چند ملتان پانی پت (ہریانہ)

لو اسیر:- بیرونی استعمال کے لئے اینوویٹ (Anovate) یا اینوسول ایچ (Anusol-H) بیرونی مرہم لگائیں۔ کھانے و لگانے کی دیگر ادویات کے لئے کتاب ہذا کا نواں باب دیکھیں۔

کمزوری جگر:- مہم اپ (Haemup) کیپ شولز ایک صبح و ایک شام دیں۔ شربت بھی دستیاب

ہے، دو چمچ صبح، دو چمچ شام برابر پانی ملا کر دیں یا ہیپ فورٹ (Hepp Forte) دو دو چمچ برابر پانی ملا کر کھانا کھانے کے پراگھنٹہ بعد دیں یا ڈیکسورینج پلس سیرپ (Dexorange Plus Syrup) دو دو چمچ برابر پانی ملا کر کھانا کھانے کے پراگھنٹہ بعد دیں یا ہیپوگلوبین (Heptoglobine) دو دو چمچ برابر پانی ملا کر صبح و شام کھانا کھانے کے پراگھنٹہ بعد دیں یا لیور نٹ آرن (Liver Nut Iron) شربت دو چمچ برابر پانی ملا کر کھانا کھانے کے پراگھنٹہ بعد دیں یا ایک کیپ شولز صبح و شام کھانا کھانے کے پراگھنٹہ بعد صبح و شام پانی سے دیں۔ خون کی کمی، فولاد کی کمی، بیماریوں کے بعد کی کمزوری میں مفید ہے یا ڈیپلی کول (Delphicol) یا سوربیلین (Sorbiline) دو دو چمچ دن میں دو بار پانی ملا کر دیں یا ایسنٹیل (Assentiale) ایک ایک کیپ شولز صبح، دوپہر و شام کو پانی سے دیں۔ درد گردہ:- میفل سپاس (Meftal Spas) ایک کیپ شولز درد کے وقت پانی سے دیں یا بسکوپان (Buscopan) ایک گولی شدید درد میں پانی سے دیں۔

گردے کی کمزوری:- ایکس نیس فورٹ (Xenex Forte) یا بیکاسول زیڈ (Becasule-Z) یا زیوٹ (Zevit) ایک کیپ شولز ہر روز کھانا کھانے کے پراگھنٹہ بعد پانی سے دیں۔

پیشاب رک جانا:- لاسیکس (Lasix) یا سیلی نیس (Salinex) ایک گولی پانی سے دیں یا سپائرو مائیڈ (Spiro-mide) یا یوری سپاس (Urispas) ایک ٹمیکہ پانی سے دیں یا ڈائی ٹائیڈ (Dytide) کھانا کھانے کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد ایک گولی پانی سے دیں۔

پیشاب میں خون آنا:- کیڈی سپرسی (Cadisper-C) یا سیپلان (Syplon) مرض کے لحاظ سے صبح اور شام ایک ایک گولی پانی سے دیں۔

ذیابیطس:- ڈی۔ بی۔ آئی (D.B.I.) ایک ایک ٹمیکہ بلحاظ مرض دیں یا گلائینز (Glynase) پراگھنٹہ پانی سے دیں۔

ذیابیطس (مضمومہ) کے علاج کے لئے کریلا کارس، جامن کے پتوں کا جوشانہ اور عتیقی خشک کے سفوف

کا استعمال مجرب ثابت ہوا ہے۔ یہ نئی تحقیقات "ذیابیطس کا علاج" کتاب (اردو یا ہندی) مسنت حکیم و ڈاکٹر سری چند ملتان پانی پت (انڈیا) میں چھپی ہیں۔ اسے نرالا جوگی سہی کیشنز پانی پت (انڈیا) سے منگایا جاسکتا ہے۔

پرسوت کا بخار:- سپٹران (Septran) یا سیناسٹٹ (Synastat) ایک ایک گولی بلحاظ عمر دن میں تین بار دیں یا اینڈو مائی سین

(Erythromycin) ایک ایک گولی کھانا کھانے کے ۱/۲ گھنٹہ بعد تازہ پانی سے دیں۔ زیادہ تکلیف میں روسی لین (Roscallin) یا امپیسیلین (Ampicillin) ۲۵۰ ملی گرام کا کیپ شولز ہر چھ گھنٹہ بعد دیں۔ مینی سلین کی طرح یہ بھی ری ایکشن کرتی ہے۔ اگر قے، متلی، چھپاکی کی تکلیف ہو جائے تو اسے فوراً بند کر دیں۔

فیمیلی پلاننگ :- لوپ اور کاپرٹی دو بچوں کے درمیان وقفہ رکھنے کا آسان اور بڑھیا طریقہ ہے۔ یہ پہلے بچے کو روکنے کے لئے استعمال نہیں کئے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کئے جاتے ہیں۔ مریض کی سہولیت کے مطابق کسی بھی دن اور کبھی بھی لگوائے جاسکتے ہیں یا حمل روکنے کے لئے کھانے کی گولیاں اور پلز کا استعمال عورتوں کے لئے سب سے زیادہ مفید ہے۔ پچھلے چھ ماہ میں یرقان یا جگر کا کوئی مرض ہو یا مائگرن، مرگی، دمر، ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، امراض دل، چھاتی یا بچہ دانی کا کیفر ہو تو اس کے لئے ان گولیوں کا استعمال منع ہے۔ فیمیلی پلاننگ کے دیگر طریقوں و نسخوں کے لیے کتاب ہذا کا سولھواں باب دیکھیں۔

بچوں کی بیماریاں :- دستوں کے لئے کیلٹن و دنیو مائی سین پرپ (Kaltin with Neomycin) یا پیٹھو کیب سپینشن یا والامائی سن سپینشن (Walamycin Susp) ۱/۲ سے ایک چمچ بلحاظ عمر دیں۔ بچے کو دودھ چاتے سے پرہیز کرائیں۔ اسہال کے بیان میں جو سپینشن بچوں کے لیے لکھے گئے ہیں۔ وہ بھی مفید ہیں۔

بسترہ کے زخم :- بیٹاڈین آئینٹمنٹ (Betadine Oint) یا صوفز مائی سین سکن کریم (Soframycin Skin Cream) بیرونی استعمال کریں، اور اندرونی سمیکسل (Symoxyl) ۲۵۰ ملی گرام کے کیپ شولز بڑوں کے لیے دن میں ۲ سے ۳ بار دیں۔ بچوں کے لئے سپینشن ۱/۲ سے ایک چمچ دن میں ۲ سے ۳ بار دیں یا سپوریدکس (Sporidex) یا سپلاکس ۲۵۰ ملی گرام دن میں ۲ سے ۳ بار دیں۔

اگزیم :- بیکلٹ - این (Beclate-N) یا کوادری ڈرم (Quadriderm) آئینٹمنٹ بیرونی استعمال کریں۔ مقام مرض پر صابن نہ لگائیں۔

سورائیس :- ٹینوویٹ کریم (Tenovate Cream) دن میں ایک دو بار بیرونی لگائیں یا زووت - بی - این (Zovate-G.N.) آئینٹمنٹ بیرونی صبح و شام لگائیں، یا ٹوپی فورٹ کریم (Topi Forte-Cream) کا بیرونی استعمال کریں کسی قسم کا صابن نہ لگائیں اور گرم خوراک سے پرہیز کریں۔

چھپاکی :- ڈیلوسن (Dilosyn) یا فورسٹل (Foristal) یا سلٹون (Celestone) ایک گولی صبح و شام پانی سے دیں۔

مہاسے :- رٹینو - اے - کریم (Retino-A Cream) یا کلیر سیل کریم (Clersil Cream) یا ایوڈینا کریم (Eudena Cream) کا استعمال کریں۔ اگر مئے ابھرے ہوئے ہوں تو ان پر آہستہ آہستہ پھٹکڑی سفید پانی سے رگڑیں۔ زور سے رگڑنے سے خون آجائے گا۔ اس لئے آہستہ آہستہ رگڑیں۔ ایک ہفتہ میں مئے گر جائیں گے۔ دوبارہ نہیں ہوں گے، بیت (گھموریاں) :- نائیل یا بورو پلس یا جانسن پر کلی ہیٹ پوڈر میں سے کوئی ایک پوڈر لگائیں۔

تپ محرقہ :- پراکسن (Paraxin) ۲۵۰ ملی گرام کیپ شولز مرض کے مطابق دن میں تین بار پانی سے دیں۔ ہنار موکھ نہ دیں۔ بچوں کو اس کا سیرپ ایک سے دو چمچے دن میں دو سے تین بار دیں۔ اس کے ساتھ ڈٹامن بی کمپلیکس بھی دیتے رہنا کمزوری کے لئے مفید ہے۔

”تاج الحکمت (پریکٹس آف میڈیسن) کے بیواں باب میں دیئے گئے تپ محرقہ کے بیان میں کلوم فینی کال سے متعلق ادویات و مندرجہ بالا علاج پر اس کو زیادہ دنوں تک استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کئی بار ان سے متعلق دست لگ جاتے ہیں۔ اور خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس لئے انہیں احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔

علاوہ ازیں ”تاج الحکمت (پریکٹس آف میڈیسن) خریدتے وقت درجنوں رنگین تصاویر سفید موٹا کاغذ کل ۲۸ باب رکبین کی ہنری جلد مصنف کا فوٹو اور نرالا جوگی پبلیکیشنز پانی پت دیکھ کر خریدیں۔ تاکہ آپ کو بندہ کی صحیح کتاب مل سکے اور آپ نقالوں سے بچ سکیں۔

بندہ حکیم ڈاکٹر ہری چند ملتان، گولڈ میڈلسٹ، پانی پت (انڈیا) موسمی بخار :- بچاؤ کے لئے میٹاکالفن (Metakelfin) ایک گولی بڑوں کو ہفتہ میں ایک بار دیں۔ علاج کے لئے دو گولی ہفتہ میں صرف ایک بار دیں۔ بچوں کو بلحاظ عمر دیں۔ خرابی جگر، یرقان، کمی خون کے کمزور مریضوں، حاملہ اور دودھ پلانے والی مائوں کے لئے اس کا استعمال سخت منع ہے۔ اس دوا کے ساتھ و بعد میں بھی دودھ و پھلوں کا رس دیں۔ پانی بھی زیادہ پلائیں یا کروڈکسن۔ ایف ایم (Croydoxin-F.M.) یا میلوسائیڈ (Malocide) یا پارالفن (Pyralfin) مندرجہ بالا طریقہ سے استعمال کریں۔ موسمی بخار (ملیریا) کے لیے بیٹا کوئن (Betaquine) یا لہریاگو (Larigo) یا میلوبرین (Melubrin) ایک ایک گولی کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد نیم گرم دودھ سے بلحاظ عمر دن میں دو سے تین بار دیں۔ یا طیریم (Maleriam) یا میفلو (Mefloc) یا میفلوپن (Meflopin) ایک ایک گولی دن میں تین بار ہمراہ ایک گلاس پانی دیں اور خالی پیٹ استعمال نہ کریں۔ پھلوں کا رس، دودھ، پانی خوب لیں۔

انفلوینزا :- فیکس پلس (Febrex Plus) یا نیو فیکس (New-Febrin) ایک ایک گولی دن میں ۲ سے ۴ بار دیں۔ آتشک :- ارسٹوسیلین (Aristocillin) یا کمپی سلین (Campicillin) یا اسکے سلین (Eskaycillin) ۲۵۰ ملی گرام کا کپ شولز ہر چھ گھنٹہ بعد دیں۔ ۵۰۰ ملی گرام کا کپ شولز دینا ہو، تو احتیاط سے دیں۔ کیونکہ اس سے دست لگ جاتے ہیں یا سپکسن (Cephaxin) یا پیکسن (Phexin) ۲۵۰ ملی گرام کپ شولز ہر چھ گھنٹہ بعد دیں یا ال تھرو سین (Althrocine) یا تھرو مائی سین (Thromycin) ایک گولی ہر چھ گھنٹہ بعد دیں۔ اس دوا سے قے و اسہال کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ایسی حالت میں اسے بند کر دیا جائے۔ دوران استعمال وٹامن بی کمپلیکس بھی دیئے رہیں۔

سوزاک :- نوربڈ (Norbid) یا نورفلیکس (Norflo) ایک گولی صبح و ایک شام ہمراہ پانی دیں یا راکسی بڈ (Roxibid) ایک گولی صبح و شام پانی سے دیں

کالی کھانسی :- امپی سلین یا البرسلین سیرپ ہر سے ایک چمچ بلحاظ مرض دن میں ۲ سے ۳ بار دیں یا ایٹھرو مائی سین سیرپ ہر سے ایک چمچ مرض کے مطابق دن میں تین بار دیں۔

وجع المفاصل :- آرٹی سڈ (Artisid) ایک ایک کپ شولز دن میں دو بار کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد دیں۔

زخم معدہ کے مریضوں کو نہ دیں یا بروفن (Brufen) یا البوجے سک (Ibugesic) یا کیٹوپروفن (Ketoprofen) یہ سب وجع المفاصل، جوڑوں کے پھتر جانے، جوڑوں کے درد، کمر کے درد و چوٹ کے درد میں مفید ہیں۔ بلحاظ عمر ۲۰۰ ملی گرام کی گولی دن میں ۲ سے ۳ بار دیں یا فینا مل بیوٹازون (Pheny Butazone) ۱۰۰ ملی گرام کی گولی دن میں ۲ سے ۳ بار دیں۔ گردے، جگر کے امراض، معدہ کے زخم و دل کے مریضوں کو نہ دیں۔ خالی پیٹ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مارکیٹ میں اسکی پارین

رومال جیک، بی بی زولین۔ الجے سین۔ ڈیٹازون وغیرہ ناموں سے بھی دستیاب ہے۔ گنٹھیا کے علاوہ پٹھوں کے درد، ورم،



موج، چوٹ کے لئے مفید ہے۔ یا کسی فن بوٹازون کے مرکب استعمال کرائے (Oxy Phen Butazone)

جاتے ہیں۔ یہ بازار میں اکسالجین (Oxalgin) فین ڈیرل (Phenderil) سوگازل (Suganril) کے نام سے

دستیاب ہیں۔ ایک سے دو گولی دن میں دو بار دیں۔ یہ بھی وجع المفاصل، ورم، چوٹ، کمردرد و پٹھوں کے درد میں مفید

ہیں۔ زیادہ دن استعمال کرنے سے چہرے و پاؤں پر سوجن ہو جاتی ہے۔ حاملہ کے لئے استعمال منع ہے۔ اور نہ ہی جگر، دل، گردوں کی کمزوری و معدے کے زخم والے مریض کو استعمال کرائیں۔ خوراک ایک گولی دن میں ۲ سے ۳ بار دیں۔

ڈیکسا بوٹارین (dexabutarin) یا بوٹاڈیکس (Butadex) یا بوٹاکارٹ (Butacort) بھی گنٹھیا میں استعمال کئے جاتے ہیں۔ یہ مرکبات گنٹھیا، پٹھوں کے درد، کمردرد اور ورم چوٹ کے لئے مفید ہیں۔ انہیں جگر کی سوجن، گردوں کے امراض، دل کے مریضوں، معدہ کے زخم اور پھیپھڑوں سے خون آنے کے مریضوں کو استعمال نہیں کرانا چاہیے۔

انجکشن سوجن کا علاج :- (جلدی، عضلاتی، وریدی انجکشن لگانے کے لئے دیکھیں "پنجیوال باب") انجکشن دینے کی غلطی یا لاپرواہی سے کبھی بھی انجکشن کی جگہ پر سوجن ہو جاتی ہے۔ اس میں خطرناک درد ہوتا ہے اور اس میں گانٹھیں پڑ جاتی ہیں۔ جو علاج کی اچھی سہولیات نہ ملنے کے باعث خطرناک پھوڑے کی صورت اختیار کر لیتی ہیں اور بہت بڑا زخم بنا دیتی ہے۔

اگر کبھی اس طرح سے انجکشن کی جگہ پر لالی، گرمی، سوجن، گانٹھیں اور درد ہو تو فوراً ہی مندرجہ ذیل ادویات کی ہلکی مالش کرنے کے بعد مٹھوڑی سی مرہم کپڑے پر لگا کر ٹیکہ والی جگہ پر چپکا دینی چاہیے۔ دن میں تین چار بار مالش بہت فائدہ دکھاتی ہے۔ مگر دیر سے کیا گیا علاج اچھا فائدہ نہیں دکھاتا۔ اس لئے ایک دو دن کے اندر ہی علاج شروع کر دینا چاہیے۔

مقرومیفوب آسینٹینٹ (Thrombophob Ointment) یا ہپارین کریم (Bepaorine Cream) یا ہیروڈائیڈ کریم (Hirudoid Cream) کا استعمال ضروری ہے۔

دنیا طے طب کی ایک نادر روزگار کتاب

لغات الادویہ

مرتبہ: حکیم کبیر الدین

کئی ہزار جڑی بوٹیوں اور مفرد ادویات کے نام اور شناخت سے متعلق مکمل تفصیل پر مبنی انسائیکلو پیڈیا۔ اردو زبان میں اپنے موضوع پر واحد مکمل، مفصل اور عظیم علمی اور تحقیقی کتاب، جس میں ہر جڑی بوٹی اور دواؤں کے نام اردو، عربی، فارسی، کشمیری، پنجابی، سندھی، ہندی، سنسکرت، بنگالی، لاطینی اور انگریزی سمیت پچیس زبانوں میں دیئے گئے ہیں کسی زبان کا ایک بھی نام معلوم ہو تو فوراً اس کے تمام زبانوں کے نام اور دوا کی ماہیت کا پتہ چل جاتا ہے اہل علم و فن، اطباء، وید، ڈاکٹر، دوا فروش اور عام حضرات کے لئے ایک نادر و نایاب تحفہ۔

دافع درد ادویات میں احتیاط ضروری

پیراٹامول :- مارکیٹ میں یہ کرو سین، میٹاسین، پائری، جیک وغیرہ ناموں سے ملتی ہے۔ بخار، سردی، بدن دردی وغیرہ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے با احتیاط استعمال کرنا چاہیئے۔ بڑوں کے لئے ایک ایک گولی دن میں ۲ سے ۳ بار۔ بچوں کے لئے سیرپ پیراٹامول یا کرو سین کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ اس کے زیادہ استعمال سے جگر کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔

ایسپرین :- ماہرین طب اسے مکمل محفوظ نہیں مانتے ہیں۔ یہ مارکیٹ میں ڈی اسپرین، مائکرو پائری، اسپرو، اناسین، اسے پی سی وغیرہ ناموں سے ملتی ہے۔ حالانکہ یہ ایک بہت ہی اچھی درد دور کرنے والی دوا ہے۔ لیکن اسے السر، دمر، ذیابیطس وغیرہ کے بوڑھے مریضوں کو نہیں دینی چاہیئے۔ ہاں! دل کے مریض اگر ایسپرین کی آدھی گولی اپنے معالج کے مشورہ سے استعمال کریں، تو اس سے ان کے دل و دماغ دونوں کی ہی خون کی نالیوں میں تنگے (Clotting) نہیں جمنے پاتے۔ جس سے دل کے دورہ کا خطرہ کم رہتا ہے۔

آئی بوپروفین (Ibuprofen) پیراٹامول کی ایک اور قسم (Piroxicum) فینائل بوٹازون، آکسی فین بوٹازون، انالجمین وغیرہ کا استعمال بھی درد دور کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ لیکن ان کا استعمال تب ہی کرنا چاہیئے۔ جب پیراٹامول یا ایسپرین کی گولیاں کارگر نہ ہوں یا آپ کے معالج نے آپ کو اس کے استعمال کی صلاح نہ دی ہو۔

مندرجہ بالا دافع درد ادویات نہایت احتیاط سے بہت زیادہ ضرورت پڑنے پر ہی استعمال میں لائیں۔

قد، وزن، غذا



کیا آپ تندرست ہیں؟ یہ خیال اکثر آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہوگا۔ آج ہم آپ کو صحت کی جانچ کا ایک ایسا آسان طریقہ پیش کرتے ہیں۔ جس سے آپ خود اپنی پانچ بچوں کی اور گھر کے دوسرے افراد کی صحت کا امتحان کر سکتے۔ مندرجہ ذیل چارٹ میں اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کی گئی ہے۔ اگر آپ تندرست ہیں اور آپ کو طبی نقطہ نظر سے نشوونما کرنے والی صحیح متوازن اور مناسب مقدار میں خوراک ملتی ہے۔ تو لحاظ قد آپ کا وزن چارٹ کے اندراج کے بالکل مطابق یا کافی حد تک ملنا جلتا ہونا چاہیئے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یا تو آپ بیمار ہیں یا آپ کو متوازن اور قوت بخش غذا مناسب مقدار میں نہیں ملتی، لہذا آپ تحقیق کر کے اس کا مناسب نڈاک کریں اور خطرے سے محفوظ رہیں۔

چارٹ مردوں کے لئے				اوسط وزن	
نمبر شمار	قد	سن	سیر		
۱	۵ فٹ	۱۲	۲۰		
۲	۵	۲	۲۲		
۳	۵	۴	۲۴		
۴	۵	۶	۲۲		
۵	۵	۸	۲۵		
۶	۵	۱۰	۲		
۷	۶	۲	۶		
چارٹ عورتوں کے لئے				اوسط وزن	
نمبر شمار	قد	سن	سیر		
۱	۴ فٹ	۱۰	۷		
۲	۴	۱۱	۹		
۳	۵	-	۱۲		
۴	۵	۱	۱۴		
۵	۵	۲	۱۶		
۶	۵	۳	۱۸		
۷	۵	۴	۲۱		
۸	۵	۶	۲۴		
۹	۵	۸	۲۵		



ڈاکٹری جانچوں ٹیسٹوں کا خلاصہ

ٹیسٹ کی اہمیت

نمونہ کتنا - کیا

کیسے کیا تیاری کریں

ٹیسٹ کا نام

خون کی عام جانچ

انیمیا (خون کی کمی) میں یہ جانچ کے لئے کہ کمی کتنی ہے۔ یہ جانچ آپریشن سے پہلے کرنی بھی ضروری ہے۔

کچھ بونڈس خون کی انگلی میں سوئی چھجا کر لیا جاسکتا ہے۔

کوئی پرہیز نہیں

۱۔ ایچ بی (ہیموگلوبین) اسی ٹیسٹ

سفید کنوں کی کل مقدار میں اتار چڑھاؤ سے بہت سے انفیکشن کا موٹا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ دوسرا خون کے کینسر میں یہ خاص طور پر ضروری ہے۔ تیسرا جن مریضوں میں کینسر روم کی بوتھ پراپی چل رہی ہے۔ ان میں یہ جانچنے کے کہ امیون پر نالی دب تو نہیں گئی ہے۔

کچھ بونڈ کی

کوئی پرہیز نہیں

۲۔ ٹی ایل سی (ٹوٹل لیوکوسائٹ کاؤنٹ)

خون میں الگ الگ قسم کے سفید کنوں کا اندازہ جاننے کے لئے اس کے سکرامک (چھوت دار) امراض کی قسم اور دوسرا کچھ الرجی کی قسم کے باسے میں پتہ چلتا ہے۔

کچھ بونڈ خون کی

کوئی پرہیز نہیں

۳۔ ڈی ایل سی (ڈیفرنشل لیوکوسائٹ کاؤنٹ)

انفیکشن کی تیزی کا موٹا اندازہ لمبے عرصہ تک چلنے والے امراض میں، اسے دہرانے سے یہ اشارہ مل جاتا ہے۔ کہ مرض قابو میں آ رہا ہے کہ نہیں۔ دوسرے پرانے امراض میں بھی اس کے گھٹنے بڑھنے سے مرض کی تیزی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس میں مندرجہ بالا چاروں ٹیسٹ شامل ہیں۔

دو ملی لیٹر خون

خالی پیٹ ٹیسٹ کے لئے جائیں

۴۔ ای ایس آر

دو ملی لیٹر خون

صبح خالی پیٹ ٹیسٹ کے لئے جائیں

۵۔ کیپلیٹ سمیوگرام (وڈ ای ایس آر)

خون کتنی دیر میں جمے گا۔ یہ جانچ کے لئے کسی بھی آپریشن سے پہلے یہ ٹیسٹ عام طور پر کروایا جاتا ہے۔

بی ٹی کی جانچ کے لئے انگلیوں سے نچر کیا جاتا ہے، سی ٹی کے کیپری ٹیوب میں کچھ بونڈ خون لیا جاتا ہے

کوئی پرہیز نہیں

۶۔ بی ٹی اور سی ٹی

الرجی اور کچھ قسم کی انفیکشن میں جن میں ایسینوفیلیا ہونے کا خطرہ ہو	دو ملی لٹر خون	کوئی پرہیز نہیں	۱۔ ایسولیوٹ ایسینوفیل کاؤنٹ
---	----------------	-----------------	-----------------------------

ذیابیطس کے لئے کی جانے والی جانچ

یہ جانچ کے لئے کہ مریض کو ذیابیطس ہے یا نہیں	پہلے خالی پیٹ	صبح خالی پیٹ جائیں	۱۔ بلڈ شوگر ایف (فاسٹنگ اور بی پی) (کھانے کے بعد)
دوسرا جن مریضوں میں ذیابیطس ہے۔ اس میں یہ دیکھنے کے لئے کہ مرض کنٹرول میں تو ہے۔	ناشتہ کرنے کے دو گھنٹے بعد ایک ملی لٹر خون	صبح خالی پیٹ ٹیسٹ کے لئے جائیں (بیڈ ٹی)	۲ (کھانے کے بعد) جی ٹی ٹی (گلوکوز ٹائرس ٹیسٹ)
ذیابیطس ہے یا نہیں۔	پہلے خالی پیٹ اور ناشتہ کرنے کے ہر گھنٹے بعد دو ٹیسٹ تک ایک ملی لٹر	بھی نہ لیں	

گردوں کے کام کرنے کی جانچ کے ٹیسٹ

یہ جانچنے کے لئے کہ مریض کے گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں یا نہیں گردوں کے کام کرنے کو جانچنے کے لئے ہی (کریڈینی فیو ر میں خاص طور سے اہمیت والا ہے)	ایک ملی لٹر خون	کوئی پرہیز نہیں	۱۔ بلڈ یوریا
جسم میں الیکٹرو لائٹس کے تال میل کو جانچنے کے لئے اس کی اہمیت بہت سے حالات میں ہے۔ جیسے اُلٹی (قے) دست لگنے پر جسم میں پانی اور الیکٹرو لائٹس کے اُتار چڑھاؤ کو دیکھنے میں۔ ہارٹ ایٹک وغیرہ۔ مگر گردے فیل ہو رہے ہوں تو اس کا خاص کام یہ معلومات دینے میں ہے کہ ڈایالیسس کی کب ضرورت پڑے گی۔	دو ملی لٹر خون	کوئی پرہیز نہیں	۲۔ سیرم کریٹینین
		کسی بھی وقت کوئی بھی پرہیز نہیں	۳۔ سیرم الیکٹرو لائٹس

جگر سے متعلق جانچ

جائڈس (ہیلیا) ہے یا نہیں، ہے تو کتنا زیادہ، اور یہ کہ جگر کی خرابی سے ہوا ہے یا خون کی خرابی سے۔	ایک ملی لٹر	ضروری ہے کہ صبح خالی پیٹ نمونہ دیا جائے	۱۔ سیرم بیلے روبن (ٹوٹل ڈائریکٹ)
--	-------------	---	----------------------------------

۲۔ ایس جی 'او' ٹی ایس جی 'پی' ٹی	ضروری ہے کہ مریض صبح خالی پیٹ نمونہ دیا جائے	دو ملی لیٹر	جگر میں بننے والے دوائی جو اس کے مرض میں مبتلا ہونے سے بڑھ جاتے ہیں۔ اس سے پیلیا کی قسم کا پتہ لگانے میں مدد ملتی ہے ہارٹ ایک کے علاج میں بھی اہمیت ہے۔
۳۔ سرم ایکلیٹن فاسفٹس	ضروری ہے کہ صبح خالی پیٹ نمونہ دیا جائے	دو ملی لیٹر	پیلیا کی قسم جانچنے میں مدد ملتی ہے۔ مرض جگر میں ہے یا اس سے پہلے اس کا بھی اس ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ ہڈیوں کے امراض میں بھی اس کی خاص اہمیت ہے۔
۴۔ سرم پریٹینز (ایس جی، ریشو)	خالی پیٹ ضروری	دو ملی لیٹر	بلے عرصے سے چلے آ رہے جگر کے امراض میں اور خرابی کی جانچ میں۔ پاؤں میں سوجن ہو تو اس کی وجہ ڈھونڈنے میں بھی اس ٹیسٹ کی مدد ملتی ہے۔
۵۔ اسٹریلیا نی جن	کسی بھی وقت	دو تین ملی لیٹر	جائڈس میں ہیپاٹائٹس۔ بی کے علاج کے لئے جانچ فائدہ مند ہے۔

دل کے امراض میں کی جانے والی جانچ

۱۔ سرم کولیٹرول	صبح خالی پیٹ جانچ کے لئے جائیں	دو ملی لیٹر	دل کے امراض میں کولیٹرول کی مقدار قلوب میں رکھنی ضروری ہوتی ہے اس لئے یہ جانچ ضروری ہوتی ہے۔
۲۔ سرم لاپرو پروٹین (ایچ ڈی) ایل ایل ڈی ایل دی ایل ڈی ایل	صبح خالی پیٹ جانچ کے لئے جائیں	دو ملی لیٹر	کیا دل کا مریض بنانے والی ہاپرو پروٹین بڑھی ہوئی ہے؟ اگر ہاں! تو کھانے پینے میں کیا احتیاط برتی جائے اور کون سی دوائیں دی جائیں جس سے وہ کم ہو سکے۔
۳۔ بلڈ شوگر	اس کی معلومات اوپر دی جا چکی ہیں۔		
۴۔ انجائلم ٹیسٹ ایس جی، او، ٹی ایس جی پی ٹی سی پی کے اور ایل ڈی ایچ	دو تین ملی لیٹر ایس جی 'او' ٹی ایس جی 'پی' ٹی ایل ڈی ایچ سی پی کے		ہارٹ ایک علاج میں (انگ انگ وقت پر) اس کی اہمیت ہے۔
۵۔ سرم ایکٹرو لائٹس	اس کی معلومات بھی پہلے دی جا چکی ہیں۔		

بخار کی وجہ تلاش کرنے کے لئے کی جانے والی عام جانچ

بلڈ کلچر	کسی بھی تیاری کی ضرورت نہیں	۱۰ ملی لیٹر	خون میں مرض کے جراثیم پائے جائیں تو علاج صاف ہو جاتا ہے۔
بلڈ فارمیٹ	ضروری ہے کہ جس وقت بخار آئے تب جانچ کے لئے خون دیں	کچھ بونڈیں خون	طیریا کی جانچ۔ یہ جاننے کے لئے کہ بخار طیریا تو نہیں ہے۔
وڈال ٹیسٹ	یہ ٹیسٹ بخار ایک ہفتہ سے زیادہ چلا جائے تب ہی کروایا جاتا ہے	۵ ملی لیٹر تک	موتی مہر (ٹائیفائیڈ، مہیادی) بخار کا شک ہونے پر۔
مونو ٹیسٹ	کسی بھی تیاری کی ضرورت نہیں (عام طور پر بچوں میں کیا جاتا ہے)	اس کے لئے بازو کی جلد پر "انٹی جن" انجکٹ کیا جاتا ہے۔ اسے ۲۸-۲ گھنٹے بعد پڑھا جاتا ہے کہ اس پاس کتنی لالی آئی ہے۔	ٹی بی کے علاج میں۔
سپوٹم فار	اگر بخار میں ساتھ کھانسی ہو اور بلغم آ رہا ہو	ڈاکٹر سے لی گئی بوتل میں بلغم لے جائیں	ٹی بی کے علاج میں۔

(اس کے علاوہ ہیمو گرام، ایس آر، چھاتی کا کھیرے، پیشاب ٹیسٹ ضرورت کے حساب سے)

تھائرائیڈ سے متعلق جانچ

سیرم ٹی ۳	کوئی پرہیز نہیں	۵ ملی لیٹر خون	تھائرائیڈ گرنختی ٹھیک سے کام کر رہی ہے یا نہیں
سیرم ٹی ۴	کوئی پرہیز نہیں		دوسرا تھائرائیڈ کو ہارمون بنانے کے لئے پریرتا پوری طرح مل رہی ہے یا نہیں
سیرم ٹی ایس ایچ	کوئی پرہیز نہیں		اور تیسرا تھائرائیڈ کسی کالکس میں اس کی وجہ سمجھنے کے لئے۔

کچھ دوسری جانچیں جو عام طور پر کی جاتی ہیں

ایزایچ پھیوٹ	کوئی پرہیز نہیں	دو ملی لیٹر خون	رومے ٹائید، گنٹھیا کے علاج میں مددگار۔
--------------	-----------------	-----------------	--

رومیٹک بخار کے علاج میں مددگار۔ حمل ٹھہرا ہوا ہے یا نہیں۔ یہ جاننے کے لئے۔	دوبلی لٹر خون ۱۰ ملی لٹر پیشاب	کوئی پریہیز نہیں صبح کا پہلا پیشاب نمونہ کی صورت میں	۱۔ اے ایس او ٹائپر ۲۔ پریگنٹس ٹیسٹ
بین کریاز کی سوجن: بین کریا مائی ٹس میں علاج کے لئے۔	دوبلی لٹر خون	کوئی پریہیز نہیں، مگر جائچ درد کے دوران موتی ضروری ہے	۳۔ سیرم ایماؤنی ٹیس
ایڈس کے علاج کے لئے۔	۵ ملی لٹر خون	-	۵۔ ایڈس ٹیسٹ (خدا غوبہا تما) نہ کرے (موت)
آنتوں میں کیڑے اور ایمی بائی سیس کے لئے۔	۵ گرام سٹول	-	۶۔ سٹول ٹیسٹ (بائے ادوا اینڈسٹ)
انفیکشن پتھری، ذیابیطس، گردے کے امراض سے موٹے طور پر جائچ کرنے کے لئے	۱۵-۲۰ ملی لٹر پیشاب	-	۷۔ پیشاب ٹیسٹ دروٹن اور صبح کا نمونہ مانکرو سکوپ)
گردوں یا مثانہ کی انفیکشن میں یہ جاننے کے لئے کہ کس قسم کی انفیکشن ہے۔ باجھ پین (اولاد نہ ہونے) کے معاملوں میں۔	۵-۱۰ ملی لٹر پیشاب	صبح کا نمونہ ڈاکٹر کے ذریعہ دی گئی "ٹائل" بوتل میں بھی پیشاب کی پہلی کچھ بوندیں اس میں ملی کر لیں ڈاکٹر ہی دیا کے مطابق	۸۔ ٹیورن کلچر ۹۔ سمن انالی سیس

بلڈ ٹرانسفیوژن اور آر، ایچ فیکٹر سے جڑی جائچ

بلڈ گروپ (اے، ایچ، او) اور آر، ایچ فیکٹر پتہ لگانے کے لئے۔	۲-۳ ملی لٹر	-	بلڈ گروپنگ اور آر ایچ فیکٹر
جو خون مریض کو چڑھایا جاتا ہے وہ خون دینے والے کے خون سے میل کھاتا ہے یا نہیں، اسے جائچ کے لئے۔	جس شخص کو خون چڑھایا جاتا ہو اور خون دینے والے کے خون کی کچھ بوندیں	-	کراس میچنگ

نوٹ:۔ جب بھی کوئی جائچ کروائیں اپنے معالج سے جائچ ضروری تیاری کے بارے میں ضرور معلومات لے لیں۔

ڈاکٹر کی پرچی کا اشارہ پہچانئے!

ایلوپیتھک طب میں کچھ ایسے اشاروں کا بیان ہے جنہیں ڈاکٹر اپنے پرچے میں عام طور پر لکھتے ہیں۔ ان اشاروں کے سلسلہ میں مفید معلومات درج ذیل ہیں۔
حکیم ڈاکٹر ہری چند ملتانی پانی پت (انڈیا)

دواکب کیسے لینی ہے۔ ان سے لگے اشارے

<p>اومنی ڈائے کا مطلب ہے، دن میں ایک بار، جب کوئی دوا دن میں صرف ایک بار ہی لینی ہوتی ہے۔ تب اس اشارہ کو اس دوا کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے۔</p> <p>بس ان ڈائے کا مطلب ہے۔ دن میں دو بار۔ جو دوا دن میں دو بار لی جانی ہو۔ اس کے ساتھ آپ یہ اشارہ لکھا پائیں گے۔</p> <p>یعنی دن میں تین بار۔ اس میں ایک مطلب اور جوڑ لیجئے۔ آٹھ آٹھ گھنٹوں کے فرق سے۔</p> <p>دن میں چار بار، چھ گھنٹے پر۔</p>	<p>اومنی ڈائے — ان لیٹن الفاظ کے پہلے لفظوں سے بنا ہے یہ اشارہ۔</p> <p>بس ان ڈائے۔ الفاظ کا مختصر مطلب</p> <p>یہ اشارہ بنا ہے، ٹران ڈائے سمینڈس، الفاظ سے۔</p> <p>لفظ میں، کوآر ٹران ڈائے سمینڈس</p>	<p>او۔ ڈی</p> <p>بی، ڈی یا</p> <p>بی، آئی، ڈی۔</p> <p>ٹی، ڈی، ایس یا</p> <p>ٹی، آئی، ڈی۔</p> <p>کیو، آئی، ٹی یا</p> <p>کیو، ٹی، ایس</p> <p>اے، ڈی</p>
<p>الٹرنیٹ ڈے یعنی ہر دوسرے دن۔ ایسی دوائیں جو ایک دن چھوڑ کر لینی ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ یہ اشارہ لکھا جاتا ہے۔</p> <p>یعنی رات کو سونے سے پہلے۔</p> <p>پوسٹ سائی بم کا اردو میں ترجمہ کیجئے گا تو بنے گا کھانا کھا لینے کے بعد۔</p> <p>بغور برکیفاسٹ کے معنی تو آپ سمجھتے ہی ہیں۔ ناشتے سے پہلے۔</p> <p>اس کے معنی ہیں فوراً۔ جو دوا ٹھیک اسی وقت دی جانی ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہ اشارہ لکھا جاتا ہے۔</p>	<p>ڈاکٹر کی پرچی میں یہ الٹرنیٹ ڈے کے لئے کہا جاتا ہے۔</p> <p>پورا لفظ ہے، 'ہوراسومنی'۔</p> <p>پوسٹ سائی بم الفاظ سے بنا ہے یہ اشارہ</p> <p>انگریزی کے لفظ — 'بغور برکیفاسٹ' کے معنی تو آپ سمجھتے ہی ہیں۔ ناشتے سے پہلے۔</p> <p>پورا لفظ ہے، سٹیم</p>	<p>ایچ، ایس</p> <p>پی، سی</p> <p>بی، بی، ایف</p> <p>سٹیم</p>

ایس، او، ایس	سی اولس سیٹ لفظوں کا مختصر...	یعنی جب جب اس کی ضرورت پڑے۔ کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کچھ حالات میں ہی لینا پڑتا ہے۔ ان دواؤں کے ساتھ ہی یہ اشارہ لکھا جاتا ہے۔
--------------	-------------------------------	--

اشارے جو دوا کی صورت کی طرف اشارہ کرتے ہیں

اشارہ	اس کی مکمل صورت	کیا ہے اس کا مطلب
ٹیپ کیپ ایس، والی پنی آئی، این، جے او، آئی، این، ٹی اپلی کیپ	ٹیبلٹ کیپ شول سیرپ انجکشن آسٹینٹ اپلی کیپ	گولی۔ یہ دوا کیپ شول کی صورت میں۔ دوا کا مرکب جو سیال حالت میں ہو۔ انجکشن کی حالت میں دی جانے والی دوا۔ مرہم ایک قسم کا کیپ شول جسے نگلنا نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے لئے باریک حصہ کو نئے بلیڈ سے کاٹ کر اس میں موجود مرہم کو ہدایات کے مطابق آنکھ یا زخم پر لگانا ہوتا ہے۔

انجکشن کیسے دیا جاتا ہے۔ یہ معلومات دینے والے اشارے

آئی، ایم آئی، وی ایس، سی	انٹرا اسکولر انٹرا وینس سبکیوٹینس	پٹھوں میں دیا جانے والا انجکشن نس میں دیا جانے والا انجکشن جلد کے نیچے دیا جانے والا انجکشن
--------------------------------	---	---

کچھ ملے جلے اشارے

ایم، ایل ٹی، ایس، ایف	سب لنگول ٹی سپون فل	زبان کے نیچے رکھ کر استعمال کریں۔ کچھ دوائیں اس طرح لینے پر اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ ایک چمچ جتنی یعنی کہ ۵ ملی لیٹر کسی بھی شربت کی خوراک کی حالت میں لکھی جاتی ہے۔
--------------------------	------------------------	---

بچے کو ٹیکے لگوائیں اور مرض سے بچائیں

ان میں خاص طور پر گل گھوٹو، کالی کھانسی، ٹیٹس، ٹی بی (تبدق) خسرہ، ایسے ٹیکے کی مدد سے ہی چھپک (بڑی مائٹا) کو دنیا بھر سے ختم کیا جا چکا ہے۔

ٹیکے کی بوستر خوراک کیا ہوتی ہے؟ جسم میں کسی بھی ٹیکے کا اثر ایک عرصہ تک ہی رہتا ہے، بچے کو پہلے سال میں دیئے گئے ٹیکے

”علاج سے بچاؤ بھلا“ یہ کہاوت پرانی ہے لیکن ہے درست ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ کسی مرض کا شکار نہ ہو۔ آپ بھی اپنے بچے کو دقت پر ٹیکے لگوا کر کئی خطرناک (جان لیوا) امراض سے بچا سکتے ہیں کئی امراض میں کئی ٹیکے زیادہ محفوظ اثر دکھانے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہر سال لاکھوں بچوں کو گل گھوٹو (ڈیفٹیریا)، کالی کھانسی (ککڑ کھانسی)، ٹیٹس، پولیو

پوری عمر کی حفاظت دیتے ہیں۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ اُسے وقت وقت پر ٹیکوں کی خوراک دی جائے تاکہ وہ اُسے اُس مرض سے ہمیشہ کے لئے بچھڑا دلا سکیں۔ اس قسم سے لگائے جانے والی حفاظت حاصل کرنے کے لئے ٹیکوں کے بعد دی جانے والی خوراک کو بوستر خوراک کہا جاتا ہے۔

ڈی پی، ٹی کیا ہوتا ہے؟ گل گھوٹو، ککڑ کھانسی اور ٹیٹس کے ٹیکوں کو ملا کر ایک ہی ٹیکہ تیار کر لیا جاتا ہے۔



ماں اور بچہ

خسرہ وغیرہ امراض سے بچاتے ہیں اور کئی بچوں کی زندگی کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو ان امراض سے بچائے رکھنے کے لئے اگلے صفحہ پر دیئے گئے نقشہ کے حساب سے انہیں سب ٹیکے لگوانے چاہئیں اور ٹیکہ کرن کے نقشہ کے مطابق لگائے جائیں۔ کسی کو کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی شک ہے تو اسے دور کرنے کے لئے اس کا عمل اس طرح ہے: ٹیکہ لگوانا ہوتا کیا ہے؟

اے تھراٹیک یا ٹریپل انٹی جن کہتے ہیں۔ یہ ان تینوں بیماریوں کو بچاتا ہے۔ کیا ڈی پی، ٹی دینے سے بخار ہو سکتا ہے؟ ہاں! ڈی پی، ٹی کا انجکشن دینے کے بعد بچے کو عام طور پر ایک دو دن کے لئے بخار آ جاتا ہے، ٹیکے کی وجہ سے بچے کو سوتی لگانے کی جگہ لالی آ کر سو جن ہو سکتی ہے اور درد بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تکلیفیں ہلکی بھی ہوتی ہیں ساتھ ہی بہت تھوڑے وقت کے لئے ہوتی ہیں۔ اس لئے ان سے گھبرانا نہیں چاہیئے اور ٹیکے ضرور لگوائیں۔ ساتھ ہی میں بخار دور دوا کرنے کی دوا بھی بچے کو یاد دہائیے۔ ٹیکہ لگوانے کے نقشہ کے مطابق ڈی پی، ٹی کی تین خوراکیں دینی

بچوں کو کئی امراض کی وجہ ایسے جرائم ہوتے ہیں جنہیں عام طور پر ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ جسم میں پہنچ کر تیزی سے بڑھتے ہیں، عام طور پر جسم کی مرض روکنے کی طاقت ان کا بچاؤ کرتی ہے۔ جسم کی اس بچاؤ والی طاقت کو بڑھانے کے لئے بہت ہی تھوڑی سی مقدار میں کسی مرض کے بچاؤ کے لئے ٹیکہ لگوانا کہتے ہیں۔ ٹیکہ جسم کو مقابلہ کی طاقت حاصل ہوتی ہے۔

کن کن امراض سے بچاؤ کے لئے ٹیکے: بچوں کے لئے کئی خطرناک بیماریوں سے بچاؤ کے لئے ٹیکے آج کل ملتے ہیں۔

کو اس مرض سے بچایا جاسکتا ہے۔ اس کا ٹیکہ نہیں لگتا صرف دوا پلائی جاتی ہے۔ جو تین خوراک میں دی جاتی ہے۔

کیا یہ درست ہے کہ پولیو ٹیکہ پلانے کے بعد کچھ گھنٹے پہلے اور بعد مال کا دودھ نہیں دینا چاہیے؟۔ نہیں یہ درست نہیں ہے۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ پولیو کی دوا پلانے کے بعد دیر پہلے یا بعد میں مال کے دودھ سے بچے کے جسم

کے ٹیکے کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ مگر اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ نظریہ درست نہیں ہے۔

منہ بچے میں ٹٹے
نس ہونے کی وجوہات؟

ٹٹے نس ایک خطرناک مرض ہے پیدا ہوتے ہی بچے کی نال کے راستے ٹٹے نس کے جراثیم اس کے جسم میں گھس جانے سے بچے کو یہ مرض لگتا

بے جب بچے کی نال بنا ابا لے دینا گرم کئے کسی بھی اوزار سے کاٹ دی جاتی ہے یا نال کو صاف نہیں رکھا جاتا ہے۔ اس لئے منہ بچے واس کی ماں کو ٹٹے نس سے بچنے کے لئے

حاملہ عورت کو ٹٹے نس کے ٹیکے ضرور لگوانے چاہئیں۔ دھیان ہے کہ ٹٹے نس کا دوسرا ٹیکہ بچہ پیدا ہونے سے ایک ماہ پہلے ضرور لگوا لیا جائے۔

خسرہ کا ٹیکہ بچوں کو کب دیا جائے؟ خسرہ کا ٹیکہ بچے کو عمر میں اس مرض کو خسرہ سے بچانے رکھتا

خسرہ کا ٹیکہ بچوں کو کب دیا جائے؟ خسرہ کا ٹیکہ بچے کو عمر میں اس مرض کو خسرہ سے بچانے رکھتا

خسرہ کا ٹیکہ بچوں کو کب دیا جائے؟ خسرہ کا ٹیکہ بچے کو عمر میں اس مرض کو خسرہ سے بچانے رکھتا

ضروری ہیں اور دوسرے بچے کے فرق سے ایک ایک کر کے تینوں خوراک دلائی جائیں۔ اگر کبھی بھی کسی وجہ سے ایک یا دو خوراک دوا دینے کے بعد باقی کی خوراک وقت پر نہیں دی جاتی تو بھی پہلے دی گئی خوراکوں کا اثر ایک دم ختم نہیں ہو جاتا۔ پھر بھی اسے ۳ خوراکیں دلائی ضروری ہیں۔ پہلے ہی ان کے دینے کے فرق میں تھوڑی دیر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اسی طرح بوسٹر ٹیکہ بھی دلانا

ضروری ہے۔ تاکہ بچے تینوں مرضوں سے لگتا رہتا ہے۔

بی، سی، جی... کا

ٹیکہ کیا ہوتا ہے؟ بچوں اور بڑوں کی طرف سے بی، سی، جی (تپ دق) سے بچانے کے لئے ٹی بی کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے، بچوں کو یہ

پیدائش کے بعد جلد سے جلد (پہلے ماہ میں) لگوانا چاہیے۔ تاکہ اسے تپ دق کے جراثیم اثر نہ کر سکیں۔

کیا ٹی بی کے ٹیکہ کی جگہ پھپھولا بننا درست ہے؟ ٹی بی

کا ٹیکہ لگانے کی جگہ پر ۲ سے ۶ سہفتہ میں پھپھولا پڑ جانا عام بات ہے اس میں کبھی کبھی تھوڑا پانی بھی نکل سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ پھوٹا ٹھیک ہو جائے گا۔

اور نشان ہی ہے گا۔

پولیو کیا ہوتا ہے؟ پولیو جراثیم سے ہونے والا خطرناک مرض ہے۔ اس کی وجہ سے بچے کے کسی بھی

اعضار کو لغو ہو جاتا ہے اور وہ اس مستقل مرض سے اپنا کوئی اعضار کھو بیٹھا ہے۔ پولیو کا ٹیکہ بچوں


کے جسم میں لگایا جاتا ہے تاکہ بچے کو پولیو سے بچانے رکھتا

ٹیکوں کا نقشہ حاملہ کیلئے

کب (عمر)	کون سا ٹیکہ	کیوں لگوائیں
حمل کی صورت، یعنی جلد سے	ٹی بی ۱ کا ٹیکہ	منہ بچے میں ٹٹے نس سے بچاؤ کے لئے
ٹٹے، ٹی، اس ۱ کے ایک ماہ بعد	ٹی بی ۲ یا بوسٹر کا ٹیکہ	منہ بچے کو تپ دق سے بچانے کے لئے
نوٹ: اگر پچھلا بچہ ایک سال کے اندر ہوئے تو صرف ایک ہی ٹی بی کے ٹیکے کام چل سکتا ہے۔		طاقت کمزور ہوتی ہے تو بچہ بیمار پڑ جاتا ہے۔

بچے کے لئے

کب (عمر)	کون سا ٹیکہ	کیوں لگوائیں
پیدا ہونے پر	بی، سی، جی کا ٹیکہ	تپ دق سے بچاؤ کے لئے
۶ ماہ کی عمر میں	ڈی پی ٹی کا پہلا ٹیکہ	گل گھوٹو، کالی کھانسی و
۱۲ ماہ کی عمر میں	پولیو کی پہلی خوراک	ٹٹے، ٹی، اس ۱ کے ٹیکے
۱۸ ماہ کی عمر میں	ڈی پی ٹی کا دوسرا ٹیکہ	ٹٹے، ٹی، اس ۱ کے ٹیکے
۲ سال کی عمر میں	پولیو کی دوسری خوراک	پولیو سے بچاؤ کے لئے
۳ سال کی عمر میں	ڈی پی ٹی کا دوسرا ٹیکہ	منہ بچے سے بچاؤ کے لئے
۴ سال کی عمر میں	پولیو کی تیسری خوراک	منہ بچے سے بچاؤ کے لئے
۵ سال کی عمر میں	ڈی پی ٹی کا تیسرا ٹیکہ	منہ بچے سے بچاؤ کے لئے
۶ سال کی عمر میں	خسرہ کا ٹیکہ	خسرہ سے بچاؤ کے لئے
۷ سال کی عمر میں	ڈی پی ٹی کا بوسٹر ٹیکہ	منہ بچے سے بچاؤ کے لئے
۸ سال کی عمر میں	پولیو کی بوسٹر خوراک	منہ بچے سے بچاؤ کے لئے
۹ سال کی عمر میں	ڈی پی ٹی کا بوسٹر ٹیکہ	منہ بچے سے بچاؤ کے لئے
۱۰ سال کی عمر میں	پولیو کی بوسٹر خوراک	منہ بچے سے بچاؤ کے لئے



اٹھائیسواں باب

یونانی، ایورویدک و ہومیوپیتھک ماڈرن تحقیقات

لہسن دل کے امراض و موٹاپا کے لئے مفید :- ابھی حال ہی میں حیران کن ریسرچ ہوئی ہے کہ لہسن کا لگاتار استعمال معدہ کے کینسر سے بچاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پستانوں و خوراک کی نالی میں بھی کینسر پیدا ہونے والے "ایفلوٹاکسن" کی حرکت کو روکتا ہے، جو کئی و مٹر کے دانے میں پایا جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کا کینسر پیدا کرنے والا جزو ہوتا ہے۔

موٹاپا دل کے مرض کی خاص وجہ بنتا ہے۔ اس کے لئے لہسن علاج کا کام کرتا ہے، اس لئے اس کا لگاتار استعمال چربی گھلاتا ہے، موٹاپا اور دل کے امراض دونوں سے بچا جاسکتا ہے۔



دل کے امراض کے معالج دل کا حملہ روکنے کے لئے ایسپرین کی ہر سے ایک گولی کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس سے خون تیار ہوتا ہے۔ کیونکہ خون میں چربی ہونے کی وجہ سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ جس سے خون کی نالیوں میں خون رُک جانے سے دل کا دورہ ہو جاتا ہے۔ اس سے معدہ پر کوئی بُرا اثر نہیں پڑتا جیسے ایسپرین سے پیٹ کے اندر زخم ہو جاتے ہیں۔ اس لئے ایسپرین سے لہسن زیادہ مفید ہے۔

میٹھی ذیابیطس کے لئے مفید :- نئی ریسرچ کے مطابق میٹھی کے بیج ذیابیطس اور دل کے امراض میں بہت مفید ہیں۔ میٹھی کے بیج روزانہ ۲۰ گرام در درے پس کر کھانے سے دس دن میں ہی پیشاب و خون میں شکر کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کی جانچ کروا کر پتہ لگایا جاسکتا ہے کہ آگے میٹھی کا استعمال کیا جائے یا نہ۔ علامات مرض میں کمی کا تجربہ تو مریض خود ہی کر سکتا ہے، پھر بھی

اچھا ہے کہ دس دس دن کے بعد جانچ کروالی جائے۔ اس کے بعد میٹھی کے زیج کی مقدار کم یا .. اگر ام تک ہر روز بڑھانی جا سکتی ہے۔ میٹھی کو کھانے کے ساتھ یا سبزی میں ڈال کر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ خوراک کی مقدار ۲۰۰ کیلوریز سے ۴۰۰ کیلوریز ہر روز رکھنے سے اور مانڈ و شکر (چینی) کا پرہیز کرنے سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ میٹھی کے استعمال سے صحت پر کوئی بُرا اثر نہیں پڑتا، اور نہ ہی کسی دوا کے ساتھ اُلٹا اثر ہوتا ہے۔ کل مقدار ۲۰ گرام یا .. اگر ام تک دن میں تین بار تقسیم کر کے لی جائے۔



ہمارے تجربات کے مطابق صرف میٹھی کے بیجوں کا استعمال ہی ذیابیطس کو دور کر دیتا ہے۔ میٹھی چیزوں چاول، آلو، گو بھی، اروی، کیلا وغیرہ کا پرہیز ضروری ہے۔ اور روزانہ ایک یا ڈیڑھ میل پیدل سیر کرنا مرض کو فوراً دور کر دیتا ہے۔ چینی کی جگہ سکریں کی گولیاں لی جاسکتی ہیں۔ مگر بہتر یہی ہے کہ بغیر سکریں کی گولیوں کے چینی سے پرہیز کیا جائے۔

اگر کرلیا، جامن، میٹھی ایک ساتھ لئے جائیں تو بھی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے اثرات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لئے صرف اکیلی میٹھی کا استعمال ہی فائدہ دکھاتا ہے۔

حکیم ڈاکٹر ہری چند ملتانوی گولڈ میڈلسٹ پانی پت (ہریانہ) انڈیا

ہلدی کے استعمال سے کینسر سے بچاؤ :- ابھی حال ہی میں کی گئی ڈاکٹر کملا کرشنا سوامی کی ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ ایک گرام ہلدی روزانہ کھانے سے برص کے کینسر سے دور رہتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ہلدی کے استعمال سے جسم میں مدافعتی نظام مضبوط اور چمٹ ہو جاتا ہے۔ اُنھوں نے جو تجربات کئے ہیں۔ ان سے ثابت ہو گیا ہے کہ ہلدی کے استعمال سے سیلوں کی مرمت کرنے والے 'ڈی' این 'اے' بڑھتے ہیں۔ اور ان سے ہارمون کا پیدا ہونا اور بڑھنا رکتا ہے جو اپنے آپ بڑھتے جانے والے سیل اور رسولی پیدا کرنے کے لئے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اُنھوں نے چوہوں میں کینسر کی طرح بڑھنے والے سیل داخل کئے، پھر ان کی خوراک میں ہلدی ملا کر دی۔ دو تین ہفتوں میں ہی وہ غائب ہو گئے۔ ہلدی کسی بھی شکل میں دی جا سکتی ہے، خواہ یہ عام خوراک میں ہو یا پاؤڈر کی شکل میں ہلدی میں کرکومن نام کا ایک مرکب ہوتا ہے۔



یہ چیزوں کو سٹرنے اور کینسر پیدا ہونے سے روکتا ہے۔ اُنھوں نے کہا کہ اگر اپنی صحت کا خیال رکھنے والے لوگ ہر روز ایک گرام ہلدی اپنی نارمل خوراک میں لیں، تو انھیں کسی قسم کا کینسر کبھی نہیں ہوگا۔

گاجر کے استعمال سے کینسر سے بچاؤ :- گاجر میں بی، کروٹین نام کا وٹامن کافی مقدار میں پایا جاتا ہے جو جسم کی کوشکاوں میں آکسیجن دور کرنے والے اثر کو کم کرنے میں کام دیتا ہے۔ آج کل صرف کینسر سے بچاؤ کے لئے ہی نہیں بلکہ کینسر کے علاج کے لئے بھی گاجر کا استعمال (پی کروٹین وٹامن) کا کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے ایری جو ناکینسر سنٹر کے ڈاکٹر کے مطابق تجربات سے پتہ چلا ہے کہ سگریٹ پینے والے والکوحل لینے والوں کی زبان و منہ میں پہلی حالت کا کینسر یا زخم اس وٹامن سے کم و ٹھیک کئے جاسکتے ہیں۔ لگ بھگ ۵۰ فی صدی میں یہ دھبے ۶ ماہ کے اندر ہی اپنے سائز سے آدھے رہ جاتے ہیں۔ یہ وٹامن یا تو گولی کی صورت میں یا زیادہ گاجر کھانے سے ملتا ہے۔ وٹامن سی ڈی کا بھی برابر اثر دیکھنے میں آیا ہے۔

کرلیے کے رس سے ذیابیطس سے بچاؤ :- کرلیے کا رس ذیابیطس کو دور کرنے کے لئے مجرب ہے اور یہ یقیناً ہی

”گوڈری کالال“ ہے اس سلسلہ میں تازہ کرلیوں کا رس نکال کر ۵ گرام سے ۲۵ گرام، کچھ نمک کھانے والا ملا کر ہر روز ہلکے ناشتے کے بعد پی لیں۔ ڈیڑھ ماہ کے استعمال سے مرض جاتا رہے گا۔ روزانہ ایک میل کی سیر اور میٹھی چیزوں سے پرہیز ضروری ہے۔ پھلوں میں جامن اور میٹھی کا استعمال نہ کریں۔ کیونکہ یہ لینے سے کرپے کے رس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔

جامن کے جوشاندے ذیابیطس سے بچاؤ :- کافی تجربات کے بعد جامن کے پتوں کا جوشاندہ ذیابیطس کے لئے کامیاب ثابت ہوا ہے۔ اس سلسلہ میں ۱۰ سے ۵ گرام جامن کے پتے پانی سے دھو کر صاف قینچی سے کتر کر ۶ گھنٹے ۵ گرام پانی میں بھگو کر رکھیں۔ پھر جوش دے کر چھان لیں۔ اور نمک کی چٹکی ملا کر دن میں دو بار پلا دیں۔ اگر شوگر کی زیادہ تکلیف ہے۔ تو دن میں تین بار بھی دے سکتے ہیں۔ میٹھی و بادی چیزوں سے پرہیز لازمی ہے۔ اور ایک میل کی روزانہ سیر بھی کرنی چاہیے۔ علاوہ انہی جامن کے استعمال کے دوران میٹھی، کرلیا، گڑ مار کا استعمال نہ کیا جائے۔ ایک یا ڈیڑھ ماہ میں آرام آ جاتا ہے۔



ذیابیطس کے علاج کے لئے ”ذیابیطس کا علاج“ اردو یا ہندی مصنف حکیم ڈاکٹر ہری چند ملتانی۔ کافی تجربات کے بعد لکھی گئی ہے۔ اسے نرالا جوگی پبلیکیشنز پانی پت (ہریانہ) انڈیا سے منگایا جاسکتا ہے۔

دل کے مریض کے لئے ارجن درخت کی چھال :- ارجن درخت کی چھال کے استعمال سے دل کا مریض پوری طرح ٹھیک ہو سکتا ہے۔ بنارس و شود دیا لہ میں کی گئی کھوج سے یہ سامنے آیا ہے۔ کہ اس علاج سے پوری طرح ٹھیک ہوئے لوگوں میں ایک ایسا مریض بھی ہے جس کی ۹۰ فیصدی دھمیاں رُک چکی تھیں، اور ڈاکٹروں نے اُسے پیس میکر لگوانے کی صلاح دی تھی۔ یہ معلومات ڈاکٹر کے ”این اڈوپہ“ نے دیں۔

ڈاکٹر اڈوپہ نے بتایا کہ ۱۰۰ دل کے مریض ارجن درخت کی چھال کے سفوف کو کھا رہے تھے، اور اس کے اچھے نتائج سامنے آئے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ اس سفوف کا استعمال تازہ پانی سے کیا جاسکتا ہے یا اس کا جوشاندہ بھی بنایا جاسکتا ہے۔ اس سلسلہ میں کھوج سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ارجن درخت کی چھال کا استعمال دل کے مریضوں کے لئے مفید ہے۔

یہی بات ہزاروں سال پہلے طب آیور وید نے کہی تھی۔ ”ارجن“ کا بالتصویر بیان ”تاج العقاقیر ہندوستان کی جڑی بوٹیاں“ جلد دوم مصنف حکیم ڈاکٹر ہری چند ملتانی میں دیکھیں۔ جلد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰



طب آیور وید میں ارجن درخت کی چھال سے تیار ”ارجن ارشٹ“ بھی دل کی دھڑکن، دل کا بیٹھنا، دل کا کمزور ہونا، دل کا ڈوبنا، (ہارٹ فیل) سے بچاتا ہے۔ خوراک ۱۰ سے ۲۵ ملی گرام برابر پانی ملا کر دیں۔

دل : بلڈ پریشر اور دُم کے مریض اگر ہر روز ۲۰ منٹ شو پر ماتا، خدا، واگورو کی یاد میں بیٹھیں تو ان امراض کو بہت جلد آرام آ جاتا ہے۔

حکیم ڈاکٹر ہری چند ملتانی، پانی پت

کالی ہڑ۔ ہلیہ سیاہ سے کایا کلب

ہے۔ بھوک بڑھ جاتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جب بھوک بڑھے گی۔ اور غذا خوب تحلیل ہوگی۔ تو اس کے نتیجے کے طور پر مردانہ طاقت زیادہ ہو جائے گی۔ مردانہ طاقت میں زیادتی کے علاوہ ہڑ سیاہ کی یہ خاصیت بھی ہے کہ سرعت کا عارضہ دور ہو جاتا ہے۔ غرضیکہ اس چیز کا ایک سالہ استعمال کایا پلٹ کر دنیا ہے۔ قدیم وقتوں میں ریاست جو دھ پور کے ایک ۶۵ سالہ بوڑھے

یہ ایک درخت کا پھل ہے۔ ہلیہ سیاہ (کالی ہڑ) ہلیہ زرد (پیلی ہڑ) اور ہلیہ کالی۔ اس کی ۲ قسمیں ہیں۔ جو پھل گھٹی پیدا ہونے سے پہلے گر پڑتے ہیں۔ انہیں ہی ہلیہ سیاہ (کالی ہڑ) کہتے ہیں۔ اور جب ہلیہ نشوونما پا کر موٹی ہو جائے تو اسے ہلیہ کالی کہتے ہیں۔ اس کا مفصل بیان ہندوستان کی جرئی بوٹیاں (مصنف حکیم ڈاکٹر ہری چند ملتانی) جلد سوم میں دیکھیں۔

نقشہ ترکیب استعمال ہڑ

نام مہینہ	بدرق مناسب موسم	مقدار ہڑ	مقدار خوراک ہڑ
جنوری، فروری	دارنفل (پیلی) سفوف	۵ گرام	۵ گرام
مارچ، اپریل	شہد خالص	۸	۸
مئی، جون	گوڑ سیاہ پرانا صاف	۶	۶
جولائی، اگست	نک سیاہ سفوف	۵	۸
ستمبر، اکتوبر	مصری سفوف	۸	۸
نومبر، دسمبر	سونٹھ سفوف	۵	۵

شخص کو ایک سال تک ہلیہ سیاہ کا استعمال کرایا گیا۔ سال بھر کے بعد بڑے میاں نے نئی شادی نوجوان لڑکی سے کی، اور باسی کرٹھی میں کچھ ایسا اُبال آیا۔ کہ صاحب اولاد ہو گئے۔ طریقہ استعمال جو آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ اس میں دو خاص مخفی نکات ہیں۔ جس سے بہت کم اطباء واقف ہیں اور

سرکردہ اطباء نے لکھا ہے

کہ اس سے کایا پلٹ ہو جاتی ہے یعنی سفید بال گر کر سیاہ بال نکل آتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ہڑ کا استعمال دیئے گئے نقشہ کے مطابق کیا جانا چاہیے۔ استعمال ہڑ کے متعلق مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ اکثر روایات ہڑ زرد کے متعلق ہیں۔ لیکن سرکردہ طبیبوں نے ہڑ سیاہ کا استعمال

ہی مفید بتایا ہے۔ اور ان کے تجربات ہڑ سیاہ سے متعلق یہ ہیں کہ:-
مندرجہ بالا بددقتات کی مادی مقدار کے ساتھ ہڑ سیاہ استعمال کرنے سے بے حد فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بڑی خوبی یہ ہے کہ پرہیز مطلق کچھ نہیں کرنا پڑتا اور سال کے جس شمسی مہینے کی ابتدا سے چاہیں استعمال شروع کر کے تمام سال کیا جاسکتا ہے۔

یہ دونوں باتیں معلوم نہ ہونے سے بعض اوقات ہلیہ کے استعمال کا جیسا کہ چاہیے، اتنا نفع نہیں ہوتا۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ اس کے بدرقہ میں جو گڑ لکھا ہے۔ وہ جس قدر پُرانا و صاف ہوگا۔ اتنا ہی نفع کرے گا۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ہڑ بعض مزارعوں میں خشکی پیدا کرتی ہے اور اس کے رفع کرنے کی دو تدابیر ہیں:-

پہلی تدبیر یہ ہے کہ ہڑ کالی کو خالص روغن بادام سے چرب کر لیا جائے اور دوسری تدبیر یہ ہے کہ حسب برداشت چکنائی کا استعمال ضروری ہے۔

ہلیہ سیاہ کے استعمال سے پہلا نفع یہ ہوتا ہے، کہ قبض رفع ہو جاتی ہے۔ پُرائے سے پُرائے نزلے کی تحریک جاتی رہتی ہے۔ آشوب چشم زائل ہو جاتا ہے۔ دماغ، معدہ دیگر کی اصلاح ہو جاتی

گھریلو ہومیوپیتھک فٹ ایڈجکس

اس مضمون میں ہم فٹ ایڈجکس گھر پر تیار کرنے کی معلومات اور ادویات کے نام پیش کر رہے ہیں۔ ادویات کی شیشیوں پر مضبوط کارک لگائیں۔ ہلکے شوگر بھی ایک اونس لاکر رکھ لیں۔ بچوں کے لئے بے بی فٹ ایڈجکس کی معلومات بھی دی گئی ہیں۔ جو کہ ہر گھر ہستی گھر میں ضرورت رہتی ہے۔

دوائی گولیوں کی صورت میں خریدیں۔ جب تک دیگر ہدایات نہ ہوں، ۲۰ پوٹینسی کی دوا کام میں لیں۔ بچوں کے لئے ۲۰ نمبر سائز کی گولی ہو تو دو گولی بڑھا کر پانچ گولی کی خوراک سمجھنا چاہیئے۔

یاد رہے کہ انڈیکسڈ شوگر پلز جنہیں گلوبول یا ہلیٹس کہا جاتا ہے۔ مختلف اقسام کی ہوتی ہیں۔ اور سب سے چھوٹی قسم کی نمبر ۱۰ اس سے بڑی نمبر ۲۰، پھر نمبر ۲۵، نمبر ۳۰ اس قسم سے انہیں معلوم کیا جاتا ہے۔ اس کا پوٹینسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ گولیاں دوا کی مادہ ہیں۔ دوا کے لئے ایک ڈرام کی شیشیاں ہی کام میں لائیں۔ یہ دوائیں ہومیوپیتھک سٹوروں پر دستیاب ہیں۔

ادویات کے کبس کو دھوپ، تیز خوشبو سے دور رکھیں، اور شیشی کے کارک کو مضبوط رکھنا ضروری ہے۔ دوا کو صاف ستھرے سفید کاغذ کے ٹکڑے پر اس میں سے ایک یا تین گولیاں ڈال کر انہیں زبان کی نوک پر ان کا رس اتارنا چاہیئے۔ شیشی میں سے جتنی گولیاں باہر نکالنا چاہیں۔ جتنی ضرورت ہو۔ باہر نکلی ہوئی گولیوں کو پھر شیشی میں نہ ڈالیں۔

ایک دوائی کو دو یا تین خوراک سے زیادہ نہیں دینی چاہیئے۔ اگر دوا علامات کے مطابق چنی گئی ہوں گی، تو وہ ۱۵ سے ۲۰ منٹ میں ہی کام کرنے لگاتی ہیں۔

فٹ ایڈجکس کی ادویات


نام دوا	استعمال	نام دوا	استعمال
۱۔ آرنیکا ۳۰	چوٹ کی وجہ سے جلد پر دراڑیں، سوجن، درد، بال توڑ۔	۱۲۔ ہائپریم ۳۰	ناخن پر چوٹ لگنے کی حالت میں
۲۔ ایس ۶	شہد کی مکھی کاٹنے سے سوجن پر۔	۱۳۔ اپی کاک ۲۰	جی پھلانا ناسے و خیر بہنے کی تکلیف میں۔
۳۔ بیلادونا ۳۰	سر درد، کان درد، ٹوٹا آنکھ کی لالی پر	۱۴۔ لیڈم ۶	کیل چبھنے و آنکھ پر چوٹ کی صورت میں۔
۴۔ کینڈلا ۳۰	کٹے ہوئے زخموں کے لئے۔	۱۵۔ نیرم سور ۶	سردی، زکام، چھینکیں، ناک بہنا۔
۵۔ کینٹھرس ۳۰	آگ سے جل جانے پر۔	۱۶۔ رسٹاکس ۶	موج آنا، کمردرد۔
۶۔ کاسٹیکم ۳۰	جل جانے پر۔	۱۷۔ پلسٹا ۳۰	ثقیل غذا سے بدضمی۔
۷۔ کایوس ۳۰	سفر میں جی پھلانے پر	۱۸۔ پلینٹیلو ۳۰	دانت درد، کان درد، بوا سیر۔
۸۔ کاربودیج ۶	بھوک نہ لگنے و پیٹ کی گیس کے لئے۔	۱۹۔ روٹا ۶	آنکھ درد، قبض، گھٹنوں کا درد۔
۹۔ کیمولا ۳۰	دانت نکلنے وقت امراض اطفال میں۔	۲۰۔ سمفائیس ۶	بڑی و آنکھ پر چوٹ۔
۱۰۔ کافا کروڈا ۳۰	بے خوابی، صدمہ سے بے ہوشی موحانا۔	۲۱۔ ٹیرے نیولا سی ۶	کاربیکل، بال توڑ، جلن و اسے پھوڑے۔
۱۱۔ ٹونان ۳۰	ٹوٹنے و سردی میں۔	۲۲۔ آئی کایوڈیس ۶	جل جانے و چھپاکی کے لئے۔

مدرٹنچر

نام دوا	استعمال	نام دوا	استعمال
۱۔ آرنیکا	بغیر کٹی پٹی چوٹ، جس پر سوجن یا شئی جلد ہو۔	۳۔ ہائپرکیم	ناخن پر چوٹ لگنے پر۔
۲۔ کیلنڈولا	کٹے پھٹے زخم اور بہتے ہوئے زخموں پر۔	۴۔ پلینٹگو میجر	دانت درد، مسوڑھے پر پھیری سے لگائیں۔
نوٹ:۔ یہ سب ادویات کیو (Q) ہوتی ہیں۔ ۵۔ بوند دوا دو تین چمچ پانی میں ڈال کر دن میں تین بار استعمال کرنا چاہیئے، بچوں کے لئے بالو کیمک ادویات کا بکس علیحدہ بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ جس کی ادویات مندرجہ ذیل ہیں:۔		۵۔ فکس ریزی	ایام زیادہ مقدار میں آنے پر
۱۔ فرم فاس ۱۲ x	چوٹ درد، دانت درد، سوجن۔	۴۔ کالی میور ۱۲ x	کان دھلے کے درد میں۔
۲۔ بکلیکریا فاس ۱۲ x	بچوں کے دودھ اُلٹنے پر۔	۵۔ میگ فاس ۶ x	پیٹ درد کی حالت میں۔
۳۔ کالی فاس ۱۲ x	نیند نہ آنے و چڑچڑاہٹ	۶۔ نیٹرم میور ۶ x	سردی، چھینک، ناک بہنا۔
بچوں کے لئے دوا کی مقدار دو یا چار ٹمکیاں دن میں ۳ یا ۴ بار دینی چاہیئے اور بڑے بچوں کو ۵ ٹمکیاں ہر روز (۲۴ گھنٹے میں) ۳ یا ۴ بار دیں۔ اگر آپ اتنی ادویات کا فاسٹ ایڈجکس گھر میں بنا کر رکھیں تو آپ کو ضرورت پڑنے پر دوا گھر میں ہی مل سکتی ہے۔			

تاج الحکمت (پریکٹس آف میڈیسن)

مصنف حکیم ڈاکٹر ہری چند ملتانی پانی پت کو مزید اعزاز دیئے گئے



۱۔ ۱۹۹۰ء میں پنجاب سٹیٹ آیور ویدک و یونانی ایسوسی ایشن لدھیانہ کے سالانہ جلسہ میں یونانی و آیور ویدک خدمات کیلئے شری جی، ایس گر لوال جوائنٹ سیکرٹری، ہلتہ پنجاب سرکار کے دست مبارک سے "سنان پتر" اور "شیلڈ" سے عزت افزائی کی گئی۔

۲۔ ۱۹۹۵ء میں آیور ویدک و یونانی رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنرز ایسوسی ایشن پنجاب کے سالانہ اجلاس میں آیور ویدک و یونانی طب کی خدمات کیلئے "سنان پتر" دیا گیا۔

اجلاس میں شری دلہان سنگھ جی کھیتی باڑی منسٹر پنجاب مہمان خصوصی تھے، اور پنجاب بھر کے سرکردہ وید حکیم و ممبران پنجاب سٹیٹ آیور ویدک و یونانی بورڈ کے علاوہ ہزاروں معزز شہری بھی اس اجلاس میں شامل تھے۔

ٹنکچر اشوک سے عورتوں کے امراض کا کامیاب علاج

دھوپ یا روشنی میں بھی اس کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس کو ہمیشہ ٹھنڈی اور اندھیری جگہ میں رکھا جائے۔ دوا کی شیشیوں اور بوتلوں کو کالے کاغذ میں لپیٹ دینے یا ڈبی میں ڈال دینے سے اندھیرا ہو جانے کے سبب دوا کے اوصاف کم نہ ہونے پائیں گے۔ تجارت کرنے کی غرض کے لئے اشوک کے ٹنکچر کو ۱۲ گرام، ۲۵ گرام اور ۲۵۰ گرام کی شیشیوں میں بند کیا جاتا ہے۔ اشوک ٹنکچر کی مقدار و ترکیب استعمال: بریٹنیوں کو اشوک کی چھال یا چھال کا جوشانہ دینے کی نسبت

ٹنکچر اشوک بڑی بڑی فارمسیاں بنا کر فروخت کر رہی ہیں اس کی آسان ترکیب درج ذیل ہے۔ یہ عورتوں کے ایام کے دشواری سے آنے والے عارضہ یا ناک، منہ، پیشاب، پاخانہ کے خون و رحم کی کمزوری اور جریان خون کے لئے بھی مفید ہے۔

اشوک کے درخت کی خشک چھال جو بہت پرانی سڑی ہوئی اور کرم خوردہ نہ ہو۔ دوائی بنانے کے کام میں لائی جائے۔ چھال کو کوٹ کر باریک سفوف بنالیں۔ اب اس سفوف کو شیشے کے چوڑے

مربعان میں ڈال کر اس میں الکوہل (۵۰ فیصدی والا) کو نوگنا مقدار میں ملا لیں۔ چار بالکل نیا اور صاف ہوا اب اس پر مضبوط شیشے کا ڈھکن کس کر اندھیری ٹھنڈی مگر خشک جگہ میں ڈھک کر رکھ دیں۔ دن میں دو تین مرتبہ ہلا دیں۔ ایسا کرنے سے چھال کا تمام اثر الکوہل میں آجائے گا۔ سات دن تک دوا پڑی رہے۔ بعد میں اس کو فلٹر پیپر یا موٹے کپڑے کی



اس کا ٹنکچر دینا نہایت موزوں ہے۔ نازک مزاج عورتیں اس کی چھال کا کڑوا سیلابین چار گرام سفوف یا اس کا ۱۲ گرام جوشانہ استعمال کرنا سخت تکلیف محسوس کریں گی اور ان کو آسانی سے نہ کھا سکیں گی، اس کے علاوہ چھال کو ٹٹنا، چھاننا بھی بذات خود ایک بھاری سردی ہے۔ اشوک ٹنکچر کا اثر سالوں پڑا رہنے پر بھی کمزور نہیں ہوتا۔

دو چار تہہ اکٹھا کر کے اس سے چھان کر شیشیوں، بوتلوں میں بھر لیں۔ نیچے بیٹھی اشوک کی چھال سے تمام اثر نکل کر الکوہل میں آجائے گا۔ سیال دوا میں اس کو بالکل نہ جانے دیا جائے، بلکہ اس کو بے کار سمجھ کر چھان کر پھینک دیا جائے۔ الکوہل اڑنے والی چیز ہے۔ اس لئے چار یا دو اسے بھری بوتلوں و شیشیوں پر مضبوط ڈاٹ لگا کر رکھا جائے۔ کارک یا ڈھکن ڈھیلا رد جانے سے تمام دوا اڑ جائے گی۔

الکوہل سے تیار شدہ دوا کو آگ کے نزدیک نہ لایا جائے کیوں کہ اس طرح معمولی لاپرواہی سے اس کو آگ لگ سکتی ہے سخت

اس کے چند قطرے پانی میں ملا کر آسانی سے پئے جاسکتے ہیں۔ تین سے دس قطرے ٹنکچر کو ۱۲ گرام تازہ پانی میں ملا کر مریضہ کو پلا دیں۔ دن میں ایسی تین چار خوراکیں پلانی کافی ہیں۔ کئی دفعہ دودھ گھنٹہ بعد بھی دوا دینی موزوں ہوتی ہے۔ کئی مریضوں کو ایک دو قطرے دوا پانی میں ملا کر دینی کافی ہوتی ہے۔ مریضہ کی عمر، مرض کی کمی یا زیادتی کو دیکھ کر کم یا زیادہ قطرے دے کر مرض کو دور کیا جاسکتا ہے۔ نہایت اعلیٰ اور زود اثر دوا ہے۔ مندرجہ بالا امراض میں دے کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ (پبلنگ کیلئے لائسنس ضروری ہے)



دھاتو واپ دھاتو شودھن کے طریقے

پروال (مُونگا) شودھن :- چھ چھ میں ۳ گھنٹے تک بھگو رکھنے کے بعد پانی سے دھو لیں، پروال شدھ ہے۔
پیتل شدھ کرنا :- پیتل کو آگ میں سرخ کر کے تیل، چھ چھ، گنو موتر، کاجی اور کلھتی کے کارٹھے میں سات سات بار بھجانے سے پیتل شدھ ہو جاتا ہے۔

دھاتوؤں کو شدھ کرنے سے ان میں صفائی پیدا ہو جاتی ہے اور خالص ہو جاتی ہیں۔ شدھ دھاتو کا کشتہ بھی جلد بنتا ہے اور زیادہ اثر رکھتا ہے، لہذا پارہ، گندھاک، سونا، چاندی وغیرہ کے کشتہ جات بنانے کے لئے ان کو شدھ کر لینا ضروری ہے اس ضمن میں متعلقہ دھاتوؤں کے شودھن کے طریقے درج کئے جاتے ہیں۔

تانہ شدھ کرنا :- تانبے کو گرم

کر کے تیل، چھ چھ، کلھتی کے کارٹھے میں رس انار داند اور رس برگ آک میں سات سات بار بھجا کر پھر ہاون دستہ میں کوٹ کر سفوف بنائیں، اور ایک ہانڈی میں گنو موتر بھر کر املی، نمک اور ساتھ ہی تانبے کا سفوف ڈال کر ۱۲ گھنٹے تک بالیں سرد ہونے پر صاف پانی سے دھو کر رس لیموں میں ڈال کر دھوپ میں رکھیں جب یہ رس نیلے رنگ کا ہو تب اس کو بدل دیں



اس طرح ۳ بار کر کے دھوپ میں سکھالیں، پس تانہ شدھ ہے۔
ترو دھاتا شودھن (قلعی، جت اور سکہ شدھ کرنا) :-
سرو دھاتا یا ترو دھاتا کو شدھ کرنے کے لئے تینوں دھاتوں کا الگ الگ شودھن مذکورہ دھاتوں کے شودھن میں درج طریقہ کے مطابق کریں :-

ابرک سفید و سیاہ شدھ کرنا :-
ابرک کے ٹکڑے کو ٹلوں کی آگ پر سرخ کر کے پوریت درخت بری کے کارٹھے میں سات بار بھجانے سے شدھ ہو جاتے ہیں۔
دیگر :- ابرک ورق ورق کر کے کھدر کی تھیلی میں ڈال کر سوراج دار کوڑیاں بھی داخل کریں۔ اور کسی کھلے برتن میں کاجی ڈال کر اس پوٹلی کو آٹھ پہر تک بھگو کر رکھیں بعد میں پیتل کو اتنی دیز تک دھتوں سے ملے رہیں جب تک کہ تمام ابرک باریک

باریک ذروں کی صورت میں تھیلی سے چھن کر پانی میں نہ آجائے، پھر اسے محفوظ مقام پر رکھ دیں تاکہ محلول ابرک تہ نشین ہو جائے۔
پس اب مذکورہ پانی کو نتھار کر تہ نشین تلچھٹ کو تیز دھوپ میں خشک کر لیں۔ یہی شدھ ابرک ہے۔

بارہ سنگھا شدھ کرنا :- بارہ سنگھا کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چھ چھ میں ڈالیں اور اسے تین دن تک دھوپ میں رکھیں، بعد ازاں پانی میں دھو کر دھوپ میں خشک کر لیں۔ اس سے بارہ سنگھا صاف ہو جاتا ہے۔

جت کا شودھن قلعی کی مانند عمل کریں، اور جت کو تر پھلا کے کارٹھے میں سات سات بار بھجائیں۔ شدھ ہو گا۔ احتیاط ہے کہ جو حکم مضبوطی سے بند ہو، در نہ جت باہر نکل کر جسم میں محسوس ہو گا۔



پارہ کی گولی بنانا

بوتیوں کے ذریعے پارہ کی گولی بنانا: کنگھی بُٹی،
لاجنتی، دھتورہ، برہم ڈنڈی، منڈی کلاں، جنگلی پودینہ، توری
تلخ، شیترج ہندی، سورج مکھی، کلونجی، تخم سوباخنے، رودنی
وغیرہ بوتیوں کا شیرہ نکال کر اگر پارہ کو کھل کر یں یا چوبہ دیں،
یا دونوں عمل کریں، تو کچھ عرصہ میں پارہ منعقد ہو جاتا ہے۔
دھتورہ بے خار کے ڈوڈے کے اندر رکھ کر اوپر ہلکی سی
لٹکا کر ہلکی آگ میں پکائیں۔ یہ عمل چند بار کریں۔ پارہ سخت
ہو جائے گا۔

۱۔ کونوں کی آ پنج پر لوہے کی کڑا ہی میں پتی تیلی ریت
بچھائیں۔ اس ریت پر چاندی کا برتن رکھیں۔ اس میں مولی
کے پتوں کا عرق ڈال کر متن چار توڑے پارہ ڈالیں۔ اوپر
زمیون کا تیل اس قدر ڈالیں کہ وہ دو انگل پارہ کے اوپر
چڑھ جائے۔ تب دو تین گھنٹہ آگ پر پکائیں اور تیل اوپر
سے الگ کر دیں۔ اور پنجے سے مدبر شدہ پارہ کپڑے سے
چھان لیں۔ منعقد پارہ کپڑے میں رہ جائے گا۔ جو پارہ کپڑے
سے نکل جائے۔ اس کو اسی ترکیب سے پھر منعقد کریں۔

پائے کی گولی کو دودھ میں لٹکا کر جوش دیں۔ پھر میٹھا ملا
کر نوش کریں۔ یہ دودھ جراثیم سے پاک ہوتا ہے۔ معدہ آگے
بخوبی سہم کر کے جزو بدن بناتا ہے۔ اسے استعمال
کرنے سے جسم میں خوب طاقت آتی ہے۔

پارہ کے وزن سے دو چند طوطیا اور طوطیا کے برابر
نمک کاسفوف لے کر کڑا ہی میں پہلے نمک کاسفوف بچھائیں،
اس پر نصف طوطیا کاسفوف بچھا کر اس پر دو تولہ پارہ ڈالیں۔
پھر طوطیا اور اس پر نمک بچھا کر اوپر پیالہ ڈھک دیں۔ پیالہ پر
کوئی وزن رکھ دیں۔ تاکہ وہ اپنی جگہ پر رہے۔ تب پیالہ کے
ارد گرد پانی ڈال کر کڑا ہی کے نیچے آگ جلائیں۔ ۶ گھنٹہ کے
بعد آگ بند کر دیں۔ جب پانی ٹھنڈا ہو جائے، تو اسے نکال
کر پیالہ اٹھائیں۔ نیچے سے پارہ جو شہد کی طرح گاڑھا ہو
گا۔ نکال کر کئی مرتبہ سادہ پانی سے دھو ڈالیں۔ تاکہ طوطیا
وصل کر نکل جائے۔ جب پارہ بالکل چاندی کی طرح ہو جائے،
اور پانی کے دھوون میں طوطیا کی رنگت نہ رہے نہ ذائقہ، تب
اس پارہ کی گولی بنا کر کوزہ آب نارسیدہ میں رکھ دیں، ۲۴
گھنٹہ میں پتھر کی طرح سخت ہو جائے گا۔

۲۔ مٹی کے گولہ میں پارہ بند کر دیں۔ اور سایہ میں سکھا
لیں۔ جب گولہ سوکھ جائے۔ تب قلعی، جست یا سیہ
لداخہ کے اندر وہ گولہ دے دیں۔ اور وہیں سرد ہونے دیں،
سرد ہونے پر چھینی سے کاٹ کر اندر سے پارہ عقد شدہ
نکال دیں۔

۳۔ سونا یا چاندی کا کشتہ کھل میں ڈال کر اس پر پانچ
گنا پارہ ڈال دیں اور عرق لیموں یا سرکہ یا کسی دوسری ترشی
سے کھل کر دیں۔ جب تمام پارہ اس میں جذب ہو جائے تب
ترشی گرا کر پارہ کی گولی بنالیں اور کوزے میں رکھ دیں۔
۲۴ گھنٹہ میں پتھر کی طرح سخت ہو جائے گا۔

حوائج ضروریہ اور صحت

بادِ مخالف کا روکنا :- بادِ مخالف وہ ہوا ہوتی ہے جو عقد کی راہ آواز کے ساتھ یا بلا آواز خارج ہوتی ہے۔ اس کے روکنے سے باؤ گولہ، درد پیٹ، ابھارہ، بدن کی سستی، بے قراری، نگاہ کی کمزوری اور پاخانہ، پیشاب کا رگ جانا پیدا ہوتا ہے۔

علاج :- پسینہ لائیں، سپازمیٹری دیں، حقنہ (انجما) کریں اور وایو کو خارج کرنے والی ادویہ دیں۔

قے روکنا :- اس کا سبب معدہ میں کسی خلافِ معدہ شے کا داخل ہونا ہے۔ اور چونکہ معدہ قبول نہیں کرتا اس لئے واپس منہ کے راستے خارج کرتا ہے۔ اس غرض سے معدے میں شور پیدا ہوتا ہے۔ جس سے قے ہوتی ہے۔ قے روکنے سے چھپاکی، فساد خون (درکت پیت)، خارش، کوڑھ، چھائیاں، بخار، زہر بادی، کھانسی، ذرہ، بھوک کی کمی اور پیت (صفرا) ہو جاتی ہے۔

علاج :- قے آور ادویہ دیں، حقنہ دیں، فاقہ کرائیں، نفع دھوا میں حباب دیں، ورزش کرائیں اور نمک و تیل سرسوں کی مالش کرائیں۔

چھینک روکنا :- نفعوں کے راستے میں جب رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تب قدرت اُسے بذریعہ چھینک کھول دیتی ہے چھینک روکنے سے گردن اکڑ جاتی ہے۔ درد سر، نفقہ، درد شقیقہ (آدھاسی) ہو جاتی ہے۔

علاج :- سورج کی طرف دیکھیں تاکہ چھینک کی رکاوٹ دور ہو، نیز خوشبو سونگھائیں۔ نسوار دیں۔

ڈکار روکنا :- معدہ میں پیدا شدہ گیس کا بذریعہ منہ باہر نکلنا ڈکار کہلاتا ہے، ڈکار کو روکنا بھکی، کھانسی، قبض اور سینے میں سوزش پیدا کرتا ہے۔

علاج :- جس طرح بھکی کا علاج کیا جاتا ہے۔

یونانی و آیوروید کتب میں حوائج ضروریہ کو 'دوگ' کہتے ہیں جس کا مطلب تیزی سے ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ :-

(۱) قے، (۲) ڈکار، (۳) کھانسی، (۴) بھوک، (۵) پیاس، (۶) سانس، (۷) چھینک، (۸) آنسو، (۹) غیند، (۱۰) بادِ مخالف، (۱۱) پیشاب، (۱۲) جمائی، (۱۳) پاخانہ۔

چونکہ دوگ جسم سے فالتو اشیاء و مواد خارج کرتے ہیں، اس لئے ان کا روکنا سخت نقصان پیدا کرتا ہے کیونکہ دوگ قدرتاً از خود خارج ہوتے ہیں۔

بہرشی جرک کہتے ہیں کہ عقل مند انسان کو پاخانہ، پیشاب، قے، چھینک، ڈکار، جمائی، بھوک، پیاس وغیرہ کا دوگ روکنا نہیں چاہیے، ورنہ بے شمار امراض لاحق ہوں گے۔

پیشاب کا روکنا :- پیشاب روکنے سے آلہ تناسل و مثانہ میں درد ہوتا ہے۔ سرد درد، ابھارہ، پیشاب کی رکاوٹ (حبس البول) درد پہلو وغیرہ شروع ہوتا ہے، بسا اوقات خون میں زہر پیدا ہو جاتا ہے جس سے موت واقع ہو سکتی ہے، نیز مثانہ پھٹنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔

علاج :- پیشاب روکنے سے جو امراض ہوں ان کے لئے پیشاب آور دوا سیر کریں، مالش کریں، جوشاندے دیں اور حقنہ (انجما) کریں۔

پاخانہ روکنا :- پاخانہ روکنے سے سر اور انٹریوں میں درد

ہونے لگتا ہے قبض کی شکایت ہوتی ہے، ڈکار آتے ہیں، زکام ہوتا ہے، بدن سست ہو جاتا ہے جسم ٹوٹنے لگتا ہے انٹریوں میں نفعہ سڑنے سے انٹریوں کی دق ہو جاتی ہے۔

علاج :- پسینہ لانا، مالش کرنا اور نہانا، حقنہ (انجما) کرنا اور قبض کشا ادویات دینا۔

صحت کے اصول

• ہمیشہ علی الصباح طلوع آفتاب سے پیشتر اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ اس میں برکت ہے۔

• صبح اٹھ کر بیک دم پانی وغیرہ نہیں پی لینا چاہیے۔ پانچ سات منٹ کے بعد جب دوران خون صحیح حالت میں آجائے تب رات کا باسی پانی پی لیں۔ پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں۔

اس طرح کے روزانہ عمل سے دائمی قبض رفع ہو جاتی ہے۔

• رفع حاجت کے وقت اپنا خیال کسی دوسری طرف منتقل نہ کریں۔ اس طرح نفسیاتی قبض واقع ہو جاتی ہے بلکہ چاہیے

کہ اپنی توجہ اپنے ایک ہی مقصد پر قائم رکھیں تاکہ انٹریوں سے براز باسانی خارج ہو سکے جو لوگ رفع حاجت کے وقت فضول باتیں سوچتے رہتے ہیں انہیں قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔

• رفع حاجت کے وقت انٹریوں پر زیادہ زور نہیں لگانا چاہیے۔ اس طرح آنکھوں کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔

• اگر آپ قبض محسوس کریں تو اس طرف فوری توجہ دیں کیونکہ قبض "ام الامراض" ہے یعنی بیماریوں کی ماں ہے۔

• آپ دست گرم پانی سے ہرگز نہ کریں۔ ایسا کرنے سے آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہے اور بواسیر کے سسے بن جاتے ہیں۔

• رفع حاجت کے وقت اگر دانتوں کو دبا کر رکھیں تو دانت درد کا فور ہو جایا کرتا ہے۔

• غسل سے پہلے مسواک ضرور کریں ٹوٹھ پیٹ برش کا استعمال مسوڑھوں کے لئے مفید ہے مسواک سب سے اچھی کیکر کی ہوتی

ہے۔ اس کے علاوہ نیم جامن، شیشم پلاس، سکھ چین وغیرہ کی بھی مسواک کی جاتی ہے۔ حلق، سینہ، زبان اور دانتوں کی

جو مکمل صفائی مسواک سے ہو سکتی ہے۔ وہ ٹوٹھ پیٹ اور برش سے نہیں ہو سکتی۔ ٹوٹھ پیٹ بس خوشبو پیدا کرتے ہیں۔ اور چونکہ لوگ آرام طلب اور عیش پرست ہوتے جاتے ہیں۔ اس لئے ان آرگنٹی اشار کا استعمال بہت ہوتا جا رہا ہے حقیقی معنوں میں مسواک کا استعمال سب سے عمدہ اور بہتر ہے۔

• مسواک کرتے وقت اگر نالوں کے ساتھ لگا کر سر نہچا کریں تو جگر کی زائد رطوبت خارج ہو جاتی ہے۔

• مسواک اتنے زور سے نہ کریں کہ مسوڑھے چھل کر زخمی ہو جائیں مسواک اگر سخت ہو تو اسے پانی میں بھگو دیں۔ نرم ہونے پر اسے چبا چبا کر برش سبنا لیں۔ چبانے سے دانتوں کی ورزش ہوتی ہے۔ دانت اور جڑے بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔

• ہر روز ہلکی سی کوئی نہ کوئی ورزش ضرور کیا کریں۔ اگر ورزش پسند نہ ہو تو سیر کرنے کی عادت ڈالیں۔ سیر اور ورزش سے جسم مضبوط بنتا ہے۔

• ورزش کرنے کے فوراً بعد ہرگز نہانا نہیں چاہیے جب دوران خون طبعی حالت پر آجائے تب غسل کریں۔

• غسل سے پہلے جسم پر خالص تیل سرسوں کی مالش کریں، تیل اتنا ملیں جو جسم میں جذب ہو جائے۔ اگر ایک چھٹانک تیل جسم میں جذب ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ نے ایک سیر گھی منعم کر لیا ہے۔

• مالش سے جسم تندرست اور خوبصورت بنتا ہے۔ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور بدن کی خشکی جاتی رہتی ہے۔

• سب سے بہتر غسل سرد پانی کا ہے۔ طبیعت اور حالات کے مطابق گرم پانی سے بھی غسل کیا جاسکتا ہے۔

بیماریوں سے محفوظ رہنے کے طبی اصول

۱۸۔ دودھ اور مچھلی ملا کر کھانے سے سفید دھبے برص اور کوڑھ ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے بعد بھی دودھ نہیں پینا چاہیئے۔

۱۹۔ زیادہ لال مرچ کھانے سے نظر کم اور معدہ خراب ہو جاتا ہے۔

۲۰۔ سب بیماریاں معدہ کی خرابیوں سے ہوتی ہیں۔

۲۱۔ رات کو پچھلے وقت میں پانی پینے سے ہاضمہ تیز ہو جاتا ہے اور قبض نہیں رہتا۔

۲۲۔ پیشاب روکنے اور حاجت مارنے سے کمزوری مشانہ اور درد مشانہ ہو جاتا ہے۔

۲۳۔ پائخانہ میں زیادہ دیر تک نہ بیٹھو، ورنہ دماغ کو نقص پہنچے گا۔
۲۴۔ قبض کو فوراً رفع کرنا چاہیئے۔ ورنہ صدمہ بطرح کے نقصانات اور دردوں کی امید ہے۔

۲۵۔ بے سبب دوا کے عادی نہ بنیں۔

۲۶۔ چھوٹے مرض کو حقیر نہ جانو، صحت کا زار و مدار صحت معدہ سمجھو۔

۲۷۔ جلاب کے موسم میں جلاب لینا بیماریوں سے بچاتا ہے۔

۲۸۔ کمزور آدمیوں کو بچوں کے برابر غذا دینی چاہیئے۔ اور بچوں کے برابر ہی دوا دینی چاہیئے۔

۲۹۔ ملاپ روزمرہ کرنا موت کا بخیم ہے۔ کمزوری دل و دماغ، بخار، لرزدہ اور عرشہ الارم ہے۔

۱۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد گھنٹہ آدھ گھنٹہ آرام کرنا چاہیئے۔ اس کا مفاد یہ ہے کہ کھانا اس عمل سے خوب ہضم ہوتا ہے۔ سستی اور کاہلی نہیں رہتی۔

۲۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد چیل قدمی ضرور کرنا چاہیئے۔ نیند خوب آئے گی، روح تازہ رہے گی۔

۳۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پیشاب کرنا چاہیئے۔ در و گروہ اور درد جگر کبھی نہ ہوگا۔

۴۔ سخت چیز دانتوں سے کبھی نہ چباؤ، بینائی کیلئے مضر ہے۔

۵۔ غصہ کے وقت کھانا کھانے سے بد ہضمی ہو جاتی ہے۔

۶۔ کھانا کھانے کے بعد اور غذا پانچ گھنٹہ بعد کھاؤ۔ ورنہ دل خراب ہو جائے گا۔ ہر وقت کھانا بے اعتدالی ہے۔

۷۔ بھوک نہ لگنا بیماری کی علامت یعنی جگر کی خرابی ہے۔

۸۔ ملاپ کے بعد پانی پینا مضر ہے۔ سست بناتا ہے۔

۹۔ دس دسے مریض کو رات کو غذا نہ کھانی چاہیئے یا ہلکی کھانی چاہیئے۔ ورنہ مرض زور پکڑ جائے گا۔

۱۰۔ بیماری سے صحت کے بعد کم سے کم غذا کھانی چاہیئے۔

۱۱۔ غصہ، غم، فکر زیادہ کرنا ہاضمہ خراب کرتا ہے۔

۱۲۔ بغیر بھوک کے کھانا صحت کو بگاڑتا ہے۔

۱۳۔ مرغ کے گوشت کے ساتھ موی کھانا مضر ہے۔

۱۴۔ سرکہ اور چا دل ساتھ کھانے سے داد پیدا ہوتا ہے۔

۱۵۔ شراب میں زہر طے کرنے کے بعد رنگ کالا اور شہد سبز ہو جاتا ہے۔

۱۶۔ موی اور وہی ملا کر کھانے سے درد و تلخ پیدا ہو جاتا ہے۔

۱۷۔ دودھ، لسی اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے سہیہ ہو جاتا ہے۔

حفظانِ صحت کیلئے ماہانہ طبی ہدایات

منفید

مضمر

جنوری :- بہار سے گرم پانی پینا، سویرے ہوا کھانا، روٹری تل چلوئے۔
دودھ کی چائے پینا۔

فروری :- بدن پر روغنِ بادام یا سرسوں کا تیل ملنا، نیم گرم پانی سے غسل کرنا،
مکان کا زیادہ گرم نہ ہونا۔ ورزش کرنا۔

مارچ :- صبح سویرے ورزش کرنا، موسم کی ترکاری کا استعمال بغیر روٹی کے موٹا
کپڑا پہنا، مصفی خون دواؤں کا استعمال کرنا۔

اپریل :- لمبوں اور پیاز کا استعمال کرنا، حلاب لینا، غذا کے بعد پانی
پینا، کچھ رات بے سفر کرنا مفید ہے۔

مئی :- صبح ورزش اسٹیا کا استعمال کرنا، بہار سے باسی پانی پینا،
صبح ہی نہانا، حلاب لینا مفید ہے۔

جون :- سر کو دھوپ سے ڈھانپے رکھنا، کچے لیکن بالکل تازہ دودھ
کا استعمال، رات کو سفر کرنا اور صبح نہانا، دن میں سونا، سستی کے اوپر کا پانی پینا۔

جولائی :- زود ہضم غذا کا استعمال، خوشبودار چیزوں کا سونگھنا، ہزار مکان
میں رہنا، زیادہ پانی پینا، دن کو سونا، ہوا دار جگہ میں رہنا۔

اگست :- صبح ہی اٹھنا، تازہ پانی سے غسل کرنا، صحبت کم کرنا، اچار کھانا،
باغ کی سیر، ہلکی غذا کھانا، صاف مکان میں رہنا۔

ستمبر :- صبح سویرے اٹھنا، تالاب کی سیر کرنا، تازہ پانی سے نہانا،
ہلکی غذا کھانا مفید ہے۔

اکتوبر :- بہار سے پانی پینا، صبح کو سیر کرنا، چشمہ میں نہانا اور صاف
سمقرے کپڑے پہنا۔

نومبر :- صبح اٹھتے ہی ورزش کرنا، دودھ والی چائے پینا، گرم
پانی سے نہانا، تھوڑی غذا کھانا مفید ہیں۔

دسمبر :- بند مکان میں تیل کی مالش کرنا، تازہ پانی پینا، گرم کپڑے پہنا
گلے اور کانوں کی ہوا سے حفاظت کرنا اور مغزایت کا استعمال۔

ایک دم گرم جگہ سے سرد جگہ جانا، ٹھنڈا پانی پینا، زیادہ گرم پانی سے
غسل کرنا، بدن کو ہوا سے نہ بچانا۔

صبح یارات کو ننگے بدن باہر نکلنا یا پاخانے جانا، مکان میں کوئلہ جلا کر
بند کر کے سونا، بدن ننگا رکھنا مضر ہے۔

سورج نکلنے کے بعد سونا، زیادہ ملاپ، نیا اناج کھانا، زیادہ باریک اور ریشمی
کپڑا پہنا اور اصطبل (مویشی گھر) میں سونا مضر ہے۔

ننگے بدن سونا، عورت سے زیادہ رجوع کرنا، دوپہر کو سونا، سو کر
اٹھتے ہی غسل کرنا مضر ہیں۔

بار بار پانی پینا، دن چڑھے سو کر اٹھنا، راستہ چل کر فوراً پانی
پینا مضر ہے۔

زیادہ پانی پینا، زیادہ ورزش کرنا، بدن کو ننگا رکھنا، سیاہ کپڑا
پہنا، گرم غذا کھانا مضر ہے۔

گرم غذا کھانا، زیادہ صحبت کرنا، دریا کے کنارے سیر کرنا، زیادہ محنت کرنا،
جسم ننگا رکھنا، کچی لسی پینا، زخم کی بے احتیاطی کرنا مضر ہیں۔

تر زمین پر لیٹنا، دھوپ میں پھرنا، رات کو زیادہ جاگنا، ناک کرنا، دن
کو سونا، رات کو ننگے بدن سونا، کچی لسی پینا مضر ہے۔

پاک کھانا، شراب پینا، دھوپ میں پھرنا، زیادہ حق پینا، زیادہ محنت کرنا،
چائے کا زیادہ استعمال کرنا مضر ہے۔

سورج نکلنے تک سونا، زیادہ رات تک جاگنا، وہی کھانا، شبنم میں
سونا، شراب پینا، گرم ورزش اسٹیا کا استعمال مضر ہے۔

سورج نکلنے تک سوتے رہنا، ٹھنڈی غذا کھانا اور ٹھنڈے
پانی سے نہانا مضر ہے۔

ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا، کوئلوں سے مکان کو گرم کر کے دروازے
بند کرنا، بدن کو ہوا سے نہ بچنا مضر ہے۔

تاج الحکمت پر منظوم نظریہ

(از فیضیاب حکمت قبلہ بی ڈی گراما صاحب شاعر و لکچرار آل انڈیا ریڈیو)
جناب گراما صاحب و دیگر دوست میری تصانیف کی تعریف تو کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تمام طبی طبقہ کی ہیں اور میں دوستوں کی رہنمائی سے ہی انہیں ترتیب دیتا ہوں لیکن میری ذاتی تعریف نہیں کی جانی چاہیئے، امید ہے کہ تمام دوست آئندہ خیال فرماویں گے! — ہری چند ملتانی

ڈاکٹر ہری چند کا تاج الحکمت
ایک خاص ہنرمند کا تاج الحکمت
نام پائے گا زمانے میں یگانہ ہو کر
طبیہ فن کا یہ نایاب خزانہ ہو کر
مائیہ ناز صحیفہ اسے سمجھیں دانا
بخشش حق کا بد یہ اسے سمجھیں دانا
روح لقمان وارسطو کے اشارے سمجھیں
ماہر فن سرخرو کے اشارے سمجھیں
طبی افلاک کے مخصوص ستارے یہ ہیں
ارضی خاک کے شاداب نظارے یہ ہیں
ادویات اس میں موثر ہیں نہایت چیدہ
نسخہ بندی بھی عجب درجہ غایت چیدہ
تجربات روز و شب اکثر ہیں مطلق کامراں
اعلیٰ تشخیص مرض اسباب علت ہیں عیاں
کیوں نہ ہونامی گرامی تاج الحکمت بر ملا
قادر و شافی نے بخشا اس کو ہے حکم شفا
مستحق اس کا مصنف ہے مبارکباد کا
جو معالج خاص ہے گراما دل نشاد کا

تاج الحکمت (پریکٹس آف میڈیسن) پر روزانہ ملاپ ۲۱ دسمبر ۱۹۶۶ء کی رائے

جناب ڈاکٹر ہری چند ملتانی گولڈ میڈلسٹ مستحق تشریک ہیں کہ آپ نے دس سال کی شب و روز محنت شاقہ کے بعد تاج الحکمت (پریکٹس آف میڈیسن) کے نام سے ایک ضخیم طبی کتاب شائع کی ہے، یہ کتاب بعد تصاویر نایاب طبی و ڈاکٹری معلومات پر کافی صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کی کتابت خوشخط و چھپائی آفیش صاف و شفاف ہے۔ اس کے حسن کو دوبالا کرنے کے لئے اس کی نہری گتے سے جلد بندی کی گئی ہے۔

یہ کتاب محض بناؤ سنگار کے لحاظ سے ہی ایک مفید صحیفہ نہیں بلکہ اس کا حسن یہ ہے کہ جس مقصد کے لئے یہ تصنیف منظر عام پر لائی گئی ہے وہ اس کی اشاعت سے پورا ہونا یقینی بات ہے۔ یہ کتاب نہ صرف پریکٹیشنروں کے لئے ہی ایک شیر کا کام دے سکتی ہے بلکہ جو امیدوار طبی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لئے اس کا مطالعہ کامیابی کا ضامن بن سکتا ہے۔

خوبی کی بات یہ ہے کہ اس میں طب البیومیتیک، یونانی، آیور ویدک، ہومیو پیتھک اور بالوکیک کے طریقہ ہائے علاج کو علیحدہ علیحدہ پیش کر کے سب تجربات کو ایک جگہ سمو کر ان کا سنگم بنا دیا گیا ہے۔ ان محاسن کے ادھار پر ہمارا نظریہ ہے کہ ملتانی صاحب نے یہ مفید کتاب شائع کر کے دکھی دنیا کی ایک بہت بڑی خدمت سر انجام دی ہے اور طبی لکچر میں بیش بہا معلوماتی اضافہ کیا ہے

LIBRARY
JAMIA HAMDARD



U75054

ہدایات متعلقہ اجرائے مطب

- ۱۔ پرائیویٹ میڈیکل پریکٹس شروع کرنے میں پابندی نہیں ہے لیکن آیور ویدک، یونانی و ہومیو پیتھک پریکٹس پر جن جن صوبوں میں حکیموں، ویدوں و ہومیو پیتھک کی رجسٹریشن مکمل ہو چکی ہے وہاں پابندی ہے اور بغیر گورنمنٹ رجسٹریشن کے پریکٹس جاری نہیں کی جاسکتی۔ ان حالات میں کتاب ہذا کا حوالہ دے کر اور جوابی خط لکھ کر "مینجرز لاجوگی پبلیکیشنز پانی پت" (ہریانہ) سے مفصل معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔
 - ۲۔ رجسٹرڈ معالج کو کسی بڑے شہر میں دکان کھولنے کے لئے کم از کم پانچ سے دس ہزار اور کسی قصبہ میں ایک سے دو ہزار روپیہ لگانا ضروری ہے اور قد سے صبر و انتظار کے بعد کامیابی یقینی ہے۔
 - ۳۔ معالج کو چاہیئے کہ مریض کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے، ادویہ کی قیمت مناسب وصول کر کے جدید آلات سے مریض کا معائنہ کرے۔
 - ۴۔ معالج کے لئے گیریکٹر کا پاکیزہ ہونا لازمی ہے، مطالعہ کا شوق ہونا چاہیئے۔ تاکہ نئی نئی دریافتوں سے واقفیت حاصل ہو سکے۔ اس کے لئے طبی جرائد کا مطالعہ از حد ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں اردو خواندہ اصحاب کے لئے اردو نرالا جوگی، پانی پت اور ہندی خواندہ اصحاب کے لئے ہندی نرالا جوگی، پانی پت کا مطالعہ ضروری ہے، تاکہ اپڈیٹ معلومات حاصل ہو سکیں۔
 - ۵۔ معالج کے لئے متعصب ہونا ایک بُری بات ہے، طبیب کو ہر قوم کے فرد سے ایک جیسا برتاؤ کرنا چاہیئے اور بلا لحاظ مذہب و ملت طبی خدمت کرنی چاہیئے۔
 - ۶۔ مریض کے راز کو معالج کے لئے پوشیدہ رکھنا لازمی ہے اور یہ راز امانت ہوتے ہیں، معالج کو ان میں کبھی خیانت نہیں کرنی چاہیئے۔
 - ۷۔ معالج کو اسٹنٹسکوپ، تھرمامیٹر، انجکشن سرینج وغیرہ بروقت اپنے پاس رکھنی چاہیئے۔ نہ معلوم ان چیزوں کی کب ضرورت پڑ جائے۔
 - ۸۔ لڑائی، جھگڑے اور زہر کھائے مریض کا علاج ہاتھ میں نہ لینا چاہیئے، کیونکہ اس سے کئی الجھنیں پیدا ہو جایا کرتی ہیں۔
 - ۹۔ ادویات زیادہ منگنی نہ دیں، معمولی دوائی آنکھ، کان میں گر ڈالیں، تو قیمت نہ لیں۔
 - ۱۰۔ مریض عورتوں کا دوسری عورت کی موجودگی میں طبی معائنہ کریں، عورتوں سے آزادانہ بات چیت سے بھی پرہیز کیا جائے۔
 - ۱۱۔ معمولی مشورہ کی کوئی فیس نہ لیں، دکان کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، ادویات تازہ و صاف سمٹھری رکھیں۔ مریض کو ڈاکٹر کی تسلی سیکڑوں دواؤں سے بڑھ کر ہے۔
 - ۱۲۔ ہول سیل ورٹیل ایلوپیتھک کیمسٹ، آیور ویدک سٹور، ہومیو پیتھک سٹور کھولنے کے لئے قواعد، فارم و معلومات اس کتاب کا حوالہ و جوابی لفاظہ بھیج کر "مینجرز لاجوگی پبلیکیشنز پانی پت" سے حاصل کر سکتے ہیں۔
- اگر علاج کے دوران مندرجہ بالا ہدایات پر عمل کیا جائے تو آپ ایک نہایت کامیاب معالج ثابت ہونگے اور آپ کی پریکٹس کو چار چاند لگ سکتے ہیں!


خادم فن
ہری چند ملتان میڈیکل ریسرچ سکالر

دنیاے طب کی ایک نادر روزگار کتاب

لغات الادویہ



مرتبہ: حکیم کبیر الدین



کئی ہزار جڑی بوٹیوں اور مفرد ادویات کے نام اور شناخت سے متعلق مکمل تفصیل پر مبنی انسائیکلو پیڈیا۔ اردو زبان میں اپنے موضوع پر واحد مکمل، مفصل اور عظیم علمی اور تحقیقی کتاب، جس میں ہر جڑی بوٹی اور دواؤں کے نام اردو، عربی، فارسی، کشمیری، پنجابی، سندھی، ہندی، سنسکرت، بنگالی، لاطینی اور انگریزی سمیت پچیس زبانوں میں دیئے گئے ہیں کسی زبان کا ایک بھی نام معلوم ہو تو فوراً اس کے تمام زبانوں کے نام اور دوا کی ماہیت کا پتہ چل جاتا ہے اہل علم و فن، اطباء، وید، ڈاکٹر، دوا فروش اور عام حضرات کے لئے ایک نادر و نایاب تحفہ۔

ملک بک ڈپو چوک اردو بازار، لاہور

عرصہ دلاز کے بعد شائع کر کے اب پھر علم طب کے شاہقین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے

عرصہ دلاز کے بعد شائع کر کے اب پھر علم طب کے شاہقین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے